





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
010/0





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
630/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
630/D




80f


630.


Complet


A xxix Bal


16




















G V L I E L M I 46796

BALLONII

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,

CONSILIORVM

MEDICINALIVM LIBRI II.

A **IACOBO THEVART**, Facultatis Medicæ Paris. Doctore,
Authoris pronepote, scholiis nonnullis illustrati,
digesti ac in lucem primùm editi.

TOMVS PRIMVS.

*In quo pleraque continentur quæ & ad Morborum cognitionem
eorundemque curationem propositis Exemplis, & obscurorum
Hippocratis locorum intelligentiam pertinebunt.*

Inter cetera elegantissimum & utilissimum est de Calculo Opusculum.

Adiecta est Authoris vita, cum Indicibus necessariis.



PARISIIS;

Apud **IACOBVM QVESNEL**, vñ Iacobæ;
sub signo Columbarum.

M DC XXXV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

B A L L O N I
M D I C I P A R I S I E N S I S C E P T E R I U M
C O N S T I T U T I O N E M
M E D I C I N A L I U M L I B R I I I

A J A C O B O T H E V A E T
A C A D E M I E P R O P O S I T O R I S
D I G E S T U M I N L U C E M P R I M O E D I T U M

I N Q U A P L A T A C O M M E N T A R I I S
C O N T I N E N T I S C U R A T I O N E M P R O P O S I T I S
C O N T I N E N T I S C U R A T I O N E M P R O P O S I T I S



A J A C O B O T H E V A E T
I N Q U A P L A T A C O M M E N T A R I I S

M D C L X X V



ILLVSTRISSIMO VIRO
DOMINO D. CLAVDIO
BOVTHILLIER,

SANCTIORIS INTIMIQUE
Confessus Christianissimi Regis Consiliario, &
Primario Sacri *Ærarij* Comiti, necnon Regij
vtriusque Ordinis Questori integerrimo,

IACOBVS THEVART, Doctor Medicus
Parisiensis. S. D.



IN HIL miki (Vir maxime) sed
virtuti tantum tuæ debes, quod liber
hic ab omnibus Philiatris iam dudum
expetitus, sub tuis felicibus auspiciis
in lucem prodit, honori que tuo datur.
Salutaria quæ continet ac tradit Con-
silia nullo alio patrono magis tutæ esse poterant, quàm
eo qui salutarium ac optimorum Christianissimo Regi
in arduis rebus Gallie Consiliorum auctor existit.

ã ij

cuiusq; fidei & consiliis cōmissa iam pridem sanctioris
Ærarij fuit Præfectura. His tam præclaris nominibus
nuper te Christianissimus ipse Rex in deligendis ditio-
num suarum administris longè sagacissimus ac pru-
dentissimus ex Augusto supremi Senatus ordine in
Sacrum secretumque suum Consilium adsciuit. In quo
quantà sagacitate & auctoritate iudicij aliorum sen-
tentias dirigas, quàm singulari prudentia tua ipse
consilia aperias, quàm expedita celeritate, eadem ubi
opus est exequaris, nemo est qui non passim admire-
tur ac prædicet. Sed interim dum gravissimis Gallie
rebus sic inuigilas, dum Te totum das atque consecras
publicæ salutis, scias velim me tuam ad incolumita-
tem studia omnia mea votaque dirigere: hoc quippe &
amplius à me non modò publica illa tua facinora qui-
bus universam deuincis Galliam iure meritoque re-
poscunt, sed ea potissimum incredibilis, quâ me sem-
per parentemque meum complexus es beneuolentia,
ad id me nec reluctante micogit & impellit. Huius tua
erga nos propensionis quoties recordor, me tibi deuin-
ctissimum debitorem toties profiteor, unaque doleo
tenuiorem mihi fundum esse quàm ut me unquam
eo debendi reatu liberare possim. Sed ecce mihi fide-
iussor auunculus ac sponsor idoneus occurrit BAL-
LONIVS ille, magni quondam nominis in salu-
berrima nostra facultate Medicus, cuius eximium
hoc Consiliorum opus in sinceri mei erga Te animi mo-
nimentum tuos ad tholos donarij instar humillimus

DEDICATORIA.

appendo. Quod si tibi gratum esse pro solita tua comitate significaueris, animum ad alia edenda addideris, quæ mihi vitæ decedens, sed nunquam moriturus Auunculus reliquit non minoris momenti opera: Bene ac feliciter vale (Vir iterum maxime) Et quo animo Clarissimus BVTHILLIERIVS patruus tuus, charissimum parentem meum nuper excepit, eodem queso me tibi deuotam eius sobolem prosequere. Ita fiet ut hoc Opus in tuam clientelam commendatum, tuæque dignationi nuncupatum maiorem tui nominis splendore apud omnes existimationem sit habiturum. Lutetiæ Parisiorum ineunte anno à salutifero partu M. DC. XXXV.

DEDICATORIA

apparet. Quod si tibi gratum esse pro solita tua co-
muni sequebatur, amemus ad illa cuncta additis-
vis, quae inveniuntur deinde, sed innumera monumentis
et innumera monumentis non minoris momenti opera. Bene
et sequebatur tunc (Vixit in hunc mundum) et quo an-
mo Christianus RUTHILII RILII 2 partem
tunc, christianus partem tunc in hunc mundum exegit
eodem quoque me tunc in hunc mundum exegit
Ita fit ut hoc Opus in tunc in hunc mundum commenda-
tum, tunc in hunc mundum innumera monumentis
monumentis sequebatur et innumera monumentis se ba-
bitur. Iste partem tunc in hunc mundum exegit
Iste partem tunc in hunc mundum exegit.

Iste partem tunc in hunc mundum exegit.



BENEVOLO LECTORI

IACOBVS THEVART Doctor
Medicus Parisiensis, S. D.



IV multumque tacitâ apud me cogitatione perpendi, priusquàm hæc GV LIELMI BALLO- N II aunculi mei, Clarissimi quondam nostri ordinis Decani, antiquiorisque Doctoris opera quæ per me nunc prostant, publici iuris facerem; tandemque rebus diligenter pensitatis de quibus ij maximè sunt solliciti, qui vt sua aliorumve scripta posteritati nota faciant, se noménque suum omnium censuræ subiiciunt, publicæ rei amor meos nimium prudentes metus vicit: cùm præsertim in ea semper fuerim sententia, ab eo tempore quo de hominis vitæ cursu quotidiano iudicare cœpi, eos beatos & aliquâ ratione humano fastigio sublimiores esse, quibus diuino munere concessum fuit, aut facere scribenda, aut

8 AD LECTOREM.

scribere legenda, beatissimos verò quibus vtrumque: sicque dolui summo iudicio, singulari prudentiâ, adeoque eleganti nitidâque dictione conscripta opera, tot vigiliis & lucubrationibus exarata, nostrisque adeò profutura nepotibus, aut in priuatos meos vsus solum verti, aut tandem in blattarum tinearumque escam seruari. Quod ne mihi probro adscriberetur ex omnibus BALLONII operibus editioni paratis, quorum me ille heredem testamentò instituit, Consilia hæc medica primùm in lucem emittenda censui, quòd scilicet à plerisque Philiatris desiderari, nullaque doctissimorum Collegarum (excepto Fernelio) ea de re scripta opera extare animaduenterim. Quæ quidem si diligenter & accuratè euoluas incredibile dictu quàm bene tuis studiis cōsultum erit. Primùm enim perfectam facilèmq; addisces methodum medendi plurimis morbis inauditis & curatu difficillimis qui in hac florentissima Parisiorum vrbe propter frequentiam & celebritatem, sæpius quàm alibi gentium aut sanandi aut diiudicandi proponuntur: Deinde verò legitimam & numeris omnibus absolutam, qualèmq; primarij olim Medici celebrarunt consilia ineundi rationem habebis: Denique non paucorum Hippocratis Aphorismorum elucidationem, adeò vt hæc quoque Consilia singularis alicuius commentarij loco meritò esse possint. At verò tuis commodis priuatim inseruiens, vtque vberiore,

&c

& nunquam satis optatum ex his fructum sis percepturus, copiosissimos rerum memoriâ scitûque dignarum indices vocumque Græcarum Latinarumque contexui: alios præterea duos perquam necessarios cùm morborum omnium & symptomatum, tum & Aphorismorum Hipp. qui toto opere explicantur: Denique quæ superflua mihi visa fuerunt multis in locis substraxi, scholiaque aliquot passim iis quæ ex Authoris speculio sunt adiunxi. Licet verò in describenda morborum symptomatumque historia, à capite ad calcem vsque progrediendo methodicum ordinem Author non sit secutus, non minoris propterea existimationis Consilia hæc esse debent. Enimverò id factum fuit quòd è re nata, & pro ratione temporum, quibus ægros inuifit, eorum affectus in commentarium & historiam redegerit, adde quod exquisita ordinis ratio in conscribendis Consiliis parui admodum sit momenti: quam ob causam Authoris seriem immutare nefas duxi, abundèque fuit prædictos morborum indices his subiecisse; quod si mihi laudi non vertatur, satis est tamen quod studio operæque mea in communem vsum relata sint. Cæterum aliorum operum seriem & catalogum quibus artem nostram locupletauit idem BALLONIVS, hîc non descripsi, neque etiam quod multos fecisse video adscriptorum commendationem, eum magnis encomiis & laudibus celebrandum suscepi,

quandoquidem id tentare aut aggredi frustranci laboris videri posset, nam quæ super ea re desiderari, tuumq; genium, ingeniumque pellicere & recreare poterunt, abundè & elegantissimè in eius vitâ ex Libro de illustribus Medicis Parisiensibus desumpta, est prosequutus Clarissimus Collega *RENATUS MORÆVS* Medicinæ & Chirurgiæ Professor Regius, summi iudicii & exquisitissimæ doctrinæ vir, cuius hoc non mediocre singularis virtutis argumentum est, quòd sic alienas virtutes quæ plurimis inuidiam aut fastidium pariunt colat, foueat ac prædicet. Interim si quæ hac in editione errata admissa esse obseruaueris, quæ typographo aut mihi imputari possent, exemplarium cacographia, frequentes in his obeli, atque huc illuc sparsi asterisci vtrumq; facilè excusabunt: quorum tamen compendiarium congeriem (quod multi solent) non struxi, quod ita leuia esse animaduertim vt te remorari nō debeant, deinde verò operis venustas & elegantia tali congerie velut deformi aliquo nœuo plerumque deturpatur. Itaque (*Beneuole Lector*) qui laborem meum ἀνεπιφθότως es obseruaturus, quidquid mei fuit officij diligenter aduertas bonique consulas quæso, eaque ratione audacior factus alterum eiusdem Authoris Consiliorum librū elegantissimum, aliâque dein præstantissima opera non minoris in medicina facienda vtilitatis necessitatisque prope diem excudenda curabo. Vale.



GVILLIELMVS DE BAILLOV;

EX LIBRO

RENATI MORÆI

DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS

ET PROFESSORIS REGII

De Illustribus Medicis Parisiensibus.



INTER cætera ἡ καλὰ ἡ μνηστέα αἴτια, hoc in Thucydide summum & eximium est docente Halicarnassæo, quod neque mendacium ultro dixerit, neque suam ipse conscientiam prodiderit. Quisquis ad historiam scribendam accedit, velim intelligat μὴν δυνέου τῇ ἀληθείᾳ, præceptoque Phocylidis obsequatur.

Ψεύδεται μὴ βιάζην τὰς ἐπιτημὰ πάντα ἀποβούτ;

Sic ut nihil odio, nihil amicitiae tribuat, non metuat, non speret, non parcat, non misereatur, non erubescat. Ut historia fax est & lumen temporum, sic historiae veritas: sine qua degenerat in fabulam ἡ εἰς ἀπείρην ἡ εἰς γῶγγειαν. Sic mecum ab initio huius operis constitui; ut nihil ad fumum, nihil ad pompam scriberem, nec dissimulatis, si quæ sint, crimibus, nec virtutibus, si desint, inductis. *Elogiorum* ea lex est ut splendeant solis virtutum luminibus, neque ultra hos carceres progrediantur, liberiora sunt βιογραφίας spatia, laudis & vituperij alternat vices, virtutis & vitij coloribus discriminatur; atque ut fidentiùs exultat in commemoratione rerum præclare gestarum, facinora tamen licet verecundè, ἡ ἀπὸ ἀνδραγαθίας delibat: Facit quod Pictores solent qui dum venustas imagines penicillo exprimunt, naves & umbras non prætermittunt, ne conciliandæ magis gratiæ quàm delineandæ speciei lenocinari videantur. In hoc ego imitatus graues & summos viros, in ipsa vitarum descriptione à nonnullis maculis interdum non abstinco; non tam conuiciandi pruritu & Tacit.

εἰ ij

Cassius, Herodia. Corn. Nep. Eunnep. libidine, quàm vt insinuem non modò quod sequendum, sed etiam quod sit fugiendum. Quod quidem non ideo longo deduximus exordio, vt in **GVILLELMO DE BAILLOV**, cuius historiam enarrandam suscipimus, multorum criminum aut vitiorum veniam deprecet, quàm vt à me criminationem adulationis remoueam; quod in illo culpandum nihil aut vituperandum inuenerim.

Patria & natalia Is Lutetiae natus circa annum Christi millesimum quingentesimum tricesimum octauum, Nicolao patre (quod illifuit cum Galeno singulare) **BALLO-** Geometriae & Architecturae peritissimo: qui è generosa stirpe **BAL-** **LONIORVM** apud Vnellos ad Nogentum Retrodi, vbi eorum est nobile pradium, oriundus, sedem & domicilium fortunarum suarum Lutetiam transtulerat; allectus fauore atque amicitia *Guillariorum Mortariorum*, qui eo saeculo primos dignitatis gradus in imperio Gallico erant consecuti. Ex his enim senior supremus Aerarj Tribunus Catharinae Mediceae regia & egregia aedificia molienti, apud qua gratia valebat plurimū, *Nicolaum* obrulit, vt eximium Architectū qui linearem daret delineationem, & Sacelli illius politissimi Sueffionensis Palatij, & scalarum regiarum quae sunt in postica Lupara, quo opere nec augustius quicquam nec elegantius prisca saecula viderunt. *Andreas* verò *Guillarius* in supremo Senatu Praeses vir integerrimae vitae vel eo argumento quod solus cū Sancerrae Comite, & Cancellario Hospitalio Principis Condai damnatoriae sententiae subscribere noluerit; *Guillelmum* Nicolai filium vnā cum liberis suis erudiendum in ludum litterarium miserit, ac propriis sumptibus aluerit. Florebat ea tempestate Academia Parisiensis non modò celeberrimis Professoribus, sed disciplinis institutisque seuerioribus: sic vt *Guillelmus noster*, cum esset procliu ad artes & scientias ingenio, & ad virtutes à natura comparato, intra aliquot annos Graeci Latineque sermonis peritissimus, Philologicarum & Philosophicarum rerum scientissimus, modestiae, pietatis, temperantiae, ceterarumque virtutum studiosissimus euaderet. Vt erat solitudinis amans, expertus curarum, ludi & alex nescius, honestarum etiam voluptatum negligens, impatiens otij, librorum helluo, pulcherrimarum rerum audus, prorsā, versaque oratione dies & noctes stylum exercens, primas in oratoria & poëtica consecutus est: adeò vt qui purius Latine loqueretur, aut floridius scriberet, aut literas pingeret elegantius parem non habuerit. Ita feliciter emenso liberalium disciplinarum stadio philosophicisque studiis ex vno Aristotele delibatis de *Pedagogia* cogitare coepit; quae vt hodierna die fax est saeculi & ingeniorum remora, sic ea tempestate fax fuit eruditionis, virtutis & gloriae seminarium. Annis aliquot in Montano Athenaeo humaniores docuit literas, quae ornamenta sunt superiorum disciplinarum; deinde inualecente eruditionis fama ad Aristotelem (quem nonnulli ex Academia exterminare contendebant) explicandum accitus & inuitatus frequentissimum auditorium habuit nobilium illustriumque discipulorum, qui tam ex eius ore facundo & erudito philosophiae praecipua, quàm ex modesto & verecundo eius vultu virtutum exempla hauserunt. Interim

Literas humaniores & philosophiam docet.

verò sub *Rochæo, Contæo, & Dureto* seniore Parisiensibus Medicinæ Professores rudimentum eius artis posuit, cuius postea futurus erat ornamentum. Tunc temporis erat Medicina velut in ætatis flore constituta, ex quo sub *Copo, Brissoro, Ruellio, Tagantio, Andernaco*, ex cineribus Arabum reuiuiscens, & adolescens sub *Hollerio, Flexelio, Syluro & Fernelio*, qui beatissimis suis consiliis emorientem Valesiorum stirpem fecundissimâ prole ad vitam excitauisset; cœperat florere & vigere ducibus *Varadæo, Dureto, Rochæo, Fabro, Pietreo, Laffilæo*, auctoritate, gratiâ, dignitate, gloria, opibus locupletata. Hoc lenocinio excitatus *Guillelmus* ad præclarissimam artem, Baccalaureorum numero adscriptus est anno 1568. ac sequenti biennio post *Martinum Akakiam* *ἰατρὸς πρῶτος*, primum in licentia gradum obtinuit; cum alioquin quatuordecim haberet Commilitones & Antagonistas, atque inter eos viros egregios doctrina & eruditione illustres *Antonium Valetum* Hollerij scholiasten, *Nicolaum Ellenium* scholæ nostræ Athlantem, *Henricum Blacuodæum*, *Ioannem Amicum*, *Ioannem Pelleterium*, *Claudium Bazinum*, & *Antonium Bruelium*, qui licet in eodem ordine, & sub iisdem ducibus cum *GVILLELMO BALLONIO* meruissent & pugnaissent, attamen non nisi post eum sacramento legibusque soluti missionem & exauctorationem adepti sunt. Renunciatus Doctor à *M. Nicolao le Grand*, anno 1570. sic se ad omnia Doctoris munia & officia exequenda comparauit, qua disputando, qua orando, qua docendo vt per quadraginta sex annos continuos suam stationem deseruisse non perhibeatur. In palæstra Medica tam strenuus pugil, disputator tam vehemens, tam acutus syllogismorum artifex, & subtilis argumentorum architectus, vt non solum in commentariis nostris ab eruditissimo Gourmeleno *Vir acutissimus*, sed etiam vulgò *flagellum manus Baccalaureorum* singulari Elogio diceretur. In componendis adornandisque *Thesibus*, siue sententiarum vbertatem, siue sermonis ornatum, siue polymathiam, siue concinnam rerum recto ordine coherentium seriem spectes nemini postremus: sic vt (quod hætenus in scholis nostris fuit inauditum) eruditissimam Thesim: *An cuique hominum sua uicē παρρησίαν, suus Genius*, bis disputandam proposuerit, anno scilicet 1602. & rursum anno 1615. omnium Medicorum rogatu perfectissimum illum & absolutissimum ingenij fortum suspicientium, è quo licet breui & exiguo plus ille laudis & nominis est consecutus,

Quam lenis è tota Marsus Amazonide.

Thesium apud Medicos Parisienses compositio vt varium & eruditum opus sic difficile, arduum, & argutum: concisa dictio sed compta, artificium singulare, sed de industriâ inuolutum, multiplices rerum & verborum ad gratiam non ad lasciuiam comparatæ delitiæ, eruditio mascula non elumbis, condita sententiis non lenociniis epicheiremata; syllogismo nititur quinque appendicibus quasi totidem fulto columinibus seu transtris; *πρῶτος* duobus primis corollariis exposita & confirmata sensim ducit ad *ἐπιληπτικὸν*, tertio & quarto explicatum & probatum, è quo *συμπεγνῆς*, vltima appendice deducitur ad totius negotij comple-

Studet Medicina.

Status Medicinæ sæculo superior.

Baccalaureat^{us} eius. Alterum licentia locum obtinet.

Doctor factus.

Eximius disputator.

Elogia eius.

Thesium peritus artifex.

Thesis bis disputata.

Martial. ep. 29. l. 4.

Thesis argutum opus.

Ut differunt Theses Medicæ Paris. ab alijs.

Stobæus de inuid. serm. 38. Liuior ab Guillelmo Ballonio, virtutum suarum splendore extinxit & comitate morum superauit.

Clandia. in Stilic.

Decanus electus.

Calamitas scholarum Paris. Pestis. Bellum Chirurgicum.

Lis in Empiricos.

mentum, argumento tam acri iunctura & subtili stamine contexto, ut artificium non nisi peritis & oculatis innotescat. *Theses* aliorum more si scribas, nihilo plus laboris & industriæ colles, quam si è libro transcribas: plana & facilis narratio, sed ieiuna & sterilis, nuda & plerumque barbara vocabula, scabra & inculta rerum maceries, nullæ scintillæ dignitatis litterariæ, nulli flosculi; ut occurrunt verba sic cadunt sub numeros, sed sine numeris, sine luminibus nequidem sententiarum quibus disciplinæ solent collustrari. Medicæ autem Parisienses ut verborum suauitate demulcent, sic sententiarum grauitate delectant, doctrina nobiles, arte illustres, rerum varietate mirabiles, totæ tamen suæ. Sese hîc explicant eruditorum ingenia, & in hoc scriptionis genere se produnt probantque tanquam in perplexo omnium opere atque arduo, è quo licet Doctorum eruditionem, facundiam & solertiam æstimare. Præfiscini dictum hîc velim ad amoliendam inuidiam, neue quemquam meo sermone commoueam, si palam & publicè profitear in isto laudis & studij argumento *Guillelmum* nostrum cæteros omnes anteuertisse. *Thesis illa* bis agitata, semel atque iterum probata, laudata semper, ut & *illa*, quam de rheumatismo & arthritide exposuit omnes in admirationem rapuere, nonnullos in æmulationem, in societatem gloriæ neminem. Soler plerumque inuidia alienis incrementis insidari, & comitari incedentes per gloriam non secus ac vinbra deambulantes per Solem. Eam tamen *Guillelmus Ballonius*, virtutum suarum splendore extinxit & comitate morum superauit.

*Facta sequebatur quamuis ingentia liuor
Solut hic inuidia fines virtute reliquit
Humanumque modum;*

Collegas enim suos tam fauentes & beneuolos expertus est ut primam illi ordinis sui dignitatem consulere, eumque mense Nouembri anni 1580. *Decanum*, qui caput est facultatis, conspirantibus omnium votis in biennium procrearint. Laborauit per ea tempora Medicus ordo Parisiensis duabus maximis calamitatibus *solitudine & seditione*. *Illam* induxerat pestilens lues quæ ferini & contagiosi catarrhi à caputio denominati prænuncia scholas feriari coëgit dispersis Doctoribus & discipulis urbem & Academiam deferentibus. *Seditionem* mouere aduersus facultatem *togati Chirurghi*, & arroganter publicè profitentes docentisque Medicinam, & impudenter Doctorum nomen & titulum ambientes. Per earum rerum angustias, & in illo negotiorum æstu in vno *Ballonio*, spes omnium & expectatio fuit collocata: utpote qui & auctoritate qua pollebat, & virtute qua cunctos demerebatur, & morum integritate qua plurimos antecellebat, & animi constantia atque fortitudine qua se à rebus aduersis frangi non patiebatur, vnus esset qui nutantem & labantem dignitatem nostram, labefactatumque imperium sustinere & fulcire posse videretur. Initio quoque sui magistratus nihil prius aut antiquius habuit quam ut Agyrtas, circumforaneos, & Empiricos quorum capita erant Itali duo *Cyprianus* nescio quis, & *Cafricanus* seu *Cabrianus* ex urbe exter-

minaret. Ut gens illa est adulteriis, lenociniis, veneficiis, Astrologicis & superstitiosis diuinationibus famosa, sic se solet tacitis artibus in aulas principum insinuare, & in Nobilium domos qui nihil nisi quod peregrinum est & exoticum amant & admirantur. Horum parricidia ut compesceret reos apud Senatum egit: neue hæc impetigo ad facultatis usque Medicos serperet, renouandum antiquum decretum omniumque Doctorum sigillis ac nouo iureiurando confirmandum curauit aduersus eos qui societatem inirent cum Empiricis & illegitimè Medicinam exercentibus. Interim aperto Marte pugnandum illi fuit in Ministros medicinæ refractarios, seruile bellum facultati & Academiae intentantes. Cum enim rogati Chirurghi, superioribus annis subreptitios libellos à Rege obtinuissent non solum de docenda publicè Medicinâ, sed de adipiscendis licentiarum & Doctoratus titulis, sensissentque elusos & retulos conatus suos nouo diplomate regio à M. Claudio Roussellet, primo decanatus sui anno qui fuit 1776. impetrato: ad nouas artes & technas conuolandum rati à summo Pontifice, nescio quo suadente Genio diploma indulti nomine extorserunt; quo Cancellario Ecclesiæ Parisiensis facultas demandabatur concedendi illis Apostolicam benedictionem ut licentiarum gloriâ relucerent. Mirare quod se ambitiosa illa societas extulerit, & quo fastu in omnium florentissimam Academiam quintam quādam facultatem introducere sperauerit! Cum itaque verendum foret, ne si taceretur, ius præscriptionis litteræ illæ habituræ essent, coercendusque initio videretur imperus iste nouitatis qui iam Rectorem Academiae (inconsultis licet ordinibus) cum toto suo ornatu & comitatu ad actus Chirurgorum euocauerat: Decanus primò expostulatione facta in Rectorem, ab illo publicam hanc confessionem extorsit, *pænitere se facti, & quod contra iura Academia illum actum Chirurgorum exornasset.* Deinde verò litem omnem ad supremum Senatum detulit, & cum Academia eiusque Cancellario ad ipsum prouocauit. Interea summi Pontificis fides & æquitas imploratur, multorum Purpuratorum Estensis, Pelleuæi, Rambulieri auctoritas interpellatur, Foxij apud Pontificem Oratoris Regij, Mureti, aliorumque clarissimorum virorum gratia & fauor crebris literis sollicitatur. Quid plura? apud Legatum Pontificium frequentes iriones & reditiones, orationes à Decano habitæ, variæ actionum formularumque argutiæ susceptæ, tandem dicta à summo Præsidente dies cum duabus aliis integris in Patronorum actionibus insumuntur. M. I. Chouart, pro Academia prudentissimè summoque iudicio dixit; M. D. Chopinus pro facultate aliquot capita satis plausibiliter perstrinxit: M. C. Robert, pro Cancellario vniuersitatis ingeniosè orauit: M. Augustinus de Thou, Regius patronus breuiter & ad rem conuenienter: Pro Chirurgis M. I. le Verst, à Chirurgo natus & Chirurgorum patronus vastè & effeminatè dixit, Academiae cardines & firma facultatis Medicae fundamenta molliuscula & effeminata oratione concutere ac conuellere giganteo more tentauit. Nec tamen ut ipse fatetur B A L L O N I V S in Commentariis sui Decanatus, plurimis licet sumptis laboribus hoc consequi potuit, ut absolutum ea de re Sena-

Decretum in Empiricos renouatum.

Causa litis in Chirurgis.

Diploma pontificiis pro Chirurgis.

Animaduersio in Rectorem.

Articuli digesti & oblatis. Ex Commentariis facult.

Ex iisdem
comment.
tusconsultum obtineretur. Desuit, inquit, voluntas nusquam, sed fortuna: Affectum quidem, sed non perfectum negotium. Nullus non à nobis susceptus labor est, partim ut apud senatum partim apud Romanam curiam res conficeretur. Nobis is desuit fauor qui in literas, & in publicam rem esse debet. Quod enim commune est negligitur. Accedit quod tot sunt ambages, tot in foro formula & diuerticula, ut ante in medio cursu obruamur, quam portum aliquem conspiciamus. Haecenus commentarij de illo negotio, cui quamuis extremam manum non imposuerit GVILIELMVS BAL-
LONIVS, ita tamen affecit & disposuit; ut illud non solum diuturnitate temporis sponte sit dissipatum, sed ambitiosa Chirurgorum societas sic attrita, ut quæ olim chirurgicarum rerum & medicarum cognitione superbiret, nunc rerum propè omnium ignoratione videatur gloriari. Relicta rerum publicarum administratione BALLONIVS ad vsum Medicinae se contulit; in quo tam prudenter feliciterque se gessit, ut inter primi nominis Medicos haberetur acceptissimus gratissimisque viris consultissimis Marescoto, Magno, Altino, Riolo seniori, Pietrao, Liebautio, Gourmeleno, Mironio, Laurentio, Segvino Archiatri, quibus fama & gloria par esse potuisset, si quantum doctrina & ingenio valebat, tantum vsu & exercitatione voluisset contendere. Sed homo ab omni fame aucupio alienus, diuitiarum quoque minimè appetens, neglexit adminicula quibus ad summos honores, & facultates conscenditur. Minus aulâ quàm Musæo delectabatur, magisque ægris plebeiis & ignobilibus quàm illustribus & Aulicis qui Medicos velut catulos in compedibus viæctos & alligatos retinent. Eum Henricus Magnus ante vrbs deditioem in oppido sancti Dionysij & benignissimè exceperat, & de rebus grauissimis, præsertim vero de calamitate Parisiensium differentem longo tempore audiebat; ut si voluisset ad aulam conuolare fauentia habiturus fuisset numina. Sed ab Aulâ velut famulatio abhorrens priuatam vitam amplexus est; exinde anno 1601. euocatus à Rege potentissimo hortante & suadente illustrissima Domina de Monglas Regiorum Liberorû curatrice, ut curâ susceperet salutis serenissimi Principis Delphini, cuius capite salus orbis continebatur; dignitatem eam recusauit, senilem ætatem, effætas vires, ingenii que tenuitatem obiciens, ne cogeretur otium domesticum aulico negotio, philosophicamque parcimoniam, Principum delitiis permutare. Ita sui iuris & potestatis factus popularibus suis medicinâ facitavit, non ad aucupandam (quod nunc fieri amat) popularē auram, vel ad opes summo æstu comparandas, sed ad ægrorum tædia leuanda & lenianda, tanta humanitate & comitate ut non instar Archagati à sæuitia vrendi & secandi hominum carnifex, sed à mitissima curandi ratione infantium Medicus, vulgò nuncuparetur. Interim nihil de studio remittere, Græcos Latinosque auctores probæ & antiquæ notæ diurna nocturnaque manu enoluere, difficillima eorum loca & notare & illustrare, præscam Hippocratis & Galeni doctrinam aduersus Nouatorum calumnias tueri, de grauissimis morbis & peritissimos quosque literis consulere, & vicissim à multis consuli, rariores morbos ac prodigiosos in aduersaria cogere &

ex-

Ad me-
dendum
se appli-
cat.

Gratus
Regi Hen-
rico.

Recusat
dignitatē
Aulicam.

Medicus
infantium
dictus.
Labor &
studium
eius.

explicare, singulorū morborum historias Hippocratis exēplo describere, quotidie aliquid adnotare, obseruare, designare; vt mirum sit negotioso homini tantū studij ad tot monimēta conscribenda; homini verō studioso tantū orij ad tam multa circa āgros suscipienda negotia superfuisse. Cū verō perfectissimum & absolutissimum Medicū sola eruditio non constituat, sed probitas & virtus, cuius gratia cātera quæ in vita contingunt expetuntur; potuit GUILLELMVS BALLONIVS, vt ingenij gloria, sic morum integritate gloriari. Pietatem enim imprimis quæ virtutum est condimentum, ἡ κτηλιάτων τὴν ἀλλήλων, ita excoluit, vt nullum diem à sacro missæ sacrificio intermisisse perhibeatur: omnia auspiciatus à Deo & in Deū omnia referens, vt pote cum Θεὸς παρὲν τοῦ ἀπὸ τοῦ ποέμενος, præsente & fauente numine quod inextricabile est, facili negotio explicari posse profiteretur. Tanta autem charitate exardescibat, vt non solum consilio āgros omnibus adiumentis destitutos solaretur, sed pecuniis subleuaret quas non paucas in pauperes singulis diebus erogasse multi recordantur. Ignotorum miseris illacrymari, aut verbis recreare gentes integrum non est humanitatis nostræ officium, sed egenis prospicere ac dare operam, vt pauperibus alimenta non desint. Licet verō Orthodoxæ religionis incensus amore hæreticæ prauitatis sectarios canepius & angue auersaretur; non potuit tamen probare pessima eorum consilia, qui Henricum IV. legitimū regni successorem auita hæreditate priuare malis artibus contendebant; sed eius partibus licet in vrbe rebellī non solum tacitè fauit, sed publico monumento quod sub Rineti nomine de calamitate & miseria ciuium Parisiensium conscripsit. Duxerat in vxorem filiam Geruasij Honoræi Pharmacopœi Parisiensis pudicissimam feminam, singularis virtutis, prudentiæ, probitatis, frugalitatis, è qua inter cāteros liberos filium minorem susceperat quem Medicinæ destinabat. Sed is postquam multa & virtutis & ingenij argumenta præbuisset, optimoque Parenti propter eximios in literis factos progressus esset acceptissimus, æstro quodam pietatis in familiam Capucinatorum transiuit, inscio & inconsulto, vt fieri solet, Parente. Qui cum hoc tristī nuncio quasi turbine afflatus fuisset, subito quidem casu exanimatus & velut è mentis statione dimotus fuit; sed mox reuocata in consilium ratione, & institutam filij diuinæ prouidentiae committens in hæc verba Euangelij prorupit, *meliozem illum partem elegisse quæ ab eo non auferetur*, piissimæque hæc meditatione recreatus secessum amantissimi filij patientissime tolerauit. Singulas virtutes quid attinet commemorare? cum obitu suo qui est vniuersæ vitæ ἀνεκάλυψις, & comœdiæ totius conclusio, quanta sanctimonia & mentis puritate vixerit reliquerit quasi consignatum. Eo enim temporis & rerum articulo quo virtutes & vitia pro suo in nos imperio solent cogitationibus nostris obuersari, eas ad Deū fudit preces, ea constantia venientem mortem excepit, eo spiritu mundi veneficia eiurauit, iis votis in cælum aspirauit, vt igniculos pietatis spectatoribus ingeneraret, cogerétque religiosissimum virum ex Capucinatorum ordine, qui vt vicem absentis filij suppleret illi assidebat, palàm exclamare

vir ut de-

ctus sic

probus.

Pietas

eius.

Philo de

nominum

mur.

Synes. ep.

139.

Charitas

vera.

Valent. ep.

Marcian.

l. 12. §. 2. C.

de sacro-

sanct. Ec.

cles.

Factioni

non sub-

scripsit.

Vxor.

Filius na-

tu minor

Franciscus.

nus.

Obitus &

mors.

in Ballonio se iusti Lotbi imaginem atque speculum contemplari.

*Corporis
dotes.*

Quadrato fuit GVILLELMVS BALLONIVS, & obesulo corpore, pleno, aperto, & ad lætitiā composito vultu, raso capillitio & barbitio, suauitate vocis eximia, blando eloquio, & in sales explicato, non dicaci, non petulanti.

*Ingenium
& virtus.*

Ingenio plurimum valuit, prudentia & sagacitate, laborum patientissimus, virtutum egregius cultor, comis quidem, sed ab vrbinitate sæculi alienus, totus in libris, sed in administratione rei familiaris propè nullus, quam vxoris prudentiæ committebat.

*Stylus &
dictio.*

Stylus illi floridus, limatus, nitidus, & in vtraque oratione profa & vorfa accuratus; dictio compta & elegans, circumcisa potius quam diffusa; condendi Epigrammatis insignis artifex, cuius exemplum non pigebit

*Poeta non
vulgaris.*

apponere ex Commentariis Dureti in Coacas Hippocratis desumptum, quibus Epigramma præfixit:

Exit opus tandem, multos quod præsit in annos

Duretus, Coi lux & imago senis:

Fallor non operis, non libri nomina quadrant:

At melius dici bibliotheca potest:

Cunctorum hic seges est medicarum vberima legum,

Et modica medicas mole coerces opes:

Morborum causas & signa, ægrosq; & horum

Legibus & cautè, queis medeare, docet:

Vanalis medicina hac Ilias unica proster;

Erustra alios cudes bibliopola libros.

Liberi.

Ex suauissima vxore liberos quatuor suscepit, duos mares, feminas totidem: Filius natu maior armaturæ militaris inspector & arbiter: minor militiæ Capucinatorum nomen dedit, Polycarpi cognomen consecutus, vir vt facundiâ sic pietate nulli secundus: filiarum alia D. Chappotino tributarij iudicij Nauennensis Præsidi saltuariôque Præfecto nupsit, altera D. Subleto armatæ militiæ Censori & Aristarcho, quos opimâ satis hæreditate beauit.

*Antiquior
Doctus.*

Obit Antiquior Scholarum Magister, anno Doctoratus sui 46. ætatis 78. Christi 1616. elatus in ædem D. Paulo sacram vbi resurrectionem expectat.

*Mortis ætatis.
Pronepotes
duo.*

Loco filiorum duos Pronepotes habuit Doctores Medicos Parisienses, vnum à sorore Simonem le Letier, eruditissimum prudentissimūque virum; alterum ab vxore IACOBVM THEVART, non minus virtutum quàm Librorum & Manuscriptorum heredem. Is cultissimi ingenij vir, doctrina & eruditione nobilis, rerum philosophicarum & Medicarum cognitione clarus vt reipub. medicæ dignitatem promoueat, simulque memoriam optimi Senis intermorituram exsuscitet, opera eius omnia publici iuris facere constituit, quod vt cito perficiat omnium literatorum nomine rogo & obsecro, vt si quidem tanti beneficij non sit au-

AUTORIS.

19

Et or, saltem erogator habeatur. Idem quoque vir Iconem *BAL- Icon.*
IONII pollicetur, ut eodem momento, & mentis imaginem & corpo-
 ris simulacrum liceat intueri.

Inter libros editioni paratos, sequentes in bibliotheca eiusdem clarissi- *Libri*
 mi *THEVARTII* asseruantur, *edendi.*

Consiliorum Medicinalium libri duo.

Epidemiorum & Ephemeridum libri duo.

De virginum & mulierum morbis liber.

Epistolarum Medicinalium liber.

Opuscula Medica de Arthritide, lapide, & urinarum sedimento.

In quibus omnibus vterum auctoritas contra Ioannem Fernelium de-
 fenditur:

Definitionum Medicarum liber.

Commentarius in librum Theophrasti de vertigine.

Adversariorum medicinalium liber.

De Gibbositate libellus.

Paradeigmaton liber.

*Epitome primorum librorum s. Gal. de simpl. medicamentorum facultati-
 bus.*

Morborum omnium Onomasticum.

*Dicta septem sapientum carmine latino expressa, quæ seruantur in Bi-
 bliotheca D. le Letier Pronepotis.*

Amicos, familiares, discipulos eius superfluum esset recensere, cum *Amici,*
 ex Epistolarum & Consiliorum libris repeti facili negotio possint.

FINIS.

I ij



IN COMMENDATIONEM
OPERIS D. G.

DE BAILLOV,
CLARISS. MEDICI PARISIENSIS
olim Decani, & Scholę antiquioris
Magistri,

EPIGRAMMA.

D^V *M* sua consultus miseris BALLONIVS
a^{gris}
Consilia impertit, consulit ipse sibi:
Corporibus tantum, atque ad tempus profuit; at nunc
Victuro aeternum consulit ingenio.

IOANNES BERAULT
Doctor Medicus Parisiensis.



IN DOCTISSIMA CONSILIA
Medica Clarissimi viri D. D.

GVL. DE BAILLOV,
DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS

olim Decani, & antiquioris
Scholæ Magistri,

HEXASTICHVM.

SE urgeri fatis cernens *BALLONIVS*, atque
Abrumpi vitæ stamina grata sua:

Nil facitis, Parca, nec enim minùs ipse saluti

Humana, scriptis auxiliabor, ait:

O res mira! aliis nam sic dum consulit, ipse

Producit vitæ stamina grata sua.

GVIDO PATINVS, Bellouacus,
Doctor Medicus Parisiensis.

IN EADEM.

L Vcrum alij quærant: *BALLONIVS* arte salutem
Reddit Consiliisque; omnibus absque lucro;

Hoc Medico amissam desperet nemo salutem,

Consilium semper, fit Medicina, bonum.

PINEAV.

i. ii.



APPROBATIO.



ÆC Consilia Medica Magistri GUIL-
LELMI DE BAILLOV, Medici Pari-
sienſis celeberrimi, eruditâ oratione &
ſummo iudicio conſcripta, fruantur eâ
quâ diutius caruere luce, futura rei Medicæ & orna-
mento & vſui maximo. Datum VII. Calend. Iunij,
Anno M. DC. XXXIV.


Fr. BOVIONIER, facultatis
Medicæ Pariſienſis Decanus.

EXTRAICT DV PRIVILEGE
du Roy.

PAR grace & priuilege du Roy, il est permis à M. IACQUES THEVART, Medecin de la Roynne mere, Docteur Regent en la faculté de Medecine en l'Vniuersité de Paris, de faire imprimer les Oeuures de Medecine de M. GVILLAVME DE BAILLOV, iadis tres-celebre Docteur en ladite faculté, son Oncle, par luy examinez, corrigez, augmentez, & mis en bon ordre, avec defences à tous Libraires & Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, ny debiter lesdites Oeuures de BAILLOV, ensemblement ou separément, sans le congé & permission dudit sieur THEVART, durant le temps & espace de dix ans, à compter du iour que lesdites Oeuures seront acheuées d'imprimer; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, & de mil liures d'amende, despens, dommages & interests envers luy; nonobstant oppositions ou appellations quelconques, Chartre Normande, clameur de Haro, ou autre chose à ce contraire; ainsi qu'il est plus au long contenu en l'original. Donné à Paris le 18. Septembre mil six cens trente-quatre. Signé, Par le Roy en son Conseil. RENOUARD, Et scellé du grand sceau de cire jaune.

L Edit sieur THEVART consent & accorde que IACQUES QUESNEL, marchand Libraire à Paris, iouyffe du present Priuilege pour le regard de ces deux volumes de Conseils de Medecine, ainsi qu'ils en sont demeurez d'accord par contract passé pardeuant deux Notaires du Chastelet de Paris.

Ce premier volume de Conseils acheué d'imprimer le 10. Feurier 1625.



INDEX CONSILIORVM
MORBORVM ET SYMPTOMATVM
HOC IN OPERE CONTENTORVM.

Numerus prior Consilium designat,
posterior paginae faciem.



<i>De Capitis dolore.</i>	CONS. I.	fol. 1
<i>De Tabes.</i>	Conf. 2.	fol. 4
<i>De turbatis ac cruentis urinis.</i>	Conf. 3	fol. 5
<i>De febre tertiana notha.</i>	Conf. 4.	fol. 7
<i>De Colico dolore.</i>	Conf. 5.	fol. 9
<i>De pulmonum phlogosi.</i>	Conf. 6.	fol. 11
<i>De febre hectica.</i>	Conf. 7.	fol. 12
<i>De fluxione biliosa in scapula & brachia.</i>	Conf. 8.	fol. 14
<i>De melancholia Hypochondriaca.</i>	Conf. 9.	fol. 15
<i>De colli ac cervicis contorsione.</i>	Conf. 10.	fol. 16
<i>De alui fluore.</i>	Conf. 11.	fol. 17
<i>De sanguinis stillicidio ab utero.</i>	Conf. 12.	fol. 20
<i>De sanguinis profluvio à partu.</i>	Conf. 13.	fol. 23
<i>De febre tertiana typum referente.</i>	Conf. 14.	fol. 26
<i>De hepatis inflammatione.</i>	Conf. 15.	fol. 27
<i>De duplici tertiana.</i>	Conf. 16.	fol. 28
<i>De febre tertiana.</i>	Conf. 17.	fol. 30
		De

INDEX.

De febre erratica. Conf. 18.	fol. 32
De febre pestilente. Conf. 19.	fol. 34
De febre tertiana. Conf. 20.	fol. 36
De visus imbecillitate. Conf. 21.	fol. 39
De Asthmate. Conf. 22.	fol. 42
De febre tertiana. Conf. 23.	fol. 49
De Hydropē. Conf. 24.	fol. 53
De febre cum grauibz symptomatis singultu & tussi. Conf. 25.	fol. 57
De doloribus ventriculi. Conf. 26.	fol. 60
De febre continua cum destillatione in pulmones. Conf. 27.	fol. 66
De doloribus ad sternū & spinalem medullam. Conf. 28. f. 71	
De febre quartana cum grauiſſimo capitis dolore & lienis affectu. Conf. 29.	fol. 72
De vermibus & a'ui fluore cœliaco & dysenterio. Conf. 30.	fol. 73
De Iliacā passione. Conf. 31.	fol. 77
De Calcū. Conf. 32.	fol. 81
De Epilepsia. Conf. 33.	fol. 124
De alui fluore. Conf. 34.	fol. 126
De scabie & pustulis. Conf. 35.	fol. 134
De febre tertiana. Conf. 36.	fol. 136
De febre purpurata. Conf. 37.	fol. 141
De melancholia hypochondriaca. Conf. 38.	ibidem
De Hydropē. Conf. 39.	fol. 148
De conuulsione. Conf. 40.	fol. 154
De fœtore oris & anhelitus. Conf. 41.	fol. 160
De pulmonum affectibus, & an ad pulmonum morbos quadret tenuis diætā. Conf. 42.	fol. 174
De ventriculi gangrena. & syderatione. Conf. 43.	fol. 197

De venæ sectione in febris tertianis. Conf. 44.	fol. 199
De Lethargo. Conf. 45.	fol. 203
De renum calculo. Conf. 46.	fol. 220
De sanguinis per os reiectione ex costarum vulnere. Conf. 47.	fol. 122
Quæstionis explicatio; cur multi valde valetudinarij viuant, alij integrè sani, alij in statu neutro. Conf. 48.	fol. 226
De capitis vulnere. Conf. 49.	fol. 233
De lactis asinini præstantia & dotibus. Conf. 50.	fol. 236
Quæstionis explicatio. An qui Gibbi ex Asthmate fiunt ante pubertatem moriantur? Conf. 51.	fol. 240
De renum calculo. Conf. 52.	fol. 254
De diarrhœa & dysenteria. Conf. 53.	fol. 258
De Angina. Conf. 54.	fol. 280
De cholera morbo. Conf. 55.	fol. 295
De fluore muliebri. Conf. 56.	fol. 299
De cholera morbo. Conf. 57.	fol. 300
De alui fluore in muliere grauida. Conf. 57.	fol. 305
De singultu febris superueniente. Conf. 58.	fol. 306
De febre purpurata. Conf. 59.	fol. 318
De Epilepsia. Conf. 60.	fol. 331
De Elephantiasi. Conf. 61.	fol. 349
De fluore vterino. Conf. 62.	fol. 350
De voluulo. Conf. 63.	fol. 354
De febre quartana. Conf. 64.	fol. 360
Explicatio trium quæstionum quarum 1. est de hypnoticis. 2. de usu medicamentorum & præpropere venæ sectione in febris quibusdam. 3. De ratione purgandi macilenta corpora. Conf. 65.	fol. 372
De fluore vterino. Conf. 66.	fol. 389
De febre Hæctica. Conf. 67.	fol. 382

INDEX.

27

De Gonorrhœa virulenta. Conf. 68.	fol. 383
De febre erratica. Conf. 69.	fol. 384
De Hydrope. Conf. 70.	fol. 387
De febre maligna. Conf. 71.	fol. 391
De febre maligna. Conf. 72.	fol. 394
De convulsione & complicatis vteri affectibus. Conf. 73. f. 395	
De pleuritide. Conf. 76.	fol. 400
De febre semitertiana. Conf. 77.	fol. 402
De sanguinis sputo. Conf. 78.	fol. 408
De febre typhode. Conf. 79.	fol. 412
De Gonorrhœa virulenta. Conf. 80.	fol. 413
De febre Assode. Conf. 80.	fol. 415
De hepatis inflammatione. Conf. 81.	fol. 416
De febre continua cum eruptione parotidum. Conf. 82.	ibid.
De febre continua. Conf. 83.	fol. 417
De febre continua cum grauib. symptomatis. Conf. 84. f. 418	
De febre maligna. Conf. 85.	fol. 423
De febre maligna. Conf. 86.	fol. 425
De destillatione in pulmones. Conf. 87.	fol. 428
Questionis Explicatio. Cur exigua puris excretionem animus facile deficiat? Conf. 88.	fol. 430
De parotidibus. Conf. 89.	fol. 437
De quartana febre leipothymia implexa. Conf. 90.	fol. 438
De hepatis phlogosi. Conf. 91.	fol. 442
De præcautione febris lentæ & destillationis in pulmones. Conf. 92.	fol. 443
De Arthritide. Conf. 93.	fol. 444
De Gonorrhœa virulenta. Conf. 94.	fol. 464
De febre lenta symptomatica. Conf. 95.	fol. 466
De pleuritide notha. Conf. 96.	fol. 469
De Ischiade. Conf. 95.	fol. 474

[o ij]

De Carcinomate vteri. Conf. 96.	fol. 476
De destillatione in pulmones. Conf. 97.	fol. 477
De febre continua. Conf. 98.	ibid.
De Dysuria. Conf. 99.	fol. 478
De Mola & fluore vterino. Conf. 100.	fol. 480
De Animi defectione. Conf. 101.	ibid.
Ad facilem vteri gestationem. Conf. 102.	fol. 481
De vlcere in regione pubis. Conf. 103.	ibid.
De vrinae incontinentia. Conf. 104.	fol. 482
De visus imbecillitate. Conf. 105.	fol. 483
De quodam qui per tres menses integros laborarat, vt tanta diu- turnitatis causa in medicos referretur. Conf. 106.	ibid.
De febre quartana, Arthritide & variis affectibus. Conf. 107	fol. 490
De febre maligna. Conf. 108.	fol. 506
De Cordis palpitatione. Conf. 109.	fol. 511
De febre continua cum grauissimis symptomatis. Conf. 110. f. 520	
De febre continua & destillatione ferina. Conf. 111.	fol. 536
De Hypochondriorum phlogosi. Conf. 112.	fol. 541
De febre continua horrida & destillatione. Conf. 113.	fol. 547
De Capitis dolore. Conf. 114.	fol. 550
De febre semitertiana. Conf. 115.	fol. 559
De febre & dentium dolore. Conf. 116.	fol. 566
Encheiridion sanitatis D. Henrico Heruillao, in miliciam Pro- fecturo praescriptum. Conf. 117.	fol. 568
De febre continua. Conf. 118.	fol. 569
De vermibus. Conf. 119.	fol. 572

F I N I S.



INDEX

APHORISMORVM HIPPOCRATIS qui hoc in opere explicantur.



Explicatur Aphorismus 5. libri 7. à furore habito, &c.

pag. 125, & 298

Explic. Aph. 44. libr. 6. quibus ex stillicidio urinae. p. 78

Explic. Aph. 65. libr. 5. quibus tumores in ulceribus appa-
rent, &c. p. 270

Explic. Aph. 45. libr. 2. quicunque pueri morbo comitiali laborant, &c.
pag. 155

Explic. Aph. 64. libr. 5. lac dare, &c. p. 237, & sequent.

Explic. Aph. 23. libr. 4. quibus ex morbis acutis aut diuturnis velex
vulneribus, &c. pag. 224

Explic. Apho. 3. libr. 6. in longa dysenteria auersio ciborum, &c. p. 269

Explic. Apho. 28. libr. 2. feb. icitantes non omnino leuiter, &c. p. 205

Explic. Aph. 6. libr. 2. qui parte laborant aliqua, &c. p. 216

Explic. Aph. 69. libr. 5. mulieribus rigores ex lumbis, &c. p. 270

Explic. Aph. 46. libr. 6. qui gibbi ex asthmate, &c. p. 240

Explic. Aph. 34. libr. 4. si à febre habito tumore non existente in fau-
cibus, &c. pag. 290

Explic. Apho. 26. libr. 7. in forti dolore ventris, &c. p. 303

Explic. Aph. 34. libr. 5. si grauida alius fluat, &c. p. 305

Explic. Aph. 8. sect. 2. Prorrh. corporis partes extremae si celeriter mu-
tentur, &c. pag. 325

Explic. Aph. ultimus. libr. 5. icterici non valde flatuosi, &c. pag. 516

Explic. Aph. 43. libr. 4. quoquomodo febres intermiserint, &c. p. 526

Explic. Aph. 30. libr. 2. circa initia & fines omnia imbecilliora, &c.
pag. 526

Explic. Aph. 9. libr. 7. à proflauio sanguinis desipientia, &c. p. 311

Explic. Aph. 13. libr. 6. à singultu habito sternutamentum, &c. p. 309

INDEX.

30

- Explic. Aph. 22. lib. 1. coctamedicari, &c. pag. 129, & 493
 Explic. Aph. 65. lib. 4. in febribus circa ventriculum aestus, &c. p. 498
 Explic. Apho. 73. lib. 4. quibus Ilia obmurmurant, &c. p. 338
 Explic. Aph. 3. lib. 7. à vomitu singultus & oculorum rubor, &c. p. 309
 Explic. Aph. 71. lib. 5. quibus cutes circumtenduntur, &c. p. 134
 Explic. Apho. 6. lib. 7. in morbis longis *ὑπερπνοία*, &c. p. 134
 Explic. Aph. 18. lib. 4. dolores supra diaphragma, &c. p. 131
 Explic. Aph. 41. lib. 4. sudor à somno multus, &c. p. 140
 Explic. Aph. 6. epid. melancholici fiunt epileptici & contra, &c. p. 147
 Explic. Aph. 9. lib. 4. melancholici fortiter purgandi, &c. p. 130
 Explic. Aph. 56. lib. 4. sudor superveniens febrem non solvens, &c.
 pag. 140
 Explic. Apho. 38. lib. 4. ubi sudor ibi morbus, &c. p. 141
 Explic. Apho. 67. lib. 4. ex somnis timores in febribus, &c. p. 144
 Explic. Apho. 14. lib. 2. Prorrh. faciei color bonus & mæstitia, &c.
 pag. 498
 Explic. Apho. Coac. coloris bonitas & sudores, &c. p. 363
 Explic. Aph. Coac. cholera morbus leipyriam soluit, &c. p. 297, & seq.
 Explic. Apho. Coac. in potibus submurmurant, &c. p. 182
 Explic. Aph. 8. lib. 3. Prorrh. quibus lumborum labores *ῥιζομυρία*. 301

FINIS.



BENEVOLO LECTORI
 GVLIELMVS
 DE BAILLOV,
 DOCTOR MEDICVS
 PARISIENSIS S. D.




I vt cuiusque est ingenium, ita se
 limet ac exerceat, præclare de se
 mereri videtur. Et cum exercendæ
 industriæ excolendæ ingenij du-
 plex omnino sit ratio, vna dum pri-
 uato studio addicti in communem
 vtilitatem nihil afferimus, ac si in se ipsa res verteretur,
 altera dum studiorum nostrorum partem cum aliis
 communem esse volumus, vt hæc ab illa longè diffi-
 det, ita vtilitatis & laudis quæ ab alterutra redit, alia
 atque alia ratio existit. Qui priuatis in studiis sese ab-
 dit, maiorem ætatis suæ partem in iis occupans, cum
 secum ipse viuat, sibi soli natus videtur. Cui melior
 inest animus eximia cuiusdam immortalitatis opinio-
 ne imbutus, is priuati sui otij, cui se adiecerat, fructum
 longè fluere ac manare volens; ad alios quoque vult
 pertinere: Sui enim conscius est miseram se aliàs vitam
 propagare, nisi quæ ipse apud se commentus est & in
 vnum contulit, eorū alios participesq; esse velit. Quod

quidem ab re non videtur. Nam in iis qui secum ita
vivunt exilis admodum est immortalitatis opinio: in iis
contra quos publici nominis desiderium ac amor tan-
git, augustum aliquid ac florens existit. Et qui umbrâ
& otio delectati falsa temporis vsura abutuntur, ta-
met si excellentem animo literarum impressam effigiem
tenere se existiment, nullo laudis aculeo pungi viden-
tur, cum illam non exprimant, alioqui non ita publi-
cam utilitatem defererent ut priuata seruiatur. Cum
verò nullâ laudis spe ducantur atque alantur, eos nihil
aut parum salis ac humani habere iudicandum est. Illis
pectus refrigescit cum hoc nullus laudis ardor inflam-
marit, quod stolidissimum quemque frigidissimumque
hominem incendere ac incitare possit. Nimum illis
scilicet æger est animus, ut quibus non sint stomachi
delicatissimæ epulæ quas laus subministrat, quæque
acerbitatem omnem condire possint ac mitigare. Fru-
stra tot præliorum dimicationes bellicosa sustinuisset
Antiquitas, in qua priscum semper aliquid ac nitidum
apparuit quod in publicam rem redundaret. Frustra
arbores seuisset sæculo alteri posuturas, in excolenda
agricolatione tantam operam posuissent: Nec minus
ridendi essent qui seposita omni rerum domesticarum
curâ in publicæ utilitatis studium sese coniicientes li-
bris de re quavis editis & miro artificio limatis claru-
runt. Inanis eorum omnis foret industria nisi cum re-
bus illis arduis ætatem suam tererent, simul etiam ad-
mirabilis cuiusdam immortalitatis opinione, & laudis
nullo marcere extinguendæ incredibili expectatione
se se sustinerent ac recrearent, quod qui negat suam
ipsius inertiam abundè declarat. Quod eo animo di-
ctum

Etum acceptumque velim, ut & instituti nostri consilium intelligatur, & hominum sibi solis consulentium pessima mens condemnetur. Nouimus qui tamen si publicis scholis multum profecerint, tam male tamen de Publica remereantur, ut nil nouum cudere, nil scribere, nil in ordinem redigere velint. Non hos laboris vigiliarumque piget, sed cum multa studio contingerint, nonnulla alienam industriam collegerint, piget tamen eorum partem aliis communicare, quorum haec ratio est ieiuna admodum & angusto ingenio digna. Quid attinet me nonnullam operam ponere in iis enucleandis euoluendisque quae multa sunt apud me araneorum & tinearum ludus & esca? si quid tale velint posterius, laborent, assequantur, nolo meam industriam illis inertiae desidiaque occasionem dare; belluinum hoc & libero homine indignum. Si hoc iure nobiscum egisset antiquitas, si immensum artium prouentum inuidisset, langueremus nunc omnes ac frigeremus. Quicquid agimus, scribimus, excogitamus, id non est nouum, sed veterum inuentis addimus tantum atque amplificamus. Melius multo de nobis meruit Antiquitas quae nullum non sustinuit laborem ut multa vndique quareret, ingenio & industria excoleret, quod in commodum nostrum verteretur. Immo in eo consumuntur eorum industriae & curae, ut posteriorum suppellex instructior locupletiorque illorum labore reddatur. Quod fit ut nos maiorum conatus proximè imitati succideremus nonnullam temporis partem quam in hunc librum conferremus ac coniceremus. Si quid enim aut ingenio nostro quæsiuerimus, aut aliorum industriam collegerimus, id ipsum huc contulimus vtili-

tatem non omnino pœnitendam aliis allatum. Sic nulla infamiæ aut fœcordiæ nota nostro nomini hærebit, vt iis contigit qui aut cùm se desidîæ dediderint, omnem laborem detrectent, aut cùm multa aliàs habeant diffusa, dispersâque quorum nōnullus esset fructus, si in vulgus ederentur, nolunt tamen laborum suorum partem cum aliis communem esse. Quod cùm brutum sit ac inhumanum, inde longè nobis recedendum arbitramur: si quid hîc sit lectione dignum, hoc pro arbitratu vtere: sin autem, aliquid afferes limatius ac excogitatum magis quod nos qui huius rei inuentores dici volumus, amplectamur. Vale, & iis qui publico nomine laborant magnam gratiam habe. Lutetiæ Parisiorum. Idibus sextilibus 1572.







GVLIELMI
BALLONII,
MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,
CONSILIORVM MEDICINALIVM
LIBER PRIMVS.

CONSILIVM PRIMVM.
DE CAPITIS DOLORE.
AD DOMINVM ANDREAM GVILLARDVM,
Regium in Consilio Secretiore Consulem.



ETERES partium infirmitates etsi omnino non tolluntur, leniri tamen solent ac mitigari. Eas autem iam vestigia pressisse, ac iam pridem inueterasse argumento est, quod cum sopitæ extinctæve iudicentur, ea veluti postliminio redeuntēs, saepe acerbius quàm aliās nos exerceant ac fatigent; siue, quod ferè fit, externa aliqua causa adsit quæ ignauiam morbi exsuscitet, siue ab humoribus qui intus ignauioresque latent, dolor hic redintegrandi sui causas principiaque ducat. Inter affectiones, quæ in hominum genus maximam partem sæuiunt, sunt capitis dolores, & ventriculi infirmitas. Hic quidem quoniam, vel ob vsum medicamentorum quibus maxima hominum pars imprudentius addicitur; vel ob esculentorum

Tom. I.

A

2 CONSILIORVM MEDICINALIVM.

potulentorumve varietatem, alteratur ac elanguescit; cerebrum autem, quod pars sit externarum iniuriarum procellis maximè expofita, & internis affici folita, cum inftar cucurbitæ internè fufum errabundos vapores attrahat. Ac præ cæteris quidem nuper apud me queftus es de vetere capitis infirmitate, quam hemicraniam appello, quæ statâ ratâque periodo caput exerceat; vnde capiti conflata comparatâque imbecillitas, vt leuiufcula de caufa in fubiectas partes illinc tanquam à fonte fcaturientes humores præcipientes ferantur. Quinetiam à catarrho in fauces, deinde in pulmones melius, quod vberrimè faliva in os recurrat, idque cum aliàs, tum maximè dum hemicrania repetit, quæ fua periodo ratôq; circuitu in alteram tantum capitis partem tyrannidem exerceat. Sed vt pluribus paucis antè diebus edifferui, non tam à capite refidua hæc fuperfluâq; materia dimanat, quàm à ventriculo, ab hoc nimirum refudante tenui fero in os ob confenfum ventriculi cum cerebro, quafi ventriculus quâ data porta exoneret fefe, eo quo mirum in modum vexatur, excremento. Quamquam imbecilla malèq; affecta pars eft; non prius tamen morbus reuirefcit, quàm à caufa aliqua externa vis ac imprefio inferatur. Vnde pertinaci ftudio, cura, fedulâq; in rem aliquam animi contentione, aut eiufdem perturbatione, cum alioqui fedatus tranquillûsque effet, vetus infirmitas detegitur ac inualefcit. Sed in eo demum virtutis & temperantiæ fignificatio maxima eft, qui caufis illis quæ morbos excitant occurrat, vt fuo fibi marre perniciem conciliaffe non iudicetur. Et in potulentis, efculentisq; moderatum fe præbendo, & in animi perturbationibus quietum ac equabilem, & in aliis id genus temperatum. Ægrè fers admodum, quod liberum in literarum quarum mirum in modum defiderio elanguefcis, ftudium incumbere non permittat aut parata in oculos fluxio, quæ te ea re frui vetat, quam cum vita eandem æftimas; aut hemicrania, quæ longiorum flexu confirmata in caput tuum ius, vt fic dicam, vindictarum habere videatur. Si quid confilio poffum, cenferem iocineris & ventriculi ftato tempore rationem habendam effe. Quantum mente ac ratione colligo, duæ illæ partes accusandæ funt, vt iam pridem illuftrium Medicorum qui tibi fecere medicinam tacitum confilium videtur indicaffe. Eorum enim omnis ratio & induftria in eo verfata eft, vt intemperiem iecinoris calidam emendarent, ventriculo robur ac firmitatem conciliarent. Sed & illud addo, corpus tuum iam ad melancholicum ftatum videtur divertere, non tam ratione curarum in quibus opprimeris, quarum tamen moli ac magnitu-

LIBER PRIMVS.

dini erecto animo resistis, quàm ætatis descriptione & annorum fle-
 xu. Hoc enim iam pridem Hippocratis auctoritate testatum est, cor-
 pora biliosa ætatis decursu cum perspiratione carent, melancholica
 effici. Supprimitur enim humor qui per extrema cutis diffilari debuit-
 set, biliosusque humor exassatur, vnde in melancholicum succum
 facile degenerat. Itaque cum constet hepatis vernaculam esse in-
 temperiem quæ demum variorum affectuum tanquam fomes ac
 seminarium existat, illa primum corrigetur. Optimè ad eam rem
 consultum videretur si syrupus ad hanc formam concinnaretur:
 ℞. succorum endiviæ, scar. borrag. depurat. an. ℥ iii. succi summitatum
 lupul. ℥ j. succi pomor. de curtis. ℥ iii. succi granat. ℥ ii. sacchar.
 candi & communis partes æquales quod sufficit; fiat syrupus coctus,
 celo æstuante in usum reduc. Loco huius syrupi in pharmacopœorum
 officinis asseruatur syrupus de cicho. compositus cum rheo. 2. Non
 videberis operæ multum pretij facturus si medicamentis purgan-
 tibus corpus assuescat. Nam cum illis nulla amicitia cum corpore
 intercedat necessitudo, ab iis corpora alterantur ac deteruntur.
 Deinde in pravam consuetudinē adducuntur; desuescere autem non
 facile est, aut non commodè id fit. Humores enim qui desides in
 corpore diu resisterunt, & qui de sanitatis gradu nondum deiece-
 runt, semel moti ac concitati deteriores redduntur, quàm ipsi fue-
 runt dum quiescerent. Potes cassia fistulari contentus esse admisto
 rheo. At ventriculo consultum oportet sumptis statò tempore pi-
 lulis aliquot, quibus non tam ventriculi repurgandi, quàm eius con-
 firmandi facultas concessa sit. Conferent pilulæ ex aloë initio
 pastus, nisi hæmorrhoidum fluxui sis obnoxius. Conferent ex pi-
 lulæ sub ea forma. ℞. mass. pilul. de aloë ℥ j. aggreg. ℥ ii. cinamomi
 interior. grana vi. cum aqua bugloss. infus. granor. vi. mastich. fiant
 pilul. De cerebro quoniam ita quereris, rationis est earum partium
 curam rationemque habere. Quæcunque enim labes contingit ea, ad
 inferarum partium morbum ac infirmitatem transferetur. Plura
 multò sunt quæ in eam rem conferri possunt, sed malo desideres,
 quàm minùs copiosè accommodatæque ea à me explicari ac per-
 tractari. Parisiis Calend. Februar. 1571.

Sectio 6.
 lib. 6. epid.

2. Galenus
 Comm. in
 Apho. 15.
 lib. 3.

Apho.
 Et 2. de
 dieta acu-
 torum. Item
 cap. ult. lib.
 de consuet.

Alj

CONSILIVM SECVNDVM.

Pro Iano Guichonio ad Tabem vergenti.

CV M vigil astitisses Illustri hero tuo ministraturus, plethoricis symptomatis cerebrum factum plenūque relictum est, vnde perenni defluvio in pulmonibus labes contracta est. Eò quoque aliquid contulisse videtur consuetudo assidua cum hero phthisico, cuius halitus potest ad alios venenatam mali qualitatem traducere. Hoc enim iam pridem veterum auctoritate confirmatum est. Ergò inueterata iam in pulmones fluxio est, & quæ pulmones iam affecterit labe nulla arte eluenda. Verum, quòd nondum artuum corporisque vniuersi macies contracta sit, id arguit nondum confirmatam phthisin esse, sed aliqua industria ac arte eleuari posse: Malum hoc funditus tolli posse si quis asseueret, aut effecturum se polliceatur, fraudem is faciet ac decipiet. Duobus modis occurri potest; vno, si quàm maximè poteris legitimam victus rationem seruaueris; altero, si per intervalla leuibus medicamentis te accommodaueris, quæ paulò post describam. Hæc autem in victurata firmāque sunt, somno diuturno abstinebis, ac præcipuè meridiano, frugalis cœna esto, iurulenta parca erunt, ientaculum solo pane constabit, potus nullus esto: Vini vsus huc non confert, cum multis abstinētia vini sanitatem reddiderit. Quoniam tamen abstinere omnino difficile est, metuendūque sit, ne circumcissus vini vsus stomacho imbecillitatem pariat, aqua primo haustu in pastu sumetur, vt viscera superiore abstinētiā paulum resiccata, rapto ad sese primo haustu humescant, nec incalescant. In aqua incoquantur myxaria, dactyli, pruna. Quod ad medicamenta, valentiorum vsus parum tutus, malum enim inueterauit; at blandiorum.

- „ ℞. Cass. ℥j. Diaphœ. ℥iij. cum Elect. Diatrag. & pulp. xix yphor.
 „ fiat bolus: aut hic potus. ℞. Decoct. pector. ℥iij. in quibus incoquantur
 „ solior. senæ ℥iij. seminis fœnicul. ℥j. s. in express. infund. agar. troch.
 „ ℥iij. in expr. diss. cath. & syrup. e bech. an. ℥vj. Diaphœnicon. ℥j.
 „ fiat potus. Nec verò abundè erit capiti consulere, sed & humoris
 „ in pulmonem illapsi ratio est habenda. Eò conferet hic linctus.
 „ ℞. Elect. diatragacant. frig. ℥j. sacch. candi puluer. diaireos, an. ℥ij.
 „ penidiar. ℥j. B. looch sani ℥. B. cum syrup. myrtino, aut de hyss. fiat
 „ linctus. ℞. confect. de rebecca ℥j. vtatur sapè. ℞. looch sani &

experti ꝓ iij. Utatur cum baculo glycyrr. Vesperis cubiturus Vteris opiata. *M. pul. elect. diatraga. ꝓ j. boli arm. ꝓ j. ꝑ. confer. reser. Vter. ꝓ j. ꝑ. cum syrup. de papau. fiat opiata.* Hordeata plurimū in cōferēt. Nec est quod frequenter iis remediis te fatiges, eorum enim vsus incidet maximē in magnis temporum mutationibus. Vere appetente venæ sectio plurimū utilis erit. In aurora conandum est expectorare ea quæ in pulmonibus contenta erunt: depexis in posteriora capillis commodē adhibebuntur sacculi ex milio & furfure. Commodē in ore versabuntur grana mastiches. Deinde excipiendus fumus hoc puluere in prunas iniecto.

2. *M. Nigē. Rem. ꝓ iij. pulu. ros. ꝓ ij. thuris ꝓ j. mastich. ꝓ j. ꝑ.* His remediis non pristinam sanitatem, quam non pollicemur, sed longiorem iucundiorēve vitam promittimus.

ANNO TATIO.

2. Fortasse suffitus ex aromaticis quales hic & à medendi peritis præscribi solent non conueniunt in affectibus iuuantis capitis: in his enim semper coniuncta est grauitas, hanc autem adauget plurimū aromatum suffitus. Nam calida omnia superiora facile petunt, firmis caput opplent. Gal. comm. in aphorism. 28. lib. 5.

CONSILIVM TERTIVM.

Ad consulem Regium turbatas accruentis vrinas excernentem.

RENVM affectus maximam partem iure hæreditario ad posteros perueniunt, vt & earum partium quibus commune publicūque officium à natura demandatum est, sic nimirum quibus cerebri imbecillius est, ij ad posteros id vitij transfundunt, vt quemadmodum bonorum sic & morborum hæredes constituantur; in cæteris lithiasis hæreditaria esse solet, quod semini impressa sit dispositio à qua affectus principia causasque ducat. Vitæ tamen institutum plurimū ad hanc aut illam partem confert, vt natia dispositio corrigatur, vel vt deprauata victus ratione prauorum humorū prouentus in corpore fiat, vnde lapidis generatio & soboles consequatur. Affectus quo non ita pridem conflictaris propter insolentiam mirum in modum terruit te, cum nulla hæctenus rudimenta eius extiterint. Doloris tamen species, situs, vrinæ quoq; ipsa malè affectorum renum locuples satis argumentum reliquerunt. Non quin

A iij

6 CONSILIORVM MEDICINALIVM,

à superis quoque partibus aliquid deerrare possit, ita enim quæ loco supero sitæ sunt partes in eas sua onera deponunt; quæ inferiore sitæ sunt, quæque excipiendis totius corporis excrementis dicantur. Urinæ arguunt renum affectus, eosque indicant: illac enim tra-
ijciunt ac si quid præter naturam contineatur, deuehant ac in matula ostentant. Arenosæ apparuerunt primum quæ contentum necessa-
riò in renum cauis calculum non arguunt, sed cum vi naturæ detur-
bentur deijcianturve, generationi lapidis occasiones præripiunt.
Alioqui metus foret ne si illic diutius resisterent, in lapidem tandem
cogerentur accoagmentarentur. Cruentæ postea, ac *nigrescentes*, & ad
nigrorem deuentes excretæ sunt, quæ lapilli contenti occasio-
nem, vel opinionem potius fecerunt, cum sæpè eiusmodi excer-
nantur attritu collisive rei duriusculæ renem deterentis. Nam cum
corpus id carnosum sit, facilè patitur. 2. Quamquam & ab hepate, & à
liene præsertim nigrore aspersæ excerni possunt, cum eo loci exal-
sentur aduranturque humores, qui postmodum cum reliqua humo-
rum colluie defluentes nouo colore urinas imbuant ac intingant.
Tamen siue à renum pressu attritue res ita euenerit, siue aliunde
raptus humorum fiat in renes, vnde & grauitatis sensio adest, quæ
lapidem contentum ementiatur, consulendum tamen renibus, vt &
non ita facilè excipiant onus aliarum partium amandantium à se se
excrementa, si hoc aliundè eueniat, siue à propria ipsius renis im-
becillitate & morbo id contingat. Id vt aptè commodèque fiat de-
riuandus est aliò humorum cursus qui præcipientes in renem malè affe-
ctu ruunt. Quod vsu syrupi huius solemnis facilè consequeris,
præsertim quo tempore Luna filet.

℞. scariol. acetos. plantag. an. m. j. endiuia, agrim. lupul. an. m. ℞.
foliorum viol. & maluæ an. m. j. bismal. m. ℞. Quat. semin. frigid. maio-
semin. endiuia an. 3 j. passul. glycyrr. an. 3 ℞. sebest. 4. Caricas tres, sum-
mitatum urticæ mollis m. ℞. fol. senæ 3. j. ℞. polyp. & semin. carth. an.
3. j. corticis myrob. citrin. & tamarin. an. 3. j. fiat Decoct. ad lib. j. in col.
diss. sacch. quart. iij. express. 3. j. ℞. rhei & 3. s. agar. maceratorum in
succo end. cum 3. j. sant. citr. & 3. ij. cinn. fiat syrup. coctus. cap. 3. j. ℞.
interlunio Luna, cum decocto glycyrr.

℞. Diatrach. frig. 3. ij. cap. frequenter. ℞. vng. refriger. Gal. aut ro-
sati Mesue 3. ij. pro litu regionis renum. Interdici debet vsus
eorum quæ mouendarum urinarum facultate pollent, nam ea ad
renes materiam deueherent, & ita obstruerent, vnde malorum in-
crementum, ideo perperam & ignorata rerum natura plerique attri-

LIBER PRIMVS.

7
dito lapidis nomine, aut renum affectus statim ad vinum album & diuretica concurrunt, ignorantes cautiùs vtendum esse vino albe, præsertim cum corpus scatet excrementis: Hæc enim vsu eorum quæ tenuitate partium prædita sunt, in renum affectum conuehant, natæque inde obstructio mirum in modum lædit, efficitque vt morbus quasi rediuius capiat incrementum. Exercitationis magnæ sunt opportunitates ad præcautionem, & curationem calculi; sed hic consideratos esse oportet, ne aut intermissione exercitationis proprii officij corpus ignauum reddatur, vel exoluatur, vnde magna crudorum humorum copia congeratur, aut vehemētiore agitatione humores agitentur, vnde sursum, deorsum ac in omnem partem impetu facto, tandem ex onerentur partes quæ imbecillitate aliqua fatiscant. Quomodo affectu renum tentati nimis exercitatione sapè dolores magnos experiuntur. Videndum ne curiosa nimis & accurata ciborum varietas obsit. Nam varij inde humores generantur qui naturæ conficienti plus faceffunt negotij, quam si res vniusmodi vsu veniant. Quoniam autem renes semel affecti alijs atque alijs exercentur morbis, vnde eorum successio contingit, æstuante cælo ad lac asininum confugiendum: huius eximie sunt dotes cum accommodatè vsurpatur, ita præposterum eius vsum magna incommoda consequuntur. Quod facillè magno vsu apparebit. Calend. Martij. 1571.

ANNOTATIO.

2 Simile quid obseruauit Hipp. in Herophonte, qui licet nigra mixxisset, conualuit, lib. 1. Epid. sect. 3. & Gal. sub finem lib. 5. de locis affect. inter cetera ea de re commemorabilis locus est apud Aëtium, tetrabibli 3. serm. 3. cap. 3.

CONSILIVM IV.

Pro Nobili puella Lodoica de Heruille.

ILLVSTRIS virgo febreprehenditur quæ typo tertianam refert, sed quod & paroxysmi in noctem inciderent, & quæd longiores forent, esse notham spuriamque febrem tertianam inferebat. Eò quoque cõtulit verna constitutio calida, sed tepens. Corpore erat satis malè affecto, & fœdis coloribus deturpato, sed illā infiam

8 CONSILIORVM MEDICINALIVM.

innatamque habebat corporis imbecillitatem; adeo ut toto febris cursu impura humorum colluies emanaret, locuples congesta cacochymia & in dies succrescentis argumentum. Sic potulenta esculentiaque omnia corrumpebantur: sic hectica quaedam corruptela & diaphthora conijciebatur. Exactis diebus tredecim (qui septem circuituum terminus erat) cum & sudores erupissent, & alius abunde lata foret, imò fluxus quidam diarrhœicus terrore magno apparuisset, sed hic quam primum repressus est, quod non excernerentur quæ excernenda erant, idque magno totius corporis incommodo fieret; tamen quasi rediuius repetiit, & ad tertianum paroxysmum auctarij vice adiectus & alius ut duplex tertiana existeret. At esse mirum oportuit, quod excretæ materiæ copia malum non terminarit, sed ne minuerit quidem. Quod in omnibus morbis malum. Dubitatum est num secanda esset vena? Aliis non placuit hoc remedium, quod iuencula, imbecilla, corpore admodum diffabili, materiæque non tam in venis contenta, quam in mesenterio, in quo magna obstructionum copia contineatur. Aliis secus visum est, qui experientia norint in febribus ab obstructione natis præsens remedium afferre venæ sectionem. Itaque omissum remedium hoc. Potuit tamen usurpari, quod febris nulla appareret vacuitas finitis paroxysmis, impresso nimirum partibus solidis calore. Morbus diuturnus, partim securus, partim verò non apparebat; diuturnus quidem quod maximam partem accessiones in idem tempus inciderint, & eodem defierint: quod ex Hippocratis mente morbum fore longum significat. Securitatem autem designabat accessionum stata periodus & repetitio; ex eiusdem enim sententia periculi immunitas est cum intermissione quocunque modo illa sit. Nam & malignæ humorum putredinis & inflammationis metus abest ex mente Interpretis. Itaque febris ex se quidem securitate pollicetur, sed ratione subiecti patientisque corporis non item, quod viscerum magna impuritas subsistat fortasse & diaphthora. Et duorum alterum consequi est necesse, vel ut in longum tempus morbus producat, vel hectica quaedam symptomata consequatur. Illud enim obseruatum est à venarum mesaraicarum obstructione nasci febres hecticas, quæ diu sine sensu magno agros exercet. Eoque initi consilij extremum pertinuit, ut agarico & folliculis obstructionum libertas quaereretur. Nam quæ excernuntur viridia, flaua, & varij coloris recrementa, ea non minuunt paroxysmos, quod arguit id non excerni quod excerni debuit, unde natura opprimitur tantum, sed non alleuatur.

CONSILIUM

CONSILIVM QVINTVM.

Pro Coquo Domini de Roissy, colicum dolorem pati se afferente.

IN CREDIBILE dictu quantis doloribus venter imustorqueatur. Ac sepe exercent in ea parte dolores quos frustra, multis adhibitis remediis siue ea assumantur, siue adhibeantur, soluere aut lenire cogitabis. Iniectis clysteribus non soluuntur, medicamentis paulò vehemētiorebus irritantur. 2 Primus nostra memoria Ferne-
lius obseruauit sæpenumerò cruciatus excitari, qui quadam simili-
tudine & vehementia colici nuncupantur, quibus tamen non in colo
intestino sedes est, sed vel in peritonæo, vel in membranis quæ ab-
domini ventrisque partibus obtenduntur. Non clysteribus, non
medicamentis leniuntur. Eorum materia aut flatus est, aut acer æru-
ginosusque humor, qui cum diu restagnans in visceribus restitisset,
tandem inusitatam viam in abdominis spatium aut in peritonæum
sibi patefacit. Et hæc in diurnis febribus contingunt. Quippe na-
tura depulsionem materiæ crissimque in aluum molitur; & cum nus-
quam expeditam viam nanciscatur, humorem illum è venis ac
visceribus in membranas auertit ac deriuat. In quatuor aut quinque
id ego deprehendi, qui cum dies aliquot febre confictati fuissent,
aut quod eius diurnitatis eos tæderet: aut quod cum primum na-
tam febrem rescindere ac iugulare cogitarēt, inito cum mulierculis,
aut præstigiatoribus circulatoribusque hominibus consilio, motum
imperiumque materiæ impediuerunt. Et cum ea inducias aliquot
dies dedisset, resumptis collectisque viribus, iam demum recens fu-
ribunda quaquaerfusus sese insinuat, vnde dolores priore morbo de-
teriores exurgunt. Ac vt cæteros omittam, Nicolaus du Saulsay me-
morandus hic. Hic febrem tertianam sustinuerat: remedia negle-
xerat, serò tamen neglecta vsurpauit. Habitu erat melancholico,
putri, aut saltem pessimè affecto liene. Cum febris quieuiisset, octauo
post die astricta aluo, in stomachi capacitate flatum sensit. Paucu-
lo post tempore paulò contractius malum ferè superius orificium
occupauit, ac si hic punctum esset aliquod: circa pectinem ad extre-
mum musculi recti altera doloris sedes, præterea circa renem fini-
strum; non quia meo iudicio materia diffusa esset magis, sed in par-
ticulis his magis elucebat. Pulsus paruus; sudores, ac veluti animi
defectiones; vrinx flux ac sedimentum nigricans diuulsūque:

Tom. i.

B

(sed tales vrinas in melancholicis, & quibus affecta viscera sunt obseruau) pugnatur cardiacis, nil profectum. Ita exactus dolor, ac velut superficiem attingens, vt minimum digitorum appulsum, imò ne rarissimi lintei ferre posset. Descendit in balneum, adhibiti litus, fotus, medicamenta vomitoria vsurpata, nil profectum. 2. Imò sequebatur magis dolor. Visus est toxico infectus. Ac eius rei magna erant argumenta: duodecies repurgatus; & hinc blandis primum agendum est, nec incœpto desistendum. Cum vires languere videretur, secta iuit vena dextra, alleuatus paulum, malum recruduit iterum. exhibita sunt iterum medicamenta, secta vena sinistra; alleuatus; ex interuallis data narcotica, somnum inire nequibat. Sed an hinc sectio venę utilis? Nullus penè est qui à secunda vena non abhorreat, cum deiectiones sint vires admodum. Præsentiissimum tamen remedium, quod materia à centro per metastasim ad habitum corporis viam affectat, & cum illic restiteret, potest educi sectione venę. Siquidem tenuis fuisset, per insensilem transpiratum, aut sudores efflasset: sed cum crassa foret, medio quasi itinere obiecta veluti morâ resistens, membranas ferit atque diuellit. Lutetiae Parisiorum mense Maio 1571.

A N N O T A T I O.

2. In aliorum scriptis hoc nondum obseruau. Fernelius vocat colicum dolorem non legitimum: dolor non est erraticus, sed in imo ventre fixus manet, & intolerabilis est, fotibus paulum quiescit, sed multo seuior repullulat; imò Io. Fernelius ait eum dolorem aliquando tertianarum febrium (quibus aliquando succedit) modo, repetere ac exacerbari. Non est quod huius rei inuentæ gloriam sibi decernat Fernelius: Nam & Hippocrates aliquid simile in Coacis videtur obseruasse. Verba quidem obscura sunt, sed tamen idem subindicasse mihi videntur: dolores, ait, ex lumbis diuturniores qui febre exacerbantur tertio die, similiter tertianæ febris, vel in modum quandam tertianæ febris, grumosum sanguinem egerere faciunt: Hoc enim vult dicere, vel eos dolores quadam periodo repetere, more earum febrium quibus successerunt, vel in febribus modum quandam tertianæ retinentibus eos demum repullulare ac reuiuiscere. Porro in eiusmodi ægris quos obseruauimus, crudelissimè affligit dolor, & tumores quidam nonnullis apparent, vt in fabro lignario cōtigit, qui diutissimè in somnis præ dolore mansit cum colico isto dolore illegitimo: hinc abscessus metuebantur: nec abs re, nam de ijs dictum est ab Hippo. in Coacis, durities circa ventrem & dolores infirmitatibus cum horrore, cibum auersantibus, si aluo parum humectata non

purgentur ad suppurationem veniet. In ijs nos & frequentibus fotibus, & medicamentis opem attulimus.

2 Hippocrates lib. de affectionibus eos dolores adumbrasse videtur, dum explicat quatuorplex sit Voluulus, vnus hyemalis: alter æstiuus & ictericus: tertius hæmatites, & autumnalis. Nam ij dolores ad Voluulum accedere videbantur.

2 Ioannes Fernelius in talibus balnea vsurpabat, viribus nondum lapsis: ac in balneo ipso medicamentum purgans propinabat: Quod dum agere incipiebat, educi iubebat ægrum e balneo.

2 Ac de eiusmodi doloribus quos hic æger noster sustulit, videtur agere aphorismus Coacar. animaduersionum Quibus dolores Hypochondriorum, oris Ventriculi, hepatis, partium circa Umbilicum, hi sanguine per inferiora excreto sanantur, non excreto moriuntur, quia metusest inflammationis.

CONSILIVM SEXTVM.

De pulmonum phlogosi.

Pro puella Nobili Longueil.

FILIA Consulis Regij alui profluuium ac febre prehenditur, in pulmonibus incendium magnum conceptum est. Febris quidem specie benigna ac mitis videtur, tamen nisi occurratur, futurum est, vt in hæticam degeneret: in pulmonibus erysipelato-des aliquid esse declarat appulsus manus ad regionem thoracis: infirmis est pulmonibus, tum quod id vitij à matre contraxit, tum quod superiore hyeme magna in pulmones destillatione laborarit: hinc difficultas magna anhelitus, hinc pulmonum imbecillitas, hinc pituitæ putris in iisdem *ἐν αὐτοῖς*, & nisi diligenter prouideatur, breui in pulmones facto humoris impetu grauius aliquod opinione nostra malum eueniet. Præterea aluius fluit, vomitiôq; ægram fatigat. Quæ deiciuntur liquidiuscula sunt, & diarrhoïca. Magna vermiû suspicio quos putredo magna parit. Nam paulò post propinato ex Rheubarbaro poculo excretus vermis mortuus (quod tãtam corruptelam significat, vt nequidem eam vermes, prognata tamen ex putredine soboles, ferre possint.) Itaque oppugnanda ventris inferioris putredo, quæ febrem hanc penè hæticam putridam quoque efficit: alterandi & pulmones. Hæc enim quæ adest sitis ingentem in pulmone conceptam flammam arguit. Et eum silentium

B ij

haustus, necnon auræ frigida: inspiratio sitim sedare dicatur ab Hippocrate, eam sitim non explebit frigida: potus, cum non in aluo æstus, sed in pulmonibus concipiatur: foris illinetur totus thorax Oleo violaceo, & butyro recenti: epithemata cordi & iecinori applicata. Sedatus vomitus. Præscriptum rheubarb. Omnia in melius vertuntur.

CONSILIVM SEPTIMVM.

De febre hectica.

Pro Puella.

Claudius de Heruille circa mensem Martium cælo æstuante corpore febricitare. Diaria erat febris quæ primo quoque tempore in speciem quandam hectica: degenerauit. Acid Medicos primis diebus latebat ad eam rem parum attentos. Aluus liquida deiecit, cinericia, putria admodum. Paucis post diebus aluus restitit. Secta vena, sed frustra. Interiecto aliquo tēporis spacio urina: crocea turbata apparuerūt: illud *χλωρόσημα λαμπρόν* Hippocratis, id est faciei viriditas collapsa est: breuissimis interuallis deprehensa est collabi corporis ea tantula quæ inerat corpori moles. Metus maximus fuit Hectica: *μαρασμώδης*: fomes in pulmonibus est, & in imo ventre: febrisque complicata est, eleuato subinde ex imis sedibus vapore, qui cordis intinra feriat atque attingat. Hicque considerari debent *ἔξις*, putredo malæque qualitas per partium inferarum quamdam corruptionem. A cibo refrigerabantur extimæ partes: rubebant genæ ex interuallis. Itaque non tam de morbo eiúsque specie laboratum est, quàm de curatione, quæ operosa ac difficilis visa est. Nam ariditas cutis & scabrities, marcor, & collapsus repente habitus, facies penè Hippocratica, caloris ad interiora recursus & expansio, vicissitudoque eius à cibo præsertim, caloris acrimoniâ hecticam intemperiem ali fouerique declarabant. Institit & quidam hoc ar- gumento nixus probare hecticam febrem non esse, quòd à cibo refrigeratio, non calfactio conringeret. At Galenus exemplo de per- fusione calcis adducto vult in hecticis febribus à cibo partes calefic- ri: sed non excludit leuem refrigerationem, quam postea calfactio excipiat. Vel dicemus in iis quibus robusta sunt viscera, calfactione statim enasci: quibus contrario modo affecta, leue refrigerium

contingere. Ergo primo quoque tempore hæc instituendi vsurpandique remedijs iam demum nata necessitas & occasio videbatur. Sed hæc audito febris hæctica nomine, non statim ad humectandum refrigerandumve accedere oportebat, eorum more qui empiricam methodum sequuti, omnia confundunt ac peruertunt. Febris illa hæctica omnia argumenta præseferbat, sed vnde nata, an morbo successerit, symptomaticave, an essentialis, quaestione dignum putatur. Hæctica rarò primariæ sunt, & vt agnouit Galenus 3. de præfag. ex puls. aut à mœrore aut ab ira nascuntur, præeunte aliqua diarria. Alias causas non agnouit. Nec enim credibile causas procatacticas tantam vim habere, vt primo quoque tẽpore partes solidas immutent. Tamen ex tribus vnum videtur probabile. Visus est diarriam productam pati cùm cælum mense Aprili æstu incandesceret, cui febris aut celata, aut neglecta hæctica promptè successit, vt 8. Meth. Gal. ait contingere. Nam faciles sunt morborum successiones in malè præsertim affectis corporibus. Vel potius (vt licet simile legere apud Gal. 3. de præfag. ex pulsibus) cum intemperies & superficiali phlogosis ratione cæli æstuantis præcessisset, ecce hæctica pestilens quæ contingit aliquando, oborta est, quæ omne medentis consilium ad cardiaca conuerterit. Quod & vrinæ prætendebat, quæ confusa & subcrocea apparebant, cum nil tale contingere soleat in simplici hæctica. Sæpè enim idque primis diebus vrinæ non parum absunt ab vrinis sanorum. Probabile & illud hæcticam hanc veluti symptomaticam in corpore macilento malèque affecto ab obstructione, aut vitio totius substantiæ partis alicuius natam. 2. Etenim legere est exoriri sæpè febres lentas ex hæcticarum genere à latente obstructione, aut semimale in parte quam corruptela. Sic nimirum focus videtur cor, hepar per consensum cordis, mesenterium, ipsi quoque pulmones. Licet Gal. lib. de Marasmo neget pulmonem sedem esse febris hæcticae, quod pulmo sit humidus, & perpetuo nouo attracto aëre refrigeretur. Sed hoc quàm verum, aliorum esto iudicium. Ac in hoc iuvene pulmo & mesenterium focus videtur, vt ne vno neglecto alteri malè consulatur. Itaque hic considerantur intemperies, mala qualitas, putredo, vt perpetuò vrinæ declararunt. Diligenter profligata est mala qualitas, duorumque hic habenda ratio, putredinis, intemperiei tanquam cuiusdam phlogoseos. 2. Hic tamen opus, hic labor. Audito nomine morbi sectio venæ, cum putredo est, & purgatio; cum autem hæctica intemperies est omnis refrigerandi modus & alteratio

2. Gal. 10.
Meth.

14 CONSILIORVM MEDICINALIVM

intelligitur, sed hic grauissimè à plerisque peccatur. Nam ait Gal. 10. *Methodi*, in febribus hecticis si quid peccatur, grauiter peccatur; & cum affectus sit magnus, leuissimū errorem tolerare nequit. Ac hīc contrariæ multæ indicationes. Ita blandissimè ex interuallis corpus repurgandum, litus corporis totius, præsertim verò ad thoracem. Syrupus resumptiuus. Auræ refrigeratio, frigida potus. Aqua rosarum & violarum: nam & facile penetrat, & summam refrigerandi vim habet. Massipanes: panis infriatus in iure gallinarum, aut caponum. Lac asininum postmodum iure & loco præscribetur.

ANNOTATIO.

2 *Obstructio & phlegmone duo sunt quæ impediunt quo minus andacter in febribus hecticis refrigeremus. Tamen Gal. manult vsu frigida & obstructionem & phlegmonem augere, quàm sinere longius serpere hecticam intemperiem.*

CONSILIVM OCTAVVM.

Pro biliosa fluxione.

Anglus annos aliquot laborauerat destillatione biliosa in scapula, & brachia cum capitis dolore. Destillationis fons creditus est in capite esse; ita tamē vt hepar præcalidum author primarius crederetur. Metusque tandem est, ne in partes inferas humor deferatur; illicque aut gonagram, aut ischiadam faciat. Quod vt ne contingat, omnisque mali præripiatur occasio, remediis iis occurrendum. Vinum circūcūdi debet. Corpus Rheubarb. sæpè repurgandum. Per tres annos vere & autumnō basilica aperiatur. Luna silente hyemis tempore repurgetur pilulis ex agarico, sine quibus, & cocciis. Tota æstate cassia cum rheubarb. Cum fluxio in motu est applicetur supra partem bolus armenia, aut nutritum: amurca aut aqua salsa: pro capitis dolore paretur Lixiuum ex cineribus sarmentorum & vnciiis quatuor fol. fenæ mund. Parabitur smegma ex nigella romana, roremarino, sale. Item opiata ex conferua antheos, buglo, borrag. cortic. citr. & myrob. item mithrid. ther.

ANNOTATIO.

2 *De ijs articularibus morbis biliosis doctè Aetius cap. 28. serm. 4. et trahib. 3.*

CONSILIVM NONVM.

De Melancholia Hypochondriaca.

Pro quodam Mercatore de Montargis.

Mercator quidam variis curis implicatus ac metu mortis percussus coepit macrescere admodum. Habitus erat macilentus, squalidus: Hypochondria collapsa. Destillatio in pulmones, & difficultas anhelitus. Cuidam Empirico se concrediderat qui accurata diæta catarrhum sistere contendebat, sed frustra id, & imperitè. Luteriæ cum moram nonnullam traheret, cōsultuit medicos ut præsentī malo occurrerēt. Visus est tantum queri de difficili anhelitu, cuius authorem catarrhum accusabant. Oculi erant mobiles, modò fixi, Galli vocant, *εσθαρεξ*, quasi esset attonitus. Quod propter affluentem animalem spiritum fit affatim, deinde propter eum resistētē; E nare sinistra stillabat humor putris serosus, qui si resistaret in cerebro, aut vertiginem, aut epilepsiam accerseret; sed ut accuratè inuestigata est totius mali causa, ac præsertim de difficili respiratione, de qua solum querebatur, laborabamus: inuenimus tandem eum melancholia Hypochondriaca laborare, & in visceribus quasi hectica quædam affectio deprehensa est. 2. Difficilis respirationis causa longius reperita est, eaque siccitati marcorique viscerum ac cordis præsertim accepta relata est. Nam in ista hypochondriaca affectione siccitas est totius corporis per alimentī proprii corruptionem, siccum est cor. calidum tamen calore acri, febrili & squalido. Vnde cum cor flabellationem (ut sic dicam) euentilationemque summè efflagitat præ siccitate, dum sufficiētē motū duplicem non habet ad refrigerationem eius caloris febrilis, statim repetito motu illud compensat ac refarcit. Hinc fit ut dum paulò magis corpus agitur, quasi animal ipsum *απὸ τοῦ* remaneat & veluti suffocatum. Sic causa difficilis respirationis & anhelitus potius ad siccitatē cordis incendio iunctam referenda est, quàm ad catarrhum. Non quin pulmones ipsi laborent, ut & cæterum corpus. Itaque in eo omnino versandum est, ut quacunq̃ue id ratione fieri possit, corpori prima moles restituatur, tollaturque, tum alimentis, tum medicamentis squalor & marcor totius corporis. 2. Nam ut dicebat quidam ex veteribus, melancholia hypochondriaca laborantes, tum demum curati dicuntur cum pinguescunt. Corpus renutriendum optimis alimentis, utendum hordeatis sæpè ac iusculis: pulmones humectandi,

balneis vtendum licet catarrhus dehortari videatur. 2 Sed quoniam extinguendus aut humefaciendus, & temperandus calor ille præter naturam qui omnium illorum malorum autor est, magis speratur felix euentus ex vsu balneorum, quàm sinister exitus. Caput corroborandum, humectandum, conferet lixiuium ex cephalicis & folliculis senæ. Lacti asinino locus erit post diligenter, blandè tamen repurgatum corpus. Etenim licet melancholicum sit, propter eaque vehementioribus vtendum sit medicamentis secundum sententiam Hippocratis: Tamen illud sine consilio & ratione non est vsurpandum, etenim cum in melancholicis humoris potius atrii ac contumacis copia in promptu est, quam vitium substantiæ, ac praua quædam viscerum diathesis & imbecillitas: illuc tum ad vehementiora remedia conuerti debet consilium, præsentè scilicet viscerum ipsorum robore, quod ab Hippocrate intellectum putari debet: sed cum cachexia quædam est ob alimenti corruptelam, vitiatamque nutritionem, ac viscera vitiata sunt ac vieta, illuc ex interuallis blando medicamento vtendum est, vt sensim ac sensim potiùs therapia consistat in epicrasi quadam, quàm frequenti catharisi quæ vim visceribus alioqui effectis illatura est.

ANNO TATIO.

² Aëtius cap. 15. tetrabibl. 3. serm. 2. Vbi ex professo agit de ijs splenicis quos tussis infestat, & istam tussim soli catarrho tribuunt nonnulli.

² Mesueus cap. de melancholia Hypochondriaca.

² Hemoptoicus erat, sed Hipp. lib. 2. prorrh. admirabiliter scribit Hemoptoicis non asferre periculum in ijs in quibus dolores melancholici excitantur in dorso & sterno. Quod in historia de Tassino annotauimus.

CONSILIVM DECIMVM.

Pro quodam Nobili cui Collum intortum erat.

Nobilis vir annos natus 45. in bello ciuili perfuga multa tulit, & in tot tantisque discriminibus cœpit laborare destillatione à capite postico, præsertim in humeros & ceruicem. Hinc colli ac ceruicis contorsio quædam, & cum tempore occursum non fuisset remediis ad id institutis, ita malum increuit vt facies in posteriora detorqueretur, & non nisi magno conatu in anteriora reflecteretur.

tur. At siue bibere, siue edere, siue loqui vellet funiculo in eam rem comparato, retrahebatur caput aliorum inclinans. Lutetianis Medicis nunquam quidquam tale videre contigerat. Ac laborandum fuit in specie morbi inquirenda, & remediis accommodatis. Videbatur nonnullis vnius partis esse resolutio, quæ alteri conuulsionem attulisset: quod non erat credibile, nam in eodem statu pars perpetuò permansisset: At reducta facies in locum suum, nisi magno conatu & magno cum dolore sisteretur, conuulsio quodam modo statim reuelleretur in postica, magna omnium qui aderant admiratione. Conuulsio erat reuera, & omnes muscoli erant affecti, & viscoso frigidoque humore imbuti, qui discussus usu rerum calidarum affectum sustulit. Itaque hæc remedia descripta sunt, quibus aliqua ex parte alleuatus est.

℞. Pilul. coctiarum & aurearum an. ʒ. b. turbith & agar. trochisc. an. ʒ. b. fiant Pilule.

℞. Gummi Elemi ʒ. j. olei ebuli Keirini, & lumbricorum an. ʒ. b. pro litu ad cernicem & occiput cum lana succida.

℞. Emplastri de beton. ʒ. iij. opopa. gumm. elem. stiracis an. ʒ. j. picis naualis, picis pinguis an. ʒ. j. pulu. maior. & Ireos an. ʒ. ij. B. ceræ & olei ruta q. s. fiat Emplast. pro capite.

℞. Nitri pulueris. ʒ. b. sulphur. vini ʒ. iij. fiat puluis quo sinapizetur Emplastrum prædictum.

℞. Castor. ʒ. ij. sem. nigell. Roman. ʒ. iij. ligni aloës ʒ. ij. pul. maior. ʒ. b. fiat puluis pro suffitu cum rosis rubris.

℞. Conser. anth. bugl. borag. folior. beton. an. ʒ. iij. mithrid. ʒ. j. B. marg. elect. ʒ. j. rad. pæon. & sem. eiusdem an. ʒ. j. cum syrupo de stœcha-de, & conseru. citri, fiat Opiata ad usum ante cibum, & serò ante somnum. Usus est decocto guajaci & Chynæ: abstinnit vino: Repetita sunt remedia frequenter, Usus est Laconico.

[CONSILIVM VNDECIMVM.

Pro alui fluore.

Adolescens in comitatu Equitis torquati cum debitum officij munus exequi non posset præ valetudine nimirum lubrica, cepit eum diurnæ cessationis tædere, aut quiddam inuita penenatura multa ferret quibus ferendis satis non esset. Affectus erat alui fluor aut diarrhoicus fluxus, inueteratus & penè cum nutricis lacte suctus, adeo

Tom. I.

C

omnem eius memoriam superauerat. Egregiè ad calamitatem natus videbatur. Affectus tædio cum eò magis augeri infirmitatem hanc videret, quo maior annorum decursus fieret, nihilominus solatus aphorismi fide, *Quibus iuuenibus aluus fluit, iis senibus astringitur*, Medicos consulit, vt hoc iam corroboratum malum vel extirpent planè, vel aliqua ratione alleuent, nam cum sæpè cogit magna desidendi necessitas. Malum hoc non tam mereri videtur nomen morbi quàm symptomatis, quod tamen ab imbecillitate aliqua in visceribus nata profectum est. Non affligit perpetuò, sed ex interuallis præsertim cum plenius paulò gulæ ventrique indulgit. Sæpè ita inuito illo aluus fluit, aut potius laxatur, vt primo quoque tempore desiderare cogatur, nec ratione vlla differatur. Interim totum corpus emaciatur est, pallidum, sitis magna, cætera satis ad res alacris. Non queritur de frequenti nimis deiectione, nec enim plus æquo aluus descendit, sed de cita nimis liquidæque aluo, & vt ita dicam, stercoris incontinentia. Intestinorum affectus; aluus cita, Græcis *διέξοδος τριχία*, dysenteria, leienteria, (quæ ventriculi quidem vitio fieri solùm nonnullis visum est, tamen intestinis tribuitur à Galeno *com. in apho. 22. lib. 3. aphorism.*) diarrhoea, cœliaca affectio, fluxus hepaticus, lienosus. Fluxum hepaticum aut lienosum quidam annos aliquot pertulère, tamen tandem parte resoluta interiøre. Ergo non est eiusmodi fluxus, leienteria minus esse potest, nec enim ea infirmitas tandiu perseverasset. Nec sanè ventriculum in vitio esse suspicamur. Nasceretur autem vel ab excretrice ventriculi irritata, vel à retentricæ resoluta, vel à coëtrice debilitata. 2 Retëtrix resoluitur à pituita acida & coniunctam habet *ὀξυγαστρίαν*: ab hætica intemperie ventriculi, & intestinorum distributioni subseruientium: vel secundum Oribasium, à pituita crassa viscidæque quæ replet rugas ventriculi. Excretrix irritatur multitudine alimentorū per se, vel quia non distribuuntur ob obstructionem mesaræi: vel acrimonia alimenti, vel humoris, vt cum ventriculus aphthis tentatur. Ergo ad fluxum diarrhoeicum potest reuocari. Obseruatum est enim diarrhoeam quamdam biliosam esse qua bilis flaua, aut citrina ardens ac plerūq; spumans emanat, idq; sine magna ventris torsione. Sed tamen cum in diarrhoea non modò in excretionis modo, sed & in qualitate & in quantitate peccatum sit: hic noster affectus ex parte aliqua quiddam habet tale, ex aliqua verò non. Nam vt prædictum est, non de frequenti nimis deiectione non conqueritur, sed de cita nimis aluo, & de excretionis modo. Fluxus alui, qui motus est ad excernendam

materiam per aluum & intestina, aut à toto corpore, aut à parte, fit motu naturæ, aut symptomaticè. A toto corpore aut diarrhœa est propriè, aut colliquatio, aut cruentus fluxus, aut varij coloris, aut cholera morbus. Si à capite, cerebialis fluxus dicitur, unde sæpe mulieribus *p̄s juveniles* dicitur à capite manare. Aut hepaticus, aut alui- nus, cum nimirum in lactibus, aut crassioribus intestinis, aut in me- sarco, aut mesocolo vitium concipitur. Et sic in cæteris prout hæc aut illa pars infirmitate detinetur. At nil tale in hoc affectu. Siqui- dem si tale aliquod vitium cōceptum esset, iampridē detectum fuisset in ægrotantis iuuenis perniciem. Ergo de frequenti deiectione non laboratur, nil de aliena excrementorum qualitate, sed de excre- tionis modo. In tribus res tota versata est. In hepate intēperies est, unde biliosi acerrimique humoris prouentus fit, qui in intestina illabens facultatem excretioni dicatam irritat; facultati retentrici imbecillitas comparata est. Inest quoque intestinis sensus exquisitus, idque propter eorum nuditatem, ex corporis enim mole & facili- tate facile colligitur interni corporis constitutio, & longo temporis tractu, aut ab ipsa cōformatione intestina non satis oblita obductaq; sunt mucore pituitosoque humore, quem natura instituit ne bilis flauæ illac transeuntis, aut excrementi mordacis acrisque per calo- rem redditæ molestiæ tam facilè sentirentur. Quod fortassis non abs- re. Ego autem cum pruritus narium obseruarem, cœpi rogare num vermium molestias sensisset. Nam inter causas fluoris alui vermes numerantur. Dum nimirum generatur putris humor vermibus ge- nerandis aptus, qui & per se aluum citaret, & cum vermes generet, vermes ipsi mordicando idem præstaret, intellexi excretos infrà su- præq; vermes, deprehensum est tandem hepar in vitio esse. Ad hæc capita curatio reducta est. Utatur conserua rosarum initio pastus. Aliquando granis mastich. cum syrupo rosarum siccarum, Iulepo ros. myua cydo. In iusculis misceatur succus ompha. Expurgetur bilis quæ multa circum cystim & iecur collecta est, decocto seridis, absinth. pont. plantag. lactucæ nouell. 4. seminū frigidorū maiorū in quo macerentur 3 ii. rhei, in forti expresso dissol. syrup. myr. 3 s vel ex succo plantag. & portul. Cum perseverabit fluor addetur corall. 3 j. rhu pul. 3. j. Vere & æstate parabitur syrupus ex succis omph. plantag. portul. seridis, cichorij vtriusque cum 3 ij. seminis papau. alb. cum seminib. frig. madeant boli armeni 3 ij. in nodulo addentur 3. ij. rhu, pro lib. in forti express. Iecori adhibebitur cerot. refrig. & epith. Parabitur Elect. ex puluere trias. coral. rub.

C ij

20 CONSILIORVM MEDICINALIVM,
seminis plantag. terr. sigill. carabe cum saccha. dissol. in aq. con-
ueniente. Intestina oblinantur decocto omazor. cui coquantur ros.
plantag. fol. myr. cum mucag. gummi tragac. interdum cremore
hordei. Utatur elixis potius quam assis. Vere nouo si pulsus velo-
cior, tundatur vena iecoris. Lacte asinino & balneis vti poterit. Idi-
bus Iunij 1571.

ANNO TATIO.

2 Et quod hic dicitur de Ventriculo, idem de intestinis dici potest, quorum
rugæ dum lenigantur, fluor alui contingere potest.

- 2 Longi cum perseverant alui fluores, raro id fit citra catarrhosam ce-
• rebri dispositionem: veteres autem Medici eo discernunt fluxum hepaticum
• & cerebralem à stomachico & intestinali, quod hepaticus & cerebialis sit
• periodicus & nocturnus; stomachicus autem diurnus fere, & non periodi-
• cus. Ratio hæc esse censetur: ideo illi sunt periodici & nocturni; quod per
• fluxionem fiant, & præterea eadem de causa multis sunt de nocte ob reno-
• cationem caloris intro, & pororum occlusionem: citantur enim tunc catarrhi:
• huc accedit motus materiæ phlegmaticæ de nocte. Quod autem caput adi-
• uet maxime huiusmodi fluores, & propterea illi consulendum sit, primus ob-
• seruauit Hippocrates, lib. mei πιδών: Huius verba hæc sunt, Dysenteria,
• Leienteria, diarrhœa, morbi consimiles sunt: Hi sic sunt sanandi vt de-
• fluxum à capite impediās, & à ventre superiore, morbi enim natura hinc
• est. Qui locus est diligenter annotandus.

CONSILIVM DVODECIMVM.

De sanguinis stillicidio ab utero.

Cuiusdam mercatoris vxor cum grauida esset, diēsque aliquot
paulum de sanitatis gradu deijceretur ex alto in latus dextrum
cecidit. Ante casum stillauerat paululum sanguinis ab utero ac si
fluxus menstruus minaretur: A casu grumus sanguinis apparet ac
paulò plenior fluor: febriculaprehendit: corpori magna est lenti-
tudo: pondus quoddam in pectine sentit: dejecta appetentia, pulsus
paruus, humilis ac in quodam ictu deficiens. Quæritur num fœtus
mortuus. Cum res in dubitationem adducta est, iam dies octauus à
casu agebatur, & superioribus diebus, vt antè dictum est, stillicidium
sanguinis præcesserat. Quæsitum est primum, num utero gestaret:
num vitale, si vitale, an casus iste vitam fœtui præripere potuisset?

ne temerè de accelerando partu elidendoque fœtu cogitaretur. Ægra mulier vtero se concepisse certò affirmabat, quod exactis duobus mensibus menstruum nil apparuisset, nisi quod paulò antecafum tantillum cruoris effluxisset. At nunquam illi menses substiterant quin vtero concepisset. Nunc à lapsu aliquid alienum contigisset. Non visa est vita præcisa fœtui quòd vitalis non esset exactis tantummodo duobus mensibus & duodecim diebus. Imo embryo tantum est. Quod falsum videtur. Nec enim à die quo mouetur in vtero fœtus numerari debent dies vitæ. Prius enim vt planta viuit, deinde vt animal sentiens: tum vt mobile animal: postremò vt rationis capax. Sensus enim facultate illustratur fœtus circiter diem sextum & trigessimum. Vbi autem ad mensem tertium mas peruenit, femina verò ad quartum, moueri incipit, ait Hipp. calcitrare. Ac certè siue mas, siue femina geritur, aliæ prægnantes semper die 42. aliæ mense tertio, aliæ non nisi medio prægnationis cursu eum loco dimoueri sentiunt. Itaque deceptus admodum medicus qui negauerit extinctum posse esse fœtum, post duos menses & 12. dies, & quòd vitam animalis viuere nò existimetur. Ac ille totius corporis lentor, fluor sanguinis, *δυσκοία*, *λεπιδουμία*, pulsus *δυσκοπὴ*, & *ἐλαψή*, cuiusdam ponderis in pectine sensus, lumborum magnus dolor, tormina, dejecta appetentia, sudor in quibusdam tantum partibus apparens, qui Hippocr. *ἐπιδρωσις* dicitur, ac in malis habetur, immò & sudor subfrigidus apparens, alienum aliquid contingens satis apertè videntur attestari. Immo quibus diebus in morbis apparet aliquid, iisdem natura nescio quid moliebatur. Molam nullam esse inde colligi potest, quòd ante casum nil deuolui videretur in alterutrum latus decumbenti. Tamen hæc omnia signa non potuerunt Medicos adducere vt certò crederent collisum esse oppressumque id quod vtero contineretur: alia enim multò certiora paruissent exactis præsertim, octo aut nouem ab occasu diebus. Tamen narrantibus obstetricibus sæpè à casibus in vnum aut alterum mensem signorum argumentorumque extincti feminis fidem supprui. 2. Quamquam Hippoc. in Historiis vicesimi diei in eiusmodi rebus mentionem iniecit. Enimverò stillicidium sanguinis si à fundo vteri manaret, os vteri hiaret, si quid collisum esset, ac vieturum (Gallis *fanè*) id vnà efflueret, aut alia ratione sese produceret. Potuit enim à casu sanguis effluere, non quòd aliquid alienum in vtero sit, sed eo modo quo antè casum, per externas nimirum venas quæ ad collum vteri pertinent, non per eas quæ in fundo de-

liteſcunt. Item & lapſus author eius ſtillicidij eſſe poteſt, non propterea hianſe vtero, ſed erumpente ſanguine per partes inferas, vtpote præ cæteris ab eo caſu conſictatas & concuſſas. Vt in ijs appareret, quibus cerebrũ concuſſum eſt, aliàs enim per os, aliàs per nares, aures, oculos quoque ipſos ſanguis quaquaverſum erumpit. Leiſpothymia, ac pulſus exiguitas poteſt humorum ſummam putredinem conſequi, quam deiectiones detegebant. Propinato enim blando medicamento ex rheub. & elect. diacarth. tantula quantitate excreta ſunt admodum putria, cineritia, ſubſtaua, quæ magnam ſubefſe corruptelam ſignificarent. Ac metus ipſe, animiq; pathemata, quibus mulierum leue ingenium facilè concutitur, & quibus iſta de qua ſermo eſt, mulier, ex interuallis agitabatur, non nihil earum rerum afferre ac adducere potuerat. Ac in tam accipiti ambiguoque negotio videndum, ne quid detrimenti capiat: nihilque audentius moliendum quouſque rerum agendarum procliuior promptiorque ſeſe nobis offerat occaſio. Saltem non obſimus dum prodeſſe volumus, cum hoc multum ad honorem Medicorum referre videatur. Ac mirum quod diem circiter 13. apparuit, reſtixerunt extimæ partes, crurum femorũq; tantus ſudor, iſque frigidus ſequutus eſt, vt larga veluti copia aquæ irrigatæ eſſent illæ partes. Ac deſiciens ille pulſus neceſſariò aut affectum cor, aut os ventriculi declarat. Addo & illi in aſthmaticis, & iis qui ab oppreſſione pulmonum moriuntur, tales pulſus apparēt. Præterea in magna humoris corruptela idem contingit. Licet febris adeſſet, ac vrinæ flammæ apparerent, vſu vini etiam generoſi non interdicta eſt: exhibita ſunt quæ vim roborandi ſuperioris orificij ventriculi haberent. Tertio quoque die propinatũ rheubarbarum, vt omni ope exigeretur iſ putris humor, qui febrem poſſet recendere. Rerum præſcriptarum hæc ratio eſt.

℞. Rad. biſtort. tormentill. tunicæ an. ʒ j. rad. & folior. diſtammis agni caſt. an. ʒ ſ. fiat decoct. in qua infunde rheu. ʒ ij. ſ. rad. biſtort. gra. 6. ſacch. roſ. ʒ vj. fiat potus. cap.

Item ℞. Ambra grif. gran. iij. margar. electar. ʒ j. corall. rub. fragm. lapid. pretioſ. & lap. hæmatitis an. gr. vj. rad. biſtort. ʒ ſ. puluer. diarrh. abb. ʒ j. cum ſacch. roſ. in aq. biſtort. diſſol. fiant tabellæ.

ANNOTATIO.

2 Ab Ariſtotele quæ conceptus corruptio intra 7. diem fit, ex quo dicitur, Latinis effluxio, in quos autem ad 40. diem vſque fit. De his Hippocrates primus lib. de ſeptimeſtripartu.

CONSILIVM DECIMVM-TERTIVM.

De sanguinis profluvio à Partu.

Mulier annos 35. nata, longè à partu magno sanguinis profluvio diuexata est. Multa eò conferentia adhibita sunt. Cum sanguis restitit iam primum oborti dolores atrocissimi circum lumbos, & ventrem ad umbilicum. Non cedebant remediis. Inter dolores ab utero numerabantur. Relictis Medicis ad mulieres confugitum est. Illæ & balneis & fomentis, & cucurbitulis utrum loco reponere conabantur. Sed frustra, tandem variis vtròque usurpatis remediis, dolores conquieverunt. Aliis Medicis visus est uterus illuuiæ humorum oppletus esse: ideo præscripta sunt hæc ad sedandos primum dolores, tum ad deplendam istam humorum illuuiem.

℞. Rad. alth. lilio. farinæ lini an. ʒ iii. mal. viol. parietar. an. m. j. chama. melilo. an. m. j. coquantur addendo butyr. recent. & ole. lilior. an. q. suff. fiat cataplasma, cui adde foliorum rutæ in sartagine cum axungia porci coctorum, m. ij. cinam. pulueris. ʒ ʒ. fiat catapl.

℞. Casto. ʒ ʒ. rheub. ʒ iij. fiat massa cum syrup. viol. capiat pilul. 4. pro dosi. Ab usu fomentorum alleuatus dolor aliqua ex parte, sed partibus imbecillitas est comparata. vnde aliquo post tempore facta veluti systrophe & collectione humoris ad hypochondrium dextrum, difficultas summa respirandi consecuta est: primo occursum manuum dolor ingens. Ingredi non valebat. Curuata penè incedebat. In neutrum latus decumbere poterat. Cum superioribus diebus de utero conquesta esset, visa est morbi sedes esse in partibus quæ ad utrum pertinent. Ac præsertim ligamentorum uteri vitium aliquod esse suspicabantur, sed situs sedem esse aut in hepate, aut in partibus vicinis demonstrabat. Initum est ea de re consilium.

Summus Hippocrates successiones morborum considerandas esse præcipiebat, quod in morbis longis multa symptomata contingant quæ bonis & eruditis Medicis ob similitudinem & fallaciam imponant. Et noui morbi tanquam soboles rediuiua ex aliis subinde consequantur ac repullulent. Nec mirum si hæc mulier post dolores uterinos, post sanguinis profluvium ingens tam variè ac variè conflictetur, quod multis contingit post partum præsertim.

24 CONSILIORVM MEDICINALIVM,

si difficilis & laboriosus extiterit. Nam oportuit naturam diuturnitate morbi, iam debilitatam aliquid moliri, aliquid in partem aliquam deponere, quod in fine morborum contingit, præsertim si qua pars dolitaauerit. Id quicquid est de quo dubitatur dolor est ad dextrum hypochondrium, qui aut immutati habitus, aut alienati temperamenti consequens est. Difficultas respirandi, corporis piger motus, inflexio difficilis. Quæ & iis contingunt authore Aëtio, quibus ad cornu dextrum vteri collectio fit & inflammatio, aut cum vteri ligamenta in vitio esse incipiunt. Morbus tumor est. Sed unde natus, quæ sedes, & cuiusmodi sit, hoc opus, hic labor. Omnis Hypochondriorum æqualitas in bonis ducenda quod subiectas partes benè habere significet. Inæqualitas in mole & qualitate in malis
 „ ponitur. Nam verum est quod scribit Hippocrates. *Hypochondrium*
 „ *molle esse conuenit, dolore vacuum, æquale. At inflammatum, aut inæqua-*
 „ *liter se habens aut dolens signum est ægritudinis non benè moratæ.* Ac nisi præcessisset illud sanguinis profluuiū, illic inflammatio hepatis concepta fuisset: nec absuit longè quin conciperetur. Illud confirmat sententia Hippocratis, *Quibus præcordia non mollia, facies sana, non liberantur citra multi sanguinis ex naribus fluxum, aut conuulsionem, aut coxendicum dolores.* Porro, tumor qui eas partes occupat, aut externas, aut internas tenet. Item aut humilis est & depressus, aut eleuatus: occultus, aut apparens. Recens, aut inueteratus. Si recens & repente fit, aut inflammationem significat, aut abscessum. Si inueteratus & sensim increseat, scirrhum significat, aut obstructionem, aut Gal. com. in 4. *Aphorismorum.* Hic non est inflammatio, quia febris vacuitas non repente contigit, quo fit ut scirrhi suspicio sit, aut congestæ illic multæ materie. At externas maximè partes occupat, nam digitorum pressus altus dolores affert, quo fit ut non hepar, sed musculi intumuisse iudicentur. Mirum illud est, quomodo secutum hoc sit post magnum sanguinis profluuium, quin potius vnà cum sanguine id quicquid est excerni debuerat, & magno illo profluuiio hepar quodammodo refrigerare debuerat, & aluus humescere, per Aphorism. Hippo. *A largo sanguinis profluuiio alui humectantur.* At contra contigit, immo aluus suppressa est, & frequentibus clysteribus irritata. Sæuissimi dolores fuerunt qui colicos referrent. Quod duabus de causis mihi videtur contigisse, aut quia profluuij diuturnitate caloris paupertas consecuta fuerit: hinc flatuum & torminum magna vis exorta est: Aut quia natura, quâ data porta, à centro ad circumferentiam humores

mores detorserit, qui lancinantes peritonæum, & partes vicinas eos dolores excitarunt. Præterea purus sanguis excretus est, multa crassa excrementa, quibus præsertim inter alias mulier hæc abundat, quod & præpinguis sit, & intemperanter viuat, in aluo restiterunt, quæ eos dolores inuexerunt. Ergo si ampla & vasta mole aut venter imus, aut pars hypochondrij promineat, si non fluctuatio sit, non alui suppressio diuturna, non hydropis suspicio, aut est musculorum abdominis tumor, aut mesenterij, aut hepatis. Nam ab ingluvie sæpe acruus est pituitæ, quem Natura aut in pancreas, aut in mesenterium relegat. Et in iis glandulis quæ illic iacent exaggerantur varij humores qui tempore siccescentes renitentem durumque tumorem ingenerant; vnde in iis partibus veluti concreuisse iudicatur. Atque vt finiat oratio, duorum alterum esse videtur: quoniam mesenterij tumor altè sepultus est, nec se in conspectum dat: vel est tumor insertus musculis abdominis; tum quia primo contactu occurrat, & quia etiam citra pressum dolorem afficit. Aut est tumor qui iecur sine scirrho distendit, iisdem ferè notis se prodens ac scirrhus in se. Hic in iecoris ambientes membranas effunditur: & vt aliquando legi, sæpe tantus est vt vniuersum hypochondrium repleat, & nulla iecoris circumscriptio appareat. Hic à flatu, aut cruditate quam immodica frigida potio affert, vel in tempestiuo fugacium fructuum esu: & non grauitatis, sed tensionis sensus est, vt pote ab humore crasso & lento quem iecur validum à se excutens in proprias membranas deponit. Nec enim propriè scirrhus est. Curatio hæc legitima esse videbitur. Omni ope amolienda est illa materia, quæ eo loci congesta falsò scirrhum refert. Cauendum à remollientibus, ne vel cancerosum quid generetur, vel scirrhosum. *Comparatus est syrupus solemnis ex ℥. ij. rheub. ℥. j. agar. & ℥. iij. foliorum sena. Rhabarbarum in succo mercurialis maceratum est. Foris applicatum est hoc.*

℥. Ceroti santalini ℥. ij. mucag. scylle & rad. altheæ an. ℥. j. Extrahatur in aqua hepatica. Fiat linimentum cum oleo rosato.

CONSILIVM XIV.

De Febre Tertianæ typum referente.

ADuocatus febre corripitur inæquali, sed quæ ad tertianæ typum referri posset. Vix erat expers febris, pulsus admodum languidus, sæpe hiabat os, continuæ erant pandiculationes. Morbus nescio quid sinistri portendebat. Antequam de remediis statuatur, primum constare oportet quis morbus, & quæ morbi causa. Alioqui inutilis opera, inutile omne consilium. Si obscura morbi species est, vt in hoc ægro existit, huic non protinus remedia adhibenda, sed maior negotij pars naturæ committenda. Nam futurū vt natura legitima vitæ ratione adiuta morbum profliget, & patefaciat id de quo dubitatur. Incerta enim medicatio non nisi dispēdio decernitur. Omnis morbus suis se signis & symptomatis prodit. An hæc febris intermittens, an continua, planè dici non potest. Nam nulla, aut exigua febris vacuitas apparuit hætenus: quod aut inflammationem, aut malam humorum qualitatem declarat. Tamen solatur Aphorismus dum ait: Quocumque modo intermiserint febres, periculum abesse significant. Si autem morbos & eorum accessiones periodorum vices declarant, in censu febrium tertianarum haberi potest, quòd tertio quoque die nouæ accessionis rudimenta appareant, sed ita parum perspicua, vt quorsum res euasura sit hætenus non sit intellectum, facilè in hecticam notham degeneraret: corpus squalidum est, calor (vt sic dicam) squalidus, tempus id postulat: à cibo statim calfactio sequitur, contentio animi, insomnia vacuitas doloris, pandiculationes frequentissimæ, ita tamen vt putredinis maxima eluceant argumenta. Magna est imbecillitas, quæ aut affectū cor, aut ventriculi orificiū, aut malam putredinē arguat à qua vapores excitentur. Vrinis parū fiditur, quòd hic eger nephriticus sit. Parum autem tutū iudiciū est vrinarum in eo casu. Nam sæpè humor crudus excernitur à renibus ipsis, qui falsò hypostasim laudabilem refert. Morbus fuit brevis. Sectâ venâ euentilatus calor, qui in putri materia erat sepultus. Bis repurgatum corpus satis vehementer. Toto morbi cursu abstinere vino non iussimus, tum quòd imbecillitas summa dehortaretur: tum quòd habitus esset melancholicus. Hic autem vino interdiceret non est artis.

CONSILIVM XV.

De Hepatis inflammatione.

THesaurarij vxor prauis scatens excrementis in vtero conceperat. Toto grauiditatis tempore nonnullos dolores ad vmbilicum sentiebat. Præteritâ tempestate austrinâ post immoderatum vsu fructuum fugacium alui fluore tentata est, qui dies aliquot neglectus. Tandem decumbere coacta est. Excernebantur cruenta, viridia, *ἡμυχλοῖα*. Interiecto tempore pici simillima mox ramenta intestinorum prodibant. Febris successit. Dubitatū an fluor is esset symptomaticus, propterea que potius in febrem esset incumbendum, quàm alui fluorem. Videbatur Medicis optimum si sæpe repurgaretur. Non aptè tamen. Desiderere cogebatur nocte quadragies, & ita vires frangebantur. 2. Vomitus fuit æruginosus planè: vomebat ante cibū, & præsertim à somno. Dolitabat regio hepatis. In hoc phlogosis coniciebatur. Prætermissa venæ sectio. Celebrata est die octauo febris. Tardiùs hoc factum, & nullo profectu. Sexto & septimo die excreta sunt quæ cadauerosum olerent. Et hæc suspecta sunt planè. Vino erat interdicens tum ratione febris, tum phlogoseos in hepate. Nam hic dolor recenter obortus, in dextro hypochondrio aliquid simile subesse demonstrabat. Pulsus falsebat: At scire debebamus ex Galeni sententia in grauidis pulsus esse paruum & oppressum. Vnde sæpe grauidas febre non laborare existimamus, cū tamen reuerà laborent. Ab hepate inflammato resudabat inutilis & serosus humor, qui in ventriculum resuens illum perturbabat, & vomitum promouebat. Ergo tam frequenter desidendi desiderij causam reuocabam ad serosum humorem, qui continenter ab hepate inflammato resudabat, iuuante ad id vteri pondere: vnde conatus & inane desiderium sæpe potest contingere. A partibus internis facilè resudat humor qui fluorem alui citare potest. Tandem hepaticæ deiectiones apparuerunt. Decimo tertio die peperit vitalem. Lochia suppressa sunt: aluus non reddidit vt antè: Omnia visa sunt tranquilliora, sed calor sensim intrò reuocabatur. Sequēte nocte profusè ridebat. Delirabat. Repēte omnes partes refrigē-

D ij

28 CONSILIORVM MEDICINALIVM

rūt. Sudor frigidus. Per duodecim horas hæc apparuerunt. Mente fatis constabat. Interiit. Ab omnibus clamatum est. Et tantæ cladis causa relata est in prætermittam reprimendi fluoris alui occasionem. Quod perperam & imperitè effectum fuisset. Nam ubi primum repressa est, mortis periculum creauit. Ac tanta excrementorum varietas etiam prauissimorum fatis abundè docuit summam fuisse in partibus intimis corruptelam, quam Græci *στασις* nuncuparunt. Ac & tempus, & corporis constitutio, & grauiditas, & affectus ipse omnem salutis occasionem præripuerunt. Si alius suppressa fuisset, non est dubitandum quin febris & alia symptomata increuissent.

ANNOTATIO.

2. Ingens bilis copia sursum deorsum ferebatur: deorsum quidem per alui fluorem dysentericum, sursum per vomitum. Nam æruginosum per os excernebatur. De eaque verum fuit quod dixit Hippocrates in Coacis. Quæ ante partum in modum cholerae morbi, id est humore sursum deorsumque lato, dolent, facile quidem pariunt; sed si febricitent, perniciosè habent: tum aliàs: Si quid in faucibus adsit, aut si aliquod prauum signum adsit. Quæ omnes aphorismi circumstantiæ in mulierem istam inciderunt: Et interiit. Sub finem s. epid. narrat de quadam muliere grauida quæ dysenteriam laboraret. Sed edito fœtu statim quieuit malum. Nam pondus pueri potest facere ad irritationem, & inane desidendi desiderium.

CONSILIVM XVI.

De duplici Tertianâ.

Adolescens annos circiter vndecim natus toto mense Augusto febre laborauit duplici tertianâ, quæ exasperationes tamen certas & statutas non habebat. Corpus macrum erat, cacochymum, visceribus affectis malè. Et qui color in cute efflorescebat, is alimenti prauitatem detegebat. Progresso morbo fluxio in pulmones eum adoritur: paulò post dolor permolesus ad hypochondrium dextrum: aliud ad sinistrum. Cum morbus quiescere videretur, postliminiò redit, non idem, eandemque rationem habens: sed diuersus. Lenta obscuraque fe-

bris eum noctu diuque sine ferè vllò sensu occupabat. Dolor hypochondrij dextrì repetit. Initur consilium. Capita hæc sunt: Vnde hypochondrij dolor: Quæ febris. Complicatane. Quæ medendi ratio. Dolorem hypochondrij euentiri potest stomachi inflatio & dolor. Vnde sepe conqueruntur de alterutro latere agrotante, cum aut nulla, aut exigui doloris causa sit in alterutro viscere: sed affectus ventriculus, tumefactusque affecti hypochondrij opinionem facit. Atque ita diligenter videndum ne similitudo affectuum nobis imponat. Tamen non multum nostra nos fefellit opinio: sed reverà dolor in ea hypochondrij parte erat qua latet hepar. Nullus qui appareret tumor: nulla inflammatio, siquidem amplior febris esset. Sed id quicquid erat meo iudicio depositio erat materiæ in partem illam vt infirmior & exercitior tota morbi tempore. Febris lenta est, complicata cū catharro & fomitem habet maximè hypochondriorum obstructionem, id est, partem in hypochondriis contentarum. Nam annotatum supra est à latente obstructione mesenterij nasci febres non heclicas quidem per empyreuma & phlogosin, sed putres heclicas, vt putredo continuitatem, persecuerantiamque (vt sic dicam) afferret. Euincenda itaque putredo omnis. Aluus pigra est admodum: an ideo vehementioribus pugnandum remediis? Nequaquam. Sic cedere ac turpiter à Medicis arbitratur, qui quum aluum pigram admodum vident, nilque etiam valido medicamento deficientem, tenerè corpuscula sicca & emaciata grauitèr medicamentis fatigant. Nesciunt enim, nesciunt, siccitatem corporis retentricem confirmare admodum, & deiectiones non posse fieri faciles & liberas, nisi humiditas quædam radicalis sit quæ actionem adiuuet. Sic enim magna illa siccitas omnem actionem impedit ac interuertit. Interè affatim sæpèq; e medicamenta valida damus, & dum maiorem siccitatem afferimus, nihilominus nostro voto satisfacit. Ergo catharrus febri iunctus illam prouexit. Vterque consulendus, sed maximè à seorsim per empyreum sensim ac sensim refici renutririque debet. Expeditis obstructis, lac asininum dabitur, quod omnium tardissime acescit. Et non est quod dehortari videatur febris nisi ea admodum magna sit. Quod Gal. consilium est libris *mei 750 p. 5.*

CONSILIVM XVII.

De duplici Tertiana.

Mercatoris vxor cū instaret pariendi tempus febre prehenditur, quæ duplicem tertianam imitaretur. Ac quæ in tempus autumnale febres incidebant, ad tertianarum naturam accedebant, ac iis de nocte præsertim ægri torquebantur. Humor biliosus suppressus induebat naturam pituitæ eiusmodi febres ingenerans. Quæ vomebantur biliosa erant, subuiridantia. Et quod mirum fuit, illo temporis non videbantur immunes à febre ægri, incertisque horis modò cum sensu frigoris, modò sine eo adoriebantur. Exactis duodecim ferè diebus enixa est, viribus satis robustis, facilè. Quæ excerni debuerunt, excreta sunt. Sed repentè, aut vno prope dicam interiecto die dolor oboritur acutus, difficultatem respirationis inferens. Nulla tussis erat: nec febris aliquantò acutior. Cū aut tussire, aut expectorare vellet, aut aliorsum mouere, præ dolore illud non poterat. Simile apparuerat nobis in alia quæ peperisset. Ab imò ischio ad mediam lateris dextri partem dolor erat toleratu difficillimus. Hic remediis non cedebat. Tandem exeunte pure per sinum pudoris alleuatio. 2. Sic in multis grauidis orgasmo materiæ quam natura vtpote imbecillior facta enixa non potest regere ac domare vt ante partum, multa contingunt quæ pleuritidem mentiuntur, siue quod motu naturæ humor fursum deorsum moueatur: siue quod externa aliqua fluxio fiat, siue quod circa hypochondriorum tunicas & venas humor multus est, vnde per continuitatem membranarum & vasorum communionem eleuatur hypochondrium alterutrum, & hic meteorismus difficultatem respirandi affert, quæ similitudine imponit sepe Medicis, supponitque alium affectum pro alio. Ita nimirum in Coacis, summus Hippocrates animaduertit quendam lateris dolorem cum hypochondrij meteorismo & difficultate spirandi. Sed vocat eum dolorem, lateris dolorem sine signis; quasi dicat pleuritidem non esse, ne ea similitudo nobis falsò imponat. Cū videret hic dolor, metusque esset suffocationis, quesitum num tutò & iure tundenda esset vena, cuius maxima est opportunitas ad anteuertendos morbos per congestionē nascituros. Dehortabantur vires imbecillæ: partus qui paulò antè præcesserat: item quod

pleuritis non esset, aliisque fortassis remediis cederetur. Denique metus suppressionis lochiorum à partu: quæ si suppresserentur, omnia peiora multò contingerent. At cum dolor ad pectus vrgeret cum difficultate spirandi, non statim tundenda vena: immò nisi signa adsint, talem sectionem improbat Hippocrates in Coacis Animaduersionibus. Tamen ne quæ materia locum certum nondum teneret, tandem parti impacta opinione nostra maiorem morbum afferret, in eam ventum est sententiam, vt sectio venæ tutò celebraretur. Sanguis qui fluxit lacteus erat, planèque putris. Dolores conquieuerunt: Lochia nō sunt suppressa, immò aliquando vt & in menstruorum tardo pigroque motu, sectione venæ liberalior, multo fluxio fit. Sed antequam tunderetur vena, præscriptum est hoc poculum.

℞. rad. bistort. myrrh. dictamni, & rad. rub. maioris, añ. ʒ. ʒ. B. mithrid. scr. ij. syrup. rosar. pallid. ʒj. vini albi ʒvj. cum aqu. hyssopi & arthemisia potus, capiat mane. Vna post hora aperiatur vena.

Cum perseveraret febris, augerenturque symptomata, subesset magna cacochymia, quod ex olidis excrementis apparebat, quesitum rursus quid hic consilij caperetur. Intumebant pedes & brachia: item facies, ac si leucophlegmatia tentaretur. Ac mirum fuit (dicebat senior medicus) quomodo non discuteretur morbus hic à febre, cum Hippocrates febrem aquas ac crudos humores concoquere ac digerere affirmaret. Sed illud verum est præsertim de febre superueniente, aut de ea quæ esset copiae humoris analoga. Quod in hac muliere non constabat: nec iure ea sententia Hippocratis citabatur. Etenim hic febris corrumpere sanguinem: sanguinem corruptum auersantur partes, & facultas alteratrix quodammodo vitata, non ratione sui, sed alimenti in probum sanguinem affluxos humores non cōuertebat. Accedit quod inflatio ista morbos istos sequi soleat, minùsque propterea terrifica esse soleat, præsertim cum in neutro hypochondrio tumor aut inæqualitas appareret. Tandem de purgatione vna atque altera, tertiâque cogitatum est, quod hypofaricidio habitum liberari alui profluuium, testatum Hippocrates reliquisset. Tamen non erat *σφοδρὸν*, nec tam frequentibus locis fuit purgationibus. Immò decipiuntur sæpe Medici rerum similitudine. Et ea tempestate multis pedes, manus, & brachia intumescere, & qui venæ sectione educebatur sanguis, planè putris erat.

ANNOTATIO.

2. *Quaestio magna esse potest, An cùm lateris dōlores oriuntur in muliere à partu cui lochia eunt, secanda sit vena. In hac enim muliere cui dōlor lateris, ut hīc dicitur, abortus est, secta vena lochia suppressa sunt. Vereor ne illa suppressio tantī mali causa sit, id est, cur in hydropem inciderit. Vide nostras historias de uxore Comitis de Mauleuri. r.*

CONSILIVM XVIII.

De Febre Erratica.

PROcurator post curas aliquot & molestias, praeunte aliquā corporis grauitate in febrem incidit. Hæc de genere earum quæ vagabantur eo tēpore autumnali. Incertæ: sine typo: modò cū sensu aliquo rigoris: modò sine eo. 2. Exiguo medicamento prouocatus lepothymiaprehendit, paulò post visa est alius liberior: sed mox restitit. Inde omnia symptomata increuerūt. Illud autē præ ceteris terrori fuit: In accessionibus pulsus paruus, febri nō analogos, coma, aphonia. Nulla re excitatur. Mirū hoc fuit in homine fatis macro. Erat & quidam ^{πῆλξος}, & suffocationis metus ingruerat. Sectā venā perseuerarunt illa. Cessante accessione & tentatis multis ad se tandem redibat, semisopitus tamen. Repurgatus sepe. Hæc ab oppressione cerebri nata erant. Coeuntibus quoque malignis vaporibus à partibus inferis, ut febris pestilentis suspicio aliqua esset. Verum quidem illud coma, catalepsin, cataphoran denique ipsam aliquando sub finem longorum morborum contingere, quod nos ipsi animaduercimus: & plerique interierunt; tum quod corpus aliquot dies sideratum manens non nutriretur: tum quòd summa erat oppressio cerebri, & febris augebatur, in modum continuæ perseuerans. Credibilēque fuit horum alterum, aut illam catalepsin ab exhausto manare, quod periculosissimum: aut propter paupertatem caloris & spirituum, & longitudinem morbi multa succreuisse pituitosa excrementa, eaque maligna, quæ cū à febre dissipata non fuissent, resistentia in corpore tam funesta symptomata intulerunt. Nec huic solū viro ea symptomata tam formidabilia conti-

contigerunt, sed & omnibus ferè qui toto illo tempore in febres inciderunt. Vidi quibus suffocationis periculum ingruit accessione aduentante quasi pondus in pectore sentirent, & sibi præcludi fauces viderentur. Aliis accessionis initio præfrigidi sudores, quod rarò contingit. Aliis (quibus ex longis interuallis tantum tussicula erat infesta) cum accessio prehenderet, tussis adeò vehemens accidebat, vt eam quam molestissime ferrent. Mulieri sexagenariae toto tempore accessionis leipothymia: comatosum quid, dolores permolesti. Querimoniam. Sed vt ad agrum nostrum reuertamus, variis remediis à primariis Medicis occursum est. hic potus iniectus est.

℞. scobis unicornis gran. 4. ambrae grisea gran. 3. cum aqu. card. fiet potus. cap. Iniecti frequenter clysteres: iniectus & hic.

℞. centaur. minoris, betonica, meliss. salvia, calament. an. m. j. flor. genist. p. ij. sem. lini 3. ij. agar. in nodulo positi 3. ij. fiat decoct. ad ℥ j. Incol. dissolue Cath. & hiera diacolocynthidos añ. 3. B. olei aneth. 3. ij. fiat clyster.

℞. conseru. arth. flor. salvia & beton. añ. 3. ij. mitho. 3. j. B. semin. pæon. 3. s. cum syrup. conseru. citrij. fiat opiata.

℞. folior. salvia. beton. maior. yua. arthr. prim. veris an. m. j. florum stachados, salvia, & anthos, an. p. ij. fiat decoct. in vino pro fotu capitis.

℞. olei chamem. lilurum, & nardini an. 3. ij. castorei 3. ij. aceti scillitici 3. j. pro embroche totius capitis.

℞. thymi satire. beton. & salviae an. m. s. piperis 3. j. s. coquantur in ℥ j. Colatura dissolue oxymel. scillitici 3. ij. fiat gargarisma. Vsus est hydromelite: foribus ex lixiuio sarmenti. cum agarico, sena, & rasura ligni sancti. Item vsus decoct. sarseparille & guaiaci. Quis enim dubitat quò minus decoctum ligni sancti conferat vbi oppressum videtur caput à pituita. Siccando enim confirmat, & liberat à dominatu ipsius pituitæ.

℞. Theriaces, mithridat. an. 3. s. olei de castor. 3. ij. aceti parum pro nuca & posteriore capitis parte.

Item ℞. pyretri, nucis moscate, caryophyll. an. 3. s. castorei 3. j. fiat puluis pro naribus. Tamen mihi valde suspectus est castorei vsus, propterea quod Epilepsiam inducit.

Item ℞. emplastr. de betonica 3. ij. ladani, styracis, calamite an. 3. j. olei ros. chamem. an. qu. suff. fiat magdaleon pro capite.

℞. oxymel. simpl. & syrup. de hyssop. an. 3. s. cap. ex cochleari.

Item ℞. theriaces, mithridat. an. 3. ij. conseru. acori, campa. anthos,

34 CONSILIORVM MEDICINALIVM

an. ʒ. j. pulu. diamarg. diarrhod. abbat. an. ʒ. j. decoctionis beton. buglos.
bipinel. mors. scabio. cum ʒ. j. semin. pæon. 6. lb. distillentur in alambico.

℥. prædicta decoct. ʒ. iij. colentur per manicam Hippocratis cum sac-
char. Utatur saepe. Subiectus & hic clyster est.

℥. salvia, maiorana, betonica añ. m. j. mercurialis m. j. sem. anisi &
pæonia an. ʒ. j. fiat decoct. ad lb. j. in qua dissolue hiera diacolocyntid. ʒ. ʒ.
mellis mercurial. ʒ. ʒ. salis comm. ʒ. iij. castorei pulueris. ʒ. j. fi. clyster.

Sed perendie quàm iniiceretur hic clyster, dati sunt ʒ. iij. pilu-
larum sine quibus serò. Tertio post die potio hæc propinata cum
accessio præcessisset superioribus similis: initio autem illius dor-
miendi adest inexpugnabilis necessitas..

℥. beton. bipin. scabios. folior. buglos. an. p. i. folior. senæ ʒ. s. semin.
card. citrj & pæon. añ. ʒ. s. fiat decoct. in qua infunde agaric. trochisc.
ʒ. iij. rhei ʒ. j. cinnam. ʒ. s. In express. dissolue hiera diacolocyntid. ʒ. j.
fiat potus.

Item ℥. florum anthos, stæchados, betonica, calament. an. m. s. radic.
angelica ʒ. ij. florum cordial. p. i. 4 semin. frigid. maiorum, cuscut. citrj
an. ʒ. j. ʒ. Fiat dec. ad quart. tria. In coll. dissol. confect. Alkermes ʒ. iij.
theriac. & mithridat. an. ʒ. ij. fiat potio colata per manicam, pro tribus
dosibus.

Item ℥. farin. fabar. & orobi an. ʒ. iij. pulu. chamam. beton. ireos,
an. ʒ. ij. coquantur in oxymel. satis diu ad spissitudinem pulticulae & tena-
citatem. fiat cataplasma pro capite dempto superiore emplastro post opera-
tionem medicamenti.

Vires interea concidebant. Interiit decimo septimo die. For-
tasse superior curatio paulò durior fuit. Etenim conuenit in-
euincenda multa materia pituitosa: sed in ficcitate coniuncta
cum humoribus aliquot iuncta virium infirmitate non ita con-
uenire videtur.

CONSILIUM XIX.

De Febre pestilenti.

Nobilis mulier post liberalem vsum fugacium fructuum, &
molestias aliquot, cum tamen ea satis hilariter viueret,
cepit aliquando conqueri de dolore & grauitate capitis. Ali-
quot post diebus cum omnia vitæ munia probè fungeretur, a
prandio cepit caput dolere: deinde omnium artuum dolor. Fe-
bris acutissima. 2. Vomitiones frequentes, varia excerneban-

cur. Aluus fluxit. Secundo die mitiora aliquantò omnia. Febris perseverabat. Ex intervallis modò temperatę partes percipiebantur, modò acerrimo calore calfactę: Iactationes plurimę: resistit aluus: vomitus cessant. Tertio intumuit facies: paulum taciturna: raptus humorum sursum. Omnes partes dolent. Urinę confusę, nigricantes. Quarto eadem perseverant. Nox difficillima: clamores: taciturnitas: difficilis: anhelitus: surrectiones quadraginta: iactationes. Quinto oculi feroces: mox depressę palpebrę: serò omnia exacerbantur: oculi ferociore: constantes quasi defixis palpebris: acies oculorum obtusa: aphonia: potum assumebat submurmurando: non deglutiebat: delirabat: Nox implacidissima. Sexto interiit corpore purpuraceo. Acutissimus hic morbus: nec ante quartum diem quicquam tentatum est. Pestilens fuit febris, declararunt iactationes quamplurimę, omnium penè facultatum casus, summus stomachi dolor. Inanis vomendi appetitus. Partes modò tepidę: elato terribili vapore à centro ad superficiem modò calidissimę. Lingua non erat febris analogos, nec enim pręficca. Et iam observavi in febribus malignis nec magnam sitim esse, nec linguę ariditatem: nec calorem magnum. Vnde sæpe morbus multò maior est opinione. Et cum specie parvus appareat, tamen ex eo eius malignitas paret, quòd non cedat remediis. Suspecti mihi fuerunt parvi tremores. Et in hoc morbo cum alijs observavi illud quod scripsit Hippocrates verissimum; *In malis febribus parvi tremores: & in potionibus. In siccis quasi subsilientes & submurmurantes pessimum.* Iniectus clyster. Quarto die blando medicamento repurgata: tum aluus supra modum reddidit. Quinto secta vena. Planè putris sanguis. Et cum fluebant menses, metusque esset suppressionis: item & ratione malignę qualitatis, data potio hæc.

℞. rad. tormentill. dictamn. bistortę, & rub. an. ʒ. ij. conservę flor. eichorii ʒi. s. scabiosę p. j. flor. p. j. fiat decoct. In coll. dissol. pulv. cinam. ʒ. s. pulver. rasur. eboris scr. j. mithridat. scr. iiij. syrup. limon. ʒ. vj. fiat potus.

Cautos admodum esse medicos oportet in eiusmodi morbis, in quibus tantę iactationes, nec febris tam effera & magna specie quàm suis se prodit signis: cum functionum animalium casus adest. Et quotquot eiusmodi febribus prehenso vidi, in iis observavi facultates animales primo quoque tempore occupari: quod mirum est.

ANNOTATIO.

Febris hac pestilens fuit, cum tamen constitutio alia esset temporis. Et primis diebus morbi sauiſſima erant omnia, & proiectione virium. An hac febris tam effera, tam maligna, & quæ mulierem validiſſimam tam citò e medio ſuſtulit, vitio humorum contingere potuit, & potuit herclè. Et in hanc rem meminisse oportet historiae Hippocratis, quæ quarta est ordine ſectionis 3. lib. 3. epid. Narrat quendam statim phreneticum decubuisse, qui tertio die interiit, Galenus in Commentar. In illius agri corpore humor generatus fuerat lethali veneno ſimilis, in corporibus vicinis aliquid paulatim agens, quæ quando vitio iam aliquo pacto opportuna erant, humorque ipse euaserat maligniſſimus, lethale repente apparuit ſymptoma. Et quomodo generetur venenum in nobis ob prauitatem humorum, ut tamen minime opinantibus nobis eripiantur agri, Galen. ample docet in part. 17. lib. 2. Prorhetic.

CONSILIVM XX.

De Febre Tertianâ.

Consul regius tribus ante mensibus connubio iunctus, & vt verisimile est, exhaustâ multâ animâ, imbecillior redditus, in febrem tertianam incidit. Hæc postea in duplicem tertianam versa est, nec tamen reliquo tempore febris vacuitas: medicamentulo agitatus est: alius liberior reddita est: biliosa materia & effera in intestina deriuata fluorem inuexit. Metuitur à dysenteria aut longo fluore. Dubitatum de ſectione venæ. Præripiebat occasionem impetus alui: item & virium imbecillitas: superiore trimestri ob causas dictas inducta quod recens coniugibus parcè detrahendus sit sanguis. Secta tum est parcè. Incubuerunt omnino ad id Medici vt alium qua id ratione fieri posset, sisterent: dolores si quos ferret, sedarent; vires confirmarent. Subinde iniectiones clysteres manè bis, ter, quater: item ferò, & aliis temporibus.

℞. tapſi barbati, centinodie, plantag. rosar. rubr. an. m. ij. semin. cydoniorum & psyllij an. ʒ. B. malicorij ʒ. B. fiat decoct. ad lb. j. in qua dissolue sacchar. rosar. ʒ. j. s. syrup. de siccis ʒ. ij. vitellos quorum duorum.

Item ℞. decoct. ordin. quartar. ij. in collat. dissolue mucor. seminis psyllij, & cidonior. extract. in aq. hordei an. ℥. β. sacchar. ros. ℥. j. vitellū oui vnius. fiat clyster.

℞. Radic. gram. acetosa, passul. integr. añ. ℥. j. cichor. plantag. agrim. beton. an. m. j. granor. berber. recent. ℥. j. semin. acetos. plantag. card. citrij. an. ℥. β. conseru. rosar. nenuph. an. ℥. j. fiat decoct. ad quart. tria. In col. dissolue syrupi cap. vener. & de cichor. an. ℥. j. β. fiat apozema.

℞. Syrup. de siccis ℥. j. cum gran. 4. mastich. fiat potus. cap. dormiturus. Interea purgabatur ex rhabarb. per interualla.

℞. rasur. ebor. cornu cerui vsti & loti in aq. ros. an. scr. j. margar. elect. scr. β. rasur. unicorn. gr. vj. dissol. In decoct. 2. dactyl. passul. integ. cap. vnius papau. & lact. cum ℥. i. syrup. de nenuph. & de siccis. Capiat hora somni. Media nocte cap. hordeatum paratum cum decocto semin. papau. albi & lactuca, cum saccharo ros.

℞. flor. nenuph. viol. rosar. rubr. an. p. i. semin. lactuca, papau. albi, an. ℥. j. Ex his confusis fiat frontale inter duas syndones: vaporetur aqua. rosar. prius illinantur tempora oxyrrhodino.

℞. caponem iuuen. carnosum, perdices duas, decoction. iuuenis caponis alterati cum lactuc. cichor. domestic. plantag. semin. maiorib. frigid. libras 4. conserue rosar. veter. ℥. j. conseru. buglos. nenuphar. an. ℥. j. myrobal. Embl. ℥. j. β. Omnia reponantur in alambico, in balneo Mariae. Fiat destillatio.

℞. predicti destillati quart. tria, sacchar. rosat. ℥. i. β. Fiat inlep, utatur cum condito.

℞. mirobal. vnā Emblīcam, coral. rub. puluer. ℥. β. rasura cornu cerui loti vsti, margar. elect. an. scr. j. rasura unicornis gr. vi. ofis de corde cerui scr. β. cum sacchar. rosat. dissolue in aqua ros. fiat conditum.

Sepe ac sepe datus syrupus somniferus, qualis antè descriptus est.

℞. fursur. rosar. rubr. balaust. tapsi, plantag. an. p. j. semin. psyllij, cidonior. althee, añ. ℥. β. fiant duo parui sacculi qui bulliant in lacte pro foru ani. Renouentur quotidie.

℞. cerati ros. Mesue. loti in aqua rosar. ℥. j. β. excipiat linteolo pro sede.

℞. plantag. centinodie, tapsi añ. m. i. balaust. rosar. rubr. flor. chamem. mel. nenuphar. an. ℥. i. fiat decoct. in lacte chalyb. dissolue sacchar. ros. an. ℥. i. β. boli armen. ℥. ij. syrupi rosar. siccar. ℥. i. vitellū oui. fiat clyster.

℞. succi cydonior. ℥. ij. succi plantag. portulac. an. ℥. i. cum sacchar. rosat. fiat inlep in modum syrupi perfectè cocti. utatur cum decocto graminis. 2.

Fiat emplastrum ex cerato Santalino pro hepate.

℞. aqu. plantag. rosar. an. ℥. iij. aqu. decoct. hordei ℔. ℥. in quibus dissol. syrup. rosar. succ. & mell. rosar. an. ℥. i. ℥. Fiat gargarismus. colluet os saepe; sentiebat enim ardorem in faucibus, & difficultatem deglutendi. Teneat in ore sacchar. rosar. interdum tabell. diatragacant. frig.

℞. malum cidonium unum: pistetur & contundatur in mortario paucis aceto rosato affuso: passetur per setaceum: passatur & adde conser. rosa. ℥. ii. ℥. puluer. rosar. ℥. iij. mastich. puluer. absynth. rom. an. ℥. ij. malaxentur cum oleo rosato. Fiat cataplasma pro hepate & ventric. Extendatur super stupas molles & bene carpinatas, prius in aqua rosar. & aceto paucis mactatas.

Item ℞. carabes ℥. ij. mastich. ℥. i. ℥. puluer. elect. diamargar. frig. triasantal. rasura eboris, cornu cerui, cum ℥. i. coral. utriusque ℥. i. semin. agni casti ℥. ℥. semin. melonum ℥. ii. tunica interioris galline preparata ℥. ii. ℥. saccha. ros. qu. suff. Fiat pulvis.

Et quoniam diuturnitate morbi & fortasse refrigeratione ventriculi, ad eius regionem dolor obortus est, sequenti fotu ei prouisum est.

℞. absynth. roma. maio. ros. rubr. an. m. j. menth. m. ℥. ligni Rhodij. cyp. an. ℥. ℥. omnium santalor. ligni aloes, an. ℥. ij. florum cham. em. p. j. Fiat decoct. in aqua & quarta parte vini pro fotu ventriculi ante cenam. Illinatur oleo cytoniorum & mastichino.

℞. conseru. rosar. symphyr. buglos. borag. an. ℥. iii. myrobal. emb. ℥. ℥. rasura eb. coral. cornu cerui. an. scr. j. ossis mespilo. scr. j. terra sigill. scr. ii. cum saccharo ros. fiat conditum.

℞. Trochiscor. de camphor. ℥. i. margarit. elect. scr. i. rasur. unicolor. ℥. 4. Fiat pulvis cap. hora som. cum iulepo rosato.

℞. cerati santal. ℥. ij. mastich. ℥. ℥. pulvis ligni rhod. ℥. iij. malaxentur cum oleo rosato. Fiat emplastrum pro iecore.

℞. corali rubr. cornu cerui vsti an. ℥. j. rhei torrefacti & irrorati succo granator. ℥. j. incorporentur cum ℥. j. conserua rosarum cum paucis syrupo myrtill. fiat parua mas. capiat mediam partem duabus horis ante insculum.

℞. balaustiorum, nucis gallarum ℥. ℥. absynth. rom. & vulgaris an. m. j. cyp. cal. aromat. ligni rhod. an. ℥. ℥. seminis plantag. ℥. ij. santal. omn. ℥. ij. Fiat decoct. in aqua fabr. & quarta parte vini pro fotu ventris. Post fotum.

℞. mucagin. gummi arab. extract. in aqua rosar. ℥. vj. olei myrtill. cyp. an. ℥. j. fiat litus post fotum.

LIBER PRIMVS.

39

3 *℞. pulu. de cynoglos. ℥ss. maslich. gr. 6. excipiantur (Grupo de ciccho. fiant duæ pilulæ, cap. dormiturus.*

Cum dolor inum ventrem vexaret.

℞. malu. bijmalu. parietaria an. m. j. semin. lini. fenugr. an. 3 i. florum anibemit. meliloti an. m. j. absynth. rom. j. fiat decoct. in oxymel. diu: fatus fiat: & post materialia applicentur. Item data saepe potio ex inlepo rosato & ℥j thuris.

ANNOTATIO.

2. Melius est incoquere eos succos cum aliquo decocto convenienti, gratior & melior erit.

3. Galenus cap. 1. lib. 12. method. magnam cautionem vult adhiberi in usu soporosorum & anodynorum medicamentorum. Et Trallianus, non vulgarem noxam sequi ait ex talium rerum potione, præsertim cum imbecille sunt vires. Questio tamen esse potest num imbecillis viribus tutus soporosorum usus, cum hæc viribus studere videantur.

CONSILIVM XXI.

De imbecillitate visus.

Domina de Pallue aquea cum exertos habeat oculos, eo-
que satis latoꝝ vt radij rerum obiectarum non facile in co-
muni coniciantur: nec suo satis gyro qui per opticum canalem
feruntur spiritus retineantur: conqueritur sæpè de imminuto
visu. Ac cum probè intelligerent Medici id vitij à natura pen-
dere vt arte subleuari tantum possit, non corrigi, tamè ne aliquid
non agerèt, & efflagitanti vrgentiq; mulieri nihil denegarent,
uariis atque variis remediis, illam bona spe erexerunt. Sæpè
enim postica capitis parte dolorem grauem perferunt: sæpè ad
radices oculorum ab intimis partibus dolores protenduntur, vt
malè affecti cerebri nonnulla suspicio adsit. Itaque, eò medi-
corum processit industria, vt capiti consuleretur, vel per sese af-
fecto ac laboranti, vel sublati aliunde vaporibus plethoricis
symptomatis aucto. Ac si, vt eos qui medicinam castè & inte-
grè facit, decet, lubenter agræ querenti denegassent, cum
sæpè frustra contra eiusmodi inueterata mala, à naturæque con-

E iij

tracta pugnetur, vt certè fecissent, non tot remediis eam vexa-
uissent ac onerauissent. At misellorum ægrotantium morbi
etiam desperati aliqua remediorum formula sunt eludendi.

℞. fœnicu. recent. euph. symphy. petre. chelid. an. m̄. j. sem. ormini,
fœnic. an. ℥ ss. agrimo. buglos. m̄. ss. turbith in nodulo positi myrob. citrin.
an. ℥ ss. folior. sene. ℥ j. ss. fiat decoctio ad quart. 3. dissol. sacch. quart. 3. ad-
dendo express. ℥ j. ss. agar. recent. troc. & ℥ ss. rhei infusi in aqua fœnic.
cum ℥ j. santal. cap. ℥ j. cum decoc. fœnicu.

℞. Decoct. vnius capi alterati cum aceto sa, buglos. borrag. lib. iiij. car-
nem vnius cap. & duarum perdic: conserua rosar. buglos. nenuphar. viola.
an. 3 j. pulu. triasantal. simpl. diamarg. frigid. an. 3 j. puluer. elect.
de gemmis ℥ j. micam vnius panis albi maceratam in aqu. cordial. &
vino albo. fiat destillatio.

℞. bipinel. m̄. ss. betonice sicca, sūmit. fœniculi viridis an. m̄. j. sūmit.
lupuli p. j. florū cordial. p. j. agrimonie, scariola, an. p. j. fiat decoct. ad lib.
ss. In colat. dissolue sacchari quart. j. express. 3 vj rhei infusi in aqua fœni-
cu. cum cinna. ℥ j. nucis mos. ℥ ss. agari. 3 j. fiat syrupus in tres doses.

℞. beton. origa. sampsuc. thymi, puleg. siccata. añ. p. j. caryophyl. nu-
cis mos. macis, cubeb. piper. lon. an. 3 j. masti. 3 j. nucis cupres. cortic.
thur. an. 3 ss. styrac. calam. benioin. an. 3 ij. fiat pul. pro cucufa.

℞. elect. diarrhod. 3 ss. coriandri prepar. cinnam. sem. anisi, macis an. ℥ j.
in euph. sic. 3 j. pulueris entur, subtilis. cum lib. ss. sacch. fiat puluis.

℞. masti. 3 ij. cubeb. nucis mos. macis, galan. cala. arom. an. 3 ss. pul-
ueris entur omnia & excipiantur gummi tracag. in aqua roris mar. disso-
luto fiant trochisci, quorum vnius cum tenui linteo versetur in ore mane
expuendo.

℞. Decoct. sampsu. & succi beta añ. 3 i ss. vini albi odorif. 3 j. mel.
ros. 3 ss. pul. nigel. rom. ℥ j. nucis mosc. 3 ss. bulliant omnia feruore
vno, coeantur & seruentur. in vase pro caput purg.

℞. agar. in succo fœnic. loco vini al. trochis. massæ pillul. lucis & sine
quibus. an. ℥ j. cum succo fœnic. fiant pillula.

℞. Euph. fœnic. an. p. j. semin. fœnugr. loti in aqua fœnic. 3 j. maio-
ra. p. ss. sem. anisi, fœnic. & gallitrich. an. 3 i ss. fiant duo sacculi quadrati
qui bulliant in aqua euphr. pro fotu oculi dolentis.

℞. Aloës in aqu. end. & succo fœnic. depurato lota 3 ij. pul. hier.
simpl. 3 ss. rhei 3 ij. agar. troch. ℥ j. pulu. euph. ℥ j. cum syrup. rosar.
pallid. fiat mass. pill. cap. bismense pillul. 3. pond. ℥ j.

℞. aqu. still. roris m. 3 ij. in hac calidiusc. dissol. salis gemma 3 ij.
& in hoc liquore infunde nectulum ex aloe linteo leui inuol. ex quo linteo
expresso

expresso instillabitur guttula liquoris præscripti: id fiet manè & vesperti.

℞ symph. petr. & fœnic. an. m. iij. rutæ, chelid. an. m. ij. irrorentur vino albo per triduum: fiat destillatio in alambico cum magno igne ad usum.

℞ milii comm. libr. j. salis furfur. macr. salu. sicc. an. lib. s. semin. fœnic. ℥. iv. fiant duo sacculi pro capite.

℞ emplastr. de betonica ℥ij. opop. ℥ j. castor. ℥ ij. picis naualis ℥ s. pul. chamom. maior. ireos, an. ℥ i s. cera ℥ ij. cum oleo nard. fiat emplastr. sinapizetur ℥ j salis nitri pro capite.

Ouum recens ad duritiem coquetur detracto vitello, puluere è vitriolo albo, & saccharo cando implebitur: ambabus partibus oui diuisi colligatis macerabitur in aqua rosar. & euphrasie per quatuor dies: expressione facta fiet collyrium.

Huic Dominae in metu cœcitatishic multa remedia præscribuntur. Item & alia quæ sequuntur optima cognitu.

℞ semin. fœnugr. loti in aqua tepida ℥. semin. fœnic. ℥ s. euphr. p. s. fiat decoctio in aqua ubi ferbuerint leuiter: primam aquam abicies: nouam addes: in secunda aqua dissolue sacchar. rosar. cand. ℥ iv. mellis rosar. ℥ ij: fiat collyrium, de quo guttas in oculum iaciat egra.

℞ farin. fœnugr. & iuthie præpar. an. ℥ iv. aloës lote ℥ ij. fellis perdicis ℥ s. amyli ℥ s. cum melle ros. colato. Formentur trochisci, siccantur in umbra, seccatis utatur cum succo fœniculi de par. addita pauca aqua rosacea maiore vel minore pro ardore.

Eidem pariter Dominae ad dentium foetorem corrigendum hæc præscripta fuerunt.

℞ rad. mal. dr. s. myrrhe dr. s. mastich. cornu cerui vsti. an. ℥ j. off. spong. & sepia an. dr. s. sang. drac. ℥ j. ireos flor. ℥ j s. corall. vtriusq. an. dr. s. cinamomi & santal. citrin. an. ℥ ij. cum saccharo. ros. fiat puluis pro dentibus. ℞ puluer. prædict. ℥ i s. excip. gummi. trag. extract. in aqua odorif. fiant parui troch. versentur ore sepe manè præsertim.

Item ad dentes.

℞ rad. altheæ ℥ j. ciner. rorismar. ℥ j s. florum rosar. rubr. ℥ iij. agrim. m. s. alum. ℥ s. tartari ℥ ii. fiat decoct. ad lib. s. pro ablutione dentium. ℞ corall. vtriusq. rosar. rubr. an. ℥ ij. cinnam. xyl. an. dr. i. s. mastich. ℥ ij. cum melle rosato: fiat opiata pro dentibus. Item:

℞ coral. vtriusque ℥ j. ossis sepiæ ℥ i. sang. dracon. mastich. an. ℥ s. pulu. rad. bistortæ & ireos floren. an. dr. s. cinam. g. s. ambr. gris. & caryo. phyll. an. gr. ij. ligni aloës ℥ i. rasur. ebor. cornu cerui vsti, rosar. rubr. an. dr. s. cum melle. fiat opiata. Item:

℞ corall. viriusque, pumicis, santal. rubr. cryst. an. ʒ iij. cinnamo. caryophyll. an. ʒ j. cum melle rosato, & granis 6 mosch. fiat opiata. Aut ℞ marmor. alb. crystall. an ʒ iij. pumicis, santal. rub. añ. ʒ s. caryoph. ireos flor. an. ʒ ij. cum melle. Fiat opiata.

CONSILIVM XXII.

De Asthmate.

CAROLVS d'Heruille ex asthmate, difficilique anhelitulatione laborabat. Iuncta erat & destillatio in pulmones, quæ suffocationis periculum afferebat. Summam pulmonum infirmitatem Medici accusabant, qui sese facile explicare non possent, nec alas suas expandere ad exigendam materiam quæ orthopnoeam concitaret. At inito prudenter consilio cum catarrho pugnatum est, incisa materia quam conceperant pulmones: & quoniam in tabem inclinatio fiebat, analeptics quoque cautum prouisumque est, ne marcor adaugeretur, tandemq; in discrimen coniiceretur. Huc autem referentur multa remedia, tum quæ sistendo catarrho dicant operam, pulmonum alas explicant, tabem retardant, & hæmoptoica quoque ipsa. Vt cum eorū sylua in promptu erit, facile si quid sese offerat eiusmodi, occurratur. Magna enim copia est hominum è pulmonibus Lutetiæ laborantium: siue quòd, vt olim Romæ eiusmodi affectus percrebruerint, ob aëris humidam temperiem, idem Lutetianis contingat. Magnam enim partem persiantur austrinis Parisienses. 2. Siue quòd Luteriani partes thoracicas imbecillas habeant, catarrhisque obnoxij sint. Delicata sunt vitæ, imbecilla habet viscera. Siue quòd cum post centum annos multi tabidi decubuerint, cumque nullus quantam hoc perniciem afferat, cautè animaduerneret, hæreditario iure ad posteros malum serpsit. Nam quicumque stirpe tabida sati sunt, eos ferè omnes tabes attingit. Siue quòd cum nullus Medicorum hætenus monuerit nos quanta sit labes & contagio pulmonum affectorum, è quibus aura venenata effertur facile eos quibuscum versantur inficiens ac contaminans, nemo sibi prouiderit, & ita incautus venenatâ qualitate infectus fuerit. Ac futurum tandem est vt nisi vel in eam rem interdicendæ consuetudinis lex sanciat, vel cane peius & angue tabe affectorum communis societas fu-

giatur, malum hoc ita Lutetiæ accrescat, vt oppido pauci malignam eius vim effugiant. Cur enim elephanti corum, cur febricitantium consuetudo eos quibuscum vitæ communio est, contaminat, tabidorū virulentia impunè in populo iactabitur? Halitus foetor, spurcicies, squalorq; corporis, character & viriditas decussa, marcor, consumptio corporis luculento etiā iniecto alimento, quid aliud præter tabificam qualitatem malignamque designat. Ophthalmia, qui affectus est externus, aëri expositus, vt vapor facile euanescat, intuentium oculos inficit, vapor è pulmone vlcerato, tabidoque pulmones alios non inficit? Vnde tanta corporis consumptio & macies, nisi quod tabifica qualitas ad cor delata, & à corde continuato cursu per arterias ad omnes corporis partes deriuata, omnes in extimis facultates, debilitet, conspurcet, & contamine? In phthoe enim vt & elephantiasi spectatur quædam totius substantiæ diaphthora, quæ nulla arte corrigi & emendari potest. At plerique visi sunt & à neotericis & à veteribus qui parentum alterutro tabido sati eodem anno nati interierint quo & parentes. Nec est quod Hippocrates in *Aphorismis*, iuuenibus hunc morbum accidere dicat, quod à vehementi exercitio sæpe hæmatoptysis præcesserit, vt Galenus interpretatur: Etsi enim causa hæc procatartica aliquid efficiat, tamen naturalis procliuitas maioris multò momenti est. Sed iam ad remedia descendamus. Ad marcorem in phthisi.

℞ amygdal. dulc. ℥ij. pinear. passul. mund. in aqua rosar. mund. & contu. añ. 3j. pulp. carnis capi vel coxar. ranarum vel cancrorum fluuiatiliū, vel testudinum 3j. medull. 4 sem. frig. maior. alih. & bombac. añ. 3ij. anisi & cinam. añ. 3 lb. amyli parum, sacchar. qu. suff. fiat massa panis cum iusculo pulli: fiant placentia. coquan. in clibano.

℞ puluer. pulm. vulpi prepar. 3j. pulu. diatreos & diatrag. frig. sacchari cand. añ. 3j. coral. rub. rasur. unicorn. añ. 3 4. ambr. gris. gr. ʒj. marg. elect. 3j. fiat puluis.

℞ har. vitellinum vnum, pullos tres, testudinem nemoralem vnā: coqu. in aqua cum lactuc. porul. agrimon. pineū, iuiab. sebest. semin. bombac. ungul. caball. passul. 3ij. ℞ prad. decoct. lb 6. lymaces vineal. 60. reponantur in alambico cum carne capi inuenis. Fiat destillatio in Balneo Mariæ: viatur in pastu, & extra pastus cum sacchar. ref.

Et cum vrget tussis à catarrho destillante in pulmones, hæc conferunt.

44 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞ glycyrr. ℥ss. passul. ℥j. iuiub. sebest. an. num. 6. bulliant in iusculo pulu. In colat. dissol. mann. granat. ℥ij. sacchar. candi ℥ij. fiat dosi.

Fiat litus ad totum thoracem ex oleis quæ ad eam rem institui ordinarique solent.

℞ conseru. ros. violar. & bugloss. an. ℥ss. conser. scabios. & vngu. caball. an. ℥ij. pulp. sebest. & iuiub. an. ℥y. boli arm. præp. ℥ij. pulu. elect. diatrag. frig. ℥ij. syrup. ros. sic. & myrt. qu. suff. Fiat Opiata.

℞ rosar. rubr. mastich. santal. citrin. an. ℥ij. myrtill. ℥ij. sampsuc. flor. stachad. an. p. s. beton. sic. ℥ss. Fiat puluis tenuiss. quo aspergatur pars anterior capitis.

℞ diatrag. frigid. ℥j. penid. ℥ij. looth sani ℥ss. iulep. ros. qu. suff. fiat in modum Opiatæ.

℞ nigell. rom. ℥ss. vernicis. ros. an. ℥ij. ligni aloës ℥ij. mastich ℥j. fiat suffitus pro capite.

℞ decoct. hordei mund. ad crepat. cocti ℥ij. in quibus bull. iuiub. sebesth. ductyl. passul. an. ℥j. glycyrr. ℥ss. bulliant omnia ad consumpt. tertia partis. adde folior. vngu. caball. & bipinell. an. p. j. In decocto dissol. sacchari albi ℥vj. fiat syrupus eximius.

In catarrho vehementissimo cum magna humorum copia frigidorum præsertim, valet quod sequitur.

℞ chamem. melil. scabios. bugloss. hyss. satur. an. m. j. vngu. caball. m. ij. rad. enul. campan. eryngi. an. ℥ij. semin. anisi ℥ij. rad. ireos ℥ss. fiat decoct. & excipiaturs eius fumus.

℞ rasur. ligni sancti. ℥ij. sarcap. ℥i. s. stachad. Arab. omnium capill. scabios. bipinell. borrag. hyss. agrim. an. m. s. semin. anisi, fœnic. an. ℥ij. glycyrr. ℥j. iuiub. sebesth. polyp. an. ℥ij. epith. vnc. i. s. Fiat decoct. ad ℥ dimid. In colatura dissolu. theriac. veter. vnc. s. syrup. cap. ven. vnc. iij. syrup. de stachad. vnc. j. s. colent. per manicam hippocr. cum cinnam. Capiat uncias tres singul. matur.

Cum præ copia materiæ asthmatici ægri quodammodo videntur, valet hoc quod sequitur.

℞ rad. serpent. vnc. ij. passul. & glycyrr. an. vnc. j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissolu. sacchar. vnc. iij. fiat in modum Iulepi. Item.

℞ cypp. calami arom. an. ℥ii. cort. citrii, asse odor. an. ℥i. milii sic. furfur. mac. loti in vino & sic. an. ℥ij. salis ℥ij. ros. rubr. santal. citri. an. ℥ss. Fiat puluis, cuius pars inspergatur capiti hora somni.

℞ succi liquir. in aqua scabios. infusi ℥vi. puluer. elect. diatr. frig. ℥ii. pulu. diatr. ℥ij. sacchari candi & penid. an. ℥i. s. sacchari albi ℥ss. ℥ij. cum infus. gum. tragac. in aqua rosar. fiat pasta. form. pil. sub lingua.

℞ boli arm. ʒ ss. elect. diatrag. puluer. glycyrr. cinnam. an. ʒ i. pul.
elect. aremat. rosar. ʒ ss. sacchari albiss. ʒ iv. cum insus. gummi tragac.
in aqua rosar. & ungu. cabal. fiat pasta.

℞ puluer. ireos floren. gummi tragac. an. ʒ i. amyli. boli arm. an. ʒ j.
rubi pulu. ʒ ii. rasura ebor. cornu cerui an. ʒ ss. liquirit. rosa ʒ i. s. saccha.
in aqua ungule cabal. soluti quant. suff. Fiant tabell. ʒ j. teneat in ore
sepe.

℞ mell. despum. sacchari & butyri recent. an. ʒ vj. utatur ex cochleari.

℞ medul. caulium rubror. coctior. inter cineres vnc. duas, 4 semin. fri-
gidior. maior. inci. er. vnc. j. sacchari albiss. vnc. iij. fiat conserua.

℞ diatrag frigid. vnc. s. diatreos vnc. s. semin. bombac. melon. an. dr.
ij. pulpa passul. mundat. ʒ iij. cum partibus aquis syrupi violar. & ca-
pill. fiat looth.

Et cum perenniter illabatur catarrhus à materia effera, qui
tabem tandem afferat, ille qui sequitur syrupus miraculose di-
citur prodesse.

℞ flor. & germin. i. salicis, folior. vrtice mortua. an. m. iv. summit.
viminis rubri, folior. bursa pastor. an. m. ij. fiat decoctio in lb. iij. aqua
rosar. ungu. cabal. & bursa pastor. cum sacchar. lib. j. s. ad medietat. su-
mat ʒ j. s. cum aqua destillat. viminis rubri.

℞ ungu. caball. bugles scabios. an. m. i. s. iuiub. sebest. num. 4. fol.
sena ʒ i. fiat decoctio ad lib. s. in colatura infunde agar. ʒ ss. sacchari
candi lib. s. fiat syrupus, capiat bis in hebdomad.

℞ syrupi rosar. sicar. iuiub. & de papau. an. ʒ ij. pilul. de cynogloss ʒ i
miscantur in mortar. capiat ager sine aqua duo cochlearia sero, addita
ʒ i. s. puluer. saccha. ros. aut candi.

Suffumigium pro capitis ornamentis in destillat. Sed hoc mi-
hi valde non probatur. Vsurpatum tamen à nobili viro.

℞ coriandri prapar. ʒ vj. gummi heder. s. anacar. mastich. olibani.
& rosar. an. ʒ iij. trochiscor. de caphara ʒ ss. semin. papauer. albi ʒ ss.
comminantur omnia crassiuscule. Ex his mane & vesperi in lecti introitu
suffiantur capitis ornamenta.

℞ agar. trochisc. ʒ j. olibani ʒ ij. fiant pilule 6. capiat vnam dormi-
tu.

℞ scabios. hipin. ungu. cabal. an. m. i. ficus pingues num. 8. passul.
iuiub. sebest. prunor. damasc. an. ʒ j. semin. melon. cucumer. an. ʒ ij. fiat
decoct. ad quant. ij. in quibus dissolu. oxymel. simpl. & sacchar. ros. an.
ʒ vi. fiat in modum syrupi.

℞ materialia prædicta, coquantur cum gallo veteri, in decoct. ʒ v.

46 CONSILIORVM MEDICINALIVM

diffolu. manne grana. vnc. ij. s. fiat potus.

℞ radic. althee in taleolas sect. ℥i. summit. malue, bismal. buglos. borrag. an. m. i. plantag. p. ij. iuiub. scbest. dactyl. pruna damasc. an. nu. 20. semin. bombac. melon. cucurb. an. ℥ss. glycyrrh. ℥ ij. conseru. vngul. cabal. ℥i. vng. cabal. m. ij. hyssopi sub finem positi p. s. florum nenuphar. & violar. an. p. i. agrimon. bipin. an. m. i. Fiat decoct. ad lib. i. in aqua vngule cabal. & rosar. Incolat. dissolue sacchar. candi, & rosa. an. lib. ℞. Syrupi de vngul. cabal. ℥ ij. penid. ℥i. fiat syrupus perfecte coctus.

Et quoniam sanguis ore reicitur, sæpe formidabile symptoma proximè phthoen minitans, quammaximè anniti debemus ut hoc arceamus.

Syrupus ex stercore asinino in omni reiectione sanguinis confert plurimum. Lauatur primum in aqua rosar. in eadem incoquitur cum saccharo rosato, & fit syrupus.

℞ conseru. rosar. veter. buglos. borrag. an. vnc. i. puluer. semin. plantag. & i. boli armen. terre sigill. an. ℥ ij. lapid. hemat. scr. i. cum syrupo capill. ven. fiat opiata.

℞ tulep. r. s. vnc. i. utatur cum aqua ros. & plantag.

℞ succor. portulac. plantag. urticae mort. granat. lactuc. an. ℥ ij. sacch. ros. quart. tria. fiat tulep in quo madeat nodulus & ij. lapid. hemat. sicut alkoor puluer.

℞ syrup. myrtil. & papau. & rosar. siccar. an. ℥j. capiat dormiturus.

℞ mumie puluer. & ij. terra sigill. scr. ℞. aqua plantag. rosar. centinod. an. vnc. j. detur.

℞ succi vngul. cabal. plantag. an. vnc. iij. succi berber. & macerat. rosar. siccar. an. vnc. ij. cum saccharo ros. fiat tulep.

℞ mumie ℥j. terra sigill. & boli armen. an. ℥ s. aqua myrtil. & ros. an. ℥ iij. decoct. rosar. & cortic. citrii lib. s. fiat tulep. in 4 doses.

℞ boli armen. terre sigill. mumie an. & iij. semin. papau. albi & melon. an. ℥ s. glycyrr. ℥ ij. sacch. candi ℥ s. Excipiantur omnia in gummi tragac. extracto in aqua rosar. fiant formulæ quas in ore teneat.

℞ maioran. flor. chamem. melilori an. p. ℞. fiat decoct. pro vapore nati.

℞ meliss. buglos. scolop. plantag. beton. vngul. cabal. folior. cardui. portul. an. p. j. passul. ℥ ij. folior. sene ℥ s. F. decoct. infunde rhei ℥ ij. dissolue syrupi violar. ℥ j.

℞ semin. papau. albi ℥ j. puluer. diatragag. frigidi ℥ ij. amyli & j. semin. melon. lactuc. an. ℥ s. glycyrr. ℥ ℞. sacch. ros. ℥ ℞. cum mucagin. semin. psyll. in aqua lactu. extract. Fiant formulæ quæ ore versentur.

Cum à capite catarrhi origo est labentis in pulmones; ut &

capiti & thoraci consulatur, valet hic syrupus.

℞ radie. lapathi acuti, serpent. bismulua. irco. florent. an. ℥ s. cichor.
tor. agrimon. adiant. ungule caball. hyssopi an. m. i. semin. bombac.
mal. melon. cucumer. fenic. an. ℥ y: passul glycyrr. an. ℥ i. s. fucus, iuinb.
an. numero x. violar. p. ij. Fiat acceet. in qua infusa. agarici trochisc.
℥ y. cinnamom. & santal. citrin. ℥ iij. bulliant mane. in colat. dissol. cass.
℥ viij. sacch. quod suff. Fiat opiata, capiat unc. unam cum sacch.

℞ pulu. rosar. cornu cerui, santal. alb. & rub. an. ℥ ij. ssod. gummi
Arab. mastich. an. ℥ s. coral. ℥ j. succi glycyrr. ℥ s. semin. papau. &
melon. an. ℥ s. cum saccharo in aqua ros. solu. fiant tabell. pondere ℥ ij.

℞ diarrhod. abba. diatrag. frig. an. ℥ j. coral. ℥ j. cum sacch. dissol.
in aqua rosar. fiant tabelle pondere ℥ j. s.

℞ rhei ℥ s. mastich. gr. 2. cum aqua agrimonie. fiant pilule tres, ca-
piat mane.

℞ succor. plantag. portul. centaur. an. ℥ iij: succi granat. ℥ iiij: aqua
rosar. macerate cum lapide hemat. super marmore ℥ iij. sacchari ros. qu.
satis. fiat syrupus posito nodulo boli armen. inter coquendum. Capiat co-
chlearia duo cum express. ℥. unius rhei bis in mense.

℞ aquar. plantag. & rosar. an. ℥ ij: aqua macerat. rosar. siccat. ℥ ij.
cum sacch. ros. fiat iulep.

℞ rasura ebor. cornu cerui, margar. elect. an. scrup. j: coral. rubr. lapid.
hemat. boli armen. terre sigil. an. ℥ s. glycyrr. ℥ y: cum sacchar. ros. in
aqua arnoglos. soluto. fiant tabella pondere ℥ ij.

Optimum est remedium opiata facta ex pulpa passular. damasc. ex pul-
pa iuinbar. & sebest. cum sacch. qu. suff.

℞ succi depur. per residentiam. plantag. portul. granat. cydonior. be-
ron. agni cast. an. ℥ ij. sacch. ros. qu. s. fiat syrup.

℞ ssodii, rosar. rub. boli armen. terre sigil. hemat. an. ℥ s. coral. rubr.
carab. margar. an. ℥ i. s. gummi tragac. dr. ij: semin. papau. albi, por-
tulac. mal. rosar. rub. arnoglos. cornu cerui rssi an. dr. ij. aiacia, succi
barbe hirci, succi glycyrr. an. dr. ij. angli rorref. diag. ij. terantur,
miscantur cum saccharo, fiat pulvis.

Tabidos alui fluorprehendit saepe, unde mors consequitur.
Eo hæc conferunt.

℞ cerati santal. ℥ ii. cerati stomach. cydonior. an. ℥ s. mastich. ℥ j:
olei myrtil. qu. suff. fiat emplastr. pro stomacho.

℞ olei de absynth. & cydonior. an. ℥ ij: ssica nar. ℥ ij: santal. citrin.
coral. rubr. ssod. rosar. an. diag. j. cera q. s. Fiat lin. ment. pro hepate.

℞ conf. rosar. nennuph. an. ℥ i. coral. rub. cornu cerui, boli armen. ter.

48 CONSILIORVM MEDICINALIVM

re sigill. an. drag. s. sacch. ros. ℥ iij. Fiat conditum.

℞ succi pomor. de curtip. plantag. endiu. an. vnc. iij. succi granat. & cydon. an. vnc. i. s. sacchari & syrupi rosar. an. qu. suff. fiat syrupus.

℞ pulu. elect. diarrhod. abbat. & triasant. an. dr. s. diamarg. frigid. ℥ ij. cornu cerui vsti, & ebor. an. ℥ i. sacchar. dissol. in aqua rosar. Fiant tabellæ.

℞ conseru. rosar. symphy. an. ℥ j. cortic. citrij cond. myrobal. citrin. cond. an. ℥ ℞. trochiscor. de terra sigill. & de spod. an. dr. ℞. trochisc. de coral. scr. j. pulu. elect. Letitie grana xv. cum syrup. myrtino. Fiat syrup.

Ad superiora quoque pertinent hæc quæ in destillatione præscribi possunt.

℞ conseru. violar. anthos, carnis myrobal. embel. cond. an. dr. ij. pulp. passul. & sebest. an. ℥ s. olibani pulu. mastich. an. scr. j. cum syrupo de stœcha. Excipiantur omnia: capiat drach. j. horâ somni.

℞ conseru. symphy. rosar. an. ℥ j. carnis myrobal. embel. vnc. s. cum syrupomyrti. Fiat opiata, capiat mane cum syrupo sequ.

℞ sigill. Salom. herbæ iudaicæ an. p. ij. plantag. cum rad. m. j. consolide virisq. an. m. s. bipin. m. j. s. semin. plantag. ℥ ij. Fiat decoct. ad lib. j. In colatura dissol. sacch. ros. ℥ vi. capiat ℥ i. s. pro dosi.

℞ rad. ireos florent. enula campanæ, glycyrr. ras. an. ℥ ℞. passul. mund. drag. 6. ficus pingues numero 6. iuiub. sebest. ilkeken. an. num. 6. bulliant in equis partibus vini albi & aque. Fiat decoct. ad vsum sequentem.

℞ gummi tragac. ℥ s. pul. glycyrr. ℥ iij. pul. elect. diatreos simpl. & diatrag. frig. an. ℥ s. sacch. candi & penid. an. ℥ i s. amyli. ℥ ij. cum sacch. al. ℥ vj. dissol. in decocto superiore. fiant cylindri.

℞ rad. ungule cabal. ℥ j. glycyrr. ℥ j. carn. dactylo. viij. iuiub. sebest. an. ℥ j. adian. folior. ungu. cabal. an. m. j. passul. damas. nucleor. pini. an. ℥ i. s. semin. mal. bomba. an. ℥ ij. fiat decoct. addendo sub finem puluer. pulmon. vulp. ℥ ij. in colat. ad quart. iij. dissol. oxymel. simpl. syrup. violar. an. ℥ ij. sacch. can. ℥ vj. fiat syrup. vtatur mane longe à pastu.

℞ carnem duarum testud. prepar. rad. serpent. maior. glycyrr. ungule cabal. an. ℥ ij. scabio. adian. capit. vener. scario. hyss. an. m. j. iuiub. sebest. numero 12. passul. ℥ ij. semin. melo. cucurb. dactyl. enucleat. nucleor. pini, & pistaciæ. an. ℥ j. fiat decoctio in aqua scabio. ungule cabal. scabio & endiu. in colat. ad lib. j. dissol. mel. al. & sacch. an. quart. iij. clarificatio fiat puluere sequenti.

℞ pulu. diatreos, diarrhod. abb. an. zi. puluer. pulmo vulp. prep. ℥ iij. pul. ireos flor. ℥ s. cinnamo. ℥ j. ponantur omnia in nodulo.

ANNOTATIO.

ANNOTATIO.

1* Maximè verò contingit magnam partem pulmonum in his regionibus vitiatam apparere, quod etiam à pueritia magna in thorace acervetur phlegmatis copia. Videmus enim omnes ferè nostros pueros tussiculosos esse, raucos, & πνευματικὸς, cum tamen nil extussiant. Sic colligitur pituita, quæ non recta amplius à natura pulmones corrumpit.

2* Tussis oritur vel stimulata naturâ à materia influente è capite: vel eadem stimulata à materia contenta in pulmone. Cum tussis continenter affligit, argumentum est descensus humoris è capite, licet intervallis longis, credibilius à materia in pulmone contenta oriri. Si à capite manat, roborandum caput, & impediendus catarrhus: si in pulmone contenta, bechicis utendum. In catarrhis, sed ferinis, præsertim illud fieri potest: non est alienum sæpè ac sæpè cibum ingerere; hinc enim catarrhi impetus debilitatur: nisi fortè ex esculentis aut potulentis aliquid alienâ qualitate tussim provocet.

3 Salix maximas vires habet. Desiccatur impensè, & sine morfu. Mirum est, cum hæc arbor adeò sit familiaris nobis, eius vires tamen negligi, quas Dioscorides tanti facit lib. 1. suorum Simplicium.

4 Quarto locor. affector. Galenus abunde explicat quomodo distinguere possimus an sanguis à ventriculo, an à pulmone, an ab ore reiciatur. Inter cetera commemoratione digna, scribit quosdam hamorrhagiâ tentatos, & excrevisse sanguinem per vomitum ob ductam per os & per nares forte fortunâ hirtudinem exiguam admodum quæ tempore accreuerit. Quod notandum est.

CONSILIVM XXIII.

De Febre Tertianâ.

DOMVS Lotharingæ custos circa mensem Augustum in febrem incidit. Ut corpus biliosum erat, constitutio temporis calida sicca, ita adorta febris est tertiana. sed ea non multò post tempore mutationem recepit, & quæ prius stata rataque esset, ea erratica effecta est in quartanam proximè degeneratura. Reddito aëre caliginoso, inæquali, frigidoque corpus melancholicum effectum est per adustionem humoris biliosi

Tom. I.

G

50 CONSILIORVM MEDICALIVM

dominatum humoris indicarunt & actiones animales expeditæ, citæ, celeres, motus animi, excrementa quoque ipsa, & calor species. Tandem quartanarius decubuit, ingens admodum sitis, procliuitas ad iram, vigiliæ perpetuæ. Nec dum tamen perseverant circuitiones periodiquæ quartanæ. Exactis enim sex aut septem circuitionibus satis constantibus, interiectæ sunt aliæ accessiones modò cum sensu frigoris, modò sine sensu, ita tamen vt die quoque quarto primæ febris ratio aliqua retineretur. Dubitabatur num triplex, an duplex quartana: an hemitritæus. Non hemitritæus erat quòd continuus non esset, nec affecti ventriculi argumenta sese proderent. Non duplex tertiana, quod maius multò esset interuallum inter repetitiones quàm in duplici tertiana esse soleret. Ergo hæ accessiones ita incertæ aut significabant causam nondum satis firmâ in lactibus & viscere vtroque, aut translata materia à suis sedibus breuî finitum iri morbum. Scribit Galenus vsu intempestiuo theriacæ & rerum similium, præsertim nondum cocta materia effici vt ex simplice quartana duplex triplexque fiat. Incidit enim materiam nondum præparatam, & in diuersas partes pellit. Ita nimirum humor in illo corpore redundans tenuis, acer, & bilioso adusto procreatus, seipse potuit mouere, ciere, & impellere. Vt quod theriaca tanquam externum efficere posset, idem humor tanquam à sese habens motus principium præstaret. 2. Sed hæc fortassè argutiora. Non adhibuimus maiorem operam vt morbus destrueretur, quia corpus vt nimis siccum ferendo non esset. Immo nostra remedia irrita videntur fuisse, nisi ex eo irrita non fuisse videri debent, quòd nobis autoribus, cum alioqui morbus esset periculosus, & homini necando satis, vim mortis tamen euaserit, morbo nimirum deluso & temperato. Contrà in hac quartana gerere se oportuit quàm in aliis. In his enim vsui sunt aperientia, vehementer & impensè calfacientia, piperata, salsaque: Sed hic ad humectantia planè descendendum fuit, tum vt ingenti siti quæ præcipuè symptomatis rationem habebat, consuleretur, tum vt humorem biliosum adustum temperaremus, & quodammodo occasionem contrahendæ putredinis præperemus. Quærebatur num iteratò mittendus sanguis, an medicamentis pugnandum. Neutrū accommodatū visum est. In morbis acutis, & principiis morborum longorum valida quidem remedia vsuueniunt,

quod ex natura adhuc vrget, & quia humor cedit trahenti medicamēto. Hic morbus progressus est, & nescitur quorsum eundar; Ergo naturæ medicatrici cōmittend^o est. Natura enim maximè medica in longis apparet coquendo, secernendo, abscessum moliendo, virtus non stat: ergo & venæ sectionem & purgationem dehortatur. Mineræ virtutum in partibus solidis. hæc sicca sunt diuturnitate morbi, vasorū ora conuiuent, concidūt, & collabuntur: siccitas illa & collapsus impedit actionem medicamēti: & potius colliquatio afferretur partib^o solidis. Preterea si paulò validiùs medicamentū daretur, metus esset ne in dolores colicis similes eger incideret quod in plerisq; obseruatū est quibus humor exagitatus est. Item & obseruatum mulierem quartana laborantem, cū iam 16. dies quieuiisset assumpto etiā medicamentulo. In morbū elapsam esse: Omnis enim materia agitata emotāque seipsa quiescente deterior esse solet, quod diligenter animaduertendum fuit. Vrinæ flammeæ sunt admodum, sitis magna: non propterea tamen hæc sectionem venæ arguunt. Nam oportet in eis febribus fuliginosum excrementum efferri à præcordiis ad cor, quò fit vt facillimè ventriculum attingat, & à ventriculo tunicam linguæ aluòque ipsi communē. Et cū sedabitur illa, incipietque corpus bene nutriri humidis alimentis naturæ resurgētis, & recreantis sese erit argumentum. De prognost. Metus esset ne in marasum coniceretur, nisi probā viētus ratione prouideatur: id quod febres erraticæ efficiunt sæpe, tum quòd ficus multiplex, & natura sæpe ac sæpe affligatur. Spes enim conualiturum, quòd hypochondria non metecora, nec pro ratione febris inæqualia. At in omnibus morbis hypochondria rectè valere optimum. Alui fluor conferret si non cum excrementis rapiatur chylosa substantia è ventriculo. Nec hodie verum constat esse quod scribit Hippocrates, quartanas securissimas: cū his temporibus aut illis succedat hydrops, aut scirrhus lienis. Tamen cū affecta non sint viscera insigniter satis tuta potest esse quartana. Nunc autem obseruatur in eiusmodi febribus quartanis cancrōsam in corpore lienis concipi dispositionem, quæ quo magis medicamentis irritetur, magis ægrescat medendo, quod & in externis affectibus cernere est. Tota ratio curationis ad duo reuocabitur, ad curam ventriculi vicinarumque partium: item ad dietam. Dieta hæc erit: Vtatur iusculis sæpe, immò etiam sub finem ac-

cessionis, minutalibus vitulinis, panata, hordeatis, vino diluto ramen. Est enim sitis ingens, & vrinarum venosique generis ardor dissuadet vsum vini, tum morbi longitudo suadet; aqua enim non transiret vasa longo morbi tractu collapsa & conuenientia, nisi veheretur. Ventriculo studendum quod fatiscat morbi longitudo, & quod eadem de causa congerat multa excrementa, vnde morborum aliud semen. Liniatur ventriculus oleis quæ vim habebunt eius corroborandi, & astringendi. Fouetur iis quæ eundem excitabunt & confirmabunt. Dantur tabellæ ex aromatico rosato descriptione Gabriælis, & Triasantalæ. Atque ea ratione futurum est, vt vincente, triumphantēque naturā, quæ nunc inferior veluti latet, morbus debilitetur, & tempore destruat.

ANNOTATIO.

* Hic ager grauissimè habebat, & dolores grauissimos perseuebat. Siquid dabat sæpè, & tamen nihilum sudores proficiebant. Ac reuerà nos obseruauimus in Quartanis sudores non proficere solere. Nam cum materia sit crassa, frigida, lenta, non est credibile eam ita attenuari posse, vt in sudores resoluatur. Sed cum calor naturalis & calor febrilis nihil non agere possit, adoritur aliam tenuem materiam alendo corpori satis accommodatam: vt mirum non sit si non proficiant tales sudores, cum maxima ex parte non sint ipsius materiae morbificæ. Prosunt quidem sudores apparentibus coctionis signis, quod materia natura cedat, sed donec aliquid tale apparuerit, non est quicquam opis expectandum. Vnde non est cur solliciti simus de citandis sudoribus in Quartanis. Nam si sudores nondum apparentibus signis coctionis, procurari non possint sine obstructionis maioris metu, quod ars non audet facere id si natura parum prouideat, presterit, minus salutis corporis consuluerit. Quod hic diximus de crebris sudoribus qui in Quartanam incidunt, questione dignum vnde oriantur. Nam non credibile est materiam tam crassam ita in halitus abire, id quod præsertim in corpore squalido & sicco, in quo tamen tot sudores apparent. Et hic annotari oportet anno Domini 1573 plurimis Quartanarius corpus totum sudoribus diffluxisse corpore planè emaciato, squalido & arido. Et ij sudores nil proficiebant. Horum duplex causa esse videbatur, infirmitas natura priore morbo ita fatigata: item ariditas hepatis & viscerum. Nam cum calor febrilis diu durans partes resciceret, fit vt quod alimentum allicit, ad partes facile non possit agglutinari, præsertim cum liquidius est. Tales

autem febricitantes solis insculis liquidis vivebantur; nec mirum si nequeunte hepate ob siccitatem multum consumere, reliquum per sudores exeat. Hanc questionem alio loco fusius fortè explicabimus.

*2. Tamen si in morbis, & præsertim in febribus: in hypochondriis, nec inæqualitas, nec tumor appareat, propterea securos esse non oportet de morbo, ut in hoc ægro apparuit: Etenim vitium sæpè in ipsis visceribus heret quod tactu nec visu percipitur. Itaque falli non oportet: Et id primus observavit Gal. cap. 7. lib. 5. Locorum affectorum; ubi declarat sæpè colorem aruginosum, aut auriginosum potius in superficie corporis apparere nulla existente obstructione, aut inflammatione, aut scirrho in hepate: ut & alteratio sit temperamenti non alienatio, nec sit morbus ullus in conformatione: idcirco cum tales colores adsunt, non statim ad admota foris deveniendum, ut malè quidam faciunt.

Iste vir, de cuius morbo hic disseritur, circa mensis Novembris decimum sextum diem lunam inclinante interiit. Et antequam interiisset intumebant pedes, omniumque partium corporis dolor obortus fuerat. Quarto antequam interiisset die, de repente suppressa est urina, & venter intumuit, ac si natura aliquid vellet moliri ad solutionem morbi: præscriptio diuretico excrevit urinae plus minus pintas tres. Visus est alluvari. Reperente accessione nova cum horrore interiit.

CONSILIVM XXIV.

De Hydrope.

MERCATORIS Vxor, de qua antè, nec purgationibus, nec venæ sectione, febris & tumoris quo detinebatur, curationem recipiebat: Immò morbus tantò contumacior resistebat, quantò maiore operâ ac curâ Medici conarentur ut morbum profligarent. Sed à Medicis aberrari videbatur. Nam illi rerum humidarum usum suadebant, usum quoque vini: hi neglectâ febre ab humidis rebus ægram auocabant, ut & cruditatem humoris in præcordiis contentam corrigerent, & tumorem omnium partium extimarum & abdominis minuerent. Item vino interdicebant illi: hi eam ad eius usum hortabantur. Nec abs re dubitatum est utri potius esset consulendum. Nam & à febre metuendum est, quæ dum humores corrumpit, maiorem

semper tumoris occasionem affert, & tumor iste curationem postulabat, ne si incremento non prohiberetur, tandem hypofarcidion immedicabilem adduceret. Ac reuera tumor ille morbi rationem habebat, à febre quidem primò originem ducens, sed qui priùs symptomatis nomine donari deberet, morbi rationem habere debebat, quod & cruditatem eius causam corpus contineret, & actionem læderet. Dum contrariis sententiis pugnaretur, de agræ salute ambiguum admodum ibat, necdum constabat quo loco standum, quidve consilij ea in recaperetur. Coacto Medicorum concilio res diligentius pertentata est, quod agræ mulieris sanitas admodum lubrica foret. Visum est omnibus febre & tumori consulendum; ita tamen ut potius febris, quàm tumor, eiusque causa negligeretur. Humorum congeries & cruditas visa est totius morbi causa: & febris ipsius, & tumoris. In iis humoribus sepultus calor visus est sese recreare nequiens; ut nisi prouideretur breui, leucophlegmatias verus sequeretur, à quo vix euaderet. Vrinę ardebant: sed id nihilominus febris habendam rationem indicabat, quod & leucophlegmaticis esset familiare, in quibus sectio venę metuenda, licet febris eam exposcere videretur. Quin & eam venę sectione curationem aggredi, agram iugulare asserebant: & erratum ab iis qui iam quartò venam secuisent, falsò inducti sanguinis detracti prauitate. Attalis in leucophlegmaticis sanguis redundare consuevit. Attantum abest ut quartò iterata venę sectio iuuerit, ut iacturam caloris naturalis attulerit, cum incubendum esset in coctionem tam contumacis materiæ morbum longum efficientis. In tanta enim cacochymia incidebat occasio nulla secandæ venę. Quod attinet ad veram curandi methodum, hæc in medium adducta sunt quæ in nullis morbis vsuuenire debent, & quæ Galenus 12 Method. propositâ febre cum syncope & cruditate coniuncta pertractauit. Nam eò loci nec purgationi, nec venę sectioni quicquam concedi debere explicauit, quod & vires in ea humorum corruptela, & veluti hypofarcidion habitusque tumore elanguescant, & cruditatis ipsa ratio omnem occasionem purgandi præripiat. Immo in eiusmodi affectu solâ frictione corpus exercet paulum admodum maioribus artis medicæ remediis attribuens. Ad summum reuocari debet eius morbi curatio ad duos canones quos Hippocratis Interpres pro hypothese proposuit. Nam in prima Aphor.

fectione, febrem hydropi humido iunctam constituit, vt vtri-
tribuendum sit in iis & similiter complicatis affectibus, doceat-
tur: æquè studendum vtrique tandem concludit, ita tamen vt
eius quod magis vrget potior ratio habeatur. 2* Posterior
hypothesis est de febre quotidiana: in ea habenda est ratio fe-
bris, & materie: hæc siccantia & calfacientia postulat: illa con-
traria. Galenus ita in eo segeri negotio, vt neglectâ ad tempus
febre materie preparationi incumbat. Quod diligenter anno-
tari debet. Contra nitebantur, qui dicebant, ideò sectionē ve-
næ commodam videri, quòd ex lochiis & mensibus nonnihil
superesset. 3* Tandem dictum est mensium recentem sup-
pressionem sectionem quidem venæ hortari: sed cum morbus
etiam ab ea suppressione natus iam affectus est. Imbecilla ea est
quæ à suppressione ista sumitur indicatio: nam contaminata est
sanguinis molisque corporis œconomia, succreuitque caco-
chymia quæ ex se catharsin indicabit. 4* Nec febris ipsa per
se sectionem indicat. Nec enim omnis febris sectione venæ tol-
litur, præsertim quæ à cruditate orta est, & cum caloris inopia
coniuncta est. Placuit eis vt vino etiam generoso vteretur ad
excitandum calorem naturalem, vires recreandas, cruditatem
coquendam, vt idonea reddatur ad excretionem, & tumorem
minuendum. Vinum absinthites probatum. Sequens apozema
institutum.

*℞ rad. enul. camp. sicca ʒi s. rad. apij, petrosel. aspar. fænic. an. ʒj.
omnium capill. agrimon. an. m. j. beton. scolop. chamæd. chamæpyt. an.
m. j. florum cordial. absyn. rom. an. p. j. glycyrr. polypod. passul. an. ʒj.
stach. florum anthos an. p. j. solior. senæ vnc. iij. agar. sub finem decoct.
positi vnc. ʒ. fiat decoct. ad lib. j. addendo turbit. vnc. s. In colat. dissol.
saccha. q. s. fiat syrup. quo semel in hebdom. vtatur.
℞ melilo. salvia, hyssop. agrimo. an. m. j. cyperi, cala. arom. schæn-
an. vnc. s. florum cordial. p. j. fiat sacculus, bulliat in vino pro fotu.*

ANNOTATIO.

Mulier hæc circa solstitium autumnale interijt cum præcessisset alui fluo-
symptomaticus à quo nil est alienata. Nec vlla fuit salutis spes quod om-
nium pene male affectarum partium internarum magna argumenta ap-
parerent. Ita enim Hippocrat. sub finem 4. de morbis, vbi in hydropi-
aluis valde fluit, citissime moritur audiens & loquens.

G iij

Hypofarcidios, quia a' iis affectionibus succedit, funestus fuit, non per
 fe, sed ex euentu. Verum enim id est quod scriptum ab Hippocrate li-
 bro περὶ παθῶν, morbum omnem alteri succedentem, funestum esse fere.
 Huc pertinet quod scriptum ab Hippocrate sub finem lib. 3. de mor-
 bis. Omnis hydrops difficilis curatu, praesertim si corpore attenuato veniat,
 & ubi aluus fluit, moritur cito.

Mirum est quod cum totum corpus aedematofum esset, & possedes muc-
 cosum dicere possis, tamen intus ardor erat, & non nisi admodum sollicita-
 ta aluus reddebat. De hoc morbo videtur ad vnguem pronuntiasse Hip-
 ocrates in Coacis. Nam verè exprimitur morbus & symptomata: Quib-
 us ex aegritudine aliqua res ad aquam intercutem deuenit, his alui sicc-
 itas, spiratodea reddunt cum eliquatione muccosa: urina non bona: disten-
 siones praecordiorum, dolores, tumores in ventre & in aqualicula:
 & iuxta spinales musculos: febres, sitis, tussis sicca, spirandi diffi-
 cultas, crurum grauitas, abstinentia & horror cibi, paucis iniectis reple-
 tur.

Libro περὶ παθῶν, notandum quod scribit Hippocrates, hydropem succe-
 dere morbis longis, cum aegri purgati non sunt. Ratio haec est, quia carnes
 corrumpuntur & liquantur, hoc, quod dicitur, communi sensu & expe-
 rientia perspicitur.

*2 Haec ratio videtur probabilis ad dissuadendam venae sectionem, cum
 suppressio inueterata est, ab ea non desumitur secunda venae indicatio: sed
 cum recens. Tamen Galenus comment. in artic. 28. sect. 3. lib. 6 Epide-
 mior. narrat se optimo consilio liberalissimâ manu sanguinem detraxisse
 in muliere extenuatissima, cui iam octo menses menstrua purgatio sub-
 stiterat.

3* Mirum est quod hic propter cruditatem Medici vino interdici
 nolunt: tamen vinum febris planè dehortatur. Incredibile enim dictu
 quantopere vinum febrem augeat. Nam dum valemus, ac calor naturalis
 intra suos limites consistit, magna etiam generosi vini copia, nihilo pen-
 auctiorem calorem reddit. Sed dum è gradu discescit, & iam febricula
 corpus occupauit, etiam tenue vinum propinatum statim symptoma
 excitat, quod qualitas caloris praeter naturam facile adiecto stimulo ap-
 pareat.

CONSI-

CONSILIVM XXV.

*De febre cum grauibus symptomatis singultu & tussi,
pro Domino de Bures.*

Dvo sunt quæ inter accidentia symptomatâque in febres quæ hac tempestate grassantur incidentia numerantur, quibus plurimum ægri torquebantur, singultus ac tussis. Nec ita quidem molesta esse ceperunt, vel quod totum febris tempus occuparent, vel quod breuissimo tempore diuexarent. Vidimus enim ineunte statim accessione ita suffocationis periculum oboriri, & tussis molestias, ac si nulla vitæ spes relinqueretur; desinente accessione placidè ac fedatè habebant. Singultus autem in nonnullis ita molestus fuit, qui febre nocturnâ, mox diurna cum destillatione in pulmones laborarent, vt omnia præter singultum moderatè ferrent. Sed ecquid causæ fuit tum singultus illius, tum tussis in accessionis tempora incidentis. Actussim quidem eo tum sequi tempore, quo paroxysmus repeteret ex eo coniicimus, quod febris à catarrho maximè esset. Et quæ materia subtilis, acrisque, quæ rigorem sensionemque frigoris afferre solet, quiescebat aliquò loci conclusa, dum ruptis veluti repagulis desuit decurritque in extima corporis, feriendo superiores membranas pulmones vel vestientes, vel illis proximas, tristis ille sensus tussim afferebat. Præterea in catarrhosis febribus quid impedit moueri quoque materiam in pulmonibus & capite ipso, quæ dum cietur, suscitatur, impelliturque, hoc molestiarum afferre solet? Accedebat & nocturni temporis occasio qua pituitæ falsæ serosæque impulsiones & molestiæ sese produnt. Quemadmodum enim vniuersalium temporum aliqua est observatio in motu humorum, ita & particularium. Sic ascarides moueri Autumno scripsit Hippocrates: sic in vespertinum tempus earum ascaridon motus incidit. Quod & defluxionum incursionibus verum esse mulierculis compertum est.

Sed is singultus difficultatem maiorè afferebat. Nam duodecim aux sexdecim ferè noctes affligebat. At leuiusculis remediis superatus, relabitur, recurritque cum molestissimo vlcerationis sensu circa orificium ventriculi. Quod vt clariùs cognoscatur, licebit hac Hippocratem adducere, qui cum in omni

Tom. I.

H

parte Medicæ contemplationis accuratus esset, ita nil reliquit quod animaduersione dignum foret. 1. Multos legimus, qui de singultu, eiusque causis disputarent, nullos præter Hippocratem, qui de singultiente febre conscriberent. Ergo omissis rebus variis, quæ ad singultus causas explicandas facere possent, quæque alio loci quàm hic venari liceret, ne opera omnis frustra ludatur, quod ad hoc institutum pertinebit, de singultiente febre disputabimus. Quæstio quæri potest, An hic æger, de quo paulò antè mentio iniicitur, singultiente febre laboraret? an quicumque febre detinetur, cui tanquam *ἐμφυλὴν οὖρον ἐκ τῆς ἀδ-* iungatur singultus, febre singultuosâ laborabit? Nequaquã verò Nam & qui sub finem febriũ, aut principio illarum malè iudicati sanguinem multum profundunt, vnde ratione inanitionis, & exhausti singultus oboritur, propterea singultiente febre teneri dicentur? Nequaquam. 2. Et qui aliquot ex intervallis dum febrit, singultiat, nec tota febre, aut toto accessionis tempore, molestiis singultus vrgeatur, an singultiente febre vexari dicetur? Nequaquam. Ergo in omni Hippocratis doctrina vna singultiens febris dicitur, vt inquit Galen. Comment. in particulam quandam sect. 4. lib. de Diætâ acutorum, cùm vel toto febris tempore singultus molestus est, vel maximâ saltem febris parte illum generet, viscidus lentusque humor impactus orificio ventriculi. Vnde Hippocrates eiusmodi febres negat solutum iri, nisi aut diebus iudicibus, aut vrinæ profluio acris, aut abscessu, quod memoriâ dignissimum est. Sed in nostro ægro proposito antequam cessaret singultus, totum corpus intumuit: Detumescente corpore repetiit singultus afferens ei aliquid permolestius quàm antè. Nam & vlcusculum excitavit, aut deflorationem aliquam, vt sic loquar, in partibus ad orificium ventriculi attinentibus. Nam cùm quid deglutiebatur aut calidiusculum, aut manifestâ qualitate præditum, percipiebatur in imo cæphagi dolor, suspicabamur aliquid esse *ἀποθνήσκει*, quod non vacabat periculo. Ad genus febrium singultientium fortassè referri dicet quis febres acutas ab inflammatione aut hepatis aut ventriculi natas, aut partium vicinarum. Quæ inflammatio, vt narrat Aëtius cap. de singultu, singultientium molestias affert. Quod & Hippocrates primus annotavit. Item referri videbitur, sed minùs aptè febris singultiens senum herniâ laborantium, & supinatione ventriculi, vt volunt veteres.

*Qua fe-
bris vere
singul-
tiens di-
citur,
inquiri-
tur.*

res. Nam dum intestinum prolapsum est, præsertim ieiunum, ut volunt, singultiendi finem non faciunt, & hoc in mortem præcipitare solet. Ac de singultu multa quæ in veterum libris intractata sunt. 3. Cui autem is singultus contigerat cum abdomen inflatum fuisset aluus biliosa reddidit: post excretionem biliosorum secuta sunt purulenta, quod mirum est. Nec credibile hæc à pulmonibus emanasse, quamuis hos laborare suspicæmur: Cum enim à partibus superis tale quid contingit, id simul & semel fieri solet. Vnde Galenus annotat Hippocratem datâ operâ vsurpasse verba de præsentî, aut de præteritò, *meiat*, aut *mixerit*. Nam cum à superis partibus excretio fit, Hippocr. vtitur verbo *mixerit*, quasi dicat, ut meiendi finem fecerit: sed cum à partibus proximis excretio fit, vtitur verbo præseti *meit*; quoniam propinqua est affectio quæ excretionem purulentam fouet. At hic ægers sæpe eam excreuit materiam. Nos autem suspicabamur idẽ hîc posse contingere quod & in vrinis. In his enim sedimentum puri proportionem respondet, imò & excerni potest aliquid simile puri, cum tamen non sit pus, sed mucago quædã quæ vnâ cum vrinis à corpore deturbatur. Id autem in excrementis per aluum secedentibus apparere potest, præsertim in iis quibus longæ & maximæ fuerunt obstructions menterij, & longus morbus. Nam humores qui pepasum admittere non potuerunt, tandem in mucorem versi sunt, qui pus referat. Quod & obseruauimus in nutrice quadam quæ ex longo morbo incidit in fluxum alui perennem, cruentum, mistum: Tandem secedebat aluus reddens aliquid pulti simile, cum præcederent dolores aluini colicis similes crudelissimi, cum inappetentia esset, summa extenuatio corporis, & marcor: præterea acerbissimus dolor ad regionem ventriculi, & totius abdominis, & qui minimo blandissimòque digitorum pressu exasperaretur. Sed id primus Hippocrates annotauit in Coacis duobus in locis. *Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, soporosi, rigorem habentes, aluum turbatam, renues, cibum auersantes, purulenta per aluum excernunt.* Et alio loco: *Durities circa ventriculum cum dolore in febrientibus, cum horrore cibum auersantibus, si aluo insuper parum humectata purgationem non faciant, ad supurationem peruenient.* Quod cum aliàs tum in ægra illa apparuit, cui totius corporis marcor aderat. At certò scire an id quod excernebatur verum pus esset, an quiddam puri simile, non erat facile.

60 CONSILIORVM MEDICINALIVM
ANNOTATIO.

1. Non solum lib. 4. de Diata, acutorum (ut hac paginâ annoto) Hippocrates meminit febris singultientis: sed & lib. 2. de morbis, ubi caput conscribit de febre singultiente.

2. Præsertim verò & tussis & singultus premebant cum appeteret accessio febrilis: quod annotavit diligenter Savañorola cap. de singultu. Singultus sæpe à pressu costæ, aut depresso, aut tracta contingit, quod diligenter annotavit Fernelius: item vomitus ab eadem causa fit, quod nos quoque in ancilla pictoris observavimus.

3. Ille eger singultiens, tussiens, febriens, ad tabem vergens, decimo nono mensis Novembris interiit. Aperto cadavere inuentus est hydrops, ascites in abdomine, qui longitudine morbi, & depravatione alimentis & potu liquidorum generatus fuerat. Nam tanta diuturnitate facultatis fatiscunt, concidunt ora vasorum, nil fere transsumitur. Inuenti sunt pulmones purulenti, corrupti: intestina luescebant quasi siderata superna parte: unde credibile fuit tum singultus magnam occasionem illinc natam, tum syncopes qua prehensus est. Lien planè putris. Denique nulla in toto corpore pars inuenta est integritatem suam servans. Deiectiones purulentæ quæ nobis admirationi fuerunt, à putri mesaræo manebant. Deiectiones (antequam diem suum obiret) præcesserunt nigrae, piciliquiæ de similes.

CONSILIVM XXVI.

De doloribus ventriculi. Pro domina de S. Iean.

1. PLEROSQUE dolores ad stomachum variè fatigant, quos nescias an attineant ad ventriculum ipsum, an verò ad partes vicinas. Ratione enim membranarum tum quæ inuestiunt thoracem, tum quæ diaphragmati vicinæ sunt oriuntur sæpe dolores continuitate quadam affligentes, & ea ratione alios aliterque quàm sint morbos mentientes. Ut sæpè malè ab ægris species doloris ignorantibus intelligentes Medici decipiantur plerumque, nec dolori vllum solatium afferant. Quod cum aliàs tum in nobili muliere Equitis Torquati coniuge manifestum fuit. Illa cum dolores tum noctu à primo præsertim

somno, tum interdiu tribus aut quatuor horis à pastu pateretur, imbecillitate stomachi laborare se existimabat. Dolores illi repetebant per intervalla, maximè si quid in victu peccaretur, aut constitutio temporis à naturali moderatione discederet. Sapè intolerabiles sunt, & quasi suffocationis periculum ingruat, statim discingi cogitur. Illi modò in ventriculi capacitate contineri videbantur, & delapso per pyloron cibo cum à duodeno ieiunòque traductio transfectioque alimenti fieri deberet distributio, repullulabant. Ac tum ac si creparet media & intumesceret ventriculus, vt reuera contingit, cohibet spiritum vt status aliquis aut sursum aut deorsum erumpat, quod dum fit, attenuatur maximam partem dolore. Nulla illam vertigo exercet, nec syncope, sed præ dolore qui inum ventriculum affligens, licet exiguus, ratione partis magnus est, & magni momenti, multa contingunt iis affectibus quamsimillima. Itaque dum diligenter inquiritur huius mali sedes, & animo lustratur, multa vtro citroque disputantur, quorum accurata & limata ratio plurimum valet, tum ad huius mali investigationem, & ad similitum affectuum notitiam venandam. Nos diligenter rem excusamus, relictà diligentiori quæstione honorario arbitro & æstimatori, ne quid præiudicata sententia afferat detrimenti. Dug sunt partes in nobis, quarum veteres infirmitates apparent & deteguntur, siue ea per se æ solæ laborent, siue ambæ per cõmunione & materiæ morbificæ & affectuū, vt in hac muliere contingit, ventriculus & caput. Hoc quidem quod & superum locum tenens externis iniuriis pateat maximè, & internis attractione & summisione vaporum. Non quòd in ea opinione Principis hærendum existimem, qui omnem à capite destillationem iecoris calidæ intemperiei ascribit; nam cerebrū ipsum tum ratione imbecillitatis suæ, tum intemperiei illarum parens est & autor. Immò frigida intemperies iecoris eas potest promovere. Addit Fernelius, si à iecore præcalido illarum destillationum proventus foret, excrementi minimū ea ratione in cerebro cõgereretur. Quod quàmprobabilè alij viderint. Ventriculi autem infirmitas patebit faciliè, quod & ciborum promptuarium, etsi quid peccetur aut domi, aut foris, id est vel mala alimenta, vel præpostero ordine iniiciantur; domi dum aut nocturna, aut ascititia imbecillitas, aut dum propinquæ partes vitiū attingunt. Quæ enim sunt propinqua & communia, ea maximè

ac primum affici solent. Receptum illud; *ubi dolor, ibi morbus*: & ut doloris vacuitas actionumque bonitas cuiusque legitimam symmetriam declarat; ita doloris praesentia, & earumdem actionum laesio contrarium significant. In agra nostra ventriculus, ventriculi que partes vicinas dolor exercet, ergo ibi morbus, hic intemperies, hic actionum peruersio. Et si enim habet *ὑπερβολή*, tamen isti dolores aut intemperiem aliquam declarant, aut malam conformationem. Ventriculū enim exercent; vel *ἀνέμια*, vel *σπασμωδία*, vel *δυσπεία*, rugitus, inflatio, singultus, nausea. Maximè verò queritur de oppressione ventriculi, ac veluti inflatione. Hæc autem cruditatis improprie dictæ, non autem quam *ἀνέμια* vocant, symptōma est: & sequitur vel caloris defectum, vel eius inopiam & paupertatem, vel externū vitium. Caloris inopiam dicimus, quod flatus qui excitantur necessariò imbecillitatem caloris designant: cum enim vel validus calor est, vel impendiò imbecillus, flatus non excitantur; Galen. 3 de symptom. causis. Et suspicio est inflationis stomachi quam vulgus colicam stomachicam appellat. Quod si non solum intra ventriculum dolores consistant, sed infra, supraue, id per consensum fit. Vnde Archigenes apud Aëtium dicebat Medicos decipi sepe ratos doloris causam aut in præcordiis esse, ait in pectore, cum eorum causa à ventriculo repetenda sit.

Alter Medicus rem paulò altius repetiuit. Affectio hæc ait videri possit stomachi, quod hæc pars maximè affici cernitur: sed an tantum eius sit: & si sit, an per se, an per consensum afficiatur; hoc demum quæri potest: Omnis affectio quæ ventriculum exercet, ea aut intemperies est, aut morbus instrumenti. Si intemperies, aut in ore eius est, aut in ipsius capacitae afficitur ventriculus, aut in fundo in quo chyloscos officina vera. Si os esset, eius affecti aliquot essent argumenta, leipothymia, aut deiecta appetentia à calore, aut intensa, à frigore, aut nausea aliqua: Nil horum agra refert. Si mediū corpus esset, aut deprauatè coqueret, & ructus essent acidi: aut nidorulenti, sed acidi præsertim si imminutè: si non coqueret, aut diminutè, fluctuationes essent, quas *ἀνέμια* vocant, nausea impacta materia, vomitio, vagante fluctuantēque eadem. 2. Si fluctuatio esset, & ab ea inflatio dum ventriculus non retineret, nec probè conficeret, oporteret necessariò cæliacas esse deiectiones, corruptas, liquidas, chylosas, quod tamen non apparet, & nil eorum quæ su-

prædicta sunt. Ergo credibile in fundo mali causam esse, in quo coctio maximè sit. Et cū superiores partes benè habeant (nam si malè habuissent, maiora sese promississent affecti ventriculi argumenta, multoque latius malum emanasset.) Credibile quoque fundum è natura habere, sed impediri eius actiones à remissa aliqua re præter naturam, vnde dolor excitatur, & præsertim cum à pyloro distribuitur ad inferiores partes alimentum. Coiecturam facit catarrhus quo iam pridem affecta est, & reiectio pituitæ liquidæ & limpidissimæ per os à ventriculo, vt hinc colligamus perpendiculariter à capite ad fundum ventriculi delabi illud phlegma, quod egrè quidem corrumpitur, crudumque manet, aut paulum immutatum cum excrementis remixtū reicitur. Item dolor qui sub quartam pomeridianam repetit, indicat mesarei venas obstructas, & speciem quandam melancholiæ hypochondriacæ constituit. Hinc annotauit Fernellius cap. de ventriculi symptomatis, sæpe iecoris, lienis & mesenterij vitia sympathia integrè sani ventriculi concoctionem perturbare: sic melancholicis, hepaticisque & lienosis ventriculus malè concoquit, si vitiosâ qualitate laceffitur, &c. Ergo dum chylus aliqua ratione mirificatus rapitur à venis mesenterij, pars tenuior à calido iecore refugitur: cum crassiori parte phlegma illud mixtum subiens angusta viarum & elaborationem vix recipiens dolores excitat: 4 & nisi aliqua ratione domaretur, iliacas passiones excitaret. Itaque bene affectus est ventriculus, quod excrementa ipsam quæ ideam partis à qua manant referunt, laudabilia satis sint. Nam cū ventriculus probè officium non præstat, liquida, aut chylosa, aut cœliaca excrementa sunt: 5. cum tantum pituita liquida vitium facit illa remissa apparet excrementis, quæ spiratodea vocantur. Vnde verò hæc pituita à cerebro: *Hoc enim veluti medulla est.* Hippocrat. libro de glandulis: *Ab hoc fluxiones fiunt foras, intro: foras per oculos, nares, aures; intro per palatum: aut in pulmones, aut in ventrem. Si in ventrem, vel fluores fiunt, vel non. Si non fiunt, voluulosa sunt affectiones, &c.* Locus ille præclarus admodum.

6. Et lib. 4. de morbis idè ferè explicat dū docet caput fontem pituitæ, & eam à ventriculo calfacto accipere. Lienem aquæ fontem, folliculū fellis, bilis fontem, & cor sanguinis. Quod diligenter notandum. Itaque non mirum si descensu pituitæ frigide putredinem vix recipientis illa mulier dolorem sentiat, & si postea voluulis sit

obnoxia, & melancholiæ hypochondriacæ. Quæ duplex est, vna vera per adustionem humoris melancholici, aut congestionem; altera improprie dicta, ob pituitam illam quæ obstruit venas mesaraicas. Nec hic necesse est tumere hypochondria. Nam sæpe vitium est in visceribus, melancholiaque hypochondriaca sæuit, sed in corporibus ipsorum viscerum & vasibus eorum obstructio delitescit sine vilo perspicuo hypochondriorum tumore. Et dum crudum aliquid continetur, facile in status digeritur. Quò teter vapor fertur, ibi vitium communicatur: si in cerebrum, mania, aut melancholia: si in ventriculum, coctionis error; si in cor, palitationes. Maximè autem eiusmodi affectionibus corpus patitur cum hepar præcalidum. Porro calidum bifariam, vel vt ferrum & plumbum, id est diuisum calorem retinens: vel vt palea. Vnde in plerisque serosus sanguis quaqua- uersum irrumpens, & rubores faciei que maculas inferens; est enim veluti calor *ἡγεσις ὁρμῆς*. Nam rapit tenuiorem chyli sanguinisque partem, & in halitum vertit. Sic plerisque ventriculus frigidus & hepar calidum calore halituoso. Hic omnia exurit, & in ichores vertit. Et talis calor non potest temperare frigiditatem ventriculi; nam fixum stabilemque esse calorem oportet. Curatio illius affectus in diæta & pharmacia continetur. Diæta quæ ad siccitatem vergat potius, vt pituita illa consumatur quæ dolores citat. Pharmacia vt blandè deturbetur pituita, quæ in angustas vias rapitur sæpè, & à capite descendit. Item habenda ratio capitis mittentis. In corrigendo ventriculo non ita occupatos esse oportet, quod in vitio per se non sit. Abstineat à iusculis multis, à generoso & crasso vino. Sæpè cibum capiat, ne ventriculus vacuus aliundè humores euocet. Ab iis quæ caco- chymiam promouerent abstineat. In ore semper contineat coriandrum conditum, passulas, cinnamomum, mastichem: & alia id genus. Carminatiuis sæpè clysteribus vtatur, vt & à lienis corpore humores crassi euocentur. Syrupus hic singu- laris.

℞ succorum menthe, absynth. pont. scariolæ depur. an. ℥ iiij. express.
 ℥ij. rheub. macerati ad partem sacch. albi quart. ij. Fiat syrup capiat se-
 mel in hebdom. aut bi.

Item in hoc affectu commendatur plurimum ad liberandos
 infarctus vsus deiectionis sequentis.

℞ rad. cichori syluest. aceros. & gram. an. ℥ j. Incoque in lib. j. aquæ
 ad tertiam

ad tertias, in quibus infundantur ʒ ij rheib. taleolatim secti. De hac infusione capiat ʒ iiij singulis matutinis tepidè.

℞ pulu. hierapicra (qua in eiusmodi affectibus ab Archigene plurimum commendatur) ʒ ij. pilul. sine quibus ʒ j. rhei ʒ ij. syrup. de ment. quod suff. fiat massa, capiat ʒ ij saepe una hora ante cibum.

℞ aromatic. ros. desc. Gabr. maior. ʒ j. pulu. elect. triasam. ʒ ij. rasur. ebor. ʒ ss. cum sacchar. dissol. fiant tabellæ.

Fotus fiant ad regionem ventriculi, ex iis qua usurpari solent ad confirmationem eius: & à fotu liniatur oleo de mentha, absynth. & mastich.

℞ syrup. de siccis ʒ ij. utatur serò cum granis mastiches aut olibani. Paretur opiata ex consensu rosar. buglos. anthos, consensu violar. cortice citrij & theriaca pauca. Utatur serò dum componit se ad somnum.

Observatâ legitimâ victus ratione, & usurpatis leuiusculis illis remediis prima fanitas poterit recuperari.

ANNOTATIO.

Aetius cap. 68. serm. 4 Tetrabil. 2. docet quomodo, & qui cruditatibus abundant, fiant pleuritici, non quòd sit pleuritis, sed imaginaria est.

2 Hippocrates lib. 2. de morbis, de morbo quem ruētiosum vocant, huic affectui quem hoc loco describimus finitimo disputat. Sed illum ab humore presertim bilioso nasci demonstrat. Caput illud commemoratione dignum est. saepe similes affectus disputandi proponuntur.

3. Tamen sputatio ista fallax esse potest signum. Nam & denotare potest prolapsam pituitose materia à capite, item & melancholiam hypochondriacam; qua mulier hæc nostra diuexatur. De melancholia dum disputat Galenus ex sententia Dioclis, proponit sputum humidum nullum consequi, presertim iniecto cibo in iis qui laborant melancholiâ hypochondriacâ. Quod diligenter notandum est ne rei ambiguitate decipiatur.

4. Cap. 14 sermonis I. tetrabil. 3. Aetius notat affectus esse quosdam malos cum à capite in ventrem humores feruntur. Nam aut frigidi humores in ventrem calidum ferantur, aut contrà: Aut difficilior curatio nem institui cum frigidi humores in calidum ventrem deferuntur: Item grauiora inde symptomata edi. Tale quid mulier ea de qua hoc in loco perulisse mihi visa est.

5. Et nos in ea muliere obseruauimus excrementa spiratodea mucosa pituita veluti oblita. Vocat autem Hippocrates in Coacis *τὰ ἀνεγμένα* *μέμνηται* *μυστήρια*: *ἐλίκvationem mucosam* vocat.

Tom. I.

I

66 CONSILIORVM MEDICINALIVM

6 Adhunc locum pertinet & alius lib. i. de morbis. In morbis catarrhosis fluxum maxime caput exhibet, utpote quod cauum est & superne situm. Cum ab aluo fuerit calfactum, pituitam tenuissimam de corpore in seipsum trahit: ubi vero in eo collecta fuerit, rursus reddit acervatam & crassam, &c. Et tunc remittit vel in superum ventrem, id est thoracem, vel inferum. Et cons. ii. huius lib. de industria probatum est longorum alui profluuiorum, dysenteriarum causam cerebro acceptam ferendam esse, ex libro Hippocr. *mei mēōv.*

CONSILIVM XXVII.

De Febre continua cum distillatione in pulmones.

MELCHIOR de Fresnoy annos quatuor natus febre corripitur cōtinuā, sed quæ exasperationes haberet vesperi. Catarrhus erat. Tussis sicca. Nec præ tenella ætate quicquam excernere poterat. Tamē inanis semper erat tussis, & tenuis humor eludebat spiritū. Vomitiones frequētes. Aluus albicantia deiecit, deinde substitit. Urinæ tenues, crudę, decolores pro febris vehementia: medicamentulo aluus sollicitata reddidit multa biliosa. Tussis perseverabat. Dolores ad sinistrum hypochondrium, sed vagi, nec eodem modo perseverantes. Deinde sinistram lateris partem occupabant. Aluus soluta est. Viridia excreta, chylosa: sitis quæ expleri non poterat. Magnum in pulmonibus conceptum incendium coniectum est. Hinc dolores ad sternum & latus sinistrum: sed qui ad latus sinistrum non perseverabant, ut antè dictum est. Medici putabant vomitiones ab imbecillitate ventriculi oriri. Quod in eam suspicionem eos adduxit est frequens deiectio, multaque rerum variarum, putrium, viridantium: Aliquando animus paulum deficiebat: & nos animi defectiones, & frequentes vomitiones in alio observauimus, cui inflammatio pulmonis à pleuritide, aut fugaci dolore lateris oborta fuerat. Quæstio hoc loco moueri potest, 2. an inflammatio pulmonis, siue ea sit phlegmonodis, siue erysipelatodis habeat hæc sibi coniuncta; defectus animi, vomitiones, tussim siccam, alui fluores, ac si per se primoque aluus inferior laboraret, fugacem genarum ruborem, tussim inextinguibilem, febrem non ita magnam omni tempore, sed ex interval-

lis ferocientem & prodentem sese? hoc fortassè pauci ante nos animaduenterunt, & sic alium morbum pro alio curamus: aut falsò vomitiones, & alia accidentia quæ narrauimus ad alias partes referimus: rati hoc non ad pulmones, quæ tamen præcipuè affecta pars est, pertinere. Et vt quod sentio obiter dicam; cum ad puellum asciti essent tres celebres Medici, vnus solùm affectum pulmonem intellexit, & quandam speciem peripneumoniae suspicatus est, vnde sectionem venæ suasit. Sed falsò subesse vlcus cogitauit, nesciens inanem hanc tussim erysipelatis pulmonis pathognomicum esse. Omnes ignorarunt vomitiones illas frequentes, deiectiones frequentes, ingentem admodum sitim, & opinionem maiorem, in inflammatione pulmonis solere apparere: Quorum ignorantiam vt detegam, ne fortè sese excusent quod nullo loco legissent, aut animaduertissent talia symptomata contingere solere inflammato pulmone, citabo Hippocratem, qui illum puelli morbum mihi verè expressisse videtur. Ita autem scripsit Hippocrates lib. i. de morbis, in omnibus suis obseruationibus ex monimentis admirandus: *Erysipelas in pulmone sit cum pulmo fuerit nimium resiccatus. Quod contingit ab ardore, febribus, labore, intemperie. Et cum superresiccatus fuerit, plurimum sanguinis ad se trahit, maximè ex magnis venis tenuissimū ac debilissimū trahit. Postquā traxit febris ex ipso sit acuta, tussis sicca, repletio in pectore, dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maximè circa spinam, magnis venis calfactis. Vomunt subuenientia aliquādo liuidā, vomunt pituitam & bilem, animo linquntur ob sanguinis transmutationem derepentè contingentem. Atque hoc maximum signum est in pulmone generati erysipelatis, & si assidue febris inuasio perseuerauerit.* Aliquot alia scripta sunt quæ huc non pertinent. Itaque ex contextu Hippocratis apparet hæc maximè symptomata erysipelate tentato pulmone contingere solere: 3. dolorem sterni, vomitiones, tussim siccam: deliquium animi, quid mirum esse potest. Sed hæc contingunt vel maiora, vel minora, vel plura, vel pauciora pro humorum varietate. Nos autem obseruatione trium eo affectu laborantium, certò scimus febrem (licet sit occupatus pulmō) non eodem perpetuo tenore affligere ac saui-
re: nam quia Erysipelatosa affectioni comes est, & præsertim à tenui serò, sit vt flammæus sit calor, cuiusmodi in palea accendi solet & euolare statim: si autem putris, solida, firmāque esset materia: & pars quæ inflammatur solida (vt hepar) perseuera-

ret febris, & calor eodem modo quo in candente ferro. 4 Deliquia animi quæ hîc contingunt nos admodum perturbant. ignorantes tale aliquid contingere posse inflammato pulmone, & triuiales medicos secuti ad malignam qualitatem iactationes istas, deliquia animi, & virium iacturam referebamus, non autem ad propriam affectionem pulmonis, vt Hippocrates fecit loco prius citato. Mouit quoque alui fluor: sed duabus de causis contingere potest: tum quia ventriculus ipse afficitur: & quæ admodum leipothymia cumprehendit per consensum pulmonis ratione ichoris à pulmone resudantis, & ratione attractionis ab ingente calore pulmonis, vt eruditissimus Hippocrates annotauit: Ita quoque debilitas aliqua in ventriculum cadere potest, à qua leienteriæ aliquid simile contingit. Ac reuerà in puello nostro chylosa nulla prodire. Secunda causa hæc esse potest, quòd ichor à pulmone refluens ferire possit ventriculū & intestina, hinc alui inferioris fibræ laxantur: hinc fluores. Fernelius vt in multis accuratus fuit: ita in pulmonum affectu obseruatione annotauit quandam notham peripneumoniam, cuius idea apparet in agro à nobis proposito. *Tenuis, acris, multaque destillatio* (inquit) *è cerebro confertum illapsa in pulmones interdum ardore præter naturam incenditur, æstum ac febrem inferens, plerique eam affectionem peripneumonia nomine designant, in qua & tussis & spirandi difficultate & lenta febre sensim conficitur æger sine ulcere, sine spuitione cruenta.* In puello nostro verè exprimitur morbus: nam febris non erat admodum vehemens: destillatio erat magna: eludebat spiritum: 5 sensim conficiebatur: & incautis nobis cum cibum appeteret, biberet auidissimè, vicesimo die, item cum de purgando eo cogitarent Medici, sublatus est, magno assidentium mœrore. Debuerat mitti sanguis. Aperto cadauere nil præter naturam in pulmone contentum inuentū est. Vna pars pulmonis veluti stipula ardente deflagrauerat: lobus vnus pulmonis liebat. 6 Hepar quoque veluti deflagrauerat. Et cum destillatio est, tussis sicca, febris non ita ad manū mordax, rubor genarum, dolor sterni (quod notandum) viriū deiectio: fitis ingens: perceptio summa caloris in pectore: non est dubiū quin inflammatus pulmo sit. Ac notari debet ex locis citatis prius tum ex recentioribus, tum veteribus, aliquid erysipelatos in pulmonibus concipi bifariam, aut cum tussi, aut sine tussi saltem quæ magnam afferat molestiam (nam subest tantula.) si

Cap. de
pulmon.
morbo.

cū tussi destillatio est ferina, diluens calorē vnde febris non ita ferox apparet: illi incauti moriuntur: nil extundunt commemorabile: à capite presertim manat causa fouens morbum. Si finetussi à venis paruis & magnis refugitur sanguis, qui in pulmonem illabens, & incurrens potiùs attractis foueat incendiū. Et illud est quod volunt Medici memorandum, veram peripneumoniam oriri excusso tenui & bilioso sanguine è dextro cordis sinu in venam arterialem; hinc totum pulmonis corpus occupatur, hinc inflammatio. Quod si verum est in inflammatione pulmonis, sectio venæ videtur potiùs celebranda ex interiore dextra. Tamen Fernelius ex sententia quorumdā, in inflammatione pulmonis secari vult internam cubiti sinistri. Ratio eius hæc est: Quoniam pulmonum venæ ex dextro cordis sinu prodeunt: hic autem in sinistrum parietem venæ cavæ inseritur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit. Inter morbos qui occurrunt, pulmonum affectus cogniti sunt difficiles: nec enim signa vniuoca sunt, sed maxima ex parte equiuoca.

ANNOTATIO.

¹ In illo rubor erat genarum magnus. Vnus ex Medicis ex eo collegit argumentum peripneumoniam aliis cum signis, alius repugnabat. Ille citauit Prognostic. Hippocr. & quamuis verum dicebat, malè citauit. Nam in 2. Prognosticon meminit quidem ruboris genarum Hippocrat. in mirbis thoracis, sed loquitur de purulentis, quibus & ob calorem pulmonum, & ob assiduam tussiculam rubent genæ, ait Galen. in Comment. part. 60. lib. 2. Prognost. Sed in Coacis peripneumoniam signum vixit, politico modo loquendi, id est, ruborem genarum. Et ille Aphorismus huic agro quadrat. Nam etiam fluente aluo erat inappetentia, sudores, vomendi desiderium, rubor faciei, cum febre & tussi. Quæ omnia declarant raptum humoris biliosi ad partes thoracicas, & concipi in illis partibus incendium. Sic Hippocrates in Coacis ait eos quibus hæc accidunt, interire modo peripneumonia.

² Cū Mesuens de peripneumonia loquitur, illud notat maximè quādam peripneumoniam biliosam esse, aliam pituitosam. Credibilis esse ait pituitosa esse. Porro pars qualibet laborat ab humore vel tanquam nutrimento, vel tanquam excremento. Si pulmo laboret ab humore tanquam excremento, à pituitoso humore laborat, si tanquam à nutrimento

à bilioso; nutritur enim humore bilioso. Vult autem omne excrementum ex sententia Aristotelis, parti contrarium esse, præter illud excrementum quod deferre solet facultatem, ideamque partis, ut est semen; siquidem ab omnibus benignum dicitur. Si prius verum est, peripneumonia à pituitoso humore tanquam ab excremento secundum Mesueum, & tanquam à contrario secundum Aristotelem deterior erit eâ peripneumonia quæ est à bilioso humore, qui est veluti nutrimentum. Tamen dubitari potest an verum sit quod scribit Aristoteles, excrementum omne parti contrarium. Et an ea peripneumonia quæ fit à bilioso humore, ab eo fiat tanquam à nutrimento; siquidem superabundans humor biliosus, ut qui à partibus inferis per violentam exercitationem rapitur, excrementum verè dici potest.

3 Quoniam hîc de peripneumonia agitur, quæ non sæpe occurrit, sciendum an pars dextra pulmonis, an sinistra, an superior, an inferior, an lobus unus tantum occupetur ut inde veniemus occasionem usurpandi remedi. Argumenta omnium horum apprimè ad artem facientia enarrat doctissime Hippocrates in Coacis.

4 Queri possit an deliquia animi in peripneumoniâ laborantem incendant. Nos id obseruauimus, & præcipitem virium lapsum & sudores subfrigidos. Quod primus Hippocrates obseruauit in Coacis, loquens de quibusdam quibus totus pulmo cum corde inflammatur, & de aliis, in quibus non inflammatur. Nam resoluuntur illi quibus cum corde pulmo inflammatur. Sic Regina Nauarræ peripneumonice 5 die interit; & tertio vires collapsæ sunt planè.

5 Qui sunt peripneumonici, præsertim cum valdè sunt imbecilli & diaphoreticis sudoribus dissoluuntur, & symptomaticis. De iis Hippocrat. 4 Acutorum. (Idem porro iudicium esto de reliquis morbis acutis.) Mali sunt sudores circa caput & clauiculam apparentes; sunt enim vincentæ agitudine ob æstum, impetum, & violentiam.

6 Paulò antè docuimus & autore Hippocrate, & historiâ Regine Nauarræ peripneumoniâ laborantis post leuem pleuritidem, cui addi potest historia Domine Dupuy, quæ post pleuritidem peripneumonica facta quinto die interit. Nunc autem monendum est de Aphorif. Hippocratis in Coacis, Peripneumonia ex pleuritide transmutata securiores sunt iis quæ ab initio fiunt. Quod minùs verum videtur, cum translatio à pleuritide in peripneumoniâ lethalis sit. Nos quosdam breuè interiisse vidimus, quibus peripneumonia pleuritidi successisset, præsertim in quibus constaret pulmones imbecilles fuisse. At absolutè peripneumonia pleuritide secuta, non videtur secuta, immo funesta, tum quòd in partem principis

per raptus fit, tum quod successio ista morborum pessima videatur. Hippocrates enim lib. *πρὸς τὸν Πρωτόκριτον* scripsit, in morbis cum alter alteri succedit, et plerumque interficit. Cum enim corpore à morbo priore debilitato alius morbus successerit, debilitate perit prius quam alius morbus desinat. Quod et notandum. Deinde locus est Galeni comment. in par. ultimam lib. 6. Epid. *αὐτὸς οὐκ αἰετῶς*, quo scribit pleuritidis curationem asserre peripneumoniae. Ait enim *πρὸς τὴν μενιγγομένην ἢ πνεύματι* lib. 7. Contra verò eodem loco ait male succedere si pleuritis in peripneumonia conuertatur, immò funestum esse videtur. Sed hæc omnia per comparationem intelligi debent.

CONSILIVM XXVIII.

De doloribus ad sternum & spinalem medullam.

CARPONÆ Gabrieli dolores atroces ad sternum, spinalem medullam decurrentes ad scoptula operta: ad mammas, ut nec in hanc, nec in illam partem corpus flecteretur. Cum in latus dextrum decumbibat, omnia exasperabantur. Aliquoties eos dolores perceperat, non tamen æquè crudeles ac eos quos circa mensis Nouembris finem ferebat. Nulla tussis erat, aut perexigua. Interdiu alleuatus videbatur. Aliquando nec rectus, nec decumbens præ dolore absque querela erat. Noctu exacerbabatur omnia. Insomnes noctes ducebat: è lecto surgebat impatiens caloris: nulla febris: cibum capiebat. Negotium nobis exhibuit. Nec sectione venæ, nec fotu, nec litibus dolores quiescebant. Pus congestum suspicabamur, admoniti oraculo Hippocratis, *Qui dolores pectoris nec purgatione, nec sectione venæ sedantur, eos necesse est in suppuratum verti.* Tamen hæc ratio in contrarium adducebat, quod nullâ tussi vexaretur quæ alioqui molesta esset si quid puris in capacitate aut membranis contineretur. Necesse enim esset refudare aliquid tenue, & horrores adesse si aliquid tale contigisset. Si vitium in pulmone esset, aut tuberculum aliquod contineretur, aut pus, aut aliquid aliud simile. Nulla inflammatio est, cum nulla febris. Tuberculum si esset, inspirandi & expirandi difficultate teneretur: nulla est. Ut summa fiat nullus adest tumor qui se aliquo signo proferat: nec si adesset, ij propterea dolores oborirentur, cum pulmones sint *αὐτὸν αἰετῶς*. Ergo in membranæ & circum membranas vitium

existit: aut in periostio. Quod consequi oportuit nos & ratione & experientiâ. Itaque cum quid hîc sequeremur, non esset in numero, sciscitatus sumus nunquidnam litus aliquando iis fieri solitos qui in magnis ponunt, & nobilitatis insigne existimant semel lue gallicâ aut hispanicâ potius laborare: si modò laborem id existimare oportet quod summæ voluptati comes esse solet. Respondit subuerecundè obortis aliquando phymatis ^{αἰσχροῦ} oblitum fuisse hydrargyro. Et ad rem, quoniam rediuiui sæpè dolores solent renasci, aut saltem aliis affectionibus occasionem, dare. Præscripsimus abstinentioniam vini. Litus ex anodynâ & discutientibus, decoctum sarsaparillæ, tum vt in lecto sudaret, tum loco vini in pastu vteretur, sed dilutiore. Exactis decem aut duodecim diebus cum accurata satis victus ratione, dolores eiusmodi maximam partem sunt leniti: sed circum sternum vestigium semper aliquod remansit. Quod autem superius hæc exposita volumus, eo præsertim consilio factum est, vt cum querelas ægotantium audimus de morbis intercutaneis nobis exprobrantium, quod nihil aut parum leuati videntur quantumuis arte & cōsilio comparatis remediis, recurramus ad ^{θεῖον} id est ad occultum aliquod: non quod à cœlo repetamus, vt plerique solent, sed ad internas occultasque causas reuocamus. Nam quotiescumque de fugacibus morbis aut doloribus potius conqueruntur ægri, aut de fixis circum ^{περιέστροφ} suspicari oportet aut latens venenum, aut reliquias alicuius luis venereæ: siue id ab hydrargyri, siue à morbi ipsius maligna vi ortum dicatur. Ne temerè similitudinibus decepti malè exerceamus ægros, sumptibus minimè necessariis oneremus. Id non in hoc solum ægro contigit videre, sed & in aliis quos sæui admodum dolores sursum deorsum, in omnemque partem errantes exercebant.

CONSILIVM XXIX.

De Febre quartana cum acerbissimo capitis dolore & lienis affectu.

QUARTANARIUS habitu satis laudabili cum ad regionem lienis murmur quoddam sentiret, & tempore accessionis acerbissimo

acerbissimo capitis dolore cruciaretur: leniendo suo atroci dolori à Medicis consultum voluit. Signis syllogisticis conclusum est à flatu cum dolorem principia maximè causasque ducere. Quo fit vt fugax esset, crudelissimus tum ob membranarum diuulsionem. Atque vt vna eademque opera, & causæ, & symptomati, sed huic maximè occurreretur, his quæ sequuntur remediis tentatum est, vt aliqua ex parte dolor pelleretur. Horum ista est forma.

℞ bdellij in aqua vine soluti ℥ j. puluer. ceterach & coral. an. ℥ j. aloes ℥ iij. cum syrupo de pomis. formentur pilule: capiat ℥ ij. ante pastum die intermissionis.

℞ rad. bryonis ℥ iij. macerentur in aceto, passentur: passature adde puluer. ceterach & ruta an. ℥ vj. oxymel. simpl. ℥ s. cum ol. de capparib. Fiet Emplastr. pro lunc.

℞ diamargar. frigid. ℥ j. puluer. ceterach scrup. ij. coral ℥ j. cum sacchar. in aq. buglos. solutio. fiant tabellæ.

℞ far. orobi, hordei & fabar. an. ℥ iij. cum oxymelite: fiet pulis pro capite. sæpe oxorrhodinum fronti & temporibus illitum est.

In acerbissimo capitis dolore, qui de nocte præsertim repetet cum febricula, & frigidis quibusdam sudoribus, decoctum est hoc præscriptum.

℞ medulla gaiaci ℥ iij. aquæ lib. viij. semin. pæonia, cardui, an. ℥ s. beton. scariolæ, an. m. j. fiat decoct. ad lb. ij. In colat. dissol. mellis ros. ℥ ij. bulliant ad despumationem pro tribus dosibus ad lib. j. s. capiat hora somni triuo singulas doses.

Et reuerà vsu talis remedij leniùs habuit. Rursus ad hoc idem institutum.

℞ ros. rubr. saluie, yue arthris, primula veris, pulegij an. p. ij. flor. chamem. summit. anethi, melilot. rorismar. an. p. j. yperi. ireos florent. an. ℥ ij. sem. lini ℥ x. cumini, dauci an ℥ j. fiant sacculi pro frictione capitis.

CONSILIVM XXX.

Ad vermes, & alui fluorem cæliacum & dysentericum.

IVDITH de Mesmes puella annos 4 nata, toto autumnali tempore & hyemali ex interuallis sentiebat tormina, & dolorem ad anum qua parte definit rectum intestinum. Deiectiones

Tom. I.

K

aliquando liquidæ erant, aliquando chylosæ, aliquando compactæ, sed quæ nonnihil crudi in se haberent. Qui dolores oboriebantur, fugaces erant, nec magnam molestiam afferebant. Ter aut quater terruit de repente nata leipothymia. Initum consiliū est, cuius hæc summa est; Deiectiones referunt ideam partium à quibus manant, & per quas feruntur, ac generali modo omnia excrementa. Cū alius ē natura habet, figuratæ sunt, constantes, eādē horā excernuntur quā prius excerni debent: item nec in quātitate, nec in qualitate, nec in excretionis modo peccatur. Si quid in aliquo horum peccatur, hoc arguit omnia secundū naturam non habere. Vnde mutatio excrementorum olim inter symptomata haberi solita est. Ac necesse est vel morbum esse, vel affectionem quæ proximē in morbum fit degeneratura. Affectio illa œconomiam naturalem non bene affectam significat; quod vel in partium ipsarum nutritioni ac coctioni dicatarum vitio positum est, vel in extrinsecus adueniente aliquo quod eiusmodi officium immutet & interturbet. Puella hæc coeliaca excreuit, cruda, liquida, foetida admodum; dysenterica quoque ipsa, cum teneismo, torminibus fugacibus: raptus est aliquādo chylus, aut simile quippiam cum excrementis. Omnis morbus aut corporis conditionem, aut temporis constitutionem, aut vtrumque potius sequitur: sic enim constituunt τὸ πικτικὸν καὶ τὸ ἐπιδερμικόν. Quod cū aliās tum in hac puella observari potest. Sensit illud verum quod scriptum ab Hippocrate 2. Epid. *Autumno ascarides*: Et illud, *Autumno ferinum*. 2. Nam incunte Autumno ascaridibus diuexata est. Non superiora vermes affectarunt quod observari potuit: non χλωροσμία λαμψρον Hippoc. 6. ἐπιδερμικόν. decussum est, non oculorum flos: non pruritus narium: non leipothymia: quæ symptomata contingere tunc solent: sed in imis maximē partibus exercebant symptomata. Præterea viui & mortui excreti sunt. Corpus humidius, mollitie diffuens, vliginosum, tum à natura, tum à vitæ instituto. Nam pueri etsi naturā humidi, & ab ea humiditate aliquot incommoda & commoda nanciscuntur, tamen ab excrementitia humiditate humidiores redduntur, tum quia ingluviei se dedunt, tum quia non bene exercentur; habent enim animales facultates infirmas, naturales validas Galeno: vnde calor nō habet suam ἐν δόμῳ 6 Epidem. hinc prouentus excrementorum, hinc in canis hepatis obstructio, ab hac putredo, ab

hac vermes, & alia. Et notandum non semper vermes generari. Nam si sepultus sit admodum calor, nec emicet, & ingens humorum copia sit, non generantur vermes. 2. Siquidem validus calor requiritur, & maximè putris, vt multiplici sobole materia illa in vermes animetur. Quæritur an à ventriculi vitio, an à capite? Coquit benè, nec affecti ventriculi per se magna eduntur signa. Et si yligo sola esset, quæ ex sententia Oribasij replens laeuigansque spiras & rugas ventriculi vt inde non adhærens alimentum præterfluat, non ita fieret de nocte, nec frequenter, nec tam putria graucolentiæque subducerentur: Ergo credibile à cerebro fluxum quemdam fieri qui misso ichore quodam officium ventriculi interturbet, & aluum citet. Non bene mungit, caput habet latum, & latius quàm pro ratione corporis. De nocte maximè aluus fluit, quod à cerebro esse arguit. Pueri maximam partem caput oppletum habent: vnde veteres eam ob causam illis vinum interdicebant, hyeme incœnatos cubitum mittebant, & eos per suturas, per palatum, per cutim, per nares passim expurgari videmus: immò per aures; quamquam neget in Aphorif. Galenus eas cõparatas ad expurgationẽ cerebri, exceptis (ait) pueris. 3. Præter fluxum illũ cerebralẽ copia quoq; humorum lentorum & tempore corruptorum hoc efficit: nam humidus calor illis tanquam lignorum strue obruitur & strangulatur. Nisi dicas quò humidius corpus, eò melius. Galen. 3. de symptom. causis, & pueros facultates naturales habere robustissimas. Quò humidius naturali humore, eò melius: & facultates naturales ad agendum habent robustas, sed non ad patiendum & resistendum. Sic minimã occasione præhenduntur fluxu cœliaco, diarrhœico, non ita dysenterico, quia muccore madent intestina. Quicquid sit, ea euitari possunt dietã siccante. Quamquam 1. sanit. tuendæ Galenus vetet ne exiccentur pueri, quia incrementò prohibentur; (intelligens maximè de humore primigenio.) Videndum ne dumprodesse volumus, non obsumus. Si sola yligo esset, & cruditas, corrigeretur coctione & alimenti detractiõne: sed præterea est corruptela ergo corrigenda, & humor tollendus. Eãdem operã detergendum, vacuandum, oppugnandi vermes.

℞ semin. contra ʒ j. passul. glycyrr. confer. viol. an. ʒ ij. absynthij roman. p. s. fiat decoct. in qua infund. rhei ʒ j. corah. ʒ. v. In express. dissol. eiusdem rheub. ʒ B. fiat potus.

K ij

De ver-
mibus
lib. 4. de
morbis.
loc. præ-
clarus,
qui pri-
ma frõte
falsus vi-
detur, sed
notan-
dus est.

76 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Item ꝯ carabes ꝯ j. rasur. ebor. cornu cerui, margar. elect. an. ꝯ j. cinnam. gr. 4. cum saccharo in aq. portul. dissoluto, & ꝯ s. pulu. contra fiant tabell.

Item ꝯ ligni aloes 3 ij. nigell. rom. 3 s. pro suffiendis operimentis capitis.

Vehementiora paulò sunt hæc quæ sequuntur remedia.

ꝯ semin. contra ver. 3 ij. pulu. ras. ebor. cornu cerui an. 3 j. semin. portulac. scr. iij. fiat puluis, misce cum eo quod sequitur.

ꝯ theriac. 3 ij. conseru. rosar. 3 j. omnibus mixtis fiat in modum opiata: vtatur quolibet mane.

ꝯ lupinorum 3 ij. medulla colocynthidos 3 j. absynth. vulg. 3 j. s. aloes 3 j. theriaces 3 ij. cum pauca terebinth. fiat in modum ceroti, & imo ventri applicetur.

ꝯ syrup. de absynth. ol. amygdal. dulc. an. 3 j. absynth. menth. puleg. succorum. an. 3 j. s. radic. dictamni, tormentill. zedoar. an. ꝯ j. cum pauca cera fiat linimentum pro ventre.

ꝯ pulu. barbotina 3 j. detur cum lacte.

ꝯ decoct. clyster. lib. s. in qua bulliant chamæm. & sem. fænic. an. 3 ij. In colatura dissol. benedict. laxat. 3 ij. confect. de baccis 3 j. s. ol. anethi & ruta an. 3 j. In torminibus à vermibus.

ꝯ osus de cord. cerui, margar. elect. an. scrup. j. rasur. ebor. karab. an. ꝯ s. rheub. ꝯ ij. cinnam. gr. ij. cum sacchar. in aq. absynth. dissol. fiant tabella pond. 3 j. s. capiat duabus horis ante pastum.

Item ꝯ absynth. m. j. bull. in aqua & vino pro solu sedis. Abstineat cœnà ne tantopere cerebrum oppleatur vaporibus. Pane filigineo & autopyro vtatur, non albo (vt vocant) quoniam obstruit nimium. Vtatur sæpè rhubarb. condito. Prouidentum capiti, quoniam in illa augeri potest plethoricis symptomatis. Et in eius sororis defunctæ annos iij nata cum conuulsionibus prehensa fuisset, in cerebri ventriculis magna aquæ citrinæ copia inuenta est. Sed his non sunt terrendi parentes 1572. Cal. Ianuar.

ANNOTATIO.

1. Notat Mesuæus vermes aliquando generari ab obstructione cysteæ cholidochi, quia enim non interstuit humor biliosus purgandis intestinis accommodatus, idè succrescit pituita multa quæ in vermes animatur. vide cap. de cura vermium.

2. Quod tamen dubium esse possit. nam calor consumit materiam, ergo eorum vermium occasionem tollit. Item effundit humorem biliosum in

intestina, hinc vermium internecio. Immo scribit Mesuensis saepe consi-
gisse in febris tum ratione caloris, tum ratione bilis effusa vermes pa-
bulum querendo, ita locum in quo nati erant & conseruabantur, perfodis-
se, ut partem ipsam perforarint.

3. Lib. de affectionibus flutorum diuturnorum alui, causam à cerebro
repetit.

CONSILIVM XXXI.

Ad Iliacam passionem.

IACOBVS Berthier post longas corporis agitationes, & co-
natus, & vsum rerum flatulentarum, in colicum dolorem, ut
putabant, incidit. Sed iliaca passio erat. Aut saltem à tormini-
bus cruciatibusque conturbata, conuoluta que sursum deorsum
intestina, tandem id mali intulerunt. Circa inguem apparuit
tumor: intestini prolapsus erat. Semel eum tantum prolapsum
passus fuerat. Tamen principio non putabant intestinum esse
prololutum, sed tumorem testiculi. Quod ne cui mirum videat-
ur, sciendum in eo conformando naturam sui oblitam fuisse.
Nam testiculus neuter in scroto erat: sed yterque intus conclu-
sus erat: vnus quidem apparebat tactui soli, & circa pectinem
locatus erat, alter delitescibat planè. Sic tumorem tantum te-
sticuli circum pectinem suspicabantur. At aliter res erat: & fre-
quentes vomitiones, & suppressa omnino alui prolapsionem
intestini indicabant. Dolor erat magnus circum vmbilicum,
quà situs est ileon. Pars fomentis & femicupis non est remol-
lita: sed eorum vfu an contigerit nescio: intra triduum totus pe-
cten inflammatus est, & aliquid acuminatum apparuit, ex quo
pus saniosum & foetidissimum excretum est. Dubitabant an id
ab intestino rupto nasceretur. Et magna rupti intestini erat su-
spicio. Quicquid sit, deuolutum erat intestinum è sua sede,
quod tumor ad pectinem indicabat. Clysteribus tentata al-
uius, nil reddidit: longioribus balanis sollicitata, reddidit. Quæ
materia rupto exiguo tumore excreta est, ea graueolebat ad-
modum: hinc faculentæ materiæ magna fuit suspicio. Tamen
speculo res explorata est, nec incisum intestinum compertum
est. Febris perseverauit: dolores frequentes, spuitiones, vom-

tus, sed non ita frequentes vt in alijs obseruauimus, sudores; defectiones animi. Sexto die totus pecten inflammatus magis, erysipelatodis, mors denique nono die. Aperto cadauere, imus venter quasi syderatus apparuit. prolapsus ileon. Insanabilis erat morbus. Iliacâ passione laborantes, alij celerius, alij tardius moriuntur. Quibus ab inflammatione malum ortum, intra quatuor dies moriuntur; vt Dominae illustri de Mandoscâ contigit, quâ intra quatuor dies periit. 1. Quidam sunt in ea opinione vt existiment nullum voluulum in quo frequentes sunt vomitiones, sanabilem esse: sed errant. Nam primo quoque tempore vitatur motus intestinorum peristalticus, quo vitato vomitus & subuersiones stomachi contingunt. Item volunt in inflammatione statim gangrânam consequi, quod falsum est. Nam hinc persuadentur quod leipothymiam frequentem adesse videant: at non est necesse inde inferre à gangrâna id consequi: siquidem facîle communicatur id vitij ventriculo ob viciniam. Et teter vapor eorû quâ excernuntur facîle leipothymiam adducere potest. Ceterum inflammatio, scirrhus, siue durus tumor, abscessus, voluuli causâ solâ videntur Galeno *Comment. in Aphor. 44. lib. 6.* At obstructionem à sicco stercore vult ileon inferre posse: at illi non videtur probabile vt crassi & leni humores tantam obstructionem faciant, vt præpediatur exitus stercoribus; quod tamen omnes verum esse volunt. Nos prolapsus intestini id mali attulisse sæpè obseruauimus. *Meisæus cap. de intestinorum morbis*, vult colicam ac iliacam passionem sæpè eodem modo fieri; dum scilicet materia collecta est in monoculo: ac dum agitur nec excernitur, augentur dolores, hinc colica aut iliaca passio. Immò, ait, clyster quia non peruenit secundum substantiam ad superiora intestina, sed secundum vim tantum, agit tantum materiam in superioribus intestinis contentam, sed non excernit, vnde grandi conatu naturæ quia per inferiora materia secedere non potest, & stercus & clyster per os reiicitur. Sed nunquid à crassis & frigidis humoribus iliaca passio nasci potest? Non videtur Galeno, vt dictum est; idèò non vult admittere illum Aphorismum Hippocratis germanum esse, *Quibus ex stillicidio vrina ileos superuenit, septem diebus pereunt, nisi febre superueniente multa vrina profluxerit.* 2. Nam si quâ materia committit stranguriam eadem, ileon committat cogetur fateri Iliacam passionem à pituita salâ

aut cruda nasci posse quæ eadem & ad renes translata commit-
tat stranguriam, & reuocata in intestinum iliacam passionem.
Faretur ignorare se quid hic velit Aphorismus, ac narrat falsas
veterum in illius Aphorismi interpretatione opiniones. Tamen
quasi reuocans calculum, dubitans tamen censet frigidam ma-
teriam ileon committere posse quæ discutiatur successu febris.
Fuchsius illum Aphorismum interpretandum audentiùs quàm
Pergamenus aggreditur. Primùm præpositionem *et* accipit pro
quasi; quasi dicat Hippocrates vt ileus superueniat stranguriæ à
crassis frigidisque humoribus natæ. Quod autem intra septem
dies moriantur, id ait fieri propter dolorem vtriusque partis &
renis & intestini, qui dolor vires admodum deiiciat. Et absur-
dè admodum diuellit verba Hippocratis, dum ait illud, *Febris si
superuenerit*, ita debere intelligi, vt loco ilei qui prius superuenit
stranguriæ, febris succedat, ac ileus abeat: quasi nolit Hip-
ocrates vnà cum ileo febrè adesse. Nam Hippocrates vult ileon
quidem stranguriæ successisse, sed vult simul esse & febrem &
ileon. Quidam fortassè putarent fieri posse ac verisimilè esse
vt ei stranguria & ileos adsit, & febrem impedire quo minùs in-
tra septem dies illi affectus perimant. Nam febris alterutrum
soluit malum: & sic solutus ager vno alacrior est aliquantò. Et
illa febris non debet esse symptomatica ilei ab inflammatione
nati, vt volebant veteres, sed succedere debet humorum aut
spirituum potiùs inflammationi. Sed posterior hæc ratio de
præsentia duorum malorum simul stranguriæ & ilei non vide-
tur plausibilis. Sed sententia Hippocratis vt non est temerè pro-
nunciata, ita veritati maximè consona videtur. Fieri enim ma-
ximè potest vt sit illicidium vrinæ cōtingat à raptu pituitæ falsæ,
acidæve ad renes. Quæ si fortè, vt ferè fit, vt morborum suc-
cessionibus in intestina regeratur, aut in iisdem resistat, paulò
vegetiore calore in status conuersa dolores vix tolerabiles ex-
turbabit. Hinc in gyrum intestinum conuoluitur, dissoluitur, in-
tumesceat. Et ab acerbitate doloris ileos reiectio omnium hu-
morum per os vitato motu peristaltico. At quoniam febris, si
modò sit analogos materiam mitificat, paralyses, tetanósque
soluit, potest quoque materiam in intestinis contentam coque-
re, mitificare; hinc ilei leuatio. Ac ea interpretatio non videtur
à veritate abhorrere. At ex iis colligere licet in iliacis passio-
nibus aliquando frigida maxime ex vfu esse & balnea: aliquandò

80 CONSILIORVM MEDICINALIVM

obesse plurimum, prodesse verò calida. Nam cum inflammatio est, non est dubium quin illa conueniant: si humores frigidi, lenti, pituitosi, calida conueniunt: 3. & si febris immineat, non est prohibenda.

Porro in nephriticis doloribus aliquid fixum est ac immobile ad alterutrus renis situm. In colica dolor est vagus, subuertens ventriculum: in ileo fixus est circum vmbilicum quæ situm est intestinum ileon. grauius est extensus, pungens. Sed pungens maximè est à vermibus. Annorat enim Mesuæus iliacam passionem à vermibus excitari, dum illi scilicet loco fixi sunt, ac pungunt, cuniculos agunt, immò perforant intestinum. Ac duo notare oportet scitu ac obseruatione dignissima. Prius est: Quæ fieri possit vt in iliaca passione stercus meracum excernatur: quod Galenus tantum morituris contingere ait. Nam si voluulus passio est intestinorum superiorum, non situ, sed generatione & ortu, & in illis tantum chylus ac cremor sit, secretio autem 4. in cæco demum fiat: præpedita via in intestinis superioribus quomodo ab inferioribus crassioribus intestinis stercus ascendat, ac præsertim morituris, cum iam vires fatiscunt. Quæstio hæc ardua est. Alterum est quod nos obseruauimus, & à Mesuæo diligenter obseruatum legimus, nempe iis qui à voluulo releuantur succedere incredibiles affectiones: Contingit, inquit, paralysis, materia ad neruos translatâ. Nam in ista affectione intra septem dies ratione astrictæ alui, & motus excrementi sursum inficiuntur spiritus, & humores qualitate inexplicabili: aliis vitiatos simili modo hepate hydrops. Melancholia tremor, scæcor, anhelitus, sudores frigidi, syncope, sitis inexhausta. 5. Vidimus mulierem quæ cum voluulo laborasset, eo liberata in hydropem incidit: hinc tabida interiit. Aliâ vidimus quæ cum sudores frigidos, extremitatû frigus per decem aut duodecim dies, etiam cessante ileo habuisset, scæcoris oris ingentem, & pudendorum ex quibus sanies graueolens resudabat. Inde fluxit aluus, repurgata ter aut quater sine vllò grauiore symptomate, aut morbo potius nunc bibens ludensque vivit.

ANNOTATIO.

Eorum opinio roborari potest sententiâ Galeni. Hic enim Comment

in Aphorism. 10. lib. 7. scribit vomitum non semper adesse in ileis, sed quando exitiales sunt. Ac si dicat vomitum superuenientem mortem significare. Ego tamen vidi quibus adesset vomitus, & liberati sunt: immo facillimè omnium succedit vomitus; ut cum prolapsum est intestinum in scrotum, statim vomitus adest. Nisi quis dicat vomitus in prolapsu intestini faciente iliace passionem non ita lethales esse, ut sunt in aliis speciebus iliace passionis, Quod credibile est: Aut per vomitus, eos presertim intelligit qui cum feculenta materia, aut cum chylosa fiunt. Nam simplices vomitus non ita mali sunt, nisi frequentes admodum sint.

2. D. Magnam Medicus & Professor Regius in Mathematicis voluulo interit impetu magno pituita multâ in intestina prolapsâ ibique collectâ & putrefactâ: unde abscessus factus, hinc morbus.

3. Febris non est tollenda aliquando in voluulo: contra faciunt Medici.

4. Nam colon tenuibus intestinis est superius. Sic mirum cur voluulus sit tantum affectus tenuium intestinorum, ut placet Galeno comment. in Aphorism. lib. 6. cum observatum sit rectum intestinum voluuli aliquando causam esse, aut saltem malum in eo esse. Vnde hist. 9. sect. 2. lib. 3. Epid. meminit crassorum intestinorum etiam voluulum esse affectum.

5. Libro de affectionibus. Hippocratis locus est valdè notandus de cura voluuli. Nam cum non admittuntur clysteres, vult fistulam ad vtriculi extremitatem, applicari, & ita intestina inflari post dari clysteres. Quod fortè non negligendum in tam periculoso morbo. Porro nota apud eundem Hippocratem, eodem libro, ni fallor, triplicem esse voluulum, vnum hyemalem, alterum ictericum, siue aestiuum, tertium hematiitien, siue autumnalem. Obseruat dominus Magnus in voluulosis affectionibus nil melius esse quàm dare Confectionem Hieræ, hæc enim subuersiones ventriculi sedat. Item induratas feces aliquando emollit & è recto intestino extrahit. Itè iniectionem per longissimam fistulam conferre ex oleo de semine lini.

CONSILIVM XXXII.

Pro Calculosis.

NVLIVS hodiè æquè genus humanum vexat morbus, ac calculus. Morbum appello, etsi nonnullis id nominis non placeat, quòd actio, nempe mictio impediatur à re præter naturam.

Tom. I.

L

turam in capacitate contenta, quam tamen alij rei natura destinauit quàm calculo continendo. Quod qua ratione fiat, cōmēratione dignissimum est. Alij vsum lacticiniorum & casei, & rerum viscidarum accusant: alij limosas aquas & paludosas. Sit ita herclē. Qui lacticiniis viscidis, crassisque alimentis vtuntur, aut qui limosis aquis, ij maximā partem calculosi sunt; non tamen generales has solas causas statuere oportet.

1. Duæ mihi videntur rationes probabiliores, propter quas tam longè latēque pateat hic morbus, vt aut nulli, aut oppidò pauci ab arenulis, aut calculo, aut concretionē aliqua immunes existant. Prima videtur ingluuiēs, & ea præsertim cū alimētorum varietate qua homines mirum in modum delectantur: secunda, ius hæreditarium; nam ex calculosis ferè calculosi generantur: Terriam adiicio facilem generationem calculi, aut top̄hi, aut arenularū, & præsertim in corporibus mollioribus & delicatis, & imbecillis, cuiusmodi sunt nostra corpora si ea cū priscis conferas. Quod enim tam facilis generatio sit, ex eo patet, quòd nulla non in parte corporis calculus aut top̄us generari possit: vnde plerisque in folliculo fellis, aliis in pulmonibus, aliis in capite, aliis in vtero, aliis in corde, aliis in intestinis generatur, vt in nostris hypomnimeumatis abundè recensuimus. Accedit quod ex variis humoribus generari possint, vt postea abundè ex veterum sententiā apparebit. Vnde iubeatur valere eorum opinio & dogma, qui ex sola pituita calculos con crescere voluerunt: vnde pingues & obesos calculo obnoxios præ ceteris voluerunt. Quod falsissimum est. Ac ingluuiem præsertim quæ varietate ciborum adiuuatur, calculorum parentem esse nemo non potest fateri, qui nouerit ingluuiem & gulæ causam esse multiplicis cruditis; vnde natum illud, *Intemperantia Medicorum mater*. Varietas autem propter diuersas variasque facultates naturæ quæ omnia ad vnum æquale & vniufmodi redigere conatur, plurimū in coquendo, alterando, segregandoque similia à dissimilibus negotij faceffit. Quod primus annotauit Hippocrates, qui in lib. i. de Diætā morborum acutorum inter præcipuas dotes quas ptisana attribuit, recenset eam, quòd ptisana nullum tumultum stomacho afferat. Verba græca sunt, *ὅτι τὸ ὑγρὸν καὶ τὸν πόντον*. Galenus non abs re Hippocratem addidisse ait *καὶ τὸν*, nec simpliciter *ὑγρὸν* dixit, quòd nihil sit quod æquē coctioni officiat ac varietas, quæ vni cibo inest, aut quæ in

variis cibis. 2. Nōne *ἀεὶ* duobus tantum locis apud Hippocr. legitur, vno lib. 4 de Diætā acutorum, cum de glande mentionem iniicit. Glans (inquit) tumultum affert. In Commentario Galenus tumultum excitari ait, cum alimenta ingesta variis facultatibus prædita sunt, & dum vnum facilius coquitur, alterum ægrius: immò dum in eodem alimento & substantia media, & externa, non sunt analogæ: vt de glande & brassica Galenus docet comment. in particul. 18. lib. 1 de Diætā acutor. Locus alter est is de quo superius dictum lib. 1. de Diætā, cum de ptisanaloquitur. Atque vt res in angustum reuocetur, legenda maior pars commentarij in eum locum. Nam adducto exemplo athletarum, & eorum qui probè educantur & nutriuntur, docet quantoperè noceat varietas ciborum, varietas facultatum, vel etiam in vno & eodem edulio. Nam cum vna mordet, alia soluit, alia inflat, non dubium est quin chyloscos officina perturbetur, & naturæ plurimum negotij afferatur; quæ cum vniuersi modi sit in officiali parte, ventriculo nempe existens, non facile subiget tam varia quæ ingeruntur. Hinc eò loci Galenus ait solitos athletas in arenam descendere volentes, 3 solo pane vti manè, solis carnibus vespere. Ac eum tumultum à ciborum varietate afferri solere obseruauit Horatius in Satyris.

Accipe nunc, victus tenuis quæ, quantaque secum

Afferat in primis valeas bene. Nam varia res

Vt noceant homini credas: memor illius esca,

Quæ simplex olim tibi sederit. Ac simul aspis

Miscueris elixa, simul conchylia turdis,

Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum.

Lenta feret pituita.

4. Itaque iis & escarum habendus delectus, & fugienda varietas quibus sanitas studio est. Ac hæreditario iure calculum vt & alios morbos ad posteros peruenire posse vulgò constat. Nam semini impressa sæpe vis est, quæ vt valet ad speciem, genus, & ideam retinendam, & ad prolem deuchendam; ita latente impetu morbosam *ἀλγιστήν* transfundit, traducitque. Hinc ex macrocephalis macrocephalus Hippocrates obdeciduum ab omnibus partibus semen gigni assueuerat.

Sed his positis, in rei propositæ arcem libentiùs inuadamus. Dicendum quæ lapidis materia, quæ efficiens causa, qui ei obnoxij, quæ præcautio. Tandem nonnulla ex eis quæ vulgò vsur-

pantur remedia afferentur. In assignanda materia multi varia, multaque censuerunt. Ac primum, nomine calculi peculiariter intelligimus eum, qui aut in vesica, aut in alterutro rene generatur. Qui enim in aliis partibus corporis humani tanquam foedinis conglomerantur, cogunturque, ad præsens institutum nil pertinent. Quidam lapidis nomine eum qui in vesica continetur intelligi volunt, quod sæpe grandiusculus sit: calculi autem, eum qui in renibus cogitur. Sed quoniam *λιδίτις*, & calculosos vertit Celsus, & lapidosos, curiosa hæc de nominibus quaestio valere iubeatur.

Calculorum materiam quidam volunt esse aliquod purulentum, & pituitam quandam putrem. Hollerius annotat observasse in quodam Præside Rhotomagæo pituitam putrem, & pus crassum falso calculum retulisse. Antequam aliorum opiniones recenseamus, expendere licet an pus, aut materia purulenta in lapidem cogi possit. Nam quod pus in vesicam illapsum, aut in eadem concretum non referat calculum, nemo dubitat: quicquid enim aliquâ ratione angustos canales, per quos urina præterfluit, obstruere, obturareque potest, id calculum non eripere potest. Sed quaestio est, num pus in vesica calculus efficiatur. Nonnullis non videtur: Galeno id fieri posse videtur. Illorum rationem huc referemus, ne indictâ causâ illos arguamus, quamquâ à Galeni partibus stare consilium est.

Primum ita ratiocinantur: Sanguis, saniesve dum putredinem concipit ut in pus vertatur, putredine fibras amittit: at fibrarum ope concretio fit: nam damarum sanguis non concrevit, quod fibrarum expers sit. Ergo pus in calculum cogi non poterit. Deinde, illud observari solet in abscessibus renum: Purulenta materia quæ à renibus abscessu tentatis excernitur, toti permiscetur tota urina: & si in imo urinae residis subsideat, parvâ agitatione rursus toti urinae remiscetur. Quod arguit pus corpulentum solidumque nil esse, sed aliquid diuulsum: Ergo in calculum non cogitur. Contrâ verò apparet in semine & pituita. Nam utrumque ut fibrarum particeps cohæret, partesque unitas habet. Unde aut tanquam separatim aliquid urinae supereminet, aut in fundo residet: ne ratione sui lentoris & partium cohærentium ita miscetur urinae toti, licet moveatur: sed suam cohærentiam conservant. Atque ita conficere se putant ex præsentibus rationibus, pus in calculum concrevire non posse. Adducuntur.

tamen victi ratione & autoritate Galeni, vt credant calculi rudimentum pure induci, incrustarique posse. Sed id subterfugere est, non rationibus & autoritati subscribere. Nam quantumuis obducatur calculi rudimentum pure, si quia fibrarum expers est non agitur, adaugeturque, nihilo maior calculus inde futurus est, quam si aqua allueretur. Pus enim iis autoribus non conerescit. Sed antequam eorum rationes conuellamus, Galenus audiatur. Verba eius sunt: *In animalis corpore ex purulento humore, aut ex purulento pituitosoque composito tophus nonnunquam creati possunt: quemadmodum & in articularum morbis accidere consuevit. Eodem enim prorsus modo in his & renum affectibus lapides concrescunt.*

Com. in
part. 6.
sect. 1
lib. 6.
Epid.

Ad primam autem rationem quâ contendunt illi neoterici ideo pus in calculum cogi non posse, quod humores per putredinem fibras amittant: at fibrarum ratione concretio fit, ita respondere consilium est. Aliud est aliquid corrumpi, aliud in pus abire. Nam in corruptione partium fit alienatio, & materia tota præter naturam est, & causa efficiens tota quoque præter naturam. Partium quoque fit diremptus, & per eam partium diremptionem fibrarum dissolutio fit: hinc nulla cohesio, hinc dissolutio continuitatis. At cum ex materia laudabili, intraque naturæ limites contenta, pus fit, etsi pus illud naturæ non cedit in alimoniam: satis tamen est si aliquam eius gratiam recipiat. Hoc autem fieri dicitur si aliquid sit vniuersimodi, si albor adsit, si laeior, si nil grumosum, nil inæquale. Idem enim opifex versatur circa pus, & circa alimentum: hoc differunt, quod alimentum cedat in naturam, pus autem excretionem sui præmonet, quod antecedenti, primariæque origine eius materia laudabilis fuerit, sed ex euentu illaudabilis extiterit, quod fortè extra locum sibi destinatum ab aliqua externa causa euocata fuerit. Quod in contusionibus apparet.

Satis autem est si in pure character naturæ imprimatur, vt eas dotes & facultates retineat, quas Hippocrates & Galenus puri laudabili tribuerunt. Cur enim toties Galenus in vlceribus commendat pus album, laeue, æquale, vt æqualitas vim significet caloris naturalis sese in omnes materiæ partes æquabiliter inducentis? laeior materiæ *conueniens*, ingenium interpretor? candor vim partium solidarum, quæ quàm fieri potuit maxime, sibi assimilare annitantur pus? Et cum perfectè id assequi non possent, saltē quem à natura sortitæ sunt partes solidæ candorem,

eum in pus contulerunt. Si per putredinem fibrarum fit deperditio, quomodo sanguis qui putrescit in vasis, aut extra vasa, vertitur in sedimentum (de febribus putridis intelligo) album, læue, & quale? Aut in laudabile pus iisdem dotibus illustre in abscessibus? Immò ex generibus puris aliud videtur contra naturam esse, vt quod in morituris apparet, liuidum est, subuiride, fœtens, diuulsum, inæquale, non læue: In iis qui è natura habet contrariis omnibus dotibus præditum est. Quinetiam licet materia diuulsa fuerit, virtute partium solidarum vnitur, laboratur, id quod *inter se* & alienum secernitur. Et cum ex Hippocrate quædam vrinæ sint grumose in morbis, quæ postea tenues fiunt, quid aliud per tenues intelligit, quam pro grumosis confusisque vrinis redditas à natura chymosi, consistentia, & contentis laudabiles: vt pauca sit hypostasis, sed ea alba, læuis, & æqualis? Ergo alienum est ab experientia, & ratione puri adimere cohesionem, & eam tribuere solis pituitæ & semini. Nam & sedimentum & pus laudabile coherent: Immò licet antecedens vtriusque materia serosum tantum fuerit aliquid, & dissolutum, multiplici elaboratione & coctione (quæ omnis in crassandis partibus fit) acquirit fibras, lentioresque, cuius ope crescatur. Et falsum est illud, quod pituitæ tam curiosè tribuitur: nam sepe videas phlegma & misceri toti vrinæ, & postquam resederit remisceri, præsertim cum coctum non fuerit, & nondum gratiam naturæ receperit. 5. Pus autem si à renibus refundatur, non est mirum si misceatur, quia longo viarum anfractu liquore vrinæ dissoluitur ac dirimitur; vnde sepe puris formam non referat. Falsò itaque puri eâ ratione vnionem & coherentiam adimunt vt conficiant in calculum non cogi. Verum enim pus cogitur, quod sensui notissimum. Nam & empyicos sæpe grandinosa spuma extundere à concrecente in grandinem & trophulum pure obseruauerunt: In abscessibus tardiùs ruptis aut naturâ, aut arte, pus ita sepe cogitur, vt iam lapidescere videatur. Nouerint itaque aliud esse corrumpi, aliud putrescere. Per corruptionem vnio, vinculum ac cohesio tollitur, diremptis videlicet partibus: per putredinem aut retinetur cohesio: aut subactis elaboratisque partibus nouarum fibrarum fit acquisitio, vnde nexus & copula consequatur. Ergo ex pure lapides cogi posse intelligentiùs scripsit Galenus. Quod primus annotauit Hippocrates lib. 2. de natura humana. 6. Quibus, in

quit, in locis subsident arenosa, vel iophi, iis per intia circa venam
 crassam tubercula extuere, versaque in pus fuere: ac deinde ipsis
 tuberculis haud celcritur ruptis pus in tophos conuersum est, qui fo-
 ras per venam cum lotio exprimuntur. Tamen quoniam & huius
 orationis idioma Hippocratem non sapit, & libellus ille fal-
 so adscriptus illi est, fit vt nullam vim id loci afferre possit.
 Sed ea in re audiendus Galenus, enarrans illam particulam,
 scribit: Excretiones eiusmodi vinarum arenosarum possunt fieri à
 causa quam statuit Hippocrates: item & rene obstructo citra venam ma-
 gnā. Maxima autem parte sine tuberculis fiunt, cum succus crassus
 vel glutinosus exitum retardans concreuerit à calore loci arefactus.
 Ergo agnouit Galenus arenosas vrinas nasci posse à pure con-
 creto, quanquam non ita frequenter.

Ac materiam lapidis & eò loci quem supra ex lib. de natur.
 humana secundò adduximus: Galenus crassum glutinosum-
 que humorem vias obstruentem præpedientemque consti-
 tuit. Et comment. in particul. 13. lib. eiusdem, apertius multò
 designat, & causam efficientem, & materiam de puerorum
 calore locutus. Pueri multi, quia admodum sunt voraces, cumulant
 succum qui propriè crudus appellatur, à quo facile calculi generantur. Is
 autem humor vt materia rationem habet, ita & calor efficientis causa.
 Ac mirum quomodo Hippocrates, aut quicumque eum li-
 brum scripserit, dicat, Puerulis nascitur lapis ob vesicæ cali-
 ditatem & totius corporis. Viris ob corporis frigiditatem
 haudquaquam generantur.

Multa in eum locum inquiri possunt, quorum explicatio
 ad seriem continuationemque disputationis apprimè perti-
 nebit. Constitutum enim erat de lapidis causa, tum quæ effi-
 ciendi, tum quæ materiæ rationem habeat, disputare: de lo-
 co: de ætatibus, & iis qui magis minúsve obnoxij forent. Pri-
 mū itaque dubitari potest an caliditas & vesicæ, & corpo-
 ris totius ad generationem calculi faciat. Et quoniam Hip-
 pocrates meminit caloris multo humore perfusi, cuiusmodi
 est humidum primum, & calidum primum; an calor puero-
 rum halituosus, ατμός, spirituosus, humidus, blandus, mi-
 nimū mordax minimè ad generationē lapidis pertinebit.
 Nec enim probabile videtur, vt paulò post abundè demon-
 strabimus. Secundò quæri potest, an caliditas vesicæ tanquā
 vnius partis eòdem pertineat, calculūque creet. Nam Ga-

lenus alio loco frigiditatem vesicæ constituere videtur causam generationis lapidis. Tertiò, an viri, quòd frigidi sint calculum non generent? Quarum quæstionum examen & enolutio non minimùm habebit & voluptatis & vtilitatis. Voluptatis quidem, quòd animus noster iis explicatis aliqua ex ratione satiabitur ac explebitur: Vtilitatis verò, & ad præcauendum, & ad curandum, & ad opem miseris mortalibus afferendum. Nam si, vt quidam volunt, immò maior Medicorum pars, calor qui ad generationem lapidis tanquam causa efficax & efficiens concurrat tenuitate partium, & acrimoniâ præditus esse debet, immò veluti febrilis, quod Hippocr. 6. Epidem. *ἡσυχία* absolutè aliquando vocat; vt dum ait, *Qui ventre calido, carnes habent frigidæ*: aliquando *πῦρ*, ob igneam vim, seu potius (vt cum Arculano loquar) igneitatē; cur toties in calculosis affectibus ad oxypora, ad *καυστῆρα*, & calidissima remedia concurrimus; nam causæ efficienti nervos & robur addimus. Atque ita, vt plerumque fit, aberramus. Si calor lapidis autor & parens temperatus est, halituosus, blâdus, naturalis, qualem Hippocrates aut scriptor libelli illius, & cum eo Galenus constituit, cur *ἡσυχία* præscribuntur remperata, dulcia, mucosa, blanda; nam & ea fouent calorem naturalem lapidis auctorem, & materiam reddunt viscidiorē, muccaginosam, lentiorē. In quo plurimùm aberraretur. Accreditibilis ab aliquo acri calore, aut saltem non à nostro blando & naturali concretionem fieri. Nam calorem potentem debere esse, tumque resoluentem satis ex mente Galeni apparet. Illius hæc verba sunt: *Lapis propria passio est purorum, qui ob edacitatem non paucos crudos humores generant, ex quibus pars crassior cum urinis ad vesicam perueniens fit lapidum materia. Accedit altera causa, vehementia caliditatis. Nam & senes acervant crudum non paucum, non ob voracitatem, sed facultatis coëctricis imbecillitatem. Non validū tamen calorem habent, qui crassam materiā resoluens lapidē generet. Vtitur participio ἡσυχία, id est, exiccās, arefaciēs, exhalare faciēs, & tenuē substantiā eliciens ē materia crassa, vt fax tandem remaneat. Ergo & calor validus requiritur, & calor qui resoluendi vim habeat. An verò tali vi præditum est calidum primum & radicale, quòd si fluens est, erit ἀτμός tantum, & ἀπόρροια τῆς σπέρματος οὐσίας: si fixum, partium solidarum ἐπιλείψια. Hic calor quandiu aliquid habet præsto in quo* secur

setur coquendo, secernendo, alterando, non sese ad aliud accingere solet; unde non est credibile calorem blandum & mitem in pueris exercere vires suas in crudis humoribus digerendis, & in lapidem conuertendis. Nam digestio illa, arefactio, resolutio quæ requiritur vt materia crassa lapidescat, soli calori febrili tribuenda est. Et quoties *ἡμεῖς* *de pueris* legitur, videtur de calore acri & febrili intelligi, cui passim Galenus obigneitatem in apoplexiis, terano, morbisque frigidis resoluendi vim, digerendi tribuit, immò & coquendi; quamquam in illo loco vbi legitur de calore febrili quòd concoquat, legitur, frigiditatem concoquendi vim habet, non absolutè, coquendi vim, sed frigiditatem coquendi, id est, corrigendi, mitificandique summam, quæ in crudis succis inest, frigiditatem. Sed hæc pertransennam. Nam si calor naturalis vim habet resoluendi, & in lapidem vertèdi in pueris, cum alioqui sit blandus, humidus, & multo humore obrutus. unde de saepe impeditur Hippocratica illa *ἐκκαρμῆς*; an tanta in senibus frigiditas, vt, cum ob facultatis coquentis imbecillitatem multa congeratur materia cruda, illa non possit obstruere, vias impedire, siccescere, à calore acriore quàm sit in pueris, quantuluscunque is sit, lapidescere? Credibilius est. Unde mirari subit cur autor libri de natura humana scripserit, *uiris calculos non generari ob frigiditatem*. Item Galenus loco superiore, In senibus quidem suppetere materiam generando creandòque lapidi idoneam, sed præ infirmitate caloris non cogi. Nam Galenum contradictionis possumus conuincere: *Asthmata in senibus ex destillationibus ortum habent, cum & respirandi instrumenta sæpe habeant, proprium sui algoris principium, quando & in ipsis multa & crasse superfluitates generantur: Et præterea præsentia virium imbecillitate renes obstruuntur, & lapides generantur; cum tenax & crassa superfluitas in similem callo substantiam transuerit.* Antequam doceam contradictionem Galeni, de serie contextus dicam, istam periodon, *καὶ μετὰ τὴν διὰ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν*. non solo cum Leonicensio cum sequentibus connectere in eo sensu, Et præsentia imbecillitate virium renes obstruuntur, & lapides generantur: sed totam periodon refero ad disputationem de asthma, quam peculiariter Galenus explicat; siquidem Hippocrates in suo contextu non meminit vllius obstructionis renum in senibus. Quasi dicat Galenus, imbecillitatem

Tom. I.

M

90 CONSILIORVM MEDICINALIVM

virium vnam ex causis esse quæ asthmaticos senes reddunt. Nam sequens periodus tota sibi cohaeret in textu græco sine vno puncto, nec colo, nec inciso, vt malè fit in textu latino: *ἡ ἀσθμία τοῖς ἀσθενέσι καὶ τοῖς γήραιοις καὶ τοῖς ἀσθματικέσι καὶ τοῖς ἀσθενέσι καὶ τοῖς γήραιοις*, &c. Obstruuntur autem renes sæpè, & lapides generant. Non autem legendum cum Leonice-
no, imbecillitate virium præsentè renes obstruuntur: lapides autem generantur quando, &c. Nam hoc scriptoris est nec Galenum intelligentis, nec verba græca an benè malè cohaerant scientis. Quanquam hoc verisimile esse videtur ab imbecillitate renum tanquàm ab adiuuante causa lapidem nasci posse. Nam concretio quæ fit in parte quapiam, infirmitatem partis agnoscit nequeuntis à sese amandare id quod molestum est. De verbis hætenus. Nunc ad rem redeamus.

Quòd in mentem venit Galeno vt tam paucis literis contradi-
ctoria complectatur? Nam in vno Lithiasin propriam affectio-
nem puerorum scribit quòd & cruditas, voracitas, & calor in-
gens in illis concurrant. Accedit quòd partes puerorum fame-
licæ à ventriculo nondum satis mitificatum alimentum rapiant.
Raptus autem ille eò fit, quòd idem alimentum & ad auctiōem,
& ad nutritionem faciat. Et quæ partes augeri debent, id quo
augeantur appetunt: quæ nutriri, id quo nutriantur. Diuersum
est partium studium, diuersum desiderium, quòd vno & eodem
alimento debet leniri ac temperari. Nutritio quidem fit non
quatenus alimentum quantitate est præditum, sed quatenus sub-
stantia est quæ in alendæ rei naturam multiplici alteratione præ-
eunte mutari debet. Auctio verò contrà. 7. Eandem lithiasin
ibidem à senibus remouet, quòd licèt materia idonea sit, tamen
causa efficiens defit. Sed alio loco obstructionem renum seni-
bus contingere posse ait, vnde viscida superfluitas. *ὡς τὸν πυλῶνα*,
callosam concretionem aut coagmentationem interpretor, cō-
trahere possit. At concretio fit resolutâ parte tenuiori virtute
caloris diffantis. In senibus, autore Galeno, frigiditas domi-
natur. Quænam ergo causa efficiens? Nec est quòd quis con-
etur defendere Galenum, quòd magna sit senum latitudo: vt qui-
dam sint virides, quidam decrepiti. Cùm vno in loco ait. In se-
nibus ob frigiditatem calculum generari non posse, de decre-
pitis intelligit. Cùm autem alio loco scribit viscidum & crassum
humorem callosam substantiam & naturam induere vnde lapis,
non de decrepitis capularibusque senibus intelligit, sed de viri-

dibus, in quibus non ita languidus, paucusque calor sit naturalis. Contra tamen colligere licet ex eiusdem commentario. Nam dum delithiasi, & asthmae, & stranguria affectionibus senum disputat contra sententiam aliorum Hippocratis interpretum, asserit senes eo loci ab Hippocrate intelligi *τὸς πλεῖστα χρόνῳ ἄγοντας ἡλικίαν, καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ταπεινὴν τὸν λόγον ὡς ἀπὸ τῆς ἡδονῆς διακινηθῶς*. Eos inquam, senes intelligit, qui extremam ætatis partem exigunt. Atque in eiusmodi senibus orationem suam finit tanquam iam ordinatim singulas ætatum partes emensus. Si itaque in extrema ætatis periodo *συστασις* illa *παρῳδῆς* fieri potest, cur non magis in iis quæ antecedunt? Itaque non videtur consentaneum a senibus & viris iam grandioribus reiicere calculorum generationem, præsertim cum materia in promptu est, cum non sit tantum frigus quin calor naturalis paulò acrior in angustis viarum quodammodo præfocatus (nam in angustis locis maximam partem lapides generantur) sufficiat ad cogendum compingendumque temporis progressu. Vt id quod simul & semel, aut brevior tempore in calidioribus fit, idem in non ita calidis, sed tempore longiore fiat. Quod alienum à ratione non videtur: immò rem ita esse credendum est. Eamque ob causam Hippocrates 6 Epidem. scribebat, *Post mictum concretio magis, an quod calidiores?* Cur dubitat? Cum aliis locis calorem puerorum causam concretionis posuerit. Reuerà libro illo multa ad memorie subsidium conscripsit. Nec abs re fortè dubitando scripsit, an quod calidiores? Dubium enim esse ostendimus, & paulò post plenius aperiemus, an calor naturalis mitis & blandus, concretionis causa.

Nunc quod mihi videtur probabile dicam de senibus & pueris: necdum enim explicabimus an ante mictum, an post mictum concretio fiat. Lapidem generantur in vesica, generantur & in renibus, & aliis locis angustis. Qui in loco ampliore generantur, & caloris vbertatem & materiae declarant, nam cum materia alia loca in quibus cogi potuisset pertransierit, in vesica calidatam per se, tum locorum vicinia, vt ex Hippocrate docebitur, nanciscitur copiam nouæ materiae; vnde concretio fit. Qui in loco angustiore fiunt, quodam obstructionis modo fiunt, dum videlicet sicca, aut viscida, sed terreno modo affecta superfluitas diu in renibus & viis angustis hæret; vnde obstructio, & ab obstructione, loco, tempore fit concretio. Itaque in calidis

92. CONSILIORVM MEDICINALIVM

naturis propria dicitur esse generatio lapidum tum in ratione lapidis, quia propriè lapis fit; tum in loco, quia in vesica; tum à causa efficiente propria, nempe calore; & in tempore, quia paucò tempore; & in effectiōis modo, quia tenuioris partis resolutio fit; vnde propriè concretio. Sed in non ita calidis, immò iam ad frigidum temperamentum vergentibus generatio lapidis cernitur, sed non propria. Quia non per modum coctiōnis per incrassationem & tenuium partium à calore consumptionem, sed per modum obstructionis, à qua res impeditur, & dum materia retinetur calor diffatione prohibetur, hinc longo tempore concretio impropria tamen fit. Item generatio ista fit in renibus. At non tam elucet vis caloris in generando lapide in angusto loco, quàm in capace: quia angustia loci quasi apprimè ad concretionem confert. Non præterea digestio fit tenuis partis, quia non multus calor. Atque vtrumque modum explicat Galenus abundè. Nam dum de senibus agit, *ἐν τῇ νεφρῇ οἱ νεφροὶ καὶ οἱ σπλῆνες καὶ οἱ σπλάγχνα παρὰ τὴν ἐξέλιξιν*. Non dicit, In senibus materia subigitur à calore, digeritur, vnde concretio: sed obstruuntur renes, inquit, & generant lapides: Ergo in generationis forma desideratur efficiens causa propria calor, sed obstructio per se videtur statim causa. Deinde *συνάστασις παρὰ τὴν ἐξέλιξιν* meminit; ac si dicat, non verè lapis est, sed per obstructionem humor *παρὰ τὴν ἐξέλιξιν* coagmentatur, adipisciturque callosam naturam. Sed dum de propria lapidum generatione loquitur, vt ea quæ fit in pueris, aliter multò loquitur; nam non meminit obstructionis, immò reiecit angustiam vt causam aliquam 6. Epid. sed voracitatis, copię humorum & validi caloris, & resolutionis. Hic tria maximè considerantur, calor validus (qui in senibus deest) copia materiæ (quæ adest quidem, sed ob coctricis facultatis imbecillitatem, ergo penuria caloris) & resolutio. Quæ efficit veram legitimamque lapidis generationem. Itaque mihi videtur sibi quadrare Galenus.

Sed nunc quasi è portu paulùm remigrantes, quoniam longius soluius, redeamus ad disputationem de calore; quoniam, vt suprà diximus, Hippocrates dubitauerit, an ideò quòd calidiores pueri post mictum in iis *συνάστασις* fiat? Et si calor, an sit mordax & acer, an naturalis, vt suprà attigimus. Ac calorem quidem esse causam generationis lapidis certum est, siue calor fit in parte ipsa in qua reapse generatio fit, siue in partibus vicinis.

nis quæ parti adiaceant. Quod fortè nouum videtur, sed id primus Hippocrates animaduertit libro de aëre, locis & aquis. Quorum alius salus fluida est ac sana, non ardens, nec stomachus vesicæ coarcescit, hi facile urinam eiciunt, & nihil in vesica congregatur. Quorum alius ardens ac feruida fuerit, in his necesse est vesicam idem pati. Cui enim magis quam pro natura fuerit calefacta, stomachus ipsius inflammatur. Cum hoc patitur, urinam non dimittit, sed in ipsa coquit atque adurit: quod tenuissimum, excernitur; quod purissimum transit ac emittitur. Quod crassissimum ac turbidissimum, coacervatur, ac primum concreuit parum, deinde magis dum voluitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit ad seipsum aptat, augetur, & in topium concreuit. Cum urinam emittit, ad vesicam stomachum allabatur ab urina impulsam, urinae emissionem impedit, & dolorem affert. Quare pueri fricant ac trahunt pudenda. At videtur causa mictionis eo loco esse. Signum autem quod hec ita se habeant, hoc est, urinam splendidissimam calculosi meiunt ad similitudinem seri, quia id quod crassissimum ac biliosum isthic manet, coacervaturque. Pueris autem lapis fit si lac non salubre fuerit, sed valde calidum ac biliosum. Ventrem enim percalfacit & vesicam. Tria hic obseruatione dignissima sunt. Primum, quomodo æstus, calorque & vesicæ & partium vicinarum calculi prouentum faciat: unde adustio fit, & orificij vesicæ inflammatio. Ergo de calore aeri locus intelligitur. Secundum, quod contra neotericorum sententiam primaria in vesica coagmentatio fiat, nec sit ad renes recurrendum. Tertium, quod lac in pueris calculum generet. Quartum addo de urinis splendidissimis. nam hoc non videtur probabile. Neque enim veri similitudinem habet ita splendida & tenues urinas, & albas reddi, cum æstus sit & in vesica, & in intestinis ratione astrictionis & ardoris. Sed hoc mihi propterea videtur contingere, quod multa copia lenti viscidique humoris subsideat, à qua refudet tenue serum, quod tanquam paratum magis ad excretionem, emingitur: sed quod crassum est ac biliosum (hoc est quod in mole ista calidum est ac æstuans, tanquam summopere conferens ad generationem lapidis) remanet: & quod excernitur tenue est, incoctum; quia licet calor sit multus, hic naturalis non est, sed æstuans, ut vult Hippocrates hoc loco (quanquam in aliis recurrit ad humidum calidumque primum, quod in pueris multum est) & propterea urina cocta non apparet, sed diluta multum, & albicans ob eam impressionem quam habet à materia in fundo vesicæ contenta.

94 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Tamen hoc controuersum esse potest maximè. De tertio, nempe de lacte, dicemus postea. De secundo, nempe de concretione lapidis & arenularum, an in vesica primò fiant, plenius posthac. De primo disputemus, quoniam instituta est quæstio de calore, an sit naturalis, & blandus, an verò contrarius. Id quod hoc loco ab Hippocrate dicitur aliquod problematicum habet. Nec enim absolutè verum est inflammari vesicam, & os eius nec intestina ardere vt inde generetur lapis. Tamen vt nihil efficitur temerè, nil ab Hippocrate imprudenter pronunciatum, ita eius verba problematica quidem, sed vera tamen cum reuerentia sunt capienda. Stultum est tanto auctori falsum aliquid asserere, quod fortè eius verba quæ aliquid secretius in se continent, non intelligamus. In eare enim inscitiam nostram potius explicaremus. Illo loco de aquis agit, earumque commoda & incommoda explicat, prout aliis atque aliis ventis afflantur. Ac inter cetera docet in nonnullis aquarum à Borea perflatarum vsu arenulas in vesica generari, in aliis non item, prout nimirum cuiusque alius bene aut malè affecta est. Nam in cuiusque morbi generatione, non modò dispositio materiæ & eiusdem copia requiritur, sed subiecti ipsius; alioqui nihil generaretur. Itaque illo loco Hippocrates vult eos calculis fore obnoxios quibus inferior alius calidior est, & vesica ipsa. Quod quanquam problematicum, tamen verisimilitudinem habet. Nec Hippocratis verba vbique ad vnguem sunt exquirenda. Nam nihil aliud videtur innuere quàm eos calculis obnoxios esse, siue in renibus generentur, siue coagmentatio prima & rudimentum fiat in renibus, perfectio verò in vesica per materiæ nouæ appulsam, quibus alius astricta est, arida, sicca. Ac si dicat Hippocrates: Illud in arte Medica receptum est, & communi prudentiâ notum, calorem lapidis efficientem causam esse. Ergo quibus illa causa præstò est, in iis credibilis est lapidem potius generari quàm in aliis in quibus deest, etiamsi par materiæ congeries adsit. Quo fit vt vesicæ ardor, alui durities, siccitas, calor plurimum generationem lapidis promoueant ac adiuuent. Vt enim calor hepatis & partium vicinarum facit ad meliorem chylis tum in coctione, tum in facili alteratione, immò & digestionem, ita intestinorum vesicæ vicinioris calor facilè communicatur & renibus & vesicæ; vnde in iis partibus augetur calor per aliarum partium viciniam, auctus calor ad rudimentum &

Notandum locus Hippocratis de generatione arenularum in vesica, contra neotericorum sententiam

perfectionem lapidis facit plurimum. Sic nimirum quæ sunt vicina, & quæ propinqua, ea primum ac maximè affici solent, *Hippocr. lib. de humoris.* ut Hippocrates scripsit. Sic inflammatio recti intestini urinæ stillicidium afferre potest: & vesicæ inflammatio tenasimum adducit, ut in Aphorismis Hippocrates testatum reliquit. Et vterus recto intestino tenasimum patiente laborat per consensum: immò & abortionem facit Hippocrati. Itaque fieri potest ut quibus ardens aluus est, ij præsentem materiâ calculosi fiant; quod communi experientiâ percipitur. Nam & qui præcalido sunt hepate, iis maximam partem aluus astricta est, & arenulas patiuntur: & qui nephriticis tentantur, & calculosi sunt, iuuantur plurimum educatione stercoris; tum quia induratum stercus opprimebat partes iam calculo pressas & fatigatas; tum quia brevissimo tempore aluus ita astricta, & ob astrictionem seipsâ calidior effecta potest calorem suum communicare partibus propinquis, & eas adiuvare ad nouarum arenularum generationem. Nam & dolores, & vigilæ, & astrictio alui facilè corpus febris reddunt: immò quibus naturâ præsertim biliosis durior, sicciorque aluus, iis maxima ex parte & capitis dolor, & renum *enigmas* (de ea enim conquerruntur sæpè) immò & rudimenta febri apparent. Calor itaque siue partibus ipsis insit, siue ab aliis partibus emanet, calculorum parens est. Ut non iterum prætercundus videatur locus ille Hippocratis suprâ citatus, pueris arenulæ cum lotiis excernuntur, tum propter vesicæ, tum totius corporis caliditatem. Ut non solum partium calorem in quibus solent nasci lapides considerari, sed & totius corporis. Quod animaduersione dignissimum est. Ceterum subtilius & breuius de calore agendum. An calor sit acer & mordax, an calor blandus & mitis, an vterque. Nam in iis quæ antè dicta sunt, & docuimus probabile esse non à calore blando cogi posse calculum, quod ad coagmentationem, digestio tenuis substantiæ requiratur, & à frigiditate non iuuari coagmentationem. Vtrumque amplius excurremus, & tandem quid sentiendum aperiemus. Audiat Hippocrates.

Post mictum concretio pueris magis, num quia calidiores?

Aliquid intus reconditum obscuris verbis designat, sed non exprimit Hippocrates. Et ut antè monuimus, non audeat absolute pronüciare an quod pueri calidiores, idè eis fiat magis concretio (πύμα Græcis, ἀπὸ τοῦ πυρρὸς ἡμὸς πυρρὰς). eaque concretio

96 CONSILIORVM MEDICINALIVM

post mictum. Nam tacitè testèque indicat duplex ^{πρὸς μὲν} ante mictum, alterum post mictum: Ita enim Græcis est, ^{ὑπὸν, καὶ μετ' ὑπὸν}. Pro nomine ^{ὑπὸν} positum aliud est lib. 2. de nat. humana ^{ὑγίεια}, sed malè; nam ponendum erat ^{ἔσθ}. Aliud est enim ^{ἔσθ}, aliud ^{ὑγίεια}, seu ^{ὑγιεινόν}. Quæramus igitur cur Hippocrat. dubitet & hanc particulam ambiguam scribat ^{ἢ καὶ ἐπὶ θερμότερον}, id est, an quòd calidiores? Duabus de causis videtur hoc adiectum esse: vna est, quia adiecerat particulam illam ^{καὶ} videtur magis consentaneum, vt in iuuenibus, in quibus calor qualitate maior cernitur potius generetur lapis, quàm in pueris. Nam si calor coagmentationis autor est, vbi maior calor, ibi coagmentationis & coalitus occasio maior. Si itaque iuuenes calidiores, cur non in illis ^{συνάγμα καὶ λίθος}. Tamen in Aphorismis absolutè pronunciarer pueros calidissimos esse, & nouerat illos & humidi primi & caloris primi vbertate fretos esse, à quo calido primo vere dicuntur calidi homines. Quanquam ^{ἔσθ} Græci Medici appellitauerint aliquando: immò sæpè quibus acer & mordax in aluis calor est. Nec mirum si dubitauerit, an quòd calidiores essent, in iis concretio post mictum fieret.

Secunda ratio videtur cruditas humorum, & superfluitas, præsertim in vesica coagmentationis lapidis causa est materialis: Vbi calor multus, ibi non est credibile crudos & superfluos multos humores coaceruari, vt res quoque se habet, præsertim ex parte caloris. Nam si magna sit ingluuies, ibi licèt calor multus, tamen non est satis coquendo, & mitificando. Si pueri calidi sunt, calor superfluam humiditatem & humores mitificabit, & nihil erit quod vim potentiàmque caloris effugiat. Ita nimirum in prognosticis Galenus scripsit, sedimentum multum esse in vrinis, quòd multi humores crudi, qui ratione copiae effugerint vim caloris natiui, vnde eos necesse sit postea cum vrinis secedere, quòd naturæ gratiam non receperint, id est, in alimentum non facesserint. Itaque dubitat Hippocrates, an quòd calidiores? quasi dicat: An non alia causa est coagmentationis post mictum? Si enim calor validus esset in pueris, vt est, & humores coquuntur, & mitificantur, & ad facilem exclusionem comparantur; ideòque non est verisimile in vesica resistere, ac illic in calculum cogi; dilatantur enim multo calore vasa. Ergo alia causa est (dicere possit Hippocrates) nimirum propter ingluuiem humorum cumulus qui hoc efficiat, vt nimirum fiat concretio

concretio post miſtum. Accedit quod non dixit abſolutè, *Pueris
magis on rectio ſit, in quòd calidiores*: Nam ſi de concretione & ſyn-
agmate ſolo ageretur, nō eſt dubiū quin à ſolo calore repetēda
eſſet cauſa, & nō ambigeret, an quòd calidiores. Nemo dubitat e-
nim à calore *πυρρὰ* hoc fieri: ſed adiecit, *uer' ὁ φαν'* poſt miſtū: vt ſi
ita quæreretur; An quia pueri calidiores, idē in iis fiat cōcretio
lapidis magis poſt miſtum quàm ante miſtum? Et particula hæc,
an quòd calidiores, dupliciter referri reducique ad ea quæ præceſ-
ſerunt poteſt: vel, An pueris concretio magis (ſupple) quàm
aliis in ætatibus, quòd ſint calidiores: quod videtur Galenus
velle colligere. Vel, An in iſtis pueris fiat concretio potiùs poſt
miſtum, quàm ante miſtum, quòd calidiores ſunt. Etenim hoc
probabile videtur, in pueris lapidem in veſica concreſcere præ-
eunte aliquo rudimento ob copiam excremēti viſcoſi & craſſi:
quod renes quidem præterit validā exiſtente puerorum natu-
rā, ac vaſis ſatis dilatatis, ſed quia graue eſt, facilè remanet &
reſidet in puerorum veſica vt molli & flaccida, exeunte tenuio-
ri parte: ſed in viris in renibus. 8. Cū in veſica ſit, dicitur
poſt miſtum fieri, id eſt, poſt ſecretionem ſeri à ſanguine, &
eius in veſicam influxum; ita enim nomen *ἐκρεως* intelligi poteſt.
Cū in renibus ſit, dicitur ante miſtum fieri, id eſt, antequam
ſecreta à ſanguine ſeri pars ſit, & illapſa in veſicam ſit in reni-
bus. Nam quidam volunt miſtionem eſſe non cū actu à veſi-
ca excernitur vrina: ſed cū in veſicam illapſa eſt vrina. Niſi
fortè dicat quis meliùs poſt miſtum dici, id eſt, poſtquam ex-
creta eſt à veſica vrina, vt excretā tenuiori parte humoris rema-
neat ſpiffior & denſior in veſica. Sed ſi hoc verum eſſet, quis
eſſet ſenſus? quæ ratio dictorum Hippocratis? Nam ſi idē di-
catur concreſcere lapis poſt miſtum in pueris, quod id fiat poſt
excretam à veſica vrinam: an probabile eſt in aliis poſſe gene-
rari lapidem in renibus ante miſtum, id eſt, dum contenta ad-
huc eſt in veſica vrina? Non videtur veriſimile. Nam continetur
vel non vrina in veſica, non propterea tamen in renibus ge-
nerabitur lapis. Ergo credibiliùs eſt, poſt miſtum dici, id eſt
poſtquam illapſa eſt in veſicam vrina: Ante miſtum, dum ad-
huc in renibus continetur. Niſi fortè dicat quis, & defendat in
hoc ſenſu dici concretionem fieri in veſica poſt miſtum, quòd
fiat poſt miſtionis actum, & nihil referat de renibus, ſiue antè,
ſiue poſt id fiat, cū Hippocrates nullam mentionem ea de re

iniecerit. Nam si ita dixisset, Post mictum in pueris concretio magis, quàm ante mictum, aliis potiùs ante mictum; videretur reuerà per comparisonem loqui voluisse de viris & pueris, vt in his aliter fiat quàm in illis. Sed secus est. Tamen & Galenus in comment. & Arnaldus, & ex veteribus plerique solent assignare distinctionem inter generationem lapidis in pueris, & in viris: quòd in iis in renibus fiat, in illis potiùs in vesica. Cuius rei demonstrationem petiisse videntur ex hoc Hippocratis Aphorismo.

Tamen coniectura à nobis priùs proposita non videtur à ratione aliena, vel quòd Hippocrates quæsierit, an quòd calidiores, quòd nimirum si hæc ratio valeret, quia calidi sint, idem de aliis ætatibus, præsertim iuuenibus intelligi possit. Vel potiùs, quòd cum nosset copiam excrementi parentem lapidis esse, & eius præsertim qui in vesica fit, non abs re dubitauerit, an caliditas eius lapidis causa sit, cum alia causa, eaque præcipua esse videatur. Quod autem de iuuenibus intelligi hoc posset potiùs, Galenus in comment. indicat, dum ait, Calidum in iuuenibus absolutè calidius est calido naturali quo abundant pueri: quocirca probabilius erat (si quidè caliditas concretionis autor sit) in adultis generari lapidem quàm in pueris. Sit ita sanè. Caliditas autor est causaque efficiens lapidis: sed an ea sit primigenia (quod nos demonstraturos sumus polliciti) aperiāmus. Quicquid eiusmodi est vt materiæ aliquam æqualitatem afferat quæ ad coagmentationem, quam læuitas adiuuat, conducere possit, & de materia educere aliquid tenue, id ad generationem calculi facere potest: nam, vt suprà docuimus, requiritur aliquod agens ad coalitum istum. At calor naturalis, & quiuis calor mediocris id præstare potest: quod ratione, ac experiētiā doceri potest.

Com. in aphor. 15. sect. 3. li. 6. Epid. Autoritas Galeni est: *Vrinarum crassitudo creandorum calculorum in pueris prima potissimāque causa est, caliditas etiam mediocris ad spissandam materiam satis esse potest. Nam & in sponte aquis calidis, essi moderatis tepidiores sint, topi concrecentes apparent. Itaque Hippocrates adiecit particulam NONNE, quoniam & tanta caliditas, quam ingentiam pueri habent ad coagmandum aliquid facit: verum non ipsa præcipuè, sed materiæ ex qua fit lapis, qualitas, ipsius compactionis causa existit. Quo ex loco apparet ea nostra coniectura verisimilis esse, quā paulò antè nobis videri dicebamus. Dubitandi par-*

LIBER PRIMVS. 99
ticulam ab Hippocrate additam esse, *an quòd calidiores?* Ac si
dicat Hippocrates. *πυρρὰς καὶ θερμὰς* istius non tam causam esse ca-
lorem quàm materiæ spissæ, crassæque qualitatem. Quod &
Galenus apertè demonstrat: licèt in omnium rerum productio-
ne habeatur potiùs ratio causæ efficientis quàm ipsius materiæ.
Et addebat, *post mictum*; siquidem post excretam urinam, vel
post delapsam eandem à renibus tanta est in fundo superfluitas,
ut minimo negotio cogi, aptarique possit.

Quæstio esse possit an tam faciliè generari possit? Nam plerique putant necessarium esse calorem ingentem qui retorreat materiam, retostam in lapidē cogat. Tribus modis fieri potest, vno per modum obstructionis, vt in senibus fieri antè ex Galeno docuimus. Quia enim multa restant excrementa, ea tempore vel per se, vel à calore siccata non simul & semel, sed progressu temporis callosam acquirunt consistentiam, & vias angustas obstruunt. Et parùm probabilè ostendimus esse id quod à Galeno dictum est, in senibus non cogi calculos, non quin adsit materia, sed quòd calor sufficiens desit. Altero modo per modum coctionis, in qua requiritur multus calor, & qui tempore recogat vt materiam non lentam, viscidā efficiat, exhausto sero, quem Galenus in Aphorismis constituit dum loquitur de lithiasi propria puerorum passione: & eundem modum agnouit Hippocrates libro de aëre & locis, dum scribit eos calculosos fore quibus alius exæstuat, vt paulò antè demonstratum est. Tertium modum ex hoc loco constituimus, in quo & Hippocrates & Galenus non tam recurrunt ad causam efficientem, quàm ad materiam, vt in pueris solam, vel præcipuam saltem vrinarum necessitudinem lithiascos causam ponant. Immò (vt ad quæstionem reuertamur an faciliè generetur lapis) Galenus exiguum tempus ad coagmentationem requirit, præsertim cùm materia præsto est. Ita enim scribit, quod annotandum: *Crassi-*

...præsto est. Itaque scribit, quod annotandum: Crassi- Comm.
 dies eiusmodi vinarum collecta, & in unum coiens (supple in vesica, con- in apho-
 tra Fernelium) cum semel aliquando non apto tempore excreta intus rism. 15
 diutius remanserit, concrescendi initium capit: principio facto facile lib 6.
 quicquid crassi in vesicam illabitur, priori agglutinatur, ut in sponte Epist.
 naris aquis cernitur, & in vasis in quibus aqua quotidie calfi. Notan-
 da illa particula, cum semel aliquando non apto tempore, &c Nam &
 facilitas generationis & incrementi apparet, præsertim ubi ma-
 teria idonea. Ut non sit requirendus tantus calor, non diathe-

Commē.
in apho-
rism. 15
lib 6.
Ep sect. 3

Nij

sis aliqua parentum, ad quam tanquam ad asylum confugiunt qui potius morborum causas rimantur, quàm easdem amoliantur. Quis enim dubitat vsu casei primo quoque tempore non posse cogi calculum?

Redeamus ad nostrum calorem. Calor naturalis coquit, vnit, ad æqualitatem adducit, crassefacit; nam coctio increassando fit: crassities illa in æqualitate spectatur, cum separatio est omnium partium *ἐν ὁμοιότητι*. Nam sæpè quod vltima in coctione apparet, tenuè magis apparet quàm quod in prima: crassius tamen est, quia separatis heterogeneis partibus æqualius est. Si calor naturalis illud præstat, tantum abest vt non concurrat ad lapidum generationem, vt plurimum faciat, quàm præsertim ratione increassat. Quod Galenus conceptis verbis demonstrat: *Crassam materiam in pueris tenaciorem esse, quoniam magis ab insito calido elaborata est, rationabile est. Nam quæcumque à calore coquendo mutantur temporis progressu lentorem acquirunt, licet ab initio illum non habuerint.* Tamen contra id quod à Galeño modò dicitur obijci potest ea ratio qua paulò antè eodem in commentario nifus est docere cur pueri in renibus calculum non generent. Pueri, inquit, in renibus calculos non generant, quia cum in iis omnes actiones naturales validæ sunt, humorum crassitudo funditur atque dissoluitur. Et paulò infrà: In pueris cum multus calor sit insitus, & actiones firmæ, materia attenuata ad renes fertur, faciliè in vesicam percolatur. Ex quibus locis apparet calorem naturalem attenuare, fundere, dissoluere, nedum cogere, spissare, coagmentare. Immò paulò infrà, coagmentationis causam in pueris, illius præsertim materiæ quæ à calore attenuata fuit, percolata per renes, & ad vesicam protrusa, vult vesicæ esse frigiditatem. Si frigiditas coagmentationem promouet materiæ alioqui à calore attenuatæ, si calor fundit, liquat, cur ergo & calor natius crassitudinis autor existit, & coagmentationis, cum contraria ei qualitas, nempe frigiditas, autore Galeno, id efficiat? Hæc herclè subtiliora sunt. Nam Galenus adduxit primam rationem, nimirum in pueris facultates validas & calorem attenuare, vt euertat eorum sententiam qui dicebant in pueris lapides gigni ob meatum in renibus angustum. At Galenus; Si angustia hoc efficeret, potius in renibus cogerentur: At contra fit: immò dubitando ponit ne in aliis quidem aetatibus angustiam istam causam esse, sed cruditatem, & infirmitatem: quæ cum

*Commē
in part.
15. sect. 3
lib 6. E-
pid.*

non sit in pueris tanta, non est mirum si in renibus non cogatur materia: immò eatenus eorum vis appareat quatenus valide depulsa est materia in vesicam, quæ ibi cogitur iuuante quadam vesicæ frigiditate. Nam primum per comparisonem tantum vult tam validas facultates in pueris: nec vult calorem omnino fundere & attenuare: nam cum primum per modum digestionis cogit, tunc fundit, liquat, attenuat: sed cum per modum coctionis, crassificat. Sic in vno loco intelligi debet calor ille æqualitatem crassitiemque efficere cum coquit. In altero fundere, liquare, dum per comparisonem cum aliis ætatibus in quibus vires nec calor tantus est, hoc dicitur, & dum digerendi partes tenet. Quod autem vesicæ frigiditas coagmentationis causa dicitur esse, id tamen non excludit munia caloris naturalis in coquendo & increassando. Nam frigiditas tantum ex euentu cogit, præsertim si adsit inanis capacitas in qua materia diu resideat; quod vult Galenus. Calor per se crassificat & cogit, dū videlicet ^{inter se} separat, & ^{in se} congregat. Et licet materia attenuata sit, vt per renes percoletur, non propterea tamen efficitur quin diutius versando circa eam materiam præsertim excrementosam, non illam cogat. Nam si illam assimilare posset vt in alimentum cederet, non vbiq; in calculum cogeretur: sed cum sit excrementum, diutius resistens eam naturam acquirit. Ex his patet calorem blandum, mitem, mediocrem concretionis lapidis auctorē esse posse, quod auctoritate & ratione confirmatur.

Experientia est de aquis: in iis tepidijsculis aliquando lapides generantur: & in vasis nostratibus in quibus vulgò aqua incoquitur. Et Galenus earum aquarum duobus in locis mentionit: priore quidem: *Itaque si ex sola purissima crassa & viscida sub-* ^{Comm. in aq. ho- rism. 6} *fidentia facta sit, color cinereus erit, aliorum topiarum colori similis, quæ* ^{lib. 6} *in aquis sponte calidis multis in regionibus lapidibus adnasci accrescere* ^{lib. 6} *que cernuntur, & in vasis alijs ubi aqua calefit. Posteriores verò,* ^{Com. in} *in calidis aquis sponte nascentibus calculi & topi generantur. At dicitur* ^{part. 15} *aliquis, non generantur nisi in aquis calidissimis. Falsum est, & aucto-* ^{lib. 3.} *ritate Galeni refutatum: ita enim eodem in loco scribit: In* ^{lib. 6} *sponte calidis aquis, etsi moderatis tepidiores sint, topi concre-* ^{lib. 6} *centes apparent. Eo autem loco conceptis verbis Gale-* ^{lib. 6} *nus docere vult non necessariū esse vt aquæ calidissimæ sint,* ^{lib. 6} *nec calor admodum vehemens vt lapis generetur.*

gerere, attenuare, id quo tenue est elicere: at hæc requiruntur ad generationem lapidis. 10. Probatum enim est ex sententia Galeni, τὸ ἀπὸ τοῦ πύου ἀλλοιωθῆναι πύον debere κατὰ φύσιν, id est, discutere, & exhalationem procurare. Quod si non sit multum contumax materia, procul dubio eam attenuabit, & in halitum digeret: alioqui conabitur quidem educere id quod tenuius, sed remanebit crassa pars; hinc calculorum prouentus. Ergo eâ ratione conferet ad calculos generandos. Præterea aliud est materiam in venoso genere aut neruis contentam esse, vt in morbis frigidis, & in conuulsionibus; aliud in capacitate aliqua, & angustis. Nam in venoso genere, aut neruoso, quia non est coactus humor, per halitum tandem digeritur: sed dum in capacitate aliqua contentus est, diutius maiore copiâ residens cogitur. Declarant arthriticorum tophi. Nam quandiu humor in genere neruoso est, vagus est: cum in pyxidem abiit, tum concrescit.

Ac disputationis continuata ex superioribus serie, agamus de reliquis partibus; de calculo an in renibus solum concrescere possit, & num omnis calculi rudimentum à renibus: item an ex hominibus aliqui obnoxij sint magis calculo, & quinam illi sint. Accedit & id, cur in hominibus & viris in renibus magis, in pueris in vesica potius concrecant. In renibus non concrescere calculum solum testatur experientia: nam nulla est corporis capacitas in qua calculus cogi non possit. Quod non est pluribus explicandum, & exemplis illustrandum. Siquidem & ex corde, intestinis, pulmônibus cysti cholidochi, immò ex cerebro ipso excreti visi sunt lapides. Est enim illud verum quod à Galeno scriptum est (dum loquitur de concretionem lapidis in vesica) *capacitatem, eamque in anem conferre ad generationem lapidis*, sed an rudimentum fiat in renibus ignoramus. Si in partibus reliquis corporis agnouit Fernelius primus illius opinionis assertor, quæ defendit lapidis in vesica contenti rudimentum à renibus esse, lapidem concrescere posse, immò & in venis ipsis; cur ergo tam absurdè contra omnium veterum opinionem asseueranter affirmat omnis calculi generationis principium à renibus esse? Si veteres credidissent futuros quosdam esse, qui præiudicata suæ sententiæ pertinaces defensores passerent in renibus rudimentum fieri, probauissent credo, necessario cogi posse in vesica: & vt solent, firmis rationibus suam opinionem roborassent. Probauerunt quidem & ratione caloris, & mate-

Comm. 1.
in par. 15.
sect. 3. lib.
6. Epid.

riæ, & capacitatis ipsius vesicæ coagmentari in vesica; sed non elaborarunt in eo vt probarent primum rudimentum à vesica ipsa esse. At quis vnquam putasset fore quem piam ita à ratione alienum, qui negare ausit labefactando omnia veterum decreta cogi per se & primò in vesica lapidem posse? Si in aliis partibus cogitur, non repetitâ primâ origine à renibus, dicat cur non in vesica cogi possit & per se & primò, rudimento à renibus non mendicato? Non potior ratio videtur, immò probabilius est in vesica cogi posse facilius, quòd excrementorum corporis sit receptaculum, & muccosa substantia per se frigida, & caloris vim effugiens, omnium facillimè in vesica cogatur, coeat, ac coagmentetur: immò credo & facilius & promptius cogi, quàm in renibus, & breuiori multò tempore. Primum enim materia est, & sicubi alibi in vesica & redundat, & apparet: ac probauimus antè & ratione & experientia copiam materiæ mucaginose in loco etiam mediocriter calido cogi ac coalescere, & ex minima retanquam fundamento aut semine per accessionem nouæ materiæ aliquid ingens cogi posse. II. Præterea & locus calidus est, immò & ratione suæ substantiæ frigidus: ad lapidis autem coagmentationem, transpirationem, concursumque caloris & frigoris vt ad lateres cogendos, plurimum conferre, veterum autoritas iam pridem confirmauit. Præterea fieri potest vt in vesica & digestio fiat, & dissipatio tenuis substantiæ, tum ratione caloris, tum ratione excretionis quæ sæpè fit: nam id quod exclusioni paratum est magis, cum vrina excluditur. Quanquam abundè suprâ docuimus ex sententia Hippocratis & Galeni, in vesica calculos non cogi tam per modum digestionis (vt in renibus fit) quàm per modum coctionis, id est, elaborationis, & crassificationis, præsertim dum diutius in vesica vrina retinetur, vt annotat Galenus.

*Com. in
Apho. 15.
sect. 3. 16.
6. Epid.* Nec est quod respondeat, illud crassamentum inæquale facile à liquore vrinæ dilui, & per os vesicæ, quod Galenus ipse facitur amplum in pueris, excludi; sic coagmentationis occasionem tolli. Nam & ex sententia Galeni superius demonstratum est, etiam in aquis *αυτοπύλας* calculos & tophos concrefcere. Itaque aqua suo liquore non impedit generationem tophi. Quid illud est? Si lapis in vesica à rene deturbatus augetur, & illud quod apponitur verè lapis sit & crassitie, & colore, omni denique ratione: immò durior sit quàm qui in renibus cogitur, vt nos experientia

perientia docet; cur non primò cogi poterit, vt rudimentum à renibus non repetatur: Eadem enim ratio videtur incrementi & principij, vt si materia & causa efficiens sufficiat ad augendā arenulam in tantam molem qualem in vesica videmus, eadem sufficiat ad generationem lapidis primò & per se? Præterea in articulis pituita lapidescit, nullo repetito à renibus principio, in vesica non cogetur, loco ad id apto, & quia veluti corporis sentina, & quia calidus locus? Quæ vrinæ grumosæ sunt, crassæ, multitudine paucæ, muccaginosæ, confusæ, à vesica excernuntur, qualium meminit Hippocrates in suis distinctionibus, diutius in vesica retentæ non generabunt tophulum, & ab hoc sæpius aucto, calculum; illud credibile, scilicet. At dicet, si crassæ ita sint, grumosæ, paucæ, renes non transibunt, & ita in illis restitabunt, & stranguriam facient, & lapidem generabunt? idque maximè in pueris, in quibus credibile non ita ampla esse vasa vt sunt & in viris. Ratio hæc probabilis est, & autoritate Galeni confirmata. *Non absque ratione* (inquit) *crassæ vrinæ paucæ sunt multitudine, vt quæ nimirum vix renes pertranscant.* At bifariam respondere possumus: primùm quidem, si ita crassæ essent vrinæ quales paulò antè descripsimus, præsertim ita crassæ dum renes pertranscunt, verisimile esset puerorum renes non posse præterfluere, & ita illic cogi: sed crassamentum illud in pueris apparet, maximè in vesica ipsa; quod dicebat Hippocrates, *post mictum concretio*. Ac si dicat; post elapsam à renibus vrinam crassamentum apparere. Posterior ratio melior est, & auctoritati Galeni adscribenda: nam commentario toties citato scribit puerorum actiones validissimas esse, calorem multum, qui fusos per venas humores attenuet, & ad excretionem per renes præparet, & actionum vim magnam esse quæ ad exitus celeritatem facit plurimùm. Idem negat angustiam viarum causam posse esse in pueris cur in renibus lapis concreseat, immò ne in adultis quidem (quod fortè minus probabile videtur, & notandum est propter sequentem de viris disputationem) quo fit vt quantumvis illæ vrinæ sint crassæ, percolentur tamen: quanquam neget in pueris crassitiem esse quæ hoc efficiat in renibus; sed crassamentum ipsum attribuit corpori vesicæ frigido.

Itaque ne Galenus rei veritate motus cogeretur fateri illuuiē istam humorum remanere in renibus angustis, nimirum ratione ætatis, asserit & eos crassos humores attenuari; & nullam angustiam

stiam esse quæ hoc efficiat. quod alienum videtur.

12. Sed ne indictâ causâ Fernelium condemnemus, licebit illius rationes in medium adducere, ac illas ad vnguem exigere. *Causam calculi* (addit ille) *omnes tradunt crassum ac frigidum succum, qui cum urina per venas in vesicæ capacitatem influit, in qua tanquam fax subsidens loci calore exaresfactus statim lapidescit. At verò quid limum istum (nisi forè admodum angusta vesicæ cervix) tandiu possit remorari non video, eum & sanguinis grumus, & pus, & alia multa crassiora facile illinc profluant cum urina. His argumentis adductus, cepi aliam causam inuestigare, ac tandem comperi omnem calculum in vesica conclusum quoddam rudimentum è renibus traxisse, è quibus per nephriticos dolores excidens, si grandiusculus est in vesica plerumque persistit, ac illic allatarum sordium adhæsu coagmentatur, cum perfectus fiat lapis. Et quicumque lapide vesicæ laborarunt, ij prius nephriticos dolores experti sunt. Et quoscumque calculos obtrini, in eorum medio nucleus repertus est, verum rudimentum è renibus exturbatum. Hæ rationes paulò debiliores sunt quàm vt à tanto Philosopho perfectæ videantur: Imò nisi eas tanquam probabiles tantum profuerit, videtur omnis fides eis deroganda. Quod his ratiunculis conficimus. Tribus argumentis nititur probare generationem lapidis primam fieri in rene, non in vesica. Primum est: Non videtur quicquam remorari posse crassum frigidumque succum lapidis parentem, in vesica, vnde concretio fiat: Est itaque probabile in rene coagmentationem fieri, quandoquidem materia facilè vesicam pertransit: quòd autem probabile sit non posse remorari illum succum in vesica; hoc docet, quod & pus & grumi sanguinis ab interna capacitare excernantur: Ergo multò magis succus crudus. Egregiam rationem quæ propterea Fernelium adduxerit vt credat calculum in vesica contentum primum sui rudimentum à renibus traxisse. Pus, sanguis concretus, & similia ab inani capacitare vesicæ excernuntur: ergo limus, & humor viscosus non potest cunctari in eadem capacitare, & adhærere spiri vesicæ? Hoc verum scilicet. Nam eadem ratione tuus nucleus, ô Ferneli, qui à rene deturbatur, & est futuri lapidis per allatarum sordium adhæsum, rudimentum à vesica excernetur: siquidem & cervix vesicæ, Galeno autore, & præsertim in pueris satis patens est, & non minùs natura sollicitatur ad excretionem arenularum à renibus exclusarum; quàm puris, aut rei alterius alienæ. Et hoc argumentum contra Fer-*

nelium ipsum nititur; item & hoc: Ideò per te non remoratur glutinosus humor in vesica, quia eum vt pus, & alia crassiora probabile sit excerni: Ergo nec in renibus ipsis idem humor continebitur. Immo quia renum lapis magis fit per adhæsum arenularum, arenulæ autem non fiunt à tam glutinosa materia quàm ille lapis qui in vesica fit, cur non quotidie exeunt arenulæ à renibus, cum ab his & pus crassum, siue ab abscessu renum excernatur (vt ferè fit) siue à pulmonibus, vt Hippocrates 1. Epid. annotauit, & Galenus lib. de locis affectis, in ruptione vomicæ sequatur, item & sanguis grumus exeat? Nec enim potior videtur ratio vt remoretur potius in renibus viscosus humor, quàm in vesica: aut dicat cur à renibus carunculæ, pus, grumus sanguinis, vrinæ abscessum aliarum partium soluentes, crassæ, grumosæ excernantur, arenulæ autem non excerni possint?

Ac de pure quòd à renibus excernatur, ita scribit Hippocrates; *Si sanguinem, aut pus quis meliat, aut vesicæ, aut renum exulceratione significat.* De carūculis & capillis, postea: *Quibus in vrina crassa existente carunculae parue ac veluti capilli vnà exeunt, ris à renibus excretio fit.* Et Galenus in comment: *Quidam excreuit eiusmodi capillos longitudine dimidij cubiti: quia toto anno vsus fuerat fabis, orobo, casco tenero, ac si. co. Item hoc fit adusto humore in renibus, & vocatur hic morbus, capillitium.* Et paulò infra, *Parue carunculae excernuntur cum hypostasies in vrinis similes orobo excernuntur, & hoc contingit in febribus in quibus crassus sanguis in hepate, aut renibus exurit.* Quid aduersum dicat Fernelius? Nam conceptis verbis declarat Galenus aduri in renibus crassum sanguinem, pus contineri, grumos, & excernuntur tamen; arenulæ autem non excernuntur? Itaque idem de renibus & vesica necesse est intelligi. Nisi fortè respondeat: At ideò non exeunt arenæ, quia gluten est aliquod in rene, cuius operà coagmentatio fiat. Cur non & idem gluten in vesica erit, immò maius? Siquidem totum recrementum in vesicam profluit, & renes corporis quidem superioris (vt italoquar) excrementum excipiunt: sed vesica & corporis, & renum & suum denique continet. Accedit quod cum spermatica sit pars, & frigida, dum nititur conuertere in sui nutrimentum humorem, & voluptuatur vrina, necessum est multum lentum frigidum crassumque humorem cunctari. Et si ventriculus ipse quatenus spermatica pars multam pituitam coaceruat ex laudabilibus alimentis, cur vesica ex excrementis tota natura alienis

non multum coaceruabit? 13. Nec est quod recurrat ad angustiam renum, nam si angustia renum id efficeret, non ea excernerentur tam crassa ac glutinosa, quæ suprà ex Aphorismis Hippocratis excerni probauimus. Præterea si ratio Fernelij aliquid haberet ponderis, quod nimirum si pus, grumus excernatur à vesica, eadem aut potiore ratione sæx excernatur, & sic tollatur occasio generandi in vesica lapidis primò ac per se: simili modo ageremus de pulmonibus, quòd nimirum non concreverent capilli, vt grando (quod ab eodem Fernelio obseruatum est.) Nam à pulmonibus pus crassum glutinosumque excernitur, excernitur grumus crassus ac magnus; ergo potius debuit excerni quædam pars materiæ glutinosæ, quæ in grandinem verti in pulmone nata est? Atque vt respondeamus (veritatis studio, non contradicendi desiderio moti) Fernelio ita in rebus his cæcutienti, & pus, & grumus, & crassæ vrinæ, & carnes, & furfuracea, & *γιδεία* (vt 6 Epidem. obseruauit Hippocrates) cum vrina excerni possunt; non propterea limus & mucosus humor lapidis parens futurus non excernitur. Non quin excernatur aliquando pro conditione vesicæ, quæ aliàs atque aliter affecta est, sed etiam aliquando subsistit. Quemadmodum etià istud pus (ò Ferneli) & grumus, & tua crassiora corpuscula aliquando excernuntur, sed etiam aliquando subsistunt. Vnde Galenus docet sæpe supprimi vrinam à grumo sanguinis eius, præsertim qui à renibus excernitur, qui postquam in vesicam illapsus est, ibidem concrescit eidem Galeno) à pure, à carunculis, & similibus, siue à vesica sint, siue à superioribus partibus. At eadem, vt experientia docet, possunt & faciliè expelli, nec vllam aut *ἰσχυρίαν*, aut *σπινθηρίαν*, aut *δυσουρίαν* efficiunt. Itaque non est necesse illum limum excerni, siue angustum sit osculum vesicæ, siue amplum. Accedit quod fieri possit vt pus, grumus, & similia faciliè excernantur, non sèx ista limosa & muccaginosa propterea, nam etsi & limus, & pus, & grumus, & alia id genus præter naturam sunt, tamen nec omnia eodem modo præter naturam sunt, sed alia atque alia magis. Nec alienum à veritate hoc loco dicemus, si limum glutinosumque, ac pituitosum humorem probauerimus non tam molestum sæpe esse vt est aut pus, aut grumus, aut caruncula, aut capillus (quæ omnia à vesica excerni videmus) immò pus etiam mediocris consistentiæ sæpe potius & citius, & facilius excernitur quàm phlegma admo-

2. de loc.
aff. cap. 1.

ibid.

dum tenue; quoniam pus molestias maiores vesicę affert quàm phlegma. Si quod pungit, acce est, hinc dysurias, strangu-
rias quę à pure & alia re præter naturam in vesica contenta oriri
videmus, à phlegmate, aut pituitoso humore non ita (nisi falsum
sit): quod si ita est vt reuerà est, non est dubium quin & ve-
sica magis laboret in puris & similis rei excretionem. Nam in par-
tibus omnibus acruatur humores frigidi ac crassi, plus, minús-
ve pro natura & conditione partis, qui alias diutius in illis resi-
des sunt, alias excernuntur, præsertim si quam fortiantur quali-
tatem alienam quę facultati expellenti calcâr ac stimulum ad-
dat. Iraque ratio Galeni de generatione lapidis in vesica multò
potentior ac validior quàm recentiorum. Secunda ratio est de
colicis, nephriticis quę doloribus, qui calculum vesicę præcede-
resolent. Nam si omnes qui è vesicâ calculo laborant, nephri-
tici dolores necessariò exercuerunt, nec sine his visus vnquam
cui in vesica lapis cogeretur, magnam vim id habet, & plurimum
neruorum ad rationem istam stabiliendam ac roborandam. At
quot pueris lapis excisus, qui nihil tale experti sint, sed residen-
tis in vesica lapidis etiam incipientis signa edita sunt, nullo præ-
eunte signo affecti renis? Et vt plerisque in renibus lapides re-
perti, quibus immunis à vitio & calculo erat vesica: ita & in ve-
sicâ capacitate repertus lapis quibus erant sani renes, & qui ni-
hil lapidosum prætenderent. At si omnis lapidis rudimentum
esset à renibus, fieri vix posset vt lapis ingens in vesica reperi-
retur, quin in renibus aut arenulæ, aut aliquid simile continere-
tur. Quod ergo dicit Fernelius, nunquam in vesica repertum
calculum, qui ante nephritica non sit passus: id multâ observa-
tione eget, diligenter quę sigillatim interrogandi essent calcu-
losi, an aliquid simile passi fuerint. Nam de viris quidem, & iis
qui in constante sunt ætate, constat quod maxima ex parte cal-
culos in renibus generent ob causas supradictas, & quas paulò
post fortè explicabimus; quos non mirum nephriticis dolori-
bus cruciari. At pueri non ita in notitiam venire possunt, num
nephritica sustinuerint: & nondum obseruatum à quoquam vi-
di conquestos esse pueros de renum doloribus, qui eos tamen
non effugerent, si à renibus prima vesicæ calculi rudimenta de-
turbarentur. Sic dubito de illa generali propositione Fernelij
quę fortè ad fucum rationibus suis fulciendum confinxit:
Quicumque vesicæ calculo laborant, eos prius dolores nephri-

110 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tici exercuerunt. At viros fortè multos interrogauit: at iam di-
ximus aliam longè rationem esse virorum ac puerorum.

Tertia ratio Fernelij aliquid probabile habere videtur vt
conuincat omne calculi rudimentum à renibus esse: Quia,
ait, quotquot calculos manibus obtrui in eorum medio nu-
cleus repertus est: at nucleum istum à renibus manasse putat.
Primò non est verum in omnibus nucleum istum apparere:
Reuerà in quibus à rene principium lapidis est aliquid sub-
rubeum & coactum, in medio calculi apparet; quod arguit
renem primum hoc rudimentũ suppeditasse. Nam si id quod
medium est, diuersi coloris & substantiæ est ab inuolucro,
credibile illud à rene esse, vt hoc à vesica. At non vbiq̃ue ista
& coloris & substantiæ varietas apparet. Nam etiam vidi-
mus lapides, quorum inuolucrum durissimum erat, grandi-
nosum, lapidosum, non album (quod necessariò esset si à ve-
sica coagmentatio alba est Fernelio) sed tendens ad fuscum:
An non hæc omnia à vesica sunt, id est, & à calore vesicæ, &
à materia vesicæ, non mendicata aliunde occasione? Nam
quibus corpus biliosum est & æstuans, iis in vesica cogitur la-
pis ardore & vesicæ & totius corporis, vt autor lib. 2. de na-
tura hum. scripsit. Quam sententiam Galenus probauit. Re-
spondeat huic rationi Fernelius, si vesica cimenti autor est
& ratione causæ efficientis, & materiei, cur non principia
causasque primas dabit? Quid respondeat Galeno de vrinis
crassis puerorum loquenti, cum vrinæ crassæ sunt, vrina non
apto semel tempore reddita, initium fit coactionis ac coag-
mentationis in vesica. Quasi verò hoc initium subacta, atre-
nuatàqua materia non possit alia in parte fieri quàm in reni-
bus? Erroneum hoc planè, & anile. Quoties verò obseruamus
in febribus longis & quartanis, & in iis qui vino gulæque in-
dulgent excerni vrinas confusas, crassas, quarum contenta
fusque déquelata rubent, ac si sanguinis fæx quædã ac limus
esset? 16. Et in vesica tate rubens recrementum moram aliqua
traxit antequam egeratur. Cur non in vesica calidiore cogi
poterit, agglutinari, coagmentari, cohærere, vt inde aliqua
moles exigua fiat? Quod si fit, cum materia illa fæculenta, li-
mosa, rubensque appareat, non est dubium quin lapis, aut
quicquid sit aliud, à tali materia ortum habens, referat color-
rem ac characterem illius materiæ. Ruboris itaque in cal-

*Part. 11.
lib. 2. de
nat. hum.*

*Com. in
part. 15.
sect. 1. li.
6. Epid.*

culo occasio non est repetenda ex renibus ipsis, quod placet Fernelio, sed sæpe à materie ipsius qualitate. Quanquam non negamus & arenularum, & ruboris generationem à renum substantia dependere.

Hinc quæri potest, si per se & primò in vesica lapis generatur, an arenularum excretio fieri debet; & si fiat, an à renibus, an à vesica ipsa oriuntur? Plerisque persuasum est non posse oriri lapidem sine arenulis; contra & sabulum & arenulas oriri posse nullo nec præeunte calculo, nec sequente. 15. Vnde melius esse putant excerni arenulas, quod *συνδυμνός* & coag-
mentationis occasio tollatur. Arenularum generatio accepta par. 18.
ferenda est renibus, ut ex sententiis Galeni & Hippocratis conclusum est suprà. Autor libri de natura hum. secundi, arenularum generationem ad calorem magnæ venæ cavæ descendens videtur retulisse: quod obscure fortè renes ipsos videtur indicasse. Nam quibus vena cava continet sanguinem ardentem, his renum intemperies comes est. Tamen si in vesica lapis cogi potest non solum tendens ad albedinem, sed ad subrubrum & suberuentum, ut ex materie distinctione paulò antè explicuimus, potest aut arenula, aut aliquid simile generari, & præcedere calculi *πρωτόγενος*, & eandem sequi, fortè non alienum erit à veritate tales vrinas sabulosas dicere, ut & quæ venis calfactis excernuntur, at quæ renales sunt (id est declarant lapidosam calculosamque *ἢ νεφρὶκὴν ἀλάθειαν*) arenulosæ propriè vocabuntur. Ita enim distinctionis gratiâ distinguuntur hoc loco sabulosæ ab arenulosis.

Cur ergo in viris calculus potiùs renes occupat, & maxima ex parte nephritidos sauiissima tormenta experiuntur; in pueris autem vesicam occupat potiùs? Quæstio hæc difficillima est, & hæcenus multos exercuit. Ac operæ pretium est audire rationes veterum Medicorum, quæ prætextu pulcherrimo sese nobis ostentant, cum erroneæ, ac falsitatis sint plenissimæ. Nam recurrunt ad angustiam vasorum, quam in viris maiorem esse censent, quàm in pueris: ac propterea materia calculorum in pueris ad vesicam vsque penetrat, vnde calculorum illic proventus: in viris autem resistit, ac hæret in renum viis, vnde illic arenulæ, coguntur glutino quodam, & lapis generatur. Alij, in quorum numero est Galenus, recurrunt ad naturæ infirmitatē: & hoc fortè minus est verum. Quis enim dicat eos qui iam pro-

112 CONSILIORVM MEDICINALIVM

uectiores sunt, quos Galenus in comm. in particul. 6. Epid.
Pueris post mictum, &c. ταις vocat, ita esse imbecillos, vt cā ra-
 tione in renibus hæreat materia, nequeunte naturā in vesicam
 vsque deturbare. In pueris autem cum & instrumentorum ma-
 gna sit mollities, infirmitas, multus humor, superfluitas magna,
 ecquæ illa tanta vis vt potius pellat in vesicam, quā in ipsis vi-
 ris? Si tanta ei vis est pellendi in vesicam, cur non & foras vna
 cum vrina, cum Galeno in pueris adeo ampla sit vesicæ ceruix,
 vt cuiusque materiei crassities facillè excerni possit. Quod si ob-
 iiciatur Galeno sua ipsius opinio, scribit enim, *Alterantur pue-
 rorum dispositiones cuiusmodi propter corporis humiditatem, & naturalis
 potentiæ infirmitatem.* Non est itaque cur recurrat Galenus ad fir-
 mitatem actionum naturalium in pueris, quæ in viris deest. Ta-
 met si enim concedamus in pueris facultatem coctricem vege-
 tam esse ob caloris naturalis vbertatem, quæ illis plurimum
 inest, tamen facultas expultrix quæ siccitate iuuatur ac roboratur,
 in illis deficit; at pellere, deducere vsque ad vesicā id quod
 ob infirmitatem in renibus subsisteret, facultatis expellentis
 munus est. Nisi dicat quis cum Galeno, non ad robur facultatis
 expultricis referri id, sed ad virtutem caloris multi qui, autore
 Galeno in comm. prædicto fundit atque dissoluit, quod in de-
 clinantis ætatis hominibus non fit; quia enim calor non ita mul-
 tus, ideo cogitur atque coagmentatur. Sed contra Galenum re-
 torqueri potest quod eodem loco scribitur, caloris naturalis vir-
 tutem contrarium potius effectum producere. Tantum enim
 abest vt dissoluat atque dissipet, vt contrā ad æqualitatem redu-
 cat, cogat, inspisset: crassam materiam, ait, tenaciorem in pue-
 ris fieri liquidò constat; quoniam magis ac magis ab insito cali-
 do elaborata est. Sic calor naturalis multus cogit potius quā
 dissoluat. Tamē quidquid sit, ex sententia Galeni apertè con-
 stat in viris lapidem in rene generari, in pueris in vesica potius.
 Ita enim ille interpretatur, *post mictum, &c., ante mictum:* vt in
 viris ante mictum generetur lapis, supp. in rene; id est, antequā
 secreta omninò sit vrina à sanguine: post mictum in pueris, id
 est, in vesica: postquam percolata est vrina, & in vesicam lapsa
 est. Nam *ὑπομικτός* hoc significat, non autem actum meiendi, vt
 falsò quidam putauerunt. Itaque ex sententia Galeni videtur
 probabile esse, si lac non conferret ad lapidem, si adeo crassæ
 non essent vrinæ, si tanta non esset edacitas, futurum esset vt
 ratione

Commēt
 in part.
 15. lib. 6.
 Epid.
 sect. 3.

ratione roboris facultatum naturalium in pueris, & caloris, patiente vesicæ ceruice, nullus esset prouentus calculorum. Et illa virtus in eo elucescit, quod saltem impediatur quo minùs in renibus cogantur: sed victa à crassitudine materiei, ab edacitatis occasione, iuuante quoque vesicæ frigiditate ob substantiam nervosam, vt antè dictum est, in hac coagmentatio fit. Quanquam qui calor fusionis ac dissolutionis causa est per se, idem quasi aliud agens coagmentationis ac coalitus causa esse potest.

Itaque angustiam vasorum Galenus eò loci causam coagmentationis lapidis in renibus reiecit: non quia angustia non adiuet, sed hoc vult dicere, non propterea in viris potius in rene generari lapidem quam vesica, quod meatuum adsit angustia. Nam & in pueris angusti quoque satis sunt meatus. Accedit quod inter eos qui calculis obnoxij sunt, eos numerare soleamus quibilibi sunt, & quibus calor acer & mordax est, & aridus. At horum venæ amplæ satis sunt, ex Galeni libris de Temperamentis: & Aphorismus de iis ab Hippocrate conscriptus videtur in Epidemiis.

Lib. 1. de
aliment.
admittit
Gal. angustiam
vasorum
cap. de
pancreate

Lib. 2.
partic.
& lib. 6.
Epid.

Qui ventriculo calidi, carnes habent frigidas, & graciles sunt. Ipsi venosi & iracundiores. Nisi fortè quis dicat venosos non appellari illo loco, quod amplæ sint venæ, sed turgentes tantum & conspicuas præ prauis sanguinis copiâ. Quæ interpretatio consentit Galeno: sed priore etiam modo accipi potest ex opinione Galeni in lib. de Temperamentis.

Itaque cum Galenus reiiciat vasorum angustiam, causam potius coagmentationis lapidis in renibus virorum, recurrit ad infirmitatem, addens sub finem commentarij: *Porro & in adultis casu frequentius videntur lapides in renibus crebro generari conspeximus.* Sed hoc nihil ad rem. Vt autem liberè dicam quod sentiam, mihi admodum mancus & minutus videtur Galenus in ratione exponenda cur potius in renibus generetur lapis in viris, in pueris in vesica. Hoc commentatione & dignissimum est, & cognitum difficillimum. Et cum hanc aggreditur disputationem Galenus aureos montes pollicetur, sed inde nascitur mus ridiculus. Nonnullam enim operam impendit in refellendis aliorum rationibus: sed sensa mentis non reclusit. Causari enim imbecillitatem vnam & crudelitatem, idque dubitando tantum, in viris vt potius renes calculo obfideantur, iuuenile hoc est, & tanto indagatore & demonstratore indignissimum. Ego verò cau-

114 CONSILIORVM MEDICINALIVM

farer potius acrimoniam caloris in viris, quam quicquam aliud. Nam cum arefactionis & digestionis modo cogatur lapis in materia crassa & cruda, causa efficiens est calor acer, mordax, digerens, arefaciens, qui quoniam in adultioribus viget magis, 16. (in pueris enim est halituosus & blandus) & praesertim in magnis venis, & in renibus; ideo ex facili & cruda materia coagmentatio fit. Quoniam verò ista acrimonia in pueris non adest, elaboratur materia fusa à blando calore; sed quoniam crassitudo magna urinae, sepositis partium excrementis in vesicam, quod fit ab acrimonia caloris in renibus virorum, non tantà existente materiâ, idem fit non tam ratione causae efficientis in vesica puerorum, quam occasione materiae. Sic in illis habenda potius ratio causae, quam materiae: in his, contrà. Accedit quod vino vtentes multa in renes deuehunt: item varietate ciborum delectantur, caseis, leguminibus, & id genus aliis vtuntur: hos autem calculis obnoxios videmus. Quanquam & *idcirco* à parentibus orta latenter & clam nobis multum iuuat.

Horum examen diligentius à nobis factum est, quoniam & ad diagnosin, & prognosin, & therapiam apprime videntur pertinere. Nam cum & locus sit diuersus in quo generetur lapis, & materia diuerso modo affecta sit, & causa efficiens, alias calor moderatus, alias calor acer dicatur: item & in aliis atque aliis corporibus generentur, inquirendum de iis fuit antequam legitime medicina adhiberi possit. Accedit quod diuersa sunt tempora lapidis, pro quorum distinctione alia atque alia remedia vsurpantur. Nam nisi haec omnia distinguantur, eo modo quo circumforanei & periclitatores vitam in discrimen adducemus. Nemo est qui audito lapidis nomine, non statim ad diuretica, & decoctum apij, petro. canis-rubi, bardanae, argentariae, seu argentinae recurrat, & in his magnum vitae ac curationis praesidium collocet. At si corpus biliosum, si renes praecalidi, si corpus excrementis scatet, si lapis factus iam est, quid proficient? Indurabitur lapis, corpus in febrem coniicietur, deuehentur sordes ad locum patientem, & aliis incommodis corpus grauabitur. Quo loco subit mirari errorem Fernelij, qui omnis lapidis originem à renibus repetat per generationem arenularum, arefactionem, calcificationemque maximam; quasi verò in pueris eodem modo cogatur; quasi verò in senibus ita fiat & in pinguibus? Diuersa ratio, diuersi loci: ergo idea remediorum diuersa. Ac ne quis

parui momenti hoc esse putet, nihilque interesse siue primò in rene, siue in vesica generetur, errat si id credit. Et aliis topicis, aliisque remediis agendum, ne temerè pars remediis fatigetur, quæ nihil viti, contraxit. Si enim omnis à rene lapis, huic primò occurrendum. At quis adeò iuuenis & hebes, qui in obæfioribus, & pueris ad renes currat, & non potiùs de vesica sit sollicitus, deque toto corpore in quo multa excrementa congeruntur? Ergo explodi debent eæ rationes quæ tam turpiter nos in ignorantiam traducere possunt: ac potiùs in veterum vestigiis manendum, quàm cum nouis neotericorum inuentis errandum. Non quin posterorum labor meritâ laude fraudandus sit: sed iis aut est cum veteribus sentiendum, aut firmioribus rationibus noua dogmata sunt stabilienda.

In calculo spectatur generatio, transitus, & mora; Græcis, *γενεσις, μεταβολή & διαμονή*. Rursus aut curatio, aut præcautio. Sæpe cum formatus lapis, irrita sunt remedia, quod dum frustrâ aut deturbare, aut comminuere lapidem volumus, sæpe malum augemus, fusâ, liquatâque nouâ materiâ, eâque ad renes deuectâ. Cum præcautioni locus est, blandis ac lenientibus agendum, ne dum materia impetu mouetur, dolores qui priùs erant aut exigui, aut nulli, excitet ac irriter. Cum curationi, videtur Hippocrates vehementioribus uti, vt veratro. Quanquam dicat quipiam, non proinde sequi vt vehementius medicamentum usurpemus, quod Hippocrates huius meminerit. Nam lib. 6. Epidem. etiam dum de puellis repurgandis agit, meminit elaterij. Sed verba Galeni satis indicant, etiam intelligi posse satis validum medicamentum, alioqui reiecisset, & de leniente medicamento præscribendo cogitasset. *Iuuenes*, inquit, *veratro purgandi, consilio Hippocratis, cum antiquus affectus est, & quasi vectibus extrudendus*. Quanquam idem hoc præceptum etiam ad omnes affectu renum laborantes extendit: immò duo momenta curationis omnium morborum renum præscribit; tametsi, ait, veratrum non detur ob crassorum humorum attenuationem, & corporum in renibus contentorum, vicinorumque solidorum mollitiem & laxitatem. Quod diligenter notandum.

Porro non per omnia tempora lapidis dolor est: sed dum generatur, & transit, dolor acutus, dum manet grauis. Vtrumque dolorem explicat vno verbo communi Hippocrates: *ἰνὴν ὀδόν*, & propriè *εὐρεῖαν*, cum dolor grauis. Nam Galenus argutè

Commē.
in aphorism. 6.
sect. 1. 6.
Epid.

vide cap.
4. lib. 2.
de loc. aff.
item cap.
2. lib. 6.

116 CONSILIORVM MEDICINALIVM

sensus cuiusdam ponderis est, sub nomine & *Cu' eius ed. vns* completur. In eodem corpore renis & grauis est dolor, & acutps. Grauis, cum caro eius afficitur aut obstructione, aut inflammatione: obstructione, vt cum infossus illi est calculus.

*Comme
in aphor.
5. lib. 6.
Aphor.*

*Eod. Co-
ment.*

S' inquit Gal. carnosam renem inflammatur substantia dolor grauis est ac si sensus ponderis adesset. Quod mirum est. Nam sine tunica non videtur inflammari posse ren. Quod si tunica patitur, eodem teste Galeno, acutus est. Nam proprie acutus aut cum arteria, aut oscilla vasorum, aut venter renis, aut tunica patitur. Idem censet de affecto hepate, contra multorum sententiam, existimantium quomocumque affectum sit hepar, sensum tantum grauitatis inesse: sed toto aberrant caelo.

*Cap. 11.
lib. 6. de
an. in ed*

His ita positis, videndum quam aberrant qui omnibus calculosis omni tempore diuretica prescribunt, sanguinem fundentia, & liquantia, omnibus corporibus, omnibus aetatibus, omni tempore, nullam factam obseruatione eorum quae dicta sunt. Ac primum sententiam Galeni docendum quam grauiter peccent plerique, qui promiscue omnibus calculosis calida, acrimaque prescribant: Primum eo in capite contra omnium opinionem censet nihil eorum quae valde calfaciunt, calculosis villo modo conferre. Et notat historiam cuiusdam hominis biliosi calculo laborantis, cui cum Medici calida prescripsissent, tandem in marasum coniecerunt. Et ita contigit, vt motus digitorum & manuum quodammodo praeficitate impedirentur, ita vt ossa cauum sonarent. Quod cum contigisset, alij multo imperitiores Medici paralyticon esse putabant. Galenus in crassis & pinguibus attenuantem videtur rationem quidem admittit: sed quibus contrario modo affectum corpus in iis contrariae sunt indicationes: vna a corpore squalido, siccoque, altera a poro seu calculo. Hic attenuans & incidens requirit, illud tum ratione totius corporis, tum ratione intemperiei renum, contrariam rationem demonstrat. At iam demonstratum maximam partem

*Cap. de
pancloro
lib. 1. &
cap. de
caesio, 13
Cap. 11.
lib. 6.*

& biliosos esse calculosos in renibus, si quid deliquerint, & a calore igneo vrentque renum calculos cogi, vt duobus locis praeter ceteros demonstrat Galenus libris de Alimentis. Quodnam ergo operae pretium facturos putamus eos qui speciosè sua diuretica venditant? Itaque optimum consilium Galeni, in lib. de sanit. tuend. vnam eandemque rationem & affe-

etui & corpori est providendum. Affeui, non præscribendo ea quæ viscosi sunt succi, vt etiam sunt carnes volatiliū domi nutritorū. Quod notandū. Valent autē hordeata, volatilia pisces saxatiles. Omnia à lacte temperandum, præterquam ab asinino: omnisque victus ratio ambiget inter impinguantem & extenuantem. Quod optimum consilium cui si omnes adhereremus, non ita turpiter in multorū caput ignorantia nostra redundaret. Satis est hæc notasse. Nec enim consilium est omnē tradere rationē præcauendi, curandique calculi.

Tantum illud narrare oportet, cur Galenus statuens distinctionem inter arthritica & diuretica medicamenta, dixerit nil eorum quæ vehementer exalfaciunt, vilo modo calculosis esse præscribendum. Nam parum sibi omnino constare videtur. Nam diuretica esse vult quæ & acrimoniam & calorem habent plurimum, vt Imyrnium, petro. daucus, fefeli, phu, azaron, acorus; quibus omnibus magna inest acrimonia. Omne diureticum fundit, & secernit, quod absque immenso non fit calore, ait Galenus: & propterea illa thoraci inimica, quod crassiores redderent materiam ac contumaciorē. Sic tribus de causis aduersa sunt ea quæ vulgò diuretica; primum quia calidiora & sanguinem fundunt, secundò quia idem in renibus præstabunt quod in pulmonibus, nimirum secernendo serum, cōtumaciorē reddent materiam; propterea interdixerat 6. sanit. tuend. calculosis valdè calida & acria. Tertiò si Galenus acutè quidem dixerat idèò menses mouentia calidiora, acrioraque esse debere, factâ comparatione cum lac prouocantibus; quod in mammas & mittatur sanguis, & attrahatur: 17. vterus autem non attrahat, cum renes ex ceteris partibus attrahendi facultate plurimum polleant, quid opus tanto calore & tenuitate? At hæc discutienda sunt, alioqui errore non vacaremus. Quæ si à plerisque intelligerentur, non ita passim peccaretur ab iis qui quod audierint ab anubus aliquid diureticum esse, idèò id putant conferre posse calculosis. 18. Aliud est absolute dicere diureticū esse aliquid, aliud conferre mouendæ vrinæ, & deturbando aut deterendo lapidi, aut materiæ lapidis incidendæ. Quod vt intelligatur, audiendus Galenus. Ille quodam loco ait: Cum plurimam urinam ducere nitimur, acrioribus & exalfaci-

Gal. 19.
5.
de simpl.

Gal. 23.
lib 5. de
simpl.

acrioribus magis quàm qua sint in rebus vitandū. Nimirum fun-

118 CONSILIORVM MEDICINALIVM

dentibus & liquantibus & secernētibus, an hoc propter eā vult, ut dicat hæc calculosis conferre? Nequaquam. Sed ex hypothesi loquitur, si urinam multam ciere volumus. Propter eā eadem interdicat asthmaticis. Item cū alio loco loquens de acribus tenuis substantiæ collatis cum iis quæ sunt crassioris substantiæ (quorum vis perniciofa) ait, *Acria tenuis substantiæ vim habent mouendi urinas, sudores provocandi, conferunt expuitionibus*; an ea vtenda consulit? Nequaquam; sed vires eorum docet. nam alio loco illa non censet vsurpanda in asthmaticis, nisi cum forbitionibus. Et hæc ratio colligendi, venandique authorum consilij. Nam aliud est urinam prouocare velle, aliud expurgare velle, aliud calculum incidere, aut materiam tenuare. Quod Galenus ita abundè docet, Quæ renes expurgant, ea incidunt, verū largā humiditate non egent. Quæ callosas consistentias, *πρωσίδας πυκνὰς* vocant, incidere sunt idonea, & ipsa incidunt quidem, sed minimū caloris habere debent. Nam caliditas poro exiccando contrahit, non incidit, nec diuidit. Et apertius alio loco hoc explicat. Quæ non desiccant, & modicè excalfaciunt, lac generant: Quæ plus calfaciunt, non tamen valenter siccant, menses cient. Vtraque urinas prouocant. Item & ea quæ calfaciunt & desiccant: Et propriè quæ calfaciunt & desiccant, Diuretica vocantur; non quia sola moueant urinas, sed solas, non etiam lac & menses, vt dictum est. Qui locus notandus est. nam paulò post ea diuretica quæ & calfaciunt, & exiccant, ratione facultatis exsiccandi pulmonum morbis, & renum calculis non conferunt, ait Gal. quia nec calculi, nec asthmatici siccitatem postulant istam. Est ergo vbi diureticis locus est cū mouendarum urinarum occasio postulat: est vbi aliis diureticis vtendum cū de incidenda attenuandaque materia cogitatur: Est & vbi iis quæ *ἀρρηκτὰ* dicuntur propriè, non *διυρητικά* locus est, quorum vis paret in leniendo, vt est quatuor seminum frigidorum maiorum, maluæ, bismaluæ: quibus omnibus magna vis est in calculorum obsidione, vel potiùs renum. Nam cū calor est igneus, acerque, ad ea potiùs recurrendum, quàm ad ea quæ & calfaciendi & siccandi vim habent, proprièque Diuretica dicuntur.

Hæc omnia eo consilio à me dicta sunt, vt ratio conueniēter cuique medendi teneatur: ne temerè periculatorū more iis nos vitā dedisse existimemus, quibus nostris temerariis auxiliis non

ademerimus. Illud enim dolendum ac miserendum ita saepe contingere vfu auxiliorum nostrorum, vt cum frustra pollicemur exturbationem calculi vfu calidiorum medicamentorum, arenulas multas excernentes, hac inutili fortuitaque excretionē agros recreantes, contumaciorem multò calculum reddamus. Carē enim emitur tantula hæc excretio, quam natura per semoliri posset. Multa porrò remediorum exempla statuemus, quibus non est temerē in quibusvis vtendum: sed ad eas regulas & canones sunt reuocanda, quos longā orationis serie sumus commentati.

Cum dolores vrgent, valet id quod sequitur.

℞ succi amygdalar. dulcium sine igne extracti ℥ ij. emulsionis semin.

4. frigidorum maior. cum aqua & vino albo extract. ℥ ij. s. fiat potus.

℞. Symp. de raph. de 3. radicib. & capill. ven. an. ℥ j. pulu. triasant. simpl. ℥ j. pulu. lumbric. preparator. 3 s. cum triplo decoctionis radic. aper. fiat potus.

℞. semin. milij solis, bipin. bardane an. 3 s. lapid. iudaici 3 j. nucleorum mespil. herba iudaica, spina burg. an. 3 j. cinn. 3 s. sacchar. ros 3 j. fiat puluis.

℞ vini mal. ℥ iiij. olei nucum ℥ ij. confect. de baccis 3 j. cum decoct. remoll. fiat clyster.

℞ rad. bard. asparag. gram. cypp. an. 3 s. beton. bismal. totius, an. m. s. sem. milij solis, aspar. melon. cucum. an. 3 j. s. passul. 3 j. ficus num.

6. fiat decoct. ad quart. tria. In colat. dissol. Syrup. de raphan. oxymel. scyl. an. 3 j. sacchar. 3 iiij. fiat Syrup. in modum apozem. aromatiz. 3 j. s. cinn.

℞. rad. gramin. & petros. siccatarum & pulueris. an 3 y. nucleor. mespil. 3 iiij. sem. melon. cucum. an. 3 j. s. sem. mal. bard. & milij solis an.

3 j. sacchari candi 3 ij. liquir. 3 ij. florum beton. 3 ij. fiat puluis. Capiat 3 ij. post vsum cassia.

℞. aq. distillationis terebint. 3 y. vtatur cum aqua. bipin.

℞. rad. cypp. gram. an. 3 s. summit. alib. vritic. herniar. beton. an. m. s. sem. melon. cucum. an. 3 y. sem. milij solis 3 j. gran. alkck. 3 j.

fiat decoct. in qua dissol. Syrup. de alib. & capil. ven. an. 3 j. s. fiat apozema.

℞. ol. de sem. lini & lilior. & amygdal. dul. an. lib. j. decoct. sem. lini, alib. melilot. florum viol. si symb. aquat. qu. suff. pro semicupio.

℞. medull. cass. 3 ij. axungia cunicul. ol. amygd. dul. & de scorpion. cum medul. panis dissoluit in lacte. fiat catapl.

In summo dolore inferioris partis spinæ & lumbarū in colica nephritica.

℞ palea hord. ros. rubr. an. p. j. tarsi barb. p. j. fiat decoct. in lacte. In colatur. dissol. vitellos ouorum.

℞. malu. bismal. flor. chamem. meliloti sisymb. aquatic. foliorum raphan. petros. macedo. an. m. j. rad. lilior. alth. gram. petros. an. ℥ ij. sem. lini, fœnugr. alth. raphan. an. ℥ s. fiat decoct. passetur. In passatura adde axung. cunicul. anat. an. ℥ j. s. olei scorp. qu. suff. fiat catap. pro pube & renibus.

℞. aqu. destill. terebinth. & parietar. an. ℥ j. s. sacch. candi ℥ j. Cap.

℞. mith. ℥ s. conser. buglos. & capill. ven. an. ℥ j. Capiat bolum.

℞ conser. capill. ven. ℥ j. electuar. lithont. diatrag. an. ℥ j. Capiat parum vini vna.

℞ rad. petro. aspar. fœnic. gram. rub. tinctor. an. ℥ j. polypod. ℥ ij. sem. melon. cucum. bard. basiliconis, saxifrag. milij solis, alkek. an. ℥ ij. conseru. capill. ven. cichorij, ceterach, buglos. an. ℥ ij. puluer. diamatg. diatrag. ras. ebor. cornu cerui, an. ℥ j. aque decoct. duarum perdicum, & caponum duorum, cum mica panis quant. suff. Fiat destillat.

Citria incisa duo aut tria misceri possunt.

℞ succi corticum, raphani ℥ j. s. succi limonum ℥ s. Syrup. de althea ℥ j. vini albi ℥ ij. terebinth. vsta & pulueris ℥ ij. fiat potus.

℞. rad. rub. maior. gram. acetosa, aspar. raph. petros. fœnic. macedon. bard. flor. genis. an. ℥ s. beton. adianth. ceterach, saxifrag. argent. an. m. j. summitatum vrtic. agrest p. j. cicer. rub. milij solis, an. ℥ s. alkeken. gr. 15. semin. raph. vrt. mal. an. ℥ ij. fragorum mororum rubi. idej, an. ℥ ij. succi ceraforum ℥ ij. Fiat decoct. In colatura dissol. sacchari albi lib. j. s. fiat syrupus.

℞. ol. sem. lini lib. j. terebinth. ℥ j. s. mellis ros. sacchar. rubr. an. ℥ j. Fiat clyster.

℞ parietar. beton. fœnic. alth. gallit. alk. an. m. j. rad. cypp. petros. macedon. bard. flor. genis. an. ℥ j. s. milij solis, rad. althea, glyc. an. ℥ j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissol. syrup. de bis. de raphan. & oxymel. simplic. & scyllit. an. ℥ j. s. Fiat apozema. Itē catapl. ex pariet. berul. petros. maced. caulibus malu. bis. semin. lini, fœnugr. rad. lilior. floribus mel. chamem. contusis, additā axung. gall. porci, cum ol. amygdal. dul.

℞ corall. veriusque, cinam. margar. elect. cornu cerui, an. gr. ij. Syrup. de limon. oxyf. simpl. an. ℥ s. aqu. buglos. & card. ℥ ij. fiat. pot. ℞ syrup. de raph. & alth. an. ℥ j. aque acetos. & chamem. an. ℥ i. s. fiat dosis.

℞ Enul. camp. mund. ℥ iij. coque in duabus lib. vini albi, donec ad ℥ xij. redeat. Capiat quotidie unc. duas pro dosi, cum ℥ s. Syrup. de raph. & Con.

℞ confer. rosar. symphy. an. ℥ s. margar. elect. cinam. cornu cerni, coral. rub. an. gr. ij. trochisc. alkek. ℥ s. cum sacch. ros. fiant tabellæ.

℞ alih. tot. foliorum acetos. an. m. j. sem. melon. genist. gallit. asp. an. ℥ ij. sem. milij ℥ j. s. rad. lapat. acut. cichor. an. ℥ s. pulp. tamarind. ℥ s. hordeip. j. florum genist. p. ij. fiat decoct. ad ℔ s. In colat. infunde cas. non mundatæ ℥ ij. s. bulliant parum. In express. colat. per setaceum dissol. syrup. de alih. hyf. & oxymel. scyll. an. ℥ vj. sacchar. cand. ℥ ij. fiat apoz. clarif. aromatiz. ℥ ij. cinam. pro duabus dosib.

Litus ex mucaginibus & adipibus predictis in magna quantitate valet. Et quia imbecillior redditur ventriculus, sub horam somni valet syrup. de absynth. cum aqu. card. & scabiosa, iteratus sepe.

℞ succi granat. succi lyman. & vini albi an. ℥ s. ambr. gris. gr. vj. fiat potus. Item bolus cum theriaca & mithridat. & syrupo de papauere.

℞ terebinth. ℥ ij. zedoar. pulu. ℥ j. cum diatrag. frig. fiat bolus.

℞ mal. vtriusque, pariet. florum genist. an. m. ij. nasturt. capill. ven. m. j. calamenth. an. p. j. cicer. rubr. ℥ s. fiat decoct. ad ℔ s. In col. dissol. syrup. de althea & de 5 radicib. an. ℥ j. s. milij solis puluer. ℥ i. s. fiat inlep. capiat in exitu bala.

Limatura ligni sancti non est aliena ab usu in lapide, præsertim ad renuandam crassam materiam quæ cum committit. Idem olim hic Symplicius commodè præscriptus est. ℞ limaturæ ligni sancti quart. j. corticis eiusdem ℥ j. macerentur per horas duodecim in aqua fluuiialis lib. iij. deinde adde polyp. ℥ ij. rad. enul. camp. sicca & contusa ℥ s. fiat decoct. ad medietatis consumptionem. In colatura depurata infunde folior. senæ ℥ iij. fructus alkekengi in vino albo per noctem temperatos num. 20. turbib. ℥ s. bulliant: seruentur ad usum.

℞ sem. saxifrag. glyc. an. vnc. s. sem. carui, genist. petros. macedon. dauci brus. aspar. lenist. anisi, tunip. rute, sesel. filer. mont. acor. baccar. laur. an. ℥ ij. azar. carpobal. cas. lig. granorum hedera, sanguinis hirci prepar. xylaloes an. ℥ j. s. lapid. lyncis ℥ ij. zinzib. turbith. an. ℥ ij. folio. senæ ℥ j. Fiat puluis, de quo fiet electuarium per tabellas pondere vnc. s.

℞ rad. intyb. oxal. gram. aspar. brus. polypod. sem. carth. vuarum damasc. an. ℥ j. bipinel. adiant. trichom. lupul. aspar. mal. pariet. an. m. j. agrimon. beton. holeriana, borag. buglos. an. m. j. fructus hali-cac. nu. 12. semin. 4. frigid. mator. apy, saxifrag. petro. milij solis, althea, an. ℥ ij. florum spart. violarum, anthos. an. p. s. florum chamam. p. j. Elixentur omnia artis ordine. In colat. ad lib. j. dissol. syrup. de radicibus de alih. & rapban. an. vnc. j. Fiat apozema in 4 doses: adde my-

xariorum zizyph. an. nu. 14.

Rad. alibea, acetosa, petro. an. ℥ j. f. corticis burg. spina ramuscu-
lorum eiusdem, limatura ligni sancti an. ℥ j. cort. rad. capp. ℥ B. anisi,
fœniculi, lithosper. hypericonis, sem. cucum. cuscuta, citrj, an. ℥ iij. solior.
alth. m. 4. beton. violar. malu. viriusque, adiant albi, asplenij, cuscuta,
an. m. j. intyb. sativi, latifolij, seridis, eupatorij, an. m. f. passul. integr.
zyziph. num. x. fructus halicacabi num. xxx. florum beton. hyper. mal.
alth. vel cichor. an. ℥ ij. fiat decoct. ad lib. duas. in colat. dissol. sacchari
albi lib. j. f. syrup. de lymon. acetos. simpl. an. ℥ ij. fiat syrupus.

Rad. maratris petroselini an. ℥ j. f. glycyrr. ℥ s. pass. mund. cicer. rub.
an. ℥ j. f. sem. anisi macedon. ameos, milij solis, an. ℥ iij. fiat decoct.
in vini albi veterrimi, & aqua an. partibus aequis, ad tertie partis con-
sumptionē: dulcoretur oxymelitis diuretici ℥ iij. Capiat singulis matutinis.

ANNO TATIO.

1. Non omitti debet illud quod Gal. scripsit in comm. lib. 4 Aphorism.
de grumo sanguinis, & capillamentis, præsertim quibus fuit usus faba-
rum & orobi.

2. Non solum alimentorum varietas confert ad cruditatem, & proinde
ad generationem calculi, sed etiam aquarum. Quod minus probabile vi-
deretur; siquidem aqua nil corpulentum habent cuius occasione concretio
feri possit. Tamen eam aquarum varietatem conferre ad generationem
calculorum, Hippocrates primus scripsit lib. de aëre, locis & aquis, cum
scribit eos calculo obnoxios fieri, qui aquas bibunt de magnis fluviis, in
quos derivantur alij. Nam, inquit, aqua aqua similis esse non potest: ac
neceffe unam præcellere præ aliâ. Vnde concludit ex ea varietate magnum
sequi incommodum. Et quod de aquis dicitur, idem de esculentis intelli-
gi potest. Itaque magnus debet esse delectus aquarum & ad præcautio-
nem, & ad curationem calculi.

3. Cum hoc scribat Galenus, miror quod in mentem venerit Gorrao Me-
dicarum Definitionum autori, ut interpretans τὸν ἑστὶν ἀδύνατον dixit athi-
letas ut robustiores evaderent, solitos assumere cibos quoslibet, nullo ordi-
ne, nullâ lege. Hac enim pugnant iis quæ dicuntur à Galeno.

4. Attendere oportet ad locum qui scriptus legitur lib. de flatibus, apud
Hippocratem, quo explicat quâ ratione fiat ut ciborum inequalitas sedis-
tionem & tumultum in ventriculo faciat.

5. Pus quod à renibus & superioribus manat partibus, & à vesica, in hoc
distinguitur, quod pus à renibus manans totum, toti urina confusum est

Et refractum in partes ob viæ longitudinem. Quod à vesica, ut à loco propinquiore quodammodo est integrum & rotum, & in se conglomeratum coactumque, quod Græcis dicitur ἀσπύον, siue ἀσπύον ἐκκρίσιον. Ita Galenus in libris de locis affectis distinguebat deiectiones dysentericas à superioribus aut inferioribus intestinis, quæque ab his forent, pus contineant non admistum: Contrà iis sese habentibus quas superiora intestina excreuerunt. Hoc præterea abundè explicat Galenus comm. in Aphorif. 35. lib. 7. Quibus insidens pingue & simul totum, ἀσπύον Græcis, iis renum vitium acutum significatur. Comparatur enim urina colliquatina partium superiorum, cum urina colliquatina renum, & vesicæ, si ita lubet. Nam quando adeps cum urina à partibus rene superioribus excernitur, is paulatim nec simul totus excernitur; sed cum à renibus est, quia breuiter sit excretio, simul totus est. Et hoc est signum ἀσπύον.

6 Galenus comm. in partic. 6. sect. 1. lib. 6. Epidem. textum hunc probat, & conceptis verbis exponit eo modo calculos in renibus gigni posse, qui ab Hippocrate est præscriptus. Quanquam probat magis ab arefacta pituita cogi ac concrefcere.

7. Aphrodisæus vult & senes & pueros calculis magis obnoxios, problem. 41. sect. 2. sed hoc minus verum est præsertim de senibus. Inter cetera occurrit locus in Coacis aduersariis quo scribit Hippocrates à quadragesimo anno ad 63. non fieri strumas in senibus, nec lapidem in vesica, nisi prius existat. Vbi vititur verbo ἰσχυρὸς, quod fieri, generarique significat. Ergo contra Fernelium, lapis fit in vesica.

8. Si quis putet illud uerbum ἰσχυρὸς intelligi cum urina è vesica excreta est, nimium reliquo excremento in vesica remanente tanquam lapidis materia, illud probabilitatem habet. Sed magnā habet difficultatē quomodo intelligatur illud uerbum ἰσχυρὸς. Si enim nomen ἰσχυρὸς sumatur pro actu meiendi, in utroque loco, videtur hic sensus minus quadrare. Nam dicere ante actum meiendi fieri concretionem in viris (ut Galenus vult) id est ante actum meiendi hoc ut nō verisimile habet, ita nec dignum est ingenio Hippocratis: ideo melius interpretari oportet utrumque, ut hoc loco sumus interpretati.

9. Quis enim dubitat quin quidam in renibus calorem habeant ex enēnis, calor est augmentum. An tunc refrigerantium usus tutus est.

10. Et Galenus 9. Method. cap. vlt. citra calorem non potest digeri in halitum corpus ullum manente substantiā compactā. Non tamen per calorem omne, sed quod aptum est in halitum digeri, ut humidum.

11. Nam Galenus ultimo cap. lib. 9. Method. lapidum substantia constans stabilis que propter siccitatem, & frigus est. Sic & materie ipsius fri-

124 CONSILIORVM MEDICINALIVM

giditas, & aliquantula vesicæ frigiditas non potest non conferre ad generationem lapidis. Sed de renibus potest dubitari. Nam in calidissimis con-
guntur lapides tantum, ut omnes volunt.

12. Non est æquum ut aliquis videatur doctior aggredi clariores & do-
ctiores sine causa, vel ut detrahatur eorum laudi, vel ut ambitioni nostra
satis fiat. Itaque si quando excusare nos velimus quod in Fernelium scri-
bamus, accipiendum erit exordium libelli Gal. aduersus Iulianum, inter
libros extraordinarios.

13. Hac in pagina docemus in multis corporis humani partibus cal-
culos posse generari: quod tamen impugnat Galenus. Et mirum, tantum
virum hoc non obseruasse. Ille cap. 5. lib. 1. loc. affect. disputans de iis af-
fectibus qui his aut illis (olis) partibus contingunt, ait suffusionem solis
oculis contingere, & lapidem solis renibus & vesicæ: quamquam ex quo-
rumdam opinione dicit in colo nonnullis lapidem repertum esse.

14. Quidam appositè & contra sententiam Fernelij dicunt colorem
arenularum & lapidis non indicare locum in quo generatur lapis, sed po-
tius materiam ex qua. Fieri enim potest ut in vesica rubens materia co-
gatur.

14. Contra Gal. cap. 5. lib. 1. de locis affect. ut ramentum ulceris signi-
dat, ita & sabulosa urine lapidis sunt argumentum.

15. Dicimus in vesica fieri lapidem, in renibus calculum & arenulas.
Lapis, quia quod est durius & grandius, locum tenet medium inter are-
nulas & calculum. Nam materia lapidis durior est quam arenularum &
calculi.

16. Mirum cur hic dicat Galenus utrum non attrahere. Nam Hip-
pocrates lib. de vet. med. ait vesicam, caput & utrum semper attrahere,
& plena esse humiditatis.

17. Disputationem de diureticis, menses mouentibus, & lac generan-
tibus, Manardus prosequitur epist. 5. lib. 11. Epistolarum.

CONSILIVM XXXIII.

De Epilepsia.

AD MIRABILES naturæ conatus sunt in morbis profligan-
dis. Nec enim solum depulsa longè materia natura sola-
tium quærit, sed sepe excusâ in partem ipsam affectam materiam.
Quod ne cui mirum videatur, huc celebris historia Equitis

Torquati pertinebit. Hic cum crudelissimis Epilepsiæ insultibus sæpe decuteretur, suppetias nulla ex parte nactus est. At quod iuâ prudentiâ & consilio ars medica non consequitur, id instinctu solo bruto natura aptissimè contigit. Nam cum furibundum reddidit, furendi tandem & breui tempore finis fuit. Ab eo tempore epilepsiæ molestias non sensit. Et illud est quod scriptis celebravit Hippocrates, *Epileptici sunt melancholici, & contrâ.* Sed illud maiore admiratione dignum videtur, quod ab Hippocrate scriptum est, *A furore difficultas intestinorum, vel aqua intercus, vel mentis alienatio, bonum.* Quomodo fieri possit ut mentis alienatio furori succedens, bonum sit, & furendi finem faciat? Nam alienatio mentis furoris videtur, & reverâ est incrementum, ut etiam asseuerat Galenus. Item mentis alienatio, continuus definitur & vehemens furor: Ergo tantum abest ut bonum signum existat, ut contrâ, pessimè agrum furentem afficiat. Mentis alienatio *ἐκκέντησις* Græci vocant, fit confertim lato humore bilioso per omnes partes cerebri. Et cum aliqua ex parte affectum esset cerebrum, unde furor simplex adesset, conatu ipsius naturæ, orgasmo ipsius materiæ *ἀπὸ τοῦ πλεονέκτου* succedit *ἐκκέντησις*, quod quodammodo criticum est. Nam si natura valida est, si cerebri temperies bona, & quæ ab impetu pessimi illius humoris tantum sit alterata, non autem alienata; futurum est ut breui tempore sequatur solutio furoris. Ita nimirum in morbis acutis (ait Galenus) terrifica symptomata ac vehementissima subito oborta crises salutes inuehant. Sæpè enim id quod imperita stoliditati terrori est bonâ spe nos consolatur. Hoc notatum volumus, quod Commentarius Galeni ea de re scriptus admodum obscurus sit, & mancus.

ANNOTATIO.

^{1.} Simile quid in Coacis. In furiosis conuulsio accedens solutionem facit.

^{2.} Mirum quomodo aqua intercus furori succedat. Nam materia furorem faciens pauca est & biliosa, quomodo hydropem accersit? Notatu dignum hoc est. Quemadmodum & nos epilepticum piscatorem factum observauimus, qui esset hydropicus, à translatione materiæ ad caput. Nec interit tamen; quamquam dicat Galeni præceptor Hippocrates, Ab hydropico epileptici perniciosum, in Coacis. Tamen in libro de locis, in homi-

126 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ne apud Hippocratem legimus à cerebro hydropis generationem aliquando pendere, quod sit materia quadam in cerebro contenta, in eo quadam excitans symptomata, in partes inferas feratur, potest in his aut hydropem, aut quid simile accersere. Non quòd inde hydrops propriè dictus consequatur, sed species hydropis, aut tympanites, materiâ nimirum existente furibundâ & flatuosâ. Quidam vt istum aphorismum excusent, dicunt non legi id est, sed id est, id est sudor. Et Hippocratis locus est præclarus, sect. 5. lib. 2. Epid. ubi annotat quomodo epilepsiam mania soluit.

CONSILIVM XXXIV.

De Alui fluore.

IN morbis multa contingunt, quorum obscura ac implicita est adeò cognitio, vt acutissimorum Medicorum aciem eludat. Quod non modò in acutis vsuuenit, in quibus exiguis interuallis magnæ mutationes incidunt, sed & in longis, immò in longis tantæ sæpe occurrunt difficultates & latebræ, vt licet eorum, autoritate Galeni, causa sit fixa stabilisque, sub obtutum tamen oculorum non cadant, nec mente comprehendantur. In eiusmodi autem, meo quidem iudicio, plus natura quàm ars potest; vt non sit mirum si olim Chirurgiam licet artem mechanicam, præclaræ arti Medicæ prætulerint, immò hanc præ illâ nihili duxerint. Quinetiam Chirurgiæ euidentem profectum esse volunt, quòd ea quæ manu administrantur sese offerant ac promittant. In medendi arte, quæ ratione & agitatione assidue mentis nititur, fortunam dominari contenderunt, quòd in longis morbis si quid voto respondeat, id naturæ, quæ temporis flexu cursuque morbi victrix est, attribuendum sit. Nam quod ars vno veluti impetu agit, id natura cunctando ac tardando foelici successu consequitur. Tamen vt arti nimis multum attribuere, cum in multis manca sit, ac deficiat, vitio non caret: ita tantum ei detrudere vt nil possit ipsa per se, errore non vacat. Atque vt quæ paulò antè dicuntur generalius, in angustum cogantur, exemplis appositis magis elucebunt. Eorum autem explicatio ac enodatio magnum ad bene medendum adiumentum afferret. Ita enim & morbi longitudinem artificiosè prædicemus, & non frustrâ medicamentis ægros exercebimus, cum materiæ

mitificatio expectanda sit. Miratus sum sæpe ægros conqueri de dolore ad orificium stomachi, cuius doloris circumscriptio brevis admodum est, nec explet latitudinem duorum digitorum. Purgationibus non iuuantur multum: vomituriunt: pulsum habent languidum: corpus pigrum ac iners: noctes insomnes ducunt. Ventre plurimum sunt astricto, immò præ dolore superior pars hiat: inferior astringitur. Superioribus paginis annotatum est de quodam, cui dolor fixus erat ad regionem stomachi, quem nullâ ferè arte sedare ac compescere potis fuit. Plura illò loci sunt legenda. Non ita pridem Piscator post ærinas aliquot & labores incidit in febrem ferè typi expertem. Sæpeleipthymia præhendebatur. Quadraginta penè dies laborauit: summa virium ruina: partium extimarum refrigeratio. Hinc aluus subducta est excrementis modò liquidis, modò chylosis, & muccaginosus. Incredibile dictu. Tribus aut quatuor diebus tres & quinque pelues satis capaces implebat. Non alleuabatur. Perpetuò aluus, siue ventriculus ei laborabat. Profluuiū hoc aluinum nobis videbatur veluti leientericum à muccaginosi humoribus, corrupto chylo, ac fortè totum corpus exonerabatur modò roborato ventriculo, modò rhabarbari vsu alleuabatur. Et cum cogeretur ad prima munia redire ob egestatem, agebat quidem sine decumbendi necessitate: tamen & pallor, & sitis, & partium imbecillitas remanebat, immò & deiecta appetentia. Quæ omnia morbi relapsus ob reliquias designant. Percipiebatur dolor ad eam stomachi regionem quam prædiximus. Tandem provocato vomitu, & aliàs sponte naturæ excitato, excreta sunt biliosa, viridia, glutinosa admodum, & quæ in longum ducerentur facillè. Sic alleuatus est. Vbi locorum tanta materiæ copia continebatur? an in ventriculo? fieri non potuit: sed in partibus vicinis ventriculo, à quibus tandem à natura victus, cum alioqui coerceretur in angustiis, ad eam capacitatem raptus est humor; hinc doloris sedatio aliqua cōtigit. Robertus Sangermanus Regi à secretis, dolore intolerabili cruciabatur: colicam falsò putabant. Erat conclusa materia eo modo quo in superioribus æruginosa, acris, præsertim æruginas & mæstitiâ secuta: dolores repetebant ex intervallis: nō eos ferendo. Medici rati colicos esse dolores, calidissimis illū frustra exercebāt: & quoniā vomebat perpetuò, styptica foris admouebant. Alij postea mitius egerunt, & materiam illam efferam

sibi aliquam cystin machinatam fuisse crediderunt: ita blandis
 ac temperatis vtentes medicamentis, eduſta vomitione est bi-
 lis vitellina, putris. Allevatus est, & ſanitati reſtitutus. Eum
 morbum rariffimè in homines inuadere dicebant. Tamen Fer-
 nelius tale aliquid ſub finem febrium & morborum typicorum
 contingere aſſeuerat. Item vidua in clauſtro Eccleſiæ Pariſien-
 ſis commorans, mater D. Ellenij clariffimi collegæ, cùm agerè
 coniugis ſui vicem doleret, præ mœrore in morbum incidit
 qui clariffimis Medicis admirationem excitauit. Expers erat
 febris: Ex interuallis ſentiebat aliquam auram venenatam ab
 infimis partibus tiliarum: deinde ſtuporem: tum dolores ad
 ventrem ſuperiorem à ventriculi regione ferè ad vmbilicum
 paulùm ad lienem declinando: tunc ſine voce & reſpiratione
 decumbebat: cum ſudoribus, defectione pulſus, palſitatione.
 Duodecim horas paroxyſmus perſeuerabat. ³ Morbus hic an-
 num & plus eo afflixit. A paroxyſmo erat ſatis alacris, ſapor &
 guſtus toto morbo aderat quaſi æruginè & æs deguſtaret (quod
 notandum). Difficilis admodum fuit inueſtigatio illius morbi.
 Quidam ex Medicis affectionem hyſtericam putabant: alij
 relictum eſſe aliquid ex purgamentis ab aliquo partu. Alij con-
 tortionem vteri eſſe. Conſultæ obſtetrices. Tentata & explo-
 rata res eſt: nihil omninò alienum in illis partibus inuentum eſt.
 Tamen quotidie per merenchyten iniecta ſunt vterina. Per
 os, aqua vitæ aromatizata cinamomo. Nil profectum eſt. Ex
 Medicis oculatior fuit vnus, qui primam mali originem ab vte-
 ro non reperebat: ſed aut dicebat ſuſpicionem melancholiz
 hypochondriacæ, aut concluſam putrem, malignam & vene-
 natam materiam in hypochondriis & partibus vicinis ventri-
 culo, quæ non ita citò, ſed tempore vomitione excludenda fo-
 ret. Nec aliter contigit. Nam cùm diuturnitatis morbi omnes
 pertaderet, conſultum tandem eſt, vt recreatis paulùm viribus
 manè iniiceretur clyſter acris: tribus poſt horis, caſſia daretur.
 Natura irritata, ſuſum deorſum excreuit. Suſum quidem æ-
 ruginofam, pallidam, ac varij coloris bilem, & mixtos alios hu-
 mores adeò inſigniter corruptos & foetentes, vt nemo odorem
 ferret; immò locus totus inquinatus eſt. Ab eo tempore alleua-
 ta. Tamen perſeuerauit alui fluor continuis decem diebus. Ac
 pleroſque alios pari modo affectos vidimus, præſertim de oriſi-
 cio ventriculi conquerentes. An ybi dolor, ibi morbus? Ne-
 quaquam

quaquam. Id est, non est existimandum in illa tantum parte latere humorem: sed cum humoris pars in eam partem sese insinuet, alia hæreat in vicinia, in illa maximè parte sensus tristis percipitur, in qua exquisitior sensus est. Nam ferè fit vt eadem causâ partem vnam occupante, eius partis non tota moles patiatur: sed in ea maximè particula dolor viget, in qua exactius sensus iudicium. Ac (vt curationis earum rerum momenta attingamus) in eiusmodi morbis duo maximè videntur præstanda, vt leniter & blandè cum ægris agamus, & per interualla tantum. Quoniam quanto magis annitimur eam materiam amoliri, tanto contumacior redditur materia: immò id consequimur quod doctè admodum scribit Hippocrates 4 de Dieta acut. Qui inflammationem medicamentis nititur demoliri, tantum abest vt aliquid agat, vt & partem inflammatam irriter magis, & partibus sanis vicinis colliquationem cõciliet. Quid agas igitur? Sequendum est Hippocratis & Galen. consilium: Illius quidem, *ocula, non cruda monere oportet.* Huius verò: *Cum natura causis morboficis obruiur, estque humorum cruditas, non potis est quicquam salutariter excerni.* 4. Quod vtrumque consilium hodie nihili penditur: quia ne nihil agere videamur, remediorum inutilium, id præsertim temporis, copiâ miserè ægros torquemus. Sensim atque sensim progrediendum. Et tametsi in illis morbis fixis magnam vim demolientem requirat, id doctè dictum est, sed bifariam intelligi debet. Magna vis demoliens requiritur, tempore & loco, nimirum præparato & tentato prius corpore, & meatuum libertate comparatâ. Quod consulit vbique Galenus. Immò in calidis etiam morbis non videtur omittere decoctum hyssopi & origani. Vel alio modo, id per comparisonem intelligi debet. Nam illo loco loquitur de illis morbis qui eadem horâ sæpe repetunt, quorum cum certa sit sedes, & fixa in illa materies, non est dubium quin validioribus medicamentis vtendum sit, supple, quàm in illis morbis in quibus orgasmo incitatur materies, & nondum loco se conformauit. Ita nimirum melancholicos *asperos*, id est, validâ manu, expurgandos, incitandosque consulit Hippocrates. Et tamen in febris quartanis, & aliis morbis, quos nemo negauerit esse melancholicos, consulit idem Galenus mitissimè agendum initio, ne si irriteretur materia, effectetur magis, & morbus augeatur. Quod nos sæpe experientiâ obseruauimus. Alia ratio medendi est, vt vomitu excludatur,

Tom. I.

R

si fieri possit, materia. Nam quoniam ventriculus afficitur, & materia tenet obsessas modo indicibili partes vicinas ventriculo & lieni, non est dubium quin vomitus multum conferat. Et sensim atque sensim parandus est humor, vt excludatur vomitione: Vt non sit mirum, si veteres saepe vomitiones praescripserunt ad primae regionis euacuationem, cum illarum magna sit opportunitas, ne tam comode materia angustis viarum conclusa per intestina non referatur. Nec ad vnguem capienda Hippocratis verba, *Qui dolores supra diaphragma, &c.* Nam & ventriculus infra diaphragma est, & gibba hepatis, & tamen saepe magno profectu vomitione iuuantur, exclusa materia quae in illis partibus continebatur. Sed accuratius aliquo loco mihi visus est Galenus philosophari, qui totum corpus in duas partes partitiuit: vt vna dicatur superior, cuius maior est dignitas; alia inferior, cuius minor excellentia. Inter partes superas censet gibbas hepatis ob excellentiam: inter inferas, eiusdem hepatis sinus. Vt ab authoritate & decretis Galeni non discedamus, si dixerimus per partes diaphragmate superiores (vt vocat Hippocrates) paulo latius intelligere nos posse eas partes quae a Galeno dicuntur superiores, inter quas & ventriculus totus, & gibba hepatis censentur. Itaque illae partes vomitione exonerabuntur. Etsi enim Hippocrates dicat diaphragmate superiores per superiora purgandas, quis dubitat tamen ophthalmiam fluore alui non iuari: & nos ad imitationem naturae aluum sollicitare posse. Item licet melancholici propter inclinationem humoris per inferiora purgandi sint, quis dubitat & fanaticos, & quartanarios, & elephanticos non & curari, & iuari plurimum vomitione? Quod & Paulus, & Galenus, & Aetius asseruerunt. Itaque non ita ad vnguem exquirenda dicta Hippocratis, quamquam non ab eo temere dictum scriptumve sit: sed in plerisque communis sensus versatur, tamen & ratio, & experientia aliud fieri docent. Quamobrem non abs re summus Hippocrates dicebat similitudines & dissimilitudines morborum bonis & eruditis Medicis saepe imponere: Nam symptomatum varietate ludimur, & excrementa morbum alium pro alio supponunt. Vt in prognosi instituenda praecipites nimium esse non oporteat, nec in eadem securos & tardos. E medio enim quempiam tolli non praedicto morbi exitu, cum praesertim historia morbi integra cognita est, Medico dedecori vitioque

verti debet: vt & calumniâ non vacat metu ægros terrere, & omnia periculi plena asseuerare. Quamquam propter ægrorum nostrorum intemperantiam vereri potius debemus, quàm imprudenter esse securi. Extare potest historia nobilis mulieris. Illa ad mensem Februarium in tertianam febrem infestissimam, & grauissimis symptomatis fœtam. Concutiebatur admodum. Corpore erat bilioso, parum carnosum. Vndecima accessio non ferè apparuit, amuletorum vsu intercepta. Ab eo tempore sitis ingens, vomitiones bilis meracæ. Lingua prærubra: deiectiones liquida. Aluus non nisi & clystere & medicamento simul exhibitio mouebatur. Virium prostratio: iectigationes: satis placidus somnus ex interuallis: à refluxu bilis in ventriculum animi defectiones. Exhibitum medicamentum validum: eodem die iniectus clyster: nocte consequente interiit.

Fallebantur plurimum Medici: Et eiusmodi error in multis contingit idem. Nam sæpe subesse glutinosum, viscidum, viridemque humorem in cauis hepatis falsò comminiscuntur, unde febrem foveri existimant. Sed errant fœdissimè, & in commoda ægrorum pessimè peccant. Dum enim hoc commento decipiuntur, miserè exercent ægros validis medicamentis, & ita capitis periculum creant. Nam dum subest exiguus humor, qui tempore naturæ gratiam recuperet, non est quod ita ægros nostros conflitemus, & de iis ita pessimè mereamur. Et multos ita obseruauimus iisdem ferè diebus mortuos quibus medicamentum sumpserunt: immò sit ita: lentus est humor, an propterea ita agitandus? Nam non est dubium quin ex sententia Hippocratis ducatur medicamento id quod tenuius est, remanet quod crassum, & contumacius redditur multò.

Medici ita putabant illam mulierem reclusa continere pituitosa excrementa, quibus nisi eductis, non cōsequeretur sanitas. Lingua squallida erat & prærubra, luridi dentes, quod incendiū summū denotabat, & sitim vix in extinguendā. Paucus erat humor, & erat talis, qualis est rubra bilis. Quidam dicebat lentæ huius febris materiam in parenchymate & venis hepatis cōclusam, & tunc dolor non sentitur nisi grauis: quod si externam potius faciem hepatis occupat, dolor tunc sentitur; hinc cedematofum quodammodo fit hepar, & à solutione huiusmodi cedematis sequitur hydrops, aut simile aliquid. Quod in plerisque verisimile est fieri, qui de repente in hydropi similem affectum

132 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 incidunt. Et hoc in morbis longis vsu venit. Nec desinunt mul-
 tum meiere. Resolvente hepate humorem, qui, si per squallorem
 cutis non possit excuti sudore, per urinas secedit. Et hac mu-
 lier multum meiebat. ⁷ Et nihil alleuabatur. In tribus pecca-
 bant urinae. Plures erant, crassiores quam pro natura morbi bi-
 liosi. Nam in hoc non est bonum ita crassas apparere urinas:
 item ardentissime & admodum confuse, ⁸ quod colliquatio-
 nem designabat. Deiectiones exhibito medicamēto erant col-
 liquatius, non fœtentes, quod pessimum fuit signum. Nec lon-
 gè post secuta mors. Cum vidissent eiusmodi deiectiones Me-
 dici, a medicamento abstinere debuerunt: quanto plus curę im-
 penderetur in purgando, tanto maius colliquationis periculum
 afferebatur.

Ego verò tam subito mortem obrepisse conicio ob medi-
 camentorū vim & efficaciam. Nec enim probabile fuit multos
 subesse humores, cum corpus ita aridū esset, ex calfactū, & parū
 caperet alimenti. Auocare à medicatione debuit marcor, squal-
 lor. Tota cura in alteratione impendi debuit. Et quoties tale ali-
 quid contingit, præparcos in medicamentis nos esse oportet.
 Afferimus enim tantum colliquationem partibus, illudque con-
 tingit quod scribit Hippocrates; *Si quis inflammationem amoveri
 nititur medicamento, non proficit quicquam, & cuius tñq; partibus affert.*
 Non est itaque negligenda animaduersio illa corporis egrotan-
 tis, ne falsò aliud pro alio supponentes, miserè ægros in mor-
 tem coniciamus.

ANNOTATIONES.

1. Sæpe multa audenda sunt cum ratione, quia sedes & idea morborum
 sensum fugit: & nosse oportet illud verum esse quod scribit Hippocrates
 lib. de lege: Timiditas in medendo, impotentiam; audacia, igno-
 rantiam artis significat.
2. Cum conclusa materia aliqua eruginosa, aut eiusmodi alia dolores
 colicos excitat, & inanes vomitiones, prudenter astringentibus vrendum
 est, quia eorum usu coërcetur magis, & obstructionis occasio maior est.
 Vide pag. 16. lib. 1. Epid. meorum.
3. Ab utero excitari putabant Medici, & in eo humorem melanco-
 licum conclusum esse. Et Hippocrates lib. de morbis mulier. vocat atram
 bilem in utero. Datis uterinis remediis, melius habuit.

4. Mirum est quod hodie in duobus grauius peccetur, in quibus tamen veteres admodum accurati fuerant. Nam & sine ordine, & assidue purgamus coëta, incoëta, aut qualitercumque affecta. Item diebus criticis & secamus venam, & purgamus; ut mirum non sit si agros sepe in vitæ discrimen afferamus. Quod diligenter annotauit Hippocrates 4 de morbis: & ille locus memorie mandari debet. Quod humor, inquit, diebus imparibus moueatur, certa sunt indicia quod iisdem diebus dolor maxime affligat, & ulcera inflammentur. Et quod quicumque a febre continua correpti, pharmaco purgatorio in diebus paribus vsi sunt, hi nimium purgati sunt nunquam. Qui vero diebus imparibus medicamento forti vsi sunt, nimium sunt purgati, & multi perierunt. Proinde priores Medici in hoc aberrarunt; nam quia humor turbatur, & ad ventriculum affluit, & protruditur, afflicto datur afflictio.

5. Neper agitabatur consilium de muliere laborante melancholiâ hypochondriacâ, dictum est in illa obseruari debere aphorismum illum, Melancholicos per inferiora ad eoripos purgare oportet. Vbi disputatum est de illa particula. Nam illud receptum est quo magis morbos melancholicos & corpora melancholica agitaueris, eo minus profeceris, incidunt saepe in leipothymias. Quod ostendit Domina ab Insula, quam non credibile est exerceri affligique cum repurgatur. Item docet illud illius mulieris quartanâ laborabat. Nam cum desisses saepe febris assumpto medicamento ex folliculis, statim sepulta febris suscitabatur. Ego obieci Dureto febres quartanas; respondit febres quartanas non indigere purgatione. Sic intelligendus aphorismus Hippocratis, Melancholicos validè purgabis (si modo purgatione indigeant.) Quartanæ autem sunt morbi melancholici, sed purgatione non egent. Itaque de iis non intelligitur aphorismus. Preterea intelligit aduerbium illud ad eoripos multum & saepe, ut frequentia compenset maiorem vehementia. Validum reuerâ debet esse medicamentum, quod humori melancholico purgando destinatur. Nam cum seque est humor, & pellenti naturæ cedit, non requiritur magna demolendi vis (ut loquitur Galenus quodam loco) sed cum abstrusus est humor qualitate malus, quantitate paucus, non requiritur magna agitatio. Sed ubi est magna copia talis humoris, & non potius urget dispositio & mala qualitas (ut fit in atrabilariis morbis) validis medicamentis locus est.

6. Pulsus in illa muliere non videbatur esse febrilis, nisi quod paulo frequentior esset. Sibi aqualis erat, & nullam mutationem representabat. Nam reuerâ febris quodammodo hectica erat, & pulsus hecticus, ut verè loquamur. At diligenter videndum ne nos iste pulsus decipiat. Quia enim

ferre sibi equalis est, non videtur febrilis. At contra est, sed non apparetur siquidē nec in humoribus, nec in spiritibus malum est contractum, sed in partibus solidis.

7. Deiectiones ille colliquantes erant & syncerae. Quae quoniam eductae sunt à medicamento, significabant nihil subesse amplius quod purgaretur. Atque in hac muliere verum illum aphorismum percepi. In morbo diuturno cibi fastidium, & deiectiones syncerae, malum. *Aphor. 6. lib. 7.* Cibi fastidium malum, cum contra, appetentia magna esse debeat in longitudine morbi. Syncerae autem deiectiones exustam esse omnem naturam humiditatem à calore febrili demonstrant. Præterea observamus illud verum; Quibus cutis circumtenditur arida, & sine sudore, illi moriuntur. Nam nullo præeunte sudore inopinantibus omnibus nobis ereptum est. Tamen quidam interpretes Hippocratis vertit *ταπεινὰ*, quod mori vertitur, *ἀπὸ τοῦ σπινθός*, sumi vult. Sed nil interest; nam & crisis una est ad mortem, altera ad salutem.

CONSILIVM XXXV.

De Scabie, & Pustulis.

IANVS Memmeus annos natus duodecim, toto corpore scabie, pustulis, & iis quæ à Celso epinyctides vocantur. Urine aquosæ. Aluus fluxit, reddit putria: dolores ad umbilicum ac si dysentericus fluor esset. Non proficit edendo. Metus aut hydropis, aut consumptionis. Pruritus erat insignis. Initum est consilium, ut quâ arte consuleretur huic corpusculo diu notatumque prurienti, & nihilo proficienti, prouideretur. Ac primum de illo fluore actum est. Primâ quidē fronte videretur aluinus: tamen non est Aluinus non est, licet albicans; quia quæ deiciuntur, cocta sunt, nihil aut parum crudum est, quod indicat ventriculi integritatem: sed totum hoc consistit in distributionis interceptione. Ita enim rapitur cremor crassior, & deuolvitur ad interiora. Sic augetur fluor, quia augetur obstructio mesaraicarum per quas deberet ferri cremor ad hepar. Deiectiones satis indicant non ferri cremorem ad hepar: Item quia corpus non nutritur: Tertiò dolores qui ad umbilicum excitantur, ubi debet fieri secretio chyli & stercoris. Nam chylus in ea parte cunctatur, & quia non rapitur, acrimoniam & corruptionem acquirit: sic præter naturam delabens in crassiora intestina in loco separationis dolorem excitat. Et eo

nues vrine satis indicant vias obstructas plurimum, vt allicia-
tur tantum quod est magis aqueum. An nil attrahit hepar? At-
trahit aliquid tenue: & quia præcalidum & siccum dum non ha-
bet vnde exsatiari possit, recoquit illud, retorret, calfacit supra
modum; hinc corruptio, & ab ea corruptione tuberculorum
proventus. Non est magna phlogosis, tametsi ariditas & calor
corporis hoc indicet satis, quia non febris, non rubor, non ama-
toris, non deiecta appetentia; contra, appetit plurimum. Et
his argumentis coniectum est, calorem, qui in hepate plurimus
quidem est, hæc symptomata non attulisse: nisi quod attractum
tenue aliquod per obstructas vias retrorruerit: sed id tribuen-
dum interceptioni distributionis. Nam quotiescumque in calo-
re, siccitateque hepatis obstructio venarum est mesaraicarum,
non est dubium quin hepar attrahat aliquid tenue & serosum,
quod cum alendo non satis sit idoneum, in prauum abit humorẽ.

Ergo cum quicquid hic sit, accusanda sit obstructio vena-
rum mesaraicarum, vnde prauorum humorum prouentus, tol-
lenda est illa omni ratione. Dubitatur autem an lenienti medi-
camento sit locus, an rhabarbaro. Læuor intestinorum & laxitas
impedit quominus leniens medicamentum vsurpetur. De rheo-
ma maior dubitatio. Nam siccitas & calor hepatis impediunt quo-
minus tutò illud vsurpemus. Sed hæc ratio nos inducit ad vsum
illius. Cum viarum libertas est, visque medicamenti peruenit
ad hepar, tutum non est rheum: sed si obstructio sit mediocris,
vel sequepedalis (vt sic loquar) eo vti debemus, & tantò auda-
ciores esse debemus quantò obstructio est maior. Quod dili-
genter notandum cum de medicamentis calidis mentio iniici-
tur. Ita enim dicimus aloem non calfacere hepar, licet impensè
calida sit, quòd prius intestina pertranseat quàm ad hepar rapia-
tur. Sorbitiones liquidæ valent, sed non succulentæ & glutino-
sæ, quòd limosas deiectiones fouent & augent. Et hoc notan-
dum est. Ter aut quater repurgatū corpus hoc medicamentulo.

*℞. folior. cardui p. j. absinthij pontic. p. s. passular. integr. ʒ ss. Fiat
decocctio cum floribus. in colar. infunde rhabarb. ʒ j. s. cinam. gr. 4. Fiat
express. in qua dissolu. sacch. candi. ʒ iij. fiat potus.*

Cogitatum est præterea de sectione venar. Quia enim in ma-
cilentò illo corpore turgabant vasa, oppletaque erant prauo
sanguine, necnon calor in hepate acer, præterea cithymata &
pustula quodammodo arderent cum pruritu magno, in eam

concursum est opinionem vt tunc secaretur vena.

Præterea tabellæ hæc sunt institutæ.

℞. rasura eboris, cornu cerui, margarit. elect. ossis cordis ceru. an. ℥j. puluer. Elect. diamargarit. frig. & triasantal. simpl. an. ℥j. rasura unicornis gr. 10. cum aqu. card. infusionis ℥j. sacchar. rosat. Fiat per tabellas Electuarium.

ANNO TATIO.

I. *Admirationi fuit excretio urinarum tenuium & aquearum in bilioso hoc iuvene. Nam cum Hippocrates in pueris tenues urinas omnino damnet, non est dubium quin in paulo grandioribus urinae tenues, aquae, non colorate, damnandæ sint quoque. Et dubitari posset an hoc obstruentionem significet. Tamen occurrit locus insignis apud Hippocratem dum loquitur de urinis tenuibus, eas splenicis faretur. In febribus longis (ait) tenuibus erroneis urinarum tenuium mictiones splenicæ sunt. Aegrotabat, tamen febris peripneumonia non erat. Omnium Medicorum consensus erat splenicus, & toto habitu melancholicus: ita in eo si quo alio veritas Aphorismi deprehensa est, tamen in quibusdam splenicis urinae saepe crassæ & grumosæ apparent, præsertim cum simul & seorsum sæculentius humor per urinas excernitur.*

CONSILIVM XXXVI.

De Febre tertiana.

PVELLA annos duos cum dimidio nata, corpore bilioso, non ita pridem ablactata, incidit in febrem tertianam. Incredibile dictu qualia primùm apparuerint symptomata. Nam toto corpore conuulsa est ac concussa, ac eò res redire videbatur, vt de eius vita desperaretur. Tamen exactis tribus aut quatuor diebus cum febris typum suum ac ordinem seruare cepit, omnia mitiora placidioraque fuerunt. Vermes suspicabantur, frustra tamen, cum nihil tale toto febris cursu apparuerit. Ex simplice tertiana, facta duplex tertiana. Sæpe febriles paroxysmi non apparuerunt, & præsertim diebus criticis. Multo sudore diffuebat corpus; character faciei non concidebat: sanitati tandem restituta est.

Tria

Tria hoc loco iure quæri possunt, quorum enodatio plurimū afferet adiumenti & voluptatis. Primum, ecquid fuit, cur tam subito symptomata hæc funesta apparuerint, cum tamen nihil postea tale contigerit. Vnde hoc? Secundo, an cum febres periodica finiunt diebus suis criticis, & non apparet paroxysmus quartus, septimus, undecimus, hoc sit tutum? Preterea, an quarta accessio, aut septima, aut alia similis, cui aliqua decernendi vis tributa est, breuior, mitiorque esse debeat quam aliarum intercalares? Tertiò, an sudores ita conferri, & frequentes in febribus intermittentibus longitudinem designant; illud in omni morbo terrificum esse debet, cum morbi initioprehendunt cum prauis symptomatis, declarant enim latens aliquod venenum. Nec enim credibile tam subitam esse causæ morbum efficiens generationem, ut est prompta & facilis ipsius morbi generatio & inuasio; quod sæpe experientiâ deprehenditur. Quoties enim comitati prauis symptomatis morbi inuadunt, ferociusque, de his veteri oportet. Et commemoratu dignus est locus qui legitur scriptus apud Galenum, comment. in historiâ 4. section. 3. lib. 3. Epidemior. quo scribit Galenus interpretans cur quidam initio statim morbi phreneticus factus fuerit, & interierit tertio die. Scribit (inquam) *delituisse in illius acri corpore humorem lethali v. neno similem, qui agens moram, & opportunitatem naturæ statim funestum symptoma excitauit.* Esse itaque debet venenati humoris suspicio, quoties citra causam ullam manifestam cum tanta symptomatum sauitia morbi quamprimùm inuadit. Quod suspectum fuit in ista puella, cuius nunc historiam explicuimus. Conuulsio ista & terrificæ symptomata, aut summam neruorum imbecillitatem declarabant, aut malignæ materiæ ferociam & translationem ad genus neruosum, aut vtrumque. Contulerat autem ad huius morbi generationem puellæ ingluuiæ, & subita ad noua edulia conuersio post ablactationem. Vnde etiam muliercularum crebris sermonibus vsurpatur, necesse esse cuique puello ablactato grauissimè laborare. Omnis enim ad contrarium victum conuersio, immò & mutatio omnis, licet non ad deteriora, suspecta esse debet.

De periodis febrium dicam vno verbo: In nonnullis obseruati accessiones criticas (voco autem criticas, factâ comparatione cum acutis) ut quartam, septimam & ceteras eius generis euauuisse planè, & tamen relapsi non sunt. Non quin restiterint

aliqua quæ agrum non immunem planè redderent. Sed an hoc tutum est? Reuerà tutum non videtur esse. Nam si ex sententia Galeni in lib. de diebus decretoriis, analogia est & proportio inter particulares accessiones morborum redeuntium typo, & acutorum morborum criticos dies: cur si septimus dies in acuto morbo criticus nihil ostendens, immò sine excretionē euascentis suspectus est, malèque fidam crisin facit, cur septima periodus non apparens suspecta non est? Et tamen videmus tertio paroxysmo finiri tertianam, aliquando quinto paroxysmo. Bitariam respondere possumus: In acuto morbo quò magis tenditur ad septimum, aut vndecimum, eò magis ad crisin tenditur, id est, subitam mutationem ad salutem, aut ad mortem. Hæc autem subita mutatio, quia litem controuersiamque morbi dirimere debet, non potest fieri citra euacuationem aliquam; idè si dies ille dispareret, infida crisis foret, quia crisis necessaria est: At in morbis interuallū quietemque habentibus non ita fit. Nō enim ^{expletis} ~~expletis~~, sed ^{notis} ~~notis~~ hic spectatur. At lyseos ratio ea est, vt non desideretur aliqua subita mutatio. Satis est si tempora adsint, vt sit vigor, incrementum, & declinatio. In febre autem tertiana (quæ etiam cum acutis morbis aliquid commune habet) fieri potest vt quarta accessio sit valida, vigoris rationem obtinens: Sic septima periodus quæ in exquisitis tertianis vixdum expectanda est, erit mitis, blanda, nihil molestiarum agro afferens: immò videmus eos sæpè quos periodicis febribus defunctos vocamus, tum cum solita munia obeunt, iis diebus quos suspectos habere deberent, nonnihil prioris morbi persentire, cum tamen verè non febricitent. Altera ratio: Apud Hippocratem, tertius, quintus, & nonus dies nonnullam iudicandam vim habent: immò qui sudores illis diebus apparent, boni iudicantur ab Hippocrate: cur non febris tertiana cum sudoribus non desinet tertiam accessione; quinta & nona, quod & sæpè obseruatur? Tertium accedit, quod nimirum si verum est, vt iam antè docuimus, & verum esse deprehendimus, tum cum à febre nos immunes esse credimus, nonnihil etiam sentire prioris morbi, aliquando leniter perhorrescere, aliquando fiti vexari, declarat hoc non necessarium esse morbos periodicos eodem seluimodo, quo & soluantur critici & acuti morbi: id est, non esse necesse criticas periodos fauiores grauiorès quæ aliis, præsertim cum de vltima periodo quæ criseos videtur, nonnullam habere

rationem, intelligitur. Tamen in puella nostra obseruauimus septimam & vndecimam periodon non apparuisse, vnde recurrit postea. At in Domino Magno Sangermano tertiana febris tertiâ periodo finiuit, cum tertia vehementissima fuisset. Abundè repurgatus fuerat: sudores conferti, & quamplurimi: immò primâ accessione, illâ etiâ ineunte, ita corpus difflebat, vt planè videretur exolui. Vnde tertia questio oboritur de sudoribus. An non tuti salubresque illi sudores, qui tantâ copiam apparent ineunte morbo? An longitudinem portentant? an non aliquid aliud? Ea de repaulò plenius dicemus. Copia sudoris, ex sententia Hippocratis sect. 4 Aphorism. aut copiam alimenti, aut humorum superuacuatorum expurgationem sui requirentiû docet, aut morbi longitudinem. De tribus his aperiendum est. Cum quis à somno multum sudat, vt non sit aliqua ^{ἐπιδρωσις} sumitur pro particulari sudore, ^{καὶ τὰς κλιδας}, declaratur assumpto multi alimenti nequeunte naturâ subigere ac domare tantum alimenti. Sin autem ^{κατὰ τὴν ὕπνιν}, (quod non significat finem somni, sed dum quis iam somno comprehensus est) aliquis sudat, ^{ἡ δὲ πὺν πρὸς}, non præsumpto multo alimento, hoc purgationem significat. Sed Hippocrates aliam distinctionem affert; scribit enim; *Sudor multus febrî superueniens, qui febrem non soluit, longitudinem morbi significat*; quasi dicat: Sudor plurimus per se longitudinem non declarat, vt plerique sine diuturno solent affirmare; sed si febrem, aut alium morbum in quem incidit non soluat. Atque ex hoc loco erui potest distinctio questionis quam hoc loco afferimus, *An sudor multus ineunte morbo tutus & salubris?* In plerisque morbis initio erumpunt sudores multi, qui longitudinem morbi non significant. Nam cum symptomaton alleuatio sequitur, non est dubium quin sudorum copia ad morbi breuitatem appareat. Etenim & meatuum libertatem designat, & materiæ præparationem, & vim naturæ maximam. Si autem non sequitur sedatio symptomaton, sed post sudores, si partium imbecillitas quædam & veluti perfractio quædam, sudores boni non sunt, sed imbecillitatem naturæ, & contumaciâ materiæ significant. Expirat enim quod tenue est, remanet strigmentum quoddam, quod morbi parens est & author. Itaque quod peculiariter dicebat Hippocrates, scribens, *Sudor multus febrî superueniens, febrem non tollens, morbi*

140 CONSILIORVM MEDICINALIVM
longitudinem significat, id in omnibus intelligi potest. In omnibus enim morbis excretionis omnis ea debet esse ratio, & aestimatur, ut inde sequatur alleuatio aliqua, aut nulla. Si illo modo, bonum, hoc, malum est; immò verò plerique Medici secuti Hippocratem, qui ephidrosin vbique damnat, cum partem tantum sudare vident, hoc in bonis non ducunt. Errant autem plurimum: nam si vbi morbus, ibi sudor, & vbi sudor, ibi morbus: cur in capite solo emanans sudor non erit dicendus in bonis? Et hoc experientiâ notum est, sæpe particularis sudor plurimum confert. Quod autem Hippocrates in parte manantem sudorem damnet, illud debet intelligi, vbi generalis sudor esse debet, & in parte tantum apparet, non est dubium quin malus sit. Sed si pars aliqua peculiariter laboret, quid obstat quominus circum partem illam sudor manet optimâ ratione apparens? Ceterum videndum ne maior nos decipiat; nam in plerisque morbis maior apparet opinionem faciens veri sudoris, sed perperam. Itaque cum de sudoribus pronuntiandum, temerè id non præstandum.

ANNOTATIO.

*Antè de sudoribus abundè diximus, ac nodum istum explicare enixi sumus, què fiat ut quartanaris iam valdè siccis, squalidis, ac strigosis redditis tantis sudoribus corpus diffluat. Id quod M. Guillelmo Archicoco contigit. Primum iis qui febre laborant quartanâ, ut iam febris hecticae improprie dicta sit rudimentum aliquod, partes internæ iam aruerunt, & ignem conceperunt: & more propriè dictorum hecticorum, cum ab alimento humectantur incalescunt; quoniam caliditas arida ab humida substantiâ humectatur: sed rationem eandem forè adducere oportet tam copiosi sudoris quam in hectica Empyricorum febre attulit Galenus ad part. 60. lib. 2. Prognost. Copiosi sudores eliciuntur (ait) in empyicis ob virium debilitatem, eo quòd diductum ac distributum alimentum discutitur. Leonicens scribit, eo quòd alimentum deliciatur. In Græco legitur *ἡ ἀπορροή τῆς τροφῆς*. Legatur iste commentarius Prognosticon.*

CONSILIVM XXXVII.

De Febre purpurata.

Cum paulò antè nobilis puella historia ob oculos poneretur, iniecta est mentio de horrifico symptomate quod illam in-
cunte morbo non sine veneni suspitione inuasit. At in eare
Galenis sententia explicata est. Narratum est quomodo vene-
natæ qualitatæ suspicio esse debeat, cum sine vlla manifesta
causa morbus adoritur symptomatis grauissimis comitatus. Nil
enim tale contingit nisi aliquid subfit latens & deses quod viru-
lentiam suam statim explicet. Quod non ita pridem in quodam
apparuit manifestò. Cum paulò liberalius genio indulgeret in
aulico comitatu, in morbum incidit. Valetudinarius degebat:
lateris doloribus erat obnoxius. Paulùm recreatus Lutetiam
venit: liberaliter fatis vixit, & consuetudinem cum vxore ha-
buit. Circa mediam noctem febricitauit. Horà diei octauâ ma-
tutinâ febricitauit, facies intumebat: dolitabat hypo-
chondrion sinistrum: oculi feroces. Circa meridiem abdomen
totum de repente intumuit: labascebant vires: tumor pedum
disparuit. Sectâ venâ maleoli exiit sanguis putris. Octaua serò
cum suffocationis periculum immineret, ne quid in capite no-
stro cuderetur, initum est consilium quoquò res euasura esset,
deaperienda vena. Circa quartam nocturnam interiit. Ex-
stus statim intumuit. Corpus exaratum erat & defœdatum pu-
sulis, aut maculis potiùs liuescentibus Cardiacis pugnatum est.
Memoratu dignissima hæc historia, tum ad prognosin, quæ hîc
maximè commendatur, tum ad declinandam calumniam. Oc-
cultum in corpore venenum delitebat.

CONSILIVM XXXVIII.

De Melancholia hypochondriaca.

DE Melancholia hypochondriaca antè disputatum est, ac
quæsitum an in eiusmodi affectu vehementi cathartico

S. iij.

142 CONSILIORVM MEDICINALIVM
locus foret. Vbi per diorismum dictum est in nonnullis affe-
ctibus melancholicis vehementer purgandum, in aliis clemen-
ter. Ac multi melancholiæ hypochondriacæ meminerunt, &
huius morbi nomen crebrò vsurpatur, sed quod propriè signi-
ficet, quis locus affectus, cur ita appelletur, cum non sit necesse
melancholicum humorem in vitio esse, an intemperies sola sit,
an morbus in conformatione nondum satis definitus. Magna
tamen dignum est commentatione, quod id plurimum ad cu-
rationem conferre videatur. Affectus ille Melancholia Hypo-
chondriaca vocatur, morbus flatuosus, & dispositio hypo-
chondriaca. Quod videtur indicare focum sedemque mali in
hypochondriis existere. Hypochondriorum autem nomine in-
telligitur hepar, lien, mesenterium, epiploon. Galenus 3. locor
affector. scribit, *Affectus Melancholia vocari solet, indicante nomine
humorem qui morbum committit.* Si nomen indicat cuiusmodi hu-
mor sit, dubium esse non videtur quin aut atrabilarius hu-
mor sit, aut melancholicus simpliciter, quasi dicas sanguinis
faciem. Tamen in contrariam partem potest adduci id quod à
Galeno scribitur eodem loco: *Circa ventriculum prima incipiunt
accidentia, & ipsi auctis melancholica sequitur affectio, & alui deiectione,
& vomitu, proba coctione & ructibus is leuatur qui laborat.* Si circa
ventriculum prima rudimenta apparent, si cruditas multa quæ
correctione & mitigatione indigeat, non videtur consentaneum
ut aut atræ bilis, aut humoris melancholici copia adsit, quæ fla-
tuosum morbum generet. At bifariam responderi potest: Cru-
ditas illa tantum ex euentu fit; fit enim ob obstructionem: ob-
structio autem ob calorem: sic in angustiis viarum heret humor,
qui tempore recoquitur & aduritur. Secundo loco ita respon-
deo: Cruditas illa non constituit hyperxin melancholiæ hypo-
chondriacæ, quæ & flatuosus affectus à veteribus nuncupatur:
sed status qui generantur, tum à calore præter naturam in hypo-
chondriis contento manant, tum à materia semicocta quod
commisit obstructio. Et quod dicitur circa ventriculum prima
apparere accidentia, non est hoc dicere vitio ipsius ventriculi
melancholiam hypochondriacam incipere: sed cum obstructio
sit primarum venarum quæ pyloro proximæ sunt, sese primò
ostendit & exerit morbus in ea parte. Accedit quod parsea sit
exquisito sensu prædita, hinc fit ut in ea facile appareant dolo-
res, & excitentur symptomata. Sed ne absque autore quicquam

in medium adducamus, confirmanda prima est ratio, qua dice-
 bamus cruditatem tantum ex euentu fieri, quod nimirum ratio-
 ne obstructionis contingeret: obstructio autem præ calore in
 partibus illis contento. Audiendus est Diocles 3. locor. affect.
 cuius sententiam probat Galenus, in eo tantum imminutum
 Dioclem ostendit, quod cum præclare sentiret de melanco-
 lia hypochondriaca, eiusque naturam & ingenium ostenderet;
 non dixit tamen quomodo fiat vt in melancholia hypochon-
 driaca fugacia sint in cerebro spectra & phantasmata. *Oritur*
à ventriculo morbus, qui flatuosus & melancholicus dicitur, quem sum-
pro cibo maximè coctu difficili & caustico sputum multum idemque hu-
midum comitatur; item ruetus, status, æstus in hypochondriis: interdum
ventriculi dolores vehementes, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt,
concoctis cibis mitescunt, mox alijs ingestis recrudescunt; interdum ieiun-
os, interdum à cena molestant: euomunt crudos cibos, phlegmata, acrim-
os, interdum à cana torpedine afficiantur. Ceterum flatuosos istos necesse
est habere plus caloris in his venis, quæ alimentam à ventriculo excipiunt,
& sanguinem crassiorem factum esse, &c. Item & addit illud Dio-
 cles 3: Aiunt nonnulli os ventriculi quod intestinis continuatur
 in hoc morbo inflammari, ac ob inflammationem obstrui, ac
 prohibere ne alimenta statuto tempore ad intestinum descen-
 dant, & ita diutius in ventriculo quam decet manentia, timores
 & æstus, & reliqua similia efficiunt. Hæc sunt quæ à Diocle scri-
 pta sunt. Vbi notandum est velle Dioclem in hypochondriaca
 melancholia affici ventriculum, & primam mali labem ab eo
 esse. Verba enim hæc sunt; *Oritur à ventriculo morbus*: Ac si dice-
 ret, & in ventriculo, & à ventriculo eum manare. Quod tamen
 verum non est; si quidem ventriculus integram suam habet tem-
 periem, & quæ cruditas adest, non est ad ventriculum referen-
 da vt innocentem, sed ad prohibitionem distributionis alimen-
 ti ab inflammatione & obstructione. Sed Galenus eodem loco
 rem paulò plenius explicat. nam conceptis verbis ita scribit;
Circa ventriculum prima incipiunt accidentia, ac iis autem melancholica
sequitur affectio. Ac si dicat: Elucent in ventriculo & partibus vi-
 cinis melancholici flatuosique morbi prima rudimenta, quod
 illie primum mali seminarium, non à ventriculo ipso, sed à ve-
 nis pyloro vicinis, inflammatis & obstructis: non quin afficiatur
 aliqua ex parte ventriculus, sed non tam affectus est initio ad
 generationem mali, quam progressu morbo afficitur ad mali

144 CONSILIORVM MEDICINALIVM
incrementum. id est: Cùm in hypochondriis malum figitur, & confirmatum est, actum verè vocatur Melancholia hypochondriaca, malum serpit ad ventriculum, & tunc cruditates multae fiunt ob contractum in consortium ventriculum: & sic malum malo additur. Sed in principio hypochondriacae melancholiae, ventriculus quidem in sese non laborat, sed tantùm ratione obstructionis viarum quae à ventriculo excipiunt chylum & cremorem: Et dolores maximè excitantur dum natura molitur *ad id* illius cremoris. Itaque tametsi & prima rudimenta circũ ventriculum appareant, & coctione, mitificationeque alimenti in ventriculo malum & dolores sedentur, item à Diocle dicatur à ventriculo natus morbus, non est accusandus ventriculus tamquam primus melancholiae hypochondriacae autor.

Alia maior oritur difficultas, quid velit Dioclis oratio haec, Inflammatur os ventriculi quod intestinis continuatur. Opinio quidem aliorum est, sed illam Diocles sequitur, & Galenus. Et quoniam maioris autoritatis est sententia Galeni, utpote singula exactius estimantis, in eius verbis haecamus. Duobus ex locis, aut tribus potius convincere possumus hypochondriacam affectionem à phlegmone (ita enim *phlegmonis* nomen usurpavit Galenus) pylori, & partium vicinarum: ut inde obstructio fiat, & ab obstructione alimenti distributio impediatur. Primus locus est is; *videtur quidem in pyloro ipso inflammatio esse, sanguis autem in parte inflammata contentus, & crassior, & magis melancholicus fit.* Locus alter est, dum rationem reddat cur affectiones & perturbationes melancholicae eorum mentem percellant, qui hypochondriacâ passione detinentur, scribit, *sublatâ enim oratione ab atrabile fuliginosa, melancholicâque in cerebro accidentia pullulare.* At atrabilarius humor non illic generatur nisi per assationem & adustionem. Adustio autem ab immodico fit calore. Tertius locus est: Melancholiam hypochondriacam, & melancholiam cerebralem (ita enim loquar clarioris Doctrinae gratiâ, cùm nimirum per se & primò melancholicum est, dum explicat Galenus, eandem generationis rationem esse vult, sed diuerso loco constitui. nam illic in hypochondriis fit, hic in cerebro. At dubium non est quin ea passio melancholica, quae cerebrum primò ac per se occupat, generetur per immoderationem caloris in parte frigida, cerebro nimirum. Quod si ita sit, cur non idem contingeret in hypochondriaca? Audiatur Galenus de cerebri melancholica

cholicâ passione loquens: *Fit melancholica cerebri passio affecto prius calidis dispositionibus cerebro, aut aestuatione, aut phlegmonosâ passione, aut phrenitide, interdum à solitudine, mœstitia, cum vigiliis.* Quæ cum ita sint, paulò accuratius videndum quomodo intelligatur ea periodus. De phlegmone pylori & partium propin quarum, ut eam necesse sit adesse duabus de causis, tum ad asilandum, recoguendumque alioqui pituitosa affectio esset tantum (si sola obstructio foret) non autem atrabilia, tum ad obstruendum, ut & Galenus & Diocles explicuerunt.

Sed si phlegmone sit aliqua, aut phlogosis, cur hîc apostema non sit, cur non adest febris? immò necesse esset morbum acutum esse, cum fieri non possit quin inflammatio pylori non afferat febrem acutissimam. At Melancholia morbus longus est, & lento gradu procedens, maciem & mortem tandem afferens. Quæ causa est cur ex recentioribus Rondeletius, & Dioclis & Galeni opinionem reiiciat. Nam si inflammatur pylorus, & ob inflammationem sequitur obstructio, & ab obstructione prohibitio distributionis illius cremoris, qui à ventriculo decidit distribuendus in venas mesaraicas, necesse est illam satis insignem esse.

Atque ut quo animo, eo certè beneuolo veteres aliquid scripserunt, quo tanquam nobili hereditate posteritatem carere noluerunt, eodem illud ipsum excipiamus. Honorari arbitri vices obeuntes, veterum opinionem cum posteriorum scriptis conciliabimus, ut plus veritatis ratio & nomen apud nos possit, quam præiudicata cuiusquam opinio.

5. Qui sunt corpore squallido, macro, sicco, pulsu satis infirmo, aut qui prærubri sunt *ῥευδῆδες* Græci vocant (de quibus etiâ Galenus 3 locor. affector.) ij melancholiæ hypochondriacæ sunt obnoxij. Item qui curis, agitudinibus, perturbationibus, que animi concutuntur, qui generosis vinis dediderunt sese, eos in melancholiam hypochondriacam præcipites ruere testatum satis est. Quò fit ut mirum non sit si desideretur inflammatio aliqua in partibus illis, quæ & retorreat in hypochondriis humores, & ita obstruat. Inde hypochondriorum æstus, inæqualitas in calore & frigore, vincente victoque calore, & materia superante calorem, & ab eodem superatâ. Itaque nomen phlegmones non ita strictè accipiendum, ut illic tumor sit, sed pro phlogosi usurpandum. Non quin ille calor qui eò loci exu-

146 CONSILIORVM MEDICINALIVM
berat, & materiam contumaciorem reddat, ex illo tenui quodam humore in tetrum vaporem degenerante, tandem coaceruet aliquid quod proximè in flatus faceffet, partimque tumorem aliquem in partibus illis excitet. Accedit quod dominant illius caloris quodammodo febrilis vasa quadatenus cōnuent & concidant; hinc maior coaceruatio, hinc obstructio, hinc alimenti impedita distributio. Sic nimirum hypochondriaci dum vel minimum alimenti sumpserunt, videntur impleti, satiatique, nequeunte distribui alimento ob viarum angustiam.

Itaque cum recentioribus statuendum est vitio splenis, mesenterij, & intestinorum melancholiam hypochondriacā contingere: Intemperies enim est mesenterij, vel venarum melancarum, quæ ad intestina & ventriculum deducuntur. Et intemperies illa potius iuncta est cum caliditate & siccitate aliqua; item cum obstructione à crassiore sanguine, cuius parstenuior halitus modò à calore adurente excitata summittitur in cerebrum, crassior autem deses, ignauaque resistit, & calorem obruens, & gravitatem in partibus illis afferens. Itaque vt de Curatione verbo dicatur; Temperatio illius caloris acris, obstructionis libertas omni ratione est procuranda. Optima autem victus ratio primas hinc tenet: quandoquidem in omnibus illis morbis qui partes illas obsident quæ nutritioni dicatæ sunt, præcipuum curationis momentum in optima victus ratione consistit.

ANNOTATIONES.

1. In melancholia hypochondriaca vnum quoque observandum est, ne similitudinis errore decipiamur, nimirum quod in thorace dolores sentiuntur ac si pleuritidis argumenta aliqua forent. Et ignari Medici ad remedia malè confugiunt pleuritidis, cum dolor iste per hypochondrij sympathiam oriatur. In mercatore de Montargis hoc est observatum. Vide pag. 15 huius libri.
2. Nota sputationem multam in iis quibus est affectus hypochondriacus, quoniam cum istam sputationem vident Medici, sæpe ad caput casarthosum recurrunt.
3. Delirare melancholicos non est dubium, cum melancholica passio definitur per delirium febris expers. Quanquam si materia acrior sit, & adusta, vt sæpe fit, suppressaque in corpore, non potest non adesse febris, ut

Posterior quod querendum dicebamus, si idè melancholici delirant, quia in his obfideatur anima, id est, pars in qua anima, ratio & iudicium versatur, quâ parte lasâ, alteratâque ratio cessat, illa sâ verò constat. In Epilepticis verò non afficitur temperamentum cerebri, sed leditur cerebrû ut pars organica, non ut similis. Quare Epilepsia definitur Convulsio non perpetua cum mentis & sensuum oblatione. Questio hæc pulcherrima. Item, Si carus ledit aëiones potius quæ sunt in cerebro; Apoplexia quæ sunt a cerebro, quod de Apoplexia dicitur, aliqua ratione de Epilepsia dici potest.

Tij

148 CONSILIORVM MEDICINALIVM

5. Galeni verba sunt cap. 7. lib. 3. locorum affect. & petita sunt ex Epidem. ut monet Gal. comment. in Aphor. 14. lib. 2. Prorhet. ubi docet quomodo coxgia malum saepe signum sit: & ut qui sunt prurubri, sint melancholici.

6. In mania, qua affectui melancholico est affinis, hic syrupus est praescriptus.

℞. rasura lign. sancti quart. j. cortic. eiusd. ℥. j. infunde in aqua floralis lib. iij. per sex horas, addendo polypod. ℥. s. enule. camp. ℥. j. foliet. senna ℥. ij. turbit gummosi infusi in vino albo cum paucis Linzib. ℥. s. colocynthid. ℥. j. Bulliant omnia in vase fictili luteato ad consumptionem medie partis. fiat col. ad lib. 1. Capiat ℥. iij. pro dosi.

CONSILIVM XXXIX.

De Hydrope.

DE aqua intercute olim à primariis Medicis disputatum est: ac praesertim quomodo vel primò fieret, vel alteri morbo succederet. At disputationis huius prima hæc pars est, An nullus hydrops contingat quin affectum sit hepar perse, aut per sympathiam: id est, quacunque in parte conceptum sit vitium, quod hydropis parens esse possit, nisi illud ad hepar perveniat, hydrops necdum generari, dicique potest. Nam cum illius *ὁ πρῶτος ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς αἰματώσους* consistat, hepar autem prima illius officina est, necesse est affectum in se iecur ut hydrops causam principiumque sumat. Posterior pars est ut inquiratur de modo quo aqua in ventrem abdomenque repit, ut inde tumor fiat. Ut de priore dicatur aliquid: In commentario in Prognostica, ubi ex professo de hydrope agitur, Galeni ea constans est assertio, ut nunquam hydrops generetur quin affectum sit hepar ipsum. Tamen duo genera hydropis constituere videtur: unum quod ad splenem pertinet: alterum quod ad hepar. Et quoniam (ait Galenus) in Prognosticis ceptum est agi de acutis morbis, non autem de splenicis morbis, ideò de hydrope per affectionem ventriculi agitur. Ut Galenus videatur inducere alium hydropem per vitium ipsius splenis non affecto hepate. Nam si omnis hydrops sit affecto hepate, omnis hydrops ad acutorum morborum classem pertinet, ut quoties de hydrope

agatur, toties de hepate, si modò vera est Galeni opinio. At commemorabilior est locus lib. 3. de symptomat. causis: illic Galenus docet *symplicitatem vitio proprio ipsius ventriculi generari*: immò & ibidè, hydropis generatione venarū ipsarū vitio tribuit. Quod si ita est, non accusandū est hepar perpetuò, nec temerè nostris remediis exercendum, cū saepe in vitio non sit. Frustrā enim adhibentur remedia, nisi primā mali sedem illis oppugnemur. Quoniam tamen communis ea est omnium veterū consensio, vt citra affectum ipsius hepatis hydrops non fiat, quicquid contra afferri possit, in eo est consistendum.

De posteriore parte plenius paulò dicendum, quod & plus habeat vtilitatis, & voluptatis. Quòque difficilior est illius explicatio & examen, cò vberior fructus qui inde manare potest. Galenus non dubitat quin intemperies frigida hepatis hydropem generet: sed de obstructione maior dubitatio. Si obstructio aliquid facit, erit villorum & tenuium staminum quibus intertextum est hepar, quorum beneficio transumptio fit à finis ad gibbas, alimenti & sanguinis. Nec enim dubitat quin communicent extremitates venarū & villorum illorum, sed quā ratione per ora sua coniungantur, non facillè intelligi posse asseuerat. Sit ita sanè; obstructio omnis impedit transitum humoris, siue illa ab inflammatione sit, siue à scirrho. Quod cū animaduernerent veteres, rationi consentaneum esse dicebant, vt pars quæ in sanguine magis tenuis & aquosa est, transmutatur, atque vehatur per vniuersum corpus: syncerus autem sanguis propter suam crassitudinem in caua visceris parte permanet. Et in hanc opinionem facillè secederet, nisi absurdum aliquod contingeret. Non est dubium quin aquosa pars sanguinis deuehatur in venam cauam, & ab ea in abdomen rapiatur: sed non est verisimile remanere limum sanguinis, aut potius puriorem sanguinem. Nam si interceptus sanguis remaneat in angustis viarum, morbus aliquis sequeretur à plenitudine sanguinis, cum tempore multus cumuletur sanguis. Præterea continget crassiorem illum sanguinem in visceris venis præ illarum angustia retentum ad intestinum ieiunum, tenue, colon & cæcum deferri, fortasse & per aluum. In leucophlegmatis, & anasarca, & tympanite nil cruentum per aluum excernitur: sed spiritum abdominis aqua impletur. Hoc itaque absurdum contineret, quod nimirum in hydropicis cruentæ essent deiectiones.

Sed dicet quispiam: An ignorauit Galenus hydropem contingere & ab inflammatione & à scirrho hepatis? Si ignoraret, tummæ inscitæ arguendus foret. Quid ergo sibi vult hoc loco, dum contendit docere per refrigerationem hepatis, & intemperies humidas, aut siccas, aut frigidas hydropem generari? Reuerà non ignorauit à scirrho, & obstructione hepatis nasci hydropem, alioqui contra eum ageremus ipsiusmet verbis tanquam obsignatis tabellis. Sed qua de causa & consilio id dicatur, breuè aperiendum.

Veterum de hydropē ea duplex fuit opinio. Quinto locorum affect. quidam putauerunt hydropem generari cum obstructio, aut inflammatio, aut tumor est in hepate præter naturam, & horum ratione præterfuit tenuis & aquosus humor in abdominis spatium, remanet, hæretque mediis viis sanguis. Altera opinio fuit eorum qui à solo scirrho, tumoreque hepatis hydropem fieri putarunt: in quorum albo fuit Erasistratus, vt videre est lib. 2. de natur. facultatibus. Qui priorem sententiam sequebantur, non eiusdem planè opinionis (meo iudicio) fuerunt, cuius fuit & Erasistratus; nec enim à solo tumore & scirrho hydropem oriri voluerunt, aut saltem Galenus non id in iis reprehendit: sed aliqua ex parte admittit eorum opinionem, alia ex parte non admittit. Negat enim illam fieri translocationem aquosæ substantiæ, remanentes sanguine crassiore, quod duplex absurdum sequeretur: prius quidem, quod ille sanguis remanens suppressus, morbum aliquem à plenitudine efficeret: posterius, quod cruentas in hydropicis deiectiones apparere esset necessum. At neutrum in artibus operibus apparet. + Quod autem illi non crederent à solo scirrho nasci hydropem, vt Erasistratus, ex eo credibile, verisimileque fit quod melius cum iis multò agatur quàm cum Erasistrato. Nam hunc inscium, ignarum, imprudentemque vocat: illos autem excipit, & eorum sententiam conciliare, ac subleuare nititur. Nisi quod sub finem demonstrare voluerit à refrigeratione hepatis potius quàm à scirrho aut tumore nasci hydropem. At debuit potius in eo laborare, an ille generationis modus hydropis, quem veteres fingeant in inflammatione, obstructione, scirrhoue hepatis esset verisimilis, non autem in eo, vt probaret non probabile esse à timore hepatis eum nasci: adducto tanquam obiectionis loco, & mulierum profluuiio suppresso, & hæmorrhoidibus suppressis, cum vtrumque

(ait) hydropem afferat, non præsumpto conceptoque tumore
 vilo in hepatis parenchymate. Sed meo iudicio voluit vnâ ea-
 demque operâ illorum veterum fundamentum positum in opi-
 nione quæ ab Erasistrato fluxerat, euertere; nimirum de tumore
 hepatis, qui aut præcipua causa, aut sola (vt Erasistrato visum
 est) hydropis crederetur. Huiusce rei coniecturam facit id
 quod scriptum est apud Galenum cap. i. lib. 6 de locis affect. vbi
 ex professo eorum explodit refellitque opinionem, qui crede-
 rent à solo tumore lienis hydropem fieri, non attracto hepate:
 item & icterum solo hepatis vitio, citralienem. Vtrumque fal-
 sum est, ait; nam & vitio vtriusque visceris icterus fit. Et non so-
 lo vitio tumoreque lienis hydrops. Quod vt apertius ostendat,
 exemplum eorum affert qui acuto morbo laborant, qui vt ex-
 plerent sitim magnam egelidæ copiam hauserunt: hi hydropici
 euadunt nullo in liene vitio concepto. Sed per modum obiection-
 nis respondet pro illis veteribus, quorum maiorem partem Era-
 sistrati opinio imbuerat. Ea autem erat eiusmodi. Nulla pars
 afficitur (dicebat Erasistr.) nisi vel tumor aliquis, vel vlcus in ea
 consistat. Sic nullum ab intemperie morbum nasci putabat. At
 debuit Galenus in aliena sententia redarguenda non ita esse in-
 dustrius. Si quid durius, aut indoctius ab Erasistrato dictum sit,
 conari debuit illud polire, illustrare, & malè coherentem sen-
 tentiam adaptare. At mirum in modum connellendæ, labefa-
 tandæque opinionis Erasistrateæ desiderio detinebatur Gale-
 nus. Nam si turpiter lapsus est Erasistratus, statuens nullam par-
 tem citra aut vlcus, aut tumorem laborare, reprehendatur &
 Hippocrates, qui omnem morbum, vlcus constituat. Quam ta-
 men à veritate alienam sententiam temperauit Galenus lib. de
 inæquali intemperie. Multa quidem à multis veteribus dicta
 sunt, in quibus magis videndum quid sentiant, quàm quid di-
 cant. Quod maximè apud Hippocratem obseruari debet. Et cur
 non eodem iure cum Erasistrato agetur?

Itaque Galenus putat se abundè euertere dogma Erasistrati
 asseribentis omnem hydropem à tumore & scirrho hepatis cau-
 sam, principiumque ducere. Quod vt faciat, proponit suppres-
 sas hæmorrhoides, proponit profluuium muliebre. Hæmor-
 rhoides (inquit) suppressæ hydropem inducunt nullo præeunte
 in hepate tumore. Erronea itaque est Erasistrati opinio, existi-
 mantis sine scirrho hepatis hydropi locum esse non posse. At

Galenus suâ ipsius sententiâ se conuincit; nam interpretans aphorismum 12. lib. 6 Aphorism. dum reddit rationem cur suppressio hæmorrhoidon prius fluere consuetarum metum hydro-
 pis afferat, iuxta Hippocratem, scribit, sanguinem hæmorrhoi-
 dalem refluere, & hepatis duritiem inducere, multitudinēque
 calorem partis obstruere, hinc hydrops. Ergo non est, o Galene,
 cur occurras de hæmorrhoidibus utpote hydropem afferenti-
 bus, cum ipse scribas; idē suppressam hæmorrhoidam metum
 hydropis afferre; quod & hepatis, & lieni (nil enim differt) duri-
 tiem inducat, & calorem obstruat. Non sibi constat Galenus: nisi
 dicamus vtrumque contingere posse, & suppressionem hæmor-
 rhoïdon sine tumore visceris hydropem euocare, & eandem
 suppressionem tumorem prius inducere, & à tumore hydropem.

Paulo obscurior videri possit ea perodus, quâ scribit, ut euer-
 tat eorum sententiam qui tenuem humorem aqueum præterla-
 bi substantiam hepatis assererent ad generandum hydropem,
 resistente in ipsius visceris angustius crassiore sanguine; scribit,
 inquam, consequi necessariò ut deiectiones cruentæ sint: Nihil
 autem cruentum vlla in specie hydropis (inquit) obseruatum
 est à nobis. Non est dubium quin si illo modo fieret hydrops,
 aliquid cruentum secederet: sed videndum an non in specie-
 bus hydropis aliquid secedat cruentum; siue hoc modo, siue
 alio generetur hydrops. hoc enim obseruatione dignum existit.

Hydrops maximam partem coniunctam habet hepatis im-
 becillitatem: hæc non modò in *διυατοπονικῇ* consistit, sed & in
 attractione, & retentione attracti alimenti. Nequit enim fieri ut
 diu temperies iocineris labefactetur, quin actiones lædantur.
 Quanquam contingit ut vna actio lædi possit, illas à integrâque
 alterâ. Itaque cum constet ob refrigerationem & imbecillitatem
 hepatis excerni excrementa liquida, hepatica, & illius officine
 characterem aliquem præferentia, non dubium esse potest
 quin excerni non possint cruenta loture carniū simillima: pro-
 ptereaque illud Galeni decretum experiētiâ confirmatum mi-
 nus constans est, quo scribit nihil cruentum excerni solere in
 hydropicis affectibus. Quinetiam si cruentæ vrinæ virtute na-
 turæ aut symptomaticè potius in hydropicis excernantur, ut
 experientia sæpè docet; cur non & deiectiones tales apparebunt
 nequeunte hepate ob imbecillitatem, aut tumorem aliquem
 probè hæmatosi incumbere.

LIBER PRIMVS.

153

Duo ista diligenter inquiri debuerunt, nempe an à solo scirrho nascatur hydrops: posterius, an nihil cruentum hydropici excernant. Nam magni interest an à tumore, an ab inflammatione, an à scirrho; item an tantum ratione lienis, vt quidam volebant, an tantum à vitio hepatis, cum variet curatio pro ratione horum omnium. Item an nihil cruentum excernatur, an contra, ne dysenteriae falsà persuasione & opinione seducti, aliud remedium pro alio supponamus. Sed horum diligentius examen in aliud tempus reuictur.

ANNOTATIONES.

1. De aqua intercute hoc notari potest. Videmus hydropicis quibusdam aluum fluere, aliis astrictam admodum. Vtrumque malum: & pessimum, si aluus cum libera sit, abdomen non detumescat: quod in seruo quodam obseruauimus. Illud autem quod diximus malum esse scribit Hippocrates in Coacis: Quibus hypochondria eleuantur aluo suppressa, malum, maximè in morbis tabidis, & quibus alui humectantur, (supple) malum est, dum videlicet aluo fluentetumor remanet.
2. Cap. 7. lib. 5. de locis affect. conceptis verbis explicat Galenus. Ac inter cetera, annotat quarum partium vitio afficiantur partes gibbae hepatis ad hydropis generationem: & quarum partium vitio sima ad eandem generationem. Hippocrates lib. de morbis primo, hypofarcidion vt & tabem inter morbos necessariò interimentes numerat.
3. Quia enim hepar est continuum, si sit inflammatio in sima, aut gibba, non distinctè & exactè cognoscitur ob carniū hepatis continuationem.
4. Argumentum hoc validum. Et miror cur Fernellius disputans de Ascite dicat necessariò rupturam fieri aliquam vasorum: & propterea, aut supra, aut infra excerni sanguinem. Quod falsum, & Galeno repugnat. Et Fernellius ita in errorem Erasistrati incidere, qui nullam partem labefactari credidit, nisi aut à tumore, aut ab ulcere. Quasi ipsa intemperies frigida causa non sit.
5. Vt libere dicam quod sentiam de iis qua hoc loco continentur, an in nulla hydropis specie aut deiectiones, aut vomitiones cruentae appareant. Quod placuit Galeno. Ita distinguere oportet: Si quo modo voluerunt vereres, hydrops feuer percolato sanguine, & remanente crassa sanguinis parte in medijs vis, oporteret cruentum rici aut per os, aut per aluum, immò initio etiam. At hoc non fit. Et ita debet intelligi locus Galeni: Non quin in hydropicis deiectiones cruentae, aut vomitiones apparere possint,

omus 1.

V

154 CONSILIORVM MEDICINALIVM
duabus de causis: Vno, progressu temporis adducto in summam imbecilli-
tatem hepate, unde hepaticæ fiant deiectiones, non ratione transsumpti
tenuioris seri ad generationem hydropis, & resluentis sanguinis ab he-
pate ad os aut aluum. Altero modo per ruptionem, aut exesione[m], aut
ab aquis acribus & ferè purulentis, aut ab usu medicamentorum acrium
quæ usurpari solent in hydropicis. Quod nos obseruauimus in Renato de
Sequenille hydropico, cui & vomitiones & deiectiones cruentæ contige-
runt. Si autem hydrops fieret eo modo quo voluerunt veteres, quod Gale-
nus exagitat, de essentia ferè esset hydropis vt sanguis excerneretur. At
potest hoc accidens illi esse, sed non pathognomicum. Vide quid de Asci-
te sentiat Fernellius, cum explicat quinam Ascita sint obnoxij.

CONSILIVM XL.

Pro muliere grauida, quæ peperit, & conuulsiones
passa est.

NOBILIS mulier nunquam dolores partus experta, cum
legitimum pariendi tempus iam elapsum foret, decimi-
que mensis pars prima aduentaret, grauissimè laborat. Exactis
horis duodecim partus sese offert. At quia primus erat propter
dolorum insolentiam, & ossium pubis angustiam, mirum in mo-
dum diuexatur¹. Interim dum enititur, aut translato sursum hu-
more affatim, aut latitante eodem in cerebro, sed magno im-
petu diffuso, incipit toto corpore concuti ac conuelli. Idem pa-
titur ac si morbo caduco laboraret. Facies tota in molem intu-
mescit, horrendaque visu sese ostendunt symptomata. Vix sex
hominum nifus impediunt quominus concuteretur ac conuel-
leretur.² Repetit ante partum, præsertim dum foetus mediâ
viâ sinus pudoris hæreret, subsisteretque, epilepticus paroxys-
mus quinquies, aut sexies: edito partu bis aut ter cum grauissi-
mo mortis metu. Dum res ita virgerent, cogitareturque po-
tius de sepulchro quàm de lauacro; dubitabant Medici num iu-
uandus esset partus, an potius conuulsioni occurrendum.
Item, an occasione partus conuulsiones prehenderent, an
verò eiusmodi dispositio prius in cerebro desces latitaret,
quæ occasione minimâ sese prodidit. Ac mors immine-
bat proxima nisi conuulsiones illæ substitissent. Meo qui

dem iudicio, si illa conuulsioni obnoxia foret, non tantope-
re periclitabatur, quàm si nunquam aliquid tale experta fuisset.
Etenim qui epilepsiâ corripî solent, licet sepius eodem in paro-
xysmo conuellantur, non propterea tamen decedunt: At illud
obseruatum sæpe, eos sæpe fato fungi, qui aut propter ingentem
plethoram conuellantur, aut à maligno explicato, suscitatoque
tetro humore qui deses restagnansque imò præcordiorum deli-
tescebat. Et qui morbis eiusmodi corripî solent, exiguâ admo-
dum occasione tentantur, immò solo forinsecus vapore feriente. At
qui nil duni talesenserunt, non ita facîle paroxysmoprehendun-
tur; vehementem enim causam esse oportet, quæ insolens hoc
symptoma afferre possit: nec enim facîle cerebrum nunquam
epilepsiâ tentatum eam labem contrahit. Eadem itaque operâ
& partus iuuabatur, & conuulsioni epileptica manus porrigeba-
tur, ne illius vi citò interiret.

Causæ hæc tanquam procatareticæ facere poterant ad indu-
cendum horrendum symptoma nunquam antea visum: Pletho-
ra corporis summa, & vsus vini hippocratici tempore grauidita-
tis: suppressio alui quinque aut sex dierum ante partum: Enixus
quoque ipse, qui etiam in habitissimis mulieribus solet semper
aliquid terrificum inducere. Accedit quod nunquam peperis-
set. Subiecto acriusculo enemate ex hiera substituerunt conuul-
siones, & ab eo tempore nil sensit eiusmodi. Larga admodum
copia sanguinis fluxit per sinum pudoris: quod suadet facîle non
tam occasione dispositionis & impressionis cuiusdam quàm co-
pia materiæ, orgasmo, raptu, & nisu maximo inter pariendum
hoc contigisse. ⁴ Itaque cum Medici animaduertent eua-
cuato humore repressum esse symptoma, immò suppressum
omnino, ducti sententiâ Galeni lib. de locis affectis, cum quid
excernitur in morbis, & ab excretionemorbi cessant, credibile
illud causam fuisse morbi, cogitauerunt de purgatione. Itaque
tale medicamentum institutum.

*2℥. expressionem 3 ijs rhubarb. electi infusi in decocto passul. glycyrr.
semin. frigid. maior. endiuia, scariola, in qua dissol. syrup. rosar. pallid.
3 j. diaphæn. 3 iij. fiat potus.*

Quidam putabant utendum valdè calfacientibus, etiam inter
purgandum: cuiusmodi sunt ea quæ vulgò epilepticis præscri-
buntur: alij contra refrigerantibus ad domandum, sedandum-
que ferociam humoris. Et posterius hoc consilium melius. Nam

156 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quoties paroxysmi epileptici aut similes morbi occurrunt, non statim ad vulgaria remedia veniendum, ac si vnus morbi in specie eadem causæ essent specie: sed sapè nouum captandū consilium. Alij Medici hoc poculum præscripserant.

℞. rad. dictamn. aristoloch. an. ʒ. s. biflora ʒij. sem. pæonia maior. ʒ ij. rad. pæonia ʒij. flor. cardui p. j. conseru. anihos & saluie an. ʒ j. rasura eboris, cornu cerni, an. ʒ ij. fiat decoct. ad lib. s. in colat. dissolu. theriacis optima ʒ ij. rasura unicornis ʒ j. syrup. de stæchad. ʒ j. s. fiat potus pro duabus dosibus, aromatizatis cinamom. & nuce mosc.

Postridie partus propinatum medicamentum, deiectiones multæ: primùm effusiones quædam. Vocat autem Dominus Magnus effusiones ex sententia Hippocratis cum excernuntur talia qualia excernere solent vaccæ: item & vliginosæ fuerunt deiectiones. Qui euerunt omnia: non propterea tamen iusserunt Medici securè dormire. nam ita res agitata est: morbus hic tametsi suppressus videatur, non propterea de eo securos nos esse oportet, tum ratione partis oblesæ, afflictaeque prioribus paroxysmis; tum ratione morbi ipsius. Pars cerebrum est. Si ad illum morbum affectum procliuè dispositumque fuit: maior relapsus metus esse debet, minimâ enim lochiorum suppressione, aut reliquâ materiâ prioris paroxysmi facilè morbus recurret. Si non erat dispositum, melius quidem agitur, sed securitas tamen magna esse non debet. Nam morbus is (vt de eorum quam de posteriore diuisionis nostræ membro dicatur) relapsus ferè particeps est. Et duabus de causis facilè recurret. Prior est. In prima lunæ quadraturaprehendit paroxysmus, lunaris morbus est, ergo tutos nos esse non oportet, nisi secunda quadratura relapsa fuerit, donec luna sit *ἡγετος*: in eiusmodi enim quadraturis mutationes, inclinationesque fiunt. Sic omnia tutamere oportet. Accedit altera causa: Quarto die lac ad mammas rapitur, fertur, & attrahitur: ratione duplicis motus; & quia calidum est, & supprimitur in hac muliere vtpote non lactanti; metus est ne fumi summittantur qui paroxysmum reuehant. In confesso enim est quod scriptum ab Hippocrate, à sanguine in mammis collecto furorem contingere, præsertim cùm sanguis ille in lac non vertitur, aut propter abundantiam nimiam, aut propter feruorem; quod diligenter annotandum est. Si furor itaque eam ob causam imminet, cur non & conuulsiones, & aliud quid simile contingere poterit, eo præsertim tempore quo lac

ad mammas deferetur? Ratio hæc vrget admodum.

Itaque prouidendum vt alius libera semper sit, raptus sanguinis ad mammas cohibeatur, malignæ qualitati consulatur, vitentur omnia fumida, graueolentia & suaueolentia, ne caput impleant, feriantque. Videndumque vt purgationes à partu citentur semper. Atque in eam rem comparata hæc sunt.

℞. rad. rubia tinctor. asparagi, gram. oxylapat. an. ℥. s. angel. m. j. passular. mundar. ℥. s. florum comin. p. j. semin. pæonia ℥. ij. buglos. borrag. omnium capill. an. p. j. fiat decoct. ad lib. j. In colat. dissol. syrup. capillor. ven. ℥. ij. Fiant tres doses aromatiz. pauco cinam.

Item ℞. conseru. anthos ℥. s. conserua rosar. ℥. ij. sem. pæonia ℥. j. s. fiat opiata cum syrupo conseruat. citrij. additus est ℥. s. pulueris scobis unicorn.

Item ℞. rasura eboris, margar. elect. an. ℥. j. rasura unicorn. ℥. s. puluer. elect. triasantal. & diamargar. an. ℥. j. cum saccharo dissol. in aq. angel. aut decoction. eiusdem. fiant tabella.

Item ℞. aquar. stillatitiar. angelica & morsus, aut decoct. angel lib. s. aromatizet. parum cinam. ad vsum ex cochleari.

Interea fotu aqua tepide procuratum est vt citarentur lochia. Omnia odorata vitata sunt.

Puellis recens natis mel deglutendum aut lambendum porrigitur optimo vfu, vt prouocetur alius, & vitentur tormina.

Item ad vitandam conuulsionem cui obnoxij sunt, cum pulte miscetur corallium & puluis margaritarum.

Purgationes à partu cumulatæ, & vt decuit, exierunt. Magna copia toto illo tempore sanguinis exiliit. Interiectis diebus inieci clysteres. Tamen ne quid alienum contingat, deinceps de purgatione cogitatum. Ac dubitatum an lauacro vtendum sit, vt à partu nostrates mulieres solent. Repurgata est rheo & catholicon. Quanquam suspectum sit catholicon, quod in suspicionem Epilepsiæ & cassia & catholicon suspectum sit, vt doctissimi à Rondeletio & Hollerio annotatum. Idque annotatum puto aut communi quadam prudentiâ cui experientia suffragatur. Et vt cum è lecto surrexerit, repurgetur adhuc, visum est è refore si apozema per decem dies vtendum præscriberetur.

℞. rad. feniculi, petros. aspar. ci chor. acetos. an. ℥. j. enule camp. ℥. ij. melissa, omnium capill. an. m. j. buglos. borrag. glycyrrh. passul. an. m. j. ceterach. scolopen. an. p. j. semin. pæonia & radicis eiusd. an. ℥. j. s. sem. seselcos ℥. j. florum, p. j. agripalma m. j. s. fiat decoct. ad lib. j. In colatur.

158 CONSILIORVM MEDICINALIVM
*dissol. syrup. capill. ven. ʒ iiij. cinam. ʒ. j. Fiat apozema clarificatum
& aromatizatum.*

Quod attinet ad vsum balnei, ne quid fortè contingat præter opinionem, præsertim si muliercularum balneum vsurpetur ex facie vini albi aut rubri, ex alumne, & similibus, visum est interdici debere vsu eiusmodi balneorum. Nisi fortè balneo dulcis aquæ recreari velit: & pro omni deterforio fiat pùlt ex amygdalis contusis & hordeo contuso, quâ corpus leuiter fricetur. Ita enim detergebitor corpus, & nihil incommodi afferetur. Nam cùm balneari vñ vsu caput vaporibus impleatur, & grauitè in iis vsurpandis peccetur, si quid peccatur, facillimè autem omnium hîc peccatur, contentos nos esse oportet simplici frictione. In quibus autem paroxysmi epileptici metus est, in iis cautos esse oportet in balneorum vsu. Quodenim veteres epilepticos & melancholicos ad lauacra miserint, id factitatum esse asserimus cùm, corpus, aut caput intemperie aliquâ calidâ siccâque affectum est, cùm in partibus omnibus squallor. Hîc enim dubium esse nō potest quin balneis locus sit ad correctionem calidæ siccæque intemperiei, quæ multorum, magnorumque malorum auctor est, & parens.

ANNOTATIONES.

1. Quod à translatione potius sit, declarat eius accidentis repressio at cessatio cùm primum alius descendit.
2. Non est dubium quin mulieres affectionibus capitis magis sint obnoxie, cùm multis de causis, tum propter capillorum exactam nimium diligentiam & studium; quod annotat Celsus Aurelianus in Chronicis.
3. Nam qui à dispositione cerebri epileptici sunt, & concidunt, minima occasione &prehenduntur, & releuantur: sed cùm quis nunquam aliquid tale sustinuit, magnam oportet adesse causam quæ hoc symptoma afferat: nam vel est summa plenitudo, vel summa corruptela, ut contigit de eo qui primo die phreneticus contigit, & tertio interit à maligno, ut Galenus doctissimè interpretatur. Itaque cùm quis epilepsiam prehendi solitus est, minus morte periclitatur, sed aut nunquam, aut ægerimè eo morbo defungitur. Si nunquam expertus est, periclitatur morte ob dolores acerrimos, & virium casum: & quia pars princeps occupatur. Si semel hoc sustineat, non ita facile relabitur. Quod autem periculū aliquando creet

CONSILIVM XLI.

Ad fætorem oris & anhelitus.

MVLIER annos nata quinquaginta leui de causa in morbum incidit. Ab eo releuari recrearique vix potuit. Inæqualiter corpus afficiebatur, modo calidiusculum, modo temperatum. Noctu, ac præsertim vesperi febris recurrebat. Eò tamen ventū est, vt cõtabescere videretur. Sed paulò plenius res tractanda, & à capite arcessenda, vt id quod instituti est nostri clariùs luceat.

Illa ferè à primis vnguibus, teneraque atatula fædo tetròque anhelitu laborauerat, vt vix quisquam in os loqui auderet fætore oris territus. Et cùm illi incumberet propter eum quem in republica locum tenebat, cum primariis hominibus confuiscere, eam tantæ molestiæ sæpe pertæsum est. Nil non in eam rem excogitauit ascito illustrium Medicorum concilio, præscriptis eò variis formulis quæ in parato forent ad fallendas, leniendasque eas molestias. Quidam eam vsu carniū omninò interdixerunt, alij aliud consuluere, quorum cùm lubenter consiliis paruisset, nihil præter fucatam oris tantum suaueolentiam retulit, cùm frustra in oris gratia concilianda fuisset elaboratum.

Nos ab eo fætore contumaci auspicari volumus, quod quæ causa eum primis annis fouerat, ac aluerat, ea non minore liberalitate sui extrema senectute copiam fecit. Immò morbum aut morbos potiùs fœcundâ sobole parturiit, quibus in depellendis multum operæ insumptum est: sed hæc omnia frustra. Itaque cùm leui quodam morbo tentata esset, efficacibusque remediis contra pugnatum esset, nihil dum sensit solatij: immò ægrescere medendo videbatur. Recruduit ille vetus oris fætore, palatum, gingiua, faucesque ipsæ limoso cœnosoque humore tanquam vligine quadam erant oblita: & cùm is humor aut muccor potiùs teter deterfus esset, citiùs dicto alius putrefacti deterfas illas partes retineret, ac occuparet. Vrinæ velut purulentæ profluebant: ex interuallis ardor urinae eam exercebat. Febris aderat è genere hecticarum putrium: inappetentia magna: virium amissio, mox earundem recuperatio: marcor totius corporis: squallidus habitus. Edendo nihilum proficiebat, ex-

metu euehymis vteretur. Dubitatum est de sede huius mali, de affectibus, aut implicitis, aut diffusis: de marcoris tanti causa, de remediis: & quis tandem foret euentus illius morbi ita occulti ac inueteracentis. Morbus omnis cum actionem primo ac per se laedat, tolli, excindique debet: nunquam tolletur nisi causa continens, quæ eum fouet, adimatur. Nec tantum in causa continente adimenda occupatos nos esse oportet, quod hæc morbum proximè foueat, sed per analysin quandam continuatione quadam ad alias causas sensim progrediendum, quæ morbum primum fouere dicantur. Tametsi enim & causa morbi continens sublata, & affectus ipse sublatus primam Medico laudem tribuant, & nil postea repullulet, non propterea aliarum præcedentium causarum tanquam continentis causæ parentum inuestigatio negligenda. Quoties enim longior quædam continuatio seriesque causarum existit, ut alia ex alia nasci & existere videatur, & omnes inter se aptæ connexæque videbuntur, tanquam conspirantes in causæ continentis affectusque ab ea nascens generationem, tanquam in commune quoddam opus, suo quæque ordine excutienda ac demenda, & ab ea curationis exordium duci debet, quæ ortu prima, sed inuentione postrema videatur. Nam in curatione, ratione, & ordine suscepta ita capari debet consilium, ut sæpè id negligatur quod postremo loco duxeramus faciendum. Alioqui frustra in tollenda continente causa laborabitur, cum ea nimium occulta, contumaxque sit, & cum à primis aliis causis pendeat, harum demolitio illius euerfioni anteponenda est.

Ita coniectura artificiosa, quam *συναγωγή* Galenus vocat, assequi oportet, primum mali fontem, & in eum digitum immittere. Quod ut exemplo pateat, esto aliquis, cui æstus sit ventriculus, & præterea acribus, piperatisque, & semiputribus caseis sæpè vtatur; unde putrium biliosorumque humorum colluies: ab ea obstructio, ab obstructione putredo, à putredine quoque febres. Sit ita sanè, vsu medicamentorum putredinem emendes, obstructionem liberares, an propterea febris illius scaturiginem, primumque principium tolles? Itaque ad ventriculi intemperiem corrigendam erit veniendum, immò prauum illud alimentum corrigenda causæ externæ eatenus rationem habens erit adimendum; frustra alioqui de tollenda febre sudabitur.

In hac nostra muliere affectus qui occurrunt, sunt summus

oris foetor, febris hectica putris: renum abscessus quidam: torius quoque corporis præter rationem consumptio. Hic analytica methodo vtendum ad sedum affectuum notitiam. Hæ autem dignoscuntur aut signis syllogisticis, aut pathognomonicis, aut consequentibus, aut excretis. Excreta autem vel partium ipsarum partes sunt quæ ab iis defecantur, vt pulmonis frustas, vel quæ in ipsis continentur, nonnunquam aliquid quod morbosam dispositionem sequitur, vel solam, vel semper, vel vt plurimum. Ac in affectuum locorum inuestigatione tria maxime sunt aduertenda, & tanquam canones proponendi ob oculos, quos semper intueamur: *Locus, Affectio & causa, Accidentia.*

Quæ tria cum animo comprehensa erunt legitimo ordine ad affectuum sedum cognitionem deueniemus. Ac locus ita sese nobis insinuat. Si affectio esset in cerebro (exempli gratia) vel per consensum fieret, vel per protopathiam. Si per consensum, fugacia essent symptomata; si per protopathiam, vel intemperie laboraret, vel solutione continui, & sic talia aut talia occurrerent. Idem de hepate sentiendum, & suis se signis ostendaret morbus, tum sedem, tum affectionis ideam indicantibus. Affectus & causa ita veniunt à nobis excutienda. Si inflammatio esset, quæ sese offerrent eius essent generis; inflammationis enim consequentia hæc sunt: si scirrhus foret, talia sequerentur; si inflammatus esset pulmo, eiusmodi essent symptomata & signa, quibus notitiam ipsam consequeremur. Ab accidentibus autem ita eruitur cognitio rei: Dolor est eiusmodi, hoc itaque denotat: Aphonia est, necesse igitur id subesse, mortuus est osificij ventriculi, illinc aut inde contingit.

Quod in nostra muliere exerceri debet: foetor est oris, ergo aut à cerebro est, aut à pulmonibus, aut à ventriculo, aut à præcordiis. Si à cerebro est, à destillatione & rheumatismo est; ac incredibile esset tussiculam adesse. Nam quæcumque materia est quæ foetorem habet, ea putris est; si putris, exulceraret, ac proinde molesta foret aut œsophago, aut tracheæ arteriæ. Si huiusmodi tussis esset; si illi, praua chylosis fieret, à praua chylosi fluores alui, deprauatio omnis alimenti, extenuatio. Si à pulmonibus est, aut vlcus, aut siderationem thoracis significat. Si vlcus, argumenta iam pridem innotuissent: at nulla hæcenus. Si sideratio esset, non tam diu eum affectum pertulisset. Si à ventriculo est, per deprauationem alimenti, assumpto cibo cessaret foetor;

vacuo ventriculo appareret. Nam inanito ventriculo fumi sursum efferuntur, qui graueolentiam afferunt. Quod multis contingere Aristoteles in Problematis scribit. Credibilis est eum foetorem & à thorace esse, & à ventriculo. A thorace esse potest, non concepto vlcere vlllo in pulmonibus. Etenim verum id est quod scribitur à Galeno, in partibus ipsis citra inflammationem, tumorem, aut obstructionem vitium concipi, quod à tota substantia dicitur. Quod & in pulmonibus verum esse potest, cum fieri possit vt proprio quodam pulmonis vitio, & ob coactionem humidioris materiae spiret aura foetens. Tamen si vitium esset totius substantiae in pulmonibus, credibile non esset eam tandiu vixisse. Ac Gordonius annotauit oris foetorem à pectore nunquam curabilem esse. Quod bifariam potest intelligi, aut quod foetor à thorace vlcus, aut quid simile significet & iam inueteratum, vnde necessario interitus consequatur. Nam sputum foetens, mortem in propinquo significat: Aut quod cum foetor est à pectore, ob remediorum difficilem ad pulmones penetrationem, causa illius foetoris immedicabilis manet. Idem autor communem quandam foetoris oris causam memorat humorem phlegmaticum. Nam nec humor biliosus ita aptus est, nec melancholicus, cum ille suam acrimoniam & calore putredinem facile arceat, hic suo acore contra foetorem istum sese quodammodo obfirmat. Vnde quibus foetor oris est, iis & palatum, & dentes quodam muccore sunt obliti & infecti. Quod huic mulieri contigit. Incredibile enim dictum est quanta copia coenosi humoris quotidie in os recurreret: quod tetrum humidumque halitum à pulmone aut ventriculo potius elatum indicaret. Nam qui à pulmone est, exhalationem refert potius: qui à ventriculo & praecordiis, vaporem & halitum. Credibile in hac muliere à vapore potius quam exhalatione, declarat satis copia excrementi. Ac quinque de causis phlegmaticus humor omnium facillime foetorem inducere ita colligitur: Prima, quia frigidus, & ideo facile suo genuino calore destituitur. Secunda, quia humidus, quod facilem ad putredinem concipiendum inclinationem affert: Tertia, quod omnium facillime (ratione corporis, est enim multus, & superfluus in corpore) rheumatismum faciat: Quarta, Quod omnium facillime ratione prauae dietae, quam quotidie instituere videmur, accumuletur ac succrescat. Quinta, quod post sanguinem abundet maxime.

Et annotat idem Gordonius, foetorem à ventriculo non esse continuum, quòd assumpto cibo paulum quiescat: Cum à pe-
ctore continuus est, & vlcus pulmonis significat, & lethale est.
Quod non probabile esse satis abundè paulò antè indicauimus.
nam fieri potest vt in pulmonibus putrescat materia exitum nò
habens, quæ oris foetorem asferet.

Mirum tamen esse possit, cur in febribus halitus non foeteat,
cùm pituitosus humor sit, qui putris sit, hinc efflatio putris esse
debet, & anhelitus: si quæ prius dicta sunt, vera existant. Re-
spondet Gordonius, bifariam fieri putrefactionem; vno modo
per ebullitionem & incendium quoddam à calore præter natu-
ram: & ea putredo non inducit foetorem, cuius generis esse so-
let in febribus: Et alia est per substantiæ corruptionē. Sic in fe-
bribus cùm foetor anhelitus est, mors significatur; quòd non so-
lùm humidæ substantiæ ebullitio significetur, sed propriæ sub-
stantiæ corruptio. Sed pace tanti auctoris dicam, hæc minus con-
gruè, verèque dicta sunt. Nam quis dubitet in febribus conti-
nuis, putridis, aut intermittentibus non simplicem esse ebulli-
tionem? Nonne excretos humores sursum deorsumve in pu-
tridis febribus foetidos, corruptosque videmus? Et tamen in iis
facta est simplex ebullitio, per Gordonium: Quasi verò cùm
foetor aut à pulmonibus, aut à vètriculo est, maior sit (manete
præsertim vita) propriæ substantiæ corruptio, quàm in febribus
putridis in quibus excretionēs sæpe cadauerosæ & putres ad-
modum apparent? Non est credibile. nam si halitus foetens à
ventriculo manans, tantam corruptionem significat, quomodo
tandiu maneret vita? Respondeat Gordonius de sudoribus, in
febribus præsertim pituitosis manantibus, tam graueolentibus,
vt vix quisquam eos ferat? & tamen non foetet anhelitus. Ita-
que alia querenda est distinctio. Nam non est dubium quin hu-
mores, si præsertim pituitosi sint, à calore præter naturam mul-
tùm corrumpanitur, & non tantam acquirant malam qualita-
tem quantæ requiritur ad foetorem oris. Cur ergo, inquires, non
foetet os? an quia simplex ebullitio, vt vult Gordonius? Nequa-
quam, sed quia humor qui febres committit, conclusus est in
visceribus, non autem in partibus thoracicis, aut capite, aut
ventriculo, aut ore: E quibus partibus necesse est spirare aliquid
ad foetorem oris. Quod si qui humor febres committit, in iis
partibus contineretur, dubium non esset quin foetorem oris ac-

cerferet. Nam si conclusus humor in præcordiis leipothymias ob tetrum vaporem, cardiogmos mortem denique inferat, cur non in superioribus partibus contentus foctorem afferre possit? Si per sudores erumpens tenuis eius pars, aut per vrinas, quæ sæpe foetentes sunt admodum, tetro vapore feriat sensus nostros, cur idem humor sursum repens, & thoracicas partes occupans, non tetrum odorem oris inferat? Hydropici graueolentissimos in abdomine humores continent, nec tamen tetrum spirant: Ergo quia humor in partibus ventris conclusus est, & non partes superiores capessit. Vnde videmus mulieres quibus suppressi sunt menses, aliquando tetrum spirare, & colligimus eas grauius ægrotaturas, quòd tanta sit humoris putrentis copia, vt non solum partes inferas, sed & superas occupet: in superis tetrum halitum, in inferis febres accersit. Ergo idem humor, & eius putredo non distinguitur. Quod autem in febribus maximam partem nec sudores graueolant, nec halitus propterea fit, quia maxima febrium pars à bile est; quod Hippocrates non minus breuiter quàm verè scripsit; quanquam hoc ab eo dictum plerique malè feriat homines non intelligunt. Bilis autem aut flaua, aut acida: neutra tetrum spirat ex se, aut illud paucum admodum. Contra in quotidianis & pituitosis, & vetularum febribus, & malus gustus est (vt vocant) ob tetrum halitum & putrentem in ventriculo humorem, & foetentes sunt sudores. Quod arguit non modò magnam humiditatem requiri ad tetrum halitum, sed & occursum materiæ ad partes oris, siue cerebrum sit, siue pulmo, siue ventriculus. Quod autem humores biliosi, aut melancholici non ita tetrum ex se emittant, vt & pituitosi, satis apparet sensui, ex alliis, cepis, pipere, synapi. Nam & allia & cepæ, & piper ferè eodem gradu calida esse veteres autumarunt: cur tamen ex iis alia tetrum spirent, alia non? Id fieri propterea assueuerant veteres, quòd allia, & capè multà humiditate prædita sint, quæ facillimè digeratur ac corumpatur, nequeunte calore illam coërcere ac mitigare: ideoque graueolent: à pipere autem & zinzibere nihil foetidum exhalet, quòd non tanta insit humiditas, & quantula est cumque facile superetur à calore. Quod idem humoribus contingit. Nam biliosi humores analogiam quandam habent ad piper & zinziber, pituitosi ad allia & cepas: & quæ humidiores sunt remperamento, & calore mediocri, maximam partem hircum re-

166 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dolent. Et mulieres vetulæ, quibus superfluit multa humi-
ditas, spirant malum odorem, & anhelitu asthmaticos pue-
ros faciunt: Et quibus gingivæ & os humidius est, iis teret
odor est. Quo fit vt concludamus multam humiditatem re-
quiri ad fœtorem oris, & præsentiam illius humoris in parti-
bus ori vicinis, alioqui conclusus manebit humor, & nil te-
trum in os mittet; vt malè concluderit Gordonius in febribus
putridis non tetrum esse halitum, ob simplicem humoris
ebullitionem: & quia qui illum halitum commissurus est, aliã
malam qualitatem ab ea quam febrilis materia nacta est, con-
cipere oportet. Idem est putredinis modus, vt diximus. Quã-
quam non negamus fieri posse vt in fœtore oris, præsertim à
malè affectis pulmonibus non adesse solum putredinem sim-
plicem, sed alienationem planè à temperamento, & perfe-
ctam *diapnoxi*. Quod nos observauimus in auriga ad ripam
Sequanæ, cuius ex ore fœtor (incredibile dictu) totam do-
mum inficiebat, & cadauerosum olebat. Vnde non ita longè
post fato concessit, siderato toto pectore. Et hæc sunt quæ
contra Gordonium agitari potuerunt: cui tanquam homini
doctissimo habenda gratia, quod disputandi fenestram ape-
ruerit.

Atque vt ad rem redeatur, de remediis illius fœtoris pau-
ca dicenda. Gordonius causam maximè constituit humorem
pituitosum. Mesurus cholicum quoque constituit; vnde
pro materiæ biliosæ conditione instituit ea quæ humectandi
vim habent, & contemperandi; vt est syrupus de pomis, & rob,
de acetositate citrij, diacytonites: At in corporibus biliosis,
siccis, in quibus abundat calor febrilis, videtur potius in co-
temperationem versandum. In materia phlegmatica, ea quæ
calfaciunt, instituuntur; vt confectio tryphæræ quæ ex aro-
maticis constat, caryophylli, cypperus, lignum aloës, cala-
mus aromaticus, & quæ sint eius generis.

Ergo cum febris illam mulierem exerceret, fœtor oris, in-
appetentia, vrinæ ardor quidam, atque vrinæ veluti purulen-
tæ funderentur, quamam methodo vtendum? cum quo agen-
dum prius? An affectus est compositus, an complicatus? de
iis breuissimè dicendum.

In morbis omnibus aliquid est quod sub sensum cadit, ali-
quid verò quod sensum fugit. Id quod sub sensum cadit, sym-

ptoma est; quanquam saepe est inuolutum ac implicitum, ut
an huius, an illius morbi sit certò definiri non possit. Si sym-
ptoma sub sensum cadit, nullo est opus signo quo sese nobis
detegat. Sensus enim fidem facit. Id quod sensum fugit, cau-
sa morbi est, & morbus ipse: Morbus quidem generali quo-
dam modo sese nobis ostendit, nimirum actionis læsione: sed
quia occultus saepe est, & causa recondita, intusque latens,
ideò concurrere debet signum quod utrumque detegat, at-
que demonstret. Signum enim est id quod sensibus nostris
obuium factum, aliud quippiam latens & occultum comita-
tur; id enim illius signum censetur. Symptoma autem, quia
conspicuum est, interioris, occultique morbi ex quo fluxit,
expressum est signum. Quia autem similitudines bonis & eru-
ditis Medicis imponunt saepè, ob morborum, causarumque
complicationem, ac confusionem; ideò in signorum ac sym-
ptomatum dignotione accuratos esse oportet: item in mor-
borum aut connexionem, aut complicationem Maximum au-
tem momentum habent signa insalubria in morbis, quod &
speciem morbi, & sedem, & causam alia atque alia designent.

Porro morbus aut vnus est, aut multi: vnus simplex, aut
compositus. Simplex aut solitarius, cum nulla efficiens cau-
sa adest, nullumque graue symptoma quod curantis consiliu
ad se reuocet; ut Intemperies simplex, Comitatus, quem
ad se reuocat causa intus fouet, ut obstructio, aut quem horren-
dum symptoma comitatur, ut cum morbo dolor ingens affi-
ctus. Compositus morbus est, qui ex multis eidem parti con-
nexis constat. At multi morbi saepius vnà nos exercent. Eos
autem aut implicitos, aut connexos, aut coniunctos, aut dis-
iunctos vocamus. Connexi, coniuncti, & consequentes
idem significant. Disiuncti coniunctis sunt contrarij. Impli-
citi & Coniuncti distinguuntur. Impliciti dicuntur cum va-
ria quidem partes afficiuntur, sed quae in communem actio-
nem omnes conspirent; implicantur enim, & communia elu-
cent symptomata, quaeque vix distinguas an id potius quàm
illud laboret. Ut cum difficilis est respiratio, & tussis, quia hæc
& in pleuritide, & in peripneumonia promiscuè incidunt, ea
per se non satis indicant an costa, an pulmo afficiatur. Sunt
enim *iuxta*, huc *quod*, ut loquitur Galenus: item & *spura*, quae
tanquam aliquid indicatura excernuntur, saepe difficultatem

Com. 1.
parr. 2. li.
1. Prorrho.

iudicandi afferunt, an hæc potius quam illa pars afficiatur, quod promiscuè indicent & costarum, & pulmonis, & asperæ arteriæ affectus, ut Galenus loco supra adducto probè recenset. Affectus autem complicatos indicat hoc exemplum, si quæpiam sit ceratoidis erosio, rhagoidis exitus, pupillæ distortio, & apparens suffusio, tamen omnes hi affectus vno eodemque tempore consistent, non tamen morbum oculi compositum efficere dicuntur: sed sunt morbi impliciti, id est variis partibus insident, quarum tamen in vnum opus est conspiratio. Sed cum morbus compositus dicitur, in eadem parte sunt multi morbi simplices: ut cum hepar intemperies sicca & calida cum tumore aliquo occupat, quia vni eidemque parti illi multi morbi inhaerent, morbum compositum constituunt, non simplicem. Proptereaque impliciti & compositi morbi eo tantum discrimine distinguuntur, quod cum simul simplices & multi sint morbi, si variæ partes in vnam communem actionem conspirantes occupantur, tunc morbi impliciti vocabuntur: Si autem vna tantum pars afficitur (nominine partis tamen non ita in angustum structumque adducta) tunc compositus morbus dicitur. Ut pleuritis & asthma simul existentia morbos implicitos efficiunt, quod vni eidemque functioni incommodent. Et ex recentioribus quidam morbos compositos ab implicitis accuratè distinxerunt, quod à paucis obseruatum viderent hoc discrimen: quod tamen magni interesse existimarent. Nam quod ad curandi consilium & indicationes pertinet, in composito morbo scopum vnum curationis proponi volunt, in complicato & inuoluto morbo diuersum: Exempli gratia, in tumore præter naturam & intemperies est, & vitium conformationis, & solutio continui. Huius tumoris cum cura suscipitur, tamen varia sese nobis offerant: vnus tamen scopus est curationis, nisi forte quosdam particulares effingere velis. At cum luxarum est brachium, & iuncta est inflammatio, & partis conuulsio, non hunc morbum compositum dices, sed implicitum, propterea quæ diuersi curationis scopi proponuntur. Hoc discrimen non agnouit Galenus disputans de morborum differentiis, confunditque morbos compositos & complicatos. Rectè quidem distinguit morbum partis similis à morbo partis organicæ, siue simplex, siue sit compositus. Vt tunc ad naturam

Quid
propriet
implici-
tus mor-
bus.

Cap. 13 de
morbor.
differ.

natae inflammatio, non oculi morbus per se tanquam totius instrumenti dicitur, sed primum & per se tunicae adnatæ dicitur, secundò totius corporis ipsius oculi tanquam instrumenti. Nam partium similarium morbi per se, ex euentu tantum toti instrumento accidere dicuntur; siue morbi ipsi singularum partium sint simplices, siue compositi; vt cum in pupilla est contortio & inflammatio: Et morbus compositus totius instrumenti bifariâ dicitur: vel cum vna tantum pars morbo composito afficitur; tunc enim totius oculi affectus dicitur, sed tantum secundariò: vel cum partes omnes oculum constituentes simplici morbo laborant; tunc enim ij omnes affectus morbum vnum compositum oculi totius dicuntur constituere. Sed recentiores non compositum morbum, sed contra Galeni mentem morbos implicitos vocant. Galenus de ea re nil primum statuit, sed aliorum affect opinionem. Nam cum vnguis & lippitudo est, cum erosio corneæ, cum vicia prolabitur, hoc totum vocant quidam morbum oculi compositum, alij diuersarum partium diuersas affectiones. Et vtrorumque probabilem sententiam asserit, mirumque est quomodo dicat Galenus nihil interesse siue hoc totum morbus compositus dicatur, siue plures morbi diuersis auxiliis egêtes, quoad pertinet ad curationem. Falsum enim hoc est. Cum autem satis abundè demonstrauerimus interesse plurimum ad curationem si morbus compositus dicatur, & si morbi complati; in his quippe & illis diuersi omninò scopi sunt. Sed Galenus non ita exactè intelligendus. Nam ex eo appellandi morbum oculi compositum occasionem sumi vult, quod cum ocululus vna sit pars ex particulis multis constituta, quæ omnes ita congruunt vt in vnum opus conspirent; propterea hæc simplici morborum congeries & syndrome non ineptè compositus oculi morbus dicitur. Sed clarioris doctrinæ & intelligentiæ causa appellentur multi morbi particulares & impliciti: Vt nominem [impliciti] diuersas morborum ideas per se exhibeat: quomodo Galenus aliud esse docet febres compositas, & implexas, ^{2. de diff. ferent. feb.} siue implicitas. Galenus autem in illo libro de differentiis morborum, postquam aliorum sententiam proposuit, vt eos inter se conciliet, videtur quid sentiat aperire. Quod vt facilius præstet, à morbis simplicibus incipit, quorum quidam totius oculi primò esse dicuntur, alij secundariò tantum, & ^{et secundariò} tripartiti. Exempli gratiâ: Suffusio totius instrumenti morbus est per se: at cera-

Tom. I.

Y

170 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 toïdis exulceratio, instrumenti morbus esse dicitur ex euentu
 tantum; per se enim ad corneam tanquam similem partem re-
 fertur. Sed longè aliud statuit discrimen de morbis compositis.
 Nam ex compositis morbis quidam sunt proprij totius instru-
 menti, nempe oculi, primò & per se: alij ex accidenti, vt, adna-
 tæ inflammatio propria est tunicæ affectio, ideo ad totum ocu-
 lum non refertur, nisi secundariò: Ergo, vt vult Galenus, ponam
 mus plures oculi partes simul vnâque affici, vel vnâ tantum
 partem, vt patet in inflammatione tunicæ adnatæ: cum vna tan-
 tum pars, ea affectio dicitur morbus compositus vnus partis
 per se, & totius instrumenti secundò tantum: cum multæ simul
 oculi partes, morbus dicitur totius instrumenti primò & per se,
 ait Galenus: quod falsum videtur. Nam ceratoïdis erosio, rha-
 goïdis exitus, pupillæ distorsio, morbi sunt singulares, multas
 oculi simul partes (si fors ferat) occupantes, primò per se, an-
 quia in cumulo sunt, propterea dicentur primariò referri ad to-
 tum instrumentum; quod vult Galenus: Si ceratoïdis erosio per
 se ad partem vnâ refertur, & pupillæ distorsio per se ad altera-
 ram partem, secundariò autem vterque affectus ad instrumen-
 tum totum referatur; cur potius cum singulæ per se æstimantur
 ad partes suas primò & per se attribuuntur, coniunctæ autem
 ad oculum totum reuocantur? Sed dicet quispiam: Cum Ga-
 lenus vult morbum compositum totius instrumenti vocari, cum
 multæ simul partes afficiuntur ipsius oculi; non hoc est intelli-
 gendum cum partes multæ afficiuntur affectu sibi proprio, pe-
 culiarique: sed affectu qui per se & primò & simpliciter ad to-
 tum oculum referatur. Nam suffusio per se ad oculum refertur,
 sed si ad suffusionem alius morbus generalis oculi, vt vnguis, &
 rheas accesserit, hi omnes morbum compositum efficient to-
 tius oculi primò & per se, quia singuli per se morbi prius in se
 considerati ad totum oculum referebantur. Sed Galenus non
 vult tantum morbum totius instrumenti vocari, cum omnes
 aut multæ simul partes afficiuntur morbis, quorum singuli pri-
 mò erant totius instrumenti; vt suffusio, vnguis, rheas: sed cum
 morbis quoque detinentur, qui singuli in se spectati peculiarem
 ad partes singulas rationem habent, & secundariò tantum cum
 soli spectarentur, ad totum instrumentum referuntur. Verba
 autem Galeni hæc sunt loco supraposito: Cum plures eodem tem-
 pore partes oculi morbo aliquo afficiuntur, morbi ipsi primò totius instru-

menti esse dicuntur, atque eo magis si unusquisque morbus antè erat primò & per se totius instrumenti. Hæc verba, atque eo magis, indicant affectiones aliarum partium peculiare, vt distorsionem, exitum, erosionem commixtas inter se posse totius oculi primò & per se morbum compositum efficere. Vnde antea dixerat nihil interesse an quis dicat eas affectiones (quarum vnaquæque propriè & primò ad oculi partes, non autem oculum totum referretur) morbum compositum oculi efficere, aut multos morbos aliarum partium. Sed tandem vt hanc nos disputationem terminemus, quoniam fortè noluit Galenus rem tam exactè disquirere, dicemus quid nobis videatur de morbis compositis & complicatis. Quod tamen non expressit Galenus, licet tamen id ipsum ex illius scriptis elicere & venari: vt non sit cur ea in parte recentiores sibi palmam deciderè oportere existiment, ac si eorum hoc esset inuentum, & huius tantæ rei autores essent ac principes. Cum multi morbi occupant varias oculi partes, siue per se sint simplices, siue compositi, vt tunica inflammatio, aut illi morbi cum simplices considerantur ad partem hanc aut illam peculiari-ter referebantur, aut generaliter ad oculum ipsum totum. Puta vnguis simplex morbus, & rheas ad totum oculum attribuitur, nomenque dat: Ergo si multi tales morbi complicantur, morbum compositum totius oculi primò per se efficient. Sed pupillæ contorsio, rhagoidis hic aut ille affectus, cum secundò tantum ad instrumentum totum referatur, si multi tales morbi peculiare in hac aut illa parte, peculiarèque denominatione inducentes, complicantur, morbum efficient compositum totius oculi: sed vel dices istum morbum compositum non propriè & primò totius oculi dici, sed secundò tantum, quod seorsim spectatæ affectiones has aut illas partes attingerent: vel potius vocabimus multos morbos multarum partium, vel implicitos morbos vni oculi functioni generaliter officientes. Sed hæc sufficiunt. Ergo morbi multi aut impliciti dicuntur, aut con- nexi, seu consequentes, aut disiuncti. Impliciti, vt dictum est, sunt, quorum ea est ratio, vt per se distinguantur: sed qui tamen ita inter se conspirant, vt vni eidemque actioni incommodent: vt de morbis vnam vnius oculi actionem lædentibus dictum est. Item pleuritis & asthma, quia duo sunt affectus partium re- spirationi dicatarum impliciti morbi dicuntur (cum simul inuadunt) quia communia quæ dā habent symptomata, vt tussim, & diffi-

172 CONSILIORVM MEDICINALIVM
cilem respirationem. Connexi, & consequentes idem signific-
cant recentiorum opinione; quanquam nomen *Consequens*
paulò latius manat quàm *Connexum*. Exempli gratiâ: Morbi con-
sequentes seu connexi dicuntur, quorum vnus posterioris est
causa & autor, & vterque morbus simul manet: Vt cùm affectus
est ventriculus, & ei affecto caput condolet, & morbi conse-
quentes, & connexi dicuntur. Quod fit aut propter morbi na-
turam, vt cùm pleuritis necessario febrem continuam aduoca-
tam habet, & dicuntur morbi consequentes & connexi: Aut ex
partium conditione, quia quæ sunt propinqua, quæque commu-
nia, ea primum & maximè affici solent, idque aut generis simili-
tudine, aut vasorum communione, aut operis societate, vt pas-
sim annotauit Galenus. Cùm itaque ea est morbi ratio, vt vnus
alterius causa sit & autor, atque ita vt nisi adempto vno, alter
non tollatur, propriè connexi morbi illi dicuntur: sed in ratio-
ne consequutionis, quia euenire potest vt commutatione qua-
dam morbus alteri succedat: vt cùm peripneumonia pleuritim
sequitur, hinc non connexi, sed consequentes dicuntur. Obser-
uatur siquidem consequutionis ratio, ac connexionis nulla est.
Sic nomen *Consequentis* longiùs patet quàm *Connexi*.

De connexis, consequentibus hæc dicta sint. Sed vt scrupu-
losis è cotibus tandem oratio nostra enatet, de disiunctis sepa-
ratisque morbis nihil dicemus, quod satis disiuncti intelligan-
tur, qui in separatis partibus versantur, quarum non est ea com-
munio quam suprà diximus. Qui morbi in ea muliere, cuius
gratiâ hoc susceptum est, satis innotescunt. Nam & in ore scæ-
tor erat à prolapsu patris pituitæ à capite, adiuuante quoque
tetrâ exhalatione à partibus inferis: & renum male affectorum
ac purulentorum magna quoque fuit suspicio. Atque omnia ita
erant occulta, vt morbus potius in diaphthora consistet, quàm
in manifesta aliqua intemperie diceretur. Febris erat lenta, cu-
ius seminarium aut renes malè affecti erant, aut mesenterium
semiputre. Illud obseruatum in ea quod 6. Epid. scripsit Hip-
pocrates: *Omnis extenuatio laxat cuim, deinde distendit: Resectio
verò distendit, deinde laxat.* Extenuationis causæ, alimenti pe-
nuria, exercitationes plures, vigilie, agitationes, dolores, mor-
bi colliquantes, euacuationes, prauitas humorum in vasis, vt
narrat Galenus in historia de muliere extenuatissima, 6 Epid.
In hac muliere corruptionem esse aliquam testantur omnes es;

cretiones omni ex parte. Accedit quod in omnis morbi diu-
 turnitate per Galenum, comment. in aphor. *Acuti morbi in*
quatuordecim diebus, &c. est obsidio partis alicuius, cuius occa-
 sione fouetur tam longus morbus. Et cum caloris & frigoris
 magna sit vicissitudo, declaratur vaporis suscitatio è materia
 corrupta. Sic Galenus docet in Epidemiis. Sic morbus latens
 est ex insidiis inuadens, & corpus frangens. Immo annota-
 uerunt quidam ex veteribus, in vetulis saepe ita humores cor-
 rumpi, vt expiret ab eis teret vapor, qui pueros teneros asth-
 maticos reddere possit. Quæstio est, an esset febris hectica.
 Aliquando refrigeratio contingebat, sed recalfactio illa so-
 lemnis, quæ in nutritis hecticiis apparet, non aderat. Si recal-
 factio non aderat, an non hectica? Erat hectica putris, à qua
 non excluditur leuis perfrigeratio, quæ *μετ' οὐλοῦς καὶ ἀσπίματος* di-
 citur. Aut dicemus manifestam calfactionem in iis apparere
 in quibus viscera sunt robusta, non autem si vieta & effæmi-
 nata sint. Hac omnia indicabant cogitandum potius esse de
 prognosi, quàm de vita protrahenda. Salutis enim exigua ad-
 modum spes supererat. Nam cum morborum securitas aut
 ex parte ipsius affectus petatur, aut corporis subiecti, aut vtri-
 usque: quodlibet horum spectaretur, de salute nil sperabatur.
 Morbus autem sui indicatione exhibet, aut *τῆς οὐλοῦς*, aut *κακότητος*.
 Subiectum, cum vis aliqua est restibilis: nam cum specie &
 ingenio morbus malus est, & subiectum malè constitutum,
 malè prælagiendi occasio sese offert. Et cum omnia in anci-
 piti forent, de que funere potius quàm de vitæ fœnore cogi-
 taretur, in eam itum est discessum que sententiam, vt oppu-
 ghanda in putredine laboraretur, & viribus adaugendis. Ita-
 que ratione putredinis breues & faciles ex rheo purgationes
 sunt institutæ. Vt autem corpus & vires recuperaret, serapiū
 instaurans ex testudinum carne est præscriptum.

His ita institutis, domitā paulum putredine, ne conta-
 gione putrium humorum lactis asinini bonitas superaretur,
 consultum est vt exactis aliquot diebus ad ipsius lactis vsum
 veniretur. Hoc ita factum est. Recreata natura surrexit,
 morbumque occultum tandem vicit, & præter omnium Me-
 dicorum opinionem superfuit; Vt mirum non sit si præiudi-
 cata Medicorum iudicia saepe non ita magni fiant, cum ab iis
 prouocare & liceat & conueniat.

174 CONSILIORVM MEDICINALIVM
ANNOTATIONES.

1. Comitatus morbus, ut cū febre fouet atque alit obstructio contra-
max, comitatus est morbus.
2. Quanquam multi morbi consequentes dicuntur, qui necessariō con-
nexi non dicuntur, ut pleuritū sequitur peripneumonia. At propter
connexi non dicuntur morbi.
3. Cū signa sunt communia, & hæc & illa significantia, oportet
Medicos diligenter suam intelligentiam exercere, ne decipiantur.
4. Si corpus capit multū alimenti, & tamen non bene nutritur, vel
corrumpitur alimentum, vel non distribuitur, vel consumitur ob ingen-
tem calorem naturalem.

Consultabant Riolanus, Magnus, anno 1573.

CONSILIVM XLII.

De pulmonum affectibus, in quo queritur, an ad pulmonum mor-
bos quadret tenuis diæta.

HIPPOCRATES optimus instituendæ diætæ architectus,
in libris de Diætâ acutorum, disputans de pleuritide, exa-
ctam diætam præscribit: Immo primis diebus ita accuratam
illam esse vult, ut quandiu morbus siccus manet, tenuissimè vi-
uendum censeat. Siccum autem morbum vocat, cū nil dum
excernitur materiæ morbificæ, cū sputum in os nondum oc-
currit. Quinetian tantum periculi creati vult vsu solius cremo-
ris ptisanæ, sicco manente morbo, ut inde homines suspiriosos
fieri asseueret. Et quod de pleuritide dictum est, idem sanciri
debet de omnibus morbis acutis. Pleuritis enim pro omni mor-
bo acuto in exemplum subiicitur. Item cremor hordei pro ali-
mentorum ceterorum examine proponitur. Et quoniam infla-
matio pulmonis ex acutissimorum morborum numero cense-
debet, quæstione digna res proponenda, an ea lex quam Hip-
pocrates in pleuritidis cura sanciuir, tenenda, confirmandaque
in inflammatione pulmonis? Duabus enim de causis idem iuris

esse videtur. Prior est, quoniam Peripneumonia acutissimus morbus est, citò litis controuersiam dirimens: Posterior, quoniam, ex sententia omnium veterum & recentiorum, eadem diætæ ratio & therapias seruatur in curanda peripneumonia & pleuritide: immò eorum plerique leuiter tantùm attigerunt de peripneumonia, & peculiare caput non descripserunt, volentes peripneumoniæ curandæ rationem ex capite de Pleuritide depromi. Atque hoc non ita relinquendum est intactum, cuius explicatio & enodatio plurimùm profectura est ad curationem morborum, quam omnes diligenter, & prout nostri muneris est prosequi debent.

Galenus locus obseruatione dignus est. *In pulmone, (ait) spiritus tenuis est, & leuis, & quem coërceri oportet, sanguis vero crassius, & quem in singulas pulmonis particulas dimitti opus sit.* Nam pulmo copiosiori alimento eget quàm partes ceteræ, tribus aut quatuor de causis: Prima est motus perpetuus: secunda, caliditatis copia. Caliditas autem & propter cordis viciniam, & propter motus assiduitatem & constantiam. Addo & natiuam, vernaculamque caliditatem, cum & spiritiosa sit pars, & rara. Et paulò post, tria adiuuenta (ὅτι τρεῖς ἄν) Græci vocant) ad affluentiam alimenti ad pulmonem ipsum, idque necessariò. Primum copia vernaculæ caliditatis, quæ efficit ut alimentum omne in partes minimas comminatur, diffundatur, ac citiùs euaporetur. Alterum, pulmonis dilatatio est in inspirationibus, quæ efficiat ut ex densissimis instrumentis (cuiusmodi est vena arteriosa) violenter quippiam arripiatur. Tertium ac omnium maximum ab eo sanguine qui soli pulmone à corde mittitur priùs in illo planè confecto atque extenuato. Tertia hæc periodus implicita est atque obscura, nec intelligi potest. Nam propositio illa, *Ab*, in textu Græco non reperitur, & interpretis malè conuertit genitiuum Græcorum absolutum. Ita enim legitur in Græco, *τὰς δὲ μέρησι τῶν πνεύματι τὸ αἷμα διὰ τὴν ἐκ τῆς καρδίας ἀπορροήν*. Ita interpretor, Tertium autem, idque maximum (supp. ad affluentiam alimenti ad pulmonem pertinens) est quod sanguis à corde mittatur ad solum pulmonem exquisitè in illo priùs elaboratus ac attenuatus. Et cum dicit tria esse præsidia ad affluentiam alimenti ad pulmonem, hoc bifariam potest intelligi, vel quòd tres illæ causæ recensitæ hoc efficiant, vel multum alimentum affluat: vel potiùs cum præcedentibus

176 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 hæc connectantur, hoc efficiunt, vt multum affluere debeat. In
 utroque sensu periodus hæc intelligi potest. Redeamus ad rem.
*In pulmone (ait) spiritus tenuis est, sanguis crassus & grauis, quem ad
 omnes pulmonis partes ferri oportet; siquidem pulmo ob causas tres mul-
 to alimento præ ceteris partibus indiget. Quorsum hoc scribit? Vt
 occurrat obiectioni eorum qui tueri velint frustra à natura con-
 stitutam esse venam arteriosam, & arteriam venosam. Nam si
 spirituosus halituosusque sanguis in pulmone contineatur, ne-
 cesse est eum arteriâ durâ robustâque contineri, alioqui effluet
 vt in aliis partibus continetur. Item si crassus sit sanguis, & gra-
 uis, vtpote nondum elaboratus, quid attinet venam arteriosam
 architectatam fuisse, cum simplex tunica, vt in partibus aliis
 fuisset satis? Tacite autem fatetur Galenus eas rationes proba-
 biles esse, vt conuincatur frustra machinatam fuisse naturam
 ista vasa ab aliis eiusdem generis diuersa. Nam in partibus aliis
 arteria dura est, ne citò effluant spiritus per corpus arterie: mol-
 lis vena, ne diutius insistat sanguis (siquidem per tunicam vene
 nutritio fit, ex sententia Galeni) & ita nutritio retardetur: ta-
 men natura necessitate adducta arteriam venosam, & venam
 arteriosam est machinata. At ampliorem disputationem de ve-
 na arteriosa in locum alium non longè reiciemus, explicantes
 an legitimè, optimâque ratione vena arteriosa à natura sit insti-
 tuta. Nunc autem quod instituti nostri est explicemus, nimirum
 copiosiore alimento vti debere pulmonem quàm partes cete-
 ras, & ratione caloris tum sui natiui, tum alieni à corpore cor-
 dis mendicati, tum constantis perpetuæque agirationis. Si enim
 hoc verum est, exquisita diæta in pulmonis inflammatione
 non est tuta, licet morbus sit acutus, quod & à ratione alienum
 non videtur. At dicat aliquis: Quid tum verò pulmo copiosiore
 alimento egeat quàm ceteræ partes, an propterea tamen exqui-
 sitæ diætæ locus non est in pulmonis inflammatione, vt & in
 pleuritide ab Hippocrate sancitum est? Nam cum Galenus vltimam
 venæ arteriosæ docet, necessariamque pulmoni alimenti copiam
 non vt affectus est pulmo, sed vt sanus, sermo habetur. Nos au-
 tem non negamus quidem iniici mentionem de sano pulmone
 sed tamen ex ea sententia desumimus postulatam ac hypothe-
 sin ad id quod instituimus maximè pertinentem? Etenim diætæ
 instituendæ ratio reuocari quoque debet ad naturalem sym-
 triam partium. Nam si in vsurpandis medicamentis laboramus*

laborat diligenter sanæ partis naturâ ac symmetriâ inquirimus, ut quoad fieri potest maximè parti consulatur: idem in diætâ factitari debet. Illud enim est quod Hippocrates monebat, dandum consuetudini, quod non solum de consuetudine intelligitur, sed de pristina natura partis. Ut si cerebrum laboret intemperie humidâ, & siccam victus rationem instituimus, quæ à nobis siccandi vi prædita diætâ præscribitur, non talis est, qualis in aliis partibus seruaretur, quæ minùs humidæ forent. Nam etsi intemperiem humidam in parte humidissima corrigere consilium est, tamen intralimites consistimus. Sic in calida intemperie partium calidarum natura, impensè refrigerare non debemus. Idem quoque in diætâ instituenda obseruari debet. Nam positis in hypothefin duabus partibus, quarum vna copiosiore alimento eget, altera non item: In paribus affectibus non par diætâ præscribi debet. Nam in affectibus eius partis cui copiosius alimentum natura concessum est, liberaliores paulò nos esse oportet. In affectibus autem eius partis cui minùs alimenti suppetit, paucos nos contentos esse oportet. Nam ut multum alimentum in aliis requiritur, ita paucum abundè est. Quod & in vniuersi corporis nostri nutritione dum morbo detinemur, obseruari debet. Nam qui paucos contenti cibo dum integrâ fruuntur valetudine, viuunt, in iis nos accuratiores, parciores, restrictioresque esse oportet: sin minùs multo copiosiorque cibum vitam propagarent, in iis dum infirmi iacent liberaliores si-mus ratio postulat. Immò Hippocrates iis congruentibus dum de qualitate cibi scribebat, monuit in diætæ præscriptione deteriorem paulò cibum consuetum, suauiore esse egris magis bono non consueto: adeò nos sollicitos esse oportet, ut & consuetudini, & temperamento, & vitæ instituto aliquid tribuatur.

Itaque si sanus pulmo copiosiore cibo dum sanus est, eget, quàm partes ceteræ, ut hepar, & ventriculus, dum inflammatione tentatus est, minùs exquisita diætâ definiri, describi que debet inflammato pulmone, quàm aut hepate, aut ventriculo. Cuius rei confirmatio & fides desumi potest ex Galeni auctoritate, si huic ea in parte fides abroganda non est: *Non sicut in iecore & ventriculo, ita in pulmonibus tenuissimo victu utendum est. In ventriculo enim & iecore alimentum coquitur, metusque est ne ipsis phlegmone laborantibus nutrimentum ritè non concoquatur, & phlegmone augeatur: in pectus verò tantum alimenti iam cocti pervenit, quantum vni-*

ipsi particula nutrienda conueniat. Hic locus admirationi esse possit: Etenim Hippocratica disciplina è directo contradicere videtur. Si enim ideò exquisitissimo victu vtendum non est in pulmonis inflammatione, qui locus morbum acutum producit, quod tantum alimentum ad pulmonem affluit, quantum ipsi conuenit tantum, cur non idem continget in tunicae costas succingentis inflammatione? At in pleuritide accuratam multum victus rationem praescribit, & dolore praesente, & dum siccus manet morbus, non multum dare ptissanae iubet, ne natura à coctione auocetur, ne dolores augeantur, ne anhelosus aeger reddatur. Ita enim scribit: *Quibus cibus, (id est stercus) statim inclusus, si quis non vacuato eo sorbitionem dederit, dolorem, si adest, augebit, si non adest, protinus inducet, frequentiorque reddetur spiritus; quod malum est: nempe pulmonem exiccat (quia augetur respiratio ab usu cibi) & fatigat hypochondrium, tum ventrem imum, tum septum transversum. Et ob similes causas qui tota viuuntur ptissana septimo die, vel celerius moriuntur: alij mente laesi, alij ob difficultatem spirandi stertioresque praefocari.* Sed hic locus an alteri superiori contradicit, quod negat Galenus locum esse tenuissimo victui in pulmonis inflammatione (quod idem de pleuritide intelligi debet, cum Galenus & in peripneumonia & in pleuritide siccitatem ex eo iudicet, quod sputum humidum non procedat) cum hoc loco ne ptissanae quidem locum esse neget? Nequaquam haec pugnant. Sed ex collatione locorum intellecta conceptaque esse oportet. Vtrumque conciliabimus, si prius vnum explicuerimus.

Causa haec est cur pulmo inflammatus respuat exquisitum victum, non autem iecur & ventriculus, quod in ventriculo & iecore cibus coquatur: si plenius nutrimentum ingeritur, nec bene coquetur ratione morbi, & augebitur inflammatio. Haec ratio Galeni est. Altera ratio petita ex eodem Galeno, vt antea abunde monuimus, pulmo ob motum perennem, calorem, copiosius re eget alimento quam partes ceterae: si dum sanus est copiosius cibandus pulmo est quam partes reliquae, ob eas causas, dum laborabit ea consuetudo, & temperies pulmonis erit inspicienda. Nam Galenus consilio nixus Hippocratis, non vult quicquam peccari nec in commoda vniuersalis nec particularis naturae. Et quae ratio vnius partis, eadem & totius corporis, & quae totius corporis, eadem & vnius partis. Ita enim scribebat Hippocrates: *Qui bis die cibari consueverunt, bis ptissanam dare, &c.* Con-

Part. 32.
Comm. 1.
in lib. de
Diet. a-
cutor.

Part. 20.
Comm. 1.
in lib. de
acutis.

fert statum ægrum cum statu sano (vt ita loquar) Et paulò post:
*Inter initia neque multam, neque crassam pristinam dare oportet, sed
 quantum & ob consuetudinem, & ne multa fiat vasorum inanitio, inge-
 rere conuenit.* Ac si dicat Hippocrates: Et si principium morbi, aut
 adiectionem magnam suadeat, nimirum si vigor longè abesse
 videatur, vt coger in vigore morbi sufficiat ne in illo cogamur
 præter rationem accedere ad nutritionem, aut detractiõnem ali-
 menti, si vigor nempe in procinctu sit, & non est metus læsio-
 nis magnæ virium: tamen ita se gerere oportet vel in subtrahē-
 da pituitana, vel in eadem aut simpliciter danda, aut augenda, vt
 consuetudinis ratio habeatur: Huius enim magna vis est, ne aut
 temerè inaniamus, aut repleamus. Ita enim veteres quidam ma-
 gnis mutationibus magnas opponere volentes, aliquando per-
 fectam inediam præscribebant, aliquando tantillum dabant ali-
 menti, vt cogerentur tandem cibum in medio vigore morbi ad-
 iccere non citra damnum ingens.

Ergo pulmo sanus multo eget alimento. Cùm itaque erit in-
 flammatus, habita ratione consuetudinis, non ita exquisita diæ-
 ta erit præscribenda. Scitum enim illud Hippocratis 6. Epid.
Attractio pulmo incendium, euacuatum siccatur somnus multus. In eius
 textus enarratione cœcutire mihi videtur Galenus; vult enim
 coniungi eas duas voces, pulmo incendium; quasi dicat Hippo-
 crates: Attractio fit cùm in pulmone est incendium. Hoc qui-
 dem verum, sed non est sensus Hippocratis. Itaque sic legen-
 dum, Attractio, pulmo, incendium: id est, incendium per se at-
 tractionis causa est: pulmo autem vna est ex partibus quæ attra-
 hit maximè vndeliber, à capite, à partibus inferioribus, ob ca-
 lorem, & motus perpetuitatem; quæ duo pulmonem reddunt
 attractionis capacissimum. Pulmo itaque inflammatus seipso
 propter phlogosin calidior effectus expetet copiosius alimen-
 tum, alioqui arefcet motus perpetuitate, & maiori celeritate
 propter idem incendiū ichores attrahet à partibus inferis. Quo
 pacto libris de sanitate tuenda scribit in hominibus biliosis ob
 inediam capitis dolores oboriri, attractis sursum missisque vi-
 cissim vaporibus. Præterea facile colligi licet vim potentiam-
 quæ pulmonis exalcati ex eo loco Hippocratis in libris de dif-
 ferentiis morborum, aut potiùs de morbis, præsertim cùm agit
 de erysipellate & inflammatione pulmonis. Docet enim tenuis-
 simum sanguinem à magna vena attrahi cùm ardet pulmo, vnde

inflammatio fouetur: at blandâ anathymiasî, id est halitu, vaporêque succulento cibi humectatur paulûm pulmo, ac proinde refrigeratur. Atque huc facit maximè quod dictû à Galeno, tantum attrahi alimenti ad pulmonem, quantum vni parti sufficit. Vt propterea ei non sit metuendum à paulò pleniorè diætâ.

Nunc autem locus postulat vt locorum Galeni & Hippocratis sensum venemur ac colligamus, ne temerè aut adiciamus, aut detrahamus: quod vtrumque cauit Hippocrates, vt mirû nõ sit modò adiectioni, modo detractioni attèden dũ esse cõseat. Locus Galeni est, *In inflammationibus pulmonis tenuissimo vitui locus non est, quod in pectus tantum attrahitur alimenti cocti, quantum vni parti tantum satis est.* Alter præterea locus dum de vsu venæ arteriosæ disputat, quo scribit præ partibus ceteris corporis pulmonem largiore alimento frui debere: Hippocrates autem in pleuritide & inflammationibus thoracis, id est, & membranarum & pulmonum exactam admodum ac statâ diætâ imperat. Si, ait, *lateris dolor asiduus est, calidis fementis non remittitur, sputum non præcedit, sed citra coctionem glutinosum est, nisi dolorem vel alui subductionem, vel sectâ venâ solueris, si hic ptissana datur, egrum in iugulas.* Immodò si totâ vtuntur ptissanâ, vel leptimo, vel citius intereunt. Et paulò ante dixerat: *Si quis sorbitum non dederit non vacuatâ aluo, dolorem, si non adest, inseret; si adest, augetur: maior difficultas spirandi orietur, & pulmonem exucat, &c.* Vbi videre licet accuratum admodum esse Hippocratem in præscribenda diætâ pleuritide laborantium, immodò ne cremorem quidem ptissanæ concedit: & vt à præscribenda ptissana auertat, proponit terrificâ symptomata quæ talis ptissanæ vsus est statim allaturus. Si per Galenum tantum affluit ad pectus alimenti quantum vni parti satis esse potest, quorsum & in peripneumonia & pleuritide plenior cremoris hordei vsus est? Quorsum reformidatur vaporum, flatuosique spiritus sursum reciprocatio, & praua ad partes thoracicas distributio, quod annotauit Galenus in quodam commentario? Immodò si pleniorè victum in acutis morbis tenuiori, exquisitòque anteponebat Hippocrates, curiosa illa sollicita que ptissanæ præscriptio locum in medendo est habitura?

Vt res tota decidatur, ac his controuersiaque dirimatur, dicimus non abs re exquisitissimam diætâ in inflammatione

Part 33
comm 1
in lib. de
Diætâ
acutâ.

Com. in
part. 12.
comm 1
in lib. de
Diætâ
acutâ.

nibus thoracis ab Hippocrate præscriptam ac sancitam, & non abs re à Galeno in inflammationibus istis pleniorẽ cibum requiri. Sed quo nexu hæc inter se coherere copularique possint; paucis explicamus.

Hippocrates aliàs pleniorẽ diætã præscribit, aliàs tenuiorẽ, pro robore, naturã, temperamento, morbi temporibus, in eodem morbo circumstantiis & occasionibus, morbi natura, consuetudine agrotantium: Etiam eodem tempore morbi aliquando accuratus victus consulitur, aliquando paulò plenior: immò in vno loco adiectionem in morbis commendat, in alio eandem reiecit, habetque rationem vniuersalis & particularis naturæ. Quæ omnia si minùs attentè audiuntur, auidâque aure non minùs accipiuntur, quàm prudenti sagacique mente exiguntur, in infinitorum errorum syllam non præcipientes delabemur. Atque id tantæ difficultatis in vnius diætæ præscriptione oboriri mihi videtur duabus de causis. Vna est, quòd difficilis admodum coniectura quam quisque prudens Medicus habere debet de morbi ingenio, vigore vel statim futuro, vel longè post, item difficilis cognitionaturæ vniuersalis & particularis cuiusque, consuetudinis, antea actæque vitæ, ne temerè ab otio ad negotium, aut contrà, conuersio fiat. Quæ in primis omnia magnum iniungunt scrupulum prudenti Medico omnia ex arte facturo. Vt exempli gratiã, si intra triduum futurus vigor sit morbi, non est dubium quin tridui, aut bidui inediã ferre possit, & ita in exquisitissima diætã perseverandum: sin longius absit, quis dubitat ineunte morbo plenius alendum esse ægrum, vt morbum ferendo esse satis possit, ne quod canet Hippocrates sub vigoris tempus pleniorẽ cibum offerre magno incommodo cogamur. Item, si quis ter cibum capere contueuerit, cum morbo præditus fuerit, eodem iure velit agere ac cum eo qui semel aut bis ceperit: Ille cum egriùs alimenti subductionem ferat, hic eiusdem adiectionem non bene fert.

Alterã ratio tantæ difficultatis est, propter veterum in ea reincipites, ambiguasque controuersias: Nam nullo ferè adhibito iudicio, nullòque diorismo, modò absolutam tridui quatruidue inediã præscribebant, & sic fame ægros miserè necabant: & sub vigoris tempus cibum offerre cogebantur, aut cum intelligerent ineuntibus morbis adiectioni po-

tius attendi debere ægros saturabant, pleniusque cibabant; unde incommoda sequerentur, quæ nulla ferè ars corrigeret ac emendaret. At Hippocrates singulari iudicio præditus, neutris calculum additurus, exquirat diligentissimè & maximè artificiosè diætā in acutis ex ratione temporum morbi, consuetudine ægri, morbi indole, priuatâ, vniuersâque cuiusque natura, cuius maximum est in medendo momentum. Itaque sententiam suam ita protulit; *Non intempestuè oportet*

*Part. 32.
comm. 2.
in lib. de
Diætâ
acutor.*

fortes vasorum inanitiones moliri, nec cum morbi urgent feruentq; cibum offerre, nec repenti in hanc illamve partem mutare licet. Quæ ratio primū in conuellit ac labefactat veterum ea de re latas sententiâs.

His itaque positis, an sine distinctione & temerè Hippocrates in inflammationibus thoracicis, vt ex illius verbis constat, exquisitissima diætā retinenda? Nequaquam. Sed primū hoc censi debet, ineunte morbo, aut in principiis morborum (nomen autem principij latè funditur) dum sicci manent potius in curam eorum incumbere debemus, quàm paulò pleniore victu naturæ consulere. An propterea inedia præscribenda, vt quidam volunt? Nequaquam. Nam cum dicimus, potius, aut magis, non excluditur omnis cibi adiectio. Primū enim in Aphorismo 5. *In tenui victu ægri delinquit, ait, & error qui committitur magnus, maior fit in tenui victu, quàm in pleniore, duabus de causis, ait Galenus; Quia natura à tali victu debilitatur plurimū, & quia ad insuetam diætā tenuem conuersio fit.* Nam cum ita tenuis diætā non præscribitur perspectâ morbi naturâ, & viribus ægri, contingit nos vires eas tridui inediâ frangere, & cibi accessionem adiungere affecto iam morbo, cum minimè sit opus ac deceat. Cum enim grauiores sint mutationes quæ fiunt ab otio ad negotium, quàm contrariæ, sic grauius in se peccat qui defraudato genio repenti ciborum pleniore manu indulget, quàm qui à saturitate ad cibi abstinentiam sese conuertit.

Prætereà idem Hippocrates i. de Diætâ acutor. satis aperte docet non ita amplecti se ineuntibus morbis exquisitam diætā; *Qui in morbis pristinâ utetur, ne vno die vasa inaniri permittat, nec ab usu desistat, nisi propter medicamentum, aut clysterem, aut sectionem venæ.* Tunc loquitur de morbis nondum validis. Nam si dolor vrget, vt locus sit medicamento, aut sectioni venæ, non ita plenâ manu cibandus æger. Sed dandum vult consue-

tudini; vt si bis cibum capere consueuerit, bis detur ptiffana, vt duabus vicibus, propter consuetudinem tantū expleatur, quod semel si morbus non adesset, expleri deberet. Paulò post subiicit, initio non multam & crassam ptiffanam dari oportere; sed videndum qualis consuetudo, tum ne magna vasorum inanitio fiat. An illud est tam accuratum esse in diæta præscribenda? Nam dum de morbi siccitate paulò post loquitur, quæ videatur alioqui abstinentiam suadere, quoniam cruditatem significat, scribit, si morbus siccior sit, non multum dare oportet. Aliud est dicere, in morborum cruditate, de qua hoc loco mentio iniicitur, non multum dari alimenti oportere, aliud est dicere omnimodam abstinentiam à cibo præscribi, vt Prodicus & Diatritarij Medici facitabant. Hippocrates enim illà superiore ratione, & quia vitur in hoc morbo (de cæteris idem iudicetur) alimento medicamento nec tenuius nec plenius alit: sed mediam quandam formam, & æquabilem retinet, tametsi Tessalus eum hoc loco egros implere asseueret, & Erasistratus eodem fame & inediâ necare. Est enim in morbis thoracicis cibo consulendum, viribus & ad educationem, & ad actionem: est & naturæ consulendum, subducta alimenti portione ad mitigationem, materiæque præparationem.

Cautiones autem istæ, cibare oportet in morbis, nisi vel clysteri, vel medicamento, vel venæ sectioni locus sit, indicant aperte detrahendum quippiam de cibo, si dolor absit, vt eius occasione aliquod illorum præsidiorum vsurpandū sit. Nam ita occurrimus obiectionibus quas prius mouimus, quasque educat quis ex duobus illis Hippocratis locis quos paulò antè enarrauimus: si in cluso cibo, id est, stercore diu retento, vt ait Galenus, sorbitionem quis det, statim dolorem augebit, si adest; si non adfit, inferet: Nec enim hoc impedit quominus adiciamus aliquid alimenti, sed cum aluus astricta est, quoniam assumptæ ptiffanæ exhibitæ distributio prohiberetur, vult præmitti clysterem, aut secari venam, priusquam de nutritione cogitetur. Si enim in fanis aluo minime liberâ ingestio esculentorum sæpe tormina ac contorfiones afferat, multò magis dum aut morbus adest, aut imminet. Alter autem locus videtur virgere paulò amplius; Si lateris dolor assiduus est, calidis fomentis non cedens, si spurum non procedit, nisi quis vel subductione alui, vel medicamento dolorem laxauerit, ptiffanam autem dederit, in perni-

ciem præcipitat ægrum. Itaque, dicet aliquis, in peripneumonia, in pleuritide cum dolores adfunt, cibum dare nocentissimum, sed omnino inedia præscribenda est. Non hic est animus Hippocratis. Atque cum locum bifariam intelligimus, obiectionemque diluimus: Prior quidem ratio, illic de vigore morbi agit Hippocrates in superioribus textibus, ut demonstratum est, plus minusve ptissanæ exhibuit ineunte morbo, docens non multum dari oportere si siccus manet morbus, nunc autem omnium dolorum & symptomatum vehementiam proponit, & vigorem morbi designat, quis adeo hebes sit, qui cum dolores urgeant ad nutriendum se conuertat, cum præmonuerit alendum ægrum plus minusve pro re nata.

Altera ratio, scribit, Nisi quis dolorem vel medicamento, vel phlebotomiâ soluerit, hoc satis indicat urgentibus doloribus vigentibusque succurrendum esse præsidii artis cum illis symptomatis vires deterreantur, priusque ptissanâ exhibeamus, præsertim iulepum, id est, priusquam plenius cibemus. Præmissum autem clystere, & sectâ venâ, tum de cibando consulatur. Ex quibus manifestò patet eam nunquam fuisse Hippocratis mentem, ut velit etiam in pleuriticis exactam admodum diætâ obseruari, præsertim initio morbi. Cum dubium esse non debeat, in omniû morborû vigore ac statu, cum dolorum summa sunt omnia, tutius esse morbi depellendi prouinciam naturæ committere, quàm adiectis cibis eandem ab instituto auocare.

Hæc satis sunt, ac priusquam disputationis finis fiat, conciliare locos duos Hippocratis in animo est, qui planè dissentire videntur. Prior est Aphorismorum lib. I. ubi in morbis adiectioni ciborum attendendum esse vult, ac in tenui victu delinquere ægros potius scribit quàm in paulò pleniore: Alter ei planè contrarius est. In libris acutorum ciborum adiectioni intendendum multò minùs. *Nam subtrahere omnino sepe expedit, cum æger sufficere possit, donec morbi vigor mature scat.* Huic & similis est apud Galenum: *In quibus morbis vigor primo quaternario adesse debet, modo natura fortior sit, integram in ediam seruare debemus. In quibus non ultra primam septimanam forti naturâ existente solo utendum meliorato. Si nature robori non fidimus, ptissanæ utemur succo. Quasi verò succus ptissanæ multum ad robur naturæ addendum sit collaturus.* Ex aduerso pugnant duo illi loci. Sed si mors Hippocratis intelligatur, satis ab utraque omnibus factum putabimus. Docuimus

Aphor. 5
lib. I.

Paris 37
com. 2. 110
lib. de
Diætâ
cut.

mus antè non abs re Hippocratem aliàs paulò pleniorẽ ciborum adiectionem concedere, aliàs eandem planè dissuadere, ob grauias quæ inde sequerentur incommoda. Atque id duabus de causis: priore quidè, quod ex veteribus medicendi magistris quidam absolutè plenam dietam instituerent, alij verò omninò cibum subtraherent: quos utrosque ut errare ostenderet, est ubi paulò plenius in morbis cibet, est ubi tenuissimè. Sic modò vnum consulit, modò alterum, non immemor, ac dissimilis sui; sed ut ostendat quàm erroneum sit aliquid ea in re statum ratumque statuere. Posteriore autem, quod cum cognosceret praediorum singulorum quantitatem artificiosâ egere coniecturâ, hanc autem assequi coniiciendi vim difficillimum esse, & ad eum pertinere, qui omnium quæ in arte sunt vires norit, maluit in ea re ancipitem, dubiamque sententiam suam proponere, quàm aut hoc, aut illud certò definiendo, multis errandi occasionem porrexisset.

Itaque dum primo Aphorismorum paulò pleniorẽ victum laudat, vniuersalem planè non proponit regulam, ut hæc est quam in libro Acutorum scripsit, cum ciborum adiectioni in morbis multò minùs attendi oportere dixit. Nemo enim dubitat corpus ægrum non tam indicare refectiõnem sui, quàm ablationem morbi quo occupatur. Ut enim cibus sano corpori praesidio est & robori, ita ægrum morbosumque corpus offendit, ac ledit. Sed offensio est maior minòrve, prout plus minùsve cibi offertur. Itaque 1. Aphorismorum vult euertere dogma eorum qui magnis mutationibus magnas mutationes opponere in animo habentes, initiis morborum sine vllò delectu inediã absolutam prescribebant, & quod citra damnum fieri non poterat, tempore vigoris cibum adicere cogebantur. Satiùs autè esse vult Hippocrates, initio morborum alimento vires recreare, ut cum ad vigorem ventum sit, absolutâ inediã minùs æger offendatur: ita tamen ut si breuì vigor futurus sit, tantum demamus de cibi adiectione quanto propinquioris videatur. At libro acutorum præceptũ generale ponit in morbis dum multò minùs adiectioni attendi debere opinatur, quod adhuc per comparationem dicitur, ut nil temerè & absque ratione dicere conseruit. Quoniam, ut dictum est antè ex conim. Galeni in hanc particulam, artificiosa coniectura quam consequi debet quisquis quantitate remediorum rationem ad vnguem tenere velit,

Tom. I.

Aa

Commē-
tario præ-
dict. ver-
ba hæc
scribitur

difficillimè omnium attingitur. Accedit quod scribit Galenus ibidem. *Quod plus est (ait) & exuperat, noxas inemendabiles facit, quod verò minus est, facile emendatur: nempe si virtus labascere videatur, cibi exiguum ministrare debemus. Quod in ventrem iniectum est, tollere est difficillimum.* In illis locis conciliandis & ad legitimam medendi formam reuocandis diligenter laborauit Manardus epist. 2. lib. 5.

Id quod in quæstione erat positum nunc absoluamus; nimirum an in inflammationibus pulmonis, quod vult Galenus, tenuissimo victu vtendum non sit. Iam docuimus in pleuritide, quam pro exemplari & typo morborum acutorum proponit Hippocrates, quatenus adiectioni, aut detractioni ciborum studere oporteat. Cum Galenus non vult tenuissimo victu vtendum in pulmonis inflammatione, notari primum debet quod tantum per comparationem loquatur. Ait enim, non est tenuissimo victu vtendum in pulmonis inflammatione, vt & in iecoris & ventriculi phlegmone. Nemo enim negauerit duos hos morbos accuratissimum victum exigere, quod ratione inflammationis iniectum alimentum corruperetur: & quia officiales sunt partes, & in quas alimentum integris viribus iniicitur, magis offenderetur. Pulmo autem pars naturalis non est officialis saltem, & ad eum, autore Galeno, tantum alimentum aduehitur quantum vni parti alendæ sufficit. Quocirca non ita incommodum sequeretur ex pleniori cibo. Dicemus autem ad hanc controuersiam dirimendam, aliud esse considerare pulmonem inflammatione laborantem tanquam morbo acuto, aliud esse eundem laborantem conferre cum ventriculo & iecinere. Priore enim modo cum acuto morbo affligatur, non est dubium quin quâdiu morbus siccus erit, diæta reuocari debeat ad eam quam de pleuritide Hippocrates explicauit: Posteriore autem, reuerâ accuratior victus esse debet in ventriculo inflammato ac iecore, quam in pulmonis inflammatione.

Duplex tamen dubium hoc loco esse possit: Prius, an hoc verum sit in ventriculi & iecoris inflammatione tenuissimo victu vt nos debere, quod pars officialis & naturalis. Immo, dicet aliquis, quia penus est promptuarium omnis alimenti, & quod nisi agente, & alimentum partibus ceteris ministrante animal breuiter concidat, plenius eâ ratione alendū est: alioqui aliæ partes quæ mutuas ad opus curationis tradunt operas, fatiscerent,

ac laborentur. Pulmo autem & cerebrum, & partes aliæ; quia naturales non sunt, nec ciborum promptuaria, parcius cibandum, quod ventriculus integer sit, & alimoniam ad tempus sustinere possit. Aut sit ita sanè alatur plenius corpus, aut tenuius, quid intererit? Dicimus idèò tenuissimè hîc alendum in inflammatione hepatis & ventriculi, quod morbi omnium sint acutissimi, proptereaque extremos habent labores. Vigor enim in propinquo est. Et hîc plus occupatos nos esse oportet in oppugnatione morbi qui plurimi est momenti, quàm naturæ corroboratione, tametsi magna virium iactura sequatur. Præterea ex euentu tenuissimæ diætæ occasio sese profert. Cum enim partes illæ extremè laborent, dubium non est quin in eis alimentum corrumpatur: corruptio autem illa ægris damnum est magis auctura, quàm si in totum alimento abstinenceatur.

Posterior dubium, an omninò verum hoc sit, nullâ factâ comparatione cum inflammato ventriculo, in pulmonis inflammatione morbo aliqui acutissimo, & suam historiam statim absolvente locus sit tenuissimo victui? Videtur ita, quia in iis morbis qui extremos statim labores habent, extremè tenuis diætâ conferat: Item quia exhibita etiam ptissima homines ^{peruicacia} fiant anhelosi. Præterea cum à corde nutriatur pulmo, si multum ingeritur cibi, plurimum ad cor sanguis deferetur: & ita ad pulmones attrahentes adinuicem, sic inflammatio augebitur: in omni autem inflammatione iis abstinendum quæ multum sanguinis generant. Videtur quod non, dum sanus pulmo multo copiosiusque alimento eget comparatione cum partibus aliis, ex mente Galeni. Ergo, vt antè docuimus, consentaneum erit vt non ita parcè ac duriter peripneumonicos nutriamus. Præterea calfactus pulmo multum consumit, multum attrahit etiam ratione caloris & motus aucti, si desit ob inedia alimentum pulmoni vndelibet rapiat, immò potiùs ichorosos humores ex quauis parte; sic augebitur peripneumonia, præsertim biliosa: venæ enim arefactæ biliosos & ichorosos humores ad se ex aliis partibus attrahunt, sic & pulmo: præterea arefiet cor raptis & sanguine, & spiritu ob incendium pulmonis, vnde peripneumonicos animo deficere videmus. Etsi autore Mesuæo peripneumonia fit aut à pituitoso, aut à bilioso humore: si à pituitoso, tanquam ab excremento; si à bilioso, tanquam à nutrimento: in biliosa peripneumonia plenius cibare oportebit: & quod

nutrimentum adesse parti oporteat, non tantum quantum quidem si sana esset, sed ut in sanis robur alimento augeamus, saltem in agris seruare quoad possumus, debemus. Item quod biliosi ichores ferociunt magis, proteruiuntque detracto alimento: nutrimentum enim temperat eos, humefacit, & expectorationem promouet humectando. Sed horum omnium explanationem venari possis ex ea longa oratione quam nos de industria habuimus.

Quod paulo ante sumus polliciti nos praestatueros, illud nunc exoluendum. Cum enim de usu venae arteriosae, ac arteriae naturam & conformationem venae referentis, mentio iniiceretur, ne disputationis ordo euerteretur, plenior ea de re disputationem in tempus ac locum aliquanto commodiorem reiecimus. Ad quam nos accingemus, quoniam plurimum habet utilitatis & voluptatis. Utilitatis quidem ad cognitionem eorum quae dicta sunt de observatione diatae in inflammationibus pulmonum, quod pulmones multo vberiusque alimento ad recreationem sui indigerent. Voluptatis autem in inquirendis contemplandisque naturae operibus, quae cum caeca, bruta ac temeraria videatur, tanquam mirus & ingeniosus artifex in iis condendis appareret: siue quod ei mentem tribuere nos cogat diuina operum praestantia, quae citra rationem, intelligentiam, ac consilium temerario fortuitoque nisu talia euadere nequiverunt, seu potius quod Deum & numen in iis suam vim ac potentiam explicuisse necessario fateri cogamur. Quod si renuerimus, id nobis inuitis extorquebit admirabilis & naturam superans effectio, quae quotidie in oculos nostros incurrit.

Res autem quae proponitur eiusmodi est, cur non ut in partibus reliquis eam venam quae a dextro cordis ventriculo derivatur, non autem oritur non ut ceteras effluerit, sed arteriae conformationem ob tunicae crassitiem quae quintuplo aut sextuplo crassior est sortita fuerit: contra vero arteriam quae sinistro cordis sinui implantatur, raram, subtilemque, & proximè venam referentem esse voluerit. Si rationem conformationis venarum & arteriarum perstrinxerimus, earum quae partibus ceteris inferuiunt, facile causam sumus reddituri, cur in pulmonibus utrumque vas contrariam suae naturae conformationem nanciscatur. In partibus quidem ceteris venae simplex est tunica, arteriae vero maior crassior quam quae venarum est. Huius ratio haec

est, quoniam si qui in arteriis continetur spiritus tenuis, calidissimus, ac incitatus maximè, crassus, compactisque vasis non coërceretur, euaporaret statim, ac euolaret. Sanguis autem quoniam piger, crassus, & grauis est, nisi vase maximè perspirabili contineretur, non bene nutritio fieret. Nutritio porro fit non modò per venarum oscilla, sed per tunicas, trāsumpta scilicet materia quæ partes irroret, adhæreat illis, & propter adhæsum tandem in earum naturam cedat atque faciliat. Ac contrariam multum in effingendis pulmonum vasis rationem habuit. Nam & aliam nutriendi rationem notā perspectamque habuit, & alimenti copiam superesse pulmoni oportuit, & spiritus communicationem non ita difficilem ut est in partibus ceteris. Itaque crassæ venæ conformandæ & arteriæ raræ ac simplicis consilium hoc fuit.

Vnumquodque simili nutritur appposito cibo: pulmonis autem carnem raram, mollem, spirituosamque esse nemo nescit. Eoque factum consilio, ut vena crassior esset, ut diutius sanguis restitaret in ea, & sic elaboraretur. Si enim mollis fuisset tunica qualis à corde manaret sanguis, talis perspiratione & transumptione celerrimā in nutritionem pulmonis concederet. Accedit quod in aliis partibus non est ea motio- nis agitationisque perpetuitas, & continuatio, quæ efficit ut calsctus impensè pulmo vi quadam vel ex densissimis vasis sanguinem arripiat. Tamen ea crassities validam pulmonis attractionem quodammodò retardat atque eludit, ut nihil nisi quod tenuissimum est, è vena arteriosa elaboratur.

Arteria autem rara effecta est duabus maximè de causis: Terciam ac quartam in orationis ractu explicabimus; ut nimirum suppetias venæ arteriosæ ferat. nam quoniam non ita multum promptumque alimentum vena arteriosa præ sua crassitie & opacitate tribuit, id arteriæ tenues, raræ resarciunt ac compensant. Secunda ratio, quoniam ceteris partibus non ita confertim affatimque concedi sanguinem arteriosum cōuenit, idèò crassæ efficiunt arteriæ, pulmo cum ex superioribus rarus ac spirituosus esse dicatur, oportuit arterias non ita crassas, ut quæ perpetuò sinere debeant effluere sanguinē eum ad pulmonem reficiendum, qui multum consumit. Tercio ob motum perpetuum, & attractionem aëris externi, eiusdemque exclusionem obædientes esse arterias fuit necesse. Præ-

cipuum autem hoc munus in pulmonum arteriis spectatur; nam nobis inspirantibus expirantibusve continenter ac facile vehi, reuehique sputum oportuit: quò maximè contulisse videtur vasorum arteriosorum mollities & obsequium. Venas autè non necesse fuit contrahi & dilatari vt & arterias, quod notandum.

Præterea crassities venæ hoc affert adiumenti, quod non ita facile effluit sanguis è vena arteriosa præ crassitie, & quia diutius remanet, duo affert commoda; vnum antè dictum est, quòd nihil nisi elaboratum finit elabi: alterum quod dum diutius manet, diutius fruitur pulmo, minùs quidem habet alimenti ea ratione, sed habet diuturnius: si enim rara esset tunica, absumeret statim ac exorberet: plurimo enim egere alimento demonstratum antè est.

Sed dicet aliquis: Ergo commodè non est efficta ista crassities, quoniam minùs effluat alimenti, propterea que suo defraudatur pulmo genio. Huic inopiæ (id est quod non multum alimentum simul, sed paucum paulatim, sensim, & quod Græci dicunt *ἐν τῷ χρόνῳ*) duabus rationibus occursum est: Vnà quidem, quoniam arteriæ supplet id in quo deficit vena arteriosa propter suam crassitiem; hæc enim impedit quo minus trāsportet alimenti à vena arteriosa ad pulmones nutriendos; arteria autem venosa raritatis suæ ratione redimit hoc, refarcitque tenuem vaporosumque spiritum tribuendo. Alterâ ratione, natura occurrit dum construxit venas in pulmone maximas: ita enim effectum est, vt quantum iustæ nutritioni propter tunicarum crassitudinem detrahitur, id venarum magnitudine expleatur. Ostensum enim est crassitiem venarum, quatenus talis consideratur, efficere vt minùs quidem alimenti simul & semel affluat, sed diuturnius est & elaboratius.

Dicat aliquis: Si arteria venosa supplet id in quo ob suam crassitiem deficit vena arteriosa, satius fuisset venas naturales esse, vt quæ luculentum dedissent alimentum ratione tenuitatis, & arterias quoque crassas & compactas vt in aliis partibus, vt quæ tenuem & vaporosum alimentum dedissent, non ita affatim vt faciunt cum tenues sunt & venosæ; siquidem venæ ipsæ suppleuissent. Nam & pulmo calidissimus & mobilis facile ex arteriis crassis attraxisset etiam sequacem sanguinem spirituosum, quod ex rationibus Galeni patet, qui dilatationem pulmonis sufficientem causam esse ait ad attractionem, etiam ex den-

fissimis venis. Eæ quidem rationes satis per se virium & ponderis habere videntur ad efficiendum naturam frustra architectatam esse aliam conformationem venarum & arteriarum in pulmonibus, aliam in aliis partibus. At illa flexilitas & obœdientia quæ desiderabatur in arteriis ob continuam inspirationem & expirationem, vnde deductio spiritus & exhalationis foris, intro, intusque foras impedit fortassè quominus idem artificium in vasis pulmonis appareret, ac aliarum partium. Quod paulò post plenius demonstraturum recipio.

Quicquid sit: Natura conformando & arteriam venosam, & venam arteriosam, id semper pensi propositique habuit, vt pulmo & vberè alimento abundaret, & conuenienti. Conueniens appello spirituosum, vaporosumque. Diu enim sanguis in vena arteriosa resistit vt attenuetur, & ita familiare reddatur alimentum: arteria autem venosa fit vt & luculentè & in promptu pulmo fruatur spiritu & vapore. Quod non ita liberum fuisset, si arteria sextuplo maior, id est crassior fuisset.

Atque quoniam huc disputatio nostra adducta est, vt de qualitate sanguinis qui continetur in vena arteriosa diceretur, quærendum nunc an talis sit vt sit subtilis, vaporosus, tenuis; an vero crassus, in crasso corpore contentus, & minimè alendo, reficiendoque pulmoni idoneus, qui subtili attenuato sanguine refocillatur & delectatur? Questionis huius prima disputatio tanquam leuioris armaturæ excursio facta est, nunc eam plenius excutere ac elimare lubet.

Pulmo nutritur sanguine halituoso tanquam familiari proprioque alimento. Omne autem alimentum cum tribus qualitatibus modis ab Hippocrate dicatur, illud demum alimentum dicitur quod nutrit proximè, quodque iam nutriendæ parti assimilatur. Ita nimirum id quod ingeritur nunc potulentum ac esculentum reapse simile non est rei nutriendæ, sed cum initio assimilabile sit, multiplici alteratione tandem assimilatur, idemque fit. Eadem ratione qui in vena arteriosa sanguis continetur alienus à dextro cordis ventriculo non necessariò est spirituosus initio, sed cum crassus sit, & in crasso opacòque vase còtentus, nempe in vena arteriosa, quia non citò effluit & transibitur ob vasis crassitiem, datur spatium attenuandi, comminuendique in partes minimas. Dubitatur autem an cum à corde rapitur sanguis, non iam attenuatus sit & crassus. Occurrunt enim loca

contrarij apud Galenum in lib. 6 de vsu part. Prior locus est:
 Cap. 10. *Omnino, opinor, in pulmone spiritus tenuis est & lenis, & quem coërceri*
 6. de vsu *oportebat, sanguis crassus & grauis, & quem in omnes pulmonis partes*
 part. *ferri oportet, ut qui copiosiore vitur alimento quàm partes cetera. Hic*
 abundè patet Galenum docere velle sanguinem rudem ac cras-
 sum esse, dum probat verisimile esse venam debuisse esse sim-
 plicem in pulmone, vt in partibus ceteris. Atque vt verè dicā,
 vas crassum redditum est non ratione sanguinis tenuis ac foras
 exiliat, sed vt diutiùs retineatur in vase, nec effluat quin elabo-
 ratus sit: eo accedit quod pulmo ratione & motus & caloris at-
 traheret sanguinem incoctum, nisi vasis crassities impediret.
 Locus alter est planè contrarius eodem capite. Nam dum red-
 ditionem Galenus cur pulmone copiosum ac vberimum ali-
 mentum conueniat, tria affert locupletissima argumenta. Pri-
 mum copiam caliditatis vernacula, vnde alimentum facile cō-
 minuitur, ac diffunditur: alterum, pulmonis dilationem in
 aspirando: vnde attractio fit alimenti etiam ex densissimis cor-
 poribus: tertium ac omnium maximum, quòd mittatur sanguis
 à corde ipso priùs attenuatus ac elaboratus. Itaque priore loco
 vult sanguinem rudem ac crassum, & indigentem crasso vase vt
 attenuetur: Posteriore hoc vult à corde attenuatum ac elabora-
 tum mitti. Ergo inutilis constructio venæ arteriosæ in eum præ-
 sertim finem vt nihil ab ea effluat & resiliat quod non ad vngue
 extenuatum sit: Ita conciliare oportet eos locos. Cùm dicit in-
 digere multo alimento, quoniam à corde mittitur elaboratus &
 attenuatus, vnde facilis eius fit & alteratio, & dissipatio à parte
 præsertim calida, illud per comparisonem debet intelligi cum
 sanguine aliarum partium. Nam si ab hepate immediatè mitte-
 retur sanguis, non est dubium quin diutiùs nutrirer: minùs ali-
 menti daret ob crassitiem (vt abundè docuimus antè) sed diu-
 turnius. Oportet autem diuturnius alimentum esse, alioqui pul-
 mo contabesceret. Nunc autem quò magis sanguis procedit, eò
 magis elaboratur, præsertim si non attingat ad venas (vt de lacte
 constat) qui in dextro sinu continetur, elaboratus est compara-
 tione cum seipso dum ab hepate fluit, nondum est elaboratus, si
 comparetur secum postquam moram traxit in vena arteriosæ.
 Et si liberè dicam quod sentio, ego existimo venam arteriosam
 ita crassam effectam esse, non tam vt subtilior accuratiórque
 reddatur sanguis ad nutritionem pulmonis, quam vt non ita re-
 pende

penet à pulmone arente, calente, & dilatante se rapiatur, atque consumatur. Quod mihi videtur probabilius. Ita enim vena arteriosa non sinens ob conformationem citò exugì, abripique sanguinem est veluti penu & promptuarium sanguinis ad nutritionem pulmonum. Quanquam & ad hanc rem magnitudinem & copiam vasorum effictam esse vult Galen. ut quod iustæ nutritioni ob tunicarum crassitudinem detrahitur, ipsarum venarum magnitudine compensetur.

Quod autem sanguinem qui continetur in vena arteriosa sit necesse paulò crassiorē esse, & paulò crassiore vase coërceri, satis abundè apparet ex his incommodis quæ consequi solent, quæque apparent in iis qui sanguinolentum sputum è pectore extundunt. Omitto casus, vlcuscula, diauroseis, quæ sæpe *quarto; thym* promouent, persequor tātum cōmentationis ergò eos quibus aut arteriosa vena tenuior, delicatiorque est, aut sanguis qui è corde ad venam arteriosam confluit spirituosus halituosusque magis. Positum enim antè est, quod diligenter debet annotari, nutritionem per tunicas vasorum fieri, si per tunicas fit, si vas rarius, pulmo continenter attrahens potest facillimo negotio id educere quòd tingat sputum: præsertim cum aut exercitatio violenta præcesserit, si generosiori vino indultum fuerit. An eiusmodi cruenta excretio formidanda? Non herclè; Siquidem tenuitas sanguinis, & vas raritas facillè hoc inducunt. Vnde frustra fatigantur venæ sectionibus, frustra incutitur metus tabis ab vlcere: quod cruentam expectorationem sequatur necessariò vlcus: ut cum meitur cruentum falsò comminiscuntur vlcerationem secuturam. Tantum enim abest ut illi iuventur sectione venæ, ut contrà illis eò pulmones debiliores reddantur, & sanguine tanquam fræno in eius generis hominibus detractò bilis proterruit, ferocitque magis, ut placuit Arabibus, quicquid contra dicant veteres aliquot, & recentiorum nonnulli. Tamen si enim obiiciant in ardentissimis febribus Galenum misisse sanguinem, cum in illis vberima bilis impetus atque imprefio appareat. Respondemus in illis febribus ardentissimum sanguinem detraxisse Galen. non simpliciter, id est, non parcam manu, ad euacuationem tantum nonnullæ materiæ, & refrigerationem nonnullam, sed ad animi vsque deliquium, ut refrigerationis ratio omninò habeatur. Quod diligenter no-

tandum. Nam qui in biliosa febre parçè detrahit sanguinem, is furentem magis bilem reddit: at si liberaliter, non est dubium quin sequatur magna refrigeratio, & bilis temperatio. Atque cùm in biliosis hominibus cruentum expectorantibus ob sanguinis tenuitatem sanguis mittitur, parçà manu mittitur; vnde ex superioribus patet eos offendi non leuiter. At diceres, iuuantur tamen? Quid tum si id temporis iuuentur? Sæpe enim sectio venæ, & calfactio, & dolorum per narcotica sedatio vno tempore tentatur, & fit cùm clam, occultè & furtim lædatur plurimùm æger: & læsionis argumenta non nisi longo tempore apparent. Vnde videmus eos quibus pro aliquare nata sãguis mittitur ad obeũda munia ineptos, pulmones habere imbecillos. Iuuabãtur quidem olim his remediis, sed pleniorẽ fidem faciunt quæ sequuntur. Præterea in prauam consuetudinem corpus adducitur, vt Galen. lib. de consuetud. doctissimè annotauit. Itaque quibus ea hæmoptysis cõtingit, consuli deberet humorum potiùs temperatio, cùm eis potiùs sit metuendum ab ariditate pulmonum quàm ab vlcere, vt falsò plerique comminiscuntur ex reiectione sanguinis, quàm vt anteuertant, statim sanguinem mittunt.

4. Ariditas autem sequetur, & ex sanguinis tenuitate, & vasorum non legitima conformatione, vt si vena arteriosa sit rarior: præterea ex frequenti sectione venæ quæ celebratur falsò & erroneè. Illud enim confirmari potest experienciã, omnem venæ sectionem partium propinquissimarum parti à qua detrahitur sanguis, imbecillitatem afferre. Ita enim cùm vena puppis aut temporum aperitur, multorum iudicio & imminutio memoriæ, & imbecillitas partis aliqua consequi solet. Et quibus in malleolo mittitur sanguis, non ita liberi gressus sunt potentes vt antea. Quare quoniam detractio sanguinis imbecillam reddit partem in qua feritur vena, & eas quæ sunt propinquissimæ. At cùm he par remotum sit à vena gibberi, non ita infirmatur. Pulmo autem quoniam proximus est venæ mediæ & basilicæ, siquidem immediatè ferè mittitur sanguis (vt testatur subita sedatio, quiesque doloris secta in pleuritide venæ) nemo inficias eat crebrâ frequentique detractio sanguinis & spirituum, & laterum robur, & nervos, & pulmonum vim relaxari ac debilitari. Vnde quibus in pleuritide liberaliùs detractus san-

guis, i sæpè dolores lateris experiuntur, & illis paulùm sæuientibus è vita abripiuntur.

Itaque vt redeat nostra oratio, de his meliùs natura meruit quibus sanguis paulò crassior est, quàm quibus ita tenuis. Cum enim tenuis est, promptius sufficitur in locum deperditi, & alimentum ad manum dat, sed breuiùs nutrit: cum crassior, diuturnius, sed minùs; Hoc autem optabilius est.

Et vt de vase arterioso dicatur, adhuc aliquid, dicimus venam arteriosam non affatim quidem præbere alimentum, sed continenter: & crassities venæ facit vt tenuissimus detur sanguis: raritas arteriæ venosæ vt copiosus spiritus, & affatim: quod huic parti necessarium in primis fuit.

Est & aliud notandum, nimirum quod subiungit Galenus, commodum non visum fuisse naturæ vt à vena caua statim & immediatè sanguis ad pulmones ferretur: vel quia in caua vena crassior sanguis est quàm qui alendo pulmone sit idoneus. At in cordis dextro sinu elaboratur aliquantum: aut quia necesse ali-quandiu retineri antequam ad pulmonem affluat, ne statim absorbeatur, & propterea à sicco pulmo laboret. Item si ita immediatè ad cor ferretur per continuationem quandam vasorum, nulla vena arteriosa fuisset, & nullæ epiphytes membranarum, sed vena quæ vulgò arteriosa dicitur, verarum venarum naturam expressisset.

Possent quis obicere, frustra naturam machinatam fuisse venam arteriosam. Prima ratio: Sanguis qui à corde ad pulmonem affluit, tenuis & elaboratus est; non necesse itaque fuit crassam fuisset venam, & arteriæ similem, ne inelaboratus sanguis ad pulmonem allabatur. Sed huic rationi validissimæ ante responsum est. Altera ratio: Sit ita sanè, sanguis qui in venis continetur pulmonis, estò crassus, & grauis, non propterea tamen necessaria fuit vasorum densitas ad elaborationem: pulmo enim quia calidissimus est & per se, & ratione vicinæ cordis, & quia mouetur perpetuò, comminuit faciliè sanguinem quantumlibet crassum & grauem: quin si crassus, transumatur ante tempus, quia diutius in partibus hærebit, minùs siccabitur pulmo, sed præsens habebit alimentum circa quod sese exerceat. Huic rationi ita respondebitur: Non fuisset necesse pulmonem in eo occupari vt crassum illum sanguinem in vena simplici contentum, & ab ea assumptum comminueret; grauior enim eâ ratione

fuiſſet, ſuoque muneri defuiſſet, quod in eo verſatur vt refrigerium cordi afferat, & inſpirationi, expirationique inſeruiat.

Ad duas rationes accedit hæc de euertenda arteria venoſa. Si arteria talis fuiſſet qualis naturaliter in aliis partibus exiſtit, id eſt craſſa, melius pulmoni conſultum fuiſſet; nam & non ita ſpiritus exinaniti fuiſſent, & ſatis abunde ſuppedituiſſet ſpiritus, quia pulmo calidus ex denſo corpore arteriæ attraxiſſet, & per ſe ſpiritus ſatis ſequax eſt. Perperam enim id fit quod ſcribit Galenus, arteriam venoſam ſuâ tenuitate ſupplere id in quo arterioſa vena propter ſuam denſitatem deficit. Nam ſi vena naturalis fuiſſet, ſuppleuiſſet id in quo arteria propter ſuam craſſitatem defeciſſet. Vera quidem hæc ſunt, & quæ pro euertendo naturæ inſtituto ſufficiant: ſed aliud eſt præterea conſiderandum. Nam quod arteriam venoſam inſtituit natura, non eo conſilio id fecit, vt ſuppleat aliquid pro vena arterioſa; id enim tantum ex euentu fit. Sed cum pulmo ſit pars ſpirituoſa, & quæ ſpirituoſi inſtrumenti rationem habeat, oportet illam abunde ſpiritum ſuppeditare: non poteſt autem commodius id fieri, quàm ſi receptaculum ſpiritus rarum feciſſet. Altera ratio potior eſt, quæ eò naturam induxit, nimirum quod neceſſarium fuerit arterioſum vas obſequens & flexibile eſſe ob inſpirationes & expirationes. Nec enim dubium eſt quin niſi ea ratio impediret, arteriam venoſam optimum fuiſſet craſſam eſſe vt diuturnius eſſet alimentum, & diutius ſpiritus ſuppeteret. Quæ omnia à nobis exagitata pertractatæque ſunt vt in veterum libris: ſi quid ſit ſcrupuloſum, eruatur, ac innotefcat. Abundè autem id fit expanſis orationis velis.

ANNOTATIONES.

1. Ergo perperam faciunt qui in morbis thoracis multum ſanguinis detrahunt, quia fraudant alimento.
2. Nam quemadmodum in generali diætæ præſcriptione non ad unumquem obſervatur dictum Hippocratis, vt cum extremi labores fuerint, extremè tenui diætâ utamur; ſed ſæpe, & temporis, & idæ morbi, imò & peculiariſ nature ægri ratio habetur: Ita in ſpeciali diætæ præſcriptione peculiariſ ratio harum aut illarum partium inſtituitur.
3. Vena arterioſa, ait Fernellius, nil intercedit cum vena cana: quoniam duplici ſimplici non continuatur, nec cohereſcit: Sic totam hanc venam

nam arteriosam ex corde nasci oportebat.

Arteria venosa sic condita, quoniam qui aer attractus in cor irrepit, nondum spiritus modo attenuatus est.

4. Item in iis quibus spirituosus sanguis, fatiscit pulmo, arescit, & adheret costis, ut experientia docet. An quia aliquando cruentum spuunt, sanguis mittendus? error est fœdissimus.

CONSILIVM XLIII.

De ventriculi gangrana & syderatione.

ABVND E alio loco docuimus verum esse quod scribit Hippocrates, similitudines bonis & eruditis Medicis fraudem facere: quod artem Medicam coniecturalem admodum facit. Etsi enim in plerisque rationationi locus est, demonstrationis-que leges sunt certissimæ: in aliis multis ita ambigit ac fluctuat ratio ipsa ob signorum complicationem & verisimilitudinem, ut quod tenendum vix explicatum exploratumque sit. Id cum alias à nobis expositum est in variis morbis, tum in hoc vno quæ explicandum suscipimus à nobis præstandum est.

Iacobus Gallus annos 50 natus, melancholico temperamento præditus, cum olim biliosus fuisset, conqueritur de dolore ad vmbilicum. Solemnis illi erat excretio cuiusdam materiæ purulentæ per anum, quod in recti intestini extremo pene vlcusculum ibi conceptum putaretur. Duodecim penè annos post illatâ vim recto intestino illatâ eo fluore recreatus est aliquantum. Restitit ille, aut non eodem modo perseverabat. Doloris illius ad vmbilicum desidentis causam referre poteramus ad illam suppressionem. Clysteribus, medicamentisque est alleuatus. Non ita paulò post deiecta appetentia, vomitiones, langor, partium extimarum quædam levis perfrigeratio, tamen incedebat. Et liquida & esculenta vomitu reiciebat. Veneno infectum putabant. Ac reuerâ præterquam quod manifestâ leipothymia non prehensus est, assumpti veneni argumenta aderant pleraque. Tamen eum eâ suspitione liberauimus, quod nullam de feris occasionem præcessisse videremus. Per dies quadraginta penè perseveravit vomitio illa. Quod mirum fuit, nec yllâ ratione alleuari potuit. Digito indicabat sedem affectam, nempe

Bb iij

superius orificium ventriculi & pylori regionem. Sensum quendam ponderis habebat. In horas marcescebat, facies concidebat, & totus venter collapsus est, præsertim qua parte subiacer ventriculus. Quidam, vt aliquid afferre viderentur, iecur & lienem putruisse dicebant: alij ad mesenterij obstructionibus plenum confugiebant. Et illud commune Medicorum asyllum est, sine quo vix rem, lucrûmve facere possint. Sed id non sine magna agrotantium clade, & Medicorum opprobrio: quasi verò in illis duabus partibus solùm omnium morborum sedes existat. Ad syrupum de cichorio solemnem confugitum est: sed omnia frustra. Tamen qui paulò accuratius rem inspicerent, cùm viderent tandiù perseuerare vomitionem, dolorem ad ventriculum non admodum vrgentem, nil profici foru, litu, delectu ciborum, balneo quoque ipso, necessariò pylori vias obstructas collegere. Satis aptè quidem. Sed vnde obstructio? an à scirrho, an ab inflammatione: Et si ab inflammatione, cur febris non erat acuta, & cur non perimebat intra paucos dies?

1. Interiit tandem planè emaciatus ac si sphacelatum corpus esset. Aperto cadauere, illud vtrumque viscus, lien & hepatis, quod fomitem malorum falsò iudicabant, satis erat integrum; quanquam fortè intemperie quadam, malàque diathesi vtrumque affectum erat, non ita tamen vt mortis inde occasio nasceretur. Ventriculi facies extima erat vermiculata, pylorustalis & penè restrictus, facies interna corrupta & putris, & statim laceratus est ventriculus, adeò (quod mirum fuit) in tota sua natura erat putris & cadauerosus. Humor qui in eo erat, nigricabat. Gangræna & syderatio erat ventriculi, quod nunquam ferè contigit. Et mirum, cùm tam malè affecta esset illa pars, & eius vis deperdita, quomodo tamen facultas eius expultrix in citando vomitu vigeret. Vomitus illa planè erat contra naturam, non à facultate excretrice vegeta, sed à retentrice deperdita, agente superiore orificio ventriculi, obturata pylori via, hinc residua vi quantulacumque in ea parte, statim remeabat id quod in ventriculum injectum erat.

Quæstio esse potest, vnde illa syderatio ventriculi, an ab inflammatione, an à veneno, an ab alia qualitate: Si ab inflammatione, febrem adesse oportuit, quod præsertim ea

pars inflammaretur, quæ locum maximum in corpore obtineret. Ille cum genio indulisset, & generosissimis vinis usus esset, credibile ventriculum tandem vitium aliquod concepisse, siue per se, siue per refluxum materiæ ab hepate, aut occasione suppressæ illius materiæ, quæ solemnī euacuatione excernebatur. Ita enim ventriculus vt & alia pars potest in tota sua substantia affici & corrumpi, vt & partes aliæ. Accedit quod phlogosis quadam potuit oriri in pyloro, & eius contagione affici ventriculus, citra tamen febrem continuam ardentem. Docuimus enim antè id contingere in melancholia hypochondriaca laborantibus, in quibus pylorus phlogosi detinetur citra manifestam febrem. Quod est notandum. Quod autem verisimile sit in ventriculo & partibus ei vicinis illam phlogosin conceptam fuisse, satis indicauit refrigeratio partium extimarumque viginti quinque dies perseuerauit: & quinque diebus antequam è viuis excederet febris apparuit in omnibus partibus.

ANNOTATIO.

i. Eodem penè modo interiit Dominus Vignerou, in vico Templi qui per sex hebdomadas laborauit, & de stomacho tantum querebatur. Sensiebat pondus quoddam, nec in latus alterutrum decumbere poterat. Vomebat sepe. Aperto cadauere hepar superiore parte adhaerebat diaphragmati, & idipsum hepar putre erat, & pulmones ferè.

CONSILIVM XLIV.

De venæ sectione in febribus tertianis.

ARABVM hoc fuit decretum, In tertianis febribus non mitti debere sanguinem nisi exacto iam tertio paroxysmo, & postquam sanguis putruerit. Quod fortè non abs re dictum est: nec credibile ita veteres Arabes, aut alios aliquid sine ratione, aut experienciâ pronunciauissent. Eiusmodi autem decretorum lin. anda eruendæque ratio, vt ea boni æquique consulantur. Videmus plerisque ante tertium paroxysmum missum sanguinem magno quodam profectu: aliis non item. Sed cur expectandum donec putruerit sanguis? Nunquid satius est statim de-

200 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 mere sanguinem, vt natura recreetur, & non expectare quoad
 sanguis contaminatus fuerit? Si plethora est, eaque natura mo-
 lesta, solvatur is habitus, & pertundatur vena: si cacochymia,
 relicto alio solemnī remedio, de purgando corpore cogitur.
 Quamquam non desunt ex recentioribus qui nitantur & auto-
 ritate veterum, & ratione docere non posse cacochymiam ad-
 esse, quin adsit simul & pleonexia si non ad vasa, ad vires saltem,
 quòd i; pravi humores non solum suā qualitate infesti sint (à qua
 cacochymia nomen desumitur) sed etiam suā quantitate. Sed
 iis salebris relictis, quæramus num in febribus tertianis (quod
 & ad alias à putri humore natas febres extendi potest) tutò vena
 secetur ante tertium paroxysmum. Materia quæ committit ter-
 tianas, extra vasa est: humor est primùm laudabilis suā naturā,
 sed qui per putredinem quæ tempore aggreditur, & per gradus
 quosdam naturæ infestus sit: febris essentia & *ὁρμή* in igneana-
 tura consistit (vnde absoluto nomine *πύρ* vocatur) materia quæ
 accensa calorem illum fouet, conscripta conclusaque loco est,
 an ea educitur sectione venæ? Hic multa occurrunt quæ lima-
 tius excuti possent, & longiore tempore, sed non est huius loci
 atque instituti. Primum, an quia in maioribus venis materia nō
 continetur, quæ intermissionis participes febres committit, id-
 eò locus sit sectioni venæ? Quod quoniam à Neotericis dispu-
 tatur, & contrā à maiore eorum qui cum nominis celebritate,
 & agrotantium auxilio Medicinam facit, agi solet, hac dis-
 putatione sumus superessuri. Constituatur enim tanquam po-
 stulatum in intermittentibus febribus, venam tutò ac ex arte
 secari. Quæstio tantum est de tempore, & an expectanda sit
 humorum putredo, antequam aperiatur vena, vt Arabum fa-
 milia placuit. Quod diligenter intelligendum est, ne quid hic
 temerè fiat & peccetur. Humor qui hodie paroxysmum com-
 mittit, an putris, an imputris? si putris erat, quare superioribus
 diebus non committebat febrem? si imputris, & intra naturæ
 limites contentus, quomodo febrem putrem committit? Quia
 putrescit (inquies;) ergo quandiu aderit putris humor, tandiu
 perseverabit accessio? Verum illud est, nam diffatur humor qui
 in hac accessione putruerat, vnde perfecta *ἀπορροή*. Quæ non
 contingeret nisi discuteretur humor putris; hinc confusæ vri-
 næ, hinc sudores. Ergo reliqui humores imputres sunt? Quo-
 rum itaque expectandum donec putruerint humores? Nam
 tantum

tantum humoris putris, quantum vni accessioni satis est. Et sic humores non educuntur venæ sectione nisi laudabiles in causa antecedente (vt aiunt) & illaudabiles in causa coniuncta. Sic multa paruo quasi suscitabulo quæstionis genera excitantur, quæ non erit facile delere nisi maior occasio & otium nobis suppetat, cum eorum alioqui euolutio & explicatio magnum sit alatura commodum iuxta ac voluptatem. Sed non possunt omnia vno loco. Vt autem paucis terminetur quæstio, quæ paucis somnitibus excitata in immensum exerescere possit, id quod ratione & experientia percepimus, aperte declarabimus. Non est in eo diutius hærendum, in quo dubitatur, si in vnaquaque accessione discutitur totum quod putret, vnde in quartanis & tertianis perfectam esse apyrexiam, Galenus ostendit (nisi quod in quartanis die intermissionis raritas & tarditas in pulsu manet.) Si totum quod putret discutitur, quid est quod expectemus huc aut illum diem, hunc aut illum paroxysmum, donec sanguis putreat? Nam finita accessione humores reliqui expertes putredinis manent, vt videtur, contra tamen fit. Aliud enim est humoris paroxysmi autorem putrere, aliud est massam sanguinis vitium concipere. Et si enim humor qui accessionem committit nondum putruerat, & post paroxysmum totus discutitur, tamen aliud est vitium in sanguinis massa tanquam causa antecedente morbum diutius alitura, futuraque, cuius occasione demendi sanguinis captatur occasio. Quotiescumque enim in corpore febris concepta est, febrilis caloris vi humorum moles facile corrumpitur. Vnde sæpe secundo aut tertio morbi die missum sanguinem laudabilem deprehendimus, progressu tantisper morbo aperta venâ putrem ac virentem fluxisse: quod argumentum esse debet minimis momentis magnas in corpore oriri mutationes in hanc aut illam partem. Sic ratione illius putredinis sanguinis celebratur venæ sectio. Quorsum itaque ante putredinem in massa conceptam celebratur? ratione plethoræ. Sed iuuatne expectar: quousque vitium in massa conceptum fuerit? illa quæstio est de qua disputatur. Id duabus rationibus aut tribus fieri debet. Prima est, si incendij concepti in humoribus maior habetur ratio, quàm copiarum humoris morbis in præcordiis. Nam cum in paroxysmis vrget æstus, aperta venâ ille præcipitatur, præuertiturque; vnde minus empyreuma, minus postea incendium & febris: sed si maior occasio ma-

Tom. I.

Cc

teriæ in præcordiis, ad purgationem veniundū. Secunda, quoniam cum vitium massæ sanguinis communicatum aut ratione caloris febrilis, aut ratione vaporis, paulò tum morbus dicitur maturior, & natura irritatur magis: atque ita irritata natura per missionem sanguinis illius putris paulò post reficitur ac recreatur. Nam post eiusmodi euacuationes sequitur aut alui fluor, aut sudor, qui faciliè morbi reliquias discutit. Tertia ratio est eiusmodi, cum plethora adest, aut ad vasa, aut ad vires, sine vlla mora ferire venam oportet: nam præsentè incendio febrili, & sanguinis copiâ faciliè strangulatur calor naturalis, hinc suffocationis periculum: hinc raptus humorum sursum, deorsum, & symptomatum augmentum.

Ratio quæ efficiat sæpe ut primæ venæ sectionis nulla ferè sit utilitas, est quòd parca manu nimium ea celebretur. Si enim liberalius sanguis mitteretur, dubio procul manifestior foret utilitas. Cetera alio loco fusiùs poterunt explicari.

ANNOTATIONES.

1. Ne quis fortè litera Arabum vim afferat, imponatque, ut quidam solent facere, contradicendi studio, nos ipsius Principis verba referemus. Nec enim absolutè tertiam accessionem prætermittendam vult antequam venam secemus. Verba autem eius sunt dum curam instituit febris tertianæ veræ, si possibile est ut non phlebotometur ager nisi post tres paroxysmos. Non est itaque cur absolutè quidam dicant Principem in febribus tertianis non secuisse venam nisi post tres paroxysmos: Galenus. ad Glaucon. in cura tertianæ veræ non meminit venæ sectionem, totus ferè est in alterando. Paraphrastes ait illo loco non multum Galeno placere enarrationem, quæ fit aut per venæ sectionem, aut per vehementem medicamentum. At dum ex professo tractat de febre tertiana notat, meminit venæ sectionis. Sed notanda verba sunt, quoniam circumstantiæ plene sunt. Sunt autem hæc: Si sanguinis missione opus est, nec est eo omittenda, sed initio statim detrahes, distinctis iis quæ probè nosti: id est, videndo an ex collatione virium cum morbo, & huius cum illis ager sufficere queat profligando hoc morbo: item observatâ ætate, tempore, & ceteris. Rondeletius carpit Galenum, quòd is voluerit in febre tertiana (de exquisita loquitur) expectandum esse tertium paroxysmum antequam vena aperiatur. Quod falsò à Rondeletio dictum est. Nisi fortè ex cap. 15 lib. 11 Methodi hoc desumpserit. Sed hoc verum non est, nec de ea re audiendus est.

2. Mirum quod scribit Galenus *commen. in aphor. 43. lib. 2. de dieta* quibus sanguis copiosus & nondum insigniter immutatus in naturam alterius humoris, iis deirahendus etiam audacter: quibus verò iam mutatus est, non deirahendus. Tamen contrà factitamus, liberius vacuamus & audacius cum videmus alteratum, quàm cum purum. Immo Galenus in melancholia audacter sanguinem mittit cum videt sanguinem in habitu esse melancholicum. Et nisi ille locus de pleuritide & inflammatione partis intelligatur, non potest tolerari, de quo est videndus *comm. in aphor. 10. lib. 2. de dieta acut.*

CONSILIVM XLV.

De Lethargo.

VIDVA Domini Garnier Procuratoris annos 45 nata in morbum incidit. Habitu erat satis succulenta, alba, genis rubentibus. Aegritudine aliquâ animi detinebatur quâ sese eximere facillè non poterat. Circa æquinoctium autumnale, cum præcessisset temporis constitutio inæqualis (qualem pauci admodum animaduenterant) putredinis parens, in morbum incidit. Primum totum corpus maculis rubris, ac si morbillis laboraret, aut si ingens æstus foret, erat defœdatum, non nullus corporis torpor, appetentia deiecta, ignavia, rerum omnium contemptio, cum alioqui prudenter rerum omnium satageret, & ad omnia obeunda munera esset alacris: Quod magnâ morum dissimilitudinem significabat, & ad iudicandum de dubio ancipiti que exitu occasionem porrigebat. Febris continua fuit, de nocte maximè exacerbabatur, nec exacerbationis nullum signum erat quod anteiret. Sed confusa erant omnia. Magna non ita febris apparebat, vt ea nos moueret. Febres eo tempore grassabantur mali ingenij. Vrinæ fallaces erant: nam nec incendij indices erant magni: & sedimentum laudabile satis, & enaorema continebant. Comatosa erat, nec nisi interrogata respondebat: alieni tamen iudicij nullum erat signum. Capiebat satis bellè cibum oblatum: Diebus iudicibus nil natura mouit, nihilque excreuit nisi arte sollicitata. Deiectiones variæ, putres admodum: sanguis bis missus planè putris: vires plurimum deiectæ apparebant, præsertim animalis, cuius et si non

Cc ij

204 CONSILIORVM MEDICINALIVM
magna necessitas est, in morbis, autore Galeno in Methodo me-
dendi; tamen ad iudicandum nobis magnam præbent occasio-
nem. Primis decem diebus exactis, omnia satis moderata, pa-
cataque fuerunt: sed ab vndecimo aut duodecimo die magnū
apparuit incendium, ex intervallis graueolentissimæ deiection-
nes, leuia deliria, oculorum lacrymæ inuoluntariæ: genarum,
ac præsertim sinistrarum rubor satur admodum. Tandem
cūm urinam redderet inuoluntariam, aut retineret aliquando
ac si suppressa esset, inuoluntaria quoque alius descenderet de-
cimo quarto morbi die ab illa exacerbatione manifesta: vicissi-
mo autem totius morbi historiæ die, cum sudore magno (nullus
autem toto tempore febris apparuerat deliria, risus, taciturni-
tas summa, tremores, & quasi subsultationes manuū aderāt. Potus
omnes sine discrimine admittebat, non sitiebat grauiter fe-
briens, potus veluti in profundum descendere videbantur: cum
colluere os aquā iuberetur, non poterat ore reicere: bene ratio-
cinabatur) Interiit.

Hac historiā intelligi volumus sæpe morbum satis securum
apparere, cūm tamen per se funestus sit, nec satis prauæ diathe-
seos argumenta apparent. In plerisque initio morbi obseruau-
imus totā corporis cutim maculis rubris suffusam, quibus ta-
men nihil præterea alienum contigit. Sæpe enim aut sanguinis
æstus, aut cum feruore quodam iuncta malitia aliquid tale pro-
mittit: sed illum nihil periculi iunctum habet, sola aut sectione
venæ, aut blando cathartico quicquid est præuenitur. Tamen
tribus quatuorve argumentis malignitas & cacoethia morbi de-
prehendi poterat. Primum in eruptione illorum exanthematō
positum erat. nam nisi ingentis incendij tanquam manifestæ
ocasiōis excusatio subsit, quoties apparēt aliquid maligni sub-
esse demonstrant: Secundum, in deiectione virium subita. Quo-
ties enim vires nō constāt, nulla præsertim præeūte euacuatione
manifesta, aut simili aliquā re quæ iacturam virium faciat, aut
cūm febris vehemens non adest, malum illud est vt signum. Ar-
guit enim aliquid aliud subesse latens ac reconditum, quod mi-
nimo momento magnam in viribus ac œconomia naturali mu-
tationem afferat. Et, quod notandum est, quodque Medicis
fraudi fuit, facies non concidebat vllō modo. Hippocrates
in Aphorismis scriptum reliquit, *Febricitantium non omnino leuiter
corpus idem permanere, & nihil minui, vel etiam plusquam posulet*

ratio contabescere, malum: nam illud morbum fore longum significat, hoc autem imbecillitatem. Vbi Galenus vult non abs re adiectum esse *ἡ ἀδυναμία*: quoniam hyeme, & cum plenitudo magna est, non collabitur habitus corporis, & tamen malum signum non est. Sed cum mediocris febris est, & tamen non mutatur corpus, nec in colore, nec mole, nec caractere: aut cum in his omnibus immutatur plus iusto, dubium non est quin hoc malum non sit. Nam non concidere ac collabi, & meatuum densitatem significat, & contumaciam materiæ. Concidere autem (quod Græcè dixit Hippocrates, minus propriè vsurpatur verbo *πυκναιέειν*) plus quam ratio postulet, imbecillitatem magnam significat; ita tamen vt collapsus illius non sit causa aliqua externa, quam *κατὰ τὴν φύσιν* aliis locis vocauit Hippocrates: & cuius in *ἀδυναμία* & *τῶν νοσημάτων* *ἡ γὰρ* maximam idem vult rationem haberi. Nam & ætas, considerata venit, & morbi aut breuitas, aut diuturnitas, & tempus, & regio, & notanda essetque digna euacuatio, vigilia, exercitationes, muneris gestiones, aliæque id genus. Quibus non perspectis, si quis ausit absolute pronuntiare de imbecillitate aut viribus naturæ pro extenuationis ratione, aberraret plurimum. Extenuatio illa (sic enim Leoniceus malè vertit *συντρίκεται*, contabescere, cum sumatur *ἀπὸ τῆς ἀδυναμίας*). Et Galenus comment. in aphorismum 10. lib. 3. Aphorismum verbum ab Hippocrate positum pro *ἐπιπείθει* *συντρίκεται* sumiait, vtens verbo *συντρίκεται* vs, pro simpliciter extenuatis) quæ præter rationem euenit naturæ infirmitatem significat. Sed hoc non est intelligendum. Aliquando enim extenuatio est, vt causa ad imbecillitatem relata, aliquando vt signum. Nam cum cutis raritas, & humorum tenuitas extenuationis causa est eiusdemque celeritæ, tunc illa extenuatio infirmat corpus: atque ita imbecillitatis causa est extenuatio. Sed cum nec raritatis cutis, & humorum tenuitatis suspicio non est, corpus autem præter rationem collabitur, ac concidit, illa extenuatio solam agnoscit virium infirmitatem, vt ex Galeno patet.

Atque vt ad scopum redeamus: In muliere proposita febris erat *ἡ πυρετός* *ὅτι* *ἡ νόσος*, & tamen non concidebat nec moles, nec color mutabatur, nec caractere: an hoc ad securitatem, & diuturnitatem apparebat, cum vicesimo quarto die interierit? Nequaquam. Et hæc duo annotatione dignissima sunt: prius quidem, quod ille dies 24. erat decimus quartus dies ab exacer-

Cc iij

Comment.
in Apho.
ad lib. 3.
Aphor.

batione. Nam, vt antè diximus, per vndecim dies satis alacriter habebat, & in actionibus naturalibus & animalibus, ac omnia pene securitatem pollicebantur. Sed quod intus venenum latebat cum natura nil mouisset, cepit sue malignitatis signa edere; hinc febris continua, acerrimi caloris perfusio, mox eiusdem contemperati significatio. Atque ita morbus acutus fuit, firatio habeatur exasperationis morbi, non totius historię. Posterius, dicendum est verisimile fuisse morbi quidem ratione citius illam interire, sed ætatis ratione quæ adhuc constabat factum, vt qui morbus antè perimere deberet, prorogaretur. Ita nimirum accuratè disputauit Galenus in Epidemiis, narrans historiam Hippocratis de Sileno. Hic enim cum à causis procatartictis in morbum incidisset, non tam lethali morbo est impletus ob causas procatartictas, quàm quia occasiones alię essent quæ corpus morbo opportunum reddebant: alioqui ratione externarum causarum in leuem febriculam lapsus fuisset. Sed lethalia symptomata quæ primùm atque statim apparuerūt, iudicio fuerunt restagnare materiam malam, quæ à causis illis externis excitata lethali morbo ægrum implicuit. Ita intelligendus Galeni locus in lib. de febr. cum ait causas procatartictas putridarum febrium non esse autores: id est, procatartictę causę *procatartictę* dictę, per se non solent putridas febres concitare, sed si corpus morbo sit opportunum, ex euentu producunt & excitant febres putres. Ergo ille Silenus cum funestissimo morbo detineretur, eius tamen vim sustinuit propter ætatem ad vndecimum diem.

*Comm.
in 1. stor.
2. sect. 3.
lib. 1. E.
pidem.*

*Cap. 7.
lib. 1. de
differe. febr.*

Hoc addam, antequam extremum persequamur, de faciei caractere & mole quam in illa muliere non concidisse dicebamus: sepe & optimus color, & character in egris apparet, cum tamen morbus ad interitum tendat, tribus de causis. Primā ratione, aliquando ipsius febris quæ sursum multum tenuem vaporem effert, qui viriditatem aliquam faciei, fallacem tamen, afferre solet: Secunda, si febris ea non sit ingens, aut *intermittens*. Obseruauimus enim aliquando febres *intermittentes* & pestilenciales (quas in quodam loco Galenus vocat pestilenciales heclicas) primo quoque tempore in speciem quandam marasmi ægros coniecisse: Tertia, si qui ægrotat, pulmonum vitio non sit obnoxius. Qui enim ita affecti sunt, rubore sæpe suffunduntur, qui Medicis minimè aduertentibus imponit maximè. Quod cum

aliàs, tum maximè in hac muliere apparuit; nam cùm paulò increuerat febris, rubore multo erant saturatæ genæ, præsertim verò sinistra. Aperto autem cadauere, vt postea dicemus, reperi sunt pulmones veluti putres, costis adherentes. Accedit ad rationes superiores, quòd qui præpingues sunt ac optimè habitì non ita facile collabuntur: aut si extenuentur, illius extenuationis & *ἐκπτώσεως* (collapsum interpretor) magna non sese produnt argumenta.

Atque vt reuocemur eò vnde digressio facta est: Tribus de causis patuit, sed non manifestò malignitas morbi & *κακότης*. Primum ob eruptionem papularum, quas *λευκίματα* Hippocrates vocauit in Epid. Illa enim eruptio (nisi fortè ob causas alterà paginà dictas aliud significet) malignum, & *κακόν* fuisse declarabat. Et videor eorum quæ scripta sunt ab Hippocratis interprete Galeno narrare historiam 4. in sectione tertia 3 Epidemior. Ait enim, initio sæpe morborum lethalia symptomata apparere, non quidem ratione ipsius morbi qui clemens & mitis apparet: sed propter latentes prauos humores, qui virulentiæ suæ semine excitato, in lethalibus symptomatis elucescunt. Secundum argumentum est positum in tam breui virium cæta. Nam cùm alacris, expedita, robustaque foret, breui attonita, stupida, comatosa, omnium obliuiosa reddita est, & delira. Tertium, quoniam in diebus criticis nil natura mouit, nullus sudor, sola *ἡσυχία* quæ in morbis istis suspecta esse solet. Quartum coma quodammodò vigilans, non tam ab oppressione fuit, vt falsò Medici putabant, tametsi multa in cerebro humiditas contineretur, quam in infirmitate facultatis natanimolis in cerebro sedem habentis. Testis inuoluntaria excretio stercoreis. Testis quoque esse potest quod medicamentis, & sectionibus venæ exartore et præscriptis nil alleuatum sit cerebrum: quod contingere non solet cùm ab oppressione tantùm laborat. Nulla enim venæ valida cerebri est oppressio, quàm medicamenta & sectio de meo. Obseruaui enim sæpe eos aut extremè laborare, aut inuicissimè, quibus acris calor, & eiusdem temperati ex interuallis mala est, vt in Coacis & Prorrheticis voluit Hippocrates: sed vicissitudo acris calor, & remissi mala quoque. Et illam vicissitudinem explicat Hippocrates, cùm vtitur vocibus *τὰ πολλά*.

208 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Nec enim vertere oportet, non omnino, sed *τα πολλὰ*, ex interuallis, ut modò hoc fiat, modò illud. Vel melius, *τα περὶ*, magna ex parte. Ut non sentire, non ratiocinari, non sitire *τα περὶ*, id est, magna ex parte: id est, ratiocinandi, & desipendi vicissitudo est sentiendi, & non sentiendi, sitiendi, & non sitiendi. Quod autem multò melius & accommodatè magis, *τα πολλὰ*, ver-
 tamus, per verbum. Vicissitudo, vel magna ex parte, illud ab-
 dè declarabit aphorismus Hippocrat. in Coacis: *ἄκρα τὰ χυλὰ ἐπ' αὐ-
 ρὰ πρὸς μεταπτώσιν ταῦ δὲ φαί τοιαῦτα, πορνεύει*. Vocat enim *ἄκρα* μεταπτώσιν, *Extremae partes modò refrigerantur, modò recalescunt*. Vel, *Extremae*
 partes magna ex parte calidae sunt, & magna ex parte frigidae.
 Et eodem loco *δι' αὐτὰ μεταπτώσιν* vocat, sitis, & non sitis, seu potius
 sitiendi, & non sitiendi vicissitudinem: ita nomen *μεταπτώσιν* hoc
 loco sumitur pro mutatione vicissitudinaria in contrarias par-
 tes; ut cum quis delirat, postea non delirat: cum nunc sitit, mo-
 dò non sitit: modò calfit, modò tepidus est aut refrigeratur. Ita-
 que cum Hippocrates in Aphorism. scripsit, *ὁ κόσμος πονέοντες: ἢ τὸ αἶ-
 ματος, τὰ πολλὰ δὲ τὸ πόνον μὴ αἰσθάνονται*, &c. Idem est ac si dicat, *ut*
πάντοτε αἶμα sit μεταπτώσιν πρὸς: vel ut melius dicam, *sit δὲ αἰσθάνονται μεταπτώσιν πρὸς*
 id est, sentiendi, & non sentiendi vicissitudo aliqua. Ut totius
 aphorismi ea sit conuersio: Qui parte corporis aliquà laborat,
 & magna ex parte dolorem non percipiunt, mentem his agro-
 tare constat. Hec pluribus explicari volumus, quoniam horum
 enodatio latius inanatura est.

Sed quaeritur, an verum quod antè diximus, non solum ca-
 loris & frigoris vicissitudinem in acutis malam esse, sed si calor
 modò acris appareat, modò temperatus & tepens, quod *αἰσθάνονται* vocat Hippocrates? De vicissitudine caloris & frigoris
 quòd mala sit, non dubium est, praesertim in acutis. nam signi-
 ficat hoc extinctionem caloris naturalis, qui vniuersi calori
 sit, partibus omnibus blandè aspirat, & dominium febrilis calo-
 ris, qui cum expanditur ad partes, eas calfacit; cum ad centrum
 reuocatur per modum inflammationis, easdem partes deferens,
 ex euentu refrigeret. Ita enim quidam Philosophi frigus per
 caloris priuationem & absentiam definiebant. In acutis itaque
 malum hoc. Nec mirum si in acutis tantum meminero; ac si quis
 velit in omni morbo eam refrigerandi & calfaciendi vicissitu-
 dinem perniciosam esse: quod non ita est. Et ad eam rationem
 impulit me aphorism. 40. lib. 4. Aphor. *Ἐν τῷ ὅλῳ σώματι μεταπτώσιν*

tionem (utitur enim nomine *ἡμετέρας*) etsi corpus refrigeretur, & modò calseat, aut coloris mutatio fiat, longitudinem morbi significat. Aliud enim est ista vicissitudine longitudinem morbi significari, aliud periculum. Nam in acutis periculo non vacat, in mitioribus morbis, longum fore morbum significat. nam & focum multiplicem significat, & materiam *ἡμετέρας*. Positum itaque & demonstratum vicissitudinem istam contrarij malam esse: sed dubitatur, an malum quoque sit modò calorem acerrimum sentire, modò temperatum.

Hac de quaestione nil vnquam scriptum reperi, eaque propter ego liberè quid sentiam enucleabo. Solemne est in multis febribus, praesertim in phlegmaticis calorem acrem apparere, & eundem temperatum praesente febre: hoc tamen malum non est; nam aut varietatem tantum materiae declarat; aut caloris in materia viridi oppressionem nequeuntis emicare, quod appositè *ἡμετέρας* vocat Hippocrates: Nec malum quoque significat in febribus cum catarrho coniunctis, in quibus saepe observamus modò emicationem caloris, modò eius teporem. Item fieri potest ut calor naturalis modò superet febrilem, & contra fiat; hinc acrimoniae perceptio, hinc teporis: & tamen hoc vacat periculo. Sed his breui satisfiet.

Cum de vicissitudine agitur, videndum quod corpus, quis morbus, & qualis sit vicissitudo, an frequens, an non. Nam in biliosis corporibus, in quibus calor totus acer est, non est expectanda vicissitudo caloris acris & moderati: sed si morbus perniciosus est, pro moderati caloris perceptione, frigoris sensio sufficitur. Breui enim calor blandus si quis est, extinguitur. Sed in corpore *ἡμετέρας*, quadrato, subfrigido, muliebri (quod nunc explicandum suscipitur) frigidis aut temperatis humoribus scattenti, non est quod expectemus extimas partes refrigerari, ut in aliis corporibus biliosis fit, nisi fortè diutius agrotent: tunc enim refrigerium apparet. Itaque quod apparet vicissitudo frigoris in biliosis & extenuatis, idem esse potest moderati tepidique caloris sensio. A materia enim vapor effertur, qui cum patris sit, sensum acrimoniae affert; cum calidus, caloris sensum. Quod autem absolute & per se frigus non appareat, id facit consideranda sunt: Vnum quod in biliosis incendium & calor intus conceptus facile reuocat calorem diffusum ad suum

210. CONSILIORVM MEDICINALIVM

centrum: Item non sunt humores moderati in quibus fouetur perpetuò febris. Sic videmus quadratos semper calere hyeme, nec multum calere æstate: siccos, macilentosque hyeme algere in extrimis, æstate ardere. Algent autem in his extrimis, quoniam caro multa non est, quæ sit pro velamine & præsidio aduersus frigus ambientis. Sic Galenus in comm. in Aphorism. eos qui carnem habent multam, & succulentam, ventresque calidos hyeme, & tamen non algent, vt macilenti, comparat cum iis qui niue perfunduntur: qui cum breuifriguant, reuocato per *αἰνιλαμνὸν καὶ ἐπὶ ἀκλινῶν* calore, calidiores solito redduntur. Atque idem contingit iis qui pituitosi sunt, & funesto morbo corripuntur. Non enim in iis sensio apparet frigoris, sed tepor quidam, vt modò incalescant, breuiter peant, quod satis malum est signum, in iis præsertim si vicissitudo ista sit frequens. Nam si vicissitudo ista, frequens non est, malum non ita est signum. 7. Sed cum frequens, inanem conatum naturæ declarat, putris materiæ copiam, à quamodò effertur vapor, modò non effertur. Idemque contingit quod in fimo putrente. Nam dum teter malignusque vapor effertur, sensio fit acrimoniæ: cum non effertur, febrilis calor tantum restat qui partes calidas reddit. Ergo dictum est de corporum varietate & de vicissitudine. Nunc de morbo dicendum breui. Cum acutissima & manifesta est febris in corpore calido sicco breui perfrigerationem extrimarum partium affert: cum autem maligna est febris, in partium imbecillitate summa posita, & humorum prauitate: nec acuta ita effertur acutici vim habens in calore, sed toto genere maligna, minitans aut parotides, aut abscessum alium morbo in partem, aut postulas (quod contigit octauo die Sileno, 1. Epidem. & tamen undecimo interiit) non ita partes extrimæ algēt, præsertim si corpus carnosum sit: (quod impressio caloris à sanguine & spiritu facili in carnem maneat) sed febris perseverans teporis, & acrimoniæ sensum exhibens: tandem cum calido sudore corpus tollit. Ita enim videmus quosdam interire cum perfrigeratione partium & sudore frigido (vt contingit siccis & extenuatis) alios cum toto febris tepore non sudauerint, aut leuiter tantum, sine ulla perfrigeratione, cum vniuersali sudore, multo, calido occidere: quod & huic mulieri contigit, & cuidam Flandro mercatori febre pestilenti confectato:

item & dominæ illi febre quoque pestilenti laboranti: de qua abundè narrauimus pag 34. huius libri. Atque ita minime opinantibus nobis multi moriuntur, quoniam non vident ullam partium perfrigerationem, quam in aliis quondam obseruauerunt. Nos autem obseruauimus istam partium perfrictionem in morituris, cum corpus siccum calidumque est, calore igneo & acri, quod Hippocrates τὸ θερμὸν absolute vocat, & eo præditos calore τὸν θερμὸν, & θερμονόους. Item in iis obseruatum est quibus in partibus internis conceptum est incendiū. Nam & cum sudore frigidissimo moriuntur, & cum summa partium refractione: vt vidimus in vico S. Antonij, in quodā nobili viro, cui aliquid erat erysipelatos circum ventriculum. Quod autem corporum distinctio afferat varietatem crisco, siue ad mortem, siue ad salutem, siue per sudores, siue absque sudoribus; siue cum calidis sudoribus, siue cum frigidis, siue cum extimarum partium perfrigerio, siue sine eodē, multis & autoritatibus, & rationibus potest roborari. Vnus autem aphorismus Hippocratis hic abundè erit, præsertim quia nos breuitatis studium recreat: Ο κοπὴσι θερμὰ καὶ περὶ τῆς γαστρίδος ἐκφυγεῖν ἢ ῥῶτα: τὸ τελευτῶσι, &c. Quorum cutis arens, & præsicca circumfensa est, si sine sudore moriuntur. Contra autem, vt idem aphorismus notat, cum cutis laxa & rara est, cum sudore moriuntur. Quod satis indicat pro ratione cutis & subiectarum partium, quibus aut multum humoris inest, aut cum sudoribus, aut sine sudoribus homines iudicari. Et antequam hinc peleni interpreter ex Philothei sententia verbum τὸ τελευτῶσι, vertere noluisse, mori, sed, iudicari. Vt τὸ τελευτῶσι ponatur loco verbi κρῖναι. O acutum hominem! τὸ τελευτῶσι significat desinere, mori, terminari, iudicari. Nil interest an mori, an iudicari, veritas; siquidem mors non fit sine crisi: & crisis æquè ambigit, tenditque & ad salutem, & ad mortem. Si τὸ τελευτῶσι αὐτὸ τὸ ἀπεκρῖναι sumas, angustior, restrictiorque erit aphorismus, si αὐτὸ τὸ κρῖναι dicis latior & multò generalior.

Præter hæc quæ superius posita sunt, tria possunt quoque hoc loco pertractari, quorum in explicatione operæ aliquid lubenter ponimus, quod inde plurimum adiumenti consequi possit arbitre. nunc. Primum est de comatosa affectione cum vigiliis: & cum dormiret, quamuis comatosa, facillè tamen excitatur.

batur, & interrogatis respondebat. Secundum est, qui fieri possit ut malè affecti cerebri tot essent argumenta, nempe comae quodammodo *ἀρεμέ*, tremores nonnulli, risus, deliria, excretiones inuoluntariae: obliuio & despectio omnium rerum, dissimilitudo morum omnium, ⁸ impotentia (quam in Coacis Hippocrates *ἀδυναμία* vocat, quamque *κνέσας* *πῶς* *ἢ* *ἐκείν*, malam esse ait, id est, si praecuntis euacuationis alicuius nulla excusatio possit asserri.) Si, inquam, tot tantaque fuerint malè affecti cerebri argumenta, qui fieri potest ut tamen ratio cinatio integra fuerit? Cur deliria ista, comaeque non euerterunt rationationem? Quaestio haec viro crudito dignissima. Tertium est de murmure ventris inferioris, & tensione, cum tamen aliud ferretur: immò quò diligentius de aluo subducenda cogitabatur, eò magis venter intumere videbatur. An hoc bonum fuit? Nam ventrem inferiorem non collabi ac deprimi in omnibus morbis bonum esse scripsit Hippocrates. Sed haec longiore explanatione egent.

Apho. 35
lib. 2.
Aphor.

De primo paucis aperiam. Coma aliud simplex est, aliud vigilans. Vigilans ab vno humore non fit, omnium iudicio, sed à mixtione humoris tenuis calidi, & crassi frigidi. Tamen, quò diligentius notandum est, reperio apud Galenum comm. in part. 1. primi Prorrhetic. Comatis vigilantis duplicem causam: vnam est sanguinis copia: hic sanguis ratione copiae comatosam affectionem inuclit: ratione autem tenuioris substantiae, quae in illo est, vigiliae quoque accidunt: Altera cum bilis mixta est pituitae. Vtrum deterius? quibus signis discernitur causa vtraque. Quod à remissione pituitae cum bile deterius est. His autem signis deprehendes à sanguine esse, praeter ea quae dominatum humoris, aut in parte aliqua, aut in toto corpore denotant: Nimirum si primis diebus celebrata ex arte sectione venae, aut v. surpato alio remedio, & copiam sanguinis euacuare solito, & acrimoniam tenuioris eius partis temperare consueto, non cesset coma vigilans, talis symptomatis causam statuere oportet bilem pituitam commistam. Quod eò loci pluribus Galenus explicauit. Hoc autem subindicarat obscurè Hippocrates illà primam sententiā Prorrheticam: *Comatosi vigilantibus cum hypochondriorum dolore & colli, stillatio è naribus perniciofa, tum alias, tum si quartæ ceperit die.* Ac si dicat Hippocrates, comatosos illos vigilantes verisimile est in eiusmodi affectionem incidisse à solo do-

minatu sanguinis. Si ergo peius habeant quarto die (quod stillidium sanguinis denotat) quo praesertim tempore cessare, aut mitescere deberet morbus solemnibus usurpatis remediis, significat hoc non solâ sanguinis copiâ, sed bile & pituitâ cerebrum occupari. Cuiusmodi affectio fuit mulieris nostra.

Secundæ quæstionis explicatio vberiore continet fructum, maioremque voluptatem est allatura. Quâ fieri possit ut integra esset ratio cinatio, cum tamen in imaginatione erraret, comatosa esset, corpus non pene moueretur? Immo si quod occurreret delirium, excitata statim ad se redibat. Nec respondendum quod scribit Galenus comm. in particulam illam: *Mente aberrantes, acutè superfervescentes, &c.* In priore Prorrhetici, quod cum humores biliosi aut alij feruntur in cerebrum, animum perturbât, cum reuocantur, in aliâque huius partem, eundem restituunt.

Nam affectum esse cerebrum per se, id est *τοῦτο τὸ μέρος* Græcis continuitas affectionis indicabat: nisi quod ratio cinatio integra foret. Quod ut intelligamus, altius hanc quæstionem repetere conuenit. Nimirum quâ fieri possit ut cum vnius partis vnum sit temperamentum à quo actio manat, quodque tanquam fons est, tamen in vna actione laesum sit aliquid, seu pars læsa, in alia actione illaesa ac intemerata. Si vnum temperamentum, cur sunt actiones contrariæ ab eo procedentes? Et cum ab eo tanquam principio actiones manent, cum vna salua est, læsa aut abolita altera? Quæstionem hanc diremisit Galen. videtur in cap. 3. lib. 3. de symptomatum causis, & in aphorismis. Scribit enim, ex actionibus quæ ab eodem principio manare cernuntur, quasdam magis vna qualitate gaudere, quam altera. Ut coctio, quia sine motu aliquo fit, in calido & humido consistit potius: attractio, expulsiôque, quoniam cum motu aliquo impetûque fiunt, in sicco potius consistunt. Ita nimirum ventriculus multum calidus & humidus coquit optimè, sed non trahit nec expellit facilè.

Contrâ si siccus pellit ac attrahit potentius, minimè autem coquit. Rens in diabete quamuis summè laborent, non desunt tamen ferociam humiditatem attrahere: immò in iis maior attractio cernitur fieri, quanto siccitas calorque ceteris qualitatibus antecellit. Ita enim ex actionibus quædam sunt *τὰς ἐν τῷ κρῖνι*, & ut sunt eiusmodi, aut illiusmodi, ita qualitatibus actiuis passiuisque magis minusve gaudent. Contrâ tamen asserri potest locus Galeni, quo videtur negare facultates quatuor

primis illis qualitatibus esse additas, sed quicquid in corpore agitur, præsertim quod ad nutritionem pertinet, illud ipsum toti substantiæ ascribendum esse censet. Quod si ita est, rationes nostræ superiores parum acutæ videbuntur. Verba autem Galeni hæc sunt: *Quatuor corporis propriæ sunt facultates, attractrix, retentrix, alteratrix, segregatrix: ac eadem facultates totius in quouis corpore substantiæ sunt, quam substantiâ ex calido, humido, frigido, siccoque inter se mixtis fieri existimandū.* Ille locus planè conuincit attractionem, coctionem, & sic de ceteris, non referendas esse ad qualitates has aut illas, sed ad totam substantiam. Nā vt postea subiungit Galenus eodem loco, loquens de nutritione quam à tota substantia fieri contendit, medicamentum autem non nutrire, quod à tota substantia non immutetur, sed ab vna tantum qualitate. *Si corpus (inquit) vna earum qualitarum quas in se habet, corpus sibi a motum mutaret, id ipsum tota substantia agere non est, nec quod ab eo mutatur, ei assimilabitur.* Sed locos ita conciliare alienum non est: Bifariam autem respondere licebit: illo loco tantum pro hypothese ponit quatuor facultates totius esse substantiæ, vt doceat medicamentum quodammodo alterari à corpore, sed non ita alterari vt in alimentum cedat; quia id tantum per qualitates præstatur: sed cum nutritio sit, cuius administræ sunt attractrix, retentrix, expultrix, ea à tota substantia sit, vt id quod mutatur, principio quidem dissimile, tandem reipsa pars fiat, ex carne & pane os, recipiatque ipsius partis *consuetudinem*. Sed sit ita tantum loco *inductum*, positum hoc sit, quam non probauit, verisimilior hæc ratio esse videtur: Quatuor facultates totius sunt substantiæ, quia resultant in composito ex mixtione quatuor elementorum, & conspirant in nutritionis officium: nõ proinde tamen sequitur quin commoditates sequantur ex vna potius qualitate quàm ex altera, vt licet & siccitas & humiditas ad actionem conferant, tamen siccitatis potentia & energia eluceat potius in attractionis & expulsionis munere, quàm in procuranda concoctione. Vel ita scrupulus hic tollendus: Vel consideramus facultates quatuor in genere, vel in specie: In genere, cum vnà conspirant in publicum munus coctionis, nutritionisve: vel quatenus in se singulæ spectatæ magis aptæ sunt ad hanc actionem adiuuandam quàm ad illam. Priore modo considerauit Galenus illo loco libri tertij

de Temperamentis: posteriore verò in aliis locis.

Vt autem hanc longam satis disputationem nostro instituto accommodemus: quemadmodum in vna qualibet parte variæ eduntur actiones tanquam ab vno communi principio manantes, sed quæ tamen facultates diuersas ei parti tributas & confusas: ita fieri potest vt & vna pereat, alterâ incolumi necnon integrâ parte. Ita nimirum in cerebro phâtasia valet, cõmunis sensus valet, & tamen iudiciũ & ratiocinatio agra est: quod pluribus explicandũ nõ est. Imprasentiarũ autẽ sufficiet illud exemplũ de melancholicis, quorũ meminit Galenus. Horũ enim quidã se testam esse putabat, ac vicatim inelamabat, vt omnes fugerent, ne aliorum tactu pressũve collideretur. Quatenus enim se testam putabat, eatenus ratiocinatio laborabat minimẽ, sed phâtasia. Nunquid enim præclarẽ ratiocinabatur læsum iri se aliorum pressũ, si terreus, aut vitreus foret? Mirum itaque non sit si de qua disputamus mulier ratiocinandi facultatem integram haberet, cùm tamen in ceteris cerebri functionibus malè satis haberet. Huius autem rei mihi probabilis hæc ratio esse videtur.

7 Cap. 11.
3. loc. eff.

Aliud est lædi offendive cerebrum in iis functionibus quæ animales esse dicuntur, clarioris doctrinæ gratiã, & ad cerebri ipsius temperamentumque pertinent: aliud verò lædi in iis quæ ad eam partem pertinent quæ mentis & consilij est. Priore modo dicitur læsum in animalitate: posteriore in ratiocinio. Hoc autem indicabit historia cuiusdam Polemarchæ generosissimi D. de Brissac. In hoc omnes actiones cerebri offensam receperant; non movebatur, delirabat, in summo æstu non fiebat: magnum & rarum spirabat, immemor sui erat. Hæc omnia læsum cerebrum indicabant, & tamen commodè ratiocinabatur, ac præclarẽ de rebus diuinis sensa mentis exprimebat. Spiratio tarda imbecillum cerebrum declarabat, rara imbecillitas in ratiocinandi facultatem; nec enim intelligebat se magnã inspiratione aëris ob æstum indigere. Sed quod attinet ad consilium, & animi vigorem, apparuit semper vis eius partis quæ ratiocinationis præclaro munere quòque proximè deos attingit, sese ostentat, cùm satis supina, languidãque esset vis illa quæ corpori & appetendo, & respirando prouideri consuli que debet: id est, vis animi quæ bonis cogitationum epulis & consiliis alitur, ac reficitur, vigeat: quæ autem à cerebri naturali temperie pendet, quæque corporea esse magis videtur, languet.

scebat. Quod solum argumentum immortalitatem animæ con-
 tra Epicureorum gregem conuincit. Nam in animo duplex vis
 apparet, vna diuina planè, non aliunde medicata quam ab ipso
 cælo: altera paulò pinguior ac terrena magis, quæ elucet quan-
 diu in corpore anima detinetur. Posteaquam absoluta est cor-
 pore, prioris vis elucet ac eminet. Ac sic intelligere oportet
 Hippocratis & Galeni varios locos. Nam modò animum ægro-
 tare ait, modò eundem in somnis ferri ac otari, modò in iis-
 dem somnis erigi ac vigere: quæ quoniam admodum contro-
 uersa sunt, non erit abs re si eos locos conciliauerimus. In A-
 phorismis mentem ægrotare dicit, utitur nomine *ψυχῆς*, quæ
 idem esse cum nomine *δύναμις* scribit Galenus. Quid hoc est ani-
 mam ægrotare? an ægrotat? Videtur idem Hippocrates negauis-
 se in libris de Dieta, *Ἰμpossibile est*, inquit, *τὴν φύσιν ὁρίσασθαι*
transformare, id est, immutare. Prius enim locutus erat de alte-
 ra natura manifesta quam in temperamento & quatuor prima-
 rum qualitatum symmetria consistere demonstrat. Quid er-
 go est, mentem ægrotare in Aphorismis? Est *ἡ νόσος τοῦ διανοητικοῦ*
 phantasia, forma, *ὁ καὶ ἐστὶν ἡ ψυχή* ipsius cerebri, & vocatur *δύναμις* ab
 Hippocrate, à Galeno in comment. *δύναμις*, propterea quòd (ut
 ego autumo) in debita temperie & symmetria ipsius cerebri
 consistit *ἡ νόσος τῆς ψυχῆς, τῆς δυνάμεως*, vis & robur. Atque in eodem
 sensu Hippocrates in Epidemiis scripsit, *Μελαγχολικοὶ εἰσὶν*
Epileptικοὶ, & contrὰ. Vtrumque autem fit prout in hanc aut il-
 lam partem affectio reperit. Si enim in corpus, epileptici; si in
 mentem, melancholici fiunt. Notatu autem dignissima sunt ver-
 ba Græca, *ὅτι ὅπου τὸ ἀρρώστια πέφκει τὸ πῶς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων γίνεται, ὅπου δὲ ἐν τῇ διάνοιᾳ
 γίνεται μελαγχολικοί*. Mentem *δύναμις* vocat, id est cerebrum ipsum qua-
 tenus consideratur tanquam pars similis. Cùm ergo scribit
Qui parte aliquâ laborant, &c. *ἡ ψυχή* mens ægrotat; non intelligit de ca-
 mente quæ immortalis, & ortus nescia, ab eodem Hippocrate
φύσις ἀσώφης, natura obscura vocatur. Nomine enim laboris sen-
 sum intelligit solum, & *ποῖός τε* vocat eos qui ita in parte aliqua
 offensi sunt, ut nisi delirio mens detineretur, dolerent, ut Ga-
 lenus idem interpretatur. Nam dolor duplex, vel enim in affe-
 ctu partis aut corporis impressionem recipientis consistit: vel
 in eius apprehensione, quæ sentientis animæ esse dicitur, per
 mediam imaginem hominis de eo iudicantis. Si enim dolor ra-
 tione causæ grauis vehemensque esse debeat, levis tamen ap-
 prehensio

Com. in
 aph. 6.
 lib. 2.

Lib. 1.
 de Dia-
 ta.

Sect. 7.
 lib. 6.

Cap. 6.
 lib. 7. de
 placitis.

prehensio est, morbus levis dicitur; vnde Stoici malum opinio-
ne metiebantur.

Et qui humili sunt animo, effœminato, ac enervato, illi sta-
tim dolore languent ac franguntur, ac sæpe malâ opinione me-
tiuntur. Ita Zeno Eleates perpeſſus est omnia animo forti ante-
quam conscios delendæ tyrannidis indicaret. Calanus Indus
Barbarus, in radicibus Caucaſi natus sua voluntate viuus com-
buſtus est. Nos, si pes dolet, si dens, ferre non possumus. Opi-
nio enim quædam est effœminata ac levis, nec in dolore magis,
quàm eadem in voluptate, quâ cùm liqueſcimus, fluimusque
molliâ, apud aculeum sine clamore ferre non possumus.

Loci autem de mente in ſomnis planè à ſe inuicem diffiden-
tes hi ſunt. Libro de ſtatibus ſcribit, *φρονος* & mens nobis dor-
mientibus immutatur, multæ & peregrinæ nobis vndique ob-
uerſantur imagines, varij errores & diſcurſus fiunt. Contrâ
libro de inſomniis: *inter vigilandum mens in varias partes diuidi-
tur, nec ſui iuris eſt: dum ſomnus obrepiſit ſua præſidia ac vires iam iam
recolligit, ac alius contemplatur.*

Tertiam iam quæſtionem paucis explicemus, quâ fieret vt
venter non detumeſceret, quamuis abundè alius ferretur. An
iſta ventris eleuatio conferebat? *in quouis morbo, ſcribit Hippo-
crates, partes quæ ad imum ventrem & umbilicam attinent, habere
craftitudinem, bonum eſſe ait, extenuari verò ac collabi, malum.* Col-
lapiſus enim ille malus, & vt ſignum, & vt cauſa: vt ſignum, quo-
niam indicat ea extenuatio naturæ imbecillitatem: Vt cauſa,
quoniam cùm partes ſubiectæ à ſucculento, quadratòque aqua-
liculo cùm iuuentur, caſu illo ac extenuatione deterius habeât,
ac propterea nec bona in vetriculo *χολης*, nec in hepate *αιχλης*
fiat. Itaque ab æquali hypochondrio iuuatur & coctio, & excre-
mentorū expulſio. At in iſta muliere an laudabile? Nequaquam.
Nā cùm è natura habet molle & quale eſſe debet: nec depreſſum,
nec elatū, nec calidum, nec frigidū; non durum, non meteorum,
nec cum borborygmis, qui aut aluo humectatâ, aut vrinæ pro-
fluio, aut ſtatu ceſſant in febris eſſentialibus (nā tum motu
naturæ fit) non autem in ſymptomaticis, cùm aut pulmo, aut
iecur, aut lien laborat (nam tum ſymptomatis rationem habet,
& inani conatu id fit) Hippocratis ſententia 4 Aphor. At con-
tigit in iſta muliere vt alius flueret, tamē falſam ſpeciem æqua-
litatis hypochondrium referebat: & murmura obaudiebantur,

Tom. 1.

Ec

Cic. lib. 2.
Tuscul.
quæſt.

Aphor. 4.
lib. 2.

quæ vt prædixi, non cessabant vlla excretionis ratione. Sic specta erat illa hypochondrii elatio. Aperto cadauere, inuenta intestina plena fugaci tetróque flatu, cum serosis humoribus in spatiis & inanibus foraminibus abdominis, qui meteorismum inferebant. Sic elatio, subductioque alui non quicquam de meteorismo detrahebat. Ac primus Hippocrates in Coacis obseruauit meteorismum in morbis, & aluo suppressa, & aluo subducta. Vtrumque malum. Verba eius sunt: *Quibus præcordia eleuantur aluo suppressa, malum, maximè autem in morbis tabidis longis: & quibus alui humectantur: id est; Quibus alui humectantur, & præcordia etiamnum eleuantur, malum. Eleuantur enim tam à maligno, siue sit flatus, siue humor tenuis, serosus, putris. Et propterea in illa parotides expectabamus; ad tale expectandum inuitabat alia Hippocratis sententia in Coacis: Hypochondriorum distensio cum sopore anxioso in caput dolente parotidem excitat.* Sed quoniam graecolentissima excernebantur elato manente hypochondrio, comate perseverante, si parotis contigisset, malum vt signum apparituram credebamus. Verum enim quod scribit Hippocrates: *Ex hypochondrio diu afflicto, & aluo graecolenti abscessus circa aurem occidit.*

Plura vnius huius historiae fides proponeret, & ad mentem Hippocratis accommodaret, vt nil temerè inconsultoque ab Hippocrate scriptum appareat: sed non vnus locus omnia capere potest. Alia sese præstò offeret occasio, in qua orationis ac sensus vela pandere licebit, ac explicare: ne si nimis multa in recula describunda effunderemus, confingere ac comminisci existimemus: & quasi nobis ipsis ostentandæ industriæ nostræ frustrà ac iuueniliter occasionem porrexisset.

ANNOTATIONES.

1. Quomodo tandem inuenerimus hanc à pulmone lethargicam fuisse, vide in libro Ephemeridon nost. 2.
2. In hac muliere fallaces fuere urina. Nam satù laudabile sedimentum semper habebant; mirum cur interierit. Nam Galenus cap. 3. lib. 3. de crisibus ait obseruasse se quemquam interisse qui iudicaretur cum urinis coctis. Et hinc colligunt quidam neminem interire posse apparentibus signis actionis in urina. Aliter tamen res habet. Nam Galenus vult non solum requiri coctionem, sed & excretionem. Tamen si enim sit & co-

ita, & secreta materia, tamen nisi excernendo natura sit satis, interibit etiamnum aeger.

3. Cum Hippocrates dicit *μη παντάπασιν ἐμπλασίως*, intelligit de febribus que sunt media inter acutas & leues.

4. Verum illud comperi: Qui à leui sudore somni sunt expertes, & rursus ardore febrili conflagrant, malum. Nam qui bene iudicantur, suauiter dormiunt: Et quod leuis sudor inanem conatum natura significat, quam melius esset pepasmo incumbere, quàm frustra excretionem moliri, quod in hac agra maximè apparuit.

5. Nullus est locus in quo melius & clariùs declaret Galenus qua ratione mutationes celeriter factæ male sint, quàm comm. in aphorif. 8. sect. 2. Prorrhetic.

6. Huiusmodi caloris renuocatio, & absentia; febris exacerbatio, & sine causa manifesta remissio solet esse frequens in febre, quam Hippocrates *ρετροεισὶν* vocat, quâ mulier mihi visa est laborasse. Et inter ceteros locos est incommemorabilis, cuius veritatem percepimus in hac agra, scriptus comm. in part. 25. sect. 2. lib. 1. Epid. Quod nimirum in febribus tertianam referentibus continuis tamen hoc obseruetur, quod in diebus decretoriis illa febres deteriores fiant. Item proprium hoc malignis. Alterum quod initio saepe magnus calor & respiratio proportionata, statim calor remittitur. Et putant hoc è re agrorum esse cùm mortis signum existat. Et Galenus comm. in Prorrhetic. meminit iactationes febrium malignarum esse proprias, easque aut insignem calorem febrilem significare, aut orificij superioris vetriculi affectionem.

7. Ego rationes istas meo veluti Marte comparaueram, sed fortè contigit easdem penè legere, sed discretè magis à Galeno explicatas comm. in aphor. 8. lib. 2. Prorrhetic. ubi ait eam reciprocam sensationem caloris & frigoris esse, quia in extimis illis partibus in quibus celeriter hoc fit, calor ferè naturalis extinctus sit, & tanquam à flamma excitata anathymias caloris febrilis dominantis pars illa recalescit, sed statim euaporat ille calor. Plura leges comment. in part. 16. lib. 4. acutor.

8. Galenus duas causas statuit imbecillitatis repentinæ citra manifestam euacuationem, aut quantitatem materia, aut principiorum corporis intemperiem.

9. Corpus sparsum erat maculis, sed erant linide. Et antè notauimus initio varias similes papulas apparuisse, quod suspectum erat necessario. Idco videtur Hippocrates huius morbi euentum prauidisse, cùm scribit in Coicis: Qui circum articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigent, hi circa ventrem rubescunt &

Ee y

220 CONSILIORVM MEDICINALIVM

inguina veluti ex plagis dolorosis, & moriuntur.

10. Quae excernebantur erant graucolentissima, propterea quae non poterant non sollicitare facultatem expultricem intestinorum: & tamen non meminerat querere maculam. Quod arguebat impotentiam iudicii & rationis euerfionem. Inuoluntaria enim erat excretio. Huius duas causas Galenus reddit comment. in particulam quandam comm. 2. lib. Prorethici. Aut cum mens agrotat, aut cum partes per quas excretio fit, non sentiunt: addo tertium, cum humor per se mordax non est, ita ut sponte sentiat: quanquam vix fieri potest quin sentiat si intestina valent. Textus Hippocratis est; Si ex ventre tenuia agro non sentienti exeat, si extra se non sit, malum ut hepatico; id est, Excretio illa tenuis materia, non sentiente agro facta, declarat vel non generari biliosum humorem ob imbecillitatem hepatis: vel si generetur, non excernitur (quanquam hepatica excrementa maxima ex parte acia sunt) sic declarat propriam affectionem hepatis. Non abs re autem adiectum est, si ager apud se sit, ne quis putet istam inuoluntariam excretionem laesa ratione fieri: ita enim signum imbecilli hepatis non ita esset manifestum, sed praeceps denotaret affectum cerebrum. Item non declaratur ulla offensa generis nervosi, propterea quod integra sunt intestina. Si ergo inuoluntaria sit illa excretio santeratione, non laesa intestinis, signum est imbecilli omnino hepatis.

CONSILIVM XLVI.

De renum calculo.

QVIDAM orthopnoea laborare videbatur, unde gravissime haberet. Nonnulla erat suspicio affecti pulmonis, non tamen certa erant argumenta quibus appareret vitium in pulmonibus conceptum. Tamen cum orthopnoeicus ac anhelosus maneret, quaesitum quae illius difficultatis causa esset: multis ad vnguem pertractatis, in eam ventum est tandem opinionem, ut nil tale in pulmonibus consistere crederetur quod eam difficultatem inueneret. Sed ut plerique sunt aliis oculatiores, dictum est suspensionem magnam esse calculi in renibus. Quod cum contingit aliquatū difficultatis spirandi species apparere potest. Consultum renibus est: Deturbatus remediis convenientibus calculus libertas respirationis est restituta. Causam autem eius

rei esse volunt, quòd neruulus est à sexta coniugatione perua-
dens diaphragma, & ad renes vsque perreptans, qui oppressus
vt in opposito femore stuporis sensum intert: ita in partibus su-
peris difficultatem nonnullam respirationis afferre potest; nam
renes ambigunt inter partes superas atque inferas. ^{1.} Et nos vi-
dimus mulieres aliquot & viros, quibus familiaris renum dolor
est grauis & pungens, qui sæpe cōquerūtur de dolore lateris ac si
pleuritis aliqua nothas costas occuparet, cū tamen nil sit ta-
le: sed ob obfessionem renis à calculo, aut eiusdem oppressionem
ab aliqua re obstruente ratione nerui implantati in renis cor-
pus, idem sit quod & in lienis aut hepatis tumore, aut obstru-
ctione; Nam circum clauiculas dolorem sentiunt tensuum.
Quærat quis, cur non id omnibus calculosis contingit, aut qui-
bus præditi sunt renes? Non est necesse. Nam sæpe insignio-
res sunt nerui in aliis atque aliis, ac errore quodam naturæ in eā
sedem partis alicuius inferuntur, in qua sensus viget magis, ac
consensus maior est cum partibus vicinis. Nec enim quibus-
cumque contentus in capacitatem renis lapillus est, iis obiectum
oppositumque femur stupet, tametsi stuporem tanquam ^{συνίτον}
^{αυτοῦ πέποι} lapidis in rene contenti constituat Hippocrates. ^{2.} E-
iusdem quippe morbi varia atque varia in aliis atque aliis cor-
poribus signa apparent: quod efficit vt ars nostra planè sit
^{εἰς τὰς ἀνθρώπων} non autem ^{ἀποδεκτικὴ}. Oportet enim multa ^{συντελεῖται}
id est, probabilibus quibusdam rationibus atque apparentibus
signis colligere; non autem ^{ἀποδεκτικὴς} & ^{συνλογιστικὴς} concludere,
ac si aliter contingere non possit in Socrate atque Sophronis-
eo: variæ enim sunt humorum idæ, variæ spirituum, variæ
corporum, variæ morborum. Quæ omnia imprimis artem no-
stram difficillimam reddunt, & immensam planè.

ANNOTATIONES.

^{1.} Arculanus cap. de renum apostimate, docet alia esse symptomata,
si ren dexter laborat, alia si sinister. Si dexter, hepar compatiunt, & par-
tes potius superiores; si sinister, ad partes potius inferiores malum per-
tinet. Addit quod si abscessus occupat panniculos renum & suspensorium,
magnificatur dolor, & fit fortis, & prohibet erectionem, iussim, & ster-
numentum, & difficile est inuenire locum. Hæc omnia notanda, vt
non temerè accusentur partes superiores innocentes alioqui, cū malum

Ee iij

222 CONSILIORVM MEDICINALIVM
sefe in inferioribus firmaverit.

2. Hippocrates part. 5 lib. 6. sect. 1. Epid. vixit rō unq̄rat tēn, huius stuporis duplex est causa: prima, compressio musculi vōs dicti, cui renes ambo incubant: altera, compressio nervi qui in cruris musculos inseritur. Hanc autem à calculi duritie & pondere fieri hinc pater, quòd incipiens calculus stuporem non inducat.

CONSILIVM XLVII.

De sanguinis per os reiectione ex costarum vulnere.

SEPTVAGENARIVS vilibus muniis occupari solitus ingentem sarcinam concinnare volebat, ac circumqua; illigare. Funes mediū ingenti conatu immisso in transuersum baculo rumpuntur. Baculus costas illidit, atque ita prosternitur. Dolor quibusdam lenitur; nonnihil tamen doloris circum læsas partes percipiebatur: nil post eum quassum ictumque excernitur per menses quatuor aut quinque. Tandem per aliquot dies appetentia imminuitur: nausea adest: membra lassantur: dum nil tale cogitaret, per os excernitur magna copia sanguinis nigri, fœculenti, grumosi, cum animi defectionibus: pulsus imbecillo, & intercalari intermissione. A reiectione quieuit. Denuò animo defecit, syncope prehenditur, sudor frigidus, vomitio magna sanguinis multò deterioris quàm sit superior: dolor ad notharum costarum regionem. Omnes interiturum credebant; conualuit tamen.

Vnde sanguis ille? Cùm causa procatarctica præcessisset, cur non aut primo quoque tempore excernebatur, aut non in pus concreuerat? Si concteuisset in pus, cur non malignitatis suæ signa prius edidit? Credibilēne in capacitatem fluxisse, & tanto tempore mansisse impunē? Cur non factus abscessus? Credibile non affatim coaceruatum esse, nec per modum ruptionis vasis exiliisse è vasis. Sed cùm pars icta fuit læsa ac concussa, hic accumulatus sanguis, tandem communicatione & transfusione in partibus vicinis conceptum vitium: alioqui & leiporhythmia præcessissent. Immò si menstruus sanguis in muliere statò tempore non exeat, non multum post furit, impetumque mouet, adeò facilis est sanguinis redundantis, ac eius præter-

tim qui in partem aliquam fusus est præter naturam, orgasmus, impetus, acira, idque propter corruptionem quam de facili contrahit. Accedit quod senex erat, squalidus ac fuscus: propterea quæ non tantus est humoris impetus quantus in iunioribus: & ratione ætatis non tanta est humiditas & calor, quæ ad facile contrahendam putredinem esse possint. Sed inquiramus cur non interierit, cum Aphorismi Hippocrat. & in Coacis, & in libro Distinctionum contra eum facere videantur?

In 4^o Aphorismor. scribit, *Morbis quibuslibet incipientibus si atra bilis supra vel infra exierit, lethale.* An hic aphorismus contra eum fecit? Nequaquam; idque tribus de causis. Primum, quia morbus non erat ullus: id est, nec inflammatio, nec febris, nec vitium in hypochondriis, cuius morbi causa esset ille humor qui excernitur. Qui quoniam non excernitur legitimo tempore, id est nec naturâ coquente, nec secernente, nec propriè euacuante; totum illud est symptomaticum. Natura enim nil excernit in principio, aut si excernit, symptomaticum est id. Ergo id quod excretum est, materia morbi non erat. Quis enim nescit sapenaturam citare alium sine morbo, vomitiones prouocare, cum id nec symptomaticum, nec criticum propriè dici debeat? Sed cum morbus est, si materia quæ excernitur morbi est, malè id fit initio.

Secunda ratio, id quod excretum est, non erat atra bilis, sed sanguis niger: at ut inter atram bilem & sanguinem nigrum multum interest; ita magni refert initio atram bilem, aut sanguinem quemdam fæculentum excerni.

Tertiò, primo quoque tempore excretio facta est, cum haberet *ap. de cr. lib. 1. de cr. lib.* nec id tempus principium dici debet morbi, cum morbus non sit: aut sit ita, sequatur morbus postea, cum vituperatur excretio initio morbi: voluit Galenus principium morbi non ita angustè accipi, sed cum paulum progressio facta est. Quanquam non negamus aliquando primo quoque tempore lethales excretionem esse, & lethalia symptomata, quod authore Galeno in corpore humores sæpe deliteant veneno adæquadi. Sic in Aphorismis damnat deiectiones sponte venientes, qualis sanguis niger, siue cum febre, siue sine febre. Quanquam hæc conditio, sine febre, magni sit momenti, quod multa excernantur modo minimè laudando, ad quem si accessio quoque febris fieret, multò res deterius haberet: quod paulò post ape-

224 CONSILIORVM MEDICINALIVM

riemus. Deiectiones autem venientes sponte prauæ sunt, aut quòd sūmum frigus designent, aut incendiū ingens, aut corruptelam. Quod in pestilenti constitutione accidisse affuecat

Com. in Galenus.

Aphor. 2
lib. 4.

Est alius aphorismus qui contra ægrum nostrum stetit videtur: *Quibus ex morbis acutis aut diuturnis, vel vulneribus, vel quodammodo extenuatis, nigra bilis, seu uti sanguis niger desubter exierit, postridie moriuntur.* Læsus erat, contusus, vulneratus quodammodo (quanquā in Græco ponitur nomē *σπύλαις*, quod infligere vulnus significat) excernitur uti sanguis niger (nec enim possibilem propriè excreuit, ut paulò antè diximus) quare nō postridiè interiit? Mirum est quod Galenus hunc narrans aphorismum, istam particulam, *ἢ ὡς καὶ σπύλαις*, generaliter retulerit ad omnes alias particulas per disinctionē scriptas: ac si dicat Hippocrat. *Quibus ex morbis acutis extenuatis, quibus ex lōgis extenuatis, quibus ex vulneribus extenuatis: nō autē per disinctionē hanc; Quibus ex morbis acutis, aut lōgis, aut extenuatis, aut vulneratis, &c. ut sit ea mens Hippocratis. Quibus extenuatis, aut à longo aut acuto morbo, aut vulnere, atrabilis exierit, &c.* Ut extenuationis nomen explicet propriè mentē Hippocratis, & extenuationis verbū verè doceat cur mors sequatur necessariò. Ita enim vult Galenus eos interire quod talis excretio iis cōtingat, qui sunt *σπύλαις καὶ σπύλαις*, non simpliciter vulneratis, non simpliciter laborantibus morbo aut acuto, aut longo: sed ita in extenuatis cōtingit, quòd adeò natura imbecilla, ut nec coquere, nec excernere, nec secernere possit. Et cum ob morbi magnitudinem nequeant contineri, effunduntur necessariò. Ob imbecillitatem autem mors anteuertit vel initio, vel augmento, non autem morbi declinatione, aut statu expectato; ut in aliis morbis euenire ait Galenus. Sic cum æger noster extenuatus non esset, de eo intelligi non potuit aphorismus.

esp. 1. & 2.
9. lib. 1.
de cris.

An alius aphorismus intelligitur? Sanguis, suprà qualiscūque fuerit malus, infra autem bonus. At suprà excretio facta: ergo mala. nam aut ruptionem, aut apertionem, aut exesionem valis significat. Nam mala est quòd per os, & mala quòd affatim. nam cum per comparisonem excretio sanguinis per inferiora laudanda censetur, Galenus non vult etiamnum sanguinem largè profluere, sed pedetentim, adeò ut tarditate gressus nigrorem acquirat sanguis, non quòd reipsa talis sit. Textus Leonicensi deprauatus

ANNOTATIONES.

2. Vixit annum & dimidium post: nullumque diem prateriit in quo molestiam aliquam in parte laesa non senserit. Tandem rupio veluti ab scessu aluius feculentis excrementis descendit, iisque fatidissimis. Visus est allenuari. Iterum aluius lata est, & dum recumbere vult, statim aphonos redditur, mediâ horâ post interit. Mortuo excretio fit per os, & deorsum magnâ copîâ, ac præsertim grumosis sanguis excernitur.

3. Hic locus plenior libro Definitionum Medicarum Galeni, vel cuius-
cumque sit auctoris. Hemorrhoids est delatio sanguinis paulatim facta per
dissolutionem. Hemorrhagia abundans est naribus effusio. Notanda haec
Tom. I. f. f.

voces, quod ad hunc locum intelligendum faciant plurimum.

Notae excretionem per inferiora (quam de hemorrhoidali profluio velis) vult intelligi Galenus) laudari, si duæ adsint conditiones. Prior, si sensim fluat, quod mirum, cum opus sit naturale: posterior si excernatur niger, non quod talis sit ex se, sed quod tardè fluendo talem nigrorem acquirat. Quod vel ex Galeno falsum convincere possumus. nam lienis qui hoc fluore iuvantur, nigrum cumulant, ergo excernunt. Verbum vomere, propriè sumitur, sed ὡς τὸ ξυστῆναι, quidam etiam ad excretionem è pulmonibus esse referendum volebant. Galenus autem omnem excretionem è pulmone sanguinis non salutarem esse ait, id est, non curatu facilem, ut interpretari licet, sine sit febris, sine non sit. Si sit febris, omnino malum: si non sit, non paulò post sequitur. Sed cum vomitio est sanguinis sine febre, non mala ita est (ut in hoc agro de quo loquimur hic appareat) nam collectionem tantùm sanguinis, non autem perennem generationem, & prouentum ad excretionem significat: sed cùm febris est, bisferiam mala, & ut signum, & ut causa: ut signum, quia declarat subile inflammationem in partibus internis, quæ talis excretionis causa sit: ut causa, quia dum humores à febre acciuntur, maior excretio sequitur. Nam quaecumque excretiones cum inflammationibus sunt ac febribus, non solum vix curari possunt, sed nec in eadem magnitudine perdurare; Miores enim sunt ac maligniores. Sic locus reponendus qui à Leonice non conuersus. Dictum est quidem ante verbum αὐτοῦ in aphor. 37. lib. 7. non fami pro πύρεσσι, ut quidam voluerunt: quia, ut ait Galenus in comment. in hunc locum. Omnis excretio è pulmonibus sanguinis est ἀναιρετική: men miror quomodo Galenus non legerit aphorismum in Coacis: qui si nullius aphorismo est 37 allegato, ubi Hippocrates vitur verbo πυρεσσι. Huius verba sunt: Sanguinem spucentibus, confert si sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & ut sputum fiat ad dies bis septem tenue: Febrile verò & tussire, ac dolere pertinaciter, & recentem sanguinem semper spueri, malum est.

CONSILIVM XLVIII.

*In quo quaeritur, cur multi valde valetudinarij viuant, alij
integre sani, alij in statu neutro.*

CORPV^s nostrum ægrum est, aut sanum, aut neutrum. *Æ-*
gro corpori ars quaesita est quæ morbos praesentes arceat

ac profliget? Sano, quæ conferuet; Neutri, quæ in alterutrius officio ambigüe verletur. Par enim ratio aliquando videtur & curationis, & conseruationis, aliquando dispar ac dissimilis. Inter eos qui viuunt, quidam integrâ perfectâque valetudine vtuntur: alij lubricâ admodum, & quibus minimis momentis de sanitatis præsidio decedendum est. Tertij aduersa valetudine conflictantur. Ac primis quidem viscera, partésque solidæ, robustæ, integræque sunt, quarum in virtute ac legitima symmetria sanitatis ipsius thesaurus reconditur, ac consistit. Secundis partium natua est infirmitas, vt quæ foris occurrentibus causis morbificis, aut internis in nobis nostrisque visceribus genitis minimè resistent, contrâque facillimè cedant. Tertios autem morbus ferè occupat, quòd inter partes quarum potentiâ corpus sustinetur ac administratur, vna sit aut altera quæ in vitio sit, vt cum aut proprio pulmonis vitio phthisici decumbūt, aut cum catharrhosi ob innatum cerebro vitium, aut alia atque alia ratione afficiuntur. Inter morbosos quidam ita sunt affecti, vt peculiari vitio partis principis, aut cerebri, aut hepatis, aut ventriculi, aut lienis, aut mesenterij (latius enim patet nomen Principis partis, quàm à quoquam veterum dictum sit) facilè in morbum etiam grauem incidant; alij in febres facilè, quod notandum. Vitio partis quidem, vt cum obstructionibus obnoxius lien est, aut cum primæ venæ facilè impediuntur, vt de melancholicis hypochondriacis patet, statim & veluti in procinctu morbus adest tracto in sympathiam ventriculo. Et cur non præcipuè cuiusdam partis mesenterium ipsum, per se quidem abiectum & vile, si præsertim conferatur cum aliis partibus, quarum nobiliora præstantiorâque sunt munia, cum impedito obstructoque mesaræo, tam citò occurrant morbi? Ita enim quibus primæ venæ cremori ventriculi excipiendo destinatæ obstruantur, vomituriunt sæpe, malè coquant, leipothymiisprehenduntur; an non magni est momenti? In singularum partium vitiis exquirendis immorandum non censeo: satis fuit indicasse morbosos valetudinariosque quosdam existere peculiari vitio partis. Alios valetudinarios vocamus, vt qui promptissimè à febribus communibus humanæ naturæ hominibus præhenduntur. Nam siue ludant, siue irascantur, siue paulò liberalius genio indulserint, ecce in insidiis stat febris quæ in eos quamprimùm grassetur atque inuolet. Contrâ verò alios

minimè omnium valetudinarios vocamus, qui febris non ita pateant. Eorum autem qui febribus tanquam communissimo omnium morbo utpote in omnem ætatem omnèque tempus incidente corripuntur, alij facile eo morbo defunguntur, alij non. Sed cum sæpè in febrem incident, leduntur tandem plurimum; nam & calor febrilis varias in corpus mutationes inuehit, & morbus tam sæpe recurrens cum actionum læsione non potest non partes offendere, penuriâ alimenti, & officij intermissione.

Quæ causa autem sit cur aliqui in febrem non incident, aut raro, aut in eam perbreuem, cum tamen inter morbos febris omnium facillimè occurrat, breuiter strictimque apertendum. Ex generibus febrium, quædam putredinem agnoscunt parentem, unde putres febres; quædam simplicem intemperiem. Illis continentur Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ. His synochi imputres, hæcticæ, diariæ. His aut illis obnoxia sunt corpora, aut non. Natis quidem ab intemperie squalida, hirsutaque, & biliosa corpora obuia sunt. Putribus autem ea quæ obstructionibus plena sunt, calida humida, præsertim si perspiratione careant, aut aëre frigido degant. Obstructionibus autem peruia corpora sunt, aut conformationis vitio, ut cum coacta angustaque sunt vasa, & viæ mesaræ (mesenterium enim maximè fons, seminarium, & scaturigo putridarum febrium & morborum à putredine à nobis constitui solet) aut diætæ vitio. Quæ itaque in neutro peccant, id est nec immoderato victu cultaque vitam degunt, nec à natura ipsa obstructionis facilitatem ac procliuatatem hauserunt, non ita facile à putridis febribus impetuntur ac occupantur. Contra autem quæ contrario modo affecta cernuntur. Itaque mirum non est si ex mortalibus quidam quadragies febribus putridis corripiantur, alij ne semel quidem, tametsi ex iis quidam satis pituitoso corpore sint, quidam verò non ita pituitoso: immò sunt qui nisi quotannis ter quaterve repurgentur, putridis febribus corripiantur; alij, nec purgantur, nec corripuntur tamen: immò quadraginta annos penè sani exigunt. Reperti sunt quibus contra normam & naturam febrium putridarum decimoquinto die contingeret. Quod annotauit Rhases Antipater Sidonius Poëta apud Plinium, singulis annis vno die tantum natali nimirum febris corripiebatur. Dominus de Masseparault supplicum libellorum in Regia Magister mihi affirmavit magna cum celebrium Medico-

rum admiratione, certo quodam die singulis annis graui-
se laborare ac si hecticâ febre præhenderetur. Et ego ipse
dum hæc scribo, commentor quæ illius quod nobis quotan-
nis accidit facile ac lubenter meminero. Quater in anno in
magnis quatuor temporum anni mutationibus febriculâ tã-
quam diariâ prehendor, cum totius corporis grauitate, inap-
petentia maxima. Videmus qui nunquam se febre manifesta
prehenso assueverunt: Alii nisi quater in anno repurgentur
minima occasione in febrem præcipientes ruunt: siue quod
propter consuetudinem purgationis id contingat, seu potius
ob intemperantem victus rationem. Scribit enim Galenus
melius esse multò si de cibis detrahant, si sese exerceant: non
enim ratione consuetudinis contingit ut illis euacuatio pro-
fit: sed quoniam ex deprauato victu multos humores crudos
ac prauos collegere.

Lib. de
confe-
tibus

Quæ hætenus dicta sunt in eum maximè finem spectant ut
paretur muniaturque via ad historiam cuiusdam Nobilis Lu-
uenis qui in grauissimum morbum incidit, cum nunquam la-
borauisset. Ecce dum in suis muniis, solitoque versatur offi-
cio, febre præhenditur: primo quoque tempore vires labun-
tur, vrina supprimitur, fandi impotens ferè redditur, tanquã
stipes inanis in nullam partem versatilis iacet: denique hîc
potius de sepulchro quàm de remedio cogitatur. Idem filio
Præsidis Boherij contigit: nam vndeicesimo ætatis anno in
febrem incidit, primùm languidam ac sepultam. Nihil ex-
crementi redditur. Nonnisi post 24 horas vrinam faciebat:
animo facile deficiebat: ne minimum quidem sudorem ferre
poterat, tamen vehementes purgationes satis alacriter tulit.
Febris sine typo, postea tertianam referebat. Primis diebus
sine perfrigeratione, sequentibus aliquando: rigor prehen-
dit, facies non concidebat. Alius nonnisi sollicitata redde-
bat. Quærat aliquis, quâ fieri possit ut qui olim tandiũ in-
tegrâ sanitate fruitus est, nunc in morbum lapsus tam graui-
ter laboret? Cur primæ vires hætenus morbo non afflicte non
apparent? Qui diuturnis morbis sunt afflicti ac impliciti, si
fortè recidunt sæpè etiamnum novos morbos experiantur ac
sustinent, cur non alacrius ferant ii qui nihil de viribus ami-
serunt, qui semel morbo tentati sunt? Alia longè ratio est:
nam qui in morbum relabuntur ac recidunt, non longè qui

Ef. iij.

230 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dem à priore morbo absunt; & ii fractis iam viribus impe-
tuntur; quo fit vt ferendo non sint, sed aut grauitè agrotent,
aut ferè moriantur. Sed qui sæpe morbis implicantur, ii ferè
robustiores existunt tanquam in ea re exercitati, & leui de
causa in morbum incidentes. Contra qui toto ætatis suæ
cursu aut nunquam, aut semel, bisve agrotauerunt, idque
leuiter, grauissimè maximam partem laborent, tum propter
inexperientiam & insolentiam morbi, vt sic dicam. Nam qui
labores ferre consueuerunt, etsi imbecilli, aut senes, iis qui
non consueuerint, vel etiam si iuuenes fuerint, multò sunt ro-
bustiores. Item quia cùm diutissimè integrâ sanitate freti sint
siue ob partium integritatem, siue ob laudabilem tempera-
tamque vitæ rationem, siue ob vtrumque, de suæ sanitatis
gradu non nisi magna de causa deciderint. Oportuit enim
causam validam esse quæ corpus hoc tam sanum de primo
statu deiecerit ac depulerit: Siue quia idem contigerit quod
habitu athletico euenire solet. Corpus enim quantumuis in-
colume ac sanum, tandem ad summum bonitatis prouehitur
vt necesse sit illud in deterius decidere. Vnde narrant quidam
scriptum esse ab Hippocrate (sed locum non legi vnquam)
quosdam ætatis annum summa cum sanitate exigere & attrin-
gere; sed propter quasdam quæ in ætatibus contingere solent
mutationes, eos ferè mori. Quod si scriptum est ab Hippo-
crate, notandum maximè, & illud quidem experientia ob-
seruatur.

Sed ad institutum redeundum est. Qui diu sani fuerunt
quatenus tandiu integrâ freti sunt sanitate, satis indicant fir-
mitatem ac robur partium, accedente probâ diætâ, quæ etiâ
corruptam naturam conseruare & instaurare potest. Quan-
quam accidit nonnullos intemperanter, omnique cum luxu
vivere; tamen sanos ætatem suam degere. Ac si tantò
firmiores stabilioreque partes redderentur, quantò depra-
uior deteriorque vitæ ratio existat. Vt contrâ, plerique cū
moderato victu cultūque suos annos exigant in summa im-
becillitate versantur, immò si eorum sanitati conseruanda
quidam Asclepiades præficiatur. Quod cur contingat, huius
quidem loci est ac instituti, sed non huius temporis cum ple-
niore in ea re temporis vsura vti debeamus. Nunc autem vno
verbo explicemus, cur qui diu sani sunt, semel in morbum

lapsedam grauer laborant, immò vitâ periclitentur, id præ-
 terrationes paulò superiùs adductas non alia ex occasione
 nasci videtur, quàm quia temporis diuturnitate per conge-
 stionem quandam in corpore accumulantur humores qui
 non statim putrescunt, nec proteruiunt, sed leui de causa ir-
 ritati & moti ferocunt ac turgent. Atque cùm copia
 multi sint, natura aggrauatur, & cùm eiusmodi motum ac
 putredinem nunquam senserit, illius rei insolens, pugnam
 detredat, ac succumbit. Hinc morbi sæuities, præsertim ob
 magnam virium iacturam.

Illud abundè aperuit historia illius iuuenis, cuius nomine
 suscepta est hæc disputatio: qui cùm nunquam, aut leuiter
 admodum laborauisset, oborto morbo non ita vehementi
 concidit quasi fractus & consternatus. In totum naturales
 euacuaciones substituerunt. Et cùm inter ceteras vrina tres iã
 dies fuisset suppressa, frustrâ curatus est tanquam ischuriã.
 Tamen vt sæpe multa ab imperitis temerè & contra artis
 præcepta fiunt, quorum non est omninò sinister euentus: ita
 in hoc ægro temerarium factum prospero euentu sese auspi-
 catò prodidit. Datus est illi potus ex terebinthina destillata,
 syrupo de althea, succo limonum: eodem die vrina largè pro-
 fluxit. Paulò post aliquantùm releuata natura, sed postea cõ-
 cidit. Itaque remedia quæ naturâ fatifcente præscripta fue-
 rint, & quæ eadem paulùm erectâ hîc adscribemus.

℞. Mithridat. opt. ℥ j. conseru. buglos. viol. an. ℥ ss. fiat empla-
 strum pro corde.

℞. rasura ebor. ℥ j. unicorn. gr. 4. cornu cerui ℥ j. syrup. granat. ℥ ss.
 aquæ cardue ℥ ij. s. fiat potus.

℞. olei rosati ℥ ij. aceti ℥ ij. pro ventre. Erat æstus ingens.

℞. destill. restaur. lib. j. syrup. viol. & de limon. an. ℥ ij. s. passetur
 cum ℥ j cinam. viatur sæpe.

℞. rasur. cornu cerui ℥ ss. sacchar. rosa. tabul. quod sufficit. fiat puluis
 viendus sæpe.

℞. syrup. granat. oxysacca. an. ℥ ss. aquæ card. & scab. an. ℥ ij. s.
 mithridat. confect. abxermes an. ℥ j. rasur. cornu cerui ℥ j. fiat potus pro
 duabus dosibus.

Iniectus clyster blandus.

℞. rasur. ebor. cornu cerui, margar. elect. unicorn. an. gr. vj. syrup. de
 nymph. ℥ vj. destillat. restaur. ℥ ij. B. fiat potus.

Item ℥. aqu. card. lib. j. ad vsum.

℥. syrup. de cichor. compos. sine rhabarb. oxyf. simpl. an. ℥. j. s. cum decoct. gramin. passul. glycyrr. fiat iulep.

Item fiat iulep ex syrupo de granatis & de limonibus.

℥. mithridat. ℥. ij. theriacis ℥. j. conseru. rosar. buglos. viol. borag. an. ℥. ij. decoct. vnius capi alterati cum buglos. borag. lib. iiij. carnem vnius capi, aqu. card. ℥. iiij. fiat destillat. in balneo Mariae. Utatur addendo syrupi violati sextam partem.

Item repurgatus rhabarbaro infuso in destillato restauratio. Bis, terve repurgatus, recreata natura.

Primis diebus pro desperato relictus est. Et in hanc historiam attentos nos esse oportet, vt discamus non temerè negligendos relinquendosque morbos qui primò quidem obtutu tanquam inmedicabiles sese nobis offerunt: Nec præterea de morbis præcipitanter esse pronunciandum. Suspendi enim oportet iudicium in prognosi præstituenda, nisi certò constet: præferim cum hoc tempore propter ingluuiem morbi pullulent, veteribus nunquam cogniti, & contra quàm facitatum sit à veteribus, nulla dierum criticorum habita ratione subinde ac identidem, variis remediis ægros oneremus, vt omne naturæ studium ac ordo peruertatur ac pereat: & magna cum nominis sui calumnia multi etiam ex primariis Medicis, aut eos morituros, falsò præferunt ac prædixerunt, qui non tamen non ita longè post à malè lata sententia tanquam prouocarent, superfuerunt, & contra multos victuros pronuntiarunt, quos non ita longè post mors secuta est.

ANNOTATIONES.

1. Caput hoc scriptum est vt queratur ratio cur multi valde valetudinarij viuunt, alij integrè sani, alij in statu neutro. Et quibusdam præsto semper sunt Medici & remedia, & tamen non valent. Aliis contra, & integrè viuunt. Item cur multis quinquagies scēta est vena, profluvia aut, & alie excretionēs contigerunt, alijs nil tale, cum etiam non integrè sanitate fruuntur. Tandem ij qui obstinato animo licet ægri noluerunt sibi venam aperiri, què diu viuant. Quomodo detractio multa sanguinis in multis aut non detrimentum attulit, aut quibus nulla facta est periculum non contigit.

2. Huius rei demonstrationem petes accuratam ex cap. 4. lib. 2. de prælag.

presag. ex puls. ubi Galenus de comparatione intermissionis pulsus in iu-
uenibus, aut in senibus & pueris agit.

3. Locum illum tandem legi lib. 1. de Dieta, dum loquitur de iis qui in
optimo habitu sani diu viuunt. Qui autem morbi à quadragesimo anno
a morbo aliquo correpti fuerint, nunquam ferè euadunt. Sed quoniam
ille locus obscure ab Hippocrate scriptus est, idèd longiore & tempore &
otio maiore indiget, horum explicationem in alium locum reicientes, no-
dum qualiscunque sit dissoluemus.

4. Celsus forte huius rei causam explicauit. Dum enim cauet ne ni-
mùm assuescamus uti medicamentis, ita scribit: Purgationes ut in-
terdum sunt necessariae, ita frequentes periculum afferunt. As-
suecit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cùm om-
nibus morbis obnoxia sit maximè infirmitas. cap. 3. lib. 1.

5. Notandum hoc symptoma nam aliàs ut symptoma curari de-
bet, aliàs ut morbus. summum verò adhibeat iudicium Medicus, an in fe-
bre urina supprimatur per se, an per accidens; quoniam falsò recurrunt
quidam ad calculum, aut ad alias causas falsas: & oportet diligenter in-
cumbere in coctionem humoris, & exclusionem & naturæ vim excitare,
& non frustra catheterem immittere metu maioris mali; id enim accidit
cùm totum corpus crudioribus humoribus refertum est. Confluit autem ex
ipso acernata multitudo in vesicam, quæ amplius distenta & dolitans, ad
actiones suas inefficax fit, & periculum suppressæ urinae inducit.

CONSILIVM XLIX.

De capitis vulnere.

NUPER in ludoliterario puelli colludebant, alius perâ, alius
calmario, & ut quisque hac aut illa re erat instructus, ita
tanquam idoneo instrumento utebatur. Fortè in perâ fundo
gladius acutissimus latebat, cuius mucro pertuderat fundum. Is
sensem ob acutiem fugiebat. Peram capiti appressit iocò, hinc
vulnus incisa-cute inflitum. Sinuosum erat, adacta cuspide acu-
tissima funditus & punctum os læsum. Neglectum id quicquid
fuit ob vulneris exiguitatem. Malè tum, quoniam nil negligen-
dum in fauciato vulneratoque capite: & quo magis sensum fu-
git, eò maiori curæ esse debet. Dilatatâ plagâ apparuit os læsum
esse, sed an vtraque tabula perforata esset, an media diploe ictus

Tmo. 1.

Gg

restitisset, controuertebatur. Si illud esset, necessario modiolum adhiberi debere conficiebamus. Si hoc, id est, alteri tantum tabulae adactus esset mucro, à terebra temperandum erat. Hoc perplexum obscurumque fuit admodum: Nam temerè ad terebram accedere periculi plenum erat, ita rebus non bene subductis, eam pratermittere, & vituperationis, & periculum afferebat. Vnum tanquam vniuocum signum parebat, nempe systole ac diastole, & nutatio seu inundatio quædã quæ ictus inflicus erat, vt propterea tactam esse pertusamque vtramque tabulam coniiceretur, ac sic modiolum vsu-venire. Sed hac inundatione deceptos sese esse, delusosque Chirurghi afferebant, quod hanc nutationem sæpe præse ferant arteriæ exiguæ quæ diploen perreptant. Itaque cum dubitaretur quò pertineret ille motus & agitatio, an ad cerebrum vi ictus detectum, an ad arteriolas in diploe intertextas, anceps magis ac dubium consilium ac ratio existerat. Vt in vtramque partem paria æqualiaque rationum momenta starent. Si noxa vtrique tabulæ illata foret, aiunt, sese id signis quibusdam detexisset. At nil planè ante 14 diem apparuit. Et illud quantulum fuit, procatartica cuidam causæ assignabatur. Si læsum os vtrumque, stillasset sanguis. A fillicidio aliquid incommodi cerebro accidisset. Præterea vomitiones nullæ contigerant, stupor nullus, nilque ex iis quæ læsâ vtrâque tabulâ euenire solent, & ad terebram idèò consilium conuertunt ac dirigunt. Nos contrà coniectas has petitiones eludebamus. Vomitiones, & id genus alia quæ vtriusque tabulæ lesionem, ac piæ memingis offensam significant, non in punctum factis vulneribus ita apparent, vt in aliis tromaton differentiis, vt cum concussio facta est, aut magna plaga illata, aut lapsus fuit, aut cum effractio est cranij. Accedit quod simulæ angustia in cæsum facto vulnere, præsertim tam acuto gladiolo, impediatur quominus in memingem stillet sanguis; aut si quid tale contigerit, pigro gressu id fit, & adeò exigua quantitate, vt nil, aut parum inde argumenti capi desumique possit.

Rebus ita agitatæ, ac dubiis ob obscuritatem, & multa rationum inuolucra relictis, tandem fortunâ ac casu sæpè ad benè medendum, & fœliciter scopum contingendum, nonnihil faciente, ad modiolum concursus est. Læsum os detractum. Incredibile hoc fuit, & cuius gratiâ hunc commentariolum de illo ictu conscripsimus de industria, nulla apparens erat diploe: os

cranij vnum erat, vna tantum tabula, quod terebranti multum attulit metus ac suspicionis, ne quicquam peccaret. Ita enim trepanum ^{ἀβάνιον} adhibent, supra cuius mucronem circulus quidam parum latus extans circumcurrit. Prohibet enim ne dum terebra agitur, altius descendat, & subiectas partes violet. Ita enim ipsius terebrae circumactus, & appressio facilius fertur. Et cum iam totum os perforatum erat, opinione diploes ductus, rursum apprimebat terebram, cum cerebri substantia occurrit.

Atque propterea frustra ad arteriolas percurrentes diploen motus pulsatorius ille de quo mentio facta est, relatus fuit. Itaque nisi rationibus satis quidem firmis, fortuna, & cepti fiducia praecurrisset, magnum saucio puello periculum creatum fuisset. Rationes quidem quibus contra nitebantur ne temere modiolus adhiberetur, verae ac probabiles erant, sed earum falsitatem solus euentus detexit. Quis enim credidisset naturam in plurimis sapientem ita in illo puello sui oblitam adeo, ut os, quod diploc in omnibus fere diuisum distinctumque miro artificio, ac profectu incredibili vnum constitueret?

Haec dicta volumus, ut intelligant qui artem Medicam, Chirurgiam ei administram subaudio, exercent, multa saepe fortuito experiunda esse contra quam ratio ipsa nobis dictare soleat. Etsi enim magna consilij iudiciiue vis est, apprimere ad feliciter medendum conferens, & ad gloriam consequendam plurimum compendij afferens: tamen experientia quaedam, fortunae quaedam caeca ac bruta aliquando pluris faciunda. Saepe enim axiomaton nostrorum praetextus speciosus, ac mordicus facta obseruatio, in praecipitia quaedam pericula aegros magno damno coniecit. Cuius rei fidem facit praesens illati vulneris historia. Si enim praeualuissent rationes nostrae magno artificio consistere cuidam ausui temerario, laudando tamen, syderationis periculum, ac deinde interitus creauissent.

1572.

Gg ij

CONSILIVM L.

De lactis asinini præstantia & dotibus.

CIBVS in egris loco & tempore non præscriptus variis incommodis corpus afficit. Quemadmodum enim dum valemus robur addit, virésque conseruat: ita dum de sanitatis præsidio atque statione deiecti sumus, idem cibus vires labefacit atque frangit. Ita enim memoriæ prodidit diuus Hippocrates. Quo fit vt natura quædam excogitauerit quæ in medicamentorum & alimentorum genere ambigerent. Hæc alimentum medicamentosa appellari solent. In horum genere est lac asinum, quod tabidis conferre dicetur. Sed hanc cautionem adhibere necessum est. Nam si magna subsit putredo, aut febris adsit, impunè dari non potest. Aut enim acorem, aut nidorem contrahiturum est; hinc detrimentum corpori afferetur. Labet tamen nonnulla hinc attexere, vt temerè lacte non interdicatur, egrique iis commodis quæ inde apportari possunt, priuentur.

Aliud est loqui de lacte simpliciter, aliud de lacte asinino. Nam cum in Aphor. cauet Hippocrates ne quid in vtendo lacte peccetur, hoc vult ne febrientibus lac offeratur, nec tabidis valdè multum febrientibus (quanquam Galenus in commendationem [valdè] supposititiam esse scribit) nec capite dolentibus, de lacte in genere loquitur. Sed cum in generibus lactis magna sit latitudo, indistinctè non est accipienda Hippocratis sententia. Audiatur primùm Galenus libro de alimentis 3. de lacte in genere loquutus: Lac omne, ait, vtile est thoraci, capiti autem nisi quis illud habeat firmum, nocet: vt neque hypochondriis quæ leui de causa inflammantur. Nam plurimis in ventriculo in flatum vertitur. Si autem cum alio coquatur quod crassius succi est, deponit flatum, sed iecur obstruit. Lac autem optimum censeri debet & boni succi, & multi alimenti, quod contrariis & substantiis & facultatibus constat subducendi & sistendi, obstruendi ac tenuandi.

Nec illud omitti debet, omne lac facilè alterari, immo, quod notandum, in sanis etiam dum coquitur, probos humores generaturum, & caput ferit, & hypochondria attollit (ait Galenus.)

Quod si in sanis fit, multò magis in agris alteratio continget. Alteratio autem in vtrunque apparet, & in nidorem, & acorem. Tamen duo loci planè contrarij occurrunt apud Galenum 4. de simpl. medicam. fac. Priore ait, *Lac tamen si gustu dulce est, ex se tamen nunquam amarum efficitur; nam in eo euincitur à frigiditate caliditas, ac proinde repositum acescit.* Paulò post tamen amarorem lacti contingere asseuerat. Ne quis putet nomen *re m p e* Galenum velle vsurpare tanquam cum *re d e i* confundatur, intelligit amarorem illum cum nidore coniungere, qui nidor à calido est. Verba Galeni hæc sunt: *Lac ubi cruditatem in ventre patitur, in frigidiori acescit, in calidiori amarum nidorosumque efficitur.* Itaque amarorem lacti contingere posse asserit. Nisi forte dicamus istam periodon ita explicari posse: Lac ex se nunquam amarum efficitur, ait Galenus, hoc debet intelligi per comparationem cum melle; illa enim mens est Galeni. Nam mel per se *Vide eam de ro ess lib. 2. A- cur. mul- ta scripta* amarum efficitur, id est à suo calore per diuturnitatem temporis. Quia enim in eo summa est dulcitus, huic cum nil addi possit, necesse est vt calore in aliam qualitatem desciscat. Lac autem ex se non ita amarum efficitur, quia non ita dulce vt mel est: immò ait Galenus eò loci, Si lac gustaretur vbi in ventre est, & per venas eò eum, ipso melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex se mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Immò, ait, cum admodum ingens calor est, tantam lac acquirit dulcedinem, quantam mel amittit. Quod si verum est, nec lac dulce est, alioqui calore mutaretur. Nec verum erit quod ait Galenus, in aphor. 64. lib. 5. Aphor. Lac omne facile alterari, aut in acorem verti cum pauco calori applicatur, aut in fumum: nidoremque si plus calori addatur. Et hæc magni momèti sunt. Quia ex illo loco ex comm. in Aphorism. abduci possumus à prescriptione lactis, vbi intemperies aliqua est, vt apparet in iis quibus vulgò lac præscribimus. Ex alio verò loco facile adduci possumus ad lactis vsum; quia, cum, ait Galenus, calor etiam ingens est, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam mel amittit. Itaque nec tam religiosos esse oportet in lacte præscribendo, nec in eodem interdicens difficiles. Nam est vbi reuera facile alteretur, vt si insigne incendium est vbi non item, vt si febris magna non fuerit. Si tamen Hippocrati assentiendum, magna cautio est adhibenda. Nam & sitientibus negat exhibendum, & quibus biliose sunt deiectiones: quod vtrumque impedimento

238 CONSILIORVM MEDICINALIVM

essenon debere verisimile est: in textu latino legitur: *Malum autem & lac, & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones.* Hæc lectio aliena est à mente Hippocratis. Legendus locus per distinctionem, vt legendum censet Galenus: in eo sensu: *Malum lac in acutis febribus, & quibus biliosæ sunt deiectiones, vt omni illi corpori interdici debere lactis vsu doceat, in quo calor prætermodum insit.* Quòd si accuratiùs capiatur, non est dubium quin multis lac asinæ propinetur, quibus nec iure, nec loco, nec temporì concedatur. Quocirca cùm Hippocrates quibus interdici lacte debeat, explicauit (multos autem adducit quibus à lacte temperandum consulit) adiungit, *si nihil quæ dicta sunt affuerit,* quod Galenus ab aphoristica disciplina alienū esse comminiscitur, & veluti per pleonasmum additum. Acutè tamen postea huiusmodi superflue repetitionis rationem reddit Hippocrates (ait Galenus) bis terve eadem reperere non veretur, si magnum aliquod periculum imminet, cùm quod dicitur, veretur ne negligentius audiatur. Ac si dicat Hippocrates, *Magnæ sunt lactis opportunitates,* nil est in rerum natura æquè præstans ac lac ipsum, ita nil æquè facillè corrumpitur, si quibus propinari nō debet, exhibeatur. Inter enim euchyma habetur, id est, inter ea quæ optimum sanguinem generant: sed si in sanis, vt ait Galenus, tam facillè malam qualitatem acquirit, quid de ægris iudicandum?

Tamen vt non exactè omnia estimari debent, ne fortè simus nimis religiosi, vt Hippocrates in sua ptissana explicanda accuratus admodum est: ita in lacte. Quod vtrumque cùm inter excellentia primas teneat, ita non nisi appositè dari debent. Et subiciuntur tanquam exempla rerum ceterarum. Si lac & cremor ptissanæ, quæ præstantissima sunt edulia iure & loco non exhibita, tantis afficiunt incommodis, quid debet expectari ab iis quæ & commoditate & præstantiâ sunt inferiora? Non est itaque quòd timidi simus in vsu lactis Hippocratis territi doctrinâ. Sepe enim præceptionum ac theorematon artis nostræ nimis religiosa observatio magnis nos afficit incommodis, quod multa audere & tentare sit religio, quæ alioqui essent profutura. In quo sæpe circumforaneis, & humanæ vitæ periculatoribus victoriæ palma decidatur, nobis verò eripitur.

Lac quoduis vsurpare non confert, sed ad id deueniendum quod commendat Galenus, quod nimirum contrariis substantiis

tiis & facultatibus constat, subducendi scilicet ac sistendi, obstruendi ac tenuandi. Optimum autem lac asininum eas facultates habere dicendum. Et obseruavi, quod affirmare aulin, in fluoribus pessimis alui asininum lac præscribi, repressâ humorum malignitate, lactis bonitate, alius magno commodo substituit. Aliis quibus alius astricta, leue profluuium vsu lactis contigit, & profuit. Nec terreri initio debet si obsit, non proficit: nam perseuerandum experientia docet. Fit enim (vt quidam ex veteribus annotauit) vt assiduitate tandem lac suâ bonitate temperet, ac refrenet cacoethiam & prauitatem humorum in corpore turgentium. Itaque Galenus 3. de alimentis ait, *Lac asina raro in ventriculo cogitur: quod si sal & mel addatur, non fieri potest ut ipsum in ventriculo coaguletur.* Si Galenus committit in aphor. illud *Lac dare.* multis serum lactis sale & melle conditum exhibuit, quibus distenta essent hypochondria (eos autem à lacte arcebat Hippocrates) cur lac asininum proximè ad serum accedens, & præterea facultate alendi præditum non præscribetur? Nam & sistendi parte caseosâ, & butyrosâ, serosâque laxandi vim habet. Sic nec lactis vsus reiiciendus, nec iis temerè assentiendum, qui quibusque in affectibus, & quouis tempore lac exhibendum putant.

ANNOTATIONES.

1. Hoc ex loco scire oportet etiam in dysentericis fluxionibus prauis non esse alienum, contra Hippocratis præceptum, lac dare. Et si enim concreuerit, tamen diuturnitate vincetur, & domabitur corruptio humorum. Et id ex præscripto Hippocratis fieri potest. Quamquam eos in quibus deiectiones sunt biliosæ, vetat lac dari. Et experientiâ comperit quosdam quibus dysenterica & mesenterica erant deiectiones diu fatigantes non alienâ arte cessauisse, quàm diuturno lactis vsu. Et Hippocrates lib. 2. de morbis mulierum, in fluore muliebri bilioso lac commendat, quia (ait) fluxus à lacte obundatur. Quod idem de deiectionibus dici potest. Filio Erotolai 7. Epid. circa initium libri, lac per os dat in vehementi dysenteria.
2. Celsus cap. 22. lib. 3. in phthisi sicut in omnibus longis, difficilibusque febribus, lac dare commodum est.

CONSILIVM LI.

In quo explicatio continetur Aphorismi illius libri 6. Aphorism.
 Qui gibbi ex asthmate fiunt, ante pubertatem
 moriuntur.

PLERAQUE apud Hippocratem præclare & exquisitè scripta sunt, quæ tamen in parvis ducuntur, aut quoddam depravata in multis codicibus non intelligantur, aut potius quoddam non sint eorum stomachi, qui peruiis vulgarisque nescio quibus theorematibus contenti magnū se pretiū operæ fecisse credūt, si aliquid in pròptu habeāt quod promere aut potius effutire possint. Ut autē ingenuè fatear, cum in omnibus ferè Hippocratis libris magna sit verborum obscuritas, ad eam tanquam auctarij vice accedit multorum depravatio, quæ multorum studia & legendi, aucupandique desiderium restringat. Quæ autem obscuritate solā implicitā sese nobis offerunt, vt in animos multorum sensim veluti influunt, & sui desiderium iniiciunt: ita quæ corrupta nausæ etiā appetentissimis hominibus pariunt. Nisi forte aliqui sint quos cum laboris non pigeat, multa aspera ausint peruadere, multas rerum difficultates deuorare. Horum imprimis laudandum studium, laudandi & conatus. Simile aliquid in plerisque cum aggressi simus, in quibus operam non detrectamus, tum in vno aphorismo Hippocratis eandem operam est iorem, vehementiusque multò studium ponere institutum esse. Ille tametsi primo quasi obtutu parum adiumenti intellexit, aut voluptatis acutè euolutus asferre videatur. Tamen si cui rem penitiùs paulò inspicere collubitu sit, nec legere pigeat, nec in hoc laborasse poeniteat. In euoluendis enim illis obicuri non minùs sæpe cuiusdam genij quàm ingenij vis apparere solet. Sed ne extra cancellos excurrat oratio, ad rem institutam accedendum est, cuius explicationem lectoribus voluptatis simul ac utilitatis plurimùm allaturam confidimus.

Aphorismus Hippocratis hic est: *Qui gibbi ex asthmate fiunt, aut tussi, ante pubertatem moriuntur.* Textus hic Leonicensi. Græcus Basil. habet: *ὁ ἀσθματικός ὁ γίββος ὁ τισσὶν ἀπὸ τῆς ἀσθμῆς ἀποθνήσκει, ἀνὰ τὴν ἰουῖν.* Verba græca latinis non quadrant, cum aliud sit dicere, moriuntur.

aiuntur, simpliciter; aliud, moriuntur ante pubertatē. Hic enim in textu Leonici ordo immutatus, immutataque periodi videtur. Scrupulus autem qui hic nobis iniicitur, quique commentandi occasionem porrexit, est is; cum dicat Hippocrates, *Qui gibbi ex asthma te aut tussi fiunt*, an asthma contorsionis spinæ causa esse possit, item & tussis, & quomodo fiat. Quis enim vñquā scripsit à tussi & asthma te gibberū cōtingere? eūque funestū cū gibber illorū causa esse vulgo perspiciatur? Nec enim valere potest quod obiciat quis ob asthma & tussendi assiduitatem vitari posse spinam, vt quibusdam rectis, tamen malè gradientibus pedum figuram labefactari contingit, vñde claudi vatiūque fiunt. item decubitus forma spinam inflectere potest, ait Hippocrates lib. 3. de articulis, his verbis: quibusdam figuræ, *τὴν φυμα* vocantur, in quas qui cubare consuevit, ad hoc conducunt, id est ad hoc vel illo modo inflectendam spinam. Qui locus aduersum nos faceret, nisi Hippocrates in textu adiecisset, figuræ cum morbo, id est cum phymatis, & tuberculis. Sic nec figura, nec tussendi conatus, nec *ἡ φυμα* quicquam ex sese ad conuersionem spinæ confert.

Sed sit ita, videamus si contextus Leonici Hippocrati quadret, an facti gibbi ex asthma te ante pubertatem moriantur. Dum gibbos ex asthma te dicimus, procatarcticas gibbositatis causas cum Galeno excludimus. Secundò, num credibilius ex gibbositate & anhelosos & tussiculosos reddi, quam tussim & asthma gibbero occasionē porrexisse. Rationi enim fauet magis vt gibbositas tussim asthma que inuehat, quàm contrà. Tertiò, *Com. in aphor. 46.* An tubercula & panī qui gibberum efficiunt, asthma & tussim prius inferant, quàm gibbum. Quam sententiam secutum fuisse Galenum ostendimus: & in hoc difficultatis cardo vertitur. Sic enim postquam tubercula tussim & asthma generarint primū, tempore gibberum inferunt, & ita auctiore respirandi difficultate perimunt. Nec enim dixit Hippocrates, *Qui gibbi ex tuberculis fiunt*, quod dici debuit: sed qui gibbi ex asthma te, id est, quibus gibbositas auctarij vice contigit ob panos, cum asthma ab iisdem panis in spina obortis præcessisset. Quanquam idem sensus, ac si dixisset: *Qui gibbi ex tuberculis, &c.* nam & spirandi difficultas tuberculorum comes; & si asthma est, suspicio esse debet tubercula adesse. ² In libro de Articulis, non dixit, *ἡ φυμα* *τὴν φυμα* *τὴν φυμα* id est, *ἡ φυμα* *τὴν φυμα* *τὴν φυμα* sed *ἡ φυμα* *τὴν φυμα* *τὴν φυμα*

Tom. I.

Hh

142 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Sent. 6.
lib. 3. de
artic.

Id est, τῶν φυματίων, ut idē Hippocrates pluribus ostendit. Quā rō-
queri potest, an nō cyphosis à casu lapsūque mortem inten-
tet, ut & quā à tuberculis committitur. Hippocrates autem lib.
de articulis 3^o duo distincta capita de cyphosi à phymatis, &
causis externis nata conscripsit. Verborum autem series cō-
semper pertinere videtur, ut aphorismus hic de ea tantū cy-
phosi intelligatur quam internæ causæ induxerunt. Ideoque
Hippocrates non absolutē scripsit, Qui gibbi ante pubertatem
fiunt, moriuntur: quanquam in libro de Articulis ita sine adie-
ctione scripsit, *Quibus, dum adhuc pueri sunt, priusquam corpus ado-*
lescentis spina in gibberum incuruatur, eā parte spina non nutritur & an-
getur. Sed Galenus alio loco scripsit, illam sententiam, sicut &
alias quæ illi annexæ sunt, de contorsione à causa interna in-
telligi.

Com. in
par. 19.
lib. 3. de
artic.

Atque ut res apertiùs explicentur; textus Basiliensis duobus
in locis deprauatus est: vno, quia particula illa τὸ πρὸ τῆς ἡλικίας non est
referenda ad postremam partem contextus, ad verbum, nimi-
rum ὑπὸ πλάγιον, sed ad priorem, ut legatur, ὁ καὶ οὗτοι γίνονται πρὸ τῆς ἡλικίας
Altero, quod omīssa vox illa τυχέως; quæ ad verbū ἀπὸ πλάγιον adie-
gi debet. Ita Fuchsius in scholiis in illum locum annotauit, non
suo ipsius iudicio, sed Galeni ductus autoritate in cōmentario
in aphorismū predictū. Huius rei fidem facit contextus Galeni,
vui τὸν πρὸ τῆς ἡλικίας καὶ ὡς ἔστιν, ἐπὶ ἀδυναμίαι καὶ βίητι διαφθερούσιν ἐκ τῆς τυχέως
Nam cū hic aphorismus ad prognosin pertineat, nil Hip-
cratis ingenio dignum, nisi dicat gibbos ex asthmate ante pu-
bertatem factos, aut citò, aut tardè mori, & vi asthmatis, & in-
flexionis. Qui enim casu incuruantur, oblationem non integrè
crescente spinā, iis mors celerior est, quā aliter affectis, sed
ob incertitudinem de iis nil quicquam prædixit Hippocrates;
cū fieri possit ut arte restituantur quoad eius fieri potest: nec e-
nim legitimè reponi potest luxata vertebra à casu, lapsūque, ait
Hippocrates, quòd vertebra inter se aptæ sint. γὰρ λυγροὶ δὲ, id est,
cardinatim, ut ait Galenus in commentariis. Itaque omīssa malè
est in textu Hippocratis vox τυχέως, quā circūscribitur tempus
quodammodo quò gibbā factā spinā à tuberculis cum dyl-
pnoea iunctis; extremus fati dies non ita post sequitur. Nec e-
sario enim adiungi debuit, alio qui indefinita absolutāque Hip-
pocratis enunciatio nil habet miri, nil habet digni.

Parti. 19.
lib. 3. de
artic.

Nisi quis fortè dicat Hippocratis laconismum non ferre ut

oratio aphoristica suis compleatur circumstantiis; vt sic dicere liceat. Et tamen Galenus in enarrando paulò copiosior adiecerit, id illi ex more est, vt imminuta deficientiâque perficiat, multâque sæpe clarioris doctrinæ causa subiungat.

Præterea ille textus Galeni, *καὶ δὲ τὰς πρὸ τῆς ἡλικίας κωλύειν τὰς*, declarat aperte vocem hanc, ante puberes annos, referri debere ad verbum *κωλύειν*, aut nomen *κωλύειν*, non autem ad verbum *ἀπόλλυειν*: quod annotatione dignum est, & ad huius rei de qua primo loco quaesitum est, explicationem primùm necessarium. Dicendum itaque, *Qui gibbi ex asthma, aut tussi ante puberes annos fiunt.* Quam lectionem præterquam quod confirmat & ratio, & contextus Galen. in comm. depravatè latinus factus à Leonicensio, vt qui in primis sordibus latere velit, plurimùm roboris ac neruorum afferet alius Hippocrat. contextus libro de art. *ὅτι καὶ τῶν ἰσχυρῶν πνεύματι, καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἀδύνατον ἀσθμῶν.* Quibus, ait, adhuc pueris aut priusquam corpus adoleuerit, spina in gibbum contrahitur, iis corpus ad spinam augeri non solet, &c.

Item in textu commentarii Galeni paulò antè adducti, alia periodus est apprimè faciens ad interpretationem particulari, ex asthma, aut tussi; illud enim quaesitum prius, secundo & tertio locis, an legendum esset, *gibbi ex asthma*: nam si ita fieret lectio, Asthma causa gibberi efficiens videretur, quod rationi non consonat. At probabilius est à tuberculis primùm nasci dyspnoeam & tussim, illæso per se pulmone, deinde gibbam fieri spinam vi panorum seu phymaton. Et illud est quod Hippocrates vocat, *ἡ ἀδύνατος κωλύειν τὰς*. Textus illa est periodus, *καὶ δὲ τὰς πρὸ τῆς ἡλικίας κωλύειν τὰς*. Iam vides formam loquendi immutari; nec enim dixit *κωλύειν τὰς ἀδύνατος*, sed *ὅτι ἀδύνατος*. At dicere idem esse, *ἡ ἀδύνατος*, & *ὅτι ἀδύνατος*, græcam linguam ignorare est: *κωλύειν* enim *ὅτι ἀδύνατος* & *βλάπτει*, est incurvari in asthma & tussi, id est, Cùm iam adest tussis, aut anhelosum quid ob phyma spinæ adnatum succedit gibbositas, non vi tussis (quamquam potest paulum iuuare) sed vi phymaton tussim & difficultatem respirationis præmittentium. Quam sententiam secutum esse Galenum postea demonstrabimus.

Quamquam illud *ὅτι ἀδύνατος*, si referatur ad verbum *βλάπτει*, non autem ad *κωλύειν*, alium habebit planè diuersum sensum, sed Hippocrati non contrarium: *ὅτι ἀδύνατος βλάπτει*, id est, gibbi ante pubertatem facti, intereunt in asthma & tussi, vel ab

244 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 asthma & tussi. Melius autem, in asthma & tussi, id est, facti
 gibbi à tuberculis tussiculosi aut anhelosi moriuntur. Sic vtra-
 que interpretatio fieri potest. At propterea quidam ex veterum
 codicum collatione ita textum Hippocratis restitui debere scri-
 bit, ἐκαστοὶ τῶν πρὸς τὸ ἄσθμα γινόντων, καὶ ἀσθενέστερος ἢ βίητος τοῦ χροῦς ἀπολλύεται. Quod cla-
 rius in sequentibus fiet.

Quoniam autem inter demonstrandum diximus verisimile
 esse à tuberculis gibbositatem fieri, præeunte tamen aliqua dif-
 ficultate spirandi, aut tussi: proptereaque non tam vi aut tussis,
 aut asthmatis, quàm gibbositatis mortem accelerari, horum
 quæ dicta sunt ac postulata, demonstratio est requirere dæmoni-
 um quomodo à tuberculis gibbositas fiat: & an illa so pulmone
 difficultas spirandi adsit. Et cur per distinctionem dictum sit,
 asthma, aut tussis. At multa alia quærentur, quorum explicatio-
 nem plurimum conferre posse confidimus.

Com. in
 aphor. 46
 lib. 6. &
 com. in
 1. art. 2.
 lib. 3. de
 artic.

Spina quatuor modis afficitur, aut vna pars tantum spinæ, aut
 plures continuæ afficiuntur; hinc καὶ φασί. Si plures non continuæ
 afficiuntur, λάρδεσι; si in latus, σκολιῶσι; cum vertebrarum omnium
 tota compages concussa, σπασί, nuncupatur. Omnes autem diffe-
 rentiæ hæ aut à causis internis, aut externis concussu, ictu, la-
 psuque pendent. In internis causis numeratur tuberculum vari-
 as apud Hippocratem & Galenum appellationes sortitum.
 Galeno vocatur ὄγκος, tumor. Hippocrat. φούρι ἀπὸ πύου καὶ σπληνός. Ei-
 dem Galeno absolute κύμα. Et in enarratione in lib. πρὸς ἀνδρ. Εἰ-

4. loc. aff.
 lib. 3. de
 art.
 2. Com.
 in 1. ho.
 4. lib. 6.

ματα μολύβδα, χροῖα, ἀπὸ πύου, σπληνός. Interpretes autem Felicianus male
 τὸ κύμα, panum vertere videtur: cum apud Latinum Interpre-
 tem Celsum panus id sit quod Græcis πύρελος vocatur. Est au-
 tem tumor quidam latus, sed non altus, in quo quiddam pustu-
 la simile est: dolor & distensio vehemens, & maior quàm esse
 debeat pro magnitudine tumoris. Et ita phlegmone quædam
 est ἐξ υγρῶν πύου καὶ σπληνός. Fernellius vocat phlegmonem in adenum locis
 emergentem, maximè in ceruice & inguinibus. fit autem post
 febres, aut alicuius partis dolores. Hippocrates generali nomi-
 ne ἀπὸ σπληνός vocat, καὶ ἀπὸ σπληνός. Si itaque dolorificum sit tuber-
 culum, & sanguineum, φούρι δὲ πύου, Panus, siue panis dici possit; si
 doloris expers, ὄγκος καὶ κύμα. Quanquam si panus tumor non altus,
 sed superficialis, & parum eminentis dicitur, non videtur posse
 difficultatem illam spirandi asserre, quæ à generatione tuber-
 culorum in spina nasci solet. Tamen si diligentius res inspicia-

Apho. 30
 & 31. ii.
 4.

tur, quoniam à tuberculo statim cyphosin nasci non oportet, illud ^{ad m. n. q. d. r. o. s.} occasio & parens, panus dici vertique potest: præsertim verò panus dici, quia citò generatur, & tardè in suppuratum abit; quæ conditiones panò quadrant, & ex consequenti ei tuberculo quod temporis progressu gibbum afferre solet. Nec enim citò à generato tubere inuertitur rhachis. Porro ut res paulò apertius pateat, ^{ad m. d. r. o. s. q. d. r. o. s.} differt, quod citò suppuret & prognaletur paulo tardius, minùsque doloris afferat; phygethion autem agriùs suppuratur, faciliùs nascitur, & dolorificum est: propterea ad obliquandam inuertendamve compagem verticillorum accomodatam magis est.

Itaque ut dictum est, vertebræ luxantur calu, lapsu, phymatenuosa corpora vertebris & spinali medulla insita extendēte. Et mirum, cum Galenus has differentias explicans, tanquam ^{4. de loc. aff. d.} adiceat, horum duo sunt genera; aliud est partium quæ secundum naturam se habent, aliud tumorum quorumdā præternaturam. Qui locus est subobscurus, ac parum intelligibilis, nisi huius ea sit explicatio: Omnino duobus modis spina vitatur, aut cum ipsa secundum naturam est, & à causa externa inficitur. Sic nil apparet viti in spina; aut cum non ita affecta est, sed diligentius insipienti tuberculi generatio in spina apparebit: alioqui illius loci sensum non calleo.

Ponò tuberculum aut superiores verticillos, aut medios, aut inferiores occupat. Si illos, anginosos facit, Galeno interprete. Scribit enim in constitutione pestilenti, quam Hippocrates descripsit eos ^{ad m. d. r. o. s.} vocasse, quibus ad ceruicis spondylos tuberculum aliquod adnatum fuerat, quod tuberculum cum ad suppuratum tenderet, tusticulosos reddebant, cum sua mole ac circumscriptione crudus maneret, spirandi difficultate eos exercebat. Non difficultas autem illa spirandi quicquam pulmonem laborare significabat. Cur autem, dicat quis, non gibbos efficit? mors longè anteuertit, & gibbositas non illi parte continet nisi vnà cum morte repentina. Quo enim tuberculū primis verticulis est propinquius, cōfunctius. Accedit quod posito pari vitio in superioribus vertebris & inferioribus, in superioribus (excipio præsentiam periculi) magis elucescit prohibitione incrementi, quàm infero loco locatis. valet enim illud theore-

^{Corr. in par. 12. l. de arag.}

Hh. iij.

246 CONSILIORVM MEDICINALIVM

minus augetur, eò quòd à superiori parte & exortum & incrementum accipit. Ex textu autem de anginosi elicere oportet quod ad Aphorismi nostri explicationem attinet: nimirum tuberculum superioribus ceruicis vertebris adnatum modò tussiculosos, modò anhelosos magis reddere, prout hoc aut illo modo affectum est phyma.

Si tuberculum medias costas occupat, aliquam ex tribus differentiis contorsionis spinæ producit. quæ omnes ad nervosum genus, non autem ad spinæ ossa propriè pertinent. Nam cum nervus vertebram muniens afficitur à morbo, postea trahitur vertebra, ac contorquetur. Sic Galenus reprehendit veteres qui diligentius verba Hippocratis obseruantes, putarent à tuberculis contorqueri costas, quòd adeò phymata indurescerent, vt ad nutum suum traherent ossa ac contorquerent. At nequit fieri vt tantum duritie phymata acquirant, vt costas grauent. Sic ossa per se non subuertuntur, tametsi proprietas verborum Hippocratis illud indicare videatur, cum *πρὸς δὲ τὴν ἄνω φωνὴν ἔλκεται καὶ γὰρ τὸ πρὸς τὴν ἄνω φωνὴν* dicat. Sed affectio hæc est corporum spondylos colligantium.

Pater itaque tubercula non obsidere pulmonem vt inde asthma fiat: sed phymata ipsa primò, per se, situ, circumscripti-
one, mole, lædunt genus nervosum spinæ, propterea gibbum fit: non autem ab asthma, aut tussi fit; vt verba Hippocratis in aphorismo notasse videntur. Et idem contingit à tuberculo, quod à casu, lapsuque: vt dicat quis aphorismum & de causis internis & externis intelligi posse. Nam quibus à casu læsa spina, quoniam nunquam eo modo se habet, quoprius; vt notat Hippocrates, videtur ob vitium non posse bene nutriri, ac augeri. Sed longè alia ratio est. Nam quibus à casu vitiata spina, ea sui vitii signum edit, & manu, artificioque, si non omninò, at ratione aliquà vitio occurri potest. At non idem iudicium de vitiata spina à tuberculo. nam cum intorta spina est, iam in summo vigore malum est, & latenter, sensimque obliquatur. Præterea cum à casu inuertitur, non est tussis, & tanta difficultas ducendi emittendique spiritus (nisi quâ parte maximè dimouetur pulmo.) At cum tuberculum est præsertim eminens, vt *ὀξείας* potiùs dicatur, quàm *εὐθάλειας* (vt antè diximus) tussis est, cum humidius est phyma, & difficultas spirandi cum durius, vt antè demon-

Com. in
part. 1. 3.
de artic.

Apho. 19
lib. 3 de
artic.

stratum ex historia 2. Epidemior. cum Hippocrates meminit eorum qui anginâ laborarent. Et cum tussis est, & dyspnoea: deinde vi tumoris cyphosis succedit, non est dubium quin vitæ nostræ filum statim præcidatur: quod non contingit in iis speciebus contorsionis spinæ, quas causa externa inuehit. Aut si in aliis contingit à casu, lapsuque, nec tam subito, nec ita manifestè ut cum à tuberculis. Demonstrationem autem affert Galenus loquens de iis qui dicuntur *ἀπομάτως κυσώδεις*. Com. in aph. lib. 6. cap. 6. Thorax non vult, ait, ob vitium cum aliis, id est cum corde & pulmone augeri, propterea angustia sequitur partium respirationi dicatarum.

Itaque mota adductaque in dubium fuit dubitatio, an tubercula illa primùm reddant gibbosos, & cum ante pubertatem hoc contingit, moriuntur ab asthmate & tussi, vel potius in Asthmate & tussi, quod superius docuimus ex Galeno *ὅτι ἀσμάτι* interpretantes: an potius, tubercula in pueris difficultatē pariunt & tussim: mox cyphosis sequitur: inde mors, at propinquius rationi posterius est.

Porro illa tubercula, ut dictum est, occupant mediam costam, aut cervicis spondylos, aut lumborum. Item vel senioribus, id est adultis, quod Hippocrates vocat *ὀνυχώδεις*, vel pueris contingunt. Item alia cruda sunt & dura, alia non item: sed ex se aliquid tenue expirant. Præterea vel sunt *ἐκ πύκνους*, suppurantia, vel non. Atque ut hæc vel illa sunt, ita variis modis afficiunt, aliis signis sese exhibent atque aliis diuersas criseis habent, diuertam prognosin constituunt, ut sigillatim omnia dici pertractarique necessum est.

Si dura ac magna, difficilem quamprimùm afferunt respirationem nullo in pulmone vitio existente; nam tubercula hæc Hippocrat. vocat *φυστήρια* *ἢ μέμολα*: non autem *ἐκ τῶν πνεύμων*, quo modo propria asthmatici fiunt: sed quod eos tuberculo in spina præditos, asthmaticos nuncupet, *τὸ ἀδυσπνέον* generaliter usurpat, Galeno. Si illa tubercula non ita dura, sed citò suppurabilia, tussiculosos reddunt per resudationem, ut antè de anginosi explicatum est: sic & tussis, & asthma, & cyphosis tuberculorum sunt soboles, & *τὸ ἐκ τῶν σπινῶν*. Si dyspneam afferunt, & dura manent, longius vitam protrahunt: si suppurant, moriuntur, ait Galenus in comment. Quod tamen dubio non caret. Nam maius periculum creare videtur difficul-

Com. in aph. lib. 6. cap. 6.

Partic. 14. lib. 3. de art. med.

Partic. 9. lib. de art. med.

Com. in aph. lib. 6. cap. 6.

248 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tas spirandi à duro tuberculo, cui succedit gibbosum, quam
cùm promouetur suppuratum. nam suppurato tollitur sal-
tem difficultas respirationis, duritie autem tuberculi acce-
dente ad cyphosin, augetur: eaque propter quæ suppurant,
& tussim faciunt, & quæ intulerunt gibbum, minùs in peri-
culum præcipitare putanda sunt. Nam & tussis occasio tol-
litur, & cyphoscos fortè, & angustia thoracis. Nisi quis di-
cat pus illud & proximè tabem inferre, & pulmones planè la-
befactare: vnde non euadunt: nam diuturnitate putredo ac-
quiritur, quæ non potest non esse molesta pulmonibus. Quò
fit vt accuratè & acutè scripserit Hippocrates, *Quibus contin-*
git gibbum adultis iam corpore, his manifestè & liquidò gibbositas morbi
præsentis crism, id est solutionem affert. Ac si dicat; Si cyphosis à
tuberculo nascatur, & ij quibus contingit iam grandiores
sint, non perniciofa est cyphosis, sed præsentis morbi solu-
tionem affert, id est, indicat suppuratum factum, & ab eo sur-
perstitem esse ægrum; quo fit vt non amplius periclitetur,
quamquam breuiorem vitam sit habiturus. Hunc locum
apertiores reddemus paulò post.

Si ergo tubercula dura protrahunt vitam; si suppuret, ab-
breuiant: propterea particula *periculosos* fortè non adici debet;
si quidem mortis celeritas non de omnibus intelligi debet,
sed per comparisonem de iis quibus suppuratum contin-
git.

Galenus itaque in Comment. videtur ipsa tubercula etiam
per se, nondum contorta spinâ, pessima asserere: Nam, inquit,
si nondum gibbositate superueniente ob solos tumores diffi-
cilis respiratio est, quid eueniet cùm tumores tempore erunt
auctiores: Et quid cùm thorax angustior? Ac si dicat; Tuber-
cula per se ac primò dyspnoeam afferunt, licet nulla contor-
sio; si dura ac magna, grauiorem: si humida, suppuratum &
tussim, & ideo malè de ægris merentur. Secundò gibbosita-
tem afferunt, quæ cùm contingit, peius cùm ægris agitur: &
id propriè est ex asthmate & tussi gibbum fieri.

Maximè autem (vt de alia ratione cyphoscos dicam) id per-
niciosum cum pueris accidit hoc, & iis qui crescent. Nam nò
ita multò post fato defunguntur ratione gibbositaris, quæ
non tam per se, quam ratione tuberculorum à quibus nata
perniciem affert. Nam hæc & tussim, & expectoratum &

& dyspnoea accersunt primo quoque tempore: quæ si tanta mala afferunt, & vim promouendæ cyphosæ habent, cum illam accersuerunt, quæ spes salutis? nam strangulatur animal prohibito thorace incrementis, auctis pulmonibus & corde. Sic Galenus, quæ tubercula cum difficili anhelitu fiunt, iis qui adhuc augentur sunt lethalia. Notandum illud iis qui adhuc au-

apho. 46.
Com. in

Vnum restat, quandoquidem diximus aphorismum intelligi de gibberositate contingente pueris, aut ante puberes annos contingente, vt explicemus, si gibber etiam à tuberculis post pubertatem contingat, an non idem contingat quod prioribus: cum tuberculum natum necessario aut tussis, aut difficultas respirandi in prociñctu est; an non idem & pueris & grandioribus contingit? immò grandioribus magis quod pectoris ossa obduritiem non tam facile obsequantur? Sed cum gibbositas ob difficultatem spirandi breui interficiat ante pubertatem, cur nõ idem grandioribus periculum imminet? Non est necesse; si quidem cum iam legitimum incrementum partes cepere, si accedat gibbum, propterea que spina non augeat, nil interest; celerioris enim interitus occasionem inde collegimus, quòd in pueris cor & pulmo augeant, affecta autem spina cremento prohibeatur. Quod idem cum non vsuueniat adultis, non est mirum si in iis longius vita protrahatur. Quòd pertinent duo aphorismi Hippocratis cogniti digni, ac intellectu difficillimi:

Quibus iam corpore prouectioribus gibber contigerit, aperte gibber ipse morbi qui adest, crism affert: per tempus tamen aliquod eadem que & in aliis magis vel minus significat: minus tamen malignè vix plurimum talia se habent. Galenus inminutus est admodum in Commentario:

Part. 14.
lib. 3. de
art.

nec enim explicat quid sit quod Hippocrates dicat *crism facit*. Morbi nomine quid intelligat, non dicit, *crism* nomine *crism* intelligit quidem, sed qua ratione id fiat, non explicat.

Tamen quid de ea re sentio, ipse explicabo. Morbi presentis nomine tuberculum subaudit, quod quidem cum inuadit eos quibus ætas prouectior, & corpus robustius, ratione ætatis, nulla crementi est necessitas, ac proinde non ita opprimitur pulmo: quia corpus robustius, & ossa, tametsi incuruantur à tubere, tamen quia mors non præuenit, & pro omni accidente, nisi forte aliqua difficultas spirandi accesserit, cyphosis contingit, gibbo-

250 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 fitas morbi præsentis crīsim, id est, solutionem facit, id est, indi-
 cat victum à natura tuberculum, & fortè remanere in aliqua
 mole & circumscriptione, vnde gibbositas conseruatur. Nam si
 solutio esset morbi, aut per suppuratum, aut alià ratione, cur
 nō tollitur gibbositas? vt prius diximus varices tollere gibberū
 excretā per venas varicosas materiā? At per suppuratum non
 potest solui sine interitu, vt abundè suprā ostendimus. Itaque
 nomen *κρίσις* siue *λύσις* alio in sensu accipi debet. Nisi fortè di-
 cat quis (& hoc subtilius est) cyphosis morbi, id est tuberculi, so-
 lutionem affert, hoc est, tuberculum nullum aliud accidens in-
 duxit præter cyphosin. sic vt cyphosis tuberculo criticè succe-
 disse dicatur, & eius sit velut crisis. Quomodo dicemus si cui
 post febrem dolor in brachio succedat & febris, aut remittatur,
 aut cesset, dolor ille dicetur afferre crīsin febris: sed hoc totum
κατὰ κρίσιν est. Remanet tuberculum, sed maior eius pars cessit in
 occasionem contorsionis spinæ, diffusa materia, aut aliter. Vn-
 de subiicit Hippocrates: Eadem quæ in aliis vel magis vel mi-
 nus: id est, difficultates sunt spirandi, & angustia aliqua magis
 vel minùs, prout quis in vitæ ratione aut accuratus fue-
 rit, aut deliquerit; vnde plerique cum gibberum in summam
 senectutem tulerunt, præsertim quibus corpus quadratum ma-
 gis, quod minùs dolitent à gibbero, & cum frigidiores sint, præ-
 fertim pingues, minùs egent respiratione.

Itē aliæ sunt cum occupātur partes crīses aut hæ aut illæ spinæ.
 Diximus autem suprā in spondylis ceruicis nato tuberculo
 valentes homines reddi, nomine *τὴν κυρτάν* generalius sumpto, vt
 vult Galenus, in medio dorso cyphosin, quæ si ad partes inferas
 pertineat, aliis signis sese exhibet, quàm illa quæ in media spina
 sedet. Nam sic Hippocrates: Quæ vitia circa spinam sunt, id est
 tubercula, cum aliàs solui minimè possint, tum illa maximè quæ
 supra septi connexionem, Galenus in Commentario vocat
τὰ κατὰ τὴν ὀσφύα. Nam cum suppurant, mortem afferunt, vt
 antè diximus, cum dubitaremus num meliùs esset phymata
 suppurari quàm dura manere. Idèò autem afferunt mortem, quod
 nulla vena sit in thorace, quæ prauos humores à tuberculis ruptis excipere
 possit. Et cum vena utrimque in thoracem dispergantur, si ex phymate
 humor aliquis in eas transfertur, exinaniri non potest, & vt excipiat
 ab illis difficile est. Accedit quod illa phymata gignunt humores crassi
 & frigidi.

de loc.
 affect.

Part. 3.
 Ep. par. 4.
 lib. 3. de
 art.

Textus
 Hippocr.
 latinus
 male
 versus
 est.

Com. in
 par. 4. lib.
 3. de art.

gidique sunt. Hæc Galenus.

Sed cum tubercula in partibus inferioribus nascuntur, ea sæpè successu varicum in cruribus soluuntur; nam per lumbares venas humor à facultate in crurales reicitur: hinc phymaton solutio. Aliquando tenasmus & dysenteria huiusmodi phymata soluit, translato ad intestina pure. Atque eorum symptomaton quæ gibberum costas inferiores occupantem consequuntur, alia gibberi ipsius solutionem afferunt, alia non afferunt, sed iuuant tantum. Ex eorum numero quæ solutionem afferunt, sunt varices & dysenteria, de qua paulò antè dictum. Ex horum autem censu quæ non soluere dicuntur, sunt quidam dolores renum & vesicæ: item abscessus circum ilia, qui suppurat quidem, & sunt sanatu difficiles & longi: hi enim morbi per sympathiam tantum sunt; quia quæ sunt vicina, & quæ propinqua, ea primum & maximè affici solent, ait Galenus in Comm. ex sententia Hippocratis. Et quia per sympathiam tantum sunt, idèò morbum non solunt. vbi notanda propositio Galeni in eodem Comment. *ἅπαντες καὶ συνεισέτιαν γίνεσθαι νοσήματα, τὰ τῶν ἡσυχαστικῶν ὅστις ἔστι καὶ παλαιῶν.* Quicumque per consensum communicationemque sunt morbi, eorum nullus eos morbos soluit qui præcesserunt. Præterea quibus gibber superior, iis gracilescunt brachia, quibus inferior coxæ graciliores fiunt, pubes barbâque tardior ac imperfectior. Item & infœcundiores iis quibus gibber superior, nam his sua sunt signa propria, suspiria, angustia thoracis, difficilior respiratio. Quæ duo principio quidem esse possunt antequam gibbositas sit. Nam tuberculum prius afferre potest angustiam, tussim, anhelosum quid, quàm gibberum efficiat. Idèò scribebat Hippocrates loquens de supero gibbero: *Πανὶς ὁ φυματὶς crudὸς ὀβnoxij ὑπερπλήθυνον κύρσιον τῆς ἀριστερῆς πλευρῆς καὶ τοῦ στήθους.* *Phymatis crudis obnoxij vtriusque plurimum circa pulmonem gibbi parte superiore sunt; nam gibber occasio & contentio plerisque ex talibus contorsionibus fit, quarum vicini tumores participes sunt.* Pars prior contextus bifariam intelligi potest: Gibbi parte superâ obnoxij sunt phymatis crudis, id est, quibus gibbositas est, ij obnoxij sunt phymatis, id est, ob gibbositatem tandem tubercula in pulmone nequeunte bene nutriri ob affectionem spinæ, crescunt. Hanc suspicionem auget, quòd dicat, obnoxij phymatis circa pulmonem: & sic gibbositas per eum contextum causa esset phymaton, & difficultatis spirandi. Sed non ea est mens Hippocratis. nam dictio [obnoxij] quæ vim magnam habet,

Ii ij

In filio
Præsidis
Baillij
hoc ob-
seruatū.

Com. in
part. 10.
lib. 3. de
artic.

Lib. de
humorib.

Part. 68
lib. 3. de
artic.

Part. 9.
lib. 3. de
artic.

supponitur ab Interprete: & nisi supponeretur, prior ista interpretatio cohæreret. Verba Hippocratis sunt obscura, nam loquens de iis quibus super septum affecta spina, & qui propterea *Part. 8. de lib. 3. de Artic.* *ὑπερσπινῶν*, id est, quibus guttur protuberat, facti sunt, ita scripsit, *ὑπερσπινῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλὺν, καὶ πλεονεύμονα εἶα*: id est, ita gibbis super septum affectâ spinâ factis, maximam partem tubercula sunt circum pulmonem: id est, in spina. nam *πνεύμονα* non idem est ac si dicat, *ἐν τῷ πνεύμονι*, vt licet colligere. Hunc autem syllogismum ita Galenus conscribit: Quibus gibber cōtigit vt plurimum a phymatis est, vt excludantur causæ procatarcticae, casus, lapsus. Quod autem diximus gibberum illum declarare generationem sui à tuberculis, nō autem inducere tuberculum in pulmonem, vt aliquis malè colligat, satis sequens periodus demonstrat. nam gibberi occasio à talibus contorsionibus existit, id est, contorsiones spinæ ob affectos tonos à phymatis gibberum inducere. Atque vt tandem dicendi commentandique finis fiat quod instituti nostri est tandem extremum persequamur. Quæcumque autem dicturi sumus, ea ex superioribus desumentur sparsa disseminatæque, vt per *ἀνακεφαλαίωσιν* quandam res planè intelligatur. Tolerari ergo potest lectio illa; Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, illi moriuntur. Docuimus enim particulam illam *παλαιῶς* non necesse esse adiici: quoniam non citò moriuntur, nisi quibus à tuberculo suppuratum contigit. Et quod Galenus in Commentario ascripserit particulam, citò, dum verba Hippocratis recenset, illud potest dici clarioris doctrinæ causâ adiectum esse. In plerisque enim est obscurus & mutilus Hippocrates: sed eius scripta aut collatis locis sunt venianda, aut exacto grauique iudicio æstimanda. Item si dicatur absolutè, illi moriuntur, nec adiiciatur, quando, an tardè, an citò, nihil Hippocrate dignum videtur. Itaque Leonicensius cuius interpretationem censuimus, si hîc adesset, fortè sese probabili ratione defenderet, cur dixerit, *Ante pubertatem moriuntur*: & significantius adiectum esse, *ante pubertatem moriuntur*, quàm si dixisset, *Qui gibbi ante pubertatem fiunt*. Nam cum contorsionis spinæ incommoda & pericula facilius in primas ætatis partes quàm in secundas tertiāsve incidant, immò periculosè iis qui crescunt spina vitietur, prognosin instituere veluti de morte ante annos pubertatis. Si enim moriuntur ante pubertatē, satis hoc indicat, necessariò & tussim, & asthma, & gibberum in

pueritiæ annos incidere debuisse. Cum ergo dicitur, *ante pubertatem moriuntur*, prædicitur mors necessariò, & supponitur necessariò viciatam fuisse in pueritia (pinam Si enim excedantur pubertatis anni & ab astmate, cyphon succedat, id periculi non imminet: Tamen innumeris locis Galeni & rationibus docuimus illud *negius hñs* priori aphorismi parti attexi debere.

De altera autem parte quâ quærebatur si ferretur lectio aphorismi, *Qui gibbi ex asthmate*, an gibbositatis causa esset asthma? hoc bifariam, trifariamque potest explicari: cum dicimus gibbos ex asthmate, aut tussi mori, sumitur effectus pro causa. nam tuberculum inducit tussim si humidius, asthma si durius, & postea cyphosin: sic ex asthmate aut tussi, periphrasticos est, ex tuberculo. Sed quoniam occasio prioris affectionis & manifestioris, nempe asthmatis & tussis, est tuberculum, ideo affectionum loco causæ mentio injecta est. Ac si dicat Hippocrates: *Qui gibbi ex asthmate*, id est à tuberculo causa asthmatis. Alio modo illud & significat *em*, & *em àma* significat: illis enim modis explicat Galenus. *Gibbi & àματος*, id est, post asthma. nam tubercula efficit, quòd facilius & promptius pulmo per sentit tuberculam spinam. Primo enim quoque tempore difficultas spirandi affertur, deinde successu illius *χωφως*. Et illud & pro *το em* sumptisse Galenum in Comment. docet, dicens, *τὸν περὶ τῆς ἡβῆς κινδύνον em àματι*, &c. Et alio loco ait, *σύμα τα γινόντ' àμα τῇ βηχί, & μὲν δύμα*: ac si dicat, primum tuberis effectum esse tussim & asthma, secundum cyphosin. Particulam autem & significare, post, apud Hippocratem quidam ingeniosè admodum colligunt in illo aphorismo, *σπασμὸς & ἐλλεβόρι δαίαισιμος*, nam melius Hippocrates dicit &, quàm *σπασμὸς ἐν ἐλλεβόρι*. nam qui dicit *σπασμὸς*, declarat convulsionem esse dum agit elleborus adhuc, ac hæc convulsio non est calamitosa: plerique enim etiam ab aliis catharticeis convulsionem medio actionis medicamento tempore. Sed qui dicit convulsionem & ἐλλεβόρι *κακίον*, illud, ex, declarat absentem iam elleborum, & muneris functionem. Itaque idem est ac si dicat, Post elleborum. Sed hoc subtilius: Atque ita fit ut protuberantia spinæ à tuberculo post difficultatem spirandi, aut tussim succedens, malo veluti malo cumulatò tantam thoracis angustiam efficiat, ut brevis mors obrepit.

ANNOTATIONES.

1. Nam tametsi ob asthma aut diuturnam tussim aliquā ratione inflecti possit spina, ut inflexio illa longo tempore sit, ita non nisi post longissimum temporis flexum periculum mortis potest asferre.

2. Quod partic. 8. lib. 3. de articulis docet Hippocrates loquens de superiore spine parte inflexa, occasio (ait) gibbositatis à causa contorsionis id est, ait Galenus, à tuberculis.

3. Huc pertinet locus præclarus de pleuritide ex dorso, in qua sit excretio urina saniosa & cruenta. Quod facile pertinere potest ad hunc locum.

CONSILIVM LII.

De renum calculo.

PRIMARIUM quendam virum vidimus nephritico dolore miro modo cruciatum. Dolor erat acutus naturā potest calculum ē renis capacitatem deturbare conanti. Ren tantum sinister obturatus erat, ut apertē secto corpore innotuit. Quod plerisque nil tale expertis admirationem mouit: nam suppressa omnino urina. Vnde colligebant Medici aut vtrumque renem à calculo obstructum præpeditumque, aut in vesica ipsa vitium latere, aut vtramque partem laborare. Sed eos euentus fefellit. Huius rei causam ita in numero habere ut communi ratione sanciri, roborarique possit, non licet. Non aliunde repetitur quam ex eo quod præ dolore in renem sinistram materia fluiret, rapereturque potius, deinde motu contrario delata vomitione excernebatur: hinc vomendi assiduitas, hinc urinae suppressio. Aut si quid ē rene dextro non obfesso ferebatur, paucum erat, & naturæ recreandæ non satis erat. Vel potius tam malè affecto reno sinistro, communicationis & sympathiæ vix dexter alioquilius & incolumis laborare incepit: deinde facultas eius diuturnitate doloris fatiscere. Quod mirum tamen, cum natura corpus omni ex parte geminū fecerit, ut vnius partis actione læsā, aut cessante, altera etiamnum suum præstet officium: in eo Medicorum versata industria, ut symptomatis occurrere.

curreretur, vomitioni, vigiliis, dolori nephriticoid & genus aliis.

℞ Terebinth. Veneta lota in aqua pariet. ℥. s. rhabarb. electi ℥j. lapid. Ind. ℥. s. cum diatrag. frig. fiant boli. capiat cum syrupo de raphan. In ista vrinae difficultate hæc quoque præscripta sunt:

℞ Succiraph. ℥j. succilymon. ℥. j. syrup. de alth. ℥. vj. cineris cancer. fluuiat. & carab. an. ℥. s. cum aqu. parietar. fiat potus.

℞ ℥iij. decoctionis aperitiua: adde syrup. de raphan. ℥j. lapid. Ind. ℥j. canthar. pulueris. gr. iij. mithridat. ℥. s. fiat potus.

℞ Theriaces ℥. s. aqu. destill. terebinth. ℥. ij. syrup. de alth. ℥j. fiat potus.

℞ aqu. scabiosa, bipin. agrimon. card. saxifrag. an. ℥. j. s. destillat. restant. ℥. iij. succi li. ℥. ij. s. accabr. quod suffic. passerur permanic. Hippocratis.

℞ rad. lilior. q. j. malu. bis mal. violar. parietar. nasturt. berul. adian. an. m. j. cicer. rubr. ℥. s. seminis milij solis, anisi, fœnic. an. ℥. ij. florum charnem. melior. an. p. j. coquantur in omazorum decoct. In colat. ad quartar. tria, dissol. terebinth. diacarth. & benedict. an. ℥. ij. sacchar. rub. & mell. an. ℥. j. ol. de scordio. & lilior. an. ℥. j. s. fiat clyster.

℞ summitat. altheæ, urtica, an. p. j. folior. beton. bipin. saxifrag. p. s. passul. mund. folior. senæ an. ℥. ij. fiat decoct. dissol. in colat. diaphæn. ℥. ij. bened. ℥. j. diacarth. ℥. ij. fiat potus.

℞ milij solis puluer. larg. spine lapid. iudaic. macis an. ℥. j. puluer. electuar. ducis ℥. j. s. capiat cum aqua terebinth. destill.

℞ succi amygdalar. dulcium sine igne ℥. j. s. vini albi potens ff. ℥. ij. cum aqu. destillat. terebinth. fiat potus.

℞ nucleor. mespil. ℥. ij. s. semin. bard. petrosel. fœnic. an. ℥. s. 4. sem. frigid. maior. an. ℥. j. puluer. electuar. diatrag. frig. an. ℥. j. s. cinnam. ℥. j. fiant tabella cum sacch. in aqu. pariet. soluto.

℞ decoct. omazorum quod suff. in quo coque mal. bis mal. viol. an. m. j. cicer. rubr. ℥. s. s. m. lini, dauci, alth. milij solis an. ℥. ij. florum charnem. an. p. j. In colat. dissol. co. & bened. laxat. an. ℥. s. ol. de scordio. lilior. & viol. an. ℥. j. santal. rubr. mellis viol. an. ℥. vj. philo. roman. ℥. ij. fiat clyster. Fetus solemnes, & unguentum ex mucaginibus administrabatur.

℞ s. radic. aperit. an. ℥. s. altheæ, totius gramin. an. ℥. j. radic. bard. lapid. acut. an. ℥. ij. cichor. totius, berniar. scariol. beton. capill. ceter. bipinell. saxifrag. omnis buglos. an. m. s. 4. semin. frigid. maiorum, carui, milij solis, siliij, an. ℥. ij. glycyrrh. ras. ℥. s. florum cordiat. & genist. an. ℥. j. fiat decoct. aalib. j. in colatura diss. syrup. oxymel. syrup. de

capill. ven. an. ʒ. j. s. aromatizetur electuario ducis.

℞. aloes ʒ. i. s. medulla semin. bipinell. bardana, apij, contuse & creta per setaceum, an. ʒ. j. nucleorum mespilorum loto. vino albo & pulueris ʒ. j. s. cum syrup. de alib. fiat massa utenda ante pastus.

℞. nucleor. mespil. puluerisator. ʒ. s. rad. gramin. lote in vino albo & in furno siccatur. ʒ. iij. liquiritia, semin. bardana, ocymi, petrosel. maced. an. ʒ. j. cum triplo sacchar. puluer.

℞. semin. milij solis, alth. lini. fenugr. an. ʒ. s. fiat decoct. In colat. dissol. Cathol. ʒ. vj. benedict. laxat. ʒ. iij. terebinth. ʒ. s. sacchari rub. mellis videt. an. ʒ. j. ol. de scorpion. & liliorum an. ʒ. ij. philon. Rom. ʒ. j. s. fiat clyster.

℞. aqu. betonica, argentine, corticum fabarum, an. ʒ. j. s. passentum cum saccharo & pauco cinam. adde sanguinis hirci preparati ʒ. j. puluer lithon. ʒ. j. fiat potus, capiat in semicupio.

℞. rad. raphan. petrosel. fenic. aspar. an. ʒ. ij. semin. milij solis, saxifragi, lappa maior. an. ʒ. s. beton. parietar. bismal. totius an. m. j. fiat decoct. in hydromelite bene cocto ad lib. duas.

℞. prædictæ decoctionis quartar. tria, in quibus dissol. terebinth. veneta benedictæ laxat. an. ʒ. s. adipis anser. ʒ. j. puluer. lapid. iudaici ʒ. j. puluer lithont. ʒ. ij. ol. de scorpion. & liliorum an. ʒ. i. s. fiat clyster. Vel

℞. olei de sem. lini lib. j. terebinth. veneta ʒ. j. s. diaphænici vino albo soluti ʒ. iij. fiat clyster.

℞. aqu. destill. saxifrag. beton. an. ʒ. j. s. aquæ terebinth. destill. ʒ. j. cum sacchar. & pauco cinam. fiat inlep. Capiat reddito clystere: & cum illo iulepo misceatur sanguis hircini preparati ʒ. s.

℞. rad. bryonia, lilior. an. ʒ. j. s. malv. bismal. tot. parietar. cretioni, berula, an. m. j. semin. fenugr. alth. lini an. ʒ. j. ficus pingues num. vij. florum chamem. p. ij. fiat decoct. & materialia prædictæ decoctionis misceantur cum far. cicerum rub. ʒ. iij. far. fenugr. ʒ. ij. adip. anser. ʒ. j. s. cum oleo de scorp. & liliorum: fiat cataplasma pro rene utroque.

Paratur balneum cum seminibus lini, fenugr. alth. milij solis, florum chamem. melilot.

℞. 4 semin. frigid. maior. an. ʒ. s. semin. aspar. lithosperm. an. ʒ. j. pul. lapid. cancro. & iudaici, an. ʒ. s. pul. burg. spina, & sem. bardana, an. ʒ. s. anthos ʒ. j. cum saccharo quod sufficit. Fiat pulvis utendus cum iulepo sequente.

℞. syrup. de alib. & de limonibus an. ʒ. j. aqu. decoct. fabarum ʒ. iij. fia tulp.

℞. aqu. hyssop. parietar. beton. saxifrag. an. ʒ. ij. aqu. terebinth. destill. & raphan. an. ʒ. j. in quibus dissolue ol. de scorpionibus ʒ. j. ol. lilior. ʒ. j.

℞ j. puluer. elect. ducis, & lithont. an. ʒ ij. oxymel. simpl. & syrup. de raphan. an. ʒ ij. adipis anserini ʒ ij. fiat clyster pro duplici iniectione, ad dūz j. s. quinta essentia terebinth.

℞ rad. cichorij, asparagi, apij, petros. fœniculi, raphan. areste bonis, an. ʒ j. rad. altheæ, lapp. maior. spineburg. cani rub. an. ʒ xj. betonica, parietaria, saxifrag. adianti, cetera, chendinia, pimpinell. cum toto berniar. cichorij, an. m. j. fructuum alkekken. num. xij. cicernam rub. xj. baccarum iuniperi & lauri contusarum an. ʒ j. s. milij solis 4. semin. frigida. maior. semin. altheæ & milij solis, sem. malu. violar. mart. an. ʒ ij. florum genist. p. j. fiat decoct. ad lib. j. in colat. dissolu. syrupi de raphan. & de lymonibus an. ʒ j. s. fiat inlep aromatizat. Electuar. Diatricos & Elect. Ducis.

℞ expr. ss. ʒ ij. rhubarb. infusi in decoct. gram. petrosel. brusci, acetos. agrimonia, bipin. saxifrag. urtica mortua, sem. alkekken. iuniperi: dissol. lapid. iudaic. ʒ j. syrup. de raphan. & ros. pallid. an. ʒ s.

℞ aqu. betonica, argent. saxifrag. an. ʒ j. s. aqu. raphan. ʒ s. passentur cum cinim. & pauco saccharo, addendo puluer. ducis ʒ j. lapid. iudici & milij solis, lapillor. cancror. an. ʒ j. fiat potus, detur in semicupio.

℞ mucagin. sem. lini, altheæ, fœnugr. extractarum in aqua pariet. ʒ j. s. adip. gallina & anseris an. ʒ vi. cum oleo de scorpionib. terebinth. venet. & butyr. recen. an. ʒ s. fiat litus pro partibus dolentib.

℞ oleor. massich. & cytoniorum, an. ʒ s. puluer. absynth. rosarum, corall. rubr. galang. an. ʒ s. cyp. ʒ j. pulu. myrtillorum, gall. nuc. cu. press. an. ʒ j. cum ceroto stomach. fiat litus ad stomachum.

Multa alia instituta sunt, quæ necesse non est scribere, & quod ea satis per se cuique occurrant, & quod aliis ex locis facile repetantur.

Tom. i.

Kk

CONSILIVM LIII.

De Diarrhæa, & Dysenteria.

INTER eas affectiones quæ miseros mortales exercent, sunt fluores alui, præproperæ deiectiones, leientericæ, dysentericæ, cœliacæ. Occurrerunt nobis plerique, quibus graue fuit ac permolestum sæpius desiderare, ac præsertim de nocte, vel cum in negotiis occuparentur, quæ necessariò omittenda essent, vt excernendi necessitati seruiretur. Cœliacæ, vel aluinæ excretiones (ῥασή) enim hoc loco, aluus, latinè à nobis cum Cicerone vertitur, vulgò Ventriculus dicitur) non possunt diutius perseverare incolumi stantèque ægro. At dysentericæ excretiones (nomine τῆς δυστερίας improprie sumpto) diu fatigant, vel quòd minimo negotio sanguis excernatur, vel quòd tam diuturni profluuij dysenterici occasio à capite repetatur, nullo etiamnum vitio in viscere aliquo contento, nisi quòd longitudine floris tandem partes αὐτῆς κοιλίᾳ contentæ labem contraxerint. Ac fluorem hoc loco intelligimus δισσέριαν vulgò dictam, cum & in excretionis modo, & in qualitate, & in frequentia peccatur. Nam hoc loco intelligi volumus de excretionis modo, & qualitate, quia per annos ferè septem, octòve nunquam excernitur quicquam ab aluo, nisi cum dolore circum umbilicum, aut paulò suprà, infràve: & quæ secedunt corrupta sunt sanguinolentaque, diuersi coloris, & tamen morbus remedijs non cedit.

Hoc affectu miserè quidam annos iam afflictus est decem, nec opem vllam, quamvis consultis primarijs Medicis quasque inuenit. Decem ante annis dysenteriam, vt tunc Medicis visum est, passus est: opera adhibita est: an malè curatus morbus nihil ad nos, ab eo tamen tempore, nisi breuibz aliquot interuallis, dolores, & excretiones, vt sic dicam, ἀργαῖαι & πύρδαι non conquieuerunt. Viso homine, nemo tam parum in arte versatus, qui non colligat temperamento bilioso esse, conferentibus eò frequentibus animi curis quibus impensè complicatur. Emaciatus est, hepar illi ad calidiorem temperiem inclinans, co-

tus venter ambustus (vt vocant) denique *δυσμόλιος* est, vt verbo Hippocratico vtamur. Sed sit ita, & fateamur eiusmodi tem-
periem & vitæ institutum Græcis *ἐπιτῆσιν* appellatum, ad alen-
dum morbum conferre, propterea tamen non constat de sede,
ac specie morbi: quis sit, vnde, qui tandiu manente ægro, per-
seueret, an vitium lienis, an hepatis, an cerebri, an mesenterij:
& si mesenterij, an vlcus sit, an intemperies: Si vlcus, aut quid
simile, quomodo tandiu superfuerit, cur non illa pars siderata,
vitiataque temporis progressu. Denique mirum est quæ fiat vt
illa liquida satis excretio, *αἱματηρά*, graueolens, tam multiplex;
(nam simul & cruenta, & stercoracea, & viridia, & flaua excernuntur, quæ nunquam in bene affectis excernuntur) tandiu possit perseuerare. Notum enim illud est Galeni, *Cum excernuntur varia, si praua fuerint, deterius ægris esse, quàm si vniuersi.* Et si varia sint, ac praua, vel *αὐτομάτως ἢ συμπτωματικῶς* excernuntur, vel vi medicamenti purgantis. Cum *αὐτομάτως* excernuntur, & ex-
cernendi finis non fit, nec id affatim fit, sed lentè ac pigro gres-
su, significatur varietas dispositionum malarum in diuersis par-
tibus. Ac quò plures partes afficiuntur, eò res ægrorum dete-
riores sunt: vt autem lentorem, tarditatèmq; gressus explicet Hippocrates, vsus est participio *τὰ ἴδια*, quòd non semel factam excretionem, & *ἀσθῆναι* declarat, sed sensim ac sensim fieri. Sed cum artificio Medici ad imitationem naturæ comparatò excre-
tio sit talis materiæ prauæ ac multiplicis, tametsi hoc per se ma-
lum, ex euentu tamen bonum est: nam non perennem genera-
tionem, sed congeriem tantùm accumulationemque, *πυκνὰ θροισμὸν* Græci vocant, designat: quod in omnibus morbis diligenter notandum.

Ac cum tandiu praua ista materia excernatur, siue noua gene-
retur, vt necesse est, siue è sedibus partium intimis illa, aut pars
illius secedat, mirum quomodo id fiat. Ideoque claris Medicis
hoc negotium datum est, vt nec operâ, nec consilio iuuarent,
immo ne sedem mali quidem intelligerent: quanquam com-
muni nomenclatione dysentericum quid appellant. Hepati-
cum non est profluuiũ, siue rubrum intelligatur, siue non, quod
tanti momenti pars decem annos non possit ita laborare, non
quòd, vt antè dictum est, non afficiatur tandem hepar. Cepha-
licum esse aliquis suspicetur, non ita tamen vt tota natura pro-
fluuij in descensu pituitæ à cerebro consistat; nec enim dolores

illi ad vmbilicvm confisterent, nec propterea cruentum excre-
neretur, nec tam varia ac putria; sed eâ ratione cephalicum esse
potest, quatenus cum iam partes inferiores affectæ essent, ad
diuturnitatem fouendam accessit capitis opera mucosum hu-
morem, aut phlegma salsum excernentis in aluum. Huc facit
quod de nocte potius ad excernendum æger incitetur. Ac ve-
teres practici distinxerunt profluuium stomachicum ab hepa-
tico & cerebri, quòd illud interdum fatiget, hoc, id est à cere-
bro hepatæque natum profluuium de nocte potius sæuire con-
suescat. Quòd autem diuturnitatem fluorum alui cuius illacum-
que modi sint, adiuuet cerebrum, primus literis mandauit Hip-
pocrates: *Dysenteria, Leienteria, Diarrhæa morbi sunt consimiles: hi
sunt sanandi, ut defluxum à capite impedias, & à ventre superius.
Morbi enim in natura hinc est.*

*Hipp. lib.
viii. p. 10.
lib. 7.*

Atque vnum obiter annotare non alicnum, an necesse sit
spumantes esse deiectiones, si à capite occasio excretionis per-
deat. Aphorismus est Hippocratis: *Quibus in alui profluuiis excre-
menta spumant, iis à capite pituita est.* Falsus enim videtur in plerisque
aphorismus: nã in doloribus colicis excernuntur spumantia, &
bubulo excremento similia, natantiâque præ contecto spiritu, in
aqua, non propterea tamen colligere licet caput hæc suppedi-
tare. Sed dicet aliquis, Hippocratem loqui de alui profluuiis, in
quibus cum spumat aliquid, excreta à capite pituitæ argumen-
tum est. In Comment. Galenus non videtur hunc aphorismum
omnino probare. Sic visum est recentioribus recte quidem in
dysenterici materia commota calore æstuante agitata spumar-
ia deiici. Si aliis signis colligendum caput malè habere signa-
ue caput, saluatio, ac præsertim manè & vespere: maxime si eâ
molestiam sentiant in ventriculo. Quanquam caput per se con-
stituitur pituitæ, sedes, quæ in ventriculum illabens profluua
longiora reddit. In spumantibus itaque deiectionibus falli non
oportet.

*Gal. com.
in aphor.
4. lib. 3.
§ 30. lib.
7.
Id. lib. 4.
de morb.*

*Cap. 4. l.
de loc.
aff.*

Et si autem caput magnum habet momentum ad producen-
da profluua, non est tamen temerè incusandum, nec medica-
mentis agitandum. Galenus primus meo iudicio, quod à nullis
hactenus annotatum est, fluorum alui causam vnã agnoscit
quandam per partem intestinorum, vt vocat, quam in quo-
dam animaduertit qui excernebat cum sensu mordacitatis in
superioribus intestinis (quod colligebat ex eo quod post mor-

dicationem paulò lōgiore tempore desideret) idque ob læsum
 à prauo medicamento intestinum. Ac coniecit læsum esse ab eo
 medicamento intestinum, ac iam in *περιτρίβει διαβρω* peruenisse,
 propterea quæ facillè iccoris excrementa recipere, eaque cor-
 rumpere. Hic locus plurimum conferet ad id intelligendum de
 quo laboramus, qui fiat vt tandiu profluuium perseveret, est il-
 la *διαβρωσις περιτρίβει*, in causa, id est, intestina vitata sunt, imbecil-
 lioræ redditæ, vt humorum aliunde influentium impetum fa-
 cillè recipiāt, & humores à iccore manantes corrumpāt. quod
 notandum. Nam aliquis quærat, si à iccore excrementa manāt,
 corrumpantur necne, nil interest: quod intrepidè negandum
 est. Nam quæ à iccore fluunt, refluuntque, ea cum excrementa
 tantum sint, sed nil mali præterea habeant, intestinum vicinum
 vitiatum, & iam in *περιτρίβει διαβρω* deueniens corrumpit, & pro-
 pterea citatior aluus redditur. Nam quæ in intestinis continen-
 tur, nisi acrimoniam quandam aliquo modo nastæ fuerint, ea
 diutius in iis resistāt, & alio stimulum calcæque ad soluendum
 non addunt. Non exigua itaque dubitatio fuit de illo egro, que-
 nam in illo potissimum pars inculanda esset. Omnes ad hepar
 recurrerant. At illud aut intemperie, aut solutione continui,
 aut totâ substantiâ affectum est. Non abs re autem *τὴν ἐκ τῆς οὐλῆς* dico,
 non autem *τὴν ἐκ τῆς οὐλῆς*; quoniam pars illa sicut & reliquæ partes
 afficiuntur nullo interim iudicio manifesto affectionis. Nam
 plerique ex iis quibus præcipua cura est de coniectandis tan-
 gendisque hypochondriis, cum nec inæqualitatem, nec tumo-
 rem, nec renitens quid tactu deprehendunt, propterea iubent
 securos esse agros. Vnde sæpe in vulgi mentem venit, propi-
 nato veneno ita languere hominem, cum recitat Medicus nil
 deprehendisse vitij in hypochondriis. Tametsi enim Hippocr.
 in Coacis aduersariis in omni morbo hypochondrii æqualita-
 tem in qualitate & substantia, in eoque doloris vacuitatem
 laudat: non propterea latere nos debet subesse substantiæ to-
 tius vitium in viscere contento in hypochondriis. Hoc autem
 Galenus literis tradidit apertè, quod ad medendum & inuesti-
 gandum confert plurimum, ne temerè inueterato contrectan-
 di hypochondria mori assentiamur. Declarat enim quomodo
 superficies corporis sæpe colore æruginoso infecta, denigratâ.
 que sit, cum nulla existat obstructio, aut inflammatio, aut scir-
 rhus in hepate. Sed, ait, secundum substantiam temperiei ipsius

partis mutatur. Vt sit temperamenti quædam alienatio, sed sit ita sanè (iam enim accedo ad eos, qui quòd fortè iuuenum virginum nitore, & vt ita dicam, polito marmore alliciantur, iam sibi persuasere officio suo non se defuturos, si vt morbi sedem inuestigent, manum ad hypochondrium adiiciant, vt hic plus voluptatis ad illos redeat, quàm ad agros vtilitatis.) Sit ita, inquam, aliqua obstructione aut tumore laboret hepar, an propterea tactus fidem faciet? ² Quod si neges, habebis Galenum tibi contradicentem, qui non ita stolidè voluptuosèque ægrarum mulierum inuerecundo tactu delectabatur. Istius verba hæc sunt: *Constat*, inquit, *hepar intra musculos positum esse: quod cum tribus contegatur musculis, fieri non potest vt tactus aliquam illius notitiam præstet, nisi vel magna in eo oriatur inflammatio, vel incumbentes ei musculi valde extenuati sint.* At affectus hepatis cognitionem alià arte venandam esse tradit.

Gal. cap. 7. lib. 5. de loc. aff.

Vt ad institutum reuertamur, illius ægri hepar quod tanquam mali auctorem omnes accusabant, illudque præfidiis innumeris fatigabant, aut solutione continui, aut intemperie laborabat, aut vernacula eius temperies totaque substantia erat immutata. Nec inflammationem hepatis passus erat, nec tumor vllus, nec metui incumbentes musculi excarnes penè essent, percipiebatur. Si caliditas est magna, adureret potius, siccarètque, & efficeret, vt in hydropicis quibus hepar præcalidum est, annotauit Hippocrates. Caliditas ad retentionem & attractionem facit: humiditas & frigiditas eadem retentionem dissoluit. Et si siccitas in iecore eandem retentionem roborabit, vt patet ex Galeno, qui qualitatum corpus constituentium, aliàs ad hanc aut ad illam potius actionem valere. ³ At dicet aliquis, immoderatus est calor, immoderata siccitas. Tamen si enim siccitas & calor ad retentionem & attractionem conferat, illud est intelligendum de vtroque moderato. Verum quidem illud: nec enim nos latet scriptum esse à Galeno, vt moderata siccitas actionem retentricis iuuat, ita immoderata dissoluit. Quod senum exemplo patet, quibus cum adsit summa siccitas, si alius est liquida *ἀνὰ δόξαν* vitio impediante, nimirum siccitate immodicâ, & *ἀνὰ δόξαν*, & retentionem legitimam. At si fuisset in illo tanta intemperies calida siccaque hepatis, non fuisset incredibile tamdiu cum viuere potuisse. Quanquam non negamus calorem qui in eo est magnus, & acer, plurimum illum

Gal. cap. 3. lib. 3. de symptom. caus. 8. lib. de ac. re par.

Com. in aph. 20. lib. 2. aphor.

fluorem iuuiffe, dispositis malè iam intestinis, humores corru-
pendo, & iis saltè acrimoniæ attribuendo. Sic enim lib. 6
Epidemiorum scripsit Hippocrates, *Qui ventre calido sunt, carnes
habent frigidas.* Et miror, si tanta fuit intemperies calida hepa-
tis initio, cur non ætas quæ secuta est illam correxit? Ita enim
vernacula intemperies & veteres infirmitates temporis pro-
gressu immutantur, vt quibus in iuuentute fluxerit aluus, iis se-
nibus rescicetur. Et id est quod scripsit Hippocrates in Epid.
Morbis conuulsi in senectate relinquunt; quod Galenus de intempe-
rie calida intelligit in Commentario, vt ætas ingrauescens illi
intemperiei veluti auxilio sit. Quomodo autem hæc multos
torquere possit. Ergo probabilius est accusare intestina in qui-
bus inest *peruicax diarrhoea* illa quam diximus, iuuant hepate, ni-
mirum ferofos humores acresque generante. Qui, si intestinu
integrum esset, non ita citaret aluum. Sed hepar generando, mit-
tendoque intestinum, & corrumpendo ob malam dispositio-
nem, mutuas tradunt operas ad illum fluorem perpetuandum.
Et futurum tandem vt colliquescat hepar, & veluti consumma-
tur. Si vitium in illo absolutè fuisset, vix tandiu homo super-
fuisset. Quanquam audiuius de Consule Parisiensi qui hepa-
tico profluuiio bilioso sex annos vexatus est, & nullis remediis
alleuatus est. Eo mortuo inuentus tantum hepatis locus &
membrana, illius parenchymate consumpto & colliquefacto.
Quod autem huic nostro agro intestinum malè affectum sit,
colligere possumus ex antecedentibus; nam aliquando dysen-
terici verà laborauit, & cum Medicorum iudicio ea malè curata
esset, ab eo tempore superfuit, restititque illud quodammodo
dysentericum profluuium. Quanquam ad mesaræon potest sæ-
pe longi floris occasio referri. Nos enim sex mensium spatio
fluorem patientes vidimus, qui non hepatica cephalicæque ex-
cernebant, sed mesenterica, vt sic loquebamur. Et sæpe longo-
rum latentiumque morborum sedes est mesaræon, frustra que
aut ad lienem, aut ad hepar mali primalabes & occasio refertur.
Et ne cui mirum videatur si ad mesenterium recurrendum sit,
quod non sit credibile ab vno hepate tam multam colluuiem
provenire, habemus nobis suffragantem Galenum. Ille agnoscit
quasdam mesenterii affectiones, a quibus qui agrotarent, Me-
senterici appellarentur. Quidam veterum cum perfectè confectū
in ventriculo cremorem animaduertent, & talem ferè deiici,

Apho. 20
lib. 2. A-
phor.

Par. 6.
sect. lib. 6
Epidem.

Cap. vlt.
lib. 13. de
loc. aff.

nec à meseraicis suctum deuectumque, vt fieri solet, falsò melli
causam mesenterio attribuentes, sic laborantes meseraicos ap-
pellabant, sed malè: & ideò hos Galenus redarguit. Nam cum
facultas attractrix hepatis languet, nil per venas meseraicas at-
trahitur ab hepate: proptereaque non accusari debet mesente-
rium, sed hepar ipsum. Idem enim contingit quod iis quibus
læsa spinalis medulla, & aut brachia, aut manus in iis suum offi-
cium non præstant. Non accusandæ manus, sed ad spinam re-
currendum. Item cum quis syncope prehensus non mouet ma-
num, an ei manus in vitio est? Hæ rationes Galeni sunt. Contra-
tamen afferri hoc potest: Cum chylus mitificatus excernitur,
nec ad hepar deuehitur, an ideò facultatis attractricis hepatis
id vitio sit? Nunquid sæpe fluorem alui videmus obstructo me-
saræo facultatibus hepatis etiamnum integris? Non sequitur er-
go ideò conuinci posse hepar laborare, cum chylosa deiiciun-
tur. Verum quidem illud, cum facultas attrahendi hepatis æ-
gra est, attractionem per meseraicas tanquam per manus offi-
ciales non fieri, non obstructæ viæ ratione, sed partis principis
mesaræi ministerio ytentis vitio. Et veteres qui meseraicos ap-
pellabant illos, non abs re fecerunt. Sic & Galenus, & illi vete-
res culpâ non vacant; siquidem & chylosa deiici possunt solo
vitio mesaræi non deducentis: aliquando ipsius hepatis vitio,
cum mesaræon incolumis sit. Præterea aduersus Galenum hoc
stare potest. Mesaræon pars est naturalis: omni parti naturali suc-
tionis vis est, & per protopathiam laborat, non per consen-
sum vt partes animales, quæ aliquando cum per se incolumes
sint, suæ affectionis causam in se non continent: Hinc fieri po-
test vt etiam laborante hepate mesaræon suum officium faciat
& contra incolume potest esse hepar, læso mesaræo. Et nil affer-
Galenus cum ait ridiculum esse affectâ spinâ, manum, quia non
moueatur, accusare: Idemque cõtingere in hepate & mesaræo,
siquidem si mesaræon non trahat, affectionis huius causam non
acceptâ ferendo mesaræo, sed ipsi hepati; quod à ratione alienû
se videtur, cum mesaræo insit vis suæ actionis, & *si cõtinetur*. Nec est
quod quis parum interesse dicat, sitne affectum mesaræon, an
hepar, cum chylosa deiiciuntur; nam magna est partium affini-
tas: & vnius affectio facillè in aliud redundat. Nos autem con-
trâ sentimus; siquidem si in mesenterio aut tumor & obstructio
sit, cuius occasione chylus ad portas non deuehatur, aliâ ratio-
ne

*Galenus
hæp. ius.*

*de loc. aff.
Cap. vii.*

ne curandum erit quàm si hepatis sola attractricis infirmitas in causa sit. Et nos vidimus chylosas deiectiones non affecto hepate aliquo insigni vitio, sed sublati multis quæ mesaræon occupabant obstructionibus; tandem cessauit chylosa deiectio. Sic non sunt Galeni dicta pensiculatim & ad momi lucernam æstimanda: sed cum Galeno illo loco mens sit de hepaticis dicere, non est dubium quin hepatis facultate attractrice infirmâ mesaræon laboret, actiôque eius aut minuat, aut deperdatur. Nam mesaræon tanquam auxiliaris manus hepati subseruit. Sed contrâ non sequitur, chylosa deiectio est, necessariò itaque vitium hepatis conuincitur. Sic in vno sensu vera opinio Galeni, in altero sensu veterum opinio excipienda. Dicendum verò mesaræon, quod est veluti venarum textura, ita affectum esse ad hepar quatenus pars est officialis, vt vitium quod est in hepate facillè communicetur ipsi mesaræo. Et Galenus eodem loco ait, si phlegmone, aut aliquid simile mesaræon obsideat, hæc affectio propriè eius esse dicitur. Si verò hepar ob imbecillitatem non possit per venas suas alimentum trahere, non mesenterio, sed hepati prouidendum erit. Porro si velis discernere an inflammatio & erysipelas mesaræon occupet, sciendum tunc non solum excerni talia qualia in hepatis imbecillitate cum ad se cibum non trahit, excernuntur, ⁴ sed præterea saniosum quid. Sic cum hepar non inflammatum est, & si cum chylosis excrementis saniosum quid excernitur, ad mesenterium hoc referendum.

Ceterum incredibile dictu est qualia excernantur dum mesenterium per intestina congestam in se colluuiem deponit: nec alienum ab instituto si differentias aliquot fluorum hepaticorum apposuerimus, dysentericæ species proposuerimus; quæ accidentia incipiente fluore dysenterico & hepatico contingant; quæ sedium distinctio, quæ notæ: deinde remediorum perbreuis sylua præscribetur. Si enim omnes fluorum differentias persequi institutum esset, ne hic liber quidem sufficeret.

Quæcumque excretio per aluum sanguinis sit (si hæmorrhoidalem exceperis) Dysenterica vulgò appellatur: idque præsertim cum dolor, ventrisque torsio aliqua percipitur: Quæ tamen cum vlcere est, propriè Dysenteria appellatur: hyparxisque eius in vlcere posita est. Ita enim eam propriè Dysenteriam nominari, & à veteribus & à suis Galenus autor est. Aliæ autem

Cap. 5. lib. 2. de loc. aff. 266 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
 sunt excretiones cruentæ, vt cū limus sanguinis excernitur,
 aut velut sanguinis fax, aut cū syncerus planè, eaque excre-
 tio affectum hepar declarat eidem Galeno. Nam vt tenue & sa-
 niosum, & recens mactatarum carniū loturę simile euacua-
 tur, id hepaticum est, id est declarat imbecillitatem iocineris
 sanguinem probum generare nequeuntis. Hanc excretionem
 Hippocrates vocat *πικρὺν καὶ ῥεῖον*, pręrubram alui proluuiem
 interpretor. Est enim vel rubentior, vel dilutior pro ratione
 permixtę tenuis substantię. Cū autem faci similis excretio
 sanguinis fit quodammodo exassantis iccoris argumentum est,
 & vocatur hoc *τὸ διαρρέον καὶ ῥεῖον*. Et notandū est illud quod
 scribit Galenus, & quod nos experientiā sæpe deprehendimus,
 aliquando liquidam tenuemque sanguinis esse excretionem,
 quam melancholica postea, sæculenta, nigra, & atra consequa-
 tur. An atra, nigraque, & adusta quodammodo intemperie fri-
 gida affectio hepate excernitur? Nequaquam. Sed cū alioqui
 præcessit frigida intemperies, temporis progressu putrescit in
 imbecillo hepate humor, à putredine febris lenta oritur; hinc
 adustio recoctioque humoris: quod annotandum. Nam sæpe
 hæc febris negligitur; hinc deiecta appetentia, prouentus pra-
 uorum humorum. Et cū vident illi Medici deiectam appeten-
 tiam, non mouentur: quod malè fit. Illud enim notum esse de-
 bet, si perseveraret intemperies illa frigida quæ initio fuit, non
 ita deici appetentiam, immò cibi augeri desiderium. Quia au-
 tem ita deperditur appetentia calidioris intemperiei quæ suc-
 cesserit, debet esse argumentum. Nam calidas intemperies nū-
 quam comitatur ciborum appetitus, sed ingens cibi fastidium,
 febris, vitiosorum humorum vomitus. Itaque non falsa debet
 esse opinio prioris intemperiei frigidæ: sed signis est venanda
 aucupandaque cognitio succedentis aliæ intemperiei.
 Quoniam autem de inappetentia quæ imbecillitatis hepatis
 comes est nonnulla dicta sunt, & de fluoribus dysentericis &
 hepaticis sermo est, non abs re erit pauca annexere ex Galeni
 mente, eaque ad Hippocratis sententiam accommodata. Hip-
 pocratis est illud, *In longis dysentericiis inedia ex fastidio, malum, &*
cum febre, perus. Nomen *τὸ ἀποστρέφειν* non aptè satis Leoniceus
 vertit, inediam ex fastidio, cū vel inappetentia, vel auersio
 ciborum, verti debeat. Propriè autem nomen *ἀποστρέφειν* auersio-
 nem ciborum significat, vt in comment. in 1. Epidem. explicat

Galenus. Sed hic *ἀντὶ τῆς ἀσπῆρας* vsurpatur. *ἀσπῆρος* autem *ἢ ἀπῆστος* distinguuntur propriè loquendo: impropriè autem sumitur hoc loco. Sic enim in Commentario Galenus vult *ἀπῆστος* sumi pro *ἀσπῆρος*. Denominibus hætenus.

Dysenteria aut supprimuntur intempestiuè, aut diuturniores sunt. Tamen si enim dysenteria pessimus sit morbus, quia tamen sæpe fluor est quidam, ratione autem floris multa è corpore euacuatur, multaque qualitate praua, nullum tamen negotium naturæ (quia quietem habent, imòque delitunt corpore) facessentia continuata serie ad motum incitantur, sit ut si illa repente, commota iam tamen, supprimantur, corpori periculum creent. Ita enim scripsit summus præceptor,

Dysenteria quæ cessauit, abscessum vel tuberculum aliquod faciet, nisi ^{4. de diarr.} *vel in febres, vel in sudores deserit.* Et in Coacis; *Dysenteria intem-* ^{acus. par. 80.} *pestiuè suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut articulis facit.*

Vt autem *Δυσεντερία* suppressa comites habet morbos, ita si longior, ei non desunt qui ius hæreditatis sibi decernant. Quocirca Aphorismo illo lib. 6 Aphorism. inappetentiam tanquam malum longæ dysenteria *ἐν τῷ σπλῆνι* scribebat. & in alio loco ita scripsit, *Qui lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, iis superue-*

niens longâ dysenteria, hydrops, aut leienteria superuenit, & moriuntur. ^{Aphor. 43. lib. 6.}

Vbi notanda verborum Hippocratis proprietas. Quid enim si bi hoc vult, *Qui lienosi à dysenteria capiuntur, iis superuenien-*

te longâ dysenteria? nam non potest superuenire si iam adsit: debuitque dicere potius: *Quibus lienosis superuenit dysente-*

ria, eaque productior fit. Ita excusari potest Hippocrates, ut verbum *ἐν τῷ σπλῆνι* non est hic propriè vsurpatum. Vel, quoniam laudatur dysenteria quæ superuenit lienoso si brevis sit, ut in

Coacis animaduertit Hippocrates, cum producit, debitumque tempus præterit, non iam amplius dysenteria splenica vocanda est, sed per propriam intestinorum affectionem fit, humoribus cuniculos agentibus, & vtrò progredientibus. Pro-

pterea quæ noua quodammodo dysenteria dici potest: sed hæc nihil ad rem. Itaque inappetentia, leienteriaque longæ dysenteria succedunt. An vtrūque affecto ventriculo, & malo quodammodo ventriculi œconomia (cuius est appetere, & coquere

cibos, ideòque leienteria propria est ventriculi passio) labefacta cōtingit? Non videtur, si Galen. credimus. Et ideò fui ob-

litus Galenus, mihi in eo errasse videtur, quod mox explicabo.

268 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Nam cum de inappetentia dysenteriae longae succedente mē-
tionem iniecit, scribit; *ulceribus* (in dysenteria) *putrilaginis*
ventriculus compatiens in coctionis munere offenditur: quā offensio
magis ac magis ad superiora perueniente cum os ventriculi vna afficitur,
tum antea sunt. Itaque vult ad os superius ventriculi malum
peruenire. Et quomodo? dicit aliquis. An ulceratio hypar-
xin dysenteriae constituens ad os superius alui peruenit? Ne-
quaquam. Quomodo id fit? Cum autem de leienteria memi-
nit, non ad ventriculi vitium recurrit, sed ad intestina sola.
Verba huius haec sunt: *Lesio intestinis à transitu vitioforum humo-*
rum vis eorum laborat, & temperies natui caloris aboletur; hinc hydrops,
& leienteria. Leienteria quidem ex sola intestinorum laesione: hydrops
ob hepatis sympathiam, &c. An sola *λενitas*, id est, oblatio sola
intestinorum in longa dysenteria leienteriam facit? Si in tali
morbo inappetentia contingit cum malum ad os ventris at-
tingit (ut ante dictum est) cur non leienteria potius à vitio
ventriculi, quam solo intestinorum vitio? An solum intesti-
norum vitium leienteriam parit? Galenus taxat veteres quod
leienteriae tale nomen indiderint *ἀπὸ τῆς ἀτέλεις* *λεϊπτοῦς*, cum ta-
men vitium non intestinorum sit, sed ventriculi, ut pote ex
ius vitio coctio laedatur, eademque incolumis sit integro
ventriculo. Itaque illa erronea propositio est, qua statuit so-
la intestinorum laesione leienteriam contingere posse. Nam
& in primo aphorismo lib. 6. & aliis locis, ad ventriculū malū
affectum leienteria refertur. Quid ergo sibi vult Galenus
tam sui dissimilis? Bifariam responderi potest, & excusari
Galenus: Quoniam institutum est Galeni de dysenteria lon-
ga disputare, cui & hydrops & leienteria superuenit, quoniam
dysenteria ad sola intestina refertur, à sola quoque laesione
intestinorum leienteria nascitur, ut vnum & idem subiectum
sit & dysenteriae & leienteriae. Dysenteriae quidem per con-
scriptionem ulcerationis quandam in intestinis: leienteriae
vitio communicato toti intestinorum convolutioni, & diu-
turnitate dysenteriae affecta temperie intestinorum. Vel di-
cemus aliud esse à sola laesione intestinorum nasci leienteriam,
aliud à laesione solum intestinorum. Nam si sola intestina
diceret, excluderet ventriculum. At non est excludendus.
Tertiò dicemus *κατὰ τὴν ὁμοίαν* nomen leienteriae usurparum: &
quae hinc leienteria fit, non est vera, cuiusmodi ea est quae per

Apho. 3.
lib. 6.Com. in
Aph. 43.
lib. 6.Lapsus
Galenus.Com. in
Apho. 12.
lib. 4.Excusa-
tio Gale-
ni.

affectionem ventriculi contingit. Vel dicemus (& hæc vltima ratio probabilior videtur (illud *μόνον, & μόνω χάρασιν* dictum esse per comparationem morborum duorum, nempe hydropis, & leienteriæ. Nam cum hydrops longæ dysenteriae succedit, tametsi intestina malè à priore morbo afficerentur, non tamen ob vitium solum intestinorum inuehitur hydrops, sed per sympathiam hepatis, lienis, & totius generis nervosi, vt disertè scribit Galenus. Ac si diceret, cum contingit hydrops in longa dysenteria, non est illius generatio ad intestina referenda: nullus enim hydrops nasci potest nisi aut hepate, aut liene affecto, aut genere nervoso, vt apertius in Prognost. declarauit. Sed cum leienteria superuenit, à sola intestinorum latione est, id est, non oportet aut hepar, aut lienem, aut genus neruorum venosum compati, vt in generando hydero, sed per proprium, peculiare, & vernaculum intestinorum suis rugis & febris alimentum, donec elaboretur aliquo modo, retinentium, vitium leienteria contingit: non quin ventriculi vitium adsit. In confesso enim omnibus esse debet leienteriam non posse nasci nisi affecto ventriculo: Et cum meminit *κακίαν* intestinorum, non excludit

Com. in
Apho. 49
lib. 6.

Com. in
Part. 1.
lib. 2.
Prognost.

Subtilis-
sime Gal.
in
extensa-
tur.

sed *κακίαν χάρασιν*: sed omnia per comparationem duorum morborum intelligenda sunt. At inappetentia ad solum superius orificium ventriculi spectat. Quod Galenus explicat, dum symptomata vitalis emorientis ab Hippocrate recensita demonstratione illustret. Hermocrates (ait) perpetuè à cibo abhorrebat, loqui non valebat, lingua inaruit, non sitiebat, &c. Hæc omnia sunt *κακίαν χάρασιν*: deinde subdit Galenus in Commentar. Inappetentia, Græcè *ἀποσπία*, melius ciborum auersio vertetur, id est vt ait, *ἀποσπία*, aut à ventriculi ore proficiuntur affecto aliqua humorum qualitate, aut ab ipsius facultatis extinctione. Atque obiter annotandum est an *ἀποσπία*, aut *ἀποσπία* ad vitalem facultatem referatur, an non potius ad naturalem. Propterea pro verbo *ἀποσπία*, legendum potius *φθορά*. Coniectura verisimilis esse videtur. Tamen, vt dicam quod sentio, nomen *φθορά* melius & generalius mihi videtur à Galeno usurpatum, vt & *τὴν δύναμιν φθορὰν*, & *τὴν φθορὰν* complexu suo comprehendat.

Part. 12
sect. 1. lib.
3. Epid.

Redeamus ad institutum. Ex his symptomatis quæ dysenteriae longæ succedunt, sunt, inappetentia, leienteria, hydrops. Dictum est quomodo hæc fierent. Nunc autem vt aphorismus

tertius libri sexti intelligatur, ne temerè iudicent Medici de in-
appetentia quæ in dysenteriam incidit, eamque aut bono, aut
malo esse pronuncient; ita cum Diorismo res distinguetur. In
appetentia quæ in dysenteriam incidit, aut initio, aut affecto
iam morbo. Si initio, non ita in malis poni debet. Nam fieri

potest inappetentia primis morbi diebus ob ichoras confluen-
tes ab hepate (malè nomen *ιχθεις humores* vertit Leonicenus.)
Ex quibus qui ad intestina deriuantur, exulcerationem afferunt.

Qui in ore ventriculi fluitant, *αποστειναι* afferre solent. At cum in-
appetentia affecto iam morbo contingit, *νεκρωσις, mortificatio*

Com. in interpretor, ventriculo aduenisse lege sympathias declarat. Hec
Aphor. Galenus. Itaque vt iudicium de inappetentia in dysenteriam
3. lib. 6. incidente feratur, hæ distinctiones tenendæ sunt.

Missam fecimus variam acceptionem nominis Dysenteria, ne
quoties sanguis per inferiora educitur, dysenteriam adesse su-
spicemur: Nam & mutilis ob copiam sanguinis fit excretio per
alium, quæ dysenterica improprie vocatur: vocant autem
αιματηρην. Item quibus sanguis habet admistam bilem, aliquando
aperit, roditque oscilla vasorum, vnde fluit sanguis. Hæc autem
improprie quoque Dysenteria vocatur, nullumque nomen re-
perit, nisi sub *τὸν ὀξύς αἱματηρῆς* comprehendas. Quanquam hoc

*3. de sym-
pto caus*

nomen ad eam euacuationem, quæ ob quantitatem contingit,
accommodetur. Galenus autem indicare videtur & hanc & il-
lam *αιματηρην* appellari posse, hoc discriminis statuto, quod vna
dicatur *αιματηρῆς* ob sanguinis copiam, altera ob qualitatem. Quod
autem ea quæ ob qualitatem fit, *αιματηρῆς* quoque dici possit, col-

*Com. in
apho 65.
lib. 5.*

ligi potest ex Commentario in 5. Aphorismorum. Nam dum
Hippocrates narrat ea symptomata quæ contingunt iis quibus
circum vlcera tumores sunt, & de repente euanescent, memi-
nit Dysenteria non proprie dictæ, sed quæ *αιματηρῆς* vocatur.
Nam vlcera aut partes posticas corporis, aut anticas occupant,
tumoresque iis assident, aut euanescent. Si in posticis, conuul-
siones fiunt tumore disparente, aut tetani: si in anticis, infania,
dolor lateris acutus, suppuratum, difficultas intestinorum. Ho-
rum hæc demonstratio, quia posteriora nervosa, anteriora vero

*Aph. 69.
lib. 5.*

venosa ac arteriosa: ideoque alio loco dictum erat, *Mulieribus
rigores ex lumbis magis & ad dorsum, &c.* Quod contingit & quia
pars illa nervosa, & frigida, & facile compassionis modo ad
principium nervorum affectio fertur, & quia substantia mol-

loris est, facile alterationem suscipit: At partes anteriores calidiores habent temperaturam, ait Galenus. Si itaque tumores, præsertim si *ἡπαρ* sint, evanescent in partibus anterioribus dolores lateris & dysenteria fiunt *αἱματὴς*, id fit per *μυελὸς*, cuius maximè ratio habenda in morbis, an eam dysenteriam probabile est fieri à sanguinis tantum copia, an verò à sanguine multo, sed iā malā qualitate prædito? Si enim nondum contraxisset malam qualitatem, non tristia illa symptomata afferret. Ergo credibile est illam dysenteriam à qualitate & quantitate sanguinis contigisse. Sic ex eo loco patet dysenteriam à qualitate sanguinis factam nullo in intestinis concepto vlceris, *αἱματὴς* dici posse, non eam solam quæ à quantitate sanguinis fit. Vtitur enim Galenus nomine *ἡ δὲ σπένδα αἱματὴς*.

Præterea hepatici sæpe excernunt sanguinem nullo intestinorum vlcerato, tamen non dysenteria propria, sed hepatica dicitur dysenteria: & illa est de qua antè dictum est, quam Hippocrates vocat *μεῖνιτον ἡπαρ*, vt Galenus Comment. in part. 2. *Prorrh.*

Prorrheticorum demonstravit.

Quid ergo restat de dysenteria dicendum, paucis aperiri debet quo excretionis modo significetur obsideri intestinum superius aut inferius: quod & deiectiones, & doloris situs & species declarabunt. Præterea quid de dysenteria scripserit Hippocrates, præsertim in libris Prorrhetic. Varietas intestinorum efficit vt & tenesmus, & dysenteria non facile sedem affectam privatim significant, ait Galenus. Item affinitas affectuum efficit quominus minus facile hepaticus fluxus à dysenterico distinguatur. Sunt quidem notæ nonnullæ, quibus distinguere possis. Etenim in dysenteria paulatim & cum torminibus excretio fit, & subinde desurgendi necessitas adest: quod in hepatico fluxu non contingit. Et mirum quod scribit Galenus eodem cap. Dysenteriam hepaticam à dysenteria propriè dicta, quæ in vlcere consistit, in eo distingui, quòd dysenteria propriè dicta non repente & affatim fiat, sed sensim, cum vlceris sua habeat tempora, & quædam rudimenta habeat: quod in dysenteria hepatica non vult contingere; quasi verò hepatica dysenteria non habeat quoque sua tempora, & non imbecillitas illa à qua nascitur ille affectus, inducatur ex longo tempore. Quod si verum est, nulla planè est Galeni distinctio de vtroque affectu constituta. Nec hunc locum planè intelligo, nisi de excretionis modo

C. p. 2.
lib. 6. de
loc. aff.

272 CONSILIORVM MEDICINALIVM
quam de generatione potius intelligatur. Aut hæc accipiuntur
non ita strictè. Huius rei iis iudicium relinquo, quibus acuties
ingenij maior inest. Ergo excretionis modus, & dolorum per-
ceptio in variis partibus, & varia contèta, varièque mixta mor-
borum sedem satis indicant: ac primùm in doloribus & sitis, &
species consideranda: situs quidem, si in partibus superioribus,
aut inferioribus consistat dolor. Nam prout partes superas, aut
inferas tenet, ita aut tenuia, aut crassa intestina dicuntur occupa-
re. Sed qui in Anatome versati sunt, aiunt hanc situs confide-
rationem pili esse faciendam. Intestinum enim colon in crasso-
rum intestinorum censu habetur, & tamen si quis in eo dolor
sit, non dicetur deprehendi ex situ inferiore. In hominibus stoma-
chi vicinum est colon ventriculo: vnde in colicis doloribus stoma-
chi subuersiones, & vomitionis assiduitas. Quid ergo sibi vult
ille situs superior, aut inferior? Præterea quod ad speciem do-
loris attinet, quæri potest, an dolor in superioribus, re-
tenuibusque intestinis sit aut maior, aut minor, quàm qui in cra-
ssioribus confedit. Primùm ex Anatome disci debet tenuium
intestinorum tunicas rarâ ac tenui substantiâ constare, & inte-
stina illa, quæ membranosa sunt, exquisitoris esse sensus quàm
sint crassa; quippe quæ carnosæ sint magis. Si exquisitor in illis
quàm in his sit sensus, dolor qui in tristi sensatione consistit
maior erit, ac manifestior in tenuibus quàm crassis intestinis. Ac
propterea Galenus vehementissimos dolores in tenuibus inte-
stinis perferri. Contra tamen & rationem Anatomæ, & com-
munem sensum, & sententiam Galeni locus alius stabit ab eo-
dem Galeno scriptus, cuius hæc verba: *Ex doloribus ij. qui vultu-
mentissimi sunt, haud abs re in crassis erunt intestina.* Qui verò ma-
iores sunt, horum duorum alterum esse necesse est, aut quod in
mansuetiore minoreque causa sunt, aut quod non in crassis, sed
in tenuibus sunt intestinis. Hoc ex loco sole clarius apparet do-
lores grauiores deterioresque esse in crassis quàm tenuibus in-
testinis, positis omnibus paribus: alioqui distinctionis omne fun-
damentum nutaret. Sed locus ille planè falsus & erroneus esse
nisi intelligatur. Institutum Galeni est de colicis doloribus à ma-
teria crassa frigida, lentâque disputare: cum enim cumulanda
crassæ, crudæque materiæ locus sit opportunus, Colon intelli-
gitur, idè & ratione loci, qui amplius est, distenditur vado-
& materiæ quæ in eo congeri solet, cum vehementissimi sint do-

Cap. 2.
lib. 6. de
loc. aff.

Cap. 5.
lib. 2. de

dolores, coniiicimus in colo esse; si mansuetiores, aut in tenuibus sunt, utpote in quibus non soleat illa pituita cumulari; aut in colo sunt, sed à minore causa. Sed dicet aliquis, si in tenui & crasso intestino eadem crassa materia ponatur, à qua dolor, an non crudelior dolor in tenui, quàm in crasso? Verum quidem esse videtur. Sed in tenuibus intestinis non illa congeritur materia: propterea accommodatè admodum facit sententia Galeni in lib. de locis affect. Omnes, ait, & Medici, & populares vehementissimos dolores ad colon referunt, & colicos vocant. Quod mihi verisimile videtur, ait Galenus. Nam non ut in vteribus lapides im-

cap. 2 lib. 6.

posito lapide dolores excitantur, ita in tenuibus intestinis frigidi spiritus & humores retenti gravissimos dolores excitant. Nam cum tenuium intestinorum tunica sit rara, diu huiusmodi causas, id est, crassos humores continere non possunt. Probabilius ergo eum crassum humorem in crasso intestino genitum, egredi nequeuntem dolores hos mouere. Vehementes quidem ob intemperantiam, & corporum crassorum tensionem: longos, quia difficulter vacuatur.¹² Hoc ex loco patet superiorem sententiam de grauitate doloris in crassis intestinis intelligi de materia frigida quæ & generationem peculiariter hinc habet, & maintenance. Attenuia intestina, quia à bile tanquam clystere naturali eluuntur, non generant; & si habeant, non diu retinent; ut placet Galeno. Non enim negare oportet quin si acres mordacesque humores in tenuibus intestinis retinerentur, aut crudeliores dolores, aut pares saltem excitarentur ac si eadem materia in crassis retineretur: sed peculiariter & crassæ materiæ crassa intestina sunt promptuarium. Ideò, ut annotat Galenus, in tenuibus intestinis acerbissimi dolores sunt (ut in ileo) aut cum inflammatio est quæ obstruit intestinum ut nil transeat, aut reificatum omnino stercus. Quanquam contrà id quod dicimus, in tenuibus intestinis non posse eam phlegmonem generari, quæ quo Galenus docens asperæ arteriæ phlegmonem posse quidē difficultatem spirandi afferre, sed strangulationem non posse inducere, scribit: Impossibile est corporis multum tenuis inflammationem spatium effatu dignum replere. Tenuia intestina, per eundem Galenum 6. de loc. affectis, tunicam habent raram admodum: Ergo quamuis in ea concipiatur phlegmone, non potest viam obstruere. Locus est notandus.

Com in Apho 3. 4. lib. 4.

His ita positis, ad reliqua pergendum est, ac de missionis modo.

Tom. I.

M m

274 CONSILIORVM MEDICINALIVM

lib. 1. de
loc. aff.
4. cap. 1.
6.

Cap. 4.
lib. 1. de
loc. aff.

Aph. 35.
lib. 7.

do dicendum. Galenus excretionis modum considerauit: item quæ excernuntur: præterea qualiter misceantur quæ excernuntur. Hæc autem vocat Galenus eo loco, vlcis notas admittas, aut non admittas, parum aut multum admittas. Si quæ excernuntur membranosa magis sint, à tenuioribus intestinis excretio fit; si autem purulenta magis & carnosæ ab intestinis crassioribus. Et quod ad tempus excretionis pertinet, si postquam dolor in partibus perceptus est, breui post tempore desideat æger, à partibus propinquis secretio fit: contra verò euenit si à longinquis partibus humores exiuerint. Præterea notæ vlcis, vel sanguis, aut tota totis excrementis sunt mixta, aut per se, & veluti sola in sese coacta comprehensaque excernuntur: si partium omnium quasi minutim concisarum ac confractarum mixtio fiat, à superioribus intestinis vacuatio fit: si aut sanguis, aut pus secretum videatur, & per se solum existens, in sese coactum, à propinquis partibus materia deraditur, huiusmodi excretionem dicimus fieri aut ἀσπρόν, aut non. Quod vt intelligamus, afferri potest sententia ex Aphorismis Hippocratis: *Quorum in urinis supereminet pingue aliquid, idque ἀσπρόν, id est confertum, totumque in sese, iis renes laborant: ἐμίσχον, dicitur ἀσπρόν, aut pus τὸ ἀσπρόν, cum non est diuulsum, diuisumque, sed compressum, coactum, collectumque in sese.* Galenus in Commentat. docet, cum à partibus corporis decedit aliquid crassum vna cum liquore, aut etiam sine eo, ob viæ prolixitatem non potest suam coherentiam ac continuitatem retinere, sed refringitur, diuiditur, diuelliturque. Cum autem à propinquis partibus emanat, coadunatur, coitque, ac in sese compingitur: hoc autem dicitur ἀσπρόν & ἀσπρόν excerni; quanquam in nostris definitionibus Medicis ἀσπρόν longè alias differentias & significationes exposuimus.

Pleraque in nostris monumentis de differentiis alui florum, siue sint vniuersales, siue particulares, siue cruenti, siue coeliaci, siue hepatici: quæ omnia hîc meminisse non vacat. Tantum huc afferemus syluam aliquam remediorum non sine iudicio usurpandorum, sed cuique pro diuerso tempore morbi, & varia corporis constitutione accommodandorum. Illa quoniam nos in usum contulimus, & ab aliis usurpata vidimus, relictis omnibus diorismis qui in dysentericis floribus curandis sunt considerandi, nudam remediorum tabulam proponemus. Et

fortè primo loco ponemus quæ astringant, non quòd ita statim faciundum putemus in eorum erroribus nosipfos implicantes, quibus irretitos veteres Galenus scribit. Illi enim omnem dysenteriam per sola astringentia, idque initio morbi curabant. Quod pessimum est, cum dysenteria intempestiuè suppressa sit calamitosa Hippocrati.

In fluxu hepatico:

℞ ol. de absynthio ℥ i. f. olei rosati ℥ j. santalor. omn. pulueris. ℥ s. assa odorata ℥ j. cum cera. fiat linim. pro hepate.

℞. carnis cyton. mastich. cerot. confortat. an. ℥ vj. ladani in vino soluti ℥ ij. cyp. aloes lotæ an. ℥ j. Malaxentur cum ol. de absynth. & rosat. fiat massa emplastri pro stomacho.

Item ℞. pulp. passul. damasc. ℥ j. f. carn. myrobal. emblicar. per se. taceum transmissam, h. pat. vulp. prepar. an. ℥ iij. rasur. ebor. ℥ j. sacch. ros. ℥ j. cum syrup. de cichor. compos. sine rheo. fiat opiata: vsus sit ℥ s.

Ad dysentericos fluores valent clysteres, in quibus sepum hircinum prius solutum oleo rosato dissoluatur.

℞. Syrupi rosar. siccat. ℥ j. syrup. de papau. ℥ s. cum decoct. papau. fiat potus.

Item ℞. rhab. puluer. ℥ ij. dissol. in aq. rosar. fiat potus.

℞. lact. vstul. cum calculis fluuiatilibus lib. s. muccag. sem. citrij, hordei & psyllij extract. in aqua centinodia ℥ ij. coaguli de quo casei fiunt, boli armen. amygd. an. ℥ j. f. vitell. oui vnum. fiat clyster.

Fru sex plantag. althea, seminib. & calidis & frigidis valent.

Item hoc quod sequitur:

℞. coriandri ℥ s. anisi ℥ ij. rosarum rubr. cort. citrij, carnis cytonior. exsiccat. an. ℥ j. sacchar. ros. quan. suff.

℞. ras. vnicor. gr. s. cum destillato restaur. fiat potus.

℞. Syrup. ros. siccat. ℥ j. diacod. cum addit. ℥ s. cum decoct. lactucæ. fiat potus.

Paratur hordeatim incoctis duobus capitibus papaueris, & positis in nodulo

℞. conser. rosar. symphyt. cornelio. nenuph. an. ℥ s. puluer. triasant. diatrag. frigidi, diarrhod. Abbat. an. ℥ j. trochisc. de karab. & spod. an.

℥ s. passul. cum roto ℥ ij. seminis papau. albi ℥ j. f. aqua decoct. duorum

pullorum in aqua pluuiali ferrata alteratorum cum lactuc. portul. buglos. borag. foliis plantag. lib. viij. Pone in alambico cum mica duorum panu

infusor. in lacte. sicut destillatio in baln. Marie.

℞. præd. destillat. lib. s. sacchari ros. ℥ ij. vini granat. ℥ s. cinamo.

℥ s. p. asser. per manic. Hippocr. vtriusque omni hora.

Mm ij

276 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞. conseru. rosar. ℥ ss. myrobalan. citrin. condit. ℥ ij. rosar. elor. cor.
cerui. coral. rubr. an. ℥ ss. sacchar. ros. quod suff. fiat conditum.

Item parata sunt hordeata cum lacte vaccino.

℞. myna cytonior. ℥ ij. capiat cochlearia duo ante pastus.

℞. sumach. ℥ j. granor. berberis ℥ j. facti sunt noduli impositi per
sedem.

℞. ol. commun. lib. i. cera alba quod suff. pistetur in mortario affan-
dendo aquam frigid. fiat unguent.

℞. decoct. fact. ex ros. rubr. plantag. verbas. sem. portulac. acetos.
rosar. florib. chamem. dissolut. ex mucag. sem. cytonior. extract. in aqu.
solatriq. s. album ouor 3. ℥ ij illius predicti ceroti refriger fiat for.

℞. olei nucis mosc. ℥ ss. pro stomacho.

℞. rad. alih. lib. s. coquatur in lacte ad lib. ij.

℞. predict. decoct. lib. j. mucag. semin. cyton. extract. in aqua plan-
tag. axungie anser. an. ℥ ss. mellis ros. ℥ vj. sacchari comm. ℥ ij. croci ℥ ss.
fiat clyster.

℞. olei ros. cyton. & mastich. an. ℥ vj. coral. rubr. & gallie mosc. an.
℥ j. cum cera. fiat linimentum.

℞. terra sigil. ℥ j. boli armen. ℥ j. syrupi rosar. siccar. ℥ j. aqu. rosar.
℥ ij. fiat potus.

℞. puluer. pudendi ceruini ℥ j. sacchari ros. ℥ j. fiat puluis.

℞. far. fabar. ℥ ij. rosar. rubr. mastich. an. ℥ ij. carnis cyton. ceroti
stomach. an. ℥ j. s. cum oleo cyton. fiat emplastr. pro stomacho, & toto vtre.

℞. conseru. rosar. ℥ j. philo. roma. ℥ ss. terra sigil. ℥ j. corall. rub. ℥ ss.
cum saccharo. fiat bolus, capiat hora somni.

℞. corticum myrob. citrin. ℥ ss. passul. ℥ ij. glycyrrh. ℥ j. s. plantag.
m. s. in colat. dissolue syrupum de cichor. compos. cum rheo ℥ ss. s. rheo.
puluer. ℥ ss. philonij rom. ℥ j. fiat potus.

℞. aqu. decoct. sumach. & vnius myrobal. plantag. rosar. berberis ℥
ij. in quitus dissolu. boli armen. loti in aqua rosar. ℥ ss. syrupi rosar. siccar.
& cytonior. an. ℥ ss. trochisc. de spodio ℥ j. fiat potus, capiat sero.

℞. philonij rom. ℥ ss. syrupi cyton. ℥ vj. trochisc. de Karab. ℥ j. cum de-
coct. sumach. rosar. plantag. fiat potus.

℞. corticum myrobal. citon. cebul. an. ℥ ss. fiat decoct. in aqua centino-
dia. In colat. dissolue syrup. rosar. siccarum ℥ j. aqu. arnoglos. ℥ j. s. fiat
potus.

℞. myrobalan. citrinarum contus. cum amygdalis ℥ ij. fiat decoct. in
aqua plantag. In colatura dissolue earumd. myrob. pulueris. ℥ j. mibris-
datij ℥ ss. syrupi de cyton. & menth. an. ℥ ss. cornu cerui vsti ℥ j. fiat potus.

aromatizatus cinam.

℞. cypp. calami aromat. schenuath. caryoph. an. ℥ss. rosar. rubr. menib. absynth. folior. myrtil. an. m. j. sem. anisi, fœnic. cumi, an. ℥ iij. balaust. ℥j. includantur sacculo: fiat decoct. in aqu. fabror. & vino stypt. pro fotsu ventri.

℞. ros. rubr. absynthij, an. m. j. cypp. ℥ iij. sumac. balaust. nucum cu- press. myrtill. an. ℥ j. gallar. ℥ss. fiat saccul. qui bulliat in aqua & vino rubro: adde aceti rosati ℥ ij.

℞. succi plantag. depurati, centinodia, an. ℥ ij. boli armeni loti in aq. ros. ℥ss. trochisc. de Karab. ℥ j. syrupi myrtil. & cyton. an. ℥ss. fiat potus.

℞. ole. mastich. de absynth. de menth. ceroti stomach. an. ℥ iij. olei nucum mosc. ℥ j. caryophyl. & pip. an. gr. vj. fiat unguent. pro stomacho.

℞. ceroti santal. vnc. ij. mastich. carnis cyton. an. ℥ss. rosar. rubr. un- guenti comitiss. an. ℥ ij. Fiat emplastr. cum puluere lapid. calam. & bolo.

℞. carnem vniuers. perdicis, dimidiā partem capi, vit. lline carnis fru- sum vnum, folior. plantag. scabiose, card. an. m. j. semin. berberis, cy- ton. & semin. frigid. maior. an. ℥ss. conserue rosar. rubr. de ribes. conser- buglos. & res. an. ℥ss. mice panis ℥ iij. Includantur omnia vase figulino, coletur. in colat ad lib. duas dissolu. succi granat. succi ribes, an. ℥ ij. s. frequenter utatur.

℞. olei mastich. cyton. & ros. an. ℥ss. pulu. rosar. rubr. corall. rubr. an. ℥ss. galange ℥ j. cum cera noua in aqua plantaginis lota. Fiat linimen- tum pro ventriculo ad regionem umbilici.

℞. sar. fab. ℥ ij. ros. rub. mastich. an. ℥ iij. carnis cyton. confortat. gal. an. ℥ss. s. cum oleo cytonior. fiat emplastrum pro ventre anteriore. Ap- plicetur aliud parti postica.

℞. emplastri de gallia cum significationibus caliditatis ℥ iij. terra lem- nie, coral. puluer. an. ℥ j. boli armeni, carnis cyton. an. ℥ss. s. cum ol. ma- stich. Fiat unguentum pro ventre toto.

℞. plantag. sumach. balaust. ros. an. m. vnum. fiat decoct. pro dosi. In colat. dissol. trochisc. de spodio & Kar. boli arm. an. ℥ss. syrupi res. succ. ℥ j. philony romani ℥ j. fiat potio.

℞. coral. rub. puluer. trochisc. de spodio & Karab. cum ℥ ij. gummi tragacan. vsti, boli armen. loti aqu. ros. ℥ss. syrupi cichor. & cytonior. an. ℥ss. opy gr. ij. cum decoct. plantag. fiat potus.

Item ℞. pilul. de cynoglos. scr. s. Capiat ex syrup. de siccis.

℞. succi plantag. depurati ℥ iij. trochisc. de Karab. ℥ ij. boli arm. loti in aqua rosar. ℥ss. trochisc. de spodio ℥ j. syrup. myrtil. ℥ j. fiat potus.

Valeat hic clyster in summis doloribus.

M m ij

278 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞. capitata papau. tapsi m. j. rosarum, m. j. radicis alibex ʒ. j. coquantur in aqua. dissol. lactis lib. s. puluerem duorum ouorum induratum, pro tribus iniectionib. in ventrem.

℞. rosar. rubrar. sumach. balauft. & nucum cupress. galla. corticum granat. an. m. j. sem. berberis ʒ. iij. alumin. ʒ. iij. fiat sacculus qui bulliat in aqua fabror. adde aceti ʒ. ij. Ceratum santalinum malaxatum in oxycrato aut oxyrhod. applicitum hepati confert.

Pleni sunt libri remediis quæ ad dysenteriam apprimè conferunt, siue detergendum, siue leniendum, siue in crustandum, siue abluendum, siue incarnandum: denique pro variis scopis quos intueri possumus.

Solum hoc annotandum de dysenteria, quod aliò animum cōuertentes, ad cætera adlicere non meminimus, conscripserunt esse caput de ea ab Hippocrate lib. 2. Prorrheticon. in quemlibet Galenus Commentarium non conscripsit. Quod eo a Galeno factum videtur, vel quia illum librum Hippocratis esse non putaret: quanquam hæc ratio ieiuna videatur, cum ne alibi librum priorem ipsius esse existimet, quem tamen scholiis illustrauit: aut quia clarior videretur, vt & reuerà est, quam vt in conscribendis in eum commentariis opera infumatur: aut conscripsit & concinnauit, sed ij iniuriâ temporis exciderunt, aut blatis & tineis esca sunt apud eos qui nimium publicæ utilitatis inuidentes, malunt nescio cui commentario oscitanter indormire, quàm eius partem suis communicare. Satis est locum Prorrhetici indicasse, vt ex eius penu quod lubet, & semel subindicatum est, cùm volumus, depromatur.

ANNOTATIONES.

1. Galenus hunc nodum soluit cap. 17. lib. 2. de different. febr. Cuius pars imbecilla est, & aliunde in hanc humor influit, hic humor si pars bene affecta esset, alimentum foret, sed quia laborat est illi potius onus quàm nutrimentum, ait Galenus; vnde non mirum si corrumpatur.

2. Tamen cap. 1. lib. 6. de loc. affect. vult faciliè aut saltem faciliè per comparationem deprehendi tumores & inflammationes lienis, quales hepatis. Et quod ad simarum hepatis inflammationem spectat, non adliè difficulter cognoscantur, quia simarum inflammationes cum gibbis partibus communicant.

3. Galenus loquens de intemperie hepatis, cap. 7. lib. 5. de loc. affect.

ait: Calida hepatis intemperies cibos in eo contentos, & eos qui per venas mesenterij deferuntur adurit: frigida contentum iam in iecore humorem crassum contumaciorem reddit: id quod affertur semicoctum reddit arida sicciores, crassioresque, humida tenuiores.

4. Notanda vox, (non solum propter ea quae dicta sunt) supp. Nam hinc patet ob affectionem peculiarem ipsius mesenterij attractionem non fieri.

5. Galenus comment. in part. 2. lib. 2. Prognost. docet fluorem alui se-qui ex inflammatione mesenterij, & hydropem, tribus de causis. Locus est notandus. Omnium autem amplissime de distinctione hepaticorum & mesaraicarum excretionum, cap. 7. lib. 5. de loc. affect. Galenus.

6. Tamen in doctrina Galeni, intestina unam tantum habent facultatem: quomodo ergo leicenteria horum vitio contingit?

7. Inappetentia ad facultatem vitalem à Galeno refertur.

8. Comment. in part. 38. sect. 2. lib. 6. Epid. notat ichorem dici bisariam: & pro aqua substantia quae circumfluit crassiorem partem cuiuslibet humoris, & veluti est & horum, cum malignam qualitatem humor ille adeptus est, à quo ichore mali morbi.

9. Sub finem libri de veteri medicina, certissimo argumento colligere posui & minores esse dolores in intestinis quam sint in hepate, & regione tui & frequentiores esse in hepate. Nam quia hepar tenerum est, (ἀπαλὸν Gracis) & sanguineum viscus; ideo magis sentit. Intestina nervosa sunt, membranosa, fortiorque, ideo magis resistunt.

10. Ab ea parte qua dolor sentitur, nullum iudicium sumi potest quo intelligas colo intestinum potius quam tenue affici ac laborare. Ait Galenus ca. 5. lib. 2. de loc. affect. quod falsum videtur. Nisi quis dicat generaliter ex vehementia doloris dicere nos posse tenue quam crassum intestinum laborare: si enim vehementissimi dolores, credibilis esse in crassis intestinis sed peculiariter à parte affecta non possumus indicationem sumere ut in dicemus colon potius laborare quam aliquod ex tenuibus intestinis.

11. Quo pacto dolores in intestinis excitentur ob revolutiones eorum dē; Hippocrates libro de veteri Medic. sub finem explicavit.

12. Ex cap. 5. lib. 2. de loc. affect. tenuitas corporis intestinorum efficitur non diu humor crassus retineatur: quod contingit in crassis. Ideo Galenus loquens de dolore colico quem patiebatur, ait. Neque tanquam per tenue corpus brevis temporis spatio dolor transibat, sed quasi à profundo per crassius corpus ferebatur, quam sit tunica tenuium intestinorum. Tamen ibidem ait; Nullum à parte à qua dolor excitatur, aut quā sentitur iudicium sumi, ut magis tenue quam

280 CONSILIORVM MEDICINALIVM
crassum intestinum affici intelligamus. Quod falsum est, & iis qui
hic dicuntur contrarium. Nec video quomodo coherere possit, nisi forte
revolutionem coli intestini dicat fieri non posse ut si peccetur situs doloris
indisemus aut colon intestinum laborare, aut tenue aliquod. Et nisi
locus audiatur, non eum possum explicare. Situs enim fallax omnino
nam ileum intestinum infra umbilicum ferè totum est: ergo ex situ
colliges.

CONSILIUM LIV.

De Angina.

CONSTITVTIO aquilonia impensè frigida & sicca fœu-
rat, cum in hominum genus magna morborum vis inuasit,
ac præsertim febres, cum magna perfrigeratione, calescendo
frigescendisque erat vicissitudo, & crudor quidam, ut Aristote-
les 1. Problematon 9^o, & 10^o problemate annotauit. Ille autem
crudor, Græcis σπένδαλος, maximè ob frigidam, siccam, aquilo-
niamque constitutionem solet contingere. Pleuritides gra-
tæ sunt, peripneumoniæ, pulmonumque variæ affectiones, præ-
sertim cum defæcatione inter cætera tussis & rauedines, præsertim cum defæcatione
te hyeme quæ in summo squalore & rigore frigoris congelata
conglaciataque fuerat, fundiliquarique cœperunt. Inter cætera
ra ophthalmiæ multis ποσόνες, multis ξηροί, ut quæ in ficcitatibus
αὐχμὲς Græci vocant, contingere solent: item deglutien-
dum quædam difficultas cum febre, linguæ scabritie, totius oris squalore
quodam, iunctâ virium infirmitate. Atque de hoc tertio
agere institutum est; nam & cum nil appareret in faucibus, & tamen
men deglutire aptè non possent ægri, nec solemnium remedia-
rum usus quicquam conduceret, id ipsum nobis medicamentum
facientibus plurimum negotij dedit. Tres nobis videre contigit
in quibus nil apparebat rubrum in faucibus, nil extrâ: non er-
gendi capitis vlla necessitas, & tamen per quindecim dies sum-
ma vlla tussi, sine excreatione manserunt, cum linguæ & totius oris
ad mediam ferè asperam arteriam squalore, ficcitate, non cal-
ore villo effatu digno, sine tumore villo, & tamen nil alleuabatur
tur. Hippocrates quidem part. 20. lib. 3 Prognosticon, meminit
cuiusdam synanches quæ ægrum in periculum non conuertit

non laborat guttur, sed in fauces, aut in ceruicem, aut in vtrāque fluxio fit: maximaque ex parte ceruix & pectus ruborem contrahunt. At talis fluxio *sacer ignis* ab Hippocrate vocatur, quod erysipelatodes sit. Nec dolent vehementer, nec difficulter spirant, cum guttur non perpetiatur. At in nostris agris nullus rubor in ceruice, aut pectore, sed tantum nescio quid superficiei tenus in faucibus & circum vuluam apparebat: dumque salua deglutiebatur, difficultas quædam erat. Item partic. 17.

3 Progn.
part. 17.

lib. 3. Prognost. meminit faucium exulceratarum in febribus, quod nos aliquando obseruauimus, cum & à capite rodens humor defertur exulcerans, & postea vi febris rursus summittitur humor, qui ob calorem febrilem acrimoniam acquirens malum continuet atque protrahat. Sed nil in agris nostris tale apparuit.

Quid ergo fuit quod illis tantam molestiam pareret? Illa difficultas, quæ aliquid *συναλγνόν* in se habebat, & fortè ad synanchen referri potest (generali enim nomine quicquid nonnullam difficultatem spirandi affert, aut circa guttur, aut fauces, illud synanche nominatur Galeno comm. in lib. de diæta acutor. Sed vnde illa difficultas, cum nec magnus dolor, nec phlogosis apparet, immò nec tumor, aut phlgmonodes aut pituitosus, nil erysipelatodes apparebat; & tamen maxima est siccitas, nil resudate, nil excreto, squalor est, & languent admodum ægri. An hic morbus angina sicca, aut biliosa, aut morbus siccus vocabitur?

Com in
par. 3. lib.
p. de diæta
acut.
Aph. 16.
lib. 3.

Reperio apud Hippocratem nomen *τὸ ξηρὸν* multis rebus attribui, & magnam vim habere, immò maiorem fortè quàm quis existimet. Si liceret orationis vela pandere, multa ea de re disputari à nobis possent. In aphorismis multis in locis inuenio *ξηρὰ μὲν ἐστὶν, & ὁξυδαμνία ὁ ξηρὸς*, quæ eadem & *ξηρὰ* dicuntur, *ὁ ξηρὸς ὁ ξηρὸς*. Item apud Hippocratem 4^o de diæta acutor. *ξηρὰ ἔστιν ὁ ξηρὸς*; & apud eundem Hippocratem, anginam reperio *ξηρὰν, πικρὰν* (ita enim eas voces admittit Galenus clarioris doctrinæ gratiâ, vt distinguatur ab ea angina, quam *νεφελικὴν* appellari volunt. Et illa angina à nitroso humore fit, qui non fauces obsidet tantum, sed musculos à tergo, vt paulò post explicabimus, orthopnoeamque parit, *ὅτι τὸν ξηρὸν τὰ πολλὰ*, ita tamen vt nil appareat. Notanda hæc vox *ξηρὰ τὰ πολλὰ*; nam & in 4^o Aphorismorum, periculossimam quandam anginam video, *ὅτι τὸν ξηρὸν τὰ πολλὰ ἔστιν*, vnde strangulatio, accedente quoque febre quæ eam siccitatem adaugeat. Præterea in 1. de Diæta

Apho. 12.
lib. 3. ES
Apho. 14.

Part. 3.
lib. 4. de
diæta.

Tom. 1.

Nn

acutor. τὸ νόσημα ξηρὸν καὶ ὑγρὸν reperio. Quoniam verò in sensu om-
 nes hæ sententiæ, in quibus τὸ ξηρὸν reperitur, accipiuntur item
 & hæc in qua Hippocrat. periculi iam aduenientis signum dat,
 in iam perniciosi morbis, ait, parui tremores, & vomitus argi-
 ginosus, qui in potibus substrepunt, & τὸ βορβορῶδες ἐκέρχεται, & πάλιν
 πρὸς κατὰ κράτος; id est, in siccis submurmurant, & deglutunt
 difficulter. Duretus illud τὸ βορβορῶδες ἐκέρχεται refert ad murmur
 hypochondriorum, vt murmur illud sit ob inflammationem
 diaphragmatis in sympathiâ cerebri tracti: ego verò nō ad mur-
 mur ob inflammationē diaphragmatis refero; quanquā scio bor-
 borygmum inde nasci posse, sed cū & strepitus in bibendo, &
 difficilis deglutitionis meminerit: ego illud murmur ἐκέρχεται, in sic-
 co, refero ad id quod apparet sæpe in delirantibus, in quibus la-
 ryngis muscoli siccati sunt, vt non amplius motū facillē præstet
 nec obediunt. Nam cū bibunt illi, & delirant, pars aquæ quæ
 descendit quodammodo in præceps cum sonitu, in vacuo & in-
 ani descendere videtur: obauditurque murmur & borborygmus
 circum præcordia, siccatis musculis, & liquore rectā descen-
 dente, nil administrantibus illis musculis. Sic illa vox, ἐκέρχεται, ad
 difficilē illam deglutitionem potest referri, cū tanta siccitas
 sit, vt musculi inertes sint, & propterea auditur sonus & mur-
 mur, ac si in cauum aliquid aquæ coniiceretur.

Nunc singillatim explicemus vocis illius ξηρὸν significationes,
 vt tandem de angina, aut potius de dispositione anginosa ora-
 tio nostra terminetur. Ia enim Medicis debet constare, quibus
 incumbit ex officio morbi ideam causamque animaduertere,
 qua ex causa difficultas deglutitionis pendeat. Nec enim audito
 anginae aut difficultatis deglutiendi nomine statim ad secandas
 venas anulares, ac gibberi accedendum: cū aliās à materia hac
 aut illa, aliās à nescio qua intemperie illa difficultas deglutiendi
 oriatur. Vnde autor lib. 4. de diætâ acut. duas anginae species
 facit à materiæ diuersitate desumptas: vt cognitis ideis morbo-
 rum in remediorum delectu aliquantò exactiores simus, nema-
 lē, temerèque vnum pro altero vsu veniat.

Οἱ δὲ λέγουσι ξηρὰ καὶ ὑγρὰ λέγουσι φθιμένα, cū ab Hippocrate dicuntur,
 aut cū ὑγρὰ ita eas dici accipiendum est, vt in siccis lippitudi-
 nibus nil humoris manet; in humidis, non crassus humor, sed
 tenuis, quamquā quibusdam placet, eas ξηρὰς dici posse, in qui-
 bus aliquid acre, mordax, pungens, & lancinans, non quantita-

te, sed qualitate peccans, excernitur. Et hoc fortassis probabilitate non caret. Humidas ophthalmias Hippocrates describit in Epidem. In constitutione calida humida, austrinaque, multis fiebant (ait) ophthalmia humida, longa, diuturna, laboriosa: palpebrarum foris & intus Empyos, id est progerminationes, quas ficos, Grecis σίγχα vocant. Humiditatis copia & ophthalmiam attulit, & tubercula in palpebris: sed quâ id ratione factum est, cum à duplici humore hoc duplex vitium natum videatur? Etenim humiditas ophthalmia ab humore est tenui, Galenus dicit, ἀπὸ τοῦ περὶ μαλακῶς ὕδατος: at σίγχα, siue Empyos, siue ὁχρῶδες ἐκ τῆς ἀναιμίας (omnibus enim his nominibus vnum & idem significatur) à crassiore, lentiorēque humore esse videtur. hoc ipsum & Galenus fatetur: ait enim in Commentario, humoris redundantis superfuitatem duplicem esse humoris videtur, & in eodem loco consistat. Quod hac ratione in corpore succrescere confirmat, Cum, ait, corpus exercitationibus solitis concitetur, moveatur, diffletur, ac lustratur, copiam & crassum & tenuium humorum simul coaceruat: crassum ob desidiam & socordiam: tenuium & aquosum ob vacationis prohibitionem. Ac si in quolibet humore sit quippiam quod limi & fæcis rationem habeat, quippiam verò quod feri, liquidiorisve partis. Quî autem discernas varios effectus vtriusque humoris: tenuiorem partem excerni testabantur deiectiones liquidæ, vrinæ, aquæ: crassiorem partem, vel grauitas capitis, vel coma, vel quia moram trahit cunctaturque in corpore. Et clarioris doctrinæ causa affectus quosdam nasci dicemus ab humore crassiore per cōgestionis modum: alios à tenuioris humoris copia per suppressionem, id est, qui suppressus est in constitutione aquilonia: deinde viâ apertâ in partes influxit. Id quod tenue & aquosum, ophthalmias humidas fecit: id quod crassum ac deses, Empyos quasdam in palpebris foris & intus. Quod enim crassum est, quia pigro gressu insistit, partibus inhærens alium morbum producit quàm id quod tenue est, & ὁχρῶδες. Empyos progerminatio dicitur, σίγχα ficos; ἐκ τῆς ἀναιμίας seu ἐκ τῆς ἀναιμίας, quod nomen apud Medicos potest sumi pro eruptione. Apud Aristophanem, bullam, papulam & phlytanam significat: & quod dicitur Empyos, illud significat in palpebrarum extremo protuberantiam, eruptionemque apparere. hoc enim verbum Empyos significat: Galenus in Commentario interpretatur nomen Empyos, τὴν ἐκ τῆς ἀναιμίας ἐκ τῆς ἀναιμίας.

P 401. 48
lib. 3 E-
pid. sect.

284 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Interpres, Tuberculum collium modo, vertit: & malè; hoc enim grammaticoteron. Etsi enim ἔχθρην, prærumpit ripa locum significet & eminentiorem paulò, & ὁ ἔχθρὸς colliculum prominentem; tamen debuit scire ἔχθρὸς apud Medicos pro verrucis, siue verrucosis extuberantiis sumi. Ita enim Marcellin. lib. 2 Dioscoridis. Ergo τὴν ὀχθρὰν δὲ αὖ ἐπὶ νύκτιν verti oportet, eruptionem, extuberationemque verrucosam; quanquam Interpretis lectio plausibilis est, quia Grammaticum agit.

Vt ad institutum redeamus, humida ophthalmia dicitur in qua aliquid aqueum & tenue manat: ἕνεκα autem est cùm aquilonia tempestas calidam humidamque excepit; hæc enim frigida constitutio vt manus spongiam, sic cerebrum comprimit; hinc humor in has illasve partes exprimitur, vt in oculos: quia autem extremo frigore cutis densatur, hinc ophthalmia sicca nascitur, idque maximè in ficcis ac biliosis. Quod notandum est ex Hippocrate. Neque enim in omnibus sicca ophthalmia præsentē constitutione aquilonia fit. ² Et alio loco in lib. de aëre, locis & aquis probabilem affert rationem cur in ficcitatibus, & squarloribus ophthalmia sicca nascantur. Bilis, inquit, (loquitur autem de hominibus biliosis) pars humidissima, atque aqueosissima exsiccat atque absuitur, crassissima verò & acerrima linquitur, supp. & lib. de siccas ophthalmias & febris acutas faciens. Itaque ex eo Hippocratis & Galeni loco colligi potest, verisimilem eorum opinionem qui siccam ophthalmiam interpretantur, in qua aliquid nitrosum, paucum, ficcum, acréque apparet mordicans oculos, non autem in qua supprimitur omninò humor, vt priùs dictum est de aquilonia constitutione humores supprime. Hinc efficitur potest ἕνεκα ὀφθαλμίας bifariam intelligi posse, & eam in qua multus quidem humor ob calidam humidamque constitutionem est, sed supprimitur ob ambiens frigidum, eaque ophthalmia cruda dici potest, eo modo quo in libris de Diæta, morbus siccus dicitur, id est crudus, in quo excrementum nondum appareret: & eam in qua non tam quantitate quàm qualitate humor in vitio est; vt cùm acer, mordax, in bilioso humore succrescit, tempore qualido, arente, aquilonio si vis: & species quædam erit ophthalmia, eaque τῇ ὕψει ὀφθαλμίων opponetur. Et hæc posterior de genere earum ophthalmiarum est, quæ à Galeno & Hippocrate vocantur φθιδάδες ὀφθαλμίας. de quibus antequam dicamus, afferemus opinionem Aëtij & Celli μετὰ ἕνεκα ὀφθαλμίας, no-

Con. in
Apt. 12.
lib. 3.

lib. de
lib. 3.

mine composito. Aridam lippitudinem definiunt, in qua sub-
 ridi oculi nec tument, nec fluant, sed cum leui prurigine ingra-
 uescunt: & palpebræ citra duritiem prægrauæ pituitâ inhæres-
 cunt. Huic similem faciunt *σπινώδης*, aspritudinem oculorum
 ac scabram lippitudinem interpretantur, rubor est oculi, pruri-
 tus à nitroso salsòque humore. Ac credo in his apparent quibus
 corpus biliosum est, aut putri salsâque pituitâ plenum. Ergo
 ophthalmiæ tabificæ quædam sunt, *σπινώδης* vocant vt sine di-
 stinctione sit legendum in aphorismo 16. lib. 3. Aphorismor. *lib. 3.*
ἐν οὐχὺ καὶ σπινώδης ὁ σφδαλμύς, non autem cum distinctione, lippitu-
 dines in squaloribus, & item tabes, vt contendit Galenus in
 Commēt. siquidem negat in siccitatibus, quatenus tales sunt
 tabem contingere: at nec articularum dolores, nec dysenteria
 ipsa, nec stranguriæ in squaloribus contingunt. Quis dicat sine
 humore aut arthritim, aut dysenteriam, aut stranguriam nasci.
 Idcòque perplexus est admodum Galenus in exquirendis huius
 aphorismi demonstrationibus. At mihi parum consultus vide-
 tur Galenus, quasi verò non nouerit in squaloribus ferinas de-
 stillationes & dysenterias ab acri, squalidòque (vt sic dicam)
 humore, qui sensim atque sensim sese exerit. Nec enim adeo
 rudis Hippocrates, vt *ἐν οὐχὺ* intellexerit sine aliquo humore, &
 in medio omnis recessus: quasi verò squalor temporisque arida
 & squalens tempestas non vim aliquam humoribus imprimat,
 & non in tali constitutione squalida ichorum dominatus non sit
 satis malignorum. Itaque accuratior fuit hîc Galenus, &
 frustra. Porro *σπινώδης ὁ σφδαλμύς* videtur & Galenus referre. Quan-
 quâ ophthalmiarû tabificarû hoc sit proprium, vt ad tabem, con-
 sumptionemque oculum pertrahant, & tamen in squaloribus
 grassantur: an vi squaloris, an ratione humoris ficci, nitrosi,
 mali. Si humor est, quare non & tabes ab humore. Si vi squalo-
 ris, si oculus tabescit ac consumitur, cur non & reliquum cor-
 pus, vt nomen *σφδαλμύς* non pro tabe, quæ propriè vlcus, aut aliud
 pulmonis vitium sequitur, sumatur, sed pro qualibet consum-
 ptione, vt possesumi Galenus suspicatur in Aphorism.

Item *ἐν σπινώδῃ* reperitur apud Hippocratem partic. 22. com-
 ment. 1. in lib. de Dieta acut. cum diætæ instituendæ ratione
 docet. Nam quamdiu morbus siccus manet, tandiu à plenior
 cibo abstinendum, nec naturæ negotium faceffamus: nec tan-
 tum ad morbos thoracis nomen *σπινώδης* referri vult, sed ad om-

*Sicca, ta-
bes ab
Hippocr.
describi-
tur lib. de
ossis ma-
tura,*
ne s partes laborantes, in quarum affectibus nihil excernitur eo-
rum quæ redundant. In sicca ophthalmia, ait, cum nil refudat
in cerebri affectibus, cum nec per nares, nec per palatū rei cuius-
que excretio fit: in affectibus partium in ventre inferiore con-
tentarum, cum aliis resiccata admodum est. Et idem in ceteris.
Cum autem excernitur aliquid, vocat morbum *ὕδατος* hume-
fieri.

*App. 12.
lib. 1. de
lib. de cri-
fib. p. 151.*
Sed quæstio hinc magna oriri possit, an sit idem morbus sic-
cus: & crudus: an idem, morbum humescere & coctum esse, vt
omnia per synecdochen capiantur. ³ Videtur idem esse mor-
bū crudum & siccū, item coctum maturumve, & humidū dicere.
Nam, exempli gratiā, in pleuritide oris mador, sputi expecto-
rationeque facilitas tanquam *ὀψαίνουσα* iam initium morbi præter-
iisse, & breuī finitum iri demonstrat in Aphorismis. Si ergo sic-
cus, id est crudus est cum nil excernitur a parte, sed materia co-
ercita conclusaque in parte est: ergo in cuius ophthalmiæ initio
fluor & lacrymæ multæ sunt, vt in humida ophthalmia, ex ³ E-
pidem. Hippocrat. antè monstrauius, ea diceretur humida, pro-
indèque cocta: consequens autem falsum est. Item cum cere-
brum plethoricis auctum est symptomatis, & per oculos, nares
& palatum multæ pituitæ liquidæ crudæque excretio fit, ista ex-
cretio significaret morbum humidum, id est coctum: hoc autē
falsum est. Itaque tametsi cum madet os in thoracis affecti-
bus, breuitatis morbi indicium est, non tamen idem est siccum
ac crudum: nec coctum, & humidum. Liquidior enim prissana
ad humectandum propinatur, non autem ad coquendum dari
dicitur. Quocirca vt in omnibus admirabilis est Hippocrates,
ita huius quæstionis nodum quodammodo dissoluit, scribit e-
nim, *si autem os madescat, & qualia oportet a pulmone excernantur, for-
bitiois quantitatem augebis.* Nam quæ citius madent, Græcè *πρῶτον*
ὀψαίνουσα, celerioris criseos notam præferunt: si coctum & humi-
dum, idem significarent, & *ἐν ὅτῳ ὁ χρόνος*, crudum seu *ἀπρόσθετον* dixis-
set simpliciter; si os madescat; nec adiecisset, & qualia oportet
educantur. Nam hæc particula, *ὅτῳ ὁ χρόνος*, non iam ampli-
contrarium siccitatis declarat, sed iam ad coctionem nos infi-
nuant: id est, coctionis tacitam mentionem iniiciunt. Et illud
est quod acutè Galenus in comm. in partic. illam, annotauerit,
verba illa; *si qualia oportet excernantur*, coctionis argumenta, signa-
que *πρῶτον* Græcis, exhibent. Et si humidum esse ac coctū

esse idem significant, catharrofæ dispositiones qualescumque forent, de coctorum morborum numero essent. Nec dubium quin in quibus morbis excretio esse debet materiæ, si illa materia supprimatur, & siccus morbus dicitur & crudus: & cum excretio incipit cocta, tum morbus *ὕδατος* dicitur: & in quibus ante tempus excretio fit, nimirum materiæ crudæ, tamen tunc *ὕδατος* dici non possit, quia effluxio fit, tamen crudus vocabitur. Sed hæc subtiliora.

Præterea *χολέρα ὕδατος* & *ὕδατος* apud Hippocratem reperio in 4. de Diata acutor. Humida cholera dicitur in qua magnâ cōtentione & virium iacturâ sursum deorsum excretio fit putrium, in coctorumque. Galenus in comment. vult oriri ab acribus humoribus generatis à corruptione assumptorum: Arida fit à spiritu flatulento acri. Videtur ex sententia Galeni his nasci sicca cholera qui cibos coctu difficiles sumpserunt, transire nequeunt, quibus adiecti sunt cibi acriores ac calidiores: & tunc statulenta copia impedit quominus quicquam excernatur. Vnde quomodo magna, an non illa cholera in qua calida assumpta sunt cum difficillibus coctu, potius humida dicenda sit quam sicca? Hippocrates ait quidem lazerpitij radicem choleram siccam efficere, sed postea iungit, si cum multo caseo & carne bubula sumatur. Sic in Epidem. quidam vorax esu carnium porcinarum, haustu vini generosissimi & placentarum, in Cholera incidit, supp. siccam, ut ex priorè Hippocratis demonstratione colligi est. Quid ergo erit humida? Quantum ex collatione locorum colligo, in humida cholera plus est materiæ corruptionis, faculratem expellentem irritantis ad excretionis omne generis, ut in hoc dicatur humida, quia excretio fiat; quâ nominis significatione sumi *τὸ ὕδατος* diximus antè. In sicca plus est crudæ, crassæ, impactæ, & status eâ materiâ subigente, agitâtæque; unde membranarum diuulsio disruptioque aliquando, & grauissimi dolores. In eoque sicca dicitur, quod nil ferè excernatur, sed conuolutio fit quædam intestinorum, & inflatio ventris. Qua in significatione *τὸ ξηρόν* sumi dictum est paulò antè. Atque astringentem esse flatuumque magnam illadem collige ex Hippocrate eodem loci: *Ab arida cholera venter inflatur, si reptus sumi, dolor laterum & lumborum, nihilque alius deicit, sed astringitur. Ergo ipsius in cholera sicca vis in eo est, quod cohibitio retet-*

Corr. 119
part. 103
lib. 4. de
dia acuto

9. Epid.
p. 563.

288 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 tióque est materiei. Quanquam Galenus Comment. in partic.
 illam non vult probare istam suppressionem flatuum ad consti-
 tuendam hyparxin, naturamque ἡ χολή τις ἐν ἑαυτῇ, quod tamen à
 ratione alienum est. Verba eius sunt: Cùm flatus interdum exire
 possint, interdum retineri, aridam choleram ob retentos flatus generari
 asserere nequeos; nam probabilius est eos vocare (suppl. cholera sicca la-
 borantes) in quibus potius flatus erumpunt, quàm retinentur. At con-
 trà: etenim nonnullos summis cum cruciatibus cholera sicca
 laborantes mori videmus, in quibus nil ferè excernitur, nec ma-
 teria, nec flatus. Membranarum enim offensæ, & diuulsiones
 ex eo maximè sequuntur, quòd spirituum magna sit vis mate-
 riam veluti subigens, diripiensque, & dum penitus subitur, so-
 lutione vnionis partium præsertim nervosarum implacabiles
 dolores excitantur. Atque idem in ventriculo contingit &

Com. ad
 part. 27.
 li 3 Pro-
 rh: tiel
 meminit
 mīs, οὐν-
 ολκῆς
 τὸ αὐτὸ
 δὲ ὅς.

partibus vicinis, præsertim membranosis, quod in surarum affe-
 ctu, qui Græcis peculiari nomine πῦλινος δὲ λέγεται dicitur: Gallicè *crampes*; inclusus est enim spiritus diuellens, & exitum sibi qua-
 rens. De Cholera sicca dictum sit hætenus.

Accedamus nos ad id cuius gratiâ instituta est disputatio. In-
 stitutum erat dicere de Angina, & anginoso quodam affectu
 (ita enim loquar) id est, de difficili deglutione. Quæ difficultas
 in faucibus & gutture synanches aut πῦλινος παθὴναι ὁ πῦλινος
 stituit. Animaduertimus enim in quibusdam, vt initio dictum
 est, ariditatem summam linguæ (talem autem linguam Hippo-
 crates 7 Epidemiorum vocat ἡ λείαν περὶ τὴν ἐνὶ στόματι, quòd iis qui
 inflammatione pulmonis laborant familiaris esse solet) dolo-
 rem occultum & latentem colli musculorumque omnium qui
 ad humeros vsque protenduntur, faucium est igitur, siccitatis
 nil tam en apparet quod arguat id de quo tanquam de difficulte
 deglutionis causa quæri possit. Quærendū itaque quis sit affe-
 ctus, quo nomine donandus, cuius speciei, quæ idea, qui mor-
 & ingenium. Potest generaliter affectus πῦλινος dici, vt Galenus
 Comment. in part. 30. lib. 4. de diætâ acut. sumi posse ostendit.
 Duplex autem omnis est πῦλινος, vt autor lib. 4. de Diætâ
 acutorum vult, aut est à materia crassa, viscosâque quæ in ma-
 ioribus vasis continetur, aut à tenui, acri, biliosa, quæ suâ tenui-
 tate maiores amplioresque venas peruadit, sed in tenuiores se-
 insinuat. in synanche à crassa materia tumor est breui strango-
 lans: alter πῦλινος, qui à tenui fit, non ita sese tumore efficit.

sed intemperie potius quadam, & erysipelatodes dicitur: Galenus dicit vocari posse μικρόχολον, aut χηλιδέα. Hanc autem ita describit; *Cum à capite tenuis fluxio est, & nitrosa, quasi ab anni tempore talis sit, mordet, ulcerat, orthopnean parit, & siccitatem multam: Quae intuentibus nobis apparent* ἰσχυρὰ φαίνεται, *minimè tumentia apparent.* Ita enim non pro gracili ἰσχυρὰ sumitur, sed pro humili, non tumente. Quo loco mihi videtur anginam nostram, de qua laboramus, describere; nam & siccitas multa erat, quam Hippocrates πολλὴν ἐξηγνίω vocat verbo antiquissimo: & difficilis deglutitio, nihil autem in faucibus aut gutture apparebat: nec alius color ferè à proprio erat, nisi quòd siccitas esset. Magnum enim est obseruare an dissimilis sui sit color. Propterea veteres vocem ἰσχυρὰ interpretabantur per ἄχρεα, id est, decolorata, non habentia colorem qui adesse deberet si inflammatio esset. Sed tamen hanc interpretationem ridet Galenus in Commentario. Galenus autem rationem reddit cur non tumeant partes laryngis & faucium: non quin biliosus humor multus collectus, non possit tamen efficere, ac praesertim humor qui à capite descendit: omnis enim pituitosa naturæ propinquus est, ut propterea pituitæ naturæ fontem cerebrum asseueraret autor lib. 4 de morbis, & lib. de glandulis: sed, ut ait Galenus, sit ut fluxionis partem recipiāt faucibus vicini muscoli: item qui à tergo siti sunt, ubi & stomachus qui sæpe simul afficitur. Sic rationem reddit & cur siccitas, cur tumor non adsit, diffusa, liquatæque materia: item cur à tergo & circum collum dolores adsint: atque talem affectum, & symptomata qualia hinc describuntur, mihi visus sum videre in istis ægris quorum superius paulò memini, nisi quod talis synanche per eundem Hippocratem vel æstate, vel autumnno fiat. At hæc affectiones synanchicæ, quarum meminimus, in hyemem inciderunt, eamque acerbissimam. At quid obstat quin dicamus id quod antè obseruatum est, per hyemem coaceruari crassos humores, & eorumdem ichores siue serositates, quæ cum diu suppressæ fuerint, acrimoniam & πικρῶδες π acquirant, deficiant quæ hyeme tenue illud subit tacitè, & morbos sui generis committit. Atque eo modo fiet angina ἐξῆς; ita enim loquar aliquis, sed potius qualitate quàm quantitate peccat: & facit squalorem, nescio quam intemperiem aridam: quod explicauit Hippocrates, cum ait, istum humorem nitrosum efficere ut

P art. 31
lib. 4. de
Diat.

Tom. I.

O o

ἐπεὶ οἱ πολλοὶ τὸ ἐγγίγνται; hinc fit vt subdiderit, & tendines cer-
uicis posteriores intenduntur, apparentque intenti ac si tetanus esset: hinc
vocalis amissio: quod indicat scribens, ἢ ἡ φωνὴ ἀπὸ τῆς τῆς
ἐπὶ τοῦ λάρυγγος, ait Galenus, per laryngis passionem. Vocis autem ge-
neratio in ea maximè parte fit, quæ Larynx vocatur, Galeno
teste. Huc maximè pertinet locus de Angina lethalissima, quam
describit Hippocrates in Aphorism. Si à febre habito collum per-
ueritur, & vix potest deuorare, sine vlllo tumore, lethale. Paulò antè
alium scripserat aphorismum de angina quoque. Si à febre ha-
bito, tumore non existente in faucibus, strangulatio repente su-
peruenerit, lethale. Aliud esse scribit Galenus, vix potest de-
uorare, & cum strangulatur. Cum autem dixit, tumore non exi-
stente in faucibus, tacitè indicat affectum esse solum guttur, quod
λάρυξ dicitur: cum repentina strangulatio necessariò laryngis
affectionem significat, vnde libet hoc contingat, siue ab inflam-
matione, siue aliter, vt paulò post dicemus, cum inquireretur an
sola intemperies sicca hoc efficiat. Mirum quomodo in apho-
rismo illo prædicto, in quo scriptum, οἱ δὲ μάλιστα μὴ ἐόντος ἐν τῷ
φάρυγγι, cum nomen φάρυγγος per fauces interpretentur. Nam
illud animaduertentur autores Græci, nomen ὁ φάρυγξ in ma-
sculeo genere, guttur significare, & cum nomine λάρυξ con-
fundi: in fœminino, φάρυγξ fauces: & Hippocrates in masculino ge-
nere accepit. Sciendum non necessariò semper laryngem si-
gnificare cum masculei generis est: promiscuè enim ὁ φάρυγξ &
fauces & guttur designat: sed ἡ φάρυγξ fauces semper denotat.
Proptereaque Galenus in commentario vtriusque aphorismi à
nobis citati, cum verba Hippocratis adducit, non amplius vltur-
pat articulum masculeum ὁ, τῷ, τῇ; sed ἡ, τῆς, τῇ: quod diligen-
ter notandum est, vt omnis amphibologia declinetur: Quod
Galenus ingenium vix deprehendit linguæ græcæ ignari. Pro-
pterea parum legendo proficiet, qui versionibus tantum latinis
impolitis & rudibus, nec vlla ex parte attingentibus Asiaticam
sermonis venustatem, operam accommodabit.

An in
angina
dolor.

Ergo cum non apparet tumor in faucibus, & repente suffo-
catio incidit, præsertim dominante febre, mortis metus est ma-
ximus. Quærit Galenus duo: cur dum in illo aphorismo angine
funestissimæ meminit, non mentionem facit de dolore, vt fecit
in prorrhético, dicens, fauces dolentes: item an angina absque do-
lore esse possit. De priore ita statuit: Tametsi non meminit do-

loris, potest tamen intelligi. De posteriore ita, Si angina fit cum inflammatione, non potest non adesse dolor. Potest autem strangulatio fieri sine dolore tribus modis, vel oborto tumore frigido quod αἰσθημα dicitur: 1^o Vel resolutione muscutorum laryngem aperientium, vnde angustior redditur meatus: vel ab utroque simul: tertio summa siccitas & squalor muscutorum internorum laryngis hoc efficere potest: ita enim supra modum extensi, meatus angustiam afferent. Sed quaestio orietur difficillima: Si indolens angina & strangulatio repente contingere potest, vt hic docet Galenus, an à siccitate immodica id fieri potest? Videtur non posse fieri, nam intemperiem siccam anginae autorem, si ita fors ferat, necesse est longo admodum tempore acquiri, vt ex locis infinitis Galeni colligi potest: quomodo ergo ab ista immodica siccitate repentina strangulatio contingere potest? Ista videntur asystata. Nisi quis dicat siccitatem quidem tempore acquiri, sed illam non sufficere ad necandum nisi febris concurreret maxima: quæ febris (nullâ adhuc præsentē aliâ siccitate) breui tempore omnium instrumentorum tensionem atque ariditatem afferre potest, præsertim si sit è genere febrium καυσόδενων. Ac propterea cum in alio aphorismo scribit: *Si cui à febre occupato collum inueritur, & vix potest deuorare, sine villo tumore, lethale.* Galenus in Commentario miratur Hippocratem non meminisse loci, cum ait, *tumore non existente, vt fecit alio in aphorismo: sed subaudiri intelligit, vel in faucibus, vel in collo ipso.* Ait autem istam strangulationem, aut potius deglutendi difficultatem ab inflammatione muscutorum gulæ præiacentium, aut gulæ ipsius oriri posse: & ab ista inflammatione contorqueri potest vertebra. Vel enim à tuberculis inuertitur, vel ab inflammatione ob tensionem partium inflammatarum, & ad sese retrahentium. Est enim affectus cervicis in quo vertebrae ad anteriora luxantur, vel solum musculis qui cum ipsis communicant affectis tumore, vel nato tuberculo, vt placet Galeno: vel extentis ob inflammationem partium nervis ac ligamentis, vt notat Galenus Commentar. in Aphorism. 35. lib. 4 Aphorism. Atque vt explicet rationem illius anginae de qua sermo est, affert locum ex Hippocrate quo in loco vult eandem anginam describi quæ & hoc in loco. Textus autem est: *Anginam patientium tales erant affectus: Colli vertebra intro vergebant, extrâque apparebat collum habere cani-*

292 CONSILIORVM MEDICINALIVM
tatem, & hoc tactum dolebat. Notandum autem illo loco mentio-
nem fieri de angina in pestilenti constitutione. Quærit rur-
sus cur Hippocrates dum loquitur de angina à contorsione
colli in febre ingente, non meminit doloris vt & in Epide-
miis? si enim inflammatio est, necesse adeste dolorem: an non
inflammatio est præsentē tantā febre, & factā contorsione
colli? vnde ista contorsio? Concludit istam anginam ab ex-
cedente fieri siccitate, à qua tensio, hinc tractus, à tractu euer-
sio vertebrarum. Cū enim adest ista siccitas, à quā tensio,
tractus, euersio, angustia meatus, difficilis deglutitio, ma-
lum hoc: peius verò si febris adsit. Nam & febris auget vsum
respirationis, cui non potest satisfieri ob meatuum angustia:
item auget siccitatem; sic malum malo cumulat.

Quæstio: Si est excedens siccitas quæ anginam quodam-
modo pestilentem facit: vnde illa siccitas? an repente incidit,
an non? an humor est? Dicam quod sentio, & accommodabo
ad ægrum nostrum, cuius ergo instituta est hæc disputatio.
In summis squaloribus, præsertim dum æstus adsunt, vel
etiam in sicca & aquilonia constitutione in qua supprimuntur
humores, sed tenuetantum serum exprimitur vi ambientis,
vt exemplo spongiolæ fieri contingere scribit Galenus in
Comm in 3. Aphorismorum, sæpe circum fauces, collum,
oculos, siccitates oriuntur, quarum ratio nulla reddi potest.
Et difficultas deglutendi est, nullo apparente tumore vel in
vulua, vel in pharynge, vel in larynge. Et squalor arerque
agrotis guttur, lingua scabra, exigua febris & latens, quasi
ab ambiente calido euocato foras calore, aut ab ambiente
frigido nimium (nam in squaloribus hæc fieri diximus, dictū
autem velim cū vel excessus est caloris, vel frigoris) retruso
in centrum calore; vnde quemamodum in oculis *ἔνδοφα-
ρμα* nascitur, ita *ἔνδοφάρμα*, si verbum confingere liceret, aut
ἔνδος οὐρανῶ oriatur. ² Quod admodum notare oportet,
& Medici decipiuntur admodum. Vidimus ita affectos per
20 aut 30 dies laborare cum squalore magno, infirmitate
summā, ariditate, nulla firi, difficultate deglutien-
di, oculorum quadam cavitare, fuliginoso spiritu aren-
te atque æstuante, ac si in hecticam laberentur. Et ex nostra-
ribus Medicis nulli hoc obseruauerunt, præter vnum domi-
num Magnum, omnium, quos ætas nostra fert, acutissimum

& solertissimum, qui vocat istum morbum Anginam *συντηνισμὸν* colliquatiuam anginam, & catarrhosam colliquationem. nam partes omnes ad guttur, collum, & fauces attinentes liquefieri quodammodo videntur: Et in exiguis venis ichor tenuis contineri videtur, qui superficiarium dolorem excitat.

Omnium morborum quos mihi videre contigit, hic mihi difficillimus & ad cognoscendum, & ad curandum visus est. Atque obiter qua ratione ei sit occurrendum, si quando incidat, aperiam.

Cum ergo ea difficultas deglutiendi (siue quis Anginam vocet, seu rheumatismum *ῥευματισμὸν*, seu morbum siccum, seu anginam siccam, seu pestilentem fluxionem, siue *ἄνυχον* quemdam malignum, siue colliquationem, siue catarrhosam colliquationem hoc loco non interest, tamen si longè hæc vocabula inter sese differant, aliasque morborum ideas indicent) cum, in qua, ea difficultas deglutiendi cum siccitate, squaloreque sit coniuncta, nullo etiamnum nec foris, nec intus tumore apparente, dolore quodam occulto partium omnium ad guttur & collum pertinentium, non est dubium quin illa intemperies sicca corrigenda sit: Eamque ob causam plurimum conferet id quod sequitur.

℞. passular. mundatarum & ficum an. ℥ j. glycyrrh. non rasa ℥ iij. prunorum. 20. rad. altheæ ℥ s. fiat decoct. in equis partibus aquæ rosar. & plantag. In colat. dissolue oxycrati ℥ ij. mellis violar. ℥ iij. fiat gargarismus. Vim habeat humectandi, & detergendi, & squalorem tollendi. Deinde circum partes thoracicas fiet litus sequens.

℞. butyri recentiss. lib. j. cum qua misce olei amygdal. dulcium sine igne extracti ℥ ij. ol. de kenri & violari non veteris an. ℥ j. s. misce: fiat litus. Circum collum, guttur, nucam, de foris magna copia affundetur, & illinetur id quod sequitur.

℞. chamemeli, melil. scabiosæ, an. m. j. fiat decoct. ad sufficientem quantitatem, in qua exirabe mucaginis sem. psyllij & alth. an. ℥ iij. cum butyro recenti ℥ iij. & ol. violari loti in præd. decocto. fiat litus ad omnes partes dictas.

Item præclare fiet si bolum castiæ assumat sine rhabarb. cum syrupo viol.

Item si ore verset bolum castiæ, deinde reiiciat, quia vim magnam habet humectandi & squalorem tollendi.

1. Iſtas affectiones Hippocrates 4. acutor. explicat eleganter, cum fluxio calida ac nitroſa fit è accipite, mordet, ac vicerat, & ſpiritus implet, & erecta cervicis ſpiratio accedit, & ſiccitas multa: & quæ videntur gracilia apparent, tendines poſteriores in collo apparent diſſenti, vox abruptens, &c.

2. Lib. de loco, aëre & aquis, humiditas ophthalmias agnoſcit in iis qui à ventis calidis perſtantur, præſertim ſi inter brumalem ſolus ortum & occaſum venti perſlent: duras & vehementes in iis qui inhabitant regionem ventis frigidis obiectam, & duras opponit humidis certa de cauſa. Et alio loco videtur explicare cur ſiant ophthalmiæ ſiccæ & febres acutæ & diurnæ, cum æſtas ſicca fuit, & autumnus ſiccus eſt & borealis. quia (inquit) quod in bile eſt humidiffimum & liquidiffimum abſumitur, denſiffimum & acerrimum relinquitur. Quod notandum. Vide Comment. in Aphoriſm. 14. lib. 3.

3. Apud Hippocratem lib. de locis. In homine, locus eſt in quo de pleuritide ſicca loquitur; ſed nomen ſiccum longè aliter quàm hic ſumitur. Etenim pleuritim ſiccam vocat, in qua ſucceſſu temporis pulmo reſiccatur adheret coſtis: unde dolores lateris.

4. Vnde lib. de vetere medicina, eryſipelas, peripneumoniæ, deſluxiones ſalſæ, acres, humide, incoctæ dicuntur: quæ cum craſſiores redduntur coqui dicuntur.

5. Libro 1. Aphoriſmorum, aphor. 12. & aphor. 50. lib. 2. τριχών docet ſputa in morbis thoracicis initio apparere debere, in peripneumonia, bilioſa remiſta tantillo ſanguinis, an hoc vult initio morbum debere eſſe coctum. Magna hæc controuerſia, quam hoc in loco dirimimus: & in margine Commentarij in aphoriſm. 12 lib. 1. Aphor.

6. Quibus antequàm facti eſſent pleuritici, pulmo erat malè affectus aut catarrhus aliquis ſtatim initio pleuritidos multum mucorem excernunt, & tamen eorum pleuritis non dicitur eſſe humida, ſed ſicca, niſi de materia coniuncta excernatur. quod notandum.

7. Nota choleram ſiccam uſu balnei iunari, ut patet ex lib. 7. Epid. de Pausaniæ filia, quæ ex fungi crudi eſu incidit in choleram ſiccam, hædromeli valde ei contulit.

8. Vide Galenum comment. in aphor. 34 lib. 4. & in ſententiam 54. lib. 2. Prorrhetic. ubi vocem τὸ ἰχϛῖς interpretatur per id quod in prægnostiſis ab Hippocrate dictum eſt: τὸ μὴ δὲν ἐκ δηλον εἶναι τῇ φάρμακῳ ποιοῖν, quod nil manuſtum in faucibus facit.

9. Apud Hippocratem *sect. 7. lib. 6 Epidemior.* cum de quadam constitutione loquitur, ait; Pharynges inflammabantur: deinde paulo post Angina fiebant. Sic aliud est Pharyngas, aliud Anginas.

10. Et *partic. 28. sect. 1. lib. 1. Epid.* notat Hippocrates à ferina destillatione pharyngem esse vitiatum & tabefactum, à qua tabefactione sequitur retractio quaedam gutturis. Vide librum Definitionum nostrarum in voce *χεταλῶσα*.

11. *Αἰχμὸς* non tantum debet intelligi de calidissima tempestate. Nam cum nulli flatus planè excitantur, siue torreat omnia aestas, siue rigeat planè hyems, tunc *αἰχμὸς* Græcis dicitur. Et cum hyems anni 1572 rigentissima fuerit, non mirum si morbi alij fuerint quàm qui in hyemem moderatà incidit: Nulle, aut paucae fuerunt apoplexie, carètia somni fuit: dolores superficialij & anginosi cum pauca febre, & hoc à squalore fuit: Quem squalorem hyemalem Virgilius videtur describere, cum in Georgicis ait, —penetrabile frigus adurit. Aduasio illa Virgiliana magnam habet *ἐνέργεια*.

12. Apud Hippocratem *sect. 7. lib. 6 Epid.* manifestè apparet hoc nomen Angina *ἐνεγ*, quia nihil aut parum cocti educebatur. Itē *ἐνέγ* & *ἐνέγ* quod mirum est.

CONSILIVM LV.

De Cholera morbo.

QVONIAM dum disputaremus de morbo sicco, de angina sicca, necessariò incidimus in disputationem de Cholera humida & sicca: non alienum ab instituto erit, si nonnulla quæ animo concepta habemus de Cholera morbo, eloquamur ac exprimamus. Hæc enim intellecta descriptamus est Hippocr. in Coacis animaduersionibus, *τὴν χολέρας ἐπιπνομένης ἢ λύεται*: Leipyriæ, febres non solvuntur nisi superueniente Cholerâ morbo. Quæ Hippocratis sententia quoniam obscura est, & à communi sensu iudicioque remota, ob latentem quem in se fructum continet, plenius à nobis est enucleanda.

Ac primum vt plenius res intelligatur, de febrium leipyria essentia agendum, vt tandem constet an Cholera morbus leipyriae febris solutionem afferre possit. Nulla est consensus inter Græcos & Arabes de leipyria febre, immò ne inter Græcos ipsos. Κάρος & febris leipyriae magna est affinitas, iisdemque penè symptomatis morbus vterque se profert ac prodit. Sitis est ingens, iectigatio, mentis percussio, vigiliarum assiduitas, partium extimarum refrigeratio, sed præsertim in leipyria, æstus in internis. Galenus Comment. in Aphorismos ait: *Partium extimarum refrigeratio æstuantibus internis solis accidit febribus quæ Causæ dicuntur, perniciosæ, vel potius malignis, vt leipyriis.* Quo loco leipyrias febres ad καύσας referre videtur: & notandum hoc est. Causa autem recessus interiora caloris, vel est ingens inflammatio, vel erysipelas. Sic leipyriae febris hyparxis in eo consistit. Id autem statu discriminis inter continuas ardentes & leipyrias, quod καύσας sequantur inflammationem internam partis alicuius, leipyriae congestionem humoris biliosi in aluo, quia aliquid ἐπὶ τῷ λατῶδες in ipso ventriculo efficit. Quod fortassis quosdam Græcos adduxit vt existiment Erysipelas solum ventriculi leipyriae febris autorem esse. Nec enim phlegmone est. Videndumque est an bilis in ventriculo æstuans erysipelas aliquid afferat: & an sit tumor. Nam credibile videtur bilem quandam prærubram & viscidam membranæ inhaerere possit partim in occultis viis subsistere, quæ dum inflammatur, nec facile à parte defecatur detergeturque, concipitur æstus ingens qui recessum afferat caloris foris intrò. Quod si verum, an τὰ λεπυρεῖα μὴ λύονται μὴ χολέρας ἐπιγινώσκουσιν? An leipyriae affectiones, vel febres leipyricæ non soluuntur nisi successu cholerae morbi? Locus ille Hippocratis si verus est, & focum & causam, & curationem leipyriarum explicat. Quidam verbum λύειν in malam partem accipi volunt, vt morbi solutionem ad interitum significet. Quo in sensu sumptum est in Aphorismis, τρέμος ἐπιγινώσκουσιν τὸ θάνατον λύει. Tremor febris post ingens delirium succedens, illud delirium soluit, id est, delirii quidem finem affert, sed simul & semel hominem de medio tollit Et est politicus loquendi modus cum ægrum quempiam non amplius laborare dicimus, & ab omnibus malis liberatum, per mortem, supple. Postquam enim mor-

λύειν
quid si-
gnificet.

mors perculsit. Itaque dicunt, Leipyria febres non soluuntur, nisi Cholera superueniente, id est, cholera soluit febrem leipyriam; ac si dicat, finem quidem leipyriae affert, sed vna ad interitum ducit. Quod mihi non placet. Cum fieri possit vt Cholera morbus leipyriae succedens, eam tollat; quod mirum esse possit. Leipyria morbus funestus est, Cholera quoque funestus morbus & acutissimus breuissimo tempore hominem e medio tollens. Qui fieri potest vt morbus per se funestus alterum morbum funestum soluat: potius enim malum malo cumulari videretur. Atque ita interpretandum est Hippocratis consilium.

CHOLERA morbus est cum sursum deorsum magno impetu bilis fertur, vt magna breui tempore spirituum fiat euacuatio, & dolores acerbissimi sint; hinc mors. Leipyria febris, vt antea docuimus, sequitur διαθεσιν ἐρισπιπλάτῳδην ab humoris biliosi congestione. Ille autem humor non eius generis cuius & bilis flaua tenuis, quæ suâ tenuitate orgasmum facit: sed est quædam bilis prærubra, squalida, ficca, viscosa, adhærens parietibus stomachi, quæque propterea non nisi magnâ vi deturbari potest. Cholera morbus cōferre potest ex euentu, dum videlicet in cholera morbo (cuius ὁπαρξίς in excretionem consistit ἀθρόως facta) euacuatur biliosa materia. Bilis enim conclusa exitum habet per cholera morbum, natura quâ data portâ sese expediente humore tantæ febris tamque funestæ causâ. Itaque dixit, τὰ λειπυρικά μὴ γενομένης χολέρας ὁ λυεταί. Duæ istæ negatiuæ particulæ, μὴ, &, adiectæ sunt ab Hippocrate per quandam αἰτίαν ἢ ἐκέρχην: ac si dicat, Leipyriae febres non possunt solui, nisi cholera morbo superueniente: id est, necessaria est cholera morbus vt cesset leipyria. Per cholera vel propriè intelligendo morbum istum & ideâ & specie, signis, symptomatibusque talē, vel euacuationem cholera morbo similem: id est, quæ sursum deorsumque fiat; non quod propriè cholera morbus sit, nam iste morbus peculiare quid habet, cuius ratione per se funestus omnis fere sit: nedum hoc boni afferre natus sit, vt manum veluti auxiliarem nobis præstet tam capitalis hostis ad alium morbum depellendum ac deturbandum. Eâque propter nomen τῆς χολέρας καὶ παχυρηνίας tantum sumetur. Quo modo & in Coacis vocat πύετος μετ' ἐλεάν: febres cum ileis, non propriè sumpto nomine ilei, sed pro simili symptomate quale in iliatis passionibus contingit, nempe pro vomitione affidua.

Tom. I.

Pp

Quod notandum. Sic & *χολέρα* non propriè sumetur, sed tantum pro ea excretionem quæ in cholera propriè dicta apparet, cum sursum deorsumque impetu excernitur humor. Item cum dicimus, *τὰ λεπτεμένα*, fortè hoc nomen illic non significat febres lipyrias, quas à cholera solui non sit verisimile, sed *τὰ λεπτεμένα* significat affectionem quandam *λεπτεμένην*, nempe cum post esum calidorum ciborum, acrumque dolores ad ventriculum oriuntur, collecta ibi materia; unde sitis, iactationes, *ρίγησσις*, *ἄσπαι*, syncope, recessus caloris intro, sine febre tamen, taliaque hic apparent qualia apparerent si eos febris lipyria occuparet. Quis enim dubitat in eo casu excretionem instar Cholerae morbi faciam, eam leipyricam passionem non soluere? Et hæc probabiliora videntur, quam si *τὸ λεπτεμένον*, & *ἡ χολέρα* in propriis significationibus accipiantur.

Tamen aliam probabilem coniecturam afferemus, ut omnes intelligant morbum unum funestum per se, pessimumque posse alteri morbo auxilium præstare, præsertim si qua sit apprens excretio materiae morbum priorem efficientis. Adduximus aliquando hoc in libro aphorismum, cuius veritas communi hominum iudicio & rationi nunquam placere aut apparere videatur. Textus autem hic est: A furore, *μανία*, Græcè dysenteria, vel hydrops, vel mentis alienatio, græcè *ἐκστασις* bonum. *ἔκστασις μανίαν* soluit, & tamen *ἐκστασις* per Galenum est incrementum mania, vel potius *μανία* adaucta. Quomodo ergo alienatio mentis maniam tollet? Id fit quia humor qui maniam efficiebat cum loco aliquo conclusus esset, & in parte cerebri, dum de mania loco fanaticum facit, dispergitur diffunditurque naturæ exitum sibi quærentem materiae priorem morbum, id est *μανίαν* efficientis: & dum hoc conatur natura conatu motuque critico (quem *ἐκδοὺν* propriè vocabimus, *καὶ ὁρμήων*) *ἐκστασιν* reddit. Plura & commemoratu dignissima illo loco à nobis conscripta leges. Sic idem in cholera morbo, & lipyria febre continget.

Atque non ita pridem leipyria febre quis laborabat: leipyria esse, non autem *λεῖπρον* declarabat lingua; nec enim ut in Causo scabra erat, sed nigra à bile adusta in ventriculo erysipelatis modo æstuante, & resudante ab ipsa aluo accensa. Deplorata omnis erat salus. Ecce subito ac si cholera morbo detineretur, cum prius ficans morbus esset, id est, nil dum excerneretur eorum quæ in vitio essent, sursum deorsum magna bilis copia

Sed hæc omnia dicta sint de Cholera morbo & febribus leipyriis, quorum intelligentia compendio ad curationem vtriusque morbi, sed præsertim febris leipyriæ est profutura : in hisque ut in omnibus admirabilis est Hippocrates.

De fluore muliebri.

POYS γυναικείας τῆς κατάρσεως nomine potius quam κατάρσεως
donandus multas mulieres affligit, ex earumque numero
albas, & quibus lævis admodum, æqualis & iucunda visu su-
perficies inest. Huius rei rationem reddunt, quod iis cutis sit
africta, propterea que excrementis non pateat: tum quod de-
licatioris molliorisque sint habitudinis, eoque in morbos pro-
magis. Tertiò accedit quod sint effœminatiores aquosæque
de excrementorum molestam vim non faciliè depellunt: flu-
xiones sunt obnoxia, & partes principes cum quodam mo-
do aqueas, laxas, vlginosasque habeant, putredini minimè
obstunt, immò faciliè corrumpuntur, & longis morbis aut im-
plicantur, aut aliorum vim impetumque non sustinent. Dicam
quod nobis videre contigit fortè, cuius non negligenda obser-
uatio vt non minimùm adiumenti allatura & ad medendum, &
ad præsentendum. Quædam cum quatuor annos fluxorem il-
lum pertulisset cum frequentibus leipothymiis præhenderetur
adeo foetidam proluuiem per pudoris sinum excernebat, vt
nullus quantumvis graueolentium rerum odorationi assuetus,
esset ferendo. Alteri diutius foetens putrisque illa illuuius ef-
fluxerat, cum annos sexaginta nata foret, vsurpato leui quo-
dam remedio inopinatò suppressa est. Nec diu impunè eam
suppressionem tulit. Etenim diabetes illius loco multò fune-
stior successit, manifestus, suis sese signis exprimens, tres aut

300 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 quatuor menses exercuit, & ad mortem comitatus est. Totā
 ferē die vrina planē aquea fluebat, nec natura eam sistere pote-
 rat. Cū sat bene habita esset, emacruit continuō, & siti inex-
 plebili cruciabatur: lingua arefcebat, & eam pellucidam præ
 siccatate vidi. Foetidum expirabat & cadauerosum. Quæstio-
 num in renum regione sensum caloris aliquem ob putrem ma-
 teriam suppressam percepisset: cū constitisset à squalida sic-
 cāque intemperie diabetem originem capere solere. Retulit
 caloris loco ita partem illam perfrigentem percipere se ac si
 glacies inibi cogeretur. Quod nobis persuasit fluorem illum
 muliebrem à falsa partim acidāque materia manauisse. Nam
 quæ in eius marito superiore hyeme materia acida tenasum
 ferē immedicabilem pepererat, eadem partim fluorem illum
 & proinde hydropem ad matulam adduxerat. Hæc fuit mor-
 borum successio. Hinc patet eos de ægris malè mereri Medi-
 eos qui indicatione à morbo sumptā aliquatenus, de suppri-
 mendis effluuiis cogitant: non rati periculosam esse suppressio-
 nem eius floris qui multos annos ægrum occupauit. Itaque
 fontem catarrhi sensim exhauriri oportuit, diætā institui ex-
 iccantem, decocto farseparillæ uti, purgantibus medicamen-
 tis repurgari ægram: venam secari, malignam qualitatem op-
 pugnari, atque ita rerum meliorum expectatione ægra fuisset
 alleuata ac recreata.

CONSILIUM LVII.

NONIS Aprilis anno 1573. mulier quadrata, boni habitus,
 & integrè sana, ad sudatoria vulgaria, Galli *Estuues* vocāt,
 proficiscitur. Tertio post die dolere ei incipit imus venter. Do-
 lorem primū vagum, Præctici deambulatorium vocant, perci-
 pit: deinde ad partes paulò superiores reuoluitur, stomachum
 que quodam velut pondere premi queritur. Cū grauissimè
 doleret, Medicum consuluit, qui statim carminatiuo clystere,
 ut ferè fit Parisiis cū primū quis de dolore torminoso con-
 queritur; sed id malè fit, ut paulò post dicemus. Aluus licèt ir-
 ritata nihil reddidit: totam noctem insomnem duxit: conster-
 nabatur. Manè subiectus alius clyster vehementissimus, nil red-
 didit. Et hic tertius dies erat, quamuis nec primo nec secundo

decubuerat. Prehenderunt eam frequentes syncopæ, sudores ad clauiculas. Mente constabat: datum cardiacum, reuomuit: frequentes vomitiones erant, frigus extremarum partium. Character faciei planè deletus, quod mirum, tam breuì contigisse. Tertiâ pomeridianâ interiit. Ego illam tertio tantùm die vidi ad meridiem. Talia mihi videre contigit: Frigus erat partium extremarum, frequens virium lapsus, *anxia* perfecta: deinde vermiculans pulsus, hypochondria satis æqualia, sed illa, & regio ventriculi contrectata etiam blandè dolebant, & syncopen inducebant. Necessariò erat illi propendendum in dextrum latus, inclinato etiam capite: si aut supinam figuram retinere cogeretur, aut in sinistrum latus deuergere animo deficiebatur, & penè suffocabatur. Vomitiones perpetuæ: nil aliud reddebat. Et quod notandum, ingenti siti & inexplibili afflictabatur. Narrabat se in ventriculi regione velut ardentem carbonem sentire. Iactabatur: irrequieta erat. Itaque non mirum si mors tam repenti aduentarit. Diligenter rogavi num longo ante tempore dolores vrillos percepisset? Menssem vnum præcessisse dictum est ex quo de stomachi dolore quereretur. Obstericum iudicio vtero ferebat. Quadraginta diebus antè solum menses apparuerant. Nunc quærendum quod genus morbi, quâ & arte ei succurrendû fuerat. Potuit esse cholera sicca? Apud Hippocratem 4. acutorum, cholerae siccae historia proponitur, *Ab arida cholera, ait, venter inflatur, strepitus fiunt, dolor pectoris & laterum, alius nil deicit.* Addo, & vomituriendi esse desiderium, dolores summos ad stomachum coercitis flatibus in partibus abdominis, sudores frigidos, vnde præ dolore virium prostratio, recursus caloris intrò, & multa alia. Illius morbi qui acutorum numero recensetur, tota historia describitur paulò antè. Vel potuit esse suppressio omninò extremorum malignorum, quæ in partem superiorem, nempe regionem ventriculi, delata sunt vndelibet vt in partem iamiam dominantem (sicut antè meminimus). Ita enim obseruauimus in constitutione illa temporis maligna (vnde infiniti penè ruri peribant) aliis ab hypogastrio delatam percipi materiam ad costas, vnde pleuritides: aliis ad ventriculum, vnde suffocatio nis inctus: aliis herpetas natos vidimus: aliis ignes sacros vel infernè sursum, vel supernè deorsum lata materia; vnde effera red dita magis materia, traducta est in ventriculum, & primam

302 CONSILIORVM MEDICINALIVM

regionem strictè sumptam, & illic apostematis speciem excitauit. Tale morbi genus obseruasse videtur Hippocrates in Prothetis; *Quis lumborum tenus & diurni dolore, ad hypochondria reuoluuntur, reducunturque, & ciborum auersio, dolor hu valens intus ad caput perueniens, citò interimit cum conuulsione. id est: Fieri potest vt excrementosa materia per se initio citò idèò minuitur los dolores excitans, tandiu in mesenterio resistat quoad aliquid maligni acquirat, vnde effrænis reddita, tandem suis ruptis repagulis orgasmo quodam in partes fertur, si in caput cum conuulsione interimit. Addo, Et si in ventriculum suffocacionem adfert, si in aliam partem aliud atque aliud. Nam quod in vno obseruatum est, id in multis potest intelligi. Est & paulò antè eodem in libro similis aphorismus, *Ventris circumscriptio la quida ad necessitatem deiciens, citò intumescens conuulsuum quida habet.* Illud in Equisone in vico de la Mortellerie obseruauimus, qui cum serò bene cœnasset, quartâ matutinâprehenditur febre acutissimâ, circa duodecimam meridianam totus imus venter inflatur, delirat, tertiâ pomeridianâ pulsus parvus fit & frequens: nigra deiciuntur. serò pectus dolet. Duodecimâ pulsus formicās, interiit tunc. Corpus totum intumescit, & nescio quibus suspectis maculis exaratur. Illud idem Hippocrates, sed non tam apertè vt nos explicat. Sic ei mulieri contingere potuit à reducta materia à parte inferiori in superiorem. Vt saepe idem à materia delata supernè deorsum potest euenire. Quod obseruauimus in filio vitrearij. Primâ die dolor exiguus ad latus dextrum: vomitiones assiduæ, secundo dolores inferiùs ad ventriculum & xiphoïdem cartilaginem percipiebantur: tertio habebat *spasmodus*: quarto summus ad ventriculum dolor, inflatio: extimorum frigus, leipothymia, sudor, mors. Ethoc contingere posse notauit Galenus in comment. in Epidem. vbi notat initio morborum funestissima symptomata euenire, quòd in visceribus malignus humor resideat atque resagneat, adeò vt venenatorum animalium venenū adæquet; vnde inopinata mors aduenit. Quod & huic mulieri contigisse videtur. Sed tanti incendij perceptio quantum ægra narrabat in suspicionem nos adducit eam febrem leipyriam esse, ab apostemate quodam in primis venis, vnde nec in latus decumbere non poterat, & sine tumoris sensu (alioqui ingentem esse oportuisset) vix minimum appulsum digitorū ferre poterat: & eius*

Hist. 4.
sect. 3. lib.
3. Epid.

modi apostema speciem aliquam iliaci morbi afferre potuit. Sæpe enim de repente in primis intestinis & phlogosis, & tumor non ita altus oboriri potest, qui breui ad interitum ægros præcipitet. Præcesserat velut dolor quidam colicus acerbus, quem frustra ignaræ mulierculæ ad vterum referunt. ³

Et Arnaldus Villanouanus annotat colicam quandam mortalem, vt cum remediis (inquit) non alleuatur dolor, sed frigitur in parte, & vomitus post vomitum insequitur: & sudor frigidus oboritur, partiumque extimarum perfrigeratio. Et quod tam propinqua ventriculo pars laboraret, illud forte erat ob colon intestinum cui ventriculi fundum incumbit, & in eo verisimile quoddam apostema natum fuisse. Annotat quoque colicam in iliacam aliquando degenerare, & hanc in illam. Ex omnibus his colligo omnium verisimillimum videri vel simplicem colicam fuisse, vel à colica natam iliacam; quæ iliaca citius interimit quàm colica ipsa, quod in tenuibus fiat quæ ventriculo sunt propinquiora. ⁴

Nisi forte quis dicat febrem omnino pestilentem fuisse. Nā quod liuens corpus post obitum apparuerit, id ad excretionem caloris febrilis, & naturalis extinctionem referri voluit.

Ceterum polliciti sumus demonstraturos nos non è re morbo occupatorum esse in colicis doloribus statim vehementes acresque clysteres subiicere: & tādē hic error pessimus inoleuit, vt operæpretium nos facturos existimemus si carminatium enema subdamus. Quod legerint in doloribus colicis siue fugacibus, siue fixis talium clysterum vtu ad iumentum afferri. Sed id intelligendum modò tempore & loco exhibeantur. Nam (vt annotat Arnaldus loco supra scripto) multi errant Medici ineuntibus doloribus colicis statim subdentes enemata acria validaque: hæc enim fæces iam induratas magis exiccant & exuccas reddunt, & tantam afferunt perturbationem, vt natura sæpe sese colligens omnia retineat, quæ tanto molimine auellere cogitamus. Quod ego sæpè obseruavi: & clyster blandus mitisque in doloribus eiusmodi plus aliquando profuit, quàm ita validus & acer.

Ecquid præsidij afferri poterat ad declinandum tam funestum morbi, tamque præcipitis exitum? Non est dubium quin blandis enematis aluo irritata latæque pars materiæ quæ diu

Cap. 32-
li. 2. Bre
uiat.

304 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
restitit aliò diuertisset: sequenti verò die satis valido et
coprotico exhibito, quod in mediis viis hærebat, foras de-
primi, exigique potuisset. Tertiò & fatus ad partes adhiberi
potuisset, & cardiacis locus fuisset.

Talis forus præscriptus, sed iam res erant deploratæ.

℞. florum chamæmeli, meliloti, an. p. j. ab synth. m. j. s. sem. anisi &
fœniculi an. ℥ s. santali citrini ℥ ij. cyperi ℥ s. rosarum p. j. fiat decoctio
in aqua, addendo vini albi parum, & sacchari ℥ ij. ob inflammationem
foveatur totus venter.

Item ℞. destillati restauratiui & aq. cardui passat. in manica, cum
electuar. diatracag. frigidi an. ℥ ij. in quibus dissolu. diamargar. frigidi
℥ j. rasur. ebor. ℥ s. theriacis ℥ j. syrup. de limonibus ℥ j. fiat potus.

ANNOTATIONES.

1. Si quis legat historiam de morbo caliacò apud Celsum, videat penè
historiam huius morbi; nam singula symptomata congruunt inter se.
Hollerius talem morbum ad febrem accendit. poterit referre; perpetua
enim iactatio, hypochondriorum contentio, materia est crassus humor,
acer & biliosus, tunicis stomachi imbibitus.

2. In hac muliere, sicut & in nonnullis aliis, quorum hic historia con-
tinetur initio magnus est æstus, & respiratio magna æstui analoga: sed
subinde perfrigeratio sequitur: & cum æstuant interna non magnam
spiritum ducunt, sed sunt βραχύμοι. Huius rei rationem reddit Gale-
nus comment. in historiam 3. sect. 3. lib. 3. Epidem. ubi notat contingere
febris istis malis ut initio ingens admodum sit incendium, & magna
sit respiratio, & partium calor: sed statim ita digeritur totus calor febrilis
penè consumptis feruèfactis humoribus putribus, ut remaneat paucus &
languidus calor natiuus: & ille calor natiuus (ait) prius exstinguitur quàm
denudò febris illa accendatur: hunc mors non longè sequitur. Locus com-
memoratione dignissimus est.

3. Huiusmodi colicam lethalem, vel affectum similem in quo ob dolo-
ris vehementiam, animi & defectiones sequuntur, & renocatur calor
intus refrigeratis partibus extremis, explicare videtur Hippocrates aphor.
26. lib. 7. In forti dolore ventris partium extremarum frigida
dicat, malum.

4. Eodem morbo paulò post periit auriga quidam. Primo die dolo-
r levis ad latus sinistrum, qui statim & pedientem ad regionem lienis de-
scendit ac increvit: vomitiones frequentes, dolor stomachi secunda &
tertia

tertio: per seuerabans vomitiones rerum viridium, æruginosarum: dolor laevis non affligebat: in ventre inferiore vagos dolores percipiebat. Quarto, de nocte omnia exacerbantur, partes extremae refrigescunt: cogimur præ suffocatione mittere sanguinem, quod ita requireret ager: vomitiones tanquam lutosi nigrique humoris. Syncope: mors. Omnem autem vsum remediorum mors ipsa anteuertit.

CONSILIVM LVII.

De alui fluore in muliere grauida

CIRCA initium huius libri narrata est historia vxoris cuiusdam thesaurarij quæ ab alui fluore dysenterico tertio post partum die, qui totius morbi vicesimus erat, interijt. *Vide ante Consilium* Conditiones floris istius, & quæ aderant praua signa, vt vomitus mox æruginosus, nunc biliosus, & meracus, febris, *15.* hepatis tumor *et modo duos* non poterant non ad malum apparere. Quæstio esse possit an vterum gerenti alui fluor sit calamitosus. Hippocrates quidẽ scripsit, *Si grauidæ aluus plurimum* *Aph. 34 lib. 5.* prosuat, metus est abortiõis. Quod verum, quia & ob dolores, & defraudationem ipsius fœtus magnæ corporis fœto mutationes contingunt. Sed ex omnibus Hippocratis pronuntiatis vnum est in Prorrheticis animaduersione dignum, & *2. Prorrhetic.* ad prognosin, & ad curandi occasionem præbendam accomodat. Narrat eò loci duas esse dysenterias, vnã cum febre, variis excrementis, hepatis inflammatione, aut præcordiorum, aut ventris, cum ciborum auersione: Aliæ quidem sunt sine his signis cum ramentis quidem & sanguine, sed breuiores sunt, & eas vocat *λευκὴν* fructuosas commodasque ægris, quod aut à diuturnis, aut breuibus morbis ægros afferant. De his posterioribus loquens ait: *Quæ vterum gestant ab huiusmodi dysenterijs, & ad partum, & ex partu euadunt, fœtus sanos habent, etiam per multos menses & sanguine, & ramentis excretis.* Ergo cum in illa muliere mala illa signa apparuerint, quorum iniecta mentio est, non mirum si præceps mortis periculum ingruerit. Et obseruatum est in illustrissima domina ab Insula per maiorem grauiditatis partem sæuam satis dy-

306 CONSILIORVM MEDICINALIVM
fenteriam affuisse, hinc tamen, salua euasit & inco-
lumis, vitalem foetum edidit. Est enim vbi dysenteria
malae sunt cum praesente partiū naturalium praua dispositione
perennis sit graueolentium excrementorum prouentus: est
vbi tantum congeries facta est excrementorum, quorum
euacuatio & foetum & foetam in melioris valetudinis bo-
nam spem adducit.

CONSILIVM LVIII.

De singultu febris superueniente.

*Vide Cō.
lib. 25.*

CIRCA principium libri huius de singultu in febrem lon-
gam incidente dictum est, & quā ratione constituenda
sit febris singultuosa, cuius Hippocrates meminit in quibus-
dam locis, ut illò loci annotatur. Omiseramus omnes sin-
gultus causas recensere: quod hoc loco datā operā à nobis
praestandum est. Ac duo proponuntur, prius ut singultus
causae explicentur: posterius, ut quaeratur cur in febres lon-
gas singultus incidat, praesertim cum marasmo & curis squa-
lore coniunctas, quindecim aut viginti ante obitum diebus,
an id ratione exhausti: & si ratione exhausti, quā id ratione
fiat. Quae omnia non minus cogniti digna sunt, quam utili-
tate vberissima. Ac primum singultum definiunt, morum de-
prauatum ventriculi & contra naturam, cum propriè con-
uulsio non sit, sed *anacrisis*, ut vocat Galenus. Conuulsio
enim propriè cadit in partes quae mouentur *anacrisis*: con-
uulsioque symptoma dicitur causae morbicae tantum, sin-
gultus autem, tussis, sternutamentum naturae à causa mor-
fica irritatae. Autor est Galenus & singultum, & conuulsio-
nem ab inanitione & repletionem fieri sententia Hippocratis:
quanquam venenatam qualiter acremque vaporem tan-
quam quid tertium singultus conuulsui causam alio in lo-
co idem Galenus constituit; quod plerisque negotium de-
dit in tutanda Hippocratis sententia, duas tantum causas
generales astruentis. Nonnullis videtur Galeni sententiam
apte commodèque defendi posse, si dicant per accidens tan-
tum venenatam auram conuulsionem propriè dictam com-

*2. de sym.
caus.
Com. in A
p hoc. 13.
lib. 6.
aph.*

mittere, nimirum feriendo aut cerebri ventriculos, aut nervos: per se autem singultum eundem auram committere. Vt conuulsionis propriè dictæ causæ duæ statuuntur per se, inanitio, & repletio, tertia autem ex euentu, qualitas venenata vti in febribus pestilentibus singultuosis apparet: singultus autem ipsius tres ponuntur causæ, inanitio, repletio, & vapor ferinus. Quasi verò dum è tibia vlcerata, aut cancrosa effertur vapor attingens ventriculos cerebri, non efficiat epilepsiam, aut conuulsionem propriè dictam, vt eâ ratione argumenta illa tantùm diuerticula constituentur.

Tamen quoniam rationalis Medicus Hippocrates generalibus suis theorematis contentus iis fidem adhiberi vult, nec inferiùs demittēs se ad particulares quasdam causas singultus contemplandas, earum vim & ingenium explicat, quod apprimè ad medendum confert: ideo ne temerè per suasi illâ propositione generali, Omnis conuulsio aut ab inanitione, aut à repletionem est: in singultu in febrem pestilentem incidente euacuandi consiliũ captemus, Galenus *τέκνισμα* *Corræus in dict. λυσις.* ex rerum priuata obseruatione instituens ad legitimè curandum quasi neglectis duabus illis causis tertiam astruit. Nam exempli gratiâ, in pressu costæ, in maligna qualitate, in perfrigeratione summa, in descensu intestini, si, vt ferè fit, singultus contingat, an is à repletionem, an ab inanitionem? Si à repletionem est, ecquæ illa est repletio? Repletio tamen est: cum nemo tam medicæ artis ignarus statuatur inanitionem illius conuulsionis causam esse. Cum itaque repletionem causam sui agnoscat, quâ illi ope succurrendum est? Si enim à repletionem principium causamque ducit, huic inanitio vtile est remedium. Nemo tamen auræ pestilenti, aut frigida intemperiei, aut singultui à prolapsu intestini nato euacuans remedium instituat: vt necesse fuerit Galeno ad peculiarem remedium institutionem tertiam aliquam & singultus & conuulsionis causam inducere: ad eorum opinionem debilitandam, qui vt errore vindicent Galenum, tertiam illam causam conuulsionis in singultu, non autem in conuulsione propriè dicta comprehendant.

His omisissis, vt peculiare singultus causas perstringamus, dicam adhuc quod mihi hac in parte probabile videtur. Eodem iure cum Hippocrate duas & conuulsionis & singultus

*Lib. de
vet. Me-
dicina.*

causas tantum constituyente agere possumus, quo & idem Hippocrates cum veteribus qui quatuor primas qualitates sanitatis & morbi causas statuebant: Et tamen hos reprehendit, quasi non & Hippocrates & tota Medicorum familia primarum quatuor qualitatum *πρωτὰ κρῖνοι* sanitatis fundamentum, ut & illius *κρῖνοι* euerfionem ægrotationis causam iam pridem posuerit: ut non ineptè generali proloquio illi veteres ab Hippocrate tamen frustra, ut videtur, reprehensi, quatuor primas qualitates & morbi & sanitatis causas ponere voluerint. Quid ergo sibi vult Hippocrates cum eos erroris insinuat? Quia vniuersalius hoc fecerint, ratifatis esse ad Medicinam faciendam in generali rerum contèplatione versari: nec infrà descendentes quid in quaque re proprium sit considerant. Quomodo magnâ ægrotantium clade plerique qui se physicos profitentur, ex eo iam magnos medendi artifices & principes existere se falsò sibi persuadent, quod in naturalirerum speculatione & τῇ θεωρίᾳ magnos progressus fecisse se opinentur. Quod non satis est: immò ne sufficit quidem Medicorum theorematon vim omnè tenere, nisi ad inferiora te dimittas, quod Hippocrates *τὴν ἀγῶνιν* vocat. Atque eodem modo Hippocrates Gnidios medendi *Lib. 1. de
diata a-
ctor.* magistros sugillat, qui speciosis remedium nominibus & ritualis cum in populo iam iactationem habere se perspicere, inde se in magnos medicos euadere se arbitrarentur. Quod ut vitaret Galenus in assignandis conuulsionis & singultus causis, non satis putauit factum si inanitionem aut euacuationem & repletionem horum causas poneret: sunt enim generaliores, & sensui magis subditæ, sed tertiam causam agnoscit, ut speciales notiones prosequatur quibus ad medendum doceamur. Possimus & quartam & quintam causam agnoscere, quam ægrè aut ad inanitionem, aut ad repletionem referemus. Aut si referatur, nihilò magis proficitur, sed tantum res inuoluitur, & nescitur sæpè quid opis afferendum: ut frustra recurratur ad illam distinctionem quam suprà attulimus, nimirum quòd singultus per se à tribus causis fiat; repletionem, inanitionem, & aurâ. Conuulsio autem non fit ab aura per se, sed *καὶ τὸ συµπερικρὺς* tantum. In vlcere maligno dum effertur vapor epilepsiam inferens, an non illa epileptica conuulsio per se fit? Quidni? Sic Galenus in 3. Aphorismorum confusè & apoplexiæ & epilepsiæ causam eandem, crassum frigidumque humorem statuit, & locum: ergo &

repletionem est: tamen alio loco dum disputat de sternutamento (idem autem est iudicium de sternutamento & epilepsia) ait non quemuis humorem (de frigido præsertim intelligit) in capite redundantem sternutationem afferre, sed flatuosam esse oportet, & acrimoniam acquirere. Hic patet Galenum iam seniores, prudentioremque factum ad speciales causas descendere, nec ita sese vniuersalibus pronuntiatis addicere, ne specie recti decipiamur.

Sed iam pensum absoluiamus. Singultum facit inanitio, facit & repletio. Verum quidem illud, & vulgo ipsi cognitum. Repletio vel à flatu est, vel ab humore acri, vel ab humore lento, frigidoque: & pro causarum varietate variant quoque remedia. Nam vt veteres practici loquuntur, vel per contemperationem curatur, vel discussionem, vel excussionem. Primo modo cum ab humore acri est: secundo, cum à flatu: tertio cum ab humore tenaci ac contumaci ventriculi parietes offarcti. Sic Hippocrates de singultu 3. disputans, ait *A singultu habitum sternutatio liberat.* Et in Commentario Galenus exemplo puerorum, qui repleti subinde singultiunt, docet repletionem maximè singultus causam esse. Nam qui fiunt ab exhausto, sunt rariiores, ait. Vnam autem ex causis externis repletionis causam statuit frigus & frigiditatem, seu perfrigerationem. In Græco est *το κρύος & ψέξις*. Leoniceus vertit, *rigor, & frigiditas*, nos melius *crudor* (Gallis, *morfondure*) siue frigus, & perfrigeratio. Huminiùs autem externum frigus, quia nervosa corpora reddit, minimè perspirantia: unde fit vt in iis humor supprimatur. Et hæc Galenus illo loco. Qui autem humor agglutinator tunicis ventriculi cum maiore vi ad demolitionem sui indigeat, sternutatio confert. Galenus in Aphorismis vomitum & singultum eiusdem ferè generis esse statuit: hoc autem inter se distingui, quod vomitu ea exigantur quæ in ventriculo natant; singultu autem naturam procurare eorum excretionem quæ tenaciùs adherent tunicis ventriculi. Atque omninò à flatu singultum fieri videmus, ab humore acri, præsertim superius orificium ventriculi feriente: vel quòd à corrupto cibo sit, vel quòd ab hepatis cysti refluat, vel quòd ibi collectus sit per phlogosin ventriculi, vel quòd ab inflammato hepate refudet, vt paulò post dicemus. Item fit ab humoris adhæsu, vt dictum est antè, compressionem costarum, quod annotauit Fernelius, ab intemperie

310 CONSILIORVM MEDICINALIVM

frigidâ ventriculi, vt de eo notum esse potest, qui cùm gracilis
esset, & superius orificium ventriculi delicatius frigidiusque
haberet, Medicis persuadere voluit ne in febre continua quâ
conflictabatur aquam propinarent: quod cùm tamen fecissent,
& cum singultire, & conuelli fecerunt, vnde interit. Singul-
tiebat sæpe si quid frigidius cepisset. Hæc Galenus. Ad has sin-
gultus causas referri potest prolapsio intestini quod in senibus
contingit maximè, & sæpè moriuntur. Febris singultuosa non
est quoque omittenda, de qua Hippocrates. Agnouerunt &
veteres inflammationem ventriculi, hepatis, meningionem
bri, mesenterij singultum asserere posse, quod per resudationem
fit, & per consensum. Ac de cerebri inflammatione quæ sin-
gultum efficiat, extat Hippocratis aphorismus, *A vomitu singul-
tus & oculorum rubor, malum.* Cuius aphorismi ex comment. Ga-
leni hæc est *ἡ νόσος*. Sæpe contingit vt materiâ in hærente ven-
triculi parietibus, natura per vomitum conetur deicere id quod
molestum est: etsi præeuntibus vomitionibus singultus rema-
neat, malum. Quod tamen alienum à ratione videbitur. Nam
prius dictum & singultum, & vomitum eiusdem esse generis: in-
hoc differre, quod singultus maior sit conatus naturæ ad amo-
liendum quod ventriculo inhæret: vomitus maior vis non est,
sed mediocris conatus ad euacuandum id quod in ventriculo
fluctuat. Ergo tametsi præcedant vomitus, & post eos remaneat
singultus, absolutè malum non est: sed declaratur impatiens
materiæ quæ tolli non potest nisi maiore vi. Quid ergo sibi vult
Hippocrates? Particula illa, *ἢ ἐνείκε*, à vomitu, trifariam potest
intelligi, vel vt simpliciter ob contumaciam materiæ vomitu tan-
quam quodam minore conatu excuti: & hic singultus malus
non est. Vel vt singultus vomitum consequatur, tanquam à
ἐξάντησις, ob exhaustum. Fieri enim potest vt adeò creber sit vo-
mitus & vehemens, vt inderatione euacuationis singultus ne-
scatur tanquam malum signum & causa. De hoc aphorismus
non intelligit, vt nec de priore. Tertio modo vomitum euacuat
materiâ, libereturque eo quo premittitur pondere, si frequen-
tius insequitur vt malum signum. nam cùm vomitu euacuetur
fuerit, singultus occasio tollitur. quod si ne singultus quidem
tollatur, immò augeatur, significat ab alia causa nasci singultum
quàm à crassa materia, sed à phlogosi & inflammatione,

ventriculi, aut cerebri, aut memingon. Potest enim, vt iam dictum est, post vomitum sequi absolutè singultus ob contumaciam materiei vomitui non cedenti, sed singultum quo excludatur requirenti: sed hîc dat Hippocrates miro quodam artificio signum διαγινώσκον, quo iudicare possis an singultus qui remanet hæres post vomitum, tantum sit ob materiei vitium, an ob causam aliam, nempe inflammationem. Illud porro signum est, *Rubor oculorum*, non is quidem qui fugax est ob conatum vomendi, sed qui inflammationis habet aliquid. Rubor autem iste comes ipsius singultus qui vomitui successit, quatenus singultum comitatur: declarat aut cerebrum aut ventriculum inflammatum, cuius occasione singultus resedit, remansitque post nonnullas vomitu factas κατάρσεις. Itaque aphorismus absolutè pronuntiatus non stetit, *A vomitu singultus, malum*: sed adiectione τῶν ὀφθαλμῶν διαγινώσκον, verus ita efficitur, *A vomitu singultus, & oculorum rubor, malum*. De singultu à repletionem, de febre singultuosa, siue per se talis sit, siue in prolapsione intestinorum accidat, deque eorum curatione abundè dictum est ab Hollerio in Methodo medendi. Nunc quod est secundi instituti præstentur, nimirum qualis sit singultus ab inanitione, & quâ is ratione fiat.

Ab inanitione & conuulsio, & singultus, & desipientia contingunt. De desipientia à plerisque est dubitatum, quòd desipientiæ medentium opera in eo versari videatur, vt recurrant ad medicamenta purgantia, ad cucurbitulas, & ad sectionem venæ, quod hanc omnem à repletionem oriri credant. Vnde Galenus comment. in aphorism. lib. 7. *A profluvio sanguinis desipientia ac conuulsio, malum*. scribit illum aphorismum magnam vim habere ad persuadendum desipientiam ab inanitione etiam nasci posse: quòd verisimile sit ætate Galeni Medicos exstitisse, quibus persuaderi non possit ab inanitione desipientiam proficisci non posse. Agnoscit autem Galenus & ob profluvium sanguinis, & ob vigilias immodicas oriri posse desipientiam: ita vt quæ ob profluvium istud fiat, ab exhausto sit, quæ ob vigilias ab inanitione: quanquam fieri possit vt immodicis vigiliis sanguis biliosus redditus, aut bilis siccior ac æstuantior principium, causamque det illi desipientiæ. Hæc Galenus; & nos id expectantes quatuor febre quartanâ erraticâ que laborasset, emacia-

lib. 7.

com. 1.

apho. 18m.

lib. 7.

312 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 tus planè, squalidus cœpit tantisper desipere, delirare, crebro
 resurgere, & inde cataphorâ seu catalepsi prehensus, quâ interit.
 An credibile ista omnia symptomata à repletionem esse, cum ita
 corpus totum contabuisse & emacruisset? Hoc Rondeletius
 diligens rerum obseruator annotauit, scribens Caron, Cata-
 phoran *in febres tertianas longas, in quartanas inci-*
dere. Item in suburbio Sancti Victorij iuuenis febre malignâ
 satis decubuit: sexto die sanguis cœpit affatim fluere, vix ac ne
 vix fisti potuit: Ab eo singultus successit (dubitabant an ab ina-
 nitione, an à grumo sanguinis in ventriculum delapsi) cœpit
 tremere, delirare, desipere. Num & tremor, & desipientia ab
 exhausto contigit? Immo (quod ab instituto non alienum, &
 Hippocrates ipse non veritus, sæpe loquendi vulgares formu-
 las proferre, vt id quod dicitur sensus nostros feriret magis)
 vulgò iam pridem persuasum est, deliria ab inuito fieri posse.
 Cùm enim in inedia quendam mentem aberrare vident, dicunt
 propterea delirare quòd hinc cerebrum vacuum fit; ita enim
 vocant. Et id verisimile est admodum. Propterea hallucinan-
 tur, cælòquetoto errant, qui in talibus delirijs ad hieram diu-
 colocyntidos, ad confectum de dactylis, & alia id genus valida
 medicamenta concurrunt. Ergo singultus ab inanitione fit.
 Nec falli oportet in febribus longis in quibus oboritur cùm he-
 par præcalidum est & siccatur: quod dum fit, tenue serum re-
 sudat ab hepate, feritque ventriculum, hinc singultus nascitur
 casio. Ob hepatis autem inflammationem patientis viciniam
 singultum oriri, eumque ad repletionem referri posse, ex Hip-
 pocrate potest colligi. Huius verba sunt: *In hepatis inflammatione*
singultus, malum. Et alio loco: *Iecoris inflammationem patienti*
lib. 7. singultus superuenit. Galenus singultum esse *ἐπὶ τῷ ἥπατι* vix scribit, quia
aph. 58. est, auctioris mali occasione fit. Huius rationem reddit, quia
lib. 5. propter neruorum communicationem ventriculus patitur, non
semper quidem, sed cùm iecur ad maximam attollitur infla-
Com. in mationem, iisdem penè verbis alio in commentario vtitur. Sin-
aph. 58. gultus fit non quomodocumque affecto hepate, nec semper
lib. 5. sed cum feruente inflammatione ad magnitudinem attollitur.
Com. in Sic oportet & maximam & pessimam esse inflammationem, ut
aph. 17. Galenus. Sed hic magna difficultas oboritur, & non negligenda;
lib. 7. An læsio ventriculi ex qua singultus oritur, sequatur ob tur-
morem, & ratione tumoris ob pressum ventriculi ab hepate
elato

elato, crassescitque & intumescit; quod Galenus paulò antè dicebat, cùm ad elationem in magnitudinem resurrebat: An verò fiat non ratione pressus & tumoris, sed quia acer ichor & serum biliosum à parte inflammata resudet, feriatque os superius ventriculi? Quid hìc dicam nescio, nam paulò antè huius rei causam assignat inflationem tumoremque iecinoris, idque ex sua sententia: paulò post tamen id ex veterum tantùm opinione constituit. Verba sunt: *Nonnulli putant magnitudinem inflammationis ventriculum premere, ac singultum facere, nequeunte spiritu exire.* Hanc sententiam non valdè videtur probare: nec verisimile est ob spiritus interclusionem hoc symptoma aduenire. Sic eam quidem sententiã probare quidem potest quatenus dicit præ tumoris magnitudine ventriculum offendi, & inde ad singultum impelli, non autem quòd spiritus via intercipiatur. Posteriores autem rationem quã nitebamur docere ab humore tenui & bilioso resudante ab hepate inflammato singultum excitari, ipsemet Galenus astruit commẽtario prædicto. *Et quidẽ bile (ait Galenus) satis calida & multa in hepatis inflammatione genita, confluentẽque ad intestinorum principium & superfluente, necnon ad ventriculum recurrente os ipsius morderi cõtingit, & ita singultum nasci.* Quod probabilius multò videtur. Atque ita in inflammatione hepatis tribus de causis potest singultus oboriri, ob pressum ventriculi à tumore ob inflammationem excitato: (at sine tumore in iis quibus feruet hepar nasci potest: nec in inflammatione, credibile est ita in magnitudinem hepar attolli, vt pressum commemorabilem afferat.) Secundã ratione ob ichorem qui ab omni parte inflammata transsumitur: vt in inflammatione membranæ costis obtentæ tussicula oboritur, transsumpto ichore à parte deflagrante.

Tertiã ratione ob generationem bilis, quã cùm redundet, refluit ad ventriculum, ibique id symptomatis solet promouere. Quartam Philotheus rationem addit minus reliquis probabilem. Ideò enim ait singultum inflammationis hepaticæ sobolem esse, præsertim si concavas occupet, & ingens fuerit, quòd ea magna inflammatio humores à ventriculo vicino trahat, & sic exhauriat illum, quo exhausto singultus ab inanitione insequitur. Progressu quidem temporis hoc fieri potest: Sed respondeat Philotheus quĩ fiat vt tam brevĩ singultus ab inanitione ob viciniam inflammati hepatis sequatur. Hepatitis enim

Tom. I.

Rr

morbus acutus est, & intra paucos dies necat: immò initio etiā
 ἡ πρῶτη πρῶτος potest nasci singultus, cum non sit probabile ab ex-
 hausto tam breui ventriculum laborare. Quæ dux rationes
 à nobis productæ, confictæque, tolerabiliter videntur infrin-
 gere ac labefactare opinionem Philorhei. Addi & potest hec
 cur in summa fame in qua suctionis sensus est, non adest sin-
 gultus: Est enim probabile si hepar deflagrans exhaustat, &
 citò singultum afferat, vt in exacta inedia idem contingat.
 Nam potest respondere Philotheus id quod scriptum est apud
 Galenum cap. 3. lib. 6. de locis malè affectis, cum distin-
 guit diabetem à canina appetentia. In canina appetentia vi-
 tium statimprehenditur, & vis, quia in animali parte id fit
 in diabete autem non item, quia fit in parte naturali quæ su-
 mali sensum non habet vt & ventriculus: potest, inquam, re-
 spondere illam exquisiti sensus facultatem quæ donatus est
 ventriculus ob nervorum propagines multiplices, in causa
 esse cur penuriam, suctum, emunctionemque, vti loquar,
 & minimam & statim percipiat. Vnde fit vt in simis existen-
 te inflammatione, eaque magna & commemorabili, dere-
 pente pars calida trahat, calfaciat, exorbeat: eaque subita
 mutatio, & veluti ἀπὸ πῶτος facta, singultui occasionem dat. At
 verò fames, quia non subitam affert mutationem, non ita sin-
 gultum affert: suctionis quidem sensum inducit, sed nō aliud
 symptoma: nisi quòd quidam conuulsi sint aliquando, sed id
 referunt ad bilem quæ ferit in ieiunitate & inedia, superius
 orificium ventriculi.

Porro si in initio singultum efficit, cur qui rabidi, aut he-
 dici moriuntur singultiendi finem non faciunt cum ab ex-
 hausto laborent? Et quibus aluus immodicè fluit, aut sanguis
 fluxit immodicus, contingit singultus & conuulsio proprie
 dicta: Sed qui sæpe tabuerunt, non prius singultiunt quàm
 dum iam iam sunt animam acturi; vnde vulgus extremum
 singultum aptè satis appellat, quasi naturâ non persentiente
 inanitionem præcedentem vt quæ sensim fieret: sed iam iam
 pereunte facultate naturali singultus excitatur? Quæstio hec
 difficillima est, & commentatione dignissima, vt quæ intel-
 lecta perspectaque non minùs autoritatis pondere quàm vir-
 litatis vbertate, iactationem in populo sit habitura. Cum re-
 pletio est aliqua, aut venenata aura, aut acre quippiam in ore

ventriculi, aut inhærens tunicis ventriculi, non dubiū quin
 legitimā ratione ventriculus ipse molestias depellere anni-
 tens, in se ipse conuellatur, singultumque efficiat conuulsio-
 nis propriē dictæ æmulum. Sed quo modo præeunte insigni-
 aliqua euacuatione singultus ab inanitione fiat maiore quæ-
 sitione dignum est. Nam, vt antè commentabamur, si inani-
 tio conuulsionem afferat in corpore vniuerso, & singultum
 in ventriculo, cur in hecticis in quibus extenuationis summa
 sunt omnia, & summa inanitio, propalam explicatur, frequē-
 tes singultus non adsunt? Primum hæc de conuulsione &
 singultu disputatio satius potest explicari: deinde in angu-
 stius cogi ac redigi. Nam & contra Galenum olim à subtilis-
 simis rerum indagatoribus disputatum est, vt conficeretur
 inanitionem ipsius conuulsionis causam non esse. Ratio au-
 tem potior illorum erat illa quam exposuimus, nimirū quod
 emaciatis & à morbo tabefactos ac colliquefactos conuul-
 sionibus exerceri oporteret: quod non vlu-venit, nisi quod
 complicatum sit coniunctumque cum ipso marcore quod
 partibus conuulsionem afferat. Atque huic obiectioni ita so-
 lutionem opponunt: Vt morbus fiat, oportet mutationem
 fieri subitam *ἐκ ἀδεῖαν*; quæ enim lentè *ἐκ τῆς βίης* fiunt, id est
 paulatim, pigròque gressu, ea non imprimunt quid corpori,
 nec mutationem alterationemve effatu dignam afferunt: vt
 propterea conuellendi occasio non adsit, tamen si ea emacia-
 tio tabesque reciprocè cum inanitione coeat; id est, tabes &
 carniū collapsus & marcor ad inanitionem referatur. Sed
 cum fortè fortunâ, aut criticè, aut aliâ vllâ ratione profun-
 ditur alius, aut sanguis, aut euacuatio aliqua *ἐκ τῆς διατροφῆς* con-
 tingit, è regione adest singultus, aut conuulsio aliqua, quæ
 hominem sic repente & affatim euacuatū adoritur. Et hæc
 maximè ratione singultus sequitur ob inanitionem. Quan-
 quam duorum aliterum esse, aut vtrumque necesse est, vel vt
 ventriculus minimam inanitionem sui sentiens tanquam
 quod sibi molestum singultiat, vel quod tamen inanitio
 ventriculum ipsum non attingat, tamen ex euentu sensum
 habet inanitionis aliarum partium. Quod ad prius attinet,
 fieri potest vt quia animalis sensus est in ventriculo, minimā
 lationem sentiat ventriculus, in ceteris partibus idem non
 contingit, quod is sensus animalis non ita insit. Quod fuit
 Rr ij

316 CONSILIORVM MEDICINALIVM
argumentum Galeni in libris de locis affectis, dum probaretur caninæ appetentiæ singula momenta, vires, & tempora perciperentur: ipsius autem diabetæ non item. Nam cum animale munus obitur exactè in parte aliqua, minimâ oblatâ occasione rei tristic sensio percipitur. Sed hîc quærat cur in inedia non conuellatur ventriculus ratione exhausti, si minimæ rei tristic sensio inest ventriculo? De posteriore ita nos statuemus. Ex euentu inanitionem aliarum partium ventriculus præsentit, subodoraturque, quòd tanquam in chorea fiat partium harum & illarum attractio, deinde attractio suctum inducit, & suctus suctionis sensum: cuius cum tota ratio in ventriculo ipso sentatur, non est dubium si potest aliarum partium penuriam sentire. Accedit quod inanitio ipsa attingat quoque ventriculum ipsum, sed non ita vt & ceteras partes. Nam si marcor, macies, & exhaustum eodem modo & gradu ventriculum ipsum attingeret quo & partes ceteras, fieri non posset vt animans subsisteret. Propterea in corde natura aquosum quid in pericardio constituit, vt & si totum corpus deflagraret, haberet tamen cor tanquam vltimò moriens quo sese sustentaret, & à tam subita deflagratione vindicaret. Ita & in ventriculo semper est aliquid pingue, mucosum, offarciens rugas & parietes ventriculi, vt minimè sentiat damnum: accedit quod si qua alia pars ingestorum gratiam recipit, ventriculus est maximè.

Sed hæc tam accurata exactaque vix conferunt ad curandum. Tamen magni interest scire in singultu quid agat, quid patiarur, quæ causa, ne temerè singultum ab inanitione, pro singultu à repletionem accipiamus. Plurimum autem refert ad Therapiam an hic aut ille sit singultus.

ANNOTATIONES.

Idem fortè dici potest de singultu & conuulsione, quod & de dolore capitis. Nam dolor capitis fit aliquando per sympathiam absolutam, et cum neruo lesò statim cerebrum compatitur sympathiâ absolutâ. nec enim vapor, nec materia vlla intercedit ad talem affectum committendum. Illa quoque est quedam conuulsio & singultus, qui nec repletionem, nec inanitionem, quæ sunt perspicuæ causæ, agnoscit; sed absolutè fit, per modum quemdam vix exprimibilem, vt sic loquar.

2. Cum & desipientia, & singultus, & conuulsio ab inanitione fiat,

male cum aliquis talis affectus contingit, statim recurrunt Medici ad attenuantia & calefacientia. In quo aberratur: & talem errorem conuincit Galenus lib. 11. Simplic. cap. de castoreo.

3. Lib. 1. Epidemior. meorum obseruari ex sententia Hippocratis, medicamentum irritum & inutile posse huiusmodi symptomata excitare. quod notandum est. Item filius domini Pouart Regij in Camera comptorum Auditoris, cum bimestri tertiana laborasset, nec ad medicamentum adduci potuisset, cum calum incanduisset paulum, datur medicamentum, cui indormiendum imprudens Pharmacopæus censuit. Medicamentum inane fuit. Mouit, nil exclusit. Ab eo tempore vix febris exers. De dolore capitis, de quo prius non conquerebatur, queritur. Dum paroxysmus repetiū repenti ^{acutus} fit, elatis in cerebrum vaporibus, immo & febr. ipsa iam cerebrum occupante (vnde calor accerrimi sensus apparebat) ac si febris esset capitalis, (vt sic loquar.) Per viginti quatuor horas ^{acutus} fere fuit, & ^{acutus} eum prehenderat. Virtus erat debilis. Nil natura prestitit, quamuis irritata. Conuulsus interiit. In cerebro nil deprehensum. Vena intumuerant parum. Vi febris interiit obfesso cerebro quoque, vt interea non esset flabellatio cordis ob respirationem non liberam. Si enim sanis cum dolores capitis derepente oriuntur, ij muti fiunt, & apoplectici moriuntur, quid non eueniet simile acri? Aphorism. 51.

lib. 6. Ad illum locum Rondelii allegatum addi potest quod scribit Hippocrates lib. 4. Epidemiorum, vbi notat quartanam febrem tum cessasse cum homo factus esset ^{tuus} ^{tuus}, aut ^{tuus} ^{tuus}. Immo commemorabilis est locus Comment. in historiam de Pythione histor. 1. lib. 3. Epid. vbi dicebant Interpretes Hippocratis Pythionem delirasse quod à venere abstinisset multo genito ac congesto semine, quod obrucendo cerebrum delirij causa foret, eo modo quo in apertione capitis pressus manuum cerebrum offendit. At Galenus refutat hanc opinionem, putatque oppressionem cerebri, siue sit cum humore, siue à manu, siue à terebra, aut alio modo, non causam esse delirij, sed potius affectionis cuiusdam apoplectica ac comatose. Qui locus preclarus est, vt scias delirium & desipientiam aut ab exhausto esse potius, aut ab humore non tam quantitate quam qualitate peccante.

Rf iij

CONSILIVM LIX.

De febre purpurata.

IOANNES Dodeuars in regiis negotiis quæ ad rem bellicam
 pertinerent occupari solitus, dum circa mensem Octobrem
 infinitum prope iter velocissimorum equorū cursu demectitur,
 ac conficit, Luteriæ in morbum grauē incidit. Et vt homo erat
 acutus, agilis, expeditus, multa animo ac cogitatione versans,
 biliosus, irasci facilis, ita suæ naturæ congenerem in morbum
 præceps ruit. In hoc agro fortè nos longius prouchi oporteret,
 quam ratio proposita postulare. Nam admirabilis rerum tra-
 here nos potest ordo, si singulorum vim explicare institutum
 esset quæ in morbo contigerunt. Cum itaque diu & noctu
 laboribus penè confectus fuisset, cum quiescere cœpit, cum
 cum leui horrore febrisprehendit, noctem insomnem duxit
 deinde magna liquidorum excrementorum copia, nil autem
 crassum excretum est: nausææ frequentes: paulum quieuit nō
 nullis supra infræ excretis. Febris cœpit incrementum, iactatio-
 nes & vacuitas somni, dolores ad regionem ventriculi & lienis
 yrinæ ardentes quodammodo vineæ, aut vino giluo dilu-
 aliquando mali aurei colorem non ita saturum referebant. Cra-
 da: sitis inexhausta, etsi cyathos duos aut tres aquæ hausisset,
 ficcauissetque, ne minimum tamen refrigerij hoc afferre vide-
 batur, ac si in ardentem fornacem iniectum id esset. Animi de-
 fectiones, præsertim cum resurgere vellet, omnium artuum
 confractio & lassitudo mixta ex phlegmonosa & tensiva: &
 quod mirum fuit, intercalaris pulsus erat, intermissio, inæqua-
 litas, & ea intermissio in multis pulsationibus apparebat. Tercio
 die sinistrum crus pustulis rubeis humilibus maculatum erat,
 quod nobis terrori fuit. Sed hoc sibi familiare esse nuntiante
 Febris eundem typum non seruabat: noctes aliæ aliis erant mor-
 lestiores. Medicamenta quæ initio exhibita sunt, educebant
 aliquid subrubeum, subflauum, sed paucum, & non nisi magna
 vi. Omnia cruda erant, & nisi moræ impatience fuisset, medicis
 que vim quodammodo afferret, vt morbum primo quoque tem-
 pore oppugnarent, incumbendum tantum fuisset cōditioni, ne

gotiumque naturæ totum committi credique debuisset. Sed & venam fecare, & purgare coacti fuimus, idque frustra, cum nos videremus nihilomagi è re ægri esse. Sed satis ægri fuit faciendum importunitati. Morbus longus fuit admodum, nec ante tres menses sibi restitui visus est. Notandum interea rigentem hyemem quæ tunc si aliàs vnquam sæuisset, ad morbum producendum attulisse plurimum, quod & meatus occluderetur, & materia contumacior redderetur. Accedit quod nisi ita initio materia cruda iactata fuisset, melius actum fuisset cum ægro. Eum in quartanam casurum sperabamus, & quod illo tempore magna quartanarum febrium copia in populo iactabat se, tum quod de liene quereretur. Tertio, quod expulsis symptomatice iis quæ liquidiora forent, remaneret materia incinerata, vt vocant Practici, adustaque quæ cunctando putredinem accerferet, & ægrum nostrum febre quartanâ cumularet. Ne longè à vero aberrauimus; nam tres aut quatuor paroxysmi quartani illum oppresserunt.

Hic multa considerari possunt, quorum explicatio vtilitatis vbertate sit nos delectatura. Primum ex historia morbi, & excretis innotescere potuit id quod principio erat implicitum ac inuolutum, nimirum quæ morbi species, & à qua causa. Secundò vnde ista extimarum perfrigeratio fugax aliquando: leipothymia, æstus ingens & nullâ ratione extinguendus: pulsus in homine iuvene inæqualitas, & intercalaris quædam intermissio, quæ periculo non carebat. Lassitudo ista, iactationes, dormit ad lienem, vrinæ quales descripsimus. Quæ omnia sigillatim explicabuntur. Id quod maximè nobis terrori fuit, pulsus inæqualitas, & intercalaris intermissio in vna pulsatione erat, initio quidem ordinata quodammodo erat: recreatis verò vitiosam inæqualitatem ordinatam non esse. Vt enim in rebus è natura ordo quippiam habet laudis & præstantiæ: ita in rebus contra naturam, non potest non ad malum apparere. Causa autem quæ nos hic commouerit atque perturbarit, est quod nos legissemus aliquando apud Galenum & inæqualitatem in pulsibus malam esse, & hac deteriore intermissione in iuuenibus, scribit periculosissimam esse pulsus intermissionem in iuuenibus, minus in pueris, minimè in senibus. Tamen ait aut ex artetriarum obstructione ortam, aut asthmate, aut diuturno affectu,

320 CONSILIORVM MEDICINALIVM

non ita exitialem esse iuuenibus. Ex vnius pulsus intermissione
multifenesae pueri euaserunt; iuuenum nullus, ait: quae
gnantia videntur. Nam aut ex asthma, aut arteriarum obli-
tione, aut affectu aliquo longo (praesertim minime aduersa
letudine) dixit intermissionem non esse lethalem. Sed cum
quitur de bona valetudine praesente, quaestionem videtur di-
mere. Si enim in ceteris satis robustus & magnus sit pulsus,
dubium quin intermissio aliqua non ita periculum creet: sed
pulsus parvus, languidus, inaequalis, & austariò accedat in-
missio, quae spes esse possit? Galenus cap. 4. lib. 2 de praesag.
pulsibus, de pulsum inaequalitate multa, eaque praecleara:
munique statuit aut in vna pulsatione obseruandam esse
qualitatē, aut in multis quod (ἡ ἀπορία vocatur ἡ οὐσιματία) alio
in vno pulsu inaequalitatē deteriores esse eā quā in aceruo
cumulo fit. Differunt autem inaequalitas & intermissio cum
ad illam referatur. Quod Galenus docet cum scribit: *Peri-
sum est omnino non moueri arteriam, quod διαλείπειν dicitur: quod
alia species inaequalitatis adest, periculosum esse dicitur.* Inter-
grammaticè tantum & obscurè locum illum vertit: ac primo
ex alio loco inaequalitatis pulsus causas repetit oppilationem
compressionem instrumenti, humorum copiam collationem
etā cum facultate, cordis intemperiem inaequalem. In genere
igitur hae inaequalitatis causae statuuntur. ⁴ Intermissio autem
pulsus agnoscit causam suae facultatis à copia humorum
pressionem, eiusdem impedimentum quominus motum
pore suo auspicetur, idque aut ob crassitudinem, aut copiam
humorum vnde oscillorum cordi vicinarum arteriarum
tur obstructio. Item saepe oscillis illis offunditur materia
vinculi modo intercipit motum. Interdum inflammationes
scirrhi, tumoresque partium quibus arteriae infixae sunt, im-
diunt ne liberè dilatentur, vnde motus intermissio non
Vnde in syncopis & palpitationibus cordis hae intermissiones
parent: si quid enim tunicis arteriarum, aut cordis ipsius cor-
rialtè defixum fuerit, in propinquo mors, intemperies
qualis cordis intermissionis causa vna non ita pernicio-
Hae enim inaequalitatem potius parere nata est, quae in
bus febribus putridis maximè conspicua est. Galenus lib.
Cap. 9. febribus quod ad hunc locum maximè pertinet in febribus
lib. 1. tridis agnoscit duo quae propria sunt, non tamen inseparabiles

Lib. 2. de
can. pul.

Cap. 9.
lib. 1.

ὁρῶν δὲ τὸν ὅλον, coarctationē pulsus appello, & ἀνωμαλίαν, inæqualitatē,
 accedit tertium ἐπιπλεονεξασθαι, id est, repetere, geminare, anno-
 tationem nouam habere febrem, cum videlicet accessione iam
 vigorem aut suum clementum affecuta, rigoris sensus quidam
 excitatur ac si post liminiō noua accessio succederet. Quod in
 febribus putridis multis conspicitur: & nos anno 1572. totā
 hyeme, & 1573 toto tempore verno & æstate quæ naturam in-
 dolēque hyemis, aut potius autumnī referret id in innume-
 ris, præsertimque in mulieribus obseruauimus. Quod non aliū-
 de contigisse suspicio fuit, quàm ob materiæ inæqualitatem
 quæ difficultatē pepasmi afferre solet. Græcis illud ἐπιπλεονεξασθαι
 dicitur accommodato satis vocabulo. At δαίψις fit ob copiam
 materiæ quæ facultatem in aliquas angustias cogens pulsus co-
 arctationem angustiamque facit. Ἀνωμαλία proprium quidem est
 febrium putridarum, siue illa in calore, siue in pulsu spectetur.
 In pulsu quidem ob fuliginosorum putriumque vaporum cor-
 petentium copiam. Galenus autem illo loco ait, sæpe in ipso
 ore ventriculi collecto quodam prauo humore mordaci aut fri-
 gido paruitatem inæqualitatemque pulsus inuehit: & cum in
 principiis paroxysmorum viridum humorum eructatio in os
 ventriculi contingat, vnde nausææ & vomitiones; mirum non
 est si affecto ore ventriculi pulsus sit ἀνώμαλος. Paruitatem qui-
 dem cum quadam inæqualitate, cum frigidus est humor: sin a-
 cer & mordax humor est, inæqualitas paruitatem pulsus exu-
 perabit. Quod notandum est, ne temerè initio morborum si-
 ue adsit febris, siue non adsit, obseruatā aut inæqualitate, aut in-
 termissione quadam ad venenum aut δειδέναι recurramus, magnū
 aliquid nos dicturos rati si diuinitatem quandam in morbo hoc
 aut illo dixerimus esse. At sæpè vna ventriculi oris superioris
 obfidio propter contumaciter adhærens aliquid pituitosum illi
 parti, hoc symptomaton genus iuniores & inexpertos Medicos
 perterrefaciens inuehit: maximè verò si pituitosa materia cir-
 cum partes has accendatur, contumacimane materiā. Nam
 quandam τῶν speciem inducit.

Nunc ad intermissionem reuertamur. Aliquando intermit-
 tit pulsus tantum quantum temporis esse possit in alia promo-
 uenda pulsatione, aliquando intermittit diutius, & per duorum
 pulsum tempus. Hoc posterius funestum est, nec ab eo quis-
 quam conualuit. Per tempus verò totum vnus pulsus, aut pau-

Tom. I.

SS

322 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 lō diutiūs intermissionem factam sæpe in plerisque qui conua-
 luerint obseruauit Galenus, præsertim si iam affectā ætate, aut
 præcipitati senes essent. Quod minūs mirum in senibus, ta-
 met si periculosum esse videatur iam ipsam ob ætatem ad vie-
 tam facultatem accedere istam intermissionem à morbo. Sed
 quod notandum, adductis senibus, & iis quos valetudinarior
 vocamus, docet à magnis causis valentes de sanitatis gradu
 deiici, quod cū contigerit, periculosius agrotant. At imbe-
 cilli & senes minimā etiam occasione aut morbo occupantur,
 aut intermissio pulsus eis accidit, quod minūs in his mirum vi-
 deri debet. Itaque ab intermissione pulsus pueri & senes non
 intereunt, iuuenes intereunt: nisi fortē iuuenes illi imbecilli
 naturā sint, & senes validi; nam tunc facile decipi possumus. Il-
 lud enim notum ex Hippocrate, *Qui laboribus assuesfacti fuerint,*
licet aut senes aut imbecilli sint, non consuetis licet validis ac iunioribus,
alacrius ferunt. Itaque est vbi in iuvene imbecillo minūs sit for-
 midabilis pulsus intermissio, quā in sene robustiore. De pue-
 ris ac senibus quod ipse obseruaui, dicam. Carpentarius qui-
 dam nomine Gilet annos pene 78 natus, imbecillis pleuritidis
 ac purulentis, vt fidem eu entus fecit, crudeli fatis pleuritidis
 de detentus iacebat. Inæqualis pulsus & intermittens quod no-
 bis non mediocre metum incussit. Ista anomalia perseueraba-
 bat: sæpe medendi fiduciam quam habebamus per sectionem
 venæ repetitam, vt ferē fit, minuit ista intermissio. Tamen ista
 quam adduximus opinione audacior erectiorque factus, ve-
 nam ter quaterque secui, conualuit. ⁶ Intermissio hæc ab æta-
 te erat, iuuante quoque duritie pulsus, tum ratione inflamma-
 tionis, tum duritie vasorum. Quod animum addidit vt etiam
 num in ista anomalia securiores effemus, erat pulsus magnitu-
 do. Si enim ad intermissionem pulsus crebritas cum paritate
 accedat, angustior longē spes est. In pictore Petro Dangers
 obseruauimus perspicuam pulsus intermissionem in magna af-
 fatimque facta destillatione: hoc illi familiare est; & tandem
 prehendimus duabus de causis hoc illi vsuvenire etiam cū
 primū incipit agrotare. ⁷ Prior est illi connata superioris ori-
 ficij ventriculi infirmitas, vt minima etiam occasione in leipo-
 thymiam deliquiumque animi præceps ruat: sed pane in vino
 infriato in os iniecto statim recreatur. Posterior est ingens
 copia materiæ pituitosæ & frigidæ à cerebro imbecillo facta

*aph. 49.
lib. 2.*

obysum modiolli continenter illabente. Reiectâ enim vomitione materia multa statim priores vires recuperat. Et nos illū nouimus à grauibz funestisque morbis quibus sæpe subiaceret, defunctum superstitemque euasisse. In D. Barthelemy iam grandi ætate eadem à nobis pulsus inæqualitas & intermissio, eum magnitudine tamen obseruata est sæpè, integris satis viribus, & corpus alacre ad surgendum. Et quod mirum est, sæpe de industria in molliusculis pueris istam inæqualitatem conspiciam vidimus, præsertim cū dormirent.

Ac de inæqualitate pulsus non modò in multis pulsationibus, sed in vna pulsatione, quod longè deterius esse paulò antè dictum est. Extat historia apud Galenum de Antipatro, cui inæqualis pulsus erat admodum, cū tamen anhelosus non esset. Et tandem argumentis coniecturisque est affecutus Galenus leues pulmonum arterias infarctas obstructasque esse. Quæ cū plerique Medici agnouerint inuento quodâ de pulsus inæqualitate conquerenti, non temerè de morte repentina pronuntiabunt, sed diligenter causis rei eius indagatis, aliis securitatem prædicent, perniciem aliis minabuntur. Et quoniam locus postulat vt mentione de pulsu factâ (cuius cognitionem soli Deo & Galeno Gordonius ille vir bonus & candidus tribuit) de speciebus quippiam dicatur, non erit alienum ab instituto paulò apertius de re disputare.

In pulsibus quinque obseruari volunt; motum, quietem, dilatationem arteriæ, ictum, corpus. Ac ratione motus differentia hæ obseruantur; celeritas, tarditas. Ratione quietis, frequens, rarus. Natura non potest duos motus contrarios moliri quin sit interiecta quies aliqua. Galenus autem quietem distinguit in internam & externam: Ratione dilatationis, paruitas & magnitudo in pulsibus obseruatur: Ratione ictus, qui & à nonnullis occurfus dicitur, imbecillitas seu remissio, & fortitudo sue vehementia spectatur. Ratione corporis ipsius arteriæ, plenitudo & durities (quanquam durities sine plenitudine esse possit, vt in hecticis annotauit Galenus lib. i. de diff. febriū) vacuitas & mollities. Hinc constitutæ sunt differentia in pulsibus,

Ratione motus,	{ celer,	Ratione dilata-	{ magnus,
	{ tardus,	tionis,	{ paruus.
Ratione quietis,	{ frequens,	Ratione ictus,	{ imbecillus, seu remissus.
	{ rarus.		{ fortis, vehemens.
		Ratione corporis	{ plenus, durus.
			{ vacuus, mollis.

Ss 22

C. p. ult.
lib. 4. de
loc. aff.

Quingua
in pulsa
obserua-
da.

Porro in corpore arteriæ vel consideramus trinam dimensionem, vel corpus ipsum per se. Si priore modo, pulsus latum angustum statuemus, profundum humilem, longum breuem. Si autem posteriore modo duritiem seu plenitudinem spectamus, unde pulsus plenus & durus, & vacuitatem seu molliorem, unde pulsus vacuus & mollis. In dilatatione autem magnitudinem & paruitatem considerandam diximus, quod pertinet obseruatio trium dimensionum. Nam magnus dicitur pulsus qui longus, latus, profundus simul est. Sed hoc ad corpus arteriæ referri potest, quatenus in hoc trinam dimensionem spectari diximus. A rhythmo differentia duci possunt, ut cum pulsus non est secundum ætatem, sexum laborantis, tempus. Innumera alia hoc loco considerari possunt, quæ quoniam à Caleno pertractata sunt abundè, horum diffusiore explicatione super sedendum videatur.

Secundum verò quod à nobis in hoc ægro est obseruatum, fuit partium extimarum perfrigeratio fugax: quæ reuera in morbis diligenter obseruanda est. nam partium extimarum frigus quoddam est positium, sed periodicum, ut initio paroxysmorum, & tale frigus minimè est pertimescendum: contra verò timendum est in inflammationibus partium internarum cum calor intro reuocatur, ut in Aphorism. explicat Galen. Aliud frigus est veluti priuatiuum per quandam extinctionem caloris naturalis: & bifariam apparet, priore modo in morituris, cum partes liuent iam per necrosin partium frigus quoddam est priuatiuum: Aliud autè frigus, non quin partes non calfiant (quod Hippocrates *αἰσθησις* vocat) sed calefactio ista à calore febrili est. Victo autem naturali temperatōque calore partes refrigerantur, & tamen caloris febrilis fauorem nonnullū percipiunt. De quo frigore iuxta ac calore reciproco dictum est ab Hippocrate: *Summa corporis partes si celeriter in utrumque mutantur, malè se habent. Nec abs re addit celeriter; ut vitetur obiectio de hyeme, & calore æstiuo. nam in illa extimæ partes refrigerantur, sed non citò calfiunt. Sed in morbis malignis, ait Galen. in comment. etiam hora mutatio ad contraria percipitur: Contingit autem ea mutatio cum partes extrema propriam caliditatem non habuerint, sed à calore febrili calfiunt, qui à centro corporis incipiens, flammæque similis corpus depascens extrema concalfacit: & cum ille febrilis calor transpirauerit refrigerantur extincta scilicet propria caliditate. Et illic est frigus pri-*

Part 12.
se 2 lib
Rrerrhet

uatum: non tale quale in morte, sed proximè accedens. De eodem frigore dictum est à Galeno in historia de Pythione. *Hist. 2. 7*
 Nam primo die ingens febris erat & æstus: secundo autem ei partes extimæ refrixerunt, præsertim manus & caput, & erat *3 Epid.*
Berymus, ad verbum *breni-stnus*, cui consentit quod & octauo die contigit; nam dicit, *spiritus exilis & imminutus*. Si itaque febris erat acuta, cur frequens & magnus non erat spiritus? saltem si frequens sit & brevis, dolorem significat supra septum transversum: sed si frequens & brevis, malus; deterior si rarus & brevis, siue parvus; qui si cum respiratione quadam siue potius expiratione frigida sit, iam facultas vitalis emoritur: In acuta parvus rarus, qui *Berymvolas* nomine includitur, pessimum signū est. Hoc explicat Galenus commentario illo in historiam de Pythione, his verbis; *Causa cur cum primo die acuta febris fuerit, secundo breuem spiritum ducat, est, quod primo die calor febrilis per putrescentes humores accensus ipse digeratur; calor autem naturalis adeo infirmus relinquatur, ut iam prius extingatur, quam febrilis de integro accendatur, velut iam seruesfactis, qui coputrescerent, succis*. Sic secundā die dominantis frigoris signum est maximum. Quo ex loco patet refrigerationem partium extimarum per extinctionem caloris naturalis contingere. Atque hoc loco quaestio dignissima cognitu poni potest, Si mutatio in calidum & frigidum partium extimarum adeo perniciosa est, ut ante ex lib. 2. Prorrh. docuimus, cur non æquè in malis ducenda mutatio in vtrumque in corpore toto? At ex Aphorismis mutatio in corpore vniuerso, ut corpus modò calfiat, modò refrigeretur, longitudinem tantum morbi significat, cur non & idem significat partium extremarum *μεταβολή*? At antè docuimus aliquid multò grauius designare. Et verò probabilius est plus subesse periculi si ambigua ista mutatio totum corpus attingat, quam si partes tantum extimas. Etenim etiam in bene habentibus facile manus, pedes, nasus mutantur, non ita facile corpus reliquum, ob subiecta viscera calida. Quod si totum corpus modò calfiat, modò aliter afficiatur, non vacare videtur periculo. At ita respondere oportet: Cum Hippocrates celerem partium extimarum in vtrumque mutationem damnat, id de febribus acutis intelligi debet, in quibus si omninò partes extimæ refrigerantur, reuocatio caloris ob phlegmonem visceris significatur: si verò in vtrumque partes mutantur, dominatus caloris febrilis signifi-

catur, & domatio extinctioque caloris blandi & naturalis. Idco cum Galenus in Comment. in partic. illam 8. lib. 2. Prorrh. illam mutationem explicat, meminit febrium malignarum, vt pote in quibus peculiariter id symptoma contingat. Sed cum lib. 4. Aphorismor. totius corporis mutationes in calidum & frigus damnat, reuera non intelligit de febribus acutis. Nec enim facta mentione febris absolute enunciat mutationem illa longitudinis morbi esse argumentu. At si in acuto morbo contineretur, non est credibile longi morbi signu esse, cum id pugnet cum natura morbi acuti. Quod si mutatio in vtrunque toti corpori conueniat, quis dubitat ad malum id non apparere in morbo acuto? Immo forte maiorem perniciem afferet quam mutatio reciproca partium extimarum. Tamen *κατ' ἑξῆς* mutationis signa in partibus maxime extimis apparent, ideo illarum Hippocrates precipue meminisse solet. In febribus autem non acutis, aut aliis morbis totius corporis mutatio longitudinem morbi designat, ob materiae *εἰς ἑξῆς* diuersitatem. Quod videmus vsuvenire in febribus cum catarrho iunctis, in quibus sensum caloris modò habent acri, modò sensum frigoris, non modò in partibus corporis extimis, sed etiam in toto corpore ipso. Item in febribus epialis non solum est sensio caloris & frigoris simul, in quo Epialis natura consistit: sed etiam mox calor percipitur, mox frigus. ¹¹ Præterea ex sententia Galeni, quicumque sunt cacochymi, dum repente incalescunt, horrore tenentur, nec non sensationem habent reciprocam caloris & frigoris: & tamen hec non significant malum aliquod, sed tantum longitudinem morbi. Ceterum vt de mutatione ista caloris & frigoris aliquid statuatur, sciendum idem esse iudicium de caloris & frigoris mutatione, quod de frigidis sudoribus, de quibus in Aphorismis. Nam vt frigidi sudores cum febre acuta perniciem significant, & in mitiori febre morbi diuturnitatem: ita & mutatio in vtrunque siue sit extimarum partium, siue totius corporis in acutis morbis perniciosu est quid: in aliis morbis aliud significat. Sed de vicissitudine ista caloris & frigoris, vnde, & quid significet, antè dictum est plenissime. De ea plura qui volet, conuertat, seque ipse conuertat. De lassitudine quæ aegroti nostro aderat, ita dicere possumus: videbatur non esse spontanea; siquidem labores quos summos pertulerat, eam lassitudinem satis poterant inuehere, ¹² tamen erat & alia quædam species ex iis lassitudinibus quæ spontaneæ dicuntur. Ac

Conmi.
part. 26.
sect. 3. lib.
6 Epid.

4. Apho.

primum spontaneæ lassitudines dicuntur sponte natæ, nō quod non sit causa aliqua, sed causa intus latet aliqua lassitudinis species se se proferens; non autem procacitatem quid habet: tamen si fortè ab extra aliquid peti possit: sed tamen de essentia ipsius lassitudinis non est. Ex libris sanit. tuen. & Aphorismis, triplex est lassitudo; vna tensiva, vlcerosa altera, tertia phlegmonodes ex vtrisque orta. Tensiva à plenitudine est, vlcerosa à cacochymia. Phlegmonosa ab vtraque causa est, ex sententia Galeni. Febris autem laboriosa aliquid aliud peculiare habet, vt ex eodem Galeno parère potest. In hoc ægro nostro erat lassitudo quædam phlegmonosa. & cum is integrâ olim sanitate fruitus esset, non nisi magna de causa desanctis statione detrudipotuit; vnde mirum non fuit si morbus admodum longus & periculosus fuerit: Et omnia initio ita cruda fuerunt, vt nil aggredi tentareque auderemus. Tamen quoniam omnium minime patiens erat æger, temerè secta vena, & multa tentata, quorum nullum melius fuisset attigisse, sed negotij partem maximam naturæ commississe. Eductus sanguis planè laudabilis: nihil sedatus æstus. Quoniam prima regio humore bilioso, crasso & veluti sanguineo aut prærubro erat offerta, cuius exclusionem facilem impediēbat rigens hyems quæ tunc sæuebat. Quod nos terruit, fuit veluti cruris sinistri maculæ subrubræ, verebamur ne exanthemata eruperent, siue ecchymata ab humoribus superfluis & tenuibus, vt notat Galenus lib. 3. Epid. Quæ exanthemata in plerisque sunt *κατὰ τὴν κριτικὴν*, vt ex historia de Sileno parère potest. Cui cum lethaliter ægrotanti papulæ rubentes, parvæ, varis similes, nec abscessum facientes erupisset, naturâ morbo reluctante, tamen interiit. Et tamen ait Galenus in Comment. ea eruptio causa fuit cur nono die non interiit, cum ei necessariò intereundum esset, sed in diem vndecimum mors dilatata fuerit. Dolor ad lienem metum afferebat, ne illic abscessus fieret, tamen inflammationis manifestæ argumenta nō erant. Causam istius doloris ad longam equitationē referrebamus, in qua ducuntur ilia, & anhelitus sæpe interruptitur: tamen iste dolor hypochondrij sinistri nos in suspicionem trahebat latentis cuiusdā mali, vt sæpe in Epid. annotauit Hippocr. vt in historia de Sileno adducta paulò antè & alibi passim.

De intermissione, aut potiùs intercalari intermissione ita nos philosophabamur. A plerisque qui citatis velocibusque equis

Com. in
aph. 5. lib.
2.

Cap. 6. lib.
3. sanit.
tuen.

Com. in
part. 2.
sect. 4. lib.

6. Epid.
Com. in
aphor. 31.

32. 33 lib.
4 Apho.

Com. in
part. 51.
sect. 3. lib.

3 Epid.
Com. part.
38. sect. 2.

lib. 1. E-
pid. hist. 2.

multum iter ocyssimè fecissent, accepimus se sæpè cùm quieti se traderent, inæqualitatem istam in pulsu percepisse. Nam exercitatio immodica tandem accersens ^{et} aliud facit quam mediocris: nam mediocris crebros, magnos & celeres pulsus facit; immodica autem, præsertim eum ventum est ad resolutionem aliquam, languidos, tardos & raros facit. Sic in isto ægro animo volebamus quæ fieret ut præcunte tanto labore pulsus esset satis magnus & celer, cum ratione immodicæ exercitationis tardus imbecillusque esse deberet. Huius rei probabiles causæ fuerunt; Æstus ingens celeritatem requirebat, & ætas hominis adhuc virilis impediēbat quominus tarditas & imbecillitas in pulsu esset, cùm tamen satis esset causæ cur & parvus, & tardus, & rarus esset pulsus, præsertim in tanta totius corporis agitatione immodica & veluti contrafractio. Sic æstus ingens, ætas hominis pro paruo magnum, pro raro frequentem, pro tardo celerem satis pulsum induxerunt: sed tamen causæ morbificæ & lassitudo & exercitatio immodica corpus frangēs saltem inæqualitatis autor fuit: & natura retinuit celeritatem & magnitudinem, sed à tot causis tentata non potuit efficere quin inæqualitas foret. Accedebat autem maximè obfidio oris superioris ventriculi quod in isto homine omnium maximè bilioso exquisiti erat sensus: & à bile immodica tentabatur, unde ^{re. diuina} frequens: & morbi euetus satis abundè docuit tanto æstu & copiâ humoris biliosi corpus occupatum fuisse, ut nil suprà. Docuimus autem antè (ni fallor) obfisionem oris ventriculi vel ab humore frigido, vel ab acri humore, aut ichore inæqualitatem in pulsu committere. Vnum præterea fuit quod terrorem attulerit, minxit sæpe oleosum, quod summo estui interno acceptum ferebatur. Historia duodecima lib. 1. Epid. sect. 3. Hippocrates meminit excretas esse vrinas oleosas, quas mortem significare ait Galenus in Commentario. Tamen in de morbis vulgaribus locus est præclarus, quo docet excretionem vrinarum oleosarum malam quidem esse, sed non perinde exitiosam, ut plerique autumant: multaque illic de vrinis oleosis legere possis quæ in communem vsum afferri possunt, quæ tics illis de rebus erit cogitandum.

Porro in ægro proposito cùm subesset æstus ingens præcordiorum, omni ratione prouisum est ne vires illud incendium quæreret. Iusculis frequentibus vitulinis carnibus ei consue-

*Sub fin. 1.
Epid.*

Histor. 1.

sect. 3. lib.

3. Epid.

Vide par.

35. lib. 1.

Prognost.

est: Item clysteribus & iisdem decoctionibus. In enematon frequenti vſu ſtatum eſt, nec olea, nec mel, nec ſaccharum diſſoluebatur. Quoniam quoties aluus inferior æſtuat, feruet, & ambuſta eſt, vt loquitur Hippocrates in libro de aëre & locis, à pinguibus & oleoſis eſt temperandum. Perſeueratum eſt in vſu catholiconis. Tandem ſub finem conſultum eſt ventriculo vſu confectionis de hiera dupla aloë. Inſtabilis admodum morbus fuit, verebamurque ne ex empyreumate prioris morbi febris quartana, aut alia ſimilis creſceret ac ſurgeret. Ad ſitim ſummam cum partium imbecillitate quæ ſequuntur præſcripta fuerunt.

℞. ſemin. pſyll. ℥ſ. maſſich. ʒ ij. car. paſſul. ℥ j. ſem. cyton. ʒ j. ſiant noduli, mandantur macerati aqu. roſar.

℞. aqu. fontana lib. ſ. deſtill. reſtaur. ℥ iv. aceti alb. ʒ vj. mellis Narbonenſis ʒ j. ſantal. alb. ʒ ij. ſ. fiat decoct. ad tertiæ partis conſumptio nem, & perfectam deſpumationem. Poſtquam refrigerit, coletur, & cilar ſcet ʒ. albuminib. ouorum, & ſantal. citr. & cinam. aromatizetur.

℞. endiuia vtriuſque, cichorij, boraginis vtriuſque an. m. j. Depu remur ſucci, & coletur trinâ vice ad clarificationem.

℞. ſucci pomorum redolent. ʒ vj. ſacchari lib. j. fiat ſyrupus ſemicoct.

℞. rhei inſuſi in aqu. endiuia ʒ iiij. myrob. citrin. & Indorum an. ʒ ij. agarici trochiſc. ʒ j. aniſi ʒ j. cinam. ʒ j. fiat potio ſepè repetenda cum ʒ ſ. ſyrupi prædicti.

ANNOTATIONES.

1. In hoc agro bilioſa craſſa, ſincera, flaua, maligna, vt vocat Galen. comment. in part. 14. lib. 3. Acut. progrediente morbo: quæquidem bi liſa, ſiue retinentur mala ſunt, ſiue excernuntur mala ſunt; nam iacta tiones, dyſenterias, deſectiones animi inducunt.

2. Apud Galenum ſub finem lib. de præſagitione ad Poſthumum, commemorabilis hiſtoria eſt de quodam iuvene, cui in pulſu intermiſſio erat, & ea naturalis, à qua periculum impendere non putaret Galenus.

3. Nam minùs eſt pernicioſum inter multas pulſationes quandam in aqualitatem eſſe, quam in vna. Quia in vna pulſatione magis ordinata, conſtansque natura debet eſſe, quod ſi ne in hac quidem mulò eſt pericu dine ortus. Nam cum ſyſtole ſit diaſtole contractior, etiam in vna pulſa tione inæqualis eſt.

Tom. I.

Tt

330 CONSILIORVM MEDICINALIVM

4. Inter ceteros locos unus est maximè huc pertinens in Commentarij Akakia in lib. 1. ad Glauconem.

5. Nam (ut verè dicam) unde Cardiognus & sine febre, & cum febre nasci solet, inde ista in pulsu insignis mutatio: & humor potius exclusione eget, & aliquà *ἐκκρίσιν*, quam alteratione per alexipharmaca: et damnetur error eorum qui in morbis perpetuò illud *ἀγέρον* τὸ δεινὸν *constituunt*.

6. Cùm enim inaequalitas est, non ita citò terreri oportet, nisi ceteri consenserint. Si enim natura valide in alijs ipsius pulsus numeris argumenta adsint, non ita metuendum est.

7. Galenus cap. 6. lib. 4 de presagitione ex pulsibus, docet inaequalitatem esse solere pulsus in affectione oris ventriculi, alios affecto fundo eius. Locus praeclarus & huc maximè pertinens. Inaequalitas ista & etiam intermissio quadam ab oppressione & copia potest accidere. Et cùm Galenus ait inaequalitatem & intermissionem in arteriarum obstructione & asthmate minùs esse terrificam; quod de asthmate dixit. Idem potest audiri de infarctu pulmonum & copia pituita, licet homo ita repletus, quod fortè latum habeat thoracem, non sit asthmaticus. Sic est ubi debet esse formidabile istud vitium in pulsu, est ubi non esse debet. Et ne quis terreatur, sciendum istas inaequalitates ab oppressione esse maximè. Nam Galenus lib. de pulsibus ad tyrones, inaequalitates in pulsibus propriae sunt facultates pressae & grauatae. Sic oportet sensim deonerare naturam, & pulsui sua reddetur inaequalitas.

8. Trina dimensionis observatio & in differentiis corporis ipsius arteriae & dilatationis observari solet, sed diuerso quodam modo. Nam quia dilatatio incidit in corpus tale quale est, cui competit trina dimensio. Itaque ipsius trinae dimensionis observatio consideranda est & quatenus ad corpus arteriae spectat, & ad dilatationem.

9. Sitis in eo erat implacabilis, iactationes, leipothymia, praeputria bilis fuit excretio, non statim, sed longo tempore mitificata materia. Dolores fugaces. Verum fuit quod scribit Hippocrates lib. de veteri medicina, non a calore simplici, aut a frigore, sed ab amaro, acido, acri astimandis morbos esse; ut in vacuando potius, quàm in alterando laboremus.

10. Comment. in aphorism. 48. lib. 4. Multò verò apertius hystericam part. 8. sect. 2. lib. 3 Epidem. cum explicat cur partes extremae lacecerent & refrigerarentur. Quanquam Practici frigus initio paroxysmorum priuatiuum dicunt per subtractionem caloris: & frigus positiuum dicunt, ut illud quod in catarrhosis percipitur, aut iis in quibus multus collectus humor pituitosus, qui dum incalescit sensum frigoris infert, ut in Epilepsia

videtur. Item materia frigidiuscula calfactio frigoris sensum infert.

11. Sicui agro vnquam, huic Ioanni dodenas accommodandum videtur quod scripsit Galenus ad historiam de Sileno 1. Epidem. sect. 2. Si quis laborando & operando se ad lassitudinem vsque affligat, potest autem largè, deinde intempestiuè sese exerceat, id est, aut à cibo, aut vbi tardiùs cocti fuerint cibi, antequam probè in sanguinem cibus versus sit, hic partim bilem ob labores accruat, partim crudos & incoctos humores ex potu & intempestiis exercitationibus. Sunt autem morbi multò grauissimi in quibus vtriusque magna colligitur copia. Immo ego addo, febres semitertianæ sunt. Hic eger citatis equis multum itineris confecerat. Et nota in talibus febribus etiam initio sedimentum esse; sed conueniens non est & intempestiuum. Ita Galen. id frequens est (supp. sedimentū ἀναγειν) febribus in quibus multus calor & flammeus feruorem ascendit quendā crudorum & crassorum humorum ad particul. 26. sect. 2. lib. 1. Epidem.

12. Cauia procatarectica solam diariam aut lenem affectum generat Galeno in histor. de Sileno.

13. Lassitudo quæ ῥότος dicitur, cum quis dolet minimo attractu, spontanea propriè non dicitur.

14. Cap. 4. lib. de atra bile docet quomodo salutariter totum corpus pustulis nigris fuerit oblitum.. Nam si paucae sint, nil est criticum.

CONSILIVM LX.

De Epilepsia.

MVLIER nata annos iam sex & viginti, bene habita, octies iam enixa, sagax, solerti que adeò ingenio & alacri ad obeunda omnia animi munia, blæsa aliquantulum, coepit nonnulla pati symptomata, quorum perseverantia morbum lunaticum minata est.

Ac primùm coepit animo aliquantulum deficere, vertiginosum quid pati: ac tunc non animaduertit quid dicat, omniumque obliuiscitur. Multa temerè effutit, parum considerans quorsum illud. Cum hæc præcessissent, iam iam primâ affectione vires nacta de nocte opprimitur, contremiscit, vociferatur, ac grauiter tunc laborat. Deinde quasi sopita manet dimidium horæ. Et frustra loqui conatur. Et quod omnium de-

Tt ij

terrimum, non ita pridem iam duodecies paroxysmos quosdā sustinuit bis die in quibus illa conuellitur, spumantique est ore, inclamat, suspiratque. Et quo magis animo turbatur, eo citius redit accessio. Iam probatum est posteriorem paroxysmum multò leuiorem reddi, immò sæpe planè non repetere dato iusculo ex decoctione visci quercini. Nunquam medicamentum sumpserat. Continenter aqua ab ore defluit: & in vltimis paroxysmis tota facies rubore suffunditur, manentque veluti exanthematon quædam vestigia quarto à paroxysmo die.

Hæc sunt Parisiensibus Medicis proposita ad disputandum, vt de affectionis causa, specie, loco, & curatione decerneretur.

Ac primùm omnium qui affuerunt Medicorum communis fuit opinio mulierem hanc epilepsiæ esse obnoxiam, quòd omnia quæ præcesserunt videntur confirmare. Dubitatum est de causa, an vapor tantum, an humor, & quinam, vnde. Cum enim epilepsiæ in genere tres sint differentiæ, prima per propriam cerebri affectionem, secunda per consensum ventriculi, tertia ob partem peculiariter affectam à qua aliquid manat, conuulsionem epilepticam creaturum, magni refert ad morbi curationem, quænam sit species, & quænam idea, & sedes primùm affecta, ne parti alteri quàm deceat consulatur.

Ac primùm cuidam visum est, non à propria cerebri affectione natam epilepsiam, nec ab vtero esse, sed à visceribus ipsis: & quæcumque illa sit affectio, & vnde vis sit ei videtur immedicabilis duabus de causis: & quia iam grandævam prehendit: *Quæcumque autem affectio comitialis post 25. annum præhædit, ea cum ægris consenescit* Hippocrati in Aphorismis: Tum quia hæreditaria & gentilitia quodammodo esse videtur; Medicis enim ea de re inquirentibus narratum est eius mulieris auum aliquando epilepsiâ prehensum esse. Quod autem à visceribus sit, non ab vtero, aut à capite, ita collegit tribus rationibus; Primâ, quia sit sagax, expedito & solerti animo, ingeniosa. At cum quis est epilepticus affecto primùm & per se cerebro, maximâ ex parte hebes est, obtusus, obliuiosus, socors, ignauus, oculis concauis, somniculosus, graui capite, vertiginosus, & nullis signis præeuntibus (vt in hac muliere contingit) statim concidit. At qui ob affectas partes capiti subiectas est epilepticus, non statim concidit, sed pleraque patitur tanquam futuram accessionem præfagientia.

Secunda ratio est, quod incubum passa sit sæpè, oppressio-
nem stomachi, animi quandam defectionem, suspiriosa fue-
rit; quæ omnia malè affectorum viscerum aut à sordibus & hu-
morum inquinamentis implicatorum argumenta sunt: Non
quin dispositio sit in cerebro à parentibus contracta: sed causa
continens à cerebro non est, sed à visceribus.

Quancquàm hic magna difficultas oriri posset. Galenus cau-
sam præcipuam periodorum lib. 2. de different. febr. sub finem
statuit inuistam quandam cuique parti dispositionem, quæ no-
uà occasione, vt nouo affluxu humorum sese manifestè prodi-
tico affluxum humorum, vel qui in parte ipsa generantur, vel
qui aliunde sunt. Exempli causâ, si cui hemicrania innata sit ob
prauam partis cerebri *σιάνη*, non prius solet repetere quàm
fortè ab ipso cerebro, aut partibus subiectis humor aduenerit
qui partem lacestat: an non tamen hemicrania per *μεστοπάθεια*
dicatur. Sic, si dispositio in cerebro iam iam sit à parentibus
contracta, quæ tamen non prius sese proferat quàm malignus
vapor crassus aut tenuis à partibus inferis venerit qui parti mo-
lestus sit: vnde excussetur pars ad expulsionem vnde con-
uulso sequatur: An non epilepsia ista per propriam affectionē
dicatur? Itaque ille sibi pugnat, qui dixit dispositiuam ipsam (vt
sic dicam) in cerebro esse, sed causam in præcordiis. Quancquā
excusari potest; nam reverâ non repeteret paroxysmus nisi
impuritas viscerum concurreret. Et illud est quod Galenus di-
cit, epilepsiam post 25 annum agnoscere causam sui prauam
dicam.

Tertia ratio quâ contendit ab vtero non esse, est quod illa
vterum gerens tam sæpè nō prehendatur epilepsiâ, quàm cum
vtero non gerit: quod contrâ contingeret. Nam si ab vtero
esset, cum fœtus meliorem alimenti partem absumat, relinqua-
turque impurior, impuritas ipsa iuncta cum prauo illo humore
qui supponitur mali autor (si ab vtero esset) reuheret paroxys-
mos, & malum malo cumlaret: At tempore gestationis im-
raunis ferè est. Accedit quod hysterica aliquando passa esset.
At nihil vnquam tale.

Nos autem qui hæc scribimus, ita disputationis & quæstio-
nis filum direximus.

In morbis modus generationis illorum est animaduertendus;
symptomata, eorumque successio, quorum omnium animad-

uersione ad rerum diagnofin peruenitur, & confufio deuitatur. Vertigines, tenebricofæ obuerfationes & marmarigæ, fynco-
pæ imago quædam, oppreffio diaphragmatis, clamores, apho-
nia, fymptomata funt & epilepfia, & apoplexia, & fyncope
cardiacæ, & aliorum morborũ communia, & in plerifque ob-
feruantur. Sed non fatis eft obferuare hæc, fed figna ^{diagnosticæ funt}

Com. in ^{diagnosticæ funt}, vt vocat Galenus, tenenda funt; & ne adhuc quidem
part. 2. abundè eft, fed quæ cuiufque rei propria, & partis, vt ideam
lib. 1. morbi venari poffimus. Exempli causâ; difficultas respiratio-
Perrebet nis affectarum partium thoracicarum nota eft, & peripneumo-
niæ, & pleuritidis, an fufficit hæc noffe? Nequaquam. Sed ad
fpecialia magis descendendum eft, vt hoc vel illud, huius aut
illius rei fit vmbra, nota, fignificationis argumentum & fignu.
Quod hîc videre eft, cùm fymptomaton concursus ifte nihil
adhuc certi afferat.

² Porro morborum alij citò generantur, cùm tamen non tam
prompta fit causæ generatio, quàm prompta eft morbi ipfius
apparitio. Causa enim latebat ignaua, & fubito per morbum
fefe expreffit; quod notat Galenus ³ Epidem. in hiftoria de eo
qui primo die phreniticus factus eft. Alij non ftatim fe profe-
runt, fed veluti per ambages & circuitiones, habentque varia
fymptomata prius quæ funt veluti paranympbi ac præcurfores
maioris morbi aduentantis. Quod cùm aliàs, tum huic mulieri
contigit, in qua per varia fymptomata veluti præeuntia prælu-
dia ad epilepfiam munitur via. Nam in hiftoria propofita tri-
plex tempus obferuatur, & in vltimo tantum certa epilepfia
figna apparuerunt.

Primum aliquid tenebricofum paffa eft, vertigines, quæ fe-
pè apoplexiam, aut epilepfiam minantur: an verò per propriam
cerebri affectionem, an per confenfum dubitandum. Nam ver-
tigo & tenebrofa obuerfatio fignum vniuocum non eft aut af-
fecti certò cerebri, aut ventriculi. Cùm enim ex Galeno illud
fit commercium inter ventriculum & cerebrum, vt facile fuas
affectiones communicent, non facilè quis diftinguet quæ pars
Cap. 3. lib. prior afficiatur, & quæ posterior. Sic vertigo, naufea, vomitus,
3. de loc. cardiognmus. Equiuoca figna funt cum ferè æquè ad affectio-
aff. nem cerebri & ventriculi confequatur. In quo Medicorum iu-
diciu fixum conftansque effe debet, ne temerè pars incufetur,
quæ in vitio non fit. Præterea mulier ifta multa effutiebatur,
quod malè affecti cerebri nota eft aut per fe aut per confenfum.

Vnde nouimus hystericas multas risum in paroxysmo cohibere non potuisse, alias multiloquas extitisse.

Secundo verò loco hypochondriorum & respirationis quædam fuit oppressio, & imaginatio quædam falsa rei opprimentis & incubantis, quod incubum designat: incubus autem epilepsiæ rudimentum quoddam est: immò & epilepsia nocturna dicitur à plerisque.

Tertio periodica quædam conuulsio apparuit totius corporis, cum lensione quadam mentis & sensuum. In quo verè character Epilepsiæ exprimitur. Nam conuulsionem totius corporis esse necessarium est. Quamquam Syluius quodam loco annotat vidisse se quendam Epilepticum cecidisse ob prauam lienis dispositionem, illumque vna tantum in corporis parte conuulsum fuisse. Ad superiora accedit occurfus spumæ quæ nec à capite eum est. Si fiat translatio à partibus inferioribus per pulmones, refractio materiei cuiusdam pituitosæ à spiritu flatulento agitante spumam potest generare. Rondeletius contendit epilepsiæ certam non esse notam & signum inseparabile; quia spiritum si à vapore tantum est Epilepsia, tum si paroxysmus brevis est & non violentus.

Ergo verum illud Hippocratis, cum quis repente aphoros fit, venarum sunt interceptiones & oppletiones, si sine occasione id fiat, aut forti aliqua causa, id est, si nulla excusatio afferri possit aut ictus, aut ægritudinis perturbationis que animi. Interceptio ista aut Epilepsiâ, aut Apoplexiâ, aut syncopæ cardiacam inducere potest, item & histericū. Nam quatuor hæc nomine *morbi comitiales* includi possunt. Cum itaque hic sit aphoria quædam, quatuor prædictorum morborum vnum adesse necesse est. At certis signisprehenditur esse Epilepsia.

Cæterum hæc aut præhendit pueros, aut puberes, aut iuvenes, aut grandiores ætate. Partic. 5. sectio. 1. lib. 6. Epid. locust. est notandus de Epilep. cum, ait Galen. Epilepsia iuniores attingit illud vt ab ætate est, ita quoque mutatione ætatis affectus minuitur & tollitur. vnde Hipp. *Quibus morbi comitiales, ante pubertatem mutationem accipiunt.* Quod bifariam intelligi potest. Nam, ante pubertatem, possumus intelligere vel inclusiue, vel exclusiue, vt aiunt. Exclusiue ad annum vsque 25. in-

336 CONSILIORVM MEDICINALIVM

inclusiue ad tempus adolescentiæ. Vnde apho. 28. lib. 3. non dixit ante pubertatem, sed, in pubertate; quod notandum. Iuue-

nes prehendi epilepsiā non placet Galeno in Aphorismis, licet
aph. 29. lib. 3. ita Hippocrati videatur; quia, vt ait Galenus, temperamentum

iuuenum generationi epilepsiæ contrarium est. Postea addit, & prehendantur eo morbo, id diætæ vitio tribui oportere, &

quia prauo vtantur cibo, & multa intempestiue faciant. At

grandiores ætate absolute à diætæ vitio epilepticos reddi

statuit, 6 Epidem. Nec amplius ætati fidendum ait ac si me

dicam manum per se adhibeat, sed ad artis Asclepiadæ aspi-

lum confugiendum esse censet; id enim à diætæ vitio est, im-

mò tantum tribuit ipsi diætæ, vt epilepsiam ratione ætatis

solui posse neget; nisi legitima sit victus ratio, immò ne si in

pubertate ipsa epilepsia accedat (quia Hippocrates ante pu-

bertatem mutationem contingere debere vult) quanquam

tunc tantum opis ab ætate expectari non potest quantum ar-

tea: quia & tempus agnoscendæ veneris in viris supponitur, &

iam præterisse, & menstruæ purgationis in mulieribus, &

men solui tunc posse putat Galenus si in diætā non peccetur.

Quod fortè & generalius potest accipi, ne putemus omnem

epilepsiam incurabilem esse quæ paulò grandiores prehe-

derit. Nam mirum est tantum posse diætā ipsam vt miser-

dum hoc malum inuehat immedicabile planè, cum tamē

hoc excepto, nullum ferè sit malum adeò graue diætæ vitio

inuectum quod non possit emendari & tolli. Vnde colligitur

est morbum hunc cerebro labem quæ elui non possit, inue-

re, quod omnem humanum captum planè superet.

Itaque cum hæc mulier iam grandis ætate miserandi huius

mali molestias senserit, id diætæ vitio tribui potest. Sed potius

Galenī dicam, secretiorem & occultiorem causam esse oportet;

nam nisi labem hanc à vetere sua prosapia contraxisset

mulierem tam benè habitam, tam solidam, & integrè sanam

morbi procellis conflictari non solitam non esset credibilem

à nōnullo diætæ vitio tam turpiter in hunc morbum lapsam

fuisse. Sic oportet vehementem aliquam fuisse causam quæ

hoc symptoma antè non visum & insolens induxerit.

Duo hîc quæri possunt non omittenda, cum à parentibus

propensitatem hanc in epilepsiam contraxerit; quæ fiat vt non

hil epilepticum senserit in pueritia, cum tamen hæc ætas huius

morbo

morbo vltro sit opportuna. Posterius quod quæri potest, Cum mulieres etiam maximè valentes, præcedente imprægnatione præsertim circa tertium mensem multis malis exerceantur, boulimo, inappetentiâ, malaciâ, & ceteris id genus, vel capitis, lumborumque dolore; qui fiat vt hæc imprægnationis tempore paroxismo epileptico non prehendatur, postea verò utero non gerens faciliè prehendatur.

Quod ad prius attinet, reuerâ ex hoc praua cerebri dispositio patet. quod grandior iam ætate epileptica facta fuerit. Nam si imbecillitas nervosi generis epilepsiæ causa fuisset in hac, nõ dubium quin puella epileptica fuisset: at latebat mala dispositio, nec se prodidit nisi quo tempore iam malum incurabile est.

Et quod sæpè pepererit nouies enixa potest partim impedisse quo minùs tam citò non sese epileptica diathesis prodiderit, quod purgationes euntes & ab epilepsia, & à podagra, & aliis morbis possunt ad tempus vindicare, quibus implicantur quæ nihil tale habent. Partim conferre potest ad augendam dispositionem. Nam nemo dubitat iuniores puellas nuptas, & frequenter enixas tantò imbecilliores reddi (quod ad cerebrum attinet) quantò frequentius enixæ fuerint: immò magna earum pars catarrhis, & doloribus capitis immedicabilibus detinetur. Quæ omnia verisimilia sunt. Prætereà vulgò obseruatur dispositionem morborum à parentibus contractorum non tam citò apparere, sed tandiu latere occultarique donec quid peccatum sit quod eius accessum maturet. Vnde plerisque gentilitia est elephantiasis, quæ tamen non sese prodit nisi cum iam grandior ætas fuerit, aut quòd ita provideat natura mali explicationem quoad potest, impediens, aut quo anno parentes in eum morbum inciderint, eodem & liberi inciderunt: quæ ratio probabilior est. Et cum sese malum prodit, siue epilepsia, siue elephantiasis fuerit, non est opinandum illud iam demum nasci, sed mali seminarium diu latuisse, cuius argumenta tandem sese prodant. Tum autem maximè sese proferunt cum mala accedit diæta, quæ etiam per se tale malum afferre potest, sed non ita immedicabile. Plerique enim nostrâ ætate epileptici verè fuerunt ob prauam diætam, at non recurrunt paroxysmù vbi prouisum cautique ægro est. Sed cum natiua est inclinatio à praua diæta facta, & veluti tandem explicata, ea multò immedicabilior est quàm quæ simpliciter à praua diæta fuerit. Et ita proba-

Tom. I.

Vv

338 CONSILIORVM MEDICINALIVM
biles rationes à nobis videntur confictæ, vt tandem id intelli-
geretur quod in quæstione positum erat; Qui nimirum fiat
mulier illa iam ad epilepsiam nata ante annum ætatis suæ vice-
simum octauum prehensa non fuerit, ac præsertim puerili sui
ætatulâ.

Posteriorem quæstionem paulò post explicabimus, si prius
nonnulla remedia attulerimus quæ ad profligandam epilepsiam
per cerebri primariam affectionem contractam instituta sunt,
quorum hîc series est proposita.

Cuidam autem epilepsiam laboranti per propriam cerebri af-
fectionem remedia hæc quæ sequuntur sunt instituta. Primum
repurgatus est tabellâ vnâ electuar. diacarthami: deinde iterum
est ad remedia sequentia.

℞. rad. pæoniæ recent. euulsa ʒj. visci quercini recent. ʒvj. galan-
ga, calami aromat. & cort. citrisicc. an. ʒj. f. beton. meliss. hyssopi, salu-
maiora. chamæd. chamæpyt. an. m. j. buglos. borag. & vtriusq. cicuta
cum radicib. herbarum capill. an. m. j. f. ruta & absynth. pont. an. m. j.
passul. sebest. an. par. x. seminis rute & sesel. an. ʒj. anis. & fenic. an.
ʒj. f. sem. callitrichi & pæon. an. ʒij. stor. stæchad. sambu. roris. & ʒj.
nist. an. p. j. fiat decoctio, & fortis express. Cape de colat. lib. j. f. i.
quod suff. oxym. scyll. ʒij. pulu. diamb. & diamosc. dulc. an. ʒij. fiat
syrupus pro 4 dosibus.

℞. mas. pil. cocciarum fætid. & assajereth. an. ʒj. agar. troch. &
rhei an. ʒj. rad. & sem. pæoniæ decrescente lunâ collectæ an. ʒj. cist. ʒj.
pinguis ʒ. B. cum syrup. de stæchad. fiat maza ad vsum.

℞. maza præscriptæ ʒj. formentur octo pilule cum aqu. vite. capiat
finito syrupo prædicto.

Deinceps bis in mense aut singulis viginti diebus cap. de maza præ-
scripta ʒj. de qua formabuntur pilule tres vel quatuor. deglutiet eas post
primum somnum.

℞. succi betæ & maioranæ an. ʒj. mellis anthos ʒij. decoct. bordei in
regre cocti ʒij. fiat caputpurg. quo vtatur secundum artem per tres
dies continuos manè ore aquâ pleno.

℞. theriac. Monspel. quinque annorum ʒij. rad. pæon. & sem. euulsa
an. ʒj. visci quercini, & cineris cranij humani an. ʒj. coralli rubric. ʒj.
& loti aqua absynth. vngul. alc. an. ʒj. cum syrup. conseru. citri. fiat
opiata, de qua capiat ceteris diebus ad molem castaneæ tribus horis ante
omnem cibum.

℞. ol. costi & nard. an. ʒj. ol. nucis mosc. ʒj. rad. & sem. pæon.

LIBER PRIMVS.

339

visci querc. sem. sesel. an. 3j. gummi ammon. aceto scyll. soluti 3j. s.
terra quod suff. fiat unguen. vngatur occiput ad radicem colli hora somni,
addendo unctionis tempore aque vite parum.

Ulores 3j. habarb. 3j. pulu. rosar. & folior. salu. an. 3s. cum sy-
rup. d. stia. bad. fiat maza vtenda quotidie vnâ horâ ante cibum.

Applicetur ruptorum postica parti capitis, hietque vlcus per tres aut
qua nor annos.

Hæc velut per transfennam dicta, scriptaque sint, retexen-
dum orationis filum est, quod horum remediorum scriptione
interruptum est.

Ex duobus quæ discutienda proposita sunt, vnum satis pro-
animi voto explicatum est, secundum autem nunc restat expli-
candum; nimirum quâ fiat vt hæc mulier cum prægnans esset,
non ita faciliè epileptica concideret, ac cum vtero non gereret.
An hoc significat aut vterum in vitio esse, aliquidque conferre
ad epilepsiam, aut contrâ. Nam si vterus faciat ad paroxysmum
epilepticum, cum concepto semine humorum veluti fiat con-
culcatio, deinde quædam ob suppressionem putredo, vapor
qui inde efferretur plurimum ad epilepsiam cõferre videretur.
Sed hæc plurimum habent difficultatis.

Ac primum aliquid non longè dissimile legere possumus a-
pud Hippocratem. Nam scribit in Pheris mulierem extitisse cui
caput valdè condoleret, idque multo tempore dolor is nullâ
ope medicâ leuabatur. Cum irent menses, leuius habebat; cum
concepisset, dolores relinquebât. Noui quoque & mulierẽ ve-
tere hemicraniâ laborantẽ cû frequenti cardiogmo: ne minimũ
quidem appulsum caloris, aut frigoris, aut funi ferre potest
quin doleat, dum facta est, alacris, iucunda, & immunis ab om-
ni est dolore. Item Auicennas cap. 11. lib. 3. fen. 21. tract. 1.
citât ex Hippocratis lib. de superfæt. mulieribus sæpè nõ gra-
uidis crurum & lumborum dolores oboriri, qui concepto fœtu
in vtero cessant; quia, inquit Princeps, per conceptum partes
illæ calfiunt, hinc dolore liberantur. Legi librum de superfætã-
tione, & illo loco Hippocrates non tantum meminit doloris
lumborum, sed & capitis, & aliarum partium. Verba eius sunt;
Si dolores in coxendice mulieri contigerint, aut in capite, aut in mani-
bus, aut aliquâ alâ corporis parte, & cum prægnans est desierint, post con-
ceptum ab vtero exolutum, si repetunt, huic odorata ad vterum suffire
conuenit, & bibere quoque expedit. Quibus ex verbis colligere est

Mulier
vteru ge-
rens non
conuelli-
tur, non
geres fa-
cile con-
uelliuntur.

s. Epid.

Hip. lib.
de super-
fætate.

Vv ij

340 CONSILIORVM MEDICINALIVM
istos dolores redeuntēs post partum, in conceptu desinentes,
ante conceptum affligentes, originem sui agnoscere in vtero,
alioqui enim Hippocrates non consulisset suffitum ad vterum,
sed singulis partibus prouidisset quæ laborant. Hoc itaque ar-
gumentum esse potest, vterum in hac muliere epileptica con-
ferre aliqui dād istam perniciosam affectionem. Etenim disti-
est tardius paroxysmum experiri, aut omninō nō experiri cum
vtero concepit: cum foeta non est facilē ab eodem corrip-
Et illo prædicto loco lib. 5 Epidemiorum, quo proponit hi-
storiam de muliere doloribus capitis cum vtero non gereret,
conflictari solita, eadem ferē cum iis quæ lib. de superfœtatio-
ne scribuntur, recenset: nam ait odoratis ad vterum apposis-
iuvare, & euntibus mensibus. Sed iam quæramus de istis do-
loribus quomodo imprægnationis tempore leniri, aut tolli pos-
sint. Si dolor iste capitis (idem postea dicemus de epilepsia,
cuius ergo hæc instituitur disputatio) primarius est in capite,
tantum abest vt sedari possit graviditatis tempore, vt contri-
adaugeatur. Nam per conceptum calefit vterus, vt ex Auicenna
antea docuimus, reuocatio fit caloris ad centrum, & præfer-
tim ad vterum, partes reliquæ sunt quodam modo destituta
fauore caloris & spiritus influentis, declarant & frigiditas par-
tium extimarum in foetis mulieribus, & earundem decolora-
tio. Sic duo sequuntur incommoda in capite: prius quidem
quod frigidius sit solito, & propterea infirmius, & ad propu-
landas morborum molestias imbecillius: posterius verò quod
calfactus vterus præ ceteris partibus, facta inibi humorum &
spirituum quadam coitione & veluti cōeulcatione, innumeros
penē summittat vapores in caput graviditatis tempore, qui va-
pores maligni erunt, quia humores à quibus excitantur magna
ex parte vitiosi sint, naturā quippe magis sanam humorum par-
tem in foetus alimentum consumente. Itaque si frigidius sit ca-
put in conceptu, si opportunius vaporibus ab vtero mananti-
bus; siquidem epileptica dispositio est in cerebro, & materiam
eiusdem, credibilis erit tempore graviditatis facilius paroxys-
mo prehendi, cum eo tempore tot symptomata tentent graui-
das, malacia, anorexia, & alia penē innumera quæ alio tempore
non pullulant. Vnde & Fernelius notat multas mulieres epilep-
sia prehendi solitas cum vtero gerunt, & foetu excluso nun-
quam aliquid tale patiuntur. Sed dicat aliquis. Sit ita sanē, ab

utero aut capitis dolor, aut epilepsia ipsa oriatur, ut idem contingat mulieri quod & ei à cuius crure aura infecta veneno sensim ad caput efferretur, an non & grauiditatis tempore facilius recurreret paroxysmus? ¹⁰ Nam eò confluunt multi humores, calefit vterus; hinc vaporum ilias, prauis sese implent cibis grauidæ, sic & à praua diæta, & à conculcatione humorum in vterinis partibus videtur vterus facilius posse reuere paroxysmum quam cum foetu non impeditur. Reuerà tamen secundum opinionem Hippocratis credibilius est mulierem epilepticam esse ab vtero aut præcordiis, quæ prehenditur paroxysmo, facilius vacuo vtero, quam pleno. Nam si affectio epileptica & materia in cerebro esset, tempore grauiditatis facilius corripere, utpote cerebro imbecilliore reddito & frigidior: sed quia in vtero aut ab vtero est, tempore imprægnationis quasi conclusio fit, & implicatio humorum, immò & si qui vapores à præcordiis efferri solebant, facto veluti materiæ recursum ad vterum, non tam facile feriunt, seseque produnt. Quamquam videtur probabilis ratio prius per dubitationem adducta, quòd nimirum si ab vtero esset, per imprægnationem facilius recurreret. Vnde obseruatum à Fernelio epilepsiam ab vtero grauiditatis tempore prehendere, ideòque visas à se plerasque mulieres quæ quoties vtero gestant epilepticæ corruunt, expeditas verò nunquam id experiiri.

Sed hæc disputatione multò longius produci possent, quorum tamen non prætermittenda fuit obseruatio, cum plurimū intersit à qua parte prima mali labes; ne temerè pars vna pro altera remediis oneretur ac fatigetur. Quidam ex Medicis dicte & humoribus prouidendum putauerunt, alij ad vterum & caput confugerunt, alij ad hepar cuius calidi temperamenti argumentum est efflorescentia quorundam exanthematon, & suffusio faciei post paroxysmum etiam stabilis.

Nos quatuor causas mali assignabamus, innatam in cerebro infirmitatem, & veluti gentilitiam, quòd eius auus epilepticus interiisset. Accedit & subtilitas, sagacitas, agilitasque cerebri quæ sæpè de facili epilepsiam accersit, ut Rondeletius annotat, quòd substantia cerebri rara sit contexturæ, & delicata admodum. Vnde qui ita affecti sunt facile cœcutiunt ob igneam spiritus animalis naturam quæ facile afficitur, vertiginosi sunt, & præcipitia sine periculo intueri nequeunt. Sic epileptica dis-

Cap. 5.
lib. 5. de
partium
morbis.

342 CONSILIORVM MEDICINALIVM

positio in cerebro est, sed non propterea causa materialis, nempe frigida & lenta pituita. Secundo, praua victus ratio, & quod nunquam medicamentum sumpserit. Nam si sibi arte medicâ consulisset in diæta & pharmacis, malum fortè interuertisset. Tertio, partium subiectarum consensus: nam breuitas paroxyismi à vapore solo malum esse natum significare potest. Et quod frequens sit saluatio, id à cerebro esse potest, & à ventriculo malè coquente. Vnde qui laborant in melancholiâ hypo-

Com. in apho. 16. lib. 3. 88 chondriacâ facilem habent saluæ in os occursum.

com. in apho. 45. lib. 2. Quod ad curationem spectat, illud obiter monendum, non valdè probari vsum rerum impensè calidarum & attenuantiũ. Nam siue à crassa viscidâque materia est epilepsia, vt placet Galeno, siue à flatulenta materia & acri non valdè ex vfu sunt ista. In priore quidem, quia in flatum conuertent. Vnde quidã dicunt radicem apij idèò in epilepsia interdici, quòd materiam acuat, & proinde malum suâ tenuitate adaugeat. Quod si verũ est, quod dicemus de euphorbio, castoreo, sagapeno, scam-moneo, & aliis id genus in epilepsia præscribi solitis. Alij dicunt non eâ ratione cauendum esse ab radice apij, sed quòd tota substantia in hoc morbo nociua sit. Si à flatulenta aut acri materia est, præsertim si ab acri, multò etiam minùs conueniẽt ista calida. At omnem ferè epilepsiam à materia quadam principium neruorum impetente oriri vel hoc argumento confici potest. Magna est affinitas & ἀσυνία inter sternutationem & morbum caducum: immò hoc discrimen statui volunt, quòd cum eadem vtrique sit materia, in morbo caduco natura inferior sit causa morbum faciente; in sternutamento verò exaduersum; natura quippe humore superior est. Vt sternutatio minoris cuiusdam epilepsię naturam & ideam referat. Atqui ex Galeno, *Sternutamentum non fit si quis humor in capite superfluit, sed si flatulentus sit, aut mordax.* Vnde si à quauis materia frigida sternutaret quis, comatosi & veternosi sternutarent, at id non fit. Idem ergo de epilepsia intelligi debet. Et idem est argumentum Ferneli, vt conuincat epilepsiam à pituitoso non esse humore. Sed huius argumenti primus autor est Galenus.

Obm. in apho. 51. lib. 7.

Vt mulieri epilepticæ prouideretur, iis quæ sequuntur remediis innixi sunt Medici ad præcautionem, & curationem, si eius spes nonnulla sit, quæ tamen perexigua est. Nam cum auo nata sit epileptico, probabile est labem aliquam contraxisse, quæ

Lib. de morbo sacro.

tempore detecta fuerit: quod primus obseruauit Hippocrates, qui à primordiis generationis epilepsiæ gentilitiæ originem repetit. In utero, ait, priusquam cerebrum conformetur, oportet quodammodo florescere, purgari, ac defæcari. Si neque magis nec minus repurgetur quàm oporteat, sanum animal existit: si magis repurgetur, ac fiat colliquatio quæ tam tinnitus aurium contingunt; si non satis repurgetur, in epilepsiam propensio contingit. Hæc Hippocrates. Et alio in loco inueteratæ epilepsiæ nullum remedium quærit; quia, inquit, cerebrum eroditur à pituita, & eliquescit. Id quod autem colliquatur aqua fit, quæ cerebrum circumalluit: & ita perpetua est generatio & fomes morbi, tum quod ad diathesin ipsam pertinet, tum quoad materiam & causam morbi coniunctam.

Ac in remediis ipsis maximè rerum non naturalium ratio habenda est aëris & cibi. Cibi quidem, quod improba victus ratio ad generationem & productionem morbi plurimum conferat: immò (vt antè docuimus) in grandioribus, cum eos non antè prehenderat morbus, comitialis affectionis causam agnoscit Galenus 6 Epid. & in aphor. improbam diætam. De aëre autem nemo dubitat quin hic magni sit momenti. Vnde Hippocrates agnoscit vêtos primùm ad morbi generationem, & paroxysmorum recursum facere: Eodemque in libro scribit cerebrum esse interpretem eorum quæ in aëre fiunt, quia cerebro ipsi sapientiam aër exhibet. Quod in eo sensu accipi potest: Inter partes corporis aëris aut molestias, aut eiusdem benignitatem sentit. Vnde plerique præsentunt mutationem aëris, aut serenitatem, aut tempestatem, sic cerebrum in iis internuncius est aëris. Multa eodem loco cerebri dignitati attribuuntur, quæ hic recensere est alienum. Nunc ad remediorum syluam properemus.

Viuat abstemia secunda, vitet omnem tristitiæ occasionem, aëre libero, serenòque viuat, perflabilem locum incolat, vitet palustria, lacustria, diûm, & cetera id genus. Primo vere post purificationem aperiatur vena basilica dextra.

Sunt qui in epilepsia locum secundæ venæ esse negent, quod rarò fiat à sanguine, rariùs à bile. Immò Hippocrates pituitosos solos videtur statuere huic morbo obnoxios: quod mirum tamē est. Galenus vult mitti sanguinem in epilepsia ex cruribus potius quàm ex cubito, idque ad faciendam reuulsionem è parte quæ certò afficietur, nempe è capite. ¹³ Loquitur autem

Lib. de morbo sacro.

Lib. de fac. morbo.

Lib. de san. miss. c. 12.

344 CONSILIORVM MEDICINALIVM

illo loco de præcautione: & quod intelligitur de imminente morbo, aliud est imminere morbum qui certò hanc aut illam partem sit obsessurus, aliud imminere morbum, de quo non constat adhuc quamnam partem obsidere debeat. Vt puta, cum indifferenter modò alicui caput, modò pes, modò hæc aut illa pars, aut totum corpus doleat, cum sectio venæ suscipitur sine vlla distinctione, aut è maleolo, aut annulari digito, aut è gibbero mittetur sanguis aut scarificabitur. Sed si certum

*Gal. cap.
16. lib. de
sanguin
mis.*

*Hippocr.
lib. de off.
sua natu.
§ sect. 6
lib. 6. E-
pid.*

que sit de parte occupanda, vt de capite in epilepsia, ad præcautionem incunte vere è maleolo detrahatur sanguis. Sed magna controuersia oritur, num epilepticos feces ex vena cubiti. ita probatur: Galenus & Hippocrates aiunt, in imminenti morbis per distantiora reuulsionem esse procurandam: in præsentibus per locum proximum. At eadem est fors, & conditio morbi iam præsentis & morbi imminenti, qui certò partem hanc aut illam est occupaturus. Ergo si in præsentem morbo vt epilepsia è cubito sanguis ducitur, quia dolorum proximum ventrem secare oportet, sequitur vt in eadem epilepsia imminente, quia de obsidione capitis certi sumus, eadem quoque vena cubiti prudenter feriat. Quod autem eadem sit conditio morbi præsentis, & eius qui immineat, dummodò certum sit hanc partem obsessum iri, ita ex Galeni verbis eliciemus:

*cap. 19.
lib. de iat.
quin. mis.*

*Quibus pars aliqua, nisi euacuati fuerint, infestatur certò, non aquè ex
quavis particula vacuabis (ac si de parte laboratura non constaret) sed
perinde atque in iis qui iam laborare incipiunt. Et miror quomodo
dicat postea: Ergo epilepticos & vertiginosos ex cruribus vacuabis.
quod non videtur agendum. Affectiones enim hæc cum sine vlla
controuersia capitis sint è brachio potius tanquam è propin-
quiore parte, videtur detrahi debere sanguis. Cum futurus
Comitialis sit curandus, ac si iam actu laboraret. Reuerà si cu-
randi scopus est, & vacuandi consilium, non est dubium quin
in epilepsia è gibbero detrahendum sit: sed si præseruare, præ-
cauere, ac reuellere tantum animus est, è longinqua parte re-
tractio fieri debet. Sic enim non sit magna repente mutatio, &
consuetudo tandem mutatur, ne amplius eò feratur sanguis.*

Consultum est vt os quotidie manè lauaret aquâ, in qua sal-
uia, aut rosmarinus maceratus esset, aut viscus quercinus. Te-
neat in ore passul. corticem citri conditi, caryophyll. vel for-
mulas has.

24. pml.

℞ pulu. caryophyll. gr. vj. nucis moscat. galang. cypp. mastich. an. ʒss.
cubeb. ʒj. piper. longi ʒss. Excipe in gummi. tragac. infuso in aqua ro-
rismar. aut decoct. eius, addendo parum sacchari. Fiant trochisci.

Utatur massapanis post pastus, pane biscocto, & puluere.

℞ puluer. electuarij aromiat. ros. diarrhodon abb. letitia gal. an ʒi.
rasura eboris, cornu cerui vsti an. ʒss. cranij humani, visci quercini, sem.
pæonia, & ocimi an. ʒj. sacchari in aqua melissa soluti. Fiat electuar.

℞ rasura cornu cerui ʒss. cornu cerui vsti ʒj. rasur. ebor. ossis de corde
cerui an ʒj. sem. pæonia maris, visci quercini an. ʒss. sem. contra ʒj. s.
rheubarb. electi & agarici albi an. ʒij. sacchar. albi duplum. Capiat co-
chlear vnum quotlibet manè.

℞ corianari conditi vnus coopertura ʒj. ambra gris. ʒj. coralli ru-
br. ʒss. sem. anisi & fœniculi conditi an. ʒij. puluer. ros ʒss. rasura ebo-
ris, cornu cerui an. ʒj. cinam. ʒss. cum saccharo. fiat puluis utendus à
pastu.

Fricentur quotidie crura, & iis aliquando applicentur cucurbitula.
Utatur clystere qui sequitur, sape.

℞ origani, calam. satureia, buglos. borag. mercur. an. m. j. rad. alib.
ʒj. semin. cumi, sesleas, ruta & pæonia an. ʒj. s. folior. sena ʒij. fiat
decoct. ad lib. j. In colar. dissol. mellis mercur. sacch. rubr. an. ʒj. catho-
lici, & confect. hamech an. ʒss. butyr. recen. ʒij. fiat clyster.

℞ aloes ʒij. mastich. ʒj. diamb. ʒss. rad. pæonia, visci quercini, an.
ʒss. corall. rub. gr. vj. ambra gris. ʒss. pulu. hiera ʒij. pilul. coctiaru
& ferid. an. ʒj. s. agar. & rhei an. ʒij. cum aqua decoction. radice
angelice & pauco zingib. fiat maza pilul. vtenda. Decimo quoque quinto
die: aliquando serò, aliquando horà quartà manè. Vel loco pilularum
accipiet aliquando de syrupo sequente.

℞ omnium capill. m. j. chamædr. chamapit. an. m. j. lupul. prima
veris an. m. j. s. absynthij port. m. s. scolopen. ceterach, agrimon. hepat.
buglos. borag. stæchad. vtriusque an. m. j. semin. ruta, iunip. sesel. pæon.
an. ʒj. s. radice. omnium aperitiuar (præter radicem apij) in vino albo
aut aceto scyllitico maceratar. an. ʒj. passul. ʒj. visci quercini & polyp.
an. ʒij. rad. pæon. ʒj. pulu. cranij human. ʒj. s. folior. sena ʒij. sant.
ciuin. ʒij. fiat decoct. addendo sub finem agar. recent trochisc. ʒj. s. tur-
bith gummosi ʒss. zinziber. ʒss. express. ʒj. rhubarb. infusi cum cinam.
& nuce mosc. in parte decocti, cum oxymel. scyllit. & syrup. de
hyssop. & stæchad. an. ʒj. sacchari suffic. quantitate. Fiat syrupus aro-
matizatus nuce moschatâ: utatur ad ʒij. aut ʒij. s. cum decocto passul. &
visci quercini.

Tom. i.

xx

346 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℥. rad. pæonie. lap. acut. an. ℥ ij. chelidon. petrosel. aspar. gram. pop. ly. ireos flor. an. ℥ s. chicor. m. j. rad. enula campana, acor. cyp. semin. anisi, fænic. cus. melon. an. ℥ j. stæchad. arab. 3 vj. semin. pæonie ℥ s. beton. meliss. scolop. vng. caball. hyssop. an. m. j. summitat. absynth. & aneth. an. p. s. Fiat decoct. ad lib. j. in qua infunde folior. sena ℥ iij. agar. ℥ ij. dissol. sacchar. quod suff.

℥ pulu. diarrhod. ℥ ij. coriandri prepar. 3 j. s. rasur. ebor. cran. bu. mani an. ℥ j. visci quercini, rad. pæonie, torment. dictamni an. ℥ s. pulu. diamb. ℥ s. plures archont. ℥ s. sem. anisi & fænic conditi an. ℥ j. s. cum saccharo in aqua decoctionis angelica & pauco cinam. dissol. Fiat electuar. per tabellas.

℥ conseru. buglos. borag. florum aurenciorum an. ℥ s. conser. enula campana, anih. stæch. meliss. an. 3 ij. conser. saluie 3 ij. theriac. & mithridat. an. ℥ iij. cortic. citrij cond. ℥ s. pulu. diamb. & arom. ros. an. gr. v. nucis mosc. ℥ s. pulu. cranij hum. ℥ j. visci quercini & rad. pæonie an. ℥ s. cum syrupo conseruat. citrij, & syrup. reg. Sabo. Fiat conditum foliis auri copertum.

Habeat bracteolas auri domi, ut utatur suo condito.

℥ theriaces & mithrid. an. ℥ j. s. conseruar. anthos, meliss. stæchad. an. ℥ s. diamargar. diarrhod. abb. an. 3 j. arom. ros. 3 s. coral. 3 j. visci querc. 3 ij. cranij hum. 3 j. cum lib. ij. aque decoctionis salu. agrest. sem. iuniperi, sesel. ruta, pæonie & rad. eius. Fiat distill. per alamb. de qua utatur manè cum pauco saccharo ad dulcorandum, & tempore paroxysmi.

Vngula alces est circumferenda in anulari digito.

Appendeat collo sacculus ex radice pæonie, floribus stæch. visco quercino, rad. pæonie, & semin. seseleos.

Item ℥ cubeb. 3 ij. nigell. rom. 3 iij. mastick. 3 j. s.

In paroxysmo ℥ rad. azari 3 j. oxymel. scyllitici 3 s. aqua saluie 3 ij. fiat potus.

℥ ros. rub. & thuris an. 3 j. ligni aloes 3 j. Fiat puluis pro suffitu oris rim. capiti.

Item commendatur decoctum sarseparilla cum passulis, sem. pæonie, sem. citrij, & carduo benedicto.

ANNOTATIONES.

I. Autor libri de morbo sacro omnia hæc symptomata enumerat con-
tingere in epilepsia, quia humor pituitosus sanguini admiscetur, & turbat

corpus. Sed quæ illo loco dicuntur non planè vera videbuntur.

2. Hippocrates lib. 1. de Diata: Morbi, ait, paulatim fiunt, & cresunt, & paulatim collecti affatim & acervatim apparent.

3. Hippocrates lib. de morbo sacro primus id observavit, ut propterea dicere possis epilepsiam non esse totius corporis convulsionem.

4. Hippocrates lib. de morbo sacro spumam in epilepsia à pulmonibus esse ait.

5. Mirum quod scribit Hippocrates lib. de sacro morbo, Epilepsiam fieri per oppleionem interceptionemque venarum ob phlegma à capite descendens. Sic non est necesse solum consistere in cerebro ut id fiat, sed venas alias oppleri & intercepti necesse est. Et locus multò magis est notandus par. 27. lib. 4 Acutorum, ubi loquitur de Apoplexia & Epilepsia, & morbis qui acutus reddunt. Interceptiones & oppleiones venarum sunt cum humores in venis continentur, & in iis conculcantur (quod siccescere vocat Hippocrates, sed improprie, ut monet Galenus.) Quod si illi humores fluentes diueriant in locos venas ipsas tenentes, fiunt apoplexia & epilepsia, ait Hippocrates, quod probat Galenus. Per locos intelligit cor, hepatis, venam cavaam. Ergo ex illo loco patet hepatis, aut iecoris, aut cordis occupationem ab eo humore qui prius in venis erat, epilepsiam & apoplexiam facere. Non meminit cerebri: quoniam de eo potest idem intelligi. Sic colliges apoplexiam & epilepsiam fieri quando loci, id est partes principes occupantur, & eorum capacitates: Convulsionem & paraplegiam quando vene ipsæ occupantur.

6. Hippocrates lib. de morbo sacro cum docet cur pueri fiant epileptici, non recurrit ad infirmitatem generis nervosi, sed excellentiorem multò rationem confingit.

7. Ac reuera cum Galenus in 4 Aphorism. disputat de rigoribus, ait diathesin esse causam symptomaton & paroxysmorum reducum (nullam factam materiei ipsius mentionem) tacite innuit in morbis periodo redeuntibus plurimum posse diathesin. Idem Hippocrates ait, Epilepsia natus annos viginti non prehendit, nisi morbus sit *αἰσχρογαστρικός*, non quod necesse fuerit corripi ante annum vicesimum, sed quod dispositio sit in cerebro: & hoc vocat *αἰσχρογαστρικός* *εἶναι* *ῥῆτον*.

8. Item subtilis hæc ratio potest reddi: Morbi qui in pueros incidunt, maxime ad nutricatum sunt referendi, cum videlicet aut mater per se male disposita fuit, aut gestationis tempus in morbis & infirmitate consumpserit. Sed quorum morborum latens origo ad semen præsertim patris refertur, non ita in pueritia y morbi pullulant & se produnt, quandiu valet natura, & nisi quid peccatum sit: sed ætate maxime progressa sese

proferunt. Sic quoniam scitum est mulierem satam esse semine par. nris
 ani epileptico, mirum non sit se primâ atate nil tale senserit.

9. Ac reuerâ in tempore imprægnationis semper aliquid commemora-
 bile contingit, siue in bonam, siue in malam partem. Vnde cum suscipit
 est grauiditatis, & dolor acerbus & longus dentium prehendit, tunc mu-
 lieres colligunt certò imprægnationem, quod abs re non dictum est. Et
 Hippocrates lib. 2. Epidem. 2. sectione, meminit mulieris cui prægnanti
 exanthemata apparebant. Quod solemne illi forè erat cum prægnanti
 exanthemata apparebant. Quod solemne illi forè erat cum prægnanti

10. Ad hanc difficultatem, quæ est, cur mulieribus malè sanis ex con-
 ceptu commoditas proueniat: contra sanis maiora symptomata & deie-
 riora eueniant: cum contra fieri debeat, pertinet locus notandus ad finem
 libri de Carnibus Hippocratis, ubi docet mulieres puras grauius affici
 initio conceptus quàm impuras. Et si impure afficiantur, non ita peri-
 piunt. Observatione autem dignum est quod Aphrodisæus ait, conceptum
 esse actionem contra naturam.

11. Ex Hippocrate lib. de morbo sacro, alia ratio multò acceptior affiri
 potest. Breuior est paroxysmus ob sanguinis dominatum. Ita enim pini-
 ta mali autor inferior est sanguine, idè non ita accessio producit. Et
 ratio hac est cur iuuenes facti epileptici diu non diu exentur. Hippocrates
 lib. de sacro morbo, non biliosos, sed pituitosos epilepsia attingit. Et
 omnibus epilepticis vult congelationem quandam esse sanguinis ob ad-
 missam sanguini pituitam.

12. Et Galen. comm. ad aphor. 22. lib. 3. cum reddit rationem cur epile-
 psia autumnis frequentiores ait, id fieri ob repentinas ad contraria trans-
 mutationes; Calor enim media die frigus primâ & ultimâ diei parte vi-
 get. Nil autem adeò comitiales accessiones, sicut talis varietas, aptum est
 generare. Et hic locus observatione dignus est, ut epilepsia obnoxius in
 qualitates istas deuinet.

13. Si epilepsia à partibus inferis non est, idque ob copiam humorum in-
 tra vasa contentorum, quorsum venæ sectio? Nisi forè spirituum que-
 dam confusio, aut sanguinis causa esse videatur. Si in cerebro & diathe-
 sis & causa est materialis, eaque à massa sanguinis separata, minùs qua-
 drat venæ sectio. Porro si ab humore frigido est, quare non potius de nocte
 paroxysmus prehendit, immò ferè interdum? Aristoteles vult de nocte
 prehendere: sed Hieronymus Gabucinius hoc confutat.

14. Vnde part. 24. lib. 4. de Dieta acut. loquens de morbis per oppletionem
 venarum, cuiusmodi est epilepsia, & apoplexia, ut Galen. interpretatur,
 vult è brachio mitti sanguinem. Illòque loco de plenitudine maxime
 mentio inferitur.

CONSILIVM LXI.

Pro Sacrificio ad elephantiasim vergente.

SACRIFICVS cū omnium intemperantissimè vixisset, & potius à pane & vino quàm à scortis temperasset, indèque bis aut ter lue hispanicà laborasset, tandem ita affectus est, vt elephantiasis ei minari videretur: nec tamen verè erat elephantiasis. Tamen vt contingit sæpe eos quibus aut malè curata lues est, aut qui post sudamina intemperantiùs quàm antè vixerunt, elephanticos reddi, aut impetiginosos, aut strumosos & chæradicos; ita nil horum ab isto intemperante homine abfuit. Quin & crus dextrum totum ita induruit, multis locis chæradum argumento apparente aliquo, vt vix exigua spes salutis esset.

Itaque inito consilio ita prouisum morbo est. Ac primum iussus est in totum abstinere vino, aut eo dilutissimo vteretur. Consultum est vt vesceretur carnibus elixis, & pullis nutritis pastâ ex carne colubrorum factâ. Theriacâ bis aut ter septimana vteretur ad 3 j. cum aqua melissæ, aut foliorum bryoniæ.

Bi mense Catholico cum 3 iij confect. hamech purgaretur.

Aperiretur vena basilica sinistra.

Balneis aquæ dulcis vteretur.

Decocto melissæ, buglos. borag. lupul. & cerefolij addito momento croci.

*Foueretur per intumescentia decoct. herbarum remollientium, & digere-
rentium, & præsertim gercennij, mercurialis, factâ in aquâ & vino albo.*

*Liniretur pars unguento facto ex spolio serpentis cum axungia porci,
radice cucumeris asinini & bryoniæ. Autumno autem vteretur decoct.
sarsapariliæ.*

Eidem homini syrupus postea ordinatus sequens.

*℞. rad. lapat. acur. 3 vj. serpen. maior. cort. rad. capp. 3 iij. agrim.
varius, adiant. cusu. fumiter. scolopend. an. m. ij. 4 semin. frigid. maio.
sem. endiu. fumiter. cuscut. fœnic. an. 3 s. passul. glycyrr. thamar. an. 3 iij.
fiat decoct. ad lib. 4. ℞. præd. decoct. lib. ij. dissol. oxy. simpl. lib. v. sacch.
lib. j. fiat syrupus.*

*℞. residuū in quo infund. rad. elleb. nig. 3 j. fol. senæ, 3 iij. agar. troch. 3 ij.
epith. 3 j. scinam. & sant. citr. an. 3 ij. s. oxym. 3 ij. sacch. lib. j. fiat syr.*

X iij

CONSILIVM LXII.

De fluore vterino.

MVLIER optimo habitu prædita, quadrata, solita munia probè exercens, annos nata quadraginta, nunquam enixa, doloribus capitis affici non solita, conqueritur de quadam proluvie humoris albuginosi, præsertim cum iam fluxerunt menses. Illius enim proluvie eadem est periodus quæ & mensium. Durat quinque ferè dies. Non graueolet: non persequatur, nec visa est anticipare, aut tardare. Hic quæritur unde hoc? Dolet maximè lumbos & hypogastrium. Inritum est consilium quo malo huic occurratur. Ego verò ita de morbo disputaui.

Vt fœda humorum proluvie longo tempore fluens adturbem & maciem corpus adducit, ita intempestiuè suppressa plurimorum morborum prouentum affert. Vnde antè narratum est de vetula cui fluor muliebris multorum annorum repressus diabetem, & tandem mortem attulit. Id de quo queritur mulier hæc, symptoma quoddam vteri est, cuius causa aut in capite, aut in visceribus, aut in vtero est. Hinc enim gonorrhœa muliebris contingit, vt & virilis, non fœda tamen, hinc & fluor muliebris originem ducit, quem Auicennas non ineptè cursum matricis appellat: Gonorrhœam esse id persuadet, quod & ex interuallis repetat, non autem continuò vexet, vt & fluor verus mulierum facere solet, sed velut stato circuitu post menstruam purgationem. Vnde aut semen est, aut quædam materia seminalis crudior quæ in nutrimentum fœtus consumeretur si vterum gestaret. Secundum argumentum: Non graueolet, nec fœdum est, vt esse solet in vterino fluxu, sed est quid albumineum, aliquando serosum, fortè phlegma crudum est falsò semen representans. Tertium argumentum: Cum boni admodum habitus sit, cum sit repleta bilis fœcunditatis, tamen vtero nunquam gestasset, fieri potest vt multum seminis crudi cumularit, si modò semen vocari debet. Hinc fit vt aut copiâ, aut imbecillitate vasorum, aut testiculorum mulieris excretio fiat illa periodica.

Contrà verò afferri potest, si vterinus fluor est, aut est à capite, aut ab hepate, aut à toto corpore, aut ab vtero ipso. Si in vtero, aut illic est humiditas immodica, aut vlcus, aut malum aliud latens eius floris scaturigo. Malum illic residere arguunt dolores ad lumbos, crura, & inguina. item ad imum ventrem. Ab aliis partibus non esse hoc arguit, quòd cachexia nulla sit, quam tamen adesse esset necesse, præsertim si ab hepate esset. Tamen nulla sensio est vlcis in vtero, etsi vlcus esset aliquando syncope adesset, & quod efflueret, dysodes esset. Item si malè affectus esset vterus, aliquid eius affectionis corpus referret. Nam ex Galeno in Aphor. vt vterus affectus est, & ita corpus; quod notandum est. Item & facillè patitur congressum viri, quod non solent mulieres quibus ab vtero fluor est præsertim. Vt de muliere typographi in via D. Iacobi constat, quæ cum annos aliquot duritiem in imo ventre habuisset, tandem facta est obnoxia, & congressum non patitur, præsertim spermatis appulsum.

Quod autem non continenter effluat vt aliis mulieribus fluorem patientibus contingit, id habet aliquid peculiare. Reuerà variant morbi pro corporum distinctione.

Res cum ad examen adducta fuit, de ea ita nos tandem iudicauimus. Malum hoc est floris vterini species, non verè fluor, quòd non sit continuus, quòd non olida fœdæque materies excernatur, quòd sit periodica, quòd sit veluti albuminea. Est autem quædam materia pituitosa quæ non admiscetur toti sanguini, quæ si in intestinis contineretur, iliacas & colicas passionis inferret, & illa continetur quasi segregata circum partes vterinas, referatisque venis per menstruam purgationem, quâ datâ viâ effluit eius nonnulla pars: reliquum verò resistit, grauitatem in partibus illis inferens. Et nisi tandem ea materia reliquis humoribus remisceatur, fieri non potest vt conualescat.

In hoc affectu curando nec impensè calida & aperientia, nec astringentia ex vsu esse possunt. nam illa perturbant nimis: hæc inferrent grauiora symptomata illum humorem supprimendo. Itaque visum est commodum si vteretur clysteribus ex decoct. arth. nep. centaur. min. agrimon. origani, absynth. mercur. eum maluis, seminibus calidis & temperatis, dissoluendo confectionem Hamech.

Pro purgante medicamento sumat rheum, agaricum, cum

352 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 confectione Hamech. Deinde aperiatur vena basilica. Tãdem
 parato corpore vsu rerum aperitiuarum vtatur decoct. follicu-
 lorum, agarico, & puluere hieræ, quæ in hoc corpore suspensa
 esse non debet, tametsi sit visceribus præcalidis, quod aloë non
 transcendat hepar. Tandem per decem dies vtatur decocto sar-
 separil. cum semine pœoniæ & cardui benedicti. Reperantur
 clysteres frequenter. Paretur syrupus ex follicul. agarico & tur-
 bith.

In simili affectu ad exigendas humorum reliquias maza pilu-
 larum instituta.

℞ aloes lotæ ʒ ij. aristoloch. rotund. ʒ f. myrrha ʒ ij. castor. ʒ j. s. cum
 syrupo de hysop. fiat maza.

℞ lixiuij clari, cineris sarmentorum lib. vj. bulliant folior succo-
 rum salu. menth. absynth. orig. calament. thymi, aneth. chamam. an.
 m. j. mastich ʒ j. fiat fotus pro imo ventre.

℞ vernicis, mastich. carab. an. ʒ ij. nucis mosch. caryophyll. an. ʒ j.
 fiat puluis gross. pro suffitu vteri.

Hic præclara quæstio proponi discuti que potest, qui fiat vt
 sæpe mulieres fluore muliebri præhendantur, an quod vterus
 attrahat, an quod humores eò ferantur. Magni enim momenti
 est scire vtrum fiat, cum controuersia sit de vtero an attrahat,
 an non. Nam si vterus attrahit, minùs valida esse debent medi-
 camenta, quàm si non attraheret, vt paulò post docebitur.
 Hac de re procerum artis medicæ audienda opinio. Galen. cap.
 22. lib. 5. de simpl. med. facult. docet distinctionem eorum quæ
 menses, lac, & vrinam prouocant: quæ tametsi in nonnullis
 consentiant, tamen in natura specifica plurimùm distinguun-
 tur. Nam lactis prouocando conferunt calfacientia, non defic-
 cantia: mensibus magis calfacientia, non valenter deficcantia.
 Vrinæ calfacientia & deficcantia. Rationem autem reddit Ga-
 lenus eodem capite cur valentiora in mensium prouocatione
 quàm lactis vsurpentur, primùm quod vterus nil conferat ad
 delationem sanguinis & attractionem: mammae verò contri-
 Nam mittitur sanguis menstruus in vteri venas, non attrahitur
 in mammas non tantùm mittitur, sed attrahitur, ideò leuiore
 præsidio opus est, adeò vt medicamenta lac in mammas con-
 ferentia menses mouere non possint. Præterea vteri venæ ma-
 gis aperiri debent quàm mammarum venæ: propterea calidior
 ribus multò vsus esse debet. Tertiò sanguis qui ad vterum fer-
 ritur

cur materiam menstruam suppeditaturus fluxilior esse debet quam is qui est ad mammas futura materia lactis. Itaque opinione Galeni vterus non attrahit. Tamen cum duplex sit attractio, vna particularis, quâ vnaquæque pars sibi id quod proprium est attrahit & allecat; altera communior, quâ partes quæ commune quoddam officium in corpore habent, attrahunt quoque, siue quod attrahitur sit familiare, siue tantum sit excrementum: vtraque ratione videtur vterus attrahere, quo fit vt Galeni opinio minus probabilis esse videatur. Nam cur non attraheret vt & reliquæ partes? Et si in cerebrum humorum raptus sit, & vaporum, cur non potius in vterum? Propterea Hippocrates scribit, *Intra hominem partes alliciunt vesica, caput, vterus in mulieribus. hæc enim omnes manifestè trahunt, & semper plene sunt attractæ humiditatis.* Quæ Hippocratis autoritas sententiâ Galeni planè labefactat. Nec plus temporis in iis rebus terendum putamus, cum certum sit vterum attrahere. At tantâ facultate tractus præditum esse, quantâ & mammae, non est credibile. Cordi enim propinquiora vbera attrahunt magis, vterus verò cum in fundo situs sit, potius sit humorum deturbatio, quam attractio. Et hæc inehercules probabilia videntur.

ANNOTATIONES.

1. Reuerâ ex Hippocrate lib. 1. de morbis mulier. fieri potest vt quædam mulierum & vterus sit humidior, & eius acetabula mucore sint plena, unde concipiendi, retinendique & seminis & fetus difficultas sic profluvium si quod evenit, non multorum dubium est, tamen propriè illius vteri esse dicitur.

2. Aut nisi vlcus est, quanquam defloratio propter acrimoniam humoris contingens potest difficultatem congressus afferre.

3. Frustrâ hîc dubitamus quæ huius morbi natura sit. Nam est profluvium muliebre, non illud quidem quod vulgò apparet. Et Hippocrates primus hoc animadvertit lib. 2. de morbis mulierum, cum quadruplex profluvium explicat. Sed inter ceteros locos vnus est lib. 1. de morbis mulierum, ubi ideam huius morbi explicat.

Tom. I.

Yy

CONSILIVM LXIII.

De Voluulo.

IOANNES Puthomme post curas aliquot, & intempestivas
 comestiones in quibus liberaliter satis genio indulgebat,
 nec mero parcebat, rerum domesticarum curam gerens, quod
 nunquam solitus fuerat, per aluum inferiorem satis largam san-
 guinis copiam profudit. Huic solemnitas erat euacuatio per ve-
 nas hæmorrhoidales: tandem veritum est ne si immoderatus
 sanguis ille flueret, de viribus nimium detraheretur. Ei bolo
 cassiæ, & meo iudicio venæ sectione consultum est. Malum cel-
 sauit. Non ita longè post queritur de doloribus acerrimis ad ve-
 trè in modo colicorū dolorū agrum vexantibus. At colica pas-
 sio non erat ea quæ propriè dicta est, pulsus erat citatus: vrina
 alias aquea, alias bile saturata: ad vtrumque renem dolor erat
 fixus, ac si in partibus illis aut lapis insideret, aut aliquid simile
 nullum ventum flatumque per ventrem emittebat. Clysteri-
 bus iuuabatur, sed momento tantum. Egrescebat medendo.
 Indita enemata carminatiua nihil aut parum adiuuabatur. Ali-
 quando magnam vrinæ copiam profudit. Insomnes dies no-
 ctesque ducebat: perpetui ructus erant: necnon ac si immine-
 ret præfocatio, sentiebat dolores summos ad sternum, & thora-
 cem. Regio renum appressu leui dolebat grauissimè. Si quie-
 ceret dolor per tempus breue, mox acerbior redibat. Nil vo-
 muit. Si colica passio fuisset, aut dolor colicus, vomitus aliqui
 aut præcessissent, aut adessent, vt ex Galeno patet. Tamen nil
 tale apparuit. Borborygmi aliqui aderant sine tumore aliquo.
 Venter non detumuit. Medici inter se digladiabantur de essen-
 tia morbi & natura. Alij tanquam colicā laborantem variis re-
 mediis calidissimis eum fatigabant, agarico, folliculis, syrupo
 rosarum solutiuo. Denique magnam frigidorum humorum co-
 piam esse rati, eò suam conuertebant operam, vt calida medi-
 camenta & phlegmagoga præscriberent. Nil est profectum: sed
 egrescebat medendo. Aluus verò perpetuò sicca remanebat,
 & nil reddebat nisi, quod vocat Hippocrates, *σπῆρ ἀπὸ τῆς βίτης*. Flatus
 verò omnis exitus præcludebatur, immò quod à Pharmacopeo

*Com. in
 aphor. 1.
 sect. 1. li.
 & Epid.*

relatum est, cum clyfma indebatur, recti intestini pars extrema contorta paulum videbatur, & non nisi vi iniiciebatur, & glans immittebatur. Cataplasmatibus anodynis dolor leuabatur. Dicebat se tumultuantes quosdam flatus sentire, non quomodo in colico dolore, sed efferi erant quidam flatus diuellentes membranas, & dolores & profundos in mesenterio excitantes, & sublimes in peritonæo tunica, vnde minimo digitorum appressit. Nulla per os excretio fiebat. Alii autem Medici, & multo acutius, veriusque obseruatâ victus ratione, quod multis & generosis vinis assuescit, genio indulgisset, susque deque habitâ diætâ vsus fuisset. Item obseruato pulsu inflammationis cuiusdam in toto mesenterio latentis indice. Præterea obseruatâ illâ per anum sanguinis excretionem, quæ repressa aliquantum fuisset, quod ne immodica foret Medici vererentur, cum fortassis melius fuisset cum nonnulla virium iactura affatim adhuc sanguinem effluxisse. Omnibus (inquam) iis obseruatis collegerunt in toto ventre inferiore voluolosam esse quandam affectionem ab inflammatione quadam, aut potius calore concepto in toto mesenterio & intestinis ex olida putrique materia flatu maligno excitante, vnde torminosi dolores & ructus perpetui, & stomachi sine vomitione occultæ subuersiones. Quæ materia reses, & ignaua, & pigra erat, ea sensum doloris modò grauis, modò pungentis in profundo præsertim ad renum regionem excitabat: eleuatus verò ex eadem malignus spiritus vagos erraticosque ^{σπόρυς} prouocabat. Neque verò materiam istam pigrâ necesse erat efferri, sed in parte in qua residebat dolor excitabatur, qui ab eadem parte tanquam radice sese sensim insinuando ac propagando in partibus vicinis dolorem excitabat. Hanc doloris ideam Galenus videtur vocasse ^{πύον διαστροφήν}, verunt ^{Cap. 7 l. 1. de loc. aff.} *urgens: qui nimirum à parte primò affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes traducitur.* Nam causa morbi vno loco conuiescit. Vel enim dolorem ^{ἐμπνευγμένον} vocare possumus, *in fixum*; sed tamen aliæ partes, præsertim si qua sit continuitas affici possunt. Causa illius doloris vel est copia humorum confertim ingruentium, vel spiritus flatuosus. Sed reuerà, vel ratione agrotantium rem non intelligentium, vel rei ipsius quæ per se obscura est & implicita, difficilis admodum est cognitio speciei doloris. Dolores autem istos reciprocos, reuolutos, re-

356 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Phil. cap.
7. lib. 2
de loc. aff.
Hipp. par.
2 lib. 3.*

ductosque Hippocrates in Prorrhet. vocat *νεφελος*; atque illo aphorismo mihi videtur quodammodo adumbrasse morbum quo miserrimus iste æger cruciabatur: Quibus (ait) *λανθάνοντες* & diuturni dolores & ad hypochondrium reducti, renouanturque, & ciborum auersio cum f. bre, dolor his valens contentusque ad caput perueniens citò cum quadam conuulsione interimit. id est: Sæpe circū præcordia & mesenterium residet & restagnat materia olida putrisque; quæ si contingeret aut cholera morbus, aut vehemens alui fluxus, nullam molestiam planè afferret: sed cunctando variat, adducit symptomata, initio quidem exiguos & torminosos excitat dolores, sed sensim atque sensim ac magis collecta, & exitu prohibita, maiores malignitatis nervos nata tandem fastidium cibi accersit, & febrem: rursus febris materiam deteriolem reddit. Tandem aliquando effera magis reddita quæquæsum erumpit, & suæ malignitatis notas edit, prout in hanc aut illam repserit partem. Quod certè huic ægro contigisset, si febris maior fuisset, quæ materiam deteriolem reddidisset, & nisi materia coercita intus fuissetibus nostris.

Præterea frequentes clysteres iniectiones, & medicamenta præscripta, tametsi minimè idonea, tamen impediuerunt quominus exaggeraretur humor, taliæque symptomata ederet tandem, qualia in Prorrheticis ab Hippocrate describi diximus. De doloribus *νεφελος* dictum in Definition.

Aut certè eum morbum speciem quandam voluuli esse dicemus, sumpto nomine voluuli non strictè, sed latè, ut apud Hippocratem sumitur; Ait enim phlegma à capite descendens voluulos diuturnos excitare, id est, dolores iliacos, & voluulos, & torminosos, in quibus imus venter & hypochondrium vitæque dolet. Nec enim credibile voluulum morbum esse diuturnum, nisi improprie sumatur. Cum itaque intestina tum ob flatum nonnullos, tum ob copiam humoris maligni in mesenterio & intestinis collecti dolent, & totus venter, eaque torquentur quodammodo, conuoluiturque (Græcè *επιδόου*) videntur, voluulosa dicitur passio, ut ex Hippocratis loco superius adducto patere potest. Simile quid apud Hippocratem legere est in lib. de affectionibus, ubi triplicem voluulum constituit, vnum hyemalem, ut cum quis nimio victu calido & humido vitetur, & non se se deambulationibus dedit, &c. Alium æstiuum, qui æstatis tempore in regionibus palustribusprehendit, & æstiuus dicitur.

*Lib. de
internis
affectionibus.*

voluulus, in eoque ager auruginosus fit. Tertium hæmatiten &
 autumnalem, quem eodem loco describit. Nomine voluulo-
 rum intelligit quosdam dolores torminosos voluulosque ob
 prauam dietam aut temporis intempestiuitatem nascentes, qui
 pro diuersis effectibus & temporibus in quibus pullulant, varias
 conditiones & nomina sortiuntur. Ager noster hæmatete &
 autumnali voluulo præhendi visus est. Nam vt antè demon-
 strauimus, sanguinis fœculenti residuum erat aliquod ab excre-
 tione quæ præcesserat, à quo prima mali labes. Et tale quid
 Hippocrates visus est obseruasse in Coacis, *dolores ex lumbis diu-*
turniores febris tertianæ modo exacerbantes (id est, quorum dolorum
 non semper est acerbitas, sed vnius diei dant inducias, ac si
 motum quandam haberent tertianum) *grumosum sanguinem ege-*
re faciunt; id est, dolores isti excitantur à conclusa in ventre
 materia nigricante, adusta; & veluti sanguine fœculento exi-
 stente, quorum remissio non fit, nisi eiusmodi materiæ fœcu-
 lentæ aut ob putredinem, aut moram diuturnam nigritiem ade-
 præ, è corpore fiat exclusio. Quæ omnia diligenter sunt notan-
 da. Et Fernellius dolores ventris non absimiles doloribus coli-
 cis (cùm tamen non sint) agnouit quodam circuitu periodo-
 que repetentes, in quibus ægri miserè conflantur. In hoc æ-
 gro dominabatur calor præter naturam, flatuum malorum qua-
 les in libro de flatibus describit Hippocrates, copia & vis exci-
 tabatur, meatus non erant liberi, vnde exitu prohibebantur, &
 reuolui cogebantur ad superiores partes: denique materia non
 dissipabatur, idèò flatum non emittebat, nec cum bombo, nec
 sine bombo, si ridore: de quibus flatibus Hippocr. in Prognost.
Flatum emitte sine bombo & stridore, saluberrimum: quod signifi-
 cetur vis caloris facile materiam dissipantis; item libertas mea-
 tuum. & tamè optabilius vnà cum bombo flatum excludi quàm
 illuc reuolui. Reuolui autem Græcè dicitur ἀναλίσσειν. Itaque ad
 etymon & proprietatem nominis ἀλίσσειν alludit senex. Porro re-
 uoluitur flatum cùm non exit, aut incendio partis, aut deprava-
 to motu intestinorum, proprio autem vitiat: & ista flatuum
 deuolutio in tenuibus intestinis tormina parit, aluum pulsar,
 nauseam excitat, & si ad diaphragma appellens respirationem
 vitiat: quæ omnia in ægro paruerunt. Nam & tormina in tenui-
 bus intestinis excitata sunt, & nausea aderat, & aliquando spe-
 cies quædam suffocationis; quæ omnia ob flatuum reuolutio-

Corp. de
 colicis do-
 lore.

Part. 2.
 lib. 2.

nem ad superiora contigerunt; reuolutionem autem peperit & incendium, & motus deprauatus intestinorum. Horum quodque demonstratio peti potest ex lib. 4 Aphor. cum ait: *Quæstilia suspensa obmurmurant, lumborum dolore superueniente alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut vrina profluvium consequatur.* Hæc verò in febribus. Murmur etenim fit ex flatu iunctâ humiditate, si non separetur flatus à materia, aluus necessario humectatur; si separetur, aluus non humectatur, sed aut flatus, aut vrina excretio fit. Et quod addit, *in febribus*; considerat vel febres symptomaticas, vel febres essentielles. Symptomaticæ sunt ut in pleuritide, peripneumonia, in quibus si murmura oriantur, aut suspendeant hypochondria, non perinde tamen aut flatus erumpunt, & murmurita contingit, ut aut vrina fluat, aut aluus feratur. Si enim murmur adsit, non est quid secundum naturam, sed tantum quid symptomaticum: propterea humiditas murmuris causa, naturâ duce non facit aut alui, aut vrinae profluvium. Sed in febribus essentialibus, quia non pars aliqua peculiariter laborat, sed totum genus venosum, œconomia naturalis laborat, vitiatur coctio, hinc à cruditate flatus surgunt cum murmure: hinc naturæ motu aut ij flatus erumpunt, aut vrina fluit, aut aluus. In ægro nostro vrina aliquando largè fluxit, vnde diabetæ metus esset, factaque humidæ materiæ erat secretio ad renes, dolores tamen non cessauerunt, quia flatus non simul eruperunt: quod si erupissent, facta fuisset dolorum solutio.

Itaque intemperies erat calida flatus excitans, motus intestinorum deprauatus, angustia venarum. Idemque contingeret quod & Galenus contingere ait in melancholia flatuosa; vnde legere est lib. de locis affect. Sed quæri potest, quomodo flatuosa esset aluus inferior, cum calor esset multus, immò & essentia morbi in calore & intemperie & phlogosi constitueretur. Nam ex Hippocrate, icterici non valde sunt flatuosi, ob dominatum caloris acris, & paucitatem crudi humoris qui flatuum est materia. Nam tametsi in 4^o Aphorismor. habitualis & hectica intestinorum & ventris inferioris dispositio hydropis sicci causa sit, & inflationis ventris ipsius, non tamen ista habitualis dispositio à calore est, sed à frigore; quanquam tantum non est quantum in reliquis hydropis speciebus. Dicemus ictericos quidem non esse flatuosos per se, sed per accidens, nimi-

Cap. 7.
lib. 3.
loc. aff.

Aph. ult.
lib. 5.

Com. in
apho. 73.
lib. 11.
4.

rum si partium ad ventrem attinentium sit imbecillitas. Maxime autem imbecillitas contrahitur ob paupertatem caloris naturalis, & dominatum caloris contra naturam omnia peruertentis; immò & omne alimentum in corruptelam & malignum spiritum conuertentis. Quod si corpus in quo intemperies est calida, ab omni crudo humore immune esset, flatuum quidem illas non glisceret: sed si qua crudorum succorum quantitas sit, facile adaugetur ob calorem contra naturam. De ictericis an flatuosi sint, an non, dictum à nobis in Comment. de Definitionibus Medicis.

Ceterum, indicauit abundè curatio qua ex causa morbus foret. Nam cum immedicabilis per multos dies permansisset, usurpatis præsertim validioribus medicamentis rerum quæ sequuntur, vsu plurimum est adiutus. Primum relictis grauioribus enematis, in blandioribus statum est. Vena secta ter vt inflammatio tolleretur. Sanguis inflammatus & corruptus. Iuscula temperata & insulsa data sunt. A vino temperauit. Ter die in balneum descendit temperatum ex aqua dulci. Sequenti die data tabella diacarth. ex iusculo pulli ad dacrydij vim debilitandam. Deinde rursus in balneum descendit. ⁴ Paulò post morbus cœpit humescere, phlogosis temperari, liberari obstructa, flatus erumpere: erumpentibus alleuatio multa. Deinde syrupo violato sæpè vsus, & portione sequenti.

℞ sem. melonum, cucum. an. ʒj. s. sem. citrij & fœnic. an. ʒj. granorum alkeken. & Kermes an. ʒj. malu. bismal. & scabios. an. m. j. cinamomi ʒj. fiat decoct. ad dosim. In colat. dissol. vini hippocratici ʒss. succi amygdal. dulcium ʒj. s. vtatur longè à pastu.

Repetatur idem poculum sæpe.

Item focus post balneum adhibitus est sequens:

℞ malu. bismal. an. m. j. florum chamem. melilot. summit. aneth. an. m. s. absynth. pont. mentha. an. m. s. semina lini ʒj. cypper. screnan. an. ʒij. ben albi, bentub. an. ʒj. Fiant sacculi qui bulliant in aqua & vino pro fotu ventris totius & ventriculi, cum spongia.

A fotu liniatur oleis sequentibus:

℞ butyr. recent. ʒij. muccag. sem. lini & althea an. ʒj. puluer. mastich. & cypperi, an. ʒj. ol. absynth. mastich. & chamem. an. ʒj. ol. rosati ʒss. aceti ʒss. misce, fiat litus ad ventrem totum.

Item adhibitus pullus gallinaceus & catulus ventriculo.

His remediis leuatus. Cessantibus ventris doloribus grauif-

360 CONSILIORVM MEDICINALIVM
simè illi doluerunt partes extimæ, præsertim genua & pedes.

ANNOTATIONES.

1. Si verè morbum illum nominare velis, speciem quandam cholerae
c.e appellares, de cuius notis & signis dictum est antè.

2. Urina erat pene cruda & incocta, quod declarabat incendium ve-
num præproperè serum attrahentium: & suppressionem humoris biliosi,
qua suppressa malum deterius reddebat.

3. Est ubi quis sunt icterici sunt flatuosi, est ubi non sunt flatuosi, se-
cundum sententiam Hippocratis. Nam cum sit icterus per inflammatio-
nem partium, nec pituitosa crudaque materia subest qua in flatum vet-
ratur, tunc absunt flatus. Sed si aut præcesserat congestio materiae pitui-
tose aut chyli propter pravam simarum hepatis dispositionem, corruptio
sequitur, etiam in ictero potest esse flatuum multitudo. Vel dicemus ex
agitatione materiae cruda, & caloris contra naturam excitatos esse flatus
malignos. Idemque factum esse quod in generatione flatuum, de quibus
nostris Definitionibus. Galenus comment. in partic. 21. lib. 4. Acutus
ait à spiritus interceptione non inferri flagrantem hypochondrio affectu-
nem. Quod verum est. Sed flagrans in hypochondrio dispositio potest fla-
tus excitare.

4. Quod mirum est quiescentibus post balnea doloribus ventris & re-
num, cæpit dolere tibias & malleolos, adeò ut per omnes noctes clamarent
nec ullâ ratione sedarentur. Hunc morbum graphicè explicat Hippocra-
tes, lib. de intern. affect.

CONSILIVM LXIV.

De Febre quartana.

ILLVSTRIS Domina de Palluaquea in quartanam incidit
I circamensem Augustum, cum tempus æstivum totum inae-
quale fuisset. Verè enim ab Hippocrate literis mandatum est.
Cum eadem die modò calor, modò frigus apparet, autumnales morbos pro-
rit. Ista enim inæqualitas naturæ infesta est. Hinc febrium er-
raticarum quæ quartanarum sunt prodromi origo. Hoc autem
ideò fit, quod temporis diuturnitate corporis habitum siccentem
ac humores adurant. In Græco est *διὰ τὴν ξηραντικὴν* quidam ver-
tuem

tunt, ob pituitam, nos autem, propter calefactionem, retorrefactionemque vertimus: vt ista calefactio sit causa incinerationis; hinc sensim corpus refrigescit, resiccaturque, vnde pro-
pensio in quartanam. Vel potius nomine *καρδιακός* audiemus
pituitam siccam, crassam, retorridam, non autem humidam ac
serosam. Hæc nobilis mulier temperamento est satis sanguinea
tamen deurgente ad siccum quam ad calidum. Et cum *πύρ* *καρ-*
διακόν duo sint genera, alij calidi & humidij sunt, hepaticique
dicuntur, & multum sanguinis generant, pulsus habent plenos,
elatos, magnos; multum sumunt alimenti, febribus continuis,
synochis, putridis que sunt obnoxij; & cum perspiratione ca-
reant, sunt melancholici, non atrabilarij, sed melancholici à
fæce sanguinis & crassitie, & veras legitimasque quartanas ha-
bent, cum sanguis non bene repurgatus, aut cum plus æquo
succrescit in corpore: & tales quartanæ sunt longæ quidem,
sed securæ. De iis dixit Hippocrates; *ἡ τερύβρις melancholica*
ἐστίν. Alij colorem habent rubeum, & hepar præcalidum ha-
bent: sed calor in humiditate positus non est, sed in nescio quo
fualore, siccitate, humiditatis inopia. Et hi tametsi rubore aliàs
fugaci, aliàs non fugaci perfundantur, suffundanturque, tamen
hoc non est iudicium abundantis sanguinis, sed calidioris he-
patis sanguinem acrem, subtilem, serosumque generantis. Sic
sunt pauci sanguinis, pulsu satis celeri, non elato, non pleno,
valetudinarij viuunt, serosis humoribus abundant, febribus
longis, hecticis, hæmitritæis detinentur, fluoribus hepaticis;
& si in quartanas incidunt, aliàs in inæquales quartanas, aliàs
continuitatem habent, vtpote sanguine non humectato, nec
corde, & inæqualitate in pulsibus perseverante. Urinas meiunt
aqueas, & aliàs in quartanam incidunt atrabilariam, horrificā,
quia humor biliosus serosus, dulci aqueo ac temperato humore
non moderatus facile excandescit, & in atrabilariam naturam
immutatur. Priores *καρδιακοί* facile ferunt venæ sectiones, & ab-
illis non læduntur: posteriores non nisi cum summa difficultate;
vix enim sese recipiunt, recolligunt, ac recuperant, & hypo-
chondriacis morbis laborant, & obstructionibus mesenterij, &
tenaces sunt, & mœsti, & facile terrentur, & apprehendunt;
immo in hydropem siccum facile delabuntur, & prauas habent
actiones vt hi qui febre laborant, nam febrientem habent vè-
trem. Alij mediij sunt. Domina de Palloysseau media ferè est,

nam nec nimis siccum hepar, nec multâ humiditate temperatum habet. Domina Dorsæa accedit potius ad posteriores, cum pulsus habeat paruos, celeres, vix perceptibiles, colorem saturatum, fugacem, aliàs plenior, siccitatem summam, & vt ita loquar, igneitat; vt mirum non sit si tempore inæquali vtraque in febrem quartanam inciderit. Et quibus ita affectum hepar non tam sæpè laborant, præsertim si sibi in victu temperauerint: sed cum in morbum inciderunt eo vix ac ne vix defunguntur. Et tamen videtur febris eis morbus esse congener. Vtraque mulier nunquam habitior fuerat, nunquam plenioris vultus ac pinguioris, nunquam ad functiones paratior & alacrior: sed vtrique solemnitas erat quædam fluxio alui, quæ dum fieret, vt erat vindex morborum, ita dum resistit, cessatque, eorumdem est promotrix, aduocatrix & conseruatric. Vni quidem, quoniam cum hepar aliqua ex parte siccus sit & calidius, multa biliosa & ichorosa generat, quæ aluum faciliè turbant, ac emouent. Sed dices: Si hepar siccum, siccitas autem facultatem retentricem iuuat, cur non retinet potius? Dicemus autem quod attinet ad illam *ἐνέχια* & *ἐνχόλια*, vtramque malam fuisse. Omnis enim *ἐνέχια* & *ἐνχόλια* quæ præter rationem aduenit, quæque nature legibus consuetis non continetur, immò potius est ob veteris & solemnitis euacuationis suppressionem, quam ob partium solidarum repletionem & instaurationem, mala est vt signum & vt causa. Vt signum, quia cum extenuationis sint argumenta in aliis partibus, repletionis autem in aliis: inæqualitas illa nutritionis declarat solum abdomen plenum esse, mesenterium plenum, vnde vetus stercus retentum illam *ἐνχόλια* secundum quid, non absolutè bonam inducit. Quod si æqualis esset ea *ἐνέχια*, declararet omnes partes solidas alimentum cepisse: vt causa autem mala est, quoniam morbos à cacochymia & à plenitudine indicat. A plenitudine quidem non sanguinis, sed humorum in abdomine contentorum, quæ plenitudo cum cacochymia confunditur. Hinc quibus mulieribus menses, aut viris hæmorrhoides subsistunt, eæ impinguantur, an propterea bene habent? Non, immò est instar euexiæ athletarum. Et Hippocrates doctè lib. de morbis, dum de suffusione pituitæ à capite loquitur, aut carnes rarefactas & excalfactas diffusam illam pituitam faciliè in se recipere, & postea *ἐνέχια* inferre. Sed illa *ἐνέχια* lubrica est, & periculi plena. Item libro Coacar. animad-

uerfionum, Coloris bonitas, & sudores fine febre, aut inordinatam diætā docent, aut vetus stercoſus ſubefſe. Veteris ſtercoris nomine poteſt audire euacuationem aliquam ſolemneſſimam ſubſiſtentem. An hæc bonitas coloris bona eſt? Nequaquam: immo prodromos & anteſignanus morborum. Vt nec ea bonitas coloris quæ in peripneumonicis apparet. Ideo decipiebantur veteres, qui minimè contenti bonā valetudine, & bonitate actionum ſanguinem & lacertos quærebant, ex eoque metiebantur ſanitatē, cum quis ſucculentus & plenus, & bene habitus foret. Sed eos Galenus reprehendit. Sic non quoties quis ſaturato rubore eſt, dicere oportet eum eſſe valde ſanum: nec item quoties quis ita affectus eſt, dicere oportet eum eſſe temperamento ſanguineo. Nam eſſe tales certū eſt colores quale alimentum, non propterea tamen ſanguinis dominatum declarat rubens gena. Nam bifariam rubent genæ, aut propter ſanguinis abundantiam, & tunc eos ſanguineos eſſe dices, & ij quadrati eſſe ſolent, rudibundi, parum de rebus ſolliciti (niſi inclinante æſtate corpus minimè perſpiret) & liberaiores eſſe oportet in ſanguine mittendo: aut ob caloris exceſſum cum humorum ichoroſorum copia & dominatu, præſertim ſi in iis potiùs ſit *υπερβολή*, quàm *υποβολή*. Scire enim oportet in aliis hepar ſuas habere inclinationes infernas, in aliis ſuperas. Vnde pedes ſæpè quibusdam ſunt frigidiffimi, quibus manus calidiſſimæ: & contrà. Si ob caloris tantum exceſſum, ij ſunt ſæpè macri, furioſi, bilioſi, mœſti, iniurioſi, iniqui, tenaces, mali, verſuti, melancholici, vrinas ſæpè aqueas habent, ut pote hepate exugente ſtatim ob calorem & ſiccitatem id quod humidum eſt, & multum meiunt, quod falſo catarrhis attribunt, cum ſit veluti diabetica affectio; eo enim pacto affectum eſt hepar, quo aliquando renes: immo in renibus non poteſt non eſſe talis diatheſis qualis in hepate: facile enim conſentiunt. Declarauit ille æger qui veluti diabetem habebat in vico de la Mortellerie, cum certiffima eſſent argumenta ſicci, ſqualidi, & arentis & calidi hepatis. Et hoc diligenter notandum eſt. Caue ergo ne valde decipiaris iudicans de temperamento ſanguinis ex eo quod quis foret ſubrubeus; fallax enim id eſt. Hippocrates videtur aliam cauſam colorationis ſtatuerē in ſuis libris; colorum mutationes ſiunt corde venas laxante, aut eodem conſtringente; laxante quidem florescentes, pellucidi,

Lib. de
off. nat.

Z z ij

rubicundi, constringente virides & *σφοδραιοι*. Ac si dicat in quibusdam per effumationem tantum & vaporum emissionem colorem induci, qui vapores si retineantur, tum mala coloratio adesse solet. Sed id potius pendet ex dispositione ea quam diximus. Nisi dicas cor quoque plurimum posse ob spiritus & colorem quem pulmonibus inducit. Vt quibus pullus parvus & languidus, constrictusque, si color rubeus adsit, non vi caloris adsit, sed nescio cuius vaporis qui effertur. Quibus autem cor bene dilatatur, & sanguinei sunt, iis bona coloratio ex se. De febre autem quæ mulierem istam adorta fuerat, ita disputatum est. In omni morborum depulsione de morbo primum constare oportet. Atque de morbo quidem quis, quæ idea, ut quæ huius aut illius corporis *ιδιαισθησις* sequatur. Nam pro corporum varietate euariant quoque. Si morbi species non statim se prodant, maior pars negotij naturæ conmittitur. Illa enim legitimæ vitæ ratione adhibitâ patefaciet id de quo dubitatur, cum incerta medicatio non nisi dispendio decernatur. Hoc autem maximè in inconstantibus temporibus fit. Quod in hac muliere spectatur. Nam qui morbus primò & per se (quod tamen raro usu venit, & ideo declarat diathesin iam in partibus factam) quartanum typum periodum receperat, mox eundem reiiciens confusus in sese est. Quartanam esse periodus declarat, ætas consentiens, tempus inæquale & autumnale. Vt quæ admodum eadem die modò calor, modò frigus fit: ita inæqualibus temporibus inæquales motus febres morbi que habeant. Et quod argumentum maximum dignotionis morbi, quodque Galenus i. ad Glauconem plurimi facit, immò pluris quam citationis formam, est quòd hoc tempore multo tales grassentur morbi. Contra tamè quartanarum non esse aliquis doceat, quod nulla ferè *ἀντιρροια*, cum tamen Galenus asserat maximè in quartanis omne quod exustum est discuti ac euacuari. Sed fortè de ordinatis intelligit. Item quòd accessio in sudores non delinat, quod tamen i. ad Glauconem requirit Galenus. Quod acerrimus calor qualis in tertianis, quòd nullus rigor, immò ne horror quidem. Quod fit tribus de causis, aut quòd sensus prestantia non sit, quòd materies retusa sit, & naturam non stimulet, aut quòd nulla motionis vehementia. Cum enim rigor motus sit multus, id est numerosas habens motiones, cum impetu, breue habens quietis tempus: horror omnia quidem ha-

*Libr. de
sympis.*

*Gal. i. ad
Glauconem.*

*a de diff.
febr. febr.*

bet, sed remissiora, frigus sine motu in cute sentitur. In rigore corpus concutitur, virtute cum humore lactante: in horrore cutis & muscoli cum quadam lassitudine, pigritia, & mouendi difficultate concutitur. In frigore nulla concussio, sed sola cutis inalgescit. Rigorem afferunt sensus prestantia, materia naturam irritans, & motionis vehementia. Si causæ hæc validiores, rigor inducetur: si remittantur, id est, sensus hebetior, materia minus calida, acris, ad motum pigrior, virtus robusta, horror: id est, cutis & musculorum concussio. Tertianam veram rigor antecedit, quia caliditas exacriorem sensum reddit, humor mordicat, virtus robusta est ob siccitatem mediocrem quam habent biliosi. In quotidiana humoris frigiditate sensus obtunditur, humore robur fatiscit, materia nec mordet, nec facile mouetur, idè adest solum frigus. Quartanas & spurias tertianas & quotidianas quibus bilis admista, & semitertianas anteit, horror medium locum occupans inter frigus & rigorem. Nam causæ non sunt vt in tertiana validæ, nec vt in quotidiana languidæ. Et Galenus ait per frigationem aliquando tertianas anteire, & leuem rigorem, præsertim si virtus debilis, & sensus hebes sit. Immo (quod notandum est) per multæ continuæ, & quæ vnica finiuntur accessione, à leui rigore & frigore incipiunt, immò & pleuritides ob materiæ vel inæqualitatem & malignitatem: maximè verò id obseruatur in corporibus delicatioribus: in tertianis pulsus magni, vehementes, celeres, omnis inæqualitatis, præterquam febrilis expertes. Magnitudo & celeritas ad robur arteriæ, vrgentem necessitatem & seque instrumentum refertur: frequentia ad necessitatem, vehementia ad robur. Galenus lib. de typis, paruum & frequentem pulsum agnoscit. Sed locus erroneus est, & facile illis ascribo qui hunc librum Galeni esse negent.

Lib. de
typis.

Nec enim ea paruitas pulsus in tertiana esse potest, sed in quartanis pulsus medio loco constitutus est inter pulsum tertianarum & quartanarum. Pulsus rari & tardi sunt, nisi increseat aut vrgeat febris. Nam postulante vsu crebriores & celeriores sunt, ita tamen vt natiua quædam tarditas & raras maneat. Rari pulsus sunt, cum interpositis longis interuallis arteria pullat: tardi cum longo tempore paruum spatium percurritur. In pulsu causa agens est virtus, quæ per-

366 CONSILIORVM MEDICINALIVM

spatium arteriam mouet, ab eius medio ad circumferentiam dum distenditur, & eandem reflectit à circumferentia ad medium, interposità quiete dum contrahitur. Sic cum urget necessitas, spatiumque liberum est, & corpus arteriæ quod mouetur virtuti parer quæ agit; tunc pulsus magnus celer & frequens fit. Contrà si vsus non urget, spatium non liberum, arteria virtuti non obsequatur, pulsus fit rarus, tardus. Nam nec vsus celer refrigerium desiderat, nec spatium liberum est, sed humorum vaporumque copiâ præpeditum. Inæqualitas in pulsu quartanariorum facile deprehenditur etiam in vno pulsu. Cum enim inæqualitas fiat urgente necessitate facultate obsequente, sed motum interrompente, impedienteque materiæ copiâ, aut crassitudine, aut instrumenti affectu, vt obstructione, aut compressione, vel constrictione inæqualitas necessariò insequitur. Hæc omnia doctissimus Scholiastes & Paraphrastes Galeni in priore ad Glauconem exemplis & hypothesebus illustrauit: quæ omnia memorabilia sunt dignissima. Sed hæc intelliguntur de iis præfertim quartanis, in quibus ater succus frigidus & siccus, calidus tantum per modum putredinis febrem accedit. Nam prout humor aut est *ερεος* aut *εμολλός*; ita facultate validâ, aut infirmâ, vt postulante, aut non pro conditione humoris, & instrumenti hoc vel illo modo affecto; ita pulsus de raritate aut tarditate remittit, acceditque ad tertianarum aut quotidianarum pulsum. Nam nemo dubitat plerisque succrescere humores biliosos futuræ tertianæ parentes, qui tamen reuerti, debilitatique, aliterque affecti quàm deceat, aut quod adsit aut nus iam, aut instet, aliam naturam accerlant, febremque quartanam inferant. Quemadmodum enim humor naturæ suæ frigidus, & talis à tempestate factus, cum alioqui ratione suæ frigiditatis inferiora petere debeat, tamen ad partes superiores conscendit in iuuenibus, quod temperamentum calidum corporis suscipientis & patientis humorem alium cursum motumque capere cogat quàm ipsa natura suadeat. Ita quoque humor natus ex se tertianam inuehere, ratione tempestatis potest tanquam de sua discedens natura aliam inducere febrem. Istam hypothesein ex Hippocrate & Galeno desumpsimus: reddit enim rationem cur iuuenibus parotides molles & pituitosæ natæ fuerint, cum materia ipsa cali-

*Com. in
part. 11.
sect. 1.
lib. Epid.*

ginosa frigidaque foret, nataque ad generandos in partibus
 inferis abcessus: quia, inquit, iuuenes erant, ut calor iue-
 nilis materiam aliorum conuerterit quam a natura habe-
 ret. Nunc redeamus: Ergo in illa muliere haec argumenta
 suadebant non veram esse quartanam, quod nulla apyrexia,
 quod accessio in sudores non desineret, quod horror non
 esset; denique quoniam inaequalitas in vno pulsu quae in quar-
 tanis maximè esse solet, ut antè dictum est, nec natua tardi-
 tas varietasque adesseret. Quod fit quod exquisitus non sit hu-
 mor atrabilarius frigidus & siccus, ut cinis; sed biliosus, qui
 tamen caliginosior factus, alius febris autor factus est quam
 pro ratione sui, quod urgeat necessitas magis flabellationis,
 quam in veris quartanis, in quibus quoniam humor frigidior
 sicciorque est, non tantam molestiam affert calor, immò in
 plerisque plus ipsa horrida concussio conquassatioque mo-
 lesta est quam calor febrilis. Accedit quod in hac biliosa
 muliere non ita instrumentum praepeditum est vaporum à
 materia frigida siccaque elatorum crassitie & copia, debue-
 rat incidere in tertianam, sed humor qui erat biliosus aliam
 naturam acquisiuit, immò & malignitatem, unde quandam
 continuitatem afferebat. Nam illud est valdè notandum
 quod scribit Galenus, *Nulla febris cum inflammatione, aut mali-*
gna humorum putredine intermissionem habet: cum verò intermittit fe-
bris, utrumque abest. At dices: Si quo tempore cacoethia hu-
 morum est, autumno maximè: ergo acutissimi morbi pullu-
 bore debent. Sed dicimus & acutissimos & longissimos mor-
 bios in autumnum incidere: hos quidem cum potius conge-
 sit. Ac quod id accadat autumno, Hippocrates scribit, Pri-
 mum, quod quartanae autumno longissimae, & idem de aliis
 quibusdam morbis. De malignis ita scribit: *Autumno morbi*
acutissimi & exitiales magna ex parte. Galenus rationem reddit,
 quod eodem die calor & frigus adsit: Item quod astatem autumnus se-
 quatur, in qua assantur humores, & vires debilitantur: tum quia humo-
 res sub finem aetatis ad distillationem erant parati, appetente autumno
 intruduntur. Et haec omnibus communia sunt, maiora verò ex mul-
 tudine prauiorum humorum cum fructibus usi fuerunt multis. Idem
 quod in Aphorism. repetit, in Epid. & in lib. 6. *Ferinum au-*
tumno & cordis dolores, & horridum, & melancholicum. Quadruplex,

Com. 1m
 aph. 489
 lib. 4.

Aph. 25.
 lib. 2.

Aphor. 9
 lib. 3.

Lib. 2. E-
 pid. sect.

568 CONSILIORVM MEDICINALIVM

autem est feritas: vna, lumbricorum; secunda, mania; destilla-
tionis altera; quarta, cancri & elephantiascos. Horum malor-
um causas duas assignauit; vnam mali humoris qui tunc gene-
ratur abundantiam, alteram temporis illius inæqualitatem. De-
nique hoc tempore grassantur morbi mali ob cacoethiam hu-
moris, venenatam qualitatem, inflammationem, impedimen-
tum partium principum, difficultatem curandi, cruditatem hu-
morum cacochymia coniunctam, temporis inæqualitatem, ob
adustionem ratione æstatis præteritæ: virium debilitatem præ-
terito tempore allatam, inclinationem humoris foris, intro, &
præsertim manè & vespèri. Hippocrates enim vespèri morbos
autumnales maximè recrudescere: denique ob fructuum vsum
immodicum.

In muliere ista humor biliosus est dilutus quidem, & *ἐν λυγρῷ*
πολύωρος, efferatus tamen tam malam febrem committit. Et forte
ille humor aliquâ tenuitate præditus, subigendo, tenuando, agi-
tando, causa est tam inæqualis *ἐπισημασίας*, vt idem faciat quod
theriaca initio febrium quartanarum data; hæc enim duplices
Lib. 1. ad triplicesque quartanas facit, quia tempore & loco non præscit
Glauc. pta incidit penetrando, & vnum humorem diuidit, duosque ex
vno facit. Statim à sumpto cibo micat calor, aut ratione eius
subtilitatis: vel quia intus calor est siccus & arens, qui quemad-
modum in hecticis, rei humidæ accessu facillè facillè exulscita-
tur, & *ἐκ λυγρῶν*. Quod ad curationem; Audito Quartanæ no-
mine statim ad incidentia, tenuantia, calfacientia, vel etiam
vehementiuscula confugimus: sed hæc omnia hîc locum non
habent. Nam ideâ distinguitur ab aliis quartanis. Maxime verò
diætæ ratio habenda, quod futura morbi longitudo vires vali-
das requirat. Abstinentum glutinantibus, succum crassum
generantibus, humectandum: quanquam Galen. videtur in-
terdicere humectantia. Sed codex græcus erroneus est; nam
cùm dicit temperandum *ἀπὸ τῶν ὑγραίνοντων*, legendum *ἐν ψυχρῷ*
nam refrigerantia & siccantia nocent. Quæstio, an in quartana
seccioni venæ locus sit. Galenus in tertiana notha, & in quartana
na, cùm de seccioni venæ agit, ex hypothèsi de ea loquitur. De
tertiana notha ita: *Si sanguinis missione opus est, ea non omittatur*
quasi in tertianis nothis non probet necessariò venæ seccionem.
At Galenus de tertiana notha loquitur, quæ maximam affinitate
tem cum quotidianis habet. De quartana ita sensit: *Quartana*

s. ad
Glauc.

ad Glau-
com. 1.

per initia moderatè tractabis. Nullum vehemens medicamentum aut
 vacuationem adhibebis, nisi sanguis admodum exuperare videatur. Et si
 secta vena sanguis niger ac crassus, qualis maximè in lienosis perspi-
 citur, profluat, audacter mitiendus; sin flauus ac tenuis, statim sistendus.

Idem Galenus de melancholicis loquens, differit. Cum, ait, opi- 7. cap. l.
 nioerit in vniuersi corporis venis melancholicum sanguinem contineri, 3. de loc.
 quò certiore habeas notitiam, vena media secetur. Quod si fluens
 sanguis non videatur melancholicus, sistatur: sin melancholicus appareat
 vacua quantum pro laborantis natura videatur. Itaque de quartana
 ex hypothesi loquitur; Si sanguis admodum exuperet: vbi notanda
 vis vocis admodum. Nec dubium esse debet quin si corpus fri-
 gidum sit & siccum (quod corpus verè quartanis implicatur) à
 sectione venæ temperandum sit. At mulier hæc de qua res agi-
 tur, calida est & sicca, æstuat, sitit, iactatio, leuia deliria, em-
 pyreuma magnum, continuitas quædam, immò nondum status
 typus: metus orgasmici, vrinæ sunt flammeæ, mulier est. Mulie-
 res autem luculentiores phlebotomias ferunt. Itaque secanda
 vena est opportunè. Purgationes non ita valent ne duplex
 quartana incidat: vt de Medico narrat Galenus, qui quartana-
 rio succum cyrenaicum præscribit, coniicitque ægrum in tri- 1. ad
 plicem quartanam. Glanc.

Designis prognosticis ita statuendum est. Omnis securitas
 aut ex parte morbi, aut subiecti, aut vtriusque. Morbus diutur-
 nus, securus ferè, vt ait Galenus passim: immò ab aliis morbis
 vindicat, ait Hippocrates. Quanquam Galenus docet comm. 7. par.
 in partic. 4. sect. 3. lib. 1. Epidem. eas febres quartanas, quæ ex 6. lib.
 liene sequuntur, id est vitium aliquod peculiare in liene hy- 6. Epid.
 dropem similemque affectum prouocare: non quin propterea 6. par.
 quartana eo nomine non sit secura, sed ex euentu id sit. Et ne 4. sect. 3.
 cessariò febris hæc quartana longa futura est, primum quod 1. lib. 1. E-
 per fetalis est, & maximè quæ hunc mem attingit: deinde quia 7. par.
 corpus inclinantis ætatis est, minimum perspirans. Tertiò quia
 epidemius nunc morbus est, vt quemadmodum tempestas est
 generatrix, ita & conseruatric esse dicatur. Nisi quis obiciat
 morbum minus longum fore, quòd ita sit inordinatus: & quæ-
 rumque febres eadem horâ repetunt, sunt agrè solubiles. Hic
 enim intelligi non debet de autumnalibus quos certa de causa
 erraticos esse diximus. Accedit quod huic mulieri lien sit infir-
 mus. Si autem infirmitas lienis æstiuas quartanas facit, contra

370 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Lib. de
aere &
lois.

aphorismum, sicut quodam loco Hippocrates animaduertit multò magis conferet ista lienis infirmitas ad conseruationem quartanarum. Nec certè aliter cessit. Nam per duos annos persequerauit ea febris, aliàs ordinata, aliàs complicata, aliàs tenua, aliàs aliter affecta. Et in vigore accessionis quoniam magescebat humor biliosus, erant deliria perpetua. Sed quod mirum est, & Medicis multum negotij dedit, est quod exacto primo anno tanta fatuæ pituitæ copia in os recurabat, ut hoc stomachi infestum esset, multum ægræ tædij afferret, necnon appetentiam omnem proiiceret. Dubitabatur an id à pulmonibus foret, an à capite, an ab hypochondriis natante aluo humiditate, quæ liberum exitum non haberet. Illa mulier pulmones habebat infirmos, & sata erat stirpe plurimum morbis obnoxia. Caput quoque incalfactum erat à calore febrili. Quemadmodum autem sol incalfaciens cerebrum *diapnois* facit (ut ait Hippocrates) corpusque multà imbuit humiditate: ita calor fe-

Lib. I. de
morbis.

brilis & consumere potest humiditatem partibus existentibus robustis, & liquefacere partibus existentibus infirmis, & locum legitimæ nutritionis multam humiditatem potest tanquàm causam per accidens inducere. Per accidens, quoniam partes debilitat, sic ut proprium alimentum non probè conficiant, & quoniam appetentiam deiicit, corpusque sitibundum reddit, remanent liquidiorum crebrior usus est, & proinde multarum humiditatum prouentus. Atque ego existimo tantæ humiditatis & pulmones & caput autores fuisse. Et illud annotauit Galenus in febribus quartanis, loquens de iis quæ superueniunt talibus febribus: *Quartanarum typum insequuntur inappetentie, saluatiore aliquando ex causis contrariis appetentie intense, insculaque ipsis debet, quando corporis habitus corrumpitur.* Et loquens paulò antè de quotidianis, quod antè est etiam annotatum: sed tamen ob loci excellentiam repetere non erit alienum, aut productis quotidianis rheumatismos thoracis succedere. Quod fit aliis partibus debilitatis, & à suppressione proprii excrementi quod à se amandare nequeunt laborantibus. Vnde cum mulier hæc potius amuletis & palliativâ curâ à quartana liberata esset, & quandam comparasset, inopinatò incidit in inflammationem pulmonis, à qua breui interiit. Præterea idem Galenus vnum obseruauit de quartanis, quod perpetuæ memoriæ tradendum est, cum & ad prognosim pertineat, & ad præcauendum ne quid tale contingat.

Lib. de
Typis, c.
4.

mones & caput autores fuisse. Et illud annotauit Galenus in febribus quartanis, loquens de iis quæ superueniunt talibus febribus: *Quartanarum typum insequuntur inappetentie, saluatiore aliquando ex causis contrariis appetentie intense, insculaque ipsis debet, quando corporis habitus corrumpitur.* Et loquens paulò antè de quotidianis, quod antè est etiam annotatum: sed tamen ob loci excellentiam repetere non erit alienum, aut productis quotidianis rheumatismos thoracis succedere. Quod fit aliis partibus debilitatis, & à suppressione proprii excrementi quod à se amandare nequeunt laborantibus. Vnde cum mulier hæc potius amuletis & palliativâ curâ à quartana liberata esset, & quandam comparasset, inopinatò incidit in inflammationem pulmonis, à qua breui interiit. Præterea idem Galenus vnum obseruauit de quartanis, quod perpetuæ memoriæ tradendum est, cum & ad prognosim pertineat, & ad præcauendum ne quid tale contingat.

gat, lib. de Typis. Typus quartanus dum febris vehementior
 euadit ipse sibi complicatio, vt duo & tres fiant quartani, vel
 etiam vsque ad quandam continuitatem perueniant: rursus
 dum moderatio est, ad vnum typum reducitur, fit etiam peri-
 culosus ob implicita mala, quia phthisim & hydropicas suffu-
 siones sæpè efficiat. Metuebamus huic mulieri hydropem, præ-
 sertim siccum; sed nil tale contigit. Remedia quæ sequuntur
 præscripta fuerunt.

℞. conseru. buglos. cichorij, ceterach & apij an. ℥j. s. folior. senæ pul-
 uerisat. ℥j. rheibarb. electi ℥ss. cum decocto polypodij. fiat opiata vien-
 da sepe. Decoctum polypodij erit factum perfecte cum saccharo.

℞. succor. menth. absynth. buglos. an. ℥ij. in quibus infunde agari-
 ci albi ℥j. fiat syrupus coctus perfecte cum saccharo.

℞. succorum depurat. buglos. borag. pomor. de curtispend. meliss. sca-
 ril. an. ℥j. sacchari qu. suff. fiat syrupus, de quo capiat sub finem access.

ANNOTATIONES.

1. Huc pertinet illud Hippocratis 2 Epidem. *ἡντινὴν excitata in qui-
 busdam coloris bonitatem affert.*
2. Plerique casuri in quartanas, sentiunt dolorem lienis. Hinc Galen.
 cap. 4. lib. de Typis, asserit quartanam sequi lienis phlegmonem & tu-
 morem. Oportet dicere quod cum febris quartana primò prehendis-
 tam est dispositio aliqua in corpore ad susceptionem, & materia in angu-
 stis venarum quodammodo est infiltrata, vt loquuntur veteres, ita de
 ea dispositio & infiltratio sequens aut contumaciam materie, aut eiusdem
 tenuitatem, morbi longi aut brevis sit causa. Nec credere oportet in
 corpore semper ipsius lienis aut iecoris fomitem esse morbi. Nam in hu-
 moribus est qui aut circum lienem continentur, aut circa hepar. Tales
 autem humores retinent de natura partium quibus vicini sunt.
3. Et lib. de Typis, ait tertianas, & quartanas accessionem habere
 breuem, autem longam: quotidianæ autem longam habent accessionem,
 breuem autem intermissionem. Nomine autem aneseos intelligere quoque oportet
 intermissionem. In 2. de different. febr. intermissionis tempus paruum
 esse vult. At tamen lib. 1. ad Glaucon. contrarium asserit, immò rarita-
 tem & tarditatem in pulsu post accessionem agnoscit.

Aaa y

CONSILIVM LXV.

In quo quæstiones tres explicantur. Prima de Hypnoticis: Secunda de usu medicamentorum, & præpropera venæ sectione in febribus quibusdam. Tertia de ratione purgandi macilenta corpora.

Duo sunt hoc consilio plurimum annotanda, quorum observatio ad artem præclare & castè exercendam conferret. Primum de usu hypnoticorum: secundum de usu medicamentorum, & præpropera venæ sectione in plerisque febribus, in quibus ægri æstuant quidem, & tamen non sitiunt valdè, tametsi lingua indicet multum subesse caloris. Tertium addam de corporibus macilentis, quæ cum purgare volumus, eis etiam ægrotantium ipsorum voto valida applicamus remedia. Ad primum inflectit sese oratio nostra. Somnus triplex est, naturalis, à causa naturali, ut cum suavis vapor cerebri meatus leniter obstruit & humectat: in quo satis est capi sensus aut intercipi videntur, cessentque ab opere: unde cantu, strepitu cytharæ, illapsu inflexuque blando aquæ somnus blandus irrepit, non partem ullam in cerebro obstructione, nec ullam re cerebrum operiente. Quod tamen Aristoteli placuit, ut existimaret nunquam illabi quempiam in somnum nisi res aliqua cerebrum operiat, aut saltem colliquatio fiat aliqua. Quod absonum videtur. Vnde enim colliquatio ista cum cantus, blandaque & sonora vox somnum inducit? Galenus autem docet somnum etiam longum nondum contra naturam existentem etiam à sola cerebri refrigeratione oriri, nullam de humore factam mentionem. Quod autem solius refrigerationis mentio facta fuerit, patet ex ea divisione quam proponit; si refrigeratio (ait) cerebro contingat, somnum profundum facit; si refrigeratio fortis iuncta humiditati lethargicæ affectiones inducit; si autem siccitati, naturæ. Sic à sola refrigeratione, mediocri tamen, somnus profundus conciliatur, quinodum aut comatis, aut similis affectus rationem habet, nisi difficilis sit expurgationis. Cum enim hoc contingit tum contra naturam somnus existit. Et tamen licet non sit difficilis expurgatio, non desinit quidam somnus longus in malis duci.

Propterea que errauerunt quidam veteres existimantes nullū
 somnum longum mediocritatem superare, esseque contra na-
 turam: vigilias verò contra naturam quasdam longas posse exi-
 stere. Sed si vigilie modum superant, naturamque lædunt, cur
 non & somnus? Horum dogmata à Galeno pluribus labefacta-
 tur in commentariis in aphor. vti & eorum qui soporiferas af-
 fectiões & contra naturam existentes, somnum esse longum
 dixerunt, præsertim dum incipiunt. Sic quidam somnus est na-
 turalis per blandam anathymiasin cerebrum capientem, actio-
 nesque cessare ferientem, sensibus quodammodò ligatis, qui
 per vigilias absoluuntur. Alius est contra naturam à causa alic-
 nore, vt Galenus pluribus locis explicat, vt in catalepsi, cata-
 phora, apoplexia, veterno, & aliis generis eiusdem apparet.
 Tertius autem medius, ab vtrisque causis nascens, & is à natu-
 rali longius recedit, contra tamen naturam nondum planè ex-
 illit. Eiusmodi somnus in pueris & temulentis apparet, & in-
 terdum iuuat ad coctionem & ebrietatem tollendam. Vnde
 Carus ab Hippocrate non videtur omninò damnatus, tametsi
 contra naturam affectio sit, & affectio sit soporifera *δυσδιήγητος*,
 (quæ vox somnum maximè contra naturam reddit, vt ex 2.
 Aphorism. patet) Galenus in Comment. & in pueris & temu-
 lentis, & aëgris *ἡ ἰσχυρὴ διήγησις* observauit, præsertim cū diu
 per morbum vigilassent, profuisse plurimū. Plura illo com-
 mentario 2. Prorrh. legere possis. Porro ille somnus qui *ἡ
 ἰσχυρὴ* habet, modum quidem naturæ excedit, & fit à causa
 quantitate potius quàm qualitate molestā. Sed est somnus alius
 veluti quartus vsu rerum soporiferarum inductus, cuius gratiā
 sermo hic est institutus, vt doceamus quibus modis inducto il-
 lo somno in ægrorum commoda peccetur, & cū ita peccetur,
 quæ ratio sit ineunda, & quatenus in eius inductione, ne ni-
 mietate & insolentiā erretur, sit insistendum. Caterū somnus
 ille hypnoticis inductus, cū blandam benignamque anathy-
 miasin causam sui agnoscat, à naturali desciscit, somnóque
 contra naturam similior redditur, quod refrigeratione & hu-
 mectatione fiat, duabus nimirum rebus febrium causæ calidæ
 & siccæ oppositus. Et quatenus ita inducitur contra naturam
 aut præter naturam somnus dicitur, quatenus autem non nihil
 adiumenti affert, immò plus commodi naturam recreando

Aaa iij.

Gal. in
aphor. 3.
lib. 2.Cap. 5. l.
3. de loc.
affect. &
comm. in
aphor. 3.
lib. 2.In Pror-
rh. par.
28. lib. 2.Com. in
aphor. 3.

374 CONSILIORVM MEDICINALIVM

diuturnis vigiliis lassatam, tritam, fractam, debilitatamque, quàm detrimenti, quòd inducatur à rebus contra naturam existantibus, quòdque aliquando in malam *ἁλίστην* trahat cerebrum.

*Apbor. 1
lib. 2. d.
p. 100.*

Sic mediocritas tenenda maximè est. Vt autem somnus etiam maximè naturalis, aliàs iuuat, aliàs nocet, vt initio paroxysmorum; sic somnus contra naturam etiam iuuat ex euentu, cum sit melius naturam vigiliis afflictam quacunque ratione leuari, quàm eam sinere atteri, ac afflictio rem reddi. Vnumquodque hæmorrhagia Galenus contendit, quæ etsi contra naturam suo genere existat, opus tamen naturæ vtilitate ipsa conferenda, dicatur.

*Lib. de
differe.
morb.*

Idem de somno. Sed in eo conciliando prodigos nos esse non oportet, satis est esse liberales. Etenim & ineuntibus morbis, & in vigore, & omni tempore morbi, siue etiam calidi, siue frigidi morbi sint, dummodò aliqua sit somni vacuitas, vt videtur Medici semper aliquid moliri, hypnoticorum vñ se se argis consulere arbitrantur. At errant longè. Nam sæpè *κακὰ καὶ ἐν ὁρίῳ*, & alia id genus mala inducunt. Dum enim exitu prohibentur excrementa *ὑπερβολὰς*, cerebrum offenditur. Galenus ex sententia

*Com. in
part. 55.
lib. 2. de
dise. acut.*

Hippocratis sententiam commemoratione dignam profert de incommodis vigiliarum immodicarum, præsertim factâ quadam ad insuetas mutatione vigilias, & somni longioris præter consuetudinem inducti, disputans. Exempli gratiâ, in morbo aut sanitate quis vigilat etiam supra mediocritatem, somnificum adhibes, tu in contrariam partem naturam adducis, & mutationem affers, nocet plurimum. Nam & vigilie *ἰσχυρὰ* cibos eructos incoctosque reddunt, ait illo loco Hippocrates: & mutatio ad somnum multum siue per se, siue de industria inductum, quod in comment. elegantissimè Galenus vocat *ὑπὸν* *ἐμπόδιον* torporem, segnitiam, langorem, grauitatem capitis, & *ἰσχυρὰ* affert, vt dicit Hippocrates. Nomine *ἰσχυρὰ* accommodatè & significanter Galenus vult intelligi *τὸ πόνος ἐκλυσις*, id est virium ac roboris exolutionem: Latine autem redditur *ἰσχυρὰ* excoctio: & homines qui immodicè dormiunt *ἐφελκύνονται* dicuntur, latine recocti excoctique, gallicè *perboulus*; quòd eorum caro sit humidior reddita, habitusque corporis albicantior & tumidiior, idque fit ob suppressionem fuliginosi excrementi, halitusque, quod per vigilias digeri deberet ac exhalare. Plura

illo commentario legi possunt. Et hæc præsertim in sanis intelliguntur, quibus arctior profundiorque somnus placet & longior. Sed in ægris est ubi hypnotica conferant, est ubi officiant plurimum.

In affectibus calidis cerebri, vigiliis, & febribus continuis soporifera maximè Medici vsurpant. Vigiliæ fiunt propter calorem primæ partis sensificæ, ait Galenus, idque vel propter simplicem intemperiem, vel ob copiam biliosi humoris in eadem parte ferocientis. Hoc videndum in calidis affectionibus cerebri, siue sit intemperies simplex, siue cum humore, ne imprudenter vsurpemus hypnotica, siue in tempore, siue in vsu crebritate. nam sic ex calida intemperie fit frigida, quod pessimum est. Accedit quod exitu prohibeantur humores tenues, siue quod per ventrem euacuari possent, siue per halitum. At dices, incrassantur? quid tum? Bonum quidem eorum acrimoniam retundere vsu temperantium, non autem stupefacientiũ vsu. Et licet retundant, ista retusio à talibus facta plus afferet incommodi nam difflatu per cutim, & refluxu à capite tanquã parte principe prohibentur humores, deinde repressi in capite vsu stupefacientium vim suam cerebro imprimunt. Vnde videmus etiam fatuos, stolidosque quosdam effici vsu narcoticorum etiam moderatorũ. In tempore quidem peccatur, cum initio morborum damus, obstruimus enim tunc, materiamque crudiorẽ reddimus, & naturam hebetiorem reddimus, nedum vegetiorem. Et omniũ grauissimè peccant etiã in vigore morborum stupefacientia hypnoticæque præscribentes: nam tunc natura aggreditur coctionem, materia est mitificata, facultas vitalis & naturalis fortes etiamnum persistunt, animalis autem infirma est: ob quam infirmitatem Galenus verat ne quid tentans. At stupefacientia cerebrum ipsum hebetius reddendo, infirmius faciunt; propterea error committitur maximus. Quin etiam contra quod Galenus dicit in vigore aliquando facultates sunt attonitæ & imbecillæ, ac tunc hypnoticon non cõfert. sopiuntur enim ipsæ facultates, nec ~~hæc quid~~ humoris percipiunt: & ita crisis non fit. Dicam quod experientiã compertum est, huc pertinens maximè & obseruandum diligenter, ne quid tale in communem hominum perniciem perpetretur. Gener cuiusdam satellitis Regij nomine Candæi febre causode laborabat,

*Com. in
lib. 2.*

*medico-
rũ error.*

*Com. in
apho. 29.
lib. 3.*

Insomnis erat. Circa nonum diem cū naturā aggressio cū cursioque expectanda esset, capiti pullus exenteratus est ap-
plicitus, eodēque tēpore syrupus diacodyonis cum deco-
cto lactucae præsriptus. Illi & præsētibz visa sunt mitiora.
Tribus aut quatuor horis post cū sese in somnum conuer-
tisset, inuentus est exanimis & extinctus. + Credibile est hoc
contigisse quod per stupefacientia somniferāque facultates
languidiores redditae forent, die præsertim critico. Sic hu-
mores non stimularunt naturam, aut eam languidam stimu-
larunt, eodēque vsu suppressā malignā materiā quae per
sudores aut aluum proiici debuisset: sic mors de repente in-
uasit. Idem in Cymaterio Sancti Ioannis mulieri contigit
cū in vigore morbi stupefacientia præsēpta essent; nam
de repente refrixerunt partes, ac interiit. Idem ad insigne S.
Trinitatis vico S. Antonij. Itaque nec initio morborum, nec
in vigore sunt admouenda stupefacientia, præsertim in acu-
tis, nec pulli exenterati; nam multū conturbant, & ad ca-
put alliciunt suo calore; vnde sensuum fit oblaesio. At op-
portunē dari possunt in morborum incremento.

Præter autem exemplorum fidem, idem clariū manifestiusque reddi potest autoritate Tralliani, qui narcoticorum
anodynorumque vsū viribus præsertim infirmis suspectum
esse ait, immō etiam mortem sæpē inde aduenire confirmat.
Nam influxum refluxūque humoris impediunt, obstruunt
naturam heberant, eiusque aciem retundunt, & alia consi-
milis afferre solent. De iis plura legere possis apud Dona-
tum ab Altomari.

De corporibus macilentis, attenuatis, squalentibus, ar-
dis, astrictaque aluo præditis hoc loco agendum est, an his
validioribus medicamentis sit consulendum, quod non nisi
ægrè aluus illis solvatur. Cū vna ex causis astrictionis alui
causa sit retentricis firmitas, præcordiorumque re-
demus frustrā eiusmodi naturas validioribus medicamentis
vexare, aut quod eorum querelis obtemperemus, qui ope-
ram nostram ludant, pote quibus medicamento nostro aluus
non sit soluta, aut quod malè credamus: quod aluus ægrius
& magis deorsum egerit, redditque, vt in Prorrheticis &
Prognost. loquitur Hippocrates, eò de validioribus medi-
camentis

camentis esse agitandum. At longè fallimur. Eiusmodi ventres siccos, arentes, ex Hippocratis libris vocare possumus, *ambustos, exustos* ve duobus in locis: priore, cùm loquitur de lapidis generatione ob æstum ventris: *Quibus*, ait, *aluus ardens ac feruida fuerit, his vesica coardefcit*: Posteriore autem dum loquitur de aquarum delectu: *Quorum ventres duri sunt, & ad hoc idonei ut amburantur, his dulcissime, leuissima, ac splendidissima aqua ex usu sunt*. Non duras aquas præscribit, non aluminosas, non nitrosas, quæ tamen viderentur aluum sollicitare, contra dulcia, mollia, liquidæque præscribit. Eadem & medicamentorum ratio esse debet. Nam vt ad ventres ardentes, aquæ molles & dulces; ad ventres, inquam, ciendos conferunt, sic & medicamenta eccoprotica, lenientia, mitigantia, leniendo soluentia. Contrà verò obfunt plurimùm ea quæ astringendo purgant, aut quæ impensè calfaciunt, vt omnia quæ scammonium recipiunt. Nam cùm siccitas ex iis sit quæ facultatem retentricem roborant, firmantque, ex quo alui pigrities consequatur, nemo dubitat plurimùm incommodi allatum iri si impensè siccantia & calfacientia medicamenta corpori facultatem retentricem præ siccitate robustam habenti exhibeantur. Sic pueriliter errant Medici id genus medicamentorum consulentes. Itaque cùm corpora gracilia, sicca, duritie alui prædita ad medicamentorum vsum adducimus, lenientia potius quàm valdè attrahentia vsurpare debemus. Immo ea corpora præhumectare oportet eo modo quo & consulit Hippocrates in Aphorismis, loquens de vsu Elleborismi. Idèd quidam ex nostratibus Medicis sic illa corpora purgabat, vt per tres dies continuos, & bolis cassiæ tanquam alimento sumptis, & iusculis vitulinis præhumectaret ac præpararet. Quæ omnia admonita volumus, vt ignaris, aut doctis quidem, sed tritâ viâ vtentibus: & ita turpiter hallucinatis recta medendi ratio præmonstretur. Aliquid simile scriptum est ab Aëtio in sua medendi methodo. Item eadem res breuibus verbis à nobis explicatur huius libri initio.

Tertium à nobis erat institutum de iis qui febricitant insigniter satis, sed non valdè sitiunt, & leuibus momentis exhorrescunt, in quibus non est æquum vsum magnorum remedium accelerare, præsertim cælo paulò frigidior. Innumeros vidimus hyeme tepidiore febricitantes eo modo quo descriptum à nobis est, quibus Medici præproperè vulgatam nimium med-

Tom. I.

Bbb

Lib. de
aere &
aquis.

Aphor.

Cap. 4.
Tetrabil.
3. serm. 1.
§. ca. 13.
eiusd.
Tetrabil.
§. serm.
eiusd.

dendi viam sequentes, & sectionem & purgationem adhibentes illos Hippocratis aphorismos Hippocr. *In principis morborum si quid videtur mouendum, moue.* Item, *In acutis passionibus raro, & id initio, &c.* Item, *In his tardare, malum.* Nam alius aphorismus, *Cocta medicari ac mouere, non cruda, modo non turgent, nec in principis, &c.* Hic (inquam) aphorismus est multo generalior eo quo nituntur, *In principis morborum si quid mouendum, moue.* Etenim per comparisonem tantum loquitur, conferens principium & augmentum cum aliis temporibus, in quibus ab opere desistendum suadet. Sed cum vetat mouere ea quæ cruda sunt, cauet ne remediis nostris agitemus frustra ægros quod ludatur opera. Et cum vult non morandum esse, sed statim aliquid molendum de acutis morbis agit. Dicimus autem in acutis reuerâ non esse procrastinandum, sed statim molendum aliquid: non idem est iudicium de iis qui parem acutiem non habent. Et reuerâ in vtrisque ecceprotica dare sufficit, non scilicet moniata eradicantia medicamenta, in quo grauius peccatur. Et reuerâ quibus blando medicamento initio consultum est, si melius habuerunt, progressoque morbo sine strophis plus vno medicamentulo exercuerunt, quam valido medicamento initio. Et ausim hoc affirmare plerisque vsu eiusmodi medicamentorum dum frustra conamur initio materiam euellere, excreuisse tantum multam serositatem quæ morbum contumacior reddidit, & nil profuit. Et maxime in eo errant Medici quod aphorismum istum, *Si quid videtur mouendum, &c.* & *Tardare malum,* æquè æstate & hyeme & autumnio vsurpant. Potius audire debent illud, *Plurima non turgent,* vt non ita ad medicationes festinent, & sectionem venæ. Et reuerâ sectione venæ ita cito celebrata in morbis non acutis, laudabilis tantum sanguis educitur cum magna virium iactura. Sic melius esset leniens medicamentum bis exhibere, & sectionem differre. Sed hæc satis per se manifesta sunt, & tamen plerisque latent veteri mendendi methodo addictos. Etenim nemo dubitat hyeme & autumnio contumaciores esse humores, & minus fluxiles quam æstate, aut verno tempore, præsertim sub finem. Et ita frustra temerè que fortibus medicationibus diuexantur ægri. Signa porro duo adiunximus febribus hybernis, in satis ingenti febre non magnam sitim, & frequentem frigoris sensationem, & rigorem.

res. ⁸ Quæ duo posteriora non tam sunt à motu humorum, quàm quia conclusus calor est intus in venis insidens multò maior quàm seforis proferat: idèò reuocatio fit spirituum & sanguinis. Itaque nimium externi frigoris appulsum facillè percipiunt, & ita leuiter exhorrescunt. Accedit & humoris qui tunc in vitio est contumacia. Nam retinens de natura hyemis est partim biliosus, partim pituitosus; vt mirum non sit si istam inæqualitatem inducat.

ANNOTATIONES.

1. Aliud est coctum & mitificatum, aliud crudum & incoctum. Nam si quæ coctionem admittunt, in familiaremque naturam suam conuertuntur: tã à natura non item, sed tantum mitificantur.

2. E-^h Hippocr. dicuntur effati, turgiduli, & excocti. Et Hippocr. quod notandum est, notat quandam constitutionem temporis, in qua febres desinebant statim, sed reuertebantur, & egriuerant à natura, à natura, à natura excocti.

3. Questio præclara est: An facultatis animalis ratio sit habenda in morbis: Et an verum quod Galenus ait; Nil tentandum in vigore morborum, cum facultas animalis sit infirma, an ea infirmitas sit estimanda. Non ceritè quoad motum, nil attinet enim moueri, sed quoad sensum. Vnde videmus obstupescit sensibus motus naturales fieri symptomatizantes; Magna enim facultatum inter se consensio est.

4. Somnus per se stupefacit, corpus torpidum reddit ac graue: meatus obscurit, vt præclare Hippocrates lib. de flatibus docet: multò magis id præstat si præter naturam inducatur. Maximè autem usum somniferorum verebimur in iis quibus frigidius cerebrum, quamuis vigilant; quia facile vires exerit in cerebrum res somnifera.

5. Ego obseruaui in operibus artis, medicamentum etiam blandum horis pomeridianis tribus à prandio exhibitum magnum habere effectum. Hinc discere possumus in his quibus alius admodum astricta est exusu esse si quatuor horis à prandio exhibeamus pharmacum.

6. Tamen Hippocrates lib. de Locis in homine, tutius macilentos purgat quàm crassos.

7. Præsertim nisi sit explicatus pulsus, aut ceritè scias à sanguinis copia obrutum pulsum, non à copia humorum in mesario contentorum.

8. Galenus com. in part. 26. sect. 3. lib. 6. Epid. scribit omnes cacochymos cum repente calsiunt inhorrescere.

CONSILIVM LXVI.

De fluore vterino. Pro illustri Domina de Marchaumont.

ANTE disputatum est de profluuiio ab vtero, cuius var
cause, & species ab Hippocrate explicantur in libris
morbis mulier. vt antè dictum est. Hic remedia prescribun
tur quibus fluor quidam vterinus in illustri Domina oppugn
tus fuit, sed non victus, qui illi ardorem summum & dolores
in lumbis excitabat: vt iis mulieribus contingit quæ ita affectæ
sunt.

℞ rad. petrosel. fœnicul. cort. cappar. an. ℥ ij. polyp. rad. plantag.
℥ j. chamadr. & capill. an. m. i. buglos. beton. scariol. agrimon. an. m. j.
(sem. melon. cucum. bardane, vrtice, pipinel. milij solis an. ℥ ss. sem. p
phani ℥ ij. summitat. malua, veronica, vrtice, herniaria an. m. j. p
glyc. ana ℥ ss. mercurial. m. ij. fiat decoct. In colat. ad lib. dissol. sacchar
albi lib. j. express. ℥ ij. rhab. & ℥ j. agar. infus. in parte decoct.

℞ succorum pomor. de curtip. buglos. meliss. borag. an. ℥ ij. decoct
passul. glyc. thamarind. florum violar. lib. s. inf. fol. sena ℥ ij. agar. ℥ j.
sacch. lib. j. fiat syrupus coctus. Dosis ℥ ij. ex decoct. semin. act
portulacæ, melon. florum nenuph.

Ob istum ardorem hoc fuit institutum.

℞ unguenti refriger. ℥ ij. pro litu renum. ℞ medull. crurum cervi ℥ j.
Lauetur pluries in aqua ros. adde ol. ros. ℥ j. mastich. ℥ ij. fiat litu p
spina dorsi.

Ingressa est balneum, & mastiche cum oleo absynth. & cera stomacho q
plicata est.

℞ faucium lucij, coralli rub. an. ℥ ij. cornu cervi vsti, margar. elect
carab. an. ℥ j. tartari vini albi prepar. ℥ j. sacchari ros. quod suff. p
pulis, cuius capiat duo cochlearia cum decoct. absynth.

℞ electuarij diatrag. frig. ℥ j. glycyrrh. ℥ ij. terra sigil. lota ap
ros. ℥ j. 4 semin. frigid. maior. & seminis papaneris albi an. ℥ j. p
pulis, vtatur cum syrupo violato.

℞ pulpa sem. melon. cucurb. citrul. amygdalarum dulcium an. ℥ j.
terantur, & fiat emulsio cum decoct. rad. gram. asparagi, glycyrr. addit
do sacchari ℥ j.

Et cum illi lien obdurasset, hoc quod sequitur est institutum.

℞ gummi pini, cera noua, an. ℥ ij. picis naualis & resina an. ℥ j. sulphuris vini ℥ ij. dissolu. in aceto forti: omnia extende super alutam pro regione lienis.

Fotus astringens.

℞ aqua fabrorum lib. s. malicor. balauft. nucis cupr. & berberis an. ℥ j. fiat decoct. in colat. dissol. sangu. dracon. thuris an. ℥ i.

Eidem cum menstrua non fluere olim quæ sequuntur præscripta fuerunt.

℞. rub. maioris, fœnic. petroscl. asparagi, rad. capp. polypod. cort. ra. mar. an. ℥ s. rad. bistor. ℥ ij. agripal. calaminib. an. m. s. omnium capil. an. p. ij. meliss. hyssopi, agrimon. scariol. an. m. j. semin. anisi, endiuia, cucut. an. ℥ ij. florum card. anthos, genest. an. p. j. fiat decoct. ad lib. In colat. dissol. syrup. de arth. ℥ ij. diarrhod. abbat. ℥ ij. fiat apozema.

℞ ceierach. pulueris, rasura eboris, cornu cerui, cara, an. ℥ j. cinam. gr. ij. puluer. electuarij diacub. ℥ s. ossis de corde cerui, margar. elect. puluer. diarrhod. aromat. ros. an. gr. viij. cum saccharo in aqu. buglosæ soluto. Fiat electuarium per tabellas. Deinde fiat fotus ex decoct. herbarum vterinarum, rad. apij, cypp. calami aromat. rad. fœnic. apij, rub. maior. valeriana, artemisia, nepet. pulegij, calament. bistorta, dictamni.

℞ trochiscor. de myrrha ℥ s. iniectionum in carbones fumus excipiat.

℞ succor. arthemis. hyss. agripal. herba cati. an. quart. j. saccha. quod sufficit. fiat syrupus: capiat ℥ j. s. cum ℥ ij decoct. lupulorum, arthemisia & cinamomi.

℞ ladanij ℥ ij. benioin ℥ j. s. caryophyll. ℥ ij. cum oleo de ben. Fiat suffusus concinnatis trochiscis.

In acerbis dolore vmbilici, & partium vicinarum.

℞ emplastri de mucag. unguent. dialib. gummi ammoniaci in aqua vite soluti an. ℥ j. sagap. opop. an. ℥ ij. rad. aristoloch. ireos, an. ℥ ij. s. cum terebinth. Fiat emplastrum. factus sacculus ex ℥ ij. s. radic. alihee, origan. calament. arth. thymo, bis mal. seminib. lini & fœnugr.

℞ prædicti decoct. lib. j. in qua dissol. confect. de baccis an. ℥ s. olei rut. & anet. an. ℥ j. s. mithridat. ℥ ij. s. fiat clyster.

℞ syrup. de arthem. ℥ j. s. decoct. ruta, aristoloch. & dictamni ℥ ij. ℞ trochisc. de myrrh. ℥ ij. castorei ℥ j. pulu. aristolochie rotund. ℥ j. agar. trochisc. ℥ ij. salis gemma ℥ ij. croci ℥ j. cum syrupo de arthem. Fiat massa.

Et cum quereretur quod non conciperet, hoc præscriptum est.

Bbb iij

382 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞ succorum calaminthe, nepete, agripalm. arthemif. scolop. mat.
an. ℥ iij. decoctionis sequ. lib. j.

℞ rad. bistort. eryng. aristoloch. an. ℥ s. pulegij, thymi, epithy. an. ℥ s. anisi, fœniculi an. ℥ ij. lingue auis p. ij. rub. maior. ℥ s. matric.
leporis, coagul. eiusdem ℥ ij. Fiat decoct. in lib. s. succorum pomorum,
lib. j. aque arthemif. & lib. s. aque marian. Coletur totum, & bullat
donec redeat ad lib. j.

℞ prædictam lib. prædictos succos, in quibus maceretur nodulus
radicis bistortæ, & ℥ iij aristoloch. & myrrh. ℥ j. croci scr. j. sacchari
buglos. lib. j. fiat syrupus coctus: capiat manè ℥ j. s. cum decoct. arthemif.

℞ puluer. matricis leporis in furno siccata, rad. aristoloch. an. ℥ s.
seta intinct in kermes margarit. elect. an. ℥ j. carab. ℥ j. sacch. buglos.
℥ ij. s. Capiat quotidie cochlear unum cum decocto puleg. & pass.

℞ ros. rubr. ℥ ij. myrrh. mastich. an. ℥ j. myrril. sang. drac. an. ℥ s.
styr. calami ℥ s. ladanij ℥ ij. ambre gris. moschi, ligni aloes an. ℥ s. fiat
trochisci pond. ℥ j. excipiatur fumus manè.

℞ olibani & myrrh. an. ℥ s. ladan. benioin an. ℥ j. sem. carui, dani
cumin. & pastinacæ, agrest. an. ℥ j. folior. orig. sicci ℥ j. fiat puluis
cum terebinth. & floribus lauendula fiant trochisci: utatur in sella per
forata.

CONSILIVM LXVII.

De febre hectica..

IACOB Carpent naturâ biliosus, & præcalidis visceribus
præditus, post purulentas vrinas in febrem hecticam inci-
dit intestinis vlceratis. Tandem aluus liquidis excrementis flu-
xit facultate hepatis & œconomiâ iam iam labascente & labo-
factatâ. Verumque illud in eo compertum est quod ab Hip-
pocrate dictum est; Si ex aluo tenuia, egro minimè sentiente, cum
tamen liberè ratiocinetur, malum ut hepatico. De cuius aphorismi
veritate antè dictum est. Nam summam paupertatem caloris
naturalis, casumque facultatis in hepate sitæ significat. Ventum
est ad lac asinæ: & cum nihilum proficeretur, infirmitatisque
& virium lapsus maiora ederentur argumenta, destillato in-
staurante ei consultum est.

℞ turtures num. 3. pedes vituli & agni iuuenis vel capreolorum an.

num. 4. hepata gallinarum & capi iuuenis an. 6. num. pellicularum stomachi gallinarum 3 j. berberis conditi, granorum granatorum an. 3 ij. carnes quatuor myrobol. emblic. carnosar. pinearum pistacearum an. 3 ij. iniub. sebest. an. num. 20. testud. nemo. tres, conser. rosar. symph. an. 3 ij. micam panis albi macerati in decocto capi iuuenis, decoctionis duorum pulorum & carn. vitullin. alterator. cum seminib. frigidis, & papan. & hordei lib. ij. fiat omnium d. stillatio in alambico.

℞ rosar. rubr. malabath. an. p. ij. scabios. & rad. dictam. an. p. s. rad. cyp. cal. aromat. scænarth. an. 3 j. s. ligni aloes & cedri an. 3 ij. Fiat decoct. in vino albo & aqu. rosar. In colat. ad lib. j. dissolu. pulu. diamar. margar. frig. 3 ij. theriac. & mithrid. an. 3 j. s. fiat epith. pro corde.

CONSILIVM LXVIII.

De Gonorrhœa virulenta.

NOBILIS mulier à marito inita, qui cum prostibulo impuro concubuerat, inquinatur: hinc gonorrhœa virulenta male fluorem muliebrem representans. Quæ excernuntur cum virore pallescunt. Iam fluxus ille per annos persecutionem illam à variis morbis vindicans. Tamen propter contagionem massæque sanguinis labem valetudinaria est; quoniam, credo, non satis largiter virulentus ille humor decurrit. Menses planè subsistunt. Atque hinc illincque metus ingruit quidam. Nam si supprimatur illud *periculosum* & virulentum, perniciem consequetur, sin fluat tametsi suo exitu commoditatem affert, tamen in maciem ita laborantem coniiciet. Quod plerisque vsu venit; siquidem non potest non afficere partes per quas traducitur, ineunte vere quo præsertim tempore omnia repuerascunt, summam in renibus grauitatem sentit. Deicitur appetentia: languet: munia non obit sua. Dolores in ventre excitantur toto. Quo medicamento exrheo & syrupo laxat. sæpè adiuta fuerat, eodem occurritur: malum recrudescit. Tandem diu noctuque ita vexatur vt ferendo non sit. Pulsus languidus & sepultus: facultatum omnium ferè concussio, ac maximè vitalis. Sursum deorsum fertur materia. Quæritur quid sit opus. Sensim atque sensim crescunt dolores pungentes & ferientes, diuellentésque membranas. Dolor turgens est, & qualem Ga-

384 CONSILIORVM MEDICINALIVM
lenus describit in lib. 3. de locis aff. id est, in partibus quibus
dam sentitur dolor veluti à remota alia parte velut radice do-
uatus; quod notandum est, falsò credunt colicum esse dolor
propterea quæ, vt ferè fit, liberales nos esse debere in vsu re-
calidarum: immò tali vsu ægrescebat magis: In eam sententia
ventum est, vt crederemus in prouocando illo fluore incun-
bendum esse, alioqui frustrà operam daturus. Atque ita pro-
sum est. Primum is clyster iniectus.

*℞ malua, bismal. arthemisia an. m. j. sem. pæonia rubentis ℥ j. j.
palm. e. p. j. rad. petrosel. asparagi an. ℥ j. sem. lini, fœnugr. an. ℥ j. j.
decoct. In colat. dissol. terebinth. ℥ ij. sacchar. rub. ℥ j. olei lilior. & ℥ j. j.
mamel. an. ℥ j. s. vitellos ouorum duorum. fiat clyster.*

Eodem die excitatus vomitus materiei virulentæ, & eius quæ
olim per inferiora ferebatur. Non à ventriculo erat, sed ab
cinore & regione renum, vt coniecturis deprehendebatur.
Quæstio, an esset sistendus, an iuuandus: Non placuit
ne materiam quæ per inferiora moueri deberet, aliorum re-
uelleremus. Vrgentibus doloribus coacti sumus adhibere be-
neum, vti succo amygdalar. dulc. cum vino hippocrat. Ceteri
bant statim dolores: è balneo egressæ redibant. Secta vena
maleolo adhibiti pessi ex hiera diacolocynt. puluere hieræ
& galyopsi. addita styrace liquida: & inuoluti sunt santalo. De
inde pilulis de hiera cum agarico & rheo consultum est. Tan-
dem repetiti clysteres primo similes. Et præscriptus bolus
quens post balnea:

℞ terebinth. veneta ℥ ij. rheib. ℥ j. cum syrup. capil. ven. capil.

Secta vena in brachio ob turgentem in lumbis dolor
Applicatæ cruribus cucurbitulæ. Tandem ad decoctum santali
parillæ ventum est ad proliciendos sudores. Prouocati sunt
atque ij admodum foetentes. Vt cunque conualuit.

CONSILIVM LXIX.

De febre erratica.

PVER annos natus nouem, præcalidis visceribus, & capite
satis amplo, cum olim satis imbecillus & valetudinarius
iam paulò grandior factus, certis quibusdam interuallis accen-

fionem habet febrilem cum atroce capitis dolore. Derepentē
 & incogitatōprehendit dolor capitis, deinde febris vehemen-
 tissima cum oculorum rubore & genarum, ac si ynocho pre-
 henderetur. Accessio est duodecim ferē horarum, aliquando
 multō minor, & sudore finitur: Tum alacer existit. Quæritur
 quæ causa huius febris quinquies sexiesve in anno repetentis:
 & quid tandem sit euenturum inde. Non est dubium quin ex
 Galeno, periodo reduces febres & dispositionem partis, & ma-
 teriam habeant causam sui. Quænam dispositio, an in cerebro,
 an in hepate, an in mesenterio? Fortē in cerebro est, vnde dici-
 mus quasdam esse febres partium proprias, vt hepaticas febres,
 lienotas, cuiusmodi febres virginum foedis coloribus laboran-
 tium, alias cephalicas, quæ non modō symptomaticæ dicen-
 tur, sed & essentielles. Sic collectæ in cerebro materiæ motu,
 siue putredine (quæ non ita facilē acquiritur in cerebro vt in
 ventre inferiore) febris excitari potest, quæ discussione mate-
 riæ facilē euanesceat. Et quod magis mirum, hæmitriteæ febres
 tabificæ dicuntur, ac si peculiariter affectionem pulmonum se-
 querentur, quod Galeno in Epidemiis placuisse videtur. Et
 ego legi siue apud Galenum, siue apud alium nescio quem au-
 torem, septenas febres, id est quæ septimo quoque die, & quin-
 tanas quæ quinto quoque die repetunt, tabidorum proprias ef-
 se, ac si peculiarem collectionem humoris in pulmone contenti
 sequerentur: & tamen essentielles febres dicuntur. Si in isto
 puello materia in mesenterio coercita, sed mota, & non exclu-
 sa, tam tetrum capitis dolorem excitans, febrem facit; cur non
 plurium horarum aut dierum? cur non putret? Si putris, cur pu-
 tredinis notas non edit? & tamen vrinæ sunt admodum tenues
 & aqueæ, quas in pueris damnat Hippocrates. Si putris, cur
 non promittit producitque febrem? Nec enim diaria esse vide-
 tur, cum huius non sit proprium tam sæuum symptoma indu-
 cere, & tantam in vrinis mutationem asferre. Mihi videbatur
 febris à liene esse, quod Hippocrates obseruauerit in feбри-
 bus erraticis vrinas tenues esse splenicæ: & etiam sæpè sinetu-
 more perspicuo dolet illi regio lienis: quod declarat in eo esse
 imbecillitatem & circum partem illam melancholici humoris
 denatura biliosi retinentis collectionem, à qua efferuntur va-
 pores non maligni quidem (vnde enim tanta malignitas in pue-
 ro) sed veluti flatulenti qui dolorem acerbum efferunt: qui si

Tom. I.

Ccc

*Gal. sub
 fin. lib. 2.
 de diff. feb.
 febr.*

*Et Hip-
 pocratis
 part. 9.
 sect. 2. lib.
 1. Epid.
 Quin-
 ta-
 na febris
 & an-
 ta-
 bificæ
 & tabi-
 dis suis
 adfuns.*

*Lib. 3.
 Prognost.*

In Cons.

in cor reperent, palmum cordis afferrent, si in ventriculos cerebri aliquid epilepticum: sed per inanes meandros feruntur, unde dolor tantum capitis excitatur. Et reverà tenuitas vrinarum, error febris, taciturnitas pueri, dolor ad sinistram hypochondrium surgens, splenicum quid significant. Accedit & prima educatio. Nam & mater, & nutrix magnis molestiis in gestationis & lactationis tempore captæ fuerunt. At ex Hippocrate qualia gestationis tempore patitur mater, talia infans: & idem de nutrice. Aduasio enim quædam facta est humorum. Id iuuat plurimum hepatis calida intemperies, quæ succos exurit. Quod si aut maior copia foret materiæ, aut à pituita non superaretur; aut si putredinem acquireret maiorem, cum leue tantum rudimentum esse videatur, maior quoque febris sequeretur: Et nisi provideatur, verèdum ne aut quartanarius, aut epilepticus per consensum fiat, aut successu temporis per propriam cerebri affectionem. Et illum humorem verum putredinis characterem non habentem natura secernere nititur, sed non excludit tamen. Ac verendum ne illud tandem contingat quod in Prorrhethico ab Hippocrate dictum est: *Cui circa lumbos dolores sine appetitus amissione voluntur ac renoluuntur, iis si dolor adaugetur atque intenditur cum febre & cibi fastidio, convulsus aliquid fit*: supp. per translationem materiæ quæ diu in ventre inferiore cunctata malignitatem acquisiuit; cuius ratione in cerebro epileptica symptomata est excitatura: Ac tandem tempus ipsum nobis aperiet quid futurum sit. Tamen dum id expectatur, non erit alienum & toti corpori, & partibus quibusdam consulere: ac toti quidem corpori sequenti decocto.

℞ lupulor. & florum violar. an. p. j. radicum aperitiuar. an. ʒ ij. infunde folior. sene ʒ iij. cinamomi ʒ j. In express. dissol. syrup. de cicbor. simpl. ʒ ss. fiat potus.

℞ conseru. rosar. buglos. & rorismar. an. ʒ ij. theriaca ʒ ss. cum syrupo conseru. citrij. fiat opiata vtenda serò.

Item ℞ rad. enule camp. rad. bryonie an. ʒ ij. polypod. fumiter. scolopend. ceterach & maluar. an. ʒ j. florum sambuci, chamemeli, stachad. an. p. j. sem. fenugr. lini an. ʒ ss. coquant. in aqu. & vino albo. Confundantur addendo ceram. fiat in modum emplastri ex mucag. rerum prædictarum. Sed prius oportet fouere partem decocto illo.

Inter cetera verò conferet vere hoc nouo venam basilicam dextram ad vnum vasculum tundere.

CONSILIVM LXX.

De Hydrope.

PETRVS Guerardus mense octobri cum de stomachi inflatione quereretur, post curas aliquot medicamentum sumpsit. Satis laudabilem effectum præstitit. Hic vir quories in morbos incidit, à Medicis pro desperato sæpè relinquitur, adeo magnis, obscuris, incognitisque morbis impetitur. Nam hinc vires elanguent, & cum virium infirmitate magna est cacochymia, vt quod affectionis remedium est, cum virium pugnet custodia. Qualia illi contigerint, & quid consilij captum fuerit, aperiam. Inappetens ciborum erat: aut nulla, aut exigua febris. Sputa pessima. Paulò post in metaphreno tumores, & in tibiis. facies tumens: pulsus languidus, paruus, sæpè inæqualis: frequentes defectiones, quibus nisi vino occurreretur, metus esset repentini interitus. Octauo post decubitus die circa æquinoctium hybernum, & cum ecliptica lunæ affectione conuulsus est planè, ac in propinquo mortem esse putabamus. De mutatione crebra pulsus ita philosophabamur: Hoc enim contingit vel affectione propriâ cordis, vel ratione orificij ventriculi oppressi, vel contumacis in primis venis obstructionis, quæ liberum spiritibus ingressum & regressum impedit; vel pulmonum infarctorum: vel quia legitimum non suppetit alimentum cordi, pote elatis, aut paucis, aut prauis spiritibus à materia olida contenta in ventre. Nam cum à vena arteriosa suppediatur alimentum corruptum & semiustum, aut quia per arteriam venosam impeditam non liberè transfluit aër, mirum non est si magna mutatio in pulsu contingat. At maior horum pars concurrere videtur. Quod autem inæqualitas perspicua sit in multis pulsibus, & nonnunquam intercalaris intermissio, id eo modo contingere videtur quo & in Antipatro ob obstructionem laxum arteriarum: potest & propter pulmonum ipsorum infarctum prouenire, aut mollitudinem & laxitatem eorumdem, vt pote qui in costam incumbunt; quod annotauit Hippocrates. Maxime verò videtur fieri ex prauitate anathymiascos, declarauit, indicauitque curatio. Nam pro gradibus purgationis pul-

Gal. lib.
4. de loc.
aff. sup.
vlt.
Lib. de
locis in
homine.

*Lib. de
morbis.*

sus restituebatur. Et Hippocrates obseruat in affectibus pulmonum, præsertim si inflammatio sit, insignem mutationem pulsus, & animi defectionem. Quod nos animaduertimus sæpè: immò & quoties multâ pituitâ offarcti sunt pulmones, & si à capite catarrhus illabatur. Testis Petrus Dangers pictor, & vidua domini Bigand: & putant sibi animum deficere. Quod pauci animaduertentes, illud ad inanitionem reuocant, & ad repletionem confugiunt. Idem in hoc ægro videtur quod & in conualescentibus. Nam vt ex Galeno patet, ideò non proficiunt, aut quia infirmitas corporis est, aut cacochymia: vtrumque in hunc ægrum cadere videtur; nam & partium est infirmitas à praua diætâ fortè ac vitæ instituto contracta, & cacochymia subest, quod ex symptomatis potest apparere; vt mirum non sit si & ea appetat quæ ex vsu non sunt, & edendo non proficiat. Nam & ipsarum partium natia & gentilitia est imbecillitas, & multa in multis partibus cacochymia quæ impedit quominus calor naturalis quantulus est elucere queat.

*In lib. 2.
aphor.*

Quod ad tumores istos œdematosos attinet, dicimus eos trifariam contingere, aut vt in morbis longis, vnde ægros insufflatos dicimus infirmitate caloris naturalis; & hoc tantum ex euentu fit: aut tanquam morbus est, aut vt symptoma. Symptoma, vt in hydrope; idque bifariam, aut affecto hepate primariò, secundariòve, vnde verus nascitur hydrops: aut per colliquationem quandam carniū; & velut putrefactionem. Hinc Hippocr. in lib. de affect. aut de morbis, ait, hydropem, improprie dictū, fieri cū in morbis longis diu ægri impurgati manent; hinc corruptio carnis, & tumores œdematosi. Morbus autem tumor est cū alius consequens non est, sed per se & primò actionem lædit.

*2. præf.
9. p. 1.*

Cacopragia hepatis & tumoris autor est, & extenuationis. Tumoris, si in defectu sanguificationis consistat res, extenuationis autem si vitium in humore sit. Quanquam Hippocrates obseruat in morbis funestissimis contingere quandam leucophlegmatæ speciem ob malignam qualitatem & statulentiam, quod in domino le Fuzelier phthisico à nobis visum est, cui totum corpus moribundo intumuit, ac facile disparuit. Sic & à pulmonibus, & ab hepate, & à liene extenuatio & tumor potest contingere. Quod de liene annotauit Hippocrates: *Lib. 2. de mor. fac. corpus extenuatur, lien efflorescit, & contrā. vt etiam ex Hippocrate*

Galenus demonstrat. Sed in huiusmodi tumoribus solum humorem agnoscere, non autem flatum quoque admistum reputat sensui. Vnde enim fluxus & refluxus tam subitus in hydrope, ut modò intumeant pedes, ventre deturgente, aut contrà, nisi comes sit flatus earum mutationum autor? Quod de hydrope ipso demonstrat Hippocrates lib. de flatibus. Sic autem inopia erit caloris naturalis flatum discutere nequeuntis, aut dominatus caloris præter naturam, materiam phlegmaticam in ventum faciliè conuertentis. Vnde alio loco docuimus auruginosos contra sententiam Hippocratis flatuosos esse posse. Et admirabilis locus est apud Hippocratem dum rationem reddit cur in hydrope dolor non sit, cum tamen partes tumeant: in arthritide cum tantus tumor non sit, & proinde non tanta distensio (quæ ex sententia Galeni in Aphorismis doloris causa est in articulari affectu) ait autem in hydrope humorem non consistere, sed vagari, propterea quæ dolorem non inferre: contrà in arthritide & paucum esse, & consistere. Atque ut breuè absoluiam: In morbis dignoscendis videndum an sint simplices, an complicati: & rursus an sit aliquid gentilitiū, an peculiari diætæ & vitæ instituti ratione aliquid fiat. Complicati morbi sunt cum diuersæ partes confluantur, quarum ut natura diuersa, symptomata quoque sunt varia, & tamen communi naturâ conueniant, tamen specifica distinguuntur in agro complicati morbi videntur, catarrhus, tumor œdematosus, deliquia animi frequentia quæ eum valdè exercuerunt: quæ omnia ab eodem fonte manare videntur. Oedematofum tumorem appressorum digitorum manentia vestigia designant. Multis de causis (ut antè dictum est) tumor iste euenire potuit, quarum non vna in hoc agro considerata est, sed plures. Vnum tantum monere oportet, an non etiam à cerebro repetenda sit illius tumoris origo, præsertim quatenus metaphrenum intumescit. Etenim Hippocrates scribit etiam hydropis originem à cerebro repeti debere: quomodo audiendus Hippocrates in Aphorism. cum ait, *hydropem esse manix solutorium*, quod sit translata à corpore cerebri vi motuque naturæ materia in partes subiectas.

Quicquid sit in affectuum complicatione, difficile tenetur pars primaria affectus causa, quod sæpè à capite in partes superiores, sæpè ab his in illas fiat defluxio, sæpè proprii humoris generatio per corruptionem propriam ob partis diathesim ma-

*Lib. de
locis in
hominis.*

*Com. in
apho. 49.
lib. 6.*

*Lib. 4
loc. in hos*

*Aphor. 5
lib.*

390 COONSIRLIVM MEDICINALIVM

lam. Quæ omnia morborum difficilem cognitionem reddunt. In hoc ægro eadem ratio habenda quæ & ædium ruinofarum, vt pro gradibus purgationis in instaurando per epicrasin corpore operam demus.

Ad educationem putris materiæ quæ pulmonibus tenaciter adhæret, ex vsu erunt thoracici linctus ex decocto rad. ari, petrosel. glycyrr. eryng. ireos hyssop. bipinel. sem. bombacis cum syrupo capill. ven. oxymelite, & syrupo de hyssopo.

Cordi applicatum est emplastrum ex confer. buglos. borag. confect. Alkermes, mithrid. theriaca, puluere malabathri, & meliss.

Ventriculo fatus ex his quæ vim haberent roborandi, & coquendi. Ad hepar oxyrrhodinum ex oleo absynth. & rosarum, cum ceroto fantalino. Deinde institutus syrupus hic:

℞. omnium herbar. capillarium an. m. j. seminis carth. ℥ j. vngula cabal. m. ij. radicum omn. aperitiuar. in vino albo maceratar. an. ℥ j. ireos floren. & eryngiorum an. ℥ ss. buglos. cichorij. pimpin. scolopen. polypodij. an. m. j. fiat decoct. ad lib. j. addendo cicerum rubr. & flor. violar. an. p. ij. in qua infunde rheib. ℥ ij. santal. citr. & cinnam. an. ℥ j. s. fiat syrupus coctus cum lib. j. sacch. & ℥ ij. syrup. rosar. palid.

Item ℞. agar. trochisc. ℥ ij. rheib. ℥ j. s. pulu. hiera ℥ ij. massa pilul. assaiereth & sine quibus an. ℥ j. cum succo absynth. fiat massa pilul. vtenda vt dicetur.

Deinde opiata sunt instituta, & condita, quibus utebatur, superbibendo parum vini albi odoriferi, aut vini hippocrat.

ANNOTATIONES.

1. Hippocrates obseruat quod qui purgati non sunt in morbis, per succrescentem cacochymiam in hydropem incidunt. An verò cocochymia hydropis causat? Ita herclè. Ita enim Galenus explicans illud Hippocratis, quod tempore pestifero quidam in hydropem inciderint, hydrops ex abundantia prauorum succorum quosdam inuasit. Comm. in part. 15. sect. 3. lib. 3. Epid.

2. Et hæc sunt argumenta Hippocr. lib. de flatibus. Humor enim nisi comitem flatum habeat, id non potest efficere.

3. Mirum non est si hydrops in hoc ægro ferè inexpugnabilis fuerit. Etenim verum illud est quod à Celso scribitur cap. 21. lib. 3. Hydrops sæpè per se incipit, sæpè alteri vetusto morbo, maximè que quartana superue-

nit, facilius in seruis quàm in liberis tollitur: quia cùm desideret famem, sitim, mille alia tedia, longamque patientiam, promptius his succurritur qui facile coguntur, quàm quibus inutilis libertas est.

CONSILIVM LXXI.

De febre maligna.

IOANNES Cheuarry post labores aliquot, cursus, equitationes & comestationes, cœpit lassitudine tentari tensuâ: febris continua, lingua prætubra, sitis inexhausta, omnium ferè partium ^{ἀδυναμία} sine causa manifesta, vrinæ laudabiles nimium: ecchymata tandem paruerunt: roborato ore ventriculi & corde, euacuatâ multâ bile olidâ restitutus est. Morbus à quadam erat colliquatione, quod declararunt dolores in faucibus tam internis quàm externis (vt sic loquar) Item deiectiones tenues & liquidæ, quas Hippocrat. ^{ὕδατι χυλῶν} vocat in Epidemiis, Nam quod in bile tenui⁹ erat excernebatur, crassior pars remanebat. In partibus imis erat phlogosis, cuius occasione constitimus in blandis medicamentis, iisque lenibus & humectantibus, cum ratione summæ infirmitatis, quæ præter rationem aderat, vix ac ne vix sectionem venæ aggredi auderemus. Ac reuerâ non est aucter tentanda, sed parcè & cum meditatione. Nec nos mouit quod in acutis mouere oporteat, cùm hoc præsertim de iis audiendum sit in quibus orgasmus est: in hoc autem agro omnia videbantur mitia & tranquilla, sed latentis putredinis aut malignitatis erat suspicio. Accedit quod hyeme febris ista orta esset, in qua humores quodammodo ^{ἐλεγχματῶν} febris erat laboriosa, non eâ tantum ratione, quia labores, corporisque motiones præcessissent, sed ob lassitudinis sensum ob copiam humorum viscosorum febrem committentium, vt in Epidemiis explicat Galenus.

Et vt Hippocrates sub finem prioris Prorrhæ. sect. 1. duplicem facit phrenitim, vnam manifestam, alteram occultam: occultam quidem, in qua signa manifesta non apparent, sed tabes quædam mala impressa manet in cerebro; ita duplex est febris, vna manifesta, quæ se pulsu & vrinis manifestè prodit, occulta quæ neutro sese manifestat. Hæc deterior est, quoniam & Me-

Com. in
part. 3.
sect. 4.
lib. 6. E.
pid.

392 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**

dicos sæpè fugit. Huius generis est febris quæ agrum diuexat. iactationes sunt, αλυσοὶ τὰν πύθεις ἢ αἰέμετοι, κόποι, vrinæ tenues, sed flammæ; pulsus frequens, sed remissus, & quasi compressus, sed analogus interno incendio. Ingens sitis, dolor gutturis & faucium, qualem antè in malis temporum constitutionibus obseruari obseruauimus, & per modum colliquationis; impotentia & infirmitas maxima sine causa manifesta: deinde eruptio ec- thymaton.

In facultate naturali sitis, fastidium sine magno calore qui foris appareret, vrinæ tenues. In animali impotentia maxima, & ad motum pigris & tarditas. In vitali, pulsus remissio. In- differentia, ecchymata, iactationes & αλυσοὶ, lassitudines, dolo- res gutturis.

Impotentia ista terrori fuit, quia in febre mediocri corpus ita impotens esse præter rationem, malum; nam nulla est reuera, quod declarat vel intemperiem partis principis, vel copiam materiæ grauantis, vel obsidionem cordis à maligno, vt ex Ga- leno videri potest.

Com. in
part. 5.
lib. 2.
Prorrh.
Lib. de
aere &
loc.
& Acut.
in Epid.

Sic in egro isto febris laboriosa erat, & idem ei contingebat quod & in sicca ophthalmia, in qua quod est tenuissimum ex- cernitur, crassius verò manet; aut vt in angina sicca eidem Hip- pocr. Vrinae erant tenues, sed erant boni coloris, quod si ad re- nuitatem malus aliquis color accessisset, pessimæ essent, vt do- ctè in histor. de Clazomenio obseruat Hippocrat. & post eum Galenus.

Ecchymata apparuerunt vt in Sileno, sed potius fuerunt pa- pulæ rubræ & tenues, aut maculæ ob ingentem phlogosim quæ ex materia coercita anathymiasim tetram educebat ac suscita- bat. In ista imbecillitate non voluimus dare hypnotica, nena- turam pigram magis redderemus. Iuuimus agrum vsu acidorū, & eorum quæ contra malignam vim pugnarent. Sanguinis de- tractioni pepercimus, nec abs re. Quoties enim ingentis cuius- dam ariditatis in partibus imis suspicio est, & argumenta, nec- non obsidio facultatum, & ἀδυναμία, zudax ne esto in secunda vena: aut si secare consilium est propter phlogosim, parcissimè id manu faciendum est; alioqui in magnum discrimē vitæ agri coniciēs. Quod & in ripa Celestinorum in vxore cuiusdam cinerum venditoris obseruauimus, quam febris maligna occu- pabat; sensim enim naturæ motu, qui tamen symptomaticus vide-

videbatur, euacuata foeda materiâ, mox aqueâ, mox paulò crassiore & biliosiore: item confirmatis corde & ventriculo, & vsu epithematon temperatiore reddito calore per Dei immortalis gratiam primæ eam restituiamus sanitati, cum tamen multa lethifera signa apparuissent.

In tonfore Caroli successore, cum laboraret ferè eadem febre, immò horrida esset, id est in continuitate quoddam ex interuallis horrores, obseruauimus aliquando frequenti venæ sectioni locum esse, aliquando eandem repetitam plurimum obesse. Prodest quidem cum iactationes & ἀλυσμοί καὶ ὄσσει, non tam sunt à maligno, quàm à calore impensè aucto, & à caco-chymi sanguinis copia: cuius argumenta sunt rigores aut horrores, qui non tam sunt per caloris affectionem, aut eius absentiam, quàm putrentis humoris membranæ & partibus spermaticis sentientibus molesti prouentum. Nam postquam horruerunt, statim incallescunt, deinde rigescunt. Galenus autem in Epidem. scribit illud vsuuenire vt quoties humores corrupti incalescant, leues horrores inducant. Quod cum euenit, audaciùs sectio venæ tentari debet, non vt quid semel fiat (quia in humorum prauorum prouentu rarò vires sufficiunt) sed iteratò. Atque huic tonfiori multa sectione venæ occurrimus, vt insigniter sauientem febrem confoderemus ac iugularemus. Sed cum horrores qui adsunt materiæ ἀνώμαλων καὶ τῶ ἐπὶ τοῦ σπλῆνος significant, aut cum verè periodici sunt, aut symptomatice, caue ne hinc secandæ venæ occasionem quæras. Item cum iactationes & ὄσσεια oris ventriculi καὶ ἐν τῷ σπλῆνι sequuntur, cunctantiùs timidiùsque sectionem venæ aggredieris. Ideò aliquando est vbi potius febris ratio habenda, quàm causæ febrim committentis in caco-chymia consistentis. Est vbi etiam potior ratio habenda causæ ipsius quàm febris. Quamquam purgatio febris causam potius respicit, quàm febrem ipsam: sectio venæ & febrem & causam.

Tom. I.

Ddd

CONSILIVM LXXII.

De febre maligna.

STABVLARIVS in vico dela Mortellerie à castris rediens, bene quidem habebat. Militiæ morbo detentus erat: & nos eum à pulmonis inflammatione vindicaueramus. Corpore erat squalido, visceribus admodum intemperatis. Vino meraco apprime delectabatur. Circa vespertum cum leuiter febriret, indulgit tamen genio. Circa quartam nocturnam febre adeo insigni prehensus est, præcedente horrore, ut animam agere videretur. Pulsus insigniter elatus, magnus, validus, frequens: ingens in præcordiis æstus, hypochondriorum murmur obaudiebatur, mox contrahebantur: frequens magnaue respiratio, oppressio, iactationes, vrine flammæ, aluus nigra reddebat, vomituriebat: per quatuor horas viguit febris: sensim declinavit. De utroque latere queritur ac si pleuriticus foret. Percipiebatur raptus humorum sursum. Febris erat plena iactatione: lingua scabra. Intumescebant sensim hypochondria. Tertia nocturna cum *cecyntus* effectus fuisset, & extima alfissent, moritur. Cadaver intumuit adeo ut semidoliolum referret. Rubentibus, nigricantibusque maculis obscuratur. Malignus erat morbus. Et de eo Galenus videtur agere in Epidem. dum obseruat contingere in febribus malignissimis & acutissimis, ut initio incendiij febrilis summa sint omnia: magna & frequens respiratio, in toto corpore fusio, perceptioque caloris contra naturam, eiusque acerrimi. Sed paulo post deferuent partes, defæuitque febris, adeo ut ea nulla restare videatur. Ager *cecyntus* fit, quoniam cum summus esset adeo calor, ut nullus eo maior extaret, digeritur prauè feruefactis omnino humoribus, & spiritibus exustis retostisque, ut remaneat tantum paucus ac exiguus calor natiuus. Eique quantulus est, exigua, breuisque spiritus ductio sufficit. Atque calor iste natiuus prius extinguatur, quam noua denuo accessio febrilis surgere queat.

ANNOTATIONES.

I. Quod huic agro contigit vt morituro aluus inflaretur, & corpus inflaretur, & corpus obfereretur maculis. Idem Nicolai filio enenit lib. 7 Epid.

CONSILIUM LXXIII.

De Conuulsione, & complicatis vteri affectibus.

Vxor Ioannis Tancré Equitis Regij filium suum primogenitum peperit. Hic exuccus aridusque emissus est: sed tamen quæ aqua cum foetu effluere debuit, ea obstetricum & clinicarum mulierum testimonio sensim atque sensim effluxit. ^{diuina} fuit adeò vt crederent vtero vim aliquam illatam esse. Toto tempore decubitus aluo fuit admodum obstricta, & iam dolores aliquos in ventre sentiebat. Indita sunt enemata, & medicamenta satis valida præscripta sunt. Aluus inde non multum subducitur. Præterito tempore decubitus cum iam sibi ad munia prima redeundum putaret, & lac artificio suppressum esset, quòd eam lactare coniunx nollet, circum vmbilicum ad eoque inum ventrem dolores oriuntur. Enemata induntur valida, & potiones. Indurescit inde aluus magis, minusque cedit remediis. Dolores inualescunt. Ad mulierum consilium res redit. Tunc & fouere, & vterinum affectum causari, immittere in balneum, medicorum consilium tanquam eius rei ignarorum reiicere, condemnare. Terebinthinam cum stupis applicare, & sexcenta alia vsurpare remedia, frequentes clysteres indere ex carminatiuis & anodynis. Incredibile dictu quanta fuerit vsurpatorum remediorum sylua. Et prout quæque mulier erudita videbatur, ita eius remedia probata sunt. Aliæ quæ vteri reponendi artem profitentur, & manu, & igne, & cucurbitulis multamoliuntur. Nil proficitur, ægrescit medendo humores vsu istorum remediorum impensè calidorum funduntur, ichorosi & saniofi fiunt, ferociunt, acuiunturque nil tale cogitantibus. In ista humorum conculcatione & agitatione, cum tamen propter astrictiorem aluum exitu supernè infernèque prohiberentur,

D d d ij

390 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ægram conuulsiones epilepticæ veræ adoriuntur, intra horas duodecim octies aut nouies conuellitur, omniâque terrore & stupore plena sunt. Ad diuinitatem istud referunt, propterea quæ nil ampliùs reliquum esse præsidij autumant. Cessante conuulsione epilepticâ *ἐπαινος* tamen manebat. Lingua exerebatur semipedis longitudine. Intumuerat, fauciabatur, ac conercebatur. Hæc nono morbi die paruerunt cum meo quidem iudicio naturam tæderet tantæ diuturnitatis, eaque aliquid moliri vellet. Ad Medicos rebus penè conclamatis concursus est. Spectatores fabulæ toto die fuerunt: clysmata ex hiera diacolocynthidos & aliis subdiderunt: aquarum theriacalium & cofilimium vsu consuluerunt. Puluis hieræ poculo datus est. Aliis videbatur opportuna sectio venæ, quod secretio videretur illius materiæ quæ per alui suppressionem in hypochondriis *ὑποχονδρίαις* acquisiuerat: & quæ in genus neruosum translata, cum olim in venis conclusa foret, conuellendi occasionem dedit. Inepta aliis visa est, cum natura videretur fathiscere, & quod in paroxysmis epilepticis vsurpata crimine non careret. Siue hæc ratio plus valuerit quàm fortuna, aut contrâ (siquidem fortunâ duce potiùs periculo ægræ tentatum hoc est) sanguis demitur ad tria ingentia vascula. Assatim riuulos eque fluit. Ab eo tempore non conuellitur, sed redit ad se: tamen subsultus quidam & contractiunculæ, quæ potiùs ex sententia Galen. *σπασμοί* quàm *παρὰ τοὺς* dicentur, apparent. Die sequenti initum est consilium. Illius affectionis causa creditur sanguinis cumulus, impetus & incitatio, necnon excrementorum in aluo proventus. Et cum aluus densa esset, facta quædam est humorum & sanguinis conculcatio; hinc phlogosis, & à phlogosi vasorum contractio & angustia, ac si aluus ambusta & sicca diceretur. Sic metus erat voluuli. Et nisi conuulsiones istæ incidissent per quandam serosæ partis & malignioris (vt ita dicam) sequstrationem, voluulus incidisset. Hippocrates hunc morbum adumbravit, cum ait dolores in hypochondriis residues & reuolutos, si augeantur; & febrem fastidiumque cibi accersant, conuulsionem afferre per diadochen & metastasim humorum malignam qualitatem, temporis successu per suppressionem adeptorum. Ac credibilis iuuenem istam mulierculam hepate visceribusque præcalidis præditam, & tamen superficie corporis subalbida, molliusculâque carne (vnde facilè ea imbuatur san-

Lib. 3.
Præfatio.

guine, inflammationesque concitat (vt de mulieribus docet Hippocrates mammarum muliebrium exemplo ²) in eam affectionem incidisse tribus de causis: ob alui suppressionem, quæ ipsa per se incommoda affert multa, ob exuberantiam sanguinis, qui in mamas fluere prohibitus est. Tertio ob cacochymia. Sic prudenter prouisum est vt bis, terve sanguis detraheretur ad tollendam plenitudinem & phlogosin, quam vsus rerum admotarum calidiorum adauxerat, colluies humorum adimere-
tur, alui leniretur. Lenienda enim alui fuit, non irritanda vehementibus medicamentis & siccantibus calfacientibusque. Quod notandum est, & à nobis obseruatum in capite de ea re præscripto, vt leuetur eorum error, qui cum vident aluum tardam, ad impensè calida confugiunt. Contra plus proficitur vsu rerum temperatarum. Iniecti ergo sunt clysteres primis contrarij, ex decoctis capitum veruecinorum, & omazorum cum borag. buglos. vtraque malua, & radicibus eius, semini-
bus melonum, cucumeris, endiuia, ex diaprun. non laxatiuo, diacassia. Immo oleum fuit suspectum ob calorem, nisi quod liliaceum & violatum magnâ copiâ iniectum est. Reiecta sunt ea quæ calfacerent in vsu *τῶν ἀνθεδύων καὶ χαλαστικῶν*, & temperato-
rum constituitur. Stuppæ iniectæ sunt in aquam egelidam vt sa-
turarentur, deinde in sesquilibra butyri recentis, & tantum de olei viol. imbutæ sunt toti abdomini applicitæ. Potiones ex oleo amygdal. dulc. recenter extracto, cum decocto maluarum, buglos. semin. frigid. lactuc. & sem. alkekengi, ex cassia soluta, eutholicon, diapruno simplici, cum syrupo viol. aliàs syrupo rosarum pallid. Quod validis medicamentis obtineri non po-
tuit, id rerum blandiorum vsus est affecutus. Si quando aliàs in ea muliere maximè obseruari debuit quod scribit Hippo-
crates: *Cauendum est ne inflammatas partes medicamentis vexemus, & dicitur.*
&c. Repetitæ sunt istæ potiones, & iuscula liquidissima. Tan-
dem ad colluuiem contumaciorem & abstrusam magis in ius-
culis tabell. diacarthami sæpè dissoluimus magno profectu. Sæpè id factum hinc benè habuit. Vrinæ præ calore nigresce-
bant, & flammæ erant: statim alui subsistebat, & spirato dea
reddebat. Immo narrabat egra se circum lumbos & in regione
venarum vteri sentire pulsus, subsultumque arteriarum, &
calorem immodicum. Nisi viribus metuissemus, largissimè
sanguinem dempsissemus. Per octo aut duodecim dies bene

Ddd iij

habet. Sed tamen dolores se mediocres in regione pubis & lumborum perferre dicebat. Sed hi aliis inferiores erant. Ecce dum eam primæ sanitati restitutam credimus, grauius quàm antè conflictatur, de nocte exacerbantur dolores, ad eò vt ea manus sibi inferre cogitet. Interdiu leuantur, alius astringitur, in inguinibus dolorem sentit, & in suris tibiæ maxime in plantis pedum intolerabilem. Insomnis nullo consistit loco. Vomitiones æruginosæ frequentes: renum regio inflammari videtur. Ad prima remedia & venæ sectionem recurritur. Parum proficitur. Vrinæ aliàs flammeæ, aliàs aqueæ, aliàs sabulosæ apparent: sic erant distantes. Et quod

Apb. 133 lib. 7. *Apb. 133 lib. 7.* urinæ distantes turbationem aliquam declarant, Hippocrati cum in eadem vrina est distantia, id est inæqualitas contentorum. Idem potest dici de vrinis cum vno die ac altero aliis aliter affectæ excernuntur. Nos vterinum aliquid esse dicebamus. Et obstetrices & chirurgi narrabant collum vteri quodammodo distortum, & ingentem intus calorem percipi. Ligamentorum cornuumque erat affectio aliqua. Dolortunc repetiit cum illa somniaret se à suo coniuge iniri, & coire voluptuosè. Sic factus erat eò sanguinis concursus, & furor, appetentiæque vteri contigerat. Quodque mirandum, magis ab vtero flatus erumpebant: quod Aëtius obseruat in cap. de inflatione vteri, & satyriasi. ⁴ Et vt ingenuè dicam, complicati erant affectus: satyriasis erat quædam, & phlogosis circum vterum. Secta vena in brachio, secta in malleolo magnâ quantitate. Cataplasmata lenientia admora. Oxyrhodini embroche frequens. Nil aut parum proficitur. Tandem consulitur clysteribus anodynis, in quibus philonium romanum dissoluitur. Iniicitur oleum liliorum & violar. in vterum. Pessi ex terebinth. bdellio, opopan. aristoloch. & ramet si phlogoseos & *ὀμφρογισματος* suspicio foret: ramen quia os vteri non contingebant, ex vsu pessiariorum profluuium sanguinis ex vtero expectabamus, eoque consilio venam malleoli tutuderamus. Iuuabatur pessis, fortè ob titillationem. Clinica mulier candelas ex sebo indebat loco pessuli: manifestam sentiebat alleuationem. Inditi sunt hi pessi.

℞ opopan. bdellij, gummi elemi an. ʒ ss. terebinth. ʒ ḡ. cere ʒj. f. p. pessus acutus puluere diacolocynthidos.
Inseffus ex ruta, chamamelo, meliloto.

Sed cum hæc non iuuarent, & dolores vrgerent, & pecti-
nis, inguinum, maximèque surarum, & plantarum pedis cum
caloris sensu. Periclitatum est hoc remedium.

*Rad. alib. & lilior. an. ℥ iij. mal. senecio. viol. bis mal. melil. chama-
mel. cretionis an. m. iij. sem. lini, cytonior. psyll. fenic. burgund. & alth.
an. ℥ j. s. hyosci. & papau. albi an. m. iij. fiat decoctio in aqua. fiat pas-
sura: in qua adde opij thebaici & populeonis an. ℥ s. Fiat cataplasma
admonendum pubi, poplitibus, & inguinibus.*

Vesicæ suille implantur eo decocto, & admoveantur. Eadem mate-
rialia capiantur, & coquantur pro semicupio. Per metrenchyten de eo de-
cocto in uterum injectio fiat.

Renibus applicatum emplastrum ex philonio rom. & unguento Comitif.
Hoc remedio conualuit, dormiuit, sedati sunt omnes
dolores.

ANNOTATIONES.

1. Colicos dolores sæpe in epilepsiam desinere nouum non est, immò &
in arrium resolutionem. Quod Paulus Aegineta annotauit, & post
eum Auicennas.

2. Convulsiones istæ feбри superuenerant, & febrē quodammodo
soluerunt. Ita enim aliquando convulsio commodè feбри superuenit, ut ad
finem lib. de crisi bus docet Hippocr.

3. Et si quando aliàs in hoc maximè verum fuit quod eodem loco &
Acutor. in præcordiorum inflammatione sectionem venæ esse principale
remedium. Vide historiam Nicolæ le Bé. Et cum dolor in nostra ægrare-
gionem uteri attingeret, mirum cur toties è brachio sanguinem sustule-
rimus, potius à malcolo trahendus erat. Vnde questio præclara, an in
uteri inflammatione & dolores immo in suppressione mensium demen-
tus sanguis è brachio. Non vult Galenus cap. 11. lib. de sang. missione.
Reclamat quoque & demonstrat Akakia in 2. ad Glaucon. Contra sentis
Aëtius. Accredo quodam Medicos medendo aberrare plurimum.

4. Sicut quæ ab Hippocrate dicuntur de flatu in utero legamus lib. 2. de
morbis mulier. multa huic mulieri talia symptomata euenisse compe-
rimus. Hæc autem inflatio cum est inter angustias uteri, dolor est maior.
Non reformidat venæ sectionem, cum calor magni magna sit suspicio.
Potuit esse inflammatio aliqua. Nam cum uteri fundus aut cavitās in-
flammat, in imo ventre dolor est, & minimo digitorum pressu irrita-
tur. Nec est quod obiiciat quis vehementem non fuisse febrē; non enim

400 CONSILIORVM MEDICINALIVM
in eo affectu ingentem esse necesse est: cum multis de causis moderata esse
possit. Tamen accidentia horrida sunt sæpè, & quæ Aëtius cap. 83. Te-
trab. 4. serm. 4. describit. Chirurgi manu agram contingentibus quo-
dammodo relaxatus uterus esse videbatur: quod non absimile videri po-
terat; siquidem fieri non posset quin præ dolore magna aliqua mutatio in
utero contingeret. Accedit frequens vsus chalaesticorum & oleorum, &
rerum humidarum propter dolores applicatorum, quæ aliquam relaxatio-
nem afferre potuerunt, immò appetentia coitus & veneris abstinentia
paululum de loco suo dimoueri potuit.

s. Hippocrates non reformidat vsum narcoticorum in doloribus uteri.

CONSILIVM LXXVI.

De Pleuritide.

FILIO LA domini Floræi cum sub dio, partim in sole versa-
ta esset, dolere caput cœpit, & tussire. Febris præhendit
acuta, & quæ tamen ex interuallis maior esse videretur. Omnes
noctes plenæ molestiarum fuerunt. Maximè enim ad sextam
ferotinam & febris & reliqua exacerbabantur. Iactabatur, nullo
consistebat loco. Tussis & tussendi cupiditas illam perpetuo
infestabat. Nil è pulmone educere poterat, tametsi esset stridula.
In pulmone humoris concursatio, quæ obaudiretur. Sitis
erat ingens & implacabilis. Frequens & brevis respiratio cum
difficultate. Postquam tussiuera, statim ciulabat. Aliquando
in partibus extimis febris mitescere videbatur. Immo leniter
perfrigerabantur ac si noua foret accessio. Sed illud fallax fuit.
Pugnabatur cum febre, & tussi quod eam partim à capite exci-
tari crederemus, partim à refudatione ichoris à calefacta pitui-
ta in pulmone. Octauo die symptomaticus alui fluor. Nono in-
terijt. Aperto cadauere latus sinistrum purulentum erat, & pars
pulmonis quæ illud contingeret. Immò & pus, in capacitate
fufum erat. Pleuritis fuit.

Nos valdè decepti fuimus existimantes tussim à capite esse.
Sed quod tam frequens esset, & sicca, & cum difficultate spi-
randi iuncta, illud aut inflammationem in pulmone, aut in latere,
aut in utroque satis significare poterat. Tamen vnum desiderabatur,
vt ægra de dolore lateris quereretur. Hoc expectabamus, interea

intercā ignorance rei præsidium in inflammationibus thoracis usurpari solitum magno incommodo omisimus. Et si illud usurpauissemus certis signis nequeentes assequi vtra pars esset affecta, è latere dextro sanguinem nullo profectu detraxissemus. Itaque puellæ peruicacia & morositas maximam periculi partem creauit. Rubor genarum non erat, tamen ferè perpetuò adest in inflammatione partium thoracis. Item aliquando clauso ore dormiebat: quod nos in eam adduxit opinionem, vt crederemus costas non esse obsessas. Sed omnis ista ratio nos decipit valdè. Tamen vix excusari possumus quin sanguinem demere debuerimus cum inflammationis in thorace magna esset suspicio. Ad sectionem venæ & insignis febris, & inflammationis suspicio, & sitis inextinguibilis, & iactationes ob incendium natæ, & maximè difficultas illa spirandi hortari debuerāt. Nam cum difficultatis differentia à motu ipso sumantur, vt velox, tardaque respiratio dicatur, à materia calida & frigida, à thorace, magna, parua, à quiete densa, rara, quemadmodum magna & frequens incendium in corde arguit, magna & rara delirium: parua & frequens in febribus aut oedema, aut impedimentum in thorace, vt inflammationem, aut quid simile. Cum videremus ingenti præsentē æstu puellam habere frequentem admodum respirationem, & tamen paruam veluti oppresso & coangustato thorace, de inflammatione aliqua suspicari nos oportebat. Tamen hoc asserimus sæpè nos obseruasse in pueris valdè febrientibus frequentem paruamque respirationem, licet affectus thorax non esset. Sed nonnunquam magna intercidit respiratio in omnem dimensionem dilatato thorace. At in hac puella nil tale obseruauimus: immò cum dilataret thoracem vellet, subsultabat quodammodò, & vociferabatur. Hæc à nobis eo consilio scribuntur, vt cum aliàs, tum maximè puerorum curam suscipientes, tanto diligentiores in eorum morbis nos præstemus, quantò minùs certos de suarum affectionum idea reddere nos solent. Immò cum pueris tanquā mutis ægris nos rem habere existimemus, vt quoniam ex relatione, quæ tamen in dignoscendis morbis plurimi facienda est, nil certi, nilque pensi habemus, aliis coniecturis, signis & symptomatū obseruationibus nitamur, alioqui puerorū salus valdè periclitatur. Nec enim ab ista ægra puella expectandum erat vt

Tom I.

Ecc

402 CONSILIORVM MEDICINALIVM
dolorem lateris pungentem quereretur quò secunda venæ oc-
casionem porrigeret, sed aliis modis res erat assequenda.

CONSILIVM LXXVII.

De febre semitertiana.

DOMINA de Chalmontio & ea mulier quæ ad insigne en-
sis regij commorabatur, eadem ferè febre detineri vide-
bantur, sed forte fatòque inæquali. Vna enim iam grande-
uis, & male pulmonibus affecta interiit, altera non item. Febris
erat affidua, aliàs interdiu, aliàs noctu exacerbationes habens.
Vna dies leuior, altera acerbior, in morem *τετανοειδὴς* aut *ἀμυγδαλίνη*.
Non tertiana erat exquisita, quia horas duodecim superabat,
non absolutè tertiana, quia horas quindecim superat, vt sentit
Galenus: fortè longa videbitur tertiana, quòd tempus inter-
missionis sit admodum breue. Tamen quoniam nulla febris va-
cuitas visa est, nòmine tertianæ donanda non fuit. Et si fortè
remissio aliqua erat, minimâ occasione præhendebat horror
cum perfrictione quadam, adeò vt ad hemitritæon accedere
videretur. Nisi fortè timeamus ne Galenus nos rideat, vt &
quosdam ætatis suæ Medicos, qui longam tertianam cum hæ-
mitritæon confundebant. At longa tertiana remissionem habet
& intermissionem aliquam, hemitritæus nil habet intermissio-
nis, vt Galenus in Epidemiis scribit. Quanquam lib. de Typis
longè aliter sentiens, hemitritæis aliquam intermissionem at-
tribuit. Sed puto hunc librum Galeni non esse. Febris dicta
tertiana quæ, latinè tertium gena, constituitur ab Hippocrate conti-
nua altero die remittens; quod Hippocrates *ἐπὶ οὐκ ἐξουσιάζουσα* vocat,
tertio quoque die exacerbatur. Hæc febris in mulieres dictas
incidere videbatur. huius hæc est descriptio:

Com. in apho. 23. sect. 2. lib. 6 Epid. Ibid. Galenus sect. pu- gnas. Sect. 2. lib. 2 Epid. Cum annus frigidus aquilonius cum humiditate fuisset, omnes per hye-
mem commode habebant. At sub ver decubuerunt. Febres tunc continua
tertianarum more innadebant, violentissimæ, longissimæ (idque ob co-
ctionis difficultatem, & oppressionem naturæ à vehementioribus sympto-
matis) laboriosissimæ: lenes à primo, de cætero incresecbant: aliquantum
remittebantur, rursus ex intermissione vehementius inceiebant, &c.
Itaque febris quæ mulierem illam adorabatur, erat potius

de qua videtur ab Hippocrate pronunciatum; *Quæ-
cumque febres tertiâ die fortiores fiunt omnes male: quoquo modo inter-
miserint, &c.* Intermiffionis vacuitatem causam habere putat
Galenus aut inflammationem, aut humorum *κακώθειαν*. Ac de il-
lis febribus quas *πυρετασμοειδεις* cum Hippocrate vocare possumus,
quatuor notanda sunt. Primum est, quod è malignarum febriu
genere sint, opinione Galeni. Secundum quod illis proprium
est, vt & malignis febribus; vt diebus decretoriis deteriores
fiant. Terriumus conuenit vt nox præcedens accessionem mo-
lestior sit, secundum Hippocratem. Nam à frigido & bilioso
humore, vt mirum non sit si de nocte molestias habeant. *Com. in
apho 25.
sect. 2. lib.
1. Epid.*
Nam dum biliosus humor acutam febrem facit, putrescunt in-
terea humores frigidi, vnde reaccenditur febris: & tamen alio
in loco hæc omnia hemitritæ tribui solent. Reuerà magna est
affinitas inter hemitritæ febres & *πυρετασμοειδεις*, vt in nostro Defi-
nitionum Commentario explicatum est. Quartum est quod
notari debet: si febres illæ tertio quoque exasperentur, cum ta-
men continuæ sint, an illis diebus tertiis licet aut venam secare,
aut purgare? Non videtur, sed potius moliendum est aliquid
diemitiore. Reuerà si manifesta tranquillitas comparatione fa-
cta cum alio die apparet, & apparet quoque manifesta exaspera-
tio die altero, eligendus is est qui eam præfert tranquillita-
tem, vt aliquid moliamur. In vtraque muliere erat anxietas
summa, quæ à calore acri omnia confundente, & os superius
ventriculi molestante contingebat. Implacabiles erant renum
dolores, vrinæ ferè crudæ. Coniciebamus circum ventricu-
lum collectam esse humorum copiam, vnde defectiones ani-
mi excitato vapore sequerentur.

Sed mirum fuit magis quod in illustri domina à Calmontio
apparuit: nam cum habitum corporis haberet tumidiusculum,
pituitosum, minimè dissilabilem, corpus internum æstuebat,
omnia quæ excernebantur erant biliosa: tota massa sanguinis
erat corrupta. Et quod mirum, pulsus erat vibrans, qualis in in-
flammationibus apparere solet. Cumque esset an-
nosa, mirabantur Medici quomodo in febris assiduitate ista
pulsus vibratio, clatio, magnitudoque tandiu persistisset. At
animosa erat mulier, nullis aut corporis, aut animi laboribus
defatigari solita, nulli pene celeritate cedens, irasci celeris, ad
omnes actiones expedita: cor compactum habebat, & faculta-

Ecc ij

404 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tem vitalem omnium validissimam habebat (nec enim tamdu-
 tam violentæ diræque febris molestias tulisset) de eaque illud
 dici potuit quod in aphor. scripsit Hippocr. *Qui consueti sunt la-
 bores ferre, etsi imbecilli sint, aut senes, non consuetis fortibus atque
 iuuenibus facilius ferunt.* Itaque pulsus erat validus, cum vitalis
 facultas esset valida, auctus erat vsus, instrumentum cedebat,
 vt mirum non fuerit si talis pulsus extiterit. & reuerà talis ad fi-
 nem vsque perseverauit. Sed quod magis mirum fuit, est quod
 vno die quinquies aut sexies rigeret ac si noua accessio foret.
 Horroris illius aut rigoris causam aut coniciebant nouæ mate-
 riæ accensionem, aut suppuratum in pulmonibus, aut aliquid si-
 mile. Obseruatum est ab antiquis frequentis & per vices repe-
 tentis causam horroris esse suppuratum: quod in pulmonibus
 hoc facit³: sed si in pulmonibus id fiat, multò magis, aut pari-
 ter quoque in aliis partibus fieri debet. Aperto cadauere fini-
 stra pars pulmonis erat purulenta: sed id crebri horroris causa
 non erat. Nam statim ab isto horrore calor adurens surgebat
 manum tangentis feriens, adeoque vola manus & planta pe-
 dum incaluerat, vt nullus ferè eum calorem ferret. Horroris
 autem illius causa esse potuit inæqualitas quædam materiæ, &
 non inæqualitas, vt quæ materia in maioribus venis coercetur, &
 vniufmodi est continuam faciat calore continenter cordi com-
 municato, necnon vapore elato: quod dum fit à calore isto alia
 corrumpitur materia in habitu corporis (in quo fucus periodi-
 carum febrium continetur & consistit) eaque materia redupli-
 cationis est causa; quæ reduplicatio habet aut leuem perfrige-
 rationem, aut horrorem antesignanum, vt idem fiat quod in he-
 mitritæis febribus quas κατὰ λόγον περιόδους passim cum Hippocra-
 te Galenus appellat. Quotidiana enim habet frigus tantum, &
 si continua est, non habet. Tertianæ autem rigorem habet: &
 tamen cum hemitritæus ex quotidiana continua (quod tamen
 minus propriè dicitur, cum nomen quotidianæ continuitatis
 nomen excludere videatur) & tertianâ intermittente compo-
 natur, dum ita confunduntur, symptomata quoque confusa
 habent. Et qui horror per se neutrius est si sola spectetur, ytriuf-
 que confusæ esse potest. Et libri prioris ad Glauconem Para-
 phrastes dum querit in quas febres rigor horrorque incidant,
 agnoscit intermittentes, quibus nimirum horror aut rigor pe-
 riodicus est, antesignanus: item semitertianas quibus proprius

est horror; immo ^{non} horrida dicuntur. Quamquam Galenus docet posse existere semitertianae sine horrore: sed hoc in vno tantum casu ponit, cum scilicet tabescentes ^{comitatur} febris semitertiana: successu enim temporis horroris occasio tollitur, praesertim materia pituitosa consumitur horroris causa, nisi forte aliunde horrescendi veniat occasio. Aut enim a suppurato oriri potest, aut forte quia diurnitate temporis corpus & ex carne & ex angue redditum minimam occasione inhorrescit. Ergo de periodicis & semitertianis dicta sint. Nunc de continuis. Quaedam sunt continuae, homonymae tamen dictae, quae cum ex multis particularibus accessionibus procedant, fit ut prioris finem altera accessio cum horrore praueinat: & in his horror adest. Aliae quoque permultae sunt continuae, & quae vna finiuntur accessione, a leui rigore vel frigore incipientes ob materiae inaequalitatem, vel malignitatem. Sunt & aliae quas Hippocrates horridas vocat (ego vero hoc non legi, nam solas semitertianas horridas vocat, & hanc admittit appellationem Galenus) quod per totam ferè accessionem earum corpus inhorrescat, idque vel reduplicato febris incremento, vel eo ipso citra reduplicationem inaequaliter crescente. In quibus si longioribus interuallis horror remeat, reduplicatio dicitur & fit, maximè in semitertianis, si breuioribus, horridus, inaequalisque motus dicitur. ⁴ Sed audiamus ipsum Galenum, quem citat Paraphrastes, locum enim haud legi. *Februm continuarum tertio die repetentium quaedam cum horrore venientes, cum à primo impetu ad incrementum se conferunt, tametsi non mediocriter praegressae videantur, alterum horrorem cum constrictione inducunt; ab hoc alterum incrementum, deinde aliam constrictionem & horrorem. nam iterum haec ter repetunt. Postridie aliam priore minorem habent accessionem sine priorum repetitione, isque est perpetuus orbis, ut bina binis diebus fiant accessiones. Et illud, binas, binis diebus, interpretor, tertio quoque die duae accessiones fieri videntur. Aliae sunt continua tertio quoque die repetitiones habentes citra illas horridas inuisiones, unamque habent accessionem tertio quoque die, accessione carent secundo die. vnum enim habent continuum & aquabile ab inuisione ad vigorem incrementum. Priores febres ^{hemitritae} vocaueris, posteriores ^{tertiociduae} quae ^{inter hemitritas & intermit-} tentes febres: nam illis sunt meliores, his vero deteriores. Et pro vtrisque notanda haec distinctio, quod in hemitritaeis tertio*

Ecc iij.

Com. in
part. 5.
sect. 3. lib.
1. Epid.Com. in
part. 5.
sect. 3. lib.
1. Epid.

Ibid.

quoque die duæ fiant accessiones, & secundo die sic una accessio. Quod mirum cur secundo die dicat fieri vnam accessionem, cum continua sit quotidiana. Sed ego puto manifestum quoddam esse argumentum cuiusdam *monuans*, quod non adest in iis quas vocat *τεταρταυεις*. Nam tertio quoque die sine horrore habent aliquam repetitionem, seu accessionem, secundo die non habent accessionem, cum sit vniusmodi febris. Item sciendum in hemitritæis manifestos esse horrores & inæqualitates, quod in his quæ dicuntur *τεταρταυεις* non cernitur. Nisi forte dicas & obicias illud Hippocratis descriptionem febriū *τεταρταυειν*, facientis in Epid. *Rigores omnibus inordinati erant errantes*. Si ergo horrores ita in illas continuas incidunt, in quo distinguetur hemitritæus *ἀπὸ τοῦ τεταρταυειδὸς*? Nos dicimus aliud esse inordinatos esse rigores minimosque in febribus continuis, aliud dicere ordinatos esse. Nam in hæmitritæis non sunt inordinati, errantes & minimi, sed validi, statim, & vehementes. Et ideo propriè dicitur horrida. Sed si in alia febre continua erratici incidunt horrores, non perinde horrida vocabuntur. Quod vt plenius intelligatur, causa & hemitritæi & triteophis eos est explicanda. Verus hemitritæus à duobus humoribus, est à bilioso & pituitoso: & si æqualiter exuperet humor vterque exquisitus, fiet semitertianus typus. Prout autem humor vnus paucior est altero, ita quoque aut vera aut non vera semitertiana est. Vera febris *τεταρταυεις* ab humore quidem bilioso, sed lentiore febre fit & coctu difficiliore. Quod si horrores habeat, non iam vnum humorem agnoscit, sed duos, & ad hemitritæon accedit. Proinde Galenus eod. Commentario de triteophis horrores errabundos loquens, ait eas à duobus humoribus oriri, pituitosis & biliosis. Et ferè dum *τεταρταυεις* explicat, idem dicit quod & de hemitritæis. Atque vt ingenuè dicam, magna est societas inter vtrasque, præsertim cum horrores sunt coniuncti. Itaque cum doctiss. Akakia de illis horridis continuis scribit: *Si longioribus intervallis horror remeat, reduplicatio & dicitur, & fit, maxime in semitertianis: sin brevioribus, horridus inæqualisque motus dicitur*. Obscurius enim dicit quod nos antè diximus: Si statim ac vehementes, & ex maiori intervallo horrores redeunt, tunc vera est semitertiana: sin erratici sint horrores, parvi, & ex brevioribus intervallis, continua potius *τεταρταυεις* dicitur. In hac muliere febris erat *τεταρταυεις*, ad semitertianæ naturam

Part. 25.
sect. 2. li.
1. Epid.

Com. in
part. 25.
sect. 2. lib.
1. Epid.

Com. in
part. 5.
sect. 3. li.
1. Epid.

accedens, & humor pituitosus quidam secretus videbatur, qui
 nouorum horro-
 rum erat occasio. Nec alienum erit monere
 Galeno placuisse cum veteribus febres istas *τεταναρqueis* inflam- *Com. in*
 mationem sequi partium internarum. Quod & in hac muliere *part. 5,*
 obseruatum est: totum enim corpus internum incendio conflagrat, *et. 3: li.*
 & cum ira esset precipitis, in cysti cholidocho nouem *1 Epid.*
 lapilli ciceribus rubris duplo maiores inuenti sunt. Hepar in-
 cendio incanduerat: totus sanguis putris erat & lacteus. Obiit
 die 27 totius morbi.

Sed & vnum animaduertere oportet, quod & therasian, &
 diagnofin in primis facit omnibus iecorariis, id est, quibus grā-
 dius hepar, amplius, tumentius & calidius, cum febribus magnis
 prehenduntur, maxima ex parte tempore vrgentis febris dolo-
 res in clauiculis ⁷, & secundum omioplata sentire satis vche-
 mentes. In plenitide quidem cum vno loco inflammatio aut
 phlegmone consistat, tamen in parte longè remota ob commu-
 nicationem & continuitatem membranarum dolor intolerabi-
 lis sæpè sentitur qui maiores sæpè molestias exhibet quàm ipsa
 pleuritis. Et signa diagnosticam pleuritidis aut superiores, aut *2 Actus*
 inferiores partes occupantis Hippocrates defumit ex dolore
 aut clauiculas aut ilcos regionem occupante, hepate accenso,
 aut inflammato, aut per insignem febrem astuante plurimum,
 dolor potest ad iugulum peruenire. Reperio enim bifariam
 dolorem tensuum ratione ipsius iecoris surgere. Aut enim he-
 par nothis costis alligatur, & tunc dolor ad clauiculam perci-
 pitur ratione distentæ membranæ ⁹. Quibus non adligatur, à
 vasorum ipsorum potiùs quàm membranarum distensione do-
 lor surgit. Et vt ait Galenus, proprius venæ arteriæque dolor, *Lib. 12*
 veluti in longitudinem extensa chordæ speciem refert. Quod *loc. aff.*
 est notandum, ne cum hos dolores in febribus aut inflamma-
 tionibus hepatis ortos videris, frustra de catarrho commi-
 niscaris. Probabile est enim dolores pro partium affectarum *si*
 quaut esse *αὐτὸν* aut *κατὰ τὴν*. Actum die 15 Septemb. 1574

ANNOTATIONES.

1. Hæc febris fuit ea, quam *τύφος* vocat Hippocrates libro de internis
 affectionibus.
2. Febres *τεταναρqueis* mediæ sunt inter hemitritæas & tertianas lon-

gas, aut alias febres quæ habent intermissionem. *Comm. in Aphorif. 2. sect. 2. lib. 6. Epidem.*

3. Galenus docet quàm acer calor excitetur ob fumosam substantiam à pituita putri & salsa excitatam. *Comment. in part. 16. lib. 4. Acut.* Reuerà inæqualitas materia causa fuit illius horroris tam frequentis.

4. Ista desumuntur ex Epidemiorum Commentario, & propriè ad tertioque febres possunt attribui.

5. Vel leges; In binis diebus tres fieri accessiones, ut uno leuiori fiat una accessio pituitosa, secundo dua accessiones.

6. Nomen *μαεξωρ* etiam in continuis potest usurpari. nam cum febris exasperatur, licet continua sit, potest dici *μαεξωρ*.

7. Nam quemadmodum ineuntibus paroxysmū intumescit & expanditur hepar contingens diaphragma, unde difficilis spiratio contingit: ita quoque dum astuas iecur, intumescencia est quadam; hinc tractui similis contentio: quo fit ut per communicationem vasa superiora afficiantur.

8. Quia tamen corpus hepatis unum est & continuum, sæpè signa inflammationum gibbarum & simarum exquisitè dignosci non possunt.

9. Membrarum dolor est punctorius, sensimque expanditur, punctorio sensu tanquam in cenivo laborantis loci in parte est. Tensionis sensus circumcirca musculum est. *Vlt. cap. lib. de sanguinis missione.* & cap. 1. lib. 2. locor. affect. Sic unum & idem potest punctorium sensum insinuerè & tensionem, sed diuersà ratione.

CONSILIVM LXXVIII

De sanguinis spūto.

Duæ sunt partes in agro isto, quæ aut infirmitatem, aut vitium, aut vtrumque videntur contraxisse, pulmo, & lien. Quæ cum aliàs, tum maximè in iis quibus hepatis intemperies est aliqua calida, propterea acrioris sanguinis parēs & procreatrix, facillè suæ infirmitatis signum edunt aliquod. Lien quidem, dum hepar non bene repurgat, quod plus succi nigri generetur, aut quod imbecillus fiat, potè legitimo alimento à secore suppeditato, non confirmatus. Pulmo autem, quia cum sit pars biliosa, facillè attrahens ob motus perennitatem, ut in Epidem.

epidemiis Hippocrates annotauit; *Attractio, pulmo, incendium.*
 id est, æstus ingens in partibus, & raritas, motusque perpetui-
 tas pulmonis attractionis sanguinis & spiritus maximæ causæ
 existunt, sit vt si acrior sit sanguis qui à iecore fluit, rapiturque,
 augeatur aliqua ex parte intemperies, & hæmoptysi æger sit
 obnoxius; vnde tabes: quod huic ægro nostro iam à longo tē-
 pore contigit. Nam qui vnà cum tussi è pulmone sanguis edu-
 citur, extunditurque, exulcerationis sensum exhibens, satis
 declarat duorum alterum, aut acriorem esse sanguinem qui ab
 hepate in cor, & ab hoc in venam arteriosam resilit, vnde ali-
 qua fit *diabes*: aut tenuiorem esse, vnde anastomasis, aut dia-
 pedesis. Nam cum nutritio pulmonis, & aliarum partium, sen-
 tentiā Galeni non tam per oscilla venarum, quam per earum
 tunicas fiat; natura arteriosam venam machinata est artificiosè,
 ne vasis raritas & pulmonis validior attractio efficeret vt statim
 sanguis, qui est pulmonis nutrimentum, absumeretur, & sic cau-
 sa esset marcoris ipsius pulmonis, affectumque illum induce-
 ret, quem Hippocrates in libris de Morbis tabem siccam vo-
 cat, quemadmodum & pulmonem siccum. Sic vasis arteriosi
 crassities facit vt restagnet, resideatque sanguis, & tardius in
 nutritionem pulmonis faceffat. Itaque si qua venæ arteriosæ
 tenuitas à natura est data, & ab ipsa conformatione, vt iis con-
 tingit quibus naturā venæ sunt angustæ, & instar tenuium sta-
 minum, ij facillè sanguinem è pulmone educunt: sed id pericu-
 lo caret, cum tribuendum hoc sit tenuitati ipsius vasis. Sed si
 vas ipsum ritè conformatum, si crassiusculum & pluribus villis
 intextum, & tameneductio sit sputi cruenti sæpè; hoc caco-
 chymia, acrimoniaque humorum ascribendum. Ita enim om-
 nis humor acer erodit, sibi viam facit, cuniculosque agit. Pro-
 preterea perperam Medici faciunt, qui vbi primùm aliquem hæ-
 moptoicum vident, illum frequenti venæ sectione fatigant: sic
 enim pulmoni & lateribus infirmitas conciliatur. Itaque distin-
 ctione opus est, nam sieductio sanguinis aut propter tenuita-
 tem sanguinis, aut venæ arteriosæ gracilitatem contingit, hinc
 parciore insecanda vena esse oportet: sin omnibus ritè com-
 paratis ob sanguinis prauitatem id fiat, liberaliores esse fas est,
 alioqui grauius in commoda agrorum peccatur. Nos autem in
 hoc ægro nostro potiùs animaduertimus conuicimùsque
 sanguinis calorem, acrimoniamque cuiusdam *diabes* causam.

Tom I.

Fff

esse, quæ in tabem ægrum coniectura est, nisi arte prouideatur. Quemadmodum enim hominibus alatis quos 6 Epid. ^{Methodi} vocat, sententia Galeni flatus ruptionis venarum causa esse potest, qui flatus ob imbecillitatem caloris surgere solet in eiuſmodi hominibus ita alatis factis per facultatis formatricis im-
 potentiam; vnde tibi obnoxij sunt maximè, ita quoque ac-
 calor eiſdem affectus causa esse potest, dum humores & spiri-
 tus generat acres, subtiles, acutos & mordaces. ¹ Iuuare quo-
 que potest destillatio à capite. Tamen in eam venimus opinio-
 nem, vt non existimemus caput per se non esse affectum, sed ex
 euentu tantum. Si enim destillatio ipsa hæmoptoïſeos autor
 fuisset, iam tabidus interiisset. Quinto enim Methodi medendi
 cap. 14 & 15 satis docet Galenus quàm breuì tabescant quibus
 ferina destillatio sputi cruenti autoreſt. ² Sed si aut conforma-
 tionis vitio, aut acrimoniâ sanguinis id fiat, non tam præcep-
 est morbus. Sic errant qui in omni metu tabis, & omni tussi ad
 caput recurrunt tanquam autorem primum. Sæpè enim id
 tantum contingit secundariò. Hippocrates hoc primus anim-
 aduertit lib. 1 de Morbis, dum docet quomodo caput pulmone
 consentiat in attractione. Nam pulmo calfactus attrahit, & ca-
 put facillè caleſcit; vnde vtrique pars conspirat in perniciem
 ægri. Tamen facillè qui affectus erat secundarius, fit primarius
 in iis qui ad tabem deurgunt ob tabificam qualitatem. ³ Huius
 ægri affectum lib. 2 de Morbis depinxit, dum describit affectum
 quem Græcè vocat *σπλην*, quæ non oritur aut vitio parentum,
 aut vlcere concepto in pulmone, sed tantum propter intempe-
 riem quandam partium. Ideoque ait eum affectum esse curabi-
 lem, & ante annos decem non necare.

De splene non putamus laborandum: quandoquidem non
 existimamus id tanti esse vt eò conuertamus nostram indu-
 striam. Eriſi enim signa quædam elucent quæ aliquid hypocho-
 driacum reſpiciunt ac redolent, putamus leuiora ista fore si he-
 pati consultum fuerit. Accidit fortè quod cum natura fit satis
 hilaris, diuturnæ infirmitatis tædio affectus, & sanitatis deſide-
 rio languens, animum suum demiserit, contraxeritque.

Ac censemus primo quoque tempore repurgato prius cor-
 pore illum ad vsum lactis asinini relegandum esse, habeat domi
 paratam opiatam ex decocto rerum aperientium & thoracica-
 rum cum multo polypodio, in quo incoquantur ʒ iij foliorum.

LIBER PRIMVS. 411

senae, additis \mathfrak{z} ij cass. & \mathfrak{z} j. conseru. buglos. & capill. ven. fiet opiata vtenda aliquando, vt tibi videbitur.

Censemus semel aliquando repurgandum satis valido medicamento, vt diaphœnico, aut electuario diacarth. dissoluto in iusculo ad elidendam vim scammonij. Et ne mirum sit cur probetur aliquando validior purgatio, cum in morbis thoracis ab omnibus recentioribus lenientia medicamenta probentur: dicimus id fieri propter humorum acrimoniam & cacochymiam, quam non superabit leniens & eccoproticum medicamentum. Quod facimus consilio Galeni, quem Fracastoreus secutus est cap. 15. lib. 5 Methodi, vbi disputat de curatione hæmoptoicorum per diaurosin & capitis vitium. Locus præclarus. Bis anno secabitur vena, ineunte autumno proximo secanda erit. Vesperi cubiturus vtatur conseruâ rosarum, nenuph. viol. additis gran. mastic. & olib. habeat syropos domi ad iuuandam expectorationem. Quantum fieri potest vino abstineat. Vtatur elixis potius. Paretur puluis ex saccharo cando, pulm. vulpis, penid. glycyrrh. cuius cochlear in ouum immittatur, & capiat manē. Vel trochisci ex hoc puluere formabuntur cum gum. tragacant. addito pulu. boli arm. aq. rosar. lot.

ANNOTATIONES.

1. Omnis puris excretio post sputum sanguinis mala. Spuitionem sanguinis omnem non sequitur puris excretio: sed si mucus, & coagulatus. Talis est autem omnino ex pulmone. Hippocr. Aphor. 15. lib. 7.
2. Sed hunc morbum melius Hippocrates explicat lib. de internis affectis. & vocat tabem ex descensu putris pituitæ. Locus præclarus. Hippocrates valenter purgat.
3. Talis phthisis à capite est, δια τὸ ἀναρῶν τὴν κεφαλὴν, vt Hippocrates 2 de morbis loquitur initio. Sed inter ceteros locus vnus præclarus est lib. 1. de morbis, quomodo pituita liquefacta descensus afferat incommoda in oculis, pulmone, ventriculo.
4. Circa hunc agrum, & alios consimiles duo queri possunt: An valdis opus habet medicamentis: quod Hippocrat. & Galen. videtur conuenire. Item an in suspitione puris & affectuum pulmonum, iusculorum, & rerum liquidiorum usus conferat. Nam putres sunt sæpè declarat puris sputum, nec modo vomica est aliqua, sed corpus ipsum vitiosum est. Si siccum sano propinquius, errant qui nimium humectant. De hac Gale-

FFF ij

412 CONSILIORVM MEDICINALIVM

nus cap. ult. lib. 4. loc. affect. & lib. 2 Epidemiorum.

§. Hippocrates conformiter ad istam opinionem lib. de internis affect. in descensu putris à capite pituita valenter purgat.

CONSILIVM LXXIX.

De Febre Typhode.

VXOR Domini Vieillart mense Iulio incidit in febrem typhoden ab antiquis vocatam. Focus eius in partibus alio propinquis erat conceptus in materia phlegmatica mista bile, aut in materia biliosa pituita facta, ut ita loquar; & symptomata elucebant utriusque humoris mixtionem significantia. Cum febris exacerbabatur obmutescibat, pulsus deficere videbatur, syncopizabat, vigilabat, obdormiscebat aliàs; & id genus terrifica erant symptomata. Verebantur medici ne cerebrum secundario læsum tandem alteraretur, unde aut cataphora, aut coma vigilans sequeretur. Tamen si autem langueret pulsus, tamen à validis medicamentis Medicinon desisterunt, quòd viderent exigendam, oppugnandamque multiplicem materiam mali auctorem.

Sæpè repurgata est medicamento ex rheo & folliculis. Clysteres frequentes iniekti ad euacuationem & reuulsionem. Vicesies sumpsit cornu vnicornis, & reliqua cardiaca. Sed id frustra fiebat, cum malum tyrannidem in cerebrum exerceret, unde metus cataphoræ & paraphrenitidis, his remediis occursum est.

℞. folior. pæonia, fœnic. salvia, maiora. betonica, an. m. j. rad. pæonia, angel. acori an. ʒ ij. scariola, acetos. florum nenuph. an. m. j. mercur. beta an. m. ij. Fiat decoct. in sero lactis, addendo epithym. p. ij. In solat. dissol. confect. hamech ʒ j. diaphan. ʒ ij. syrup. rosar. pallid. ʒ i. fiat clyster.

℞. olei castor. ʒ j. ol. cham. em. ʒ j. s. pro litu colli.

℞. olei cham. em. ʒ ij. cum pulu. angel. & castorei. fiat litus.

℞. aquar. pæonia & angel. an. ʒ ij. passent. per manicam hippoc.

℞. theriacis & mithrid. veteris an. ʒ s. conser. rosar. borag. meliss. an. ʒ ij. pro corde.

℞. destill. restaurat. & aque hord. an. lib. s. vtatur.

Cum ingens in toto ventre incendium perciperetur, hoc quod sequitur præscriptum est.

℞. macag. sem. atch. p. hylly & cyton. extract. in aqu. ros. an. ℥ij. ceru. santal. ℥j. aceti ℥ij. ol. ros. & chamem. an. ℥j. s. Fiat linimentum pro toto ventre.

℞. aqu. imperialis & aqu. salvia an. ℥ij. Utatur. Item & misbri-datio.

℞. decoct. hordei ℥iv. syrup. nenuph. ℥j. s.

Ettunc incumbabant Medici in somni conciliationem.

Parata hordeata ex cremore hordei non contusi, sed expressi. Dealbatum est hordeatum amygdalis, & dulcoratum saccharo ros.

℞. cos. alkermes ℥j. conf. buglos. nenuphar. an. ℥j. rasur. unior. gr. ij. cum folijs auri. fiat bolus.

Repurgata confect. hamech & rheobarb.

℞. conf. nenuphar. & ros. an. ℥vj. aceti ℥j. s. lactuca m. s. Fiat frontale.

℞. rasur. unior. gr. iv. rasura eboris, margar. elect. an. gr. v. capiat cum aqua cardui.

℞. absynt. ros. rub. fol. salvia, maior. an. m. j. santal. ℥ij. Fiant sacculi pro stomacho.

Clysteres iniectioni dissolutis ℥ij castia & ℥j. catholic.

℞. aqu. lactuc. solan. acetos. ros. an. ℥ij. aceti ros. ℥j. s. pulu. rosarum, santal. an. ℥ij. pulu. absynih. ℥j. Fiat epithema pro iecore.

℞. flor. nenuph. viol. buglos. an. p. j. folior. lactu. m. s. papau. albi, cap. i. semin. meron. ℥j. Fiat decoct. pro dosi. & cum ℥j. diacody. potus.

℞. sem. raphan. ℥j. sem. atripl. ℥j. coquantur in oxymel. simpl. In colat ad ℥ij. dissol. succi amygdalar. dulc. ℥j. s. fiat vomitorium.

Ad renes sunt irrigationes ex aqua solatri, semperuin, lactuca, cum aceto.

CONSILIVM LXXX.

De Gonorrhœa virulenta.

MERCATOR quidam vnâ muliere non contentus, quantum licuit libidinosè vixit: & cum prostibulis versatus, inquinatus est, vnde & gonorrhœa & vlcuscula cacoethica in

Fff iij

in pudendo manauerunt: Tamen sibi præcauens, aduocato Medicorum consilio, in luem non incidit. Sed cum rem leuiusculam putaret, semine illius virulentæ gonorrhœæ intemperstius suppressæ rediuiuo sentit dolorem acerbum in spina, & lumborum regione: immò in pene vlcuscula repullulant, statimque euanescent. Difficultatem spirandi nonnullam habet, ^{ai b q u r t o s} est, macrescit in dies, dolet totam spinam, & lumbos. Inito consilio dictum est id totum esse à reliquiis istius virulentia, quæ sensim vires acquirit: immò & rudimentum esse illius affectionis quam Hippocrates in libris de Morbis tabem ex dorso vocauit. Itaque tametsi ad oppugnandam vim morbi valeret vsus guaiaci, tamen de macie erat verendum. Itaque creditur satius esse corpus reficere, & interea non esse alienum reinterponeretur vsus hydroticorum temperaturorum, vt non propoliantur sudores, sed vt potius sensim humores desiccantur, & maligna qualitas emendetur. Consilij hæc sunt capita.

Bis hebdomade iniiciatur clyster emolliens & detergens. Primo quoque tempore utatur bolo castia cum rbcobarbaro. Aperiatur basilica decem tri brachij ad tria vascula.

Utatur semel paucâ terebinth. cum syrupo de alibea. Paucâ autem sit quantitas, ne hinc aluus soluat, sed tantum vt vasa munda fiant. Linatur frequenter spina oleo mastiches, cytonio-rosato cum aceto.

Deinde utatur lacte asinino per dies viginti continuos.

In pastibus decocto sarsaparilia diluto sasis, idque cum passolis.

Tandem cum renitritus fuerit, ad decoctum schina & sarsaparilia minimè dilutum adducetur, si semen mali longius disseminetur.

Et cum perseveraret dolor, & calor summus in renibus, hoc quod sequitur fuit institutum.

℞. sapa lib. f. mucaginis decoctionis malua, bis mal. violarum, seminis psyllij, melonum: adde opj ʒ ij. & applicetur instar cataplasmati in regione renum.

CONSILIVM LXXX.

De febre Affode.

LAVRENTIVS Prætor post curas, sollicitudines, iras, & intemperantem victum, generosorumque vinorū vsum, horruit, & insigniter febricitavit. De eo verum illud Hippocratis: *Morbi sensim generantur, sed affasim repenteque adoriuntur.* Cum solita exercebat munia in acutissimam febrem incidit, statimque magna virium iactura apparuit. Nox implacidissima, iactationes, æstus, sitis implacabilis, facies paulo post hippocratis. Natura visa est choleram morbum tentare. Excreta sunt *ἰσχυρὰ*; multi generis, foetidissima: pulsus parvus, frequens, difficilis respiratio, sopor: oppressio stomachi: delugebat sæpè, sed inaniter, & falsa quædam erat imaginatio & opinio aut flatus, aut doloris ventrem vrgentis, quod animum laborare, delirioque occupari significat; quemadmodum Hippocrates scripsit, & apertius Galenus in Comment. *Ventrem tum murmurantem, tum rugientem cum inanibus surrectionibus, quidam phreniticon esse contendunt. Sic duobus errant modis: nam nece qua sub sensum cadunt sentiunt, quanquam cum dolore fiant: vel qua sub sensum cadunt videntur sentire. Altero modo, quia sæpè de lecto desurgunt ac se sollicitati & demorsi essent: & tamen non mordentur. Sic falso se morderi putant. Tamen ex vfu videretur sectio venæ, nil tentatum est ob virium metum. Tamen vrgente difficultate spirandi, & æstu summo, secta vena, Nihilo leuius habuit. Quæcumque excernerentur siue suprâ siue infrâ, omnia cruda erât. Urinæ citrinæ, confusæ: *ἰσχυρὰ*: & post missum sanguinem deterior virium conditio fuit. Quinto interiit. Morbus peracutus fuit. Aliquid fuit *μετεωριστικόν*; tamen pulsus inflammationem nō indicabat. Ex intervallis dolor erat lateris aliquis, sed fugax. Rondeletius autem observat cum peripneumoniis adesse dolores nonnullos laterum & sterni, febris, ut prædictum est, vehementissima adorsa est, & statim secuta est virium magna iactura. Iactatio erat & anxietas *ἀνέμωτος* infirmitatem naturæ & obfidionem ventriculi designans. Et febris erat *ἀπρόσβλητος*. Nec mi-*

416 CONSILIORVM MEDICINALIVM
rùm si horrida statim fuit febris, qualis phrenitico obigit in
Epidemiis. Nil profectum, quòd remedia morbo essent infe-
riora.

CONSILIVM LXXXI.

De hepatis inflammatione.

IOANNIS Puthonne vxor post sollicitudines, curas, cum
valdè cacochema esset, in ardentissimam febrem incidit.
Nullo loco stare poterat: vires febris eundo acquirebat. lacta-
batur plurimum: vtrumque hypochondrium intumuerat. Ne
minimum quidem digitorum pulsus ferebat. Densitas erat
linguæ ob ingens incendium & defectum humiditatis. Septimo
isterica interiit. At hic iustus licet suo die critico eruperit, ta-
men funestus fuit, quia non tam erat à suffusione bilis quæ fe-
brem committeret, quàm à phlogosi ipsius hepatis. Et reuera
leuiter tantum corporis superficies erat infecta, nec morbi par-
erat suffusio. Hepar erat inflammatum, & fauces præcludi vix
sunt, quod ad clauiculas dolor pertineret. Sanguis tantum se-
mel detractus, quòd iam morbi dies exactus foret antequam
Medicus vocaretur.

CONSILIVM LXXXII.

De febre continua cum eruptione parotidum.

TONSOR quidam iuuenis pituitosus partim & sanguineus
cum loco & tempore curaretur, septimo die morbi sudo-
res habuit copiosos. Octauo die summa virium erat iactura fa-
cta: & cum febris expers foret, necnon satis luculentam ha-
buisset hæmorrhagiam, tamen nono die parotides apparuerunt.
Illæ erant satis mansuetae, potiùs quantitatem materiæ quàm
qualitatem secutæ ac præferentes. Digerendis illis consultum
est, mox suppurandis. Nil profectum est. Tamen cum recurre-
ret materia quæ aliorum rapi videbatur, tandem maioribus
machinamentis suppuratum tentandum fuit. Hinc discas sæpè
non

non esse funestas parotides, vt in plerisque solent, præsertim si materia earum sit ^{videtur de cōsuetudine}, quomodo multas in Epidem. in- ^{1 Epid.} nocuas esse testatur. At in Prorrhetico bifariam parotidon ^{scilicet. i.} eruptionem malam esse probat, tum quòd per parotidas abscessus morbo non sit par: tum quòd qui abscessus ad partes superiores fiunt, perniciosi esse soleant. ^{3 Prorrhet.}

CONSILIVM LXXXIII.

De febre continua.

CVIVSDAM Victoris vxor cū febre laboraret cōtinuā morbo iam progresso Medicos accersuit. Affecto iam morbo illud faciendū fuit, quod iam factum, si de re maturius consultum, oportuisset. Et cū serò melius fuerit præstari quā nunquam, quòd res operam celerem postularet, nono die secta est vena ad duo vascula. Natura istā sectione irritata crisin auertit. Itaque vesperi illa toto horruit corpore, ^{videtur longa}, vox clangosa, ^{μεγὰρ κραίγιον}. Partium extimarum frigus qualiter in iam morituris apparet. De funere cogitabatur. Cū exiguā salutis spes foret, qualicumque ista excretionē natura crecta fuit. Fluxus dysentericus: conualuit.

Hinc discere oportet nefas esse tumultuariam nonnullorum curandi rationem sequi, qui susquedēque ferunt si diebus criticis, aut aliis quibusvis aut feriantur venæ, aut medicamenta præscribantur. At nos obseruauimus sæpè leues irritationes ab artificio Medici factas, motus & perturbationes, tumultusque excitare magnos. Et si instatibus crisibus (præsertim si morbus biliosus sit, & benè ordinatus) medicamenta dantur, sæpè hypercatharisis inducunt. Quod centies verum deprehendi. Et id primus edisseruit Hippocrates. ^{Lib. de Medicamentis.}

Tom I.

Ggg

CONSILIVM LXXXIV.

De febre continua cum grauibz symptomatibz.

ROBERTVM febris continua magnas de nocte exacerbationes habens corripuit. Incolumis illac-tenus vixerat. Membra delassata fractaque appulsum manus non ferentia. Dolor capitis acerbis: iactationes perpetuæ. Quarto die purgatus: quinto secta vena: sexto apozemate ex foliculis repurgatus. Biliosa multa: septimo nil apparuit. Urinæ non multum flammæ, tenues, sed boni coloris. Quod si ad tenuitatem coloris prauitas accessisset, pessimum id foret. Sed saltem ad morbilongitudinem apparuerunt, vt Clazomenio contigit. Octauo iterum repurgatus. Nono comatosus factus & delirus. Febri ingens: urinæ tenues, subflauæ. Alius eo minimè sentiente perrenniter stuebat. Id symptomaticum erat, quia sensim fiebat. Omnis excretio biliosa. Decimo & vndecimo eadem. Lingua obtremiscens. Quod Galenus ad facultatis animalis imbecillitatem refert, estque signum non constantis mentis. *Cerebrum enim, ait, afficitur, affectioque ipsa calida est: quod calor motionem perpetuam afferat, contra frigus immobilitatem.* Et in Aphorismis: Si lingua repente incontinens fiat, aut aliqua pars stupore elanguit, hoc melancholicum est. Galenus in comment. *τὸ μελαγχλικὸν* interpretatur non vt ad affectum melancholicum referatur, sed ad humoris dominatum. Quanquam *ἢ μελαγχλικὸν ἢ τὸ μελαγχλικὸν* non ad humorem, sed ad diathesin & affectionem, affectionisquæ speciem refertur. Sic incontinentia linguæ repente incidens est *μελαγχλικὸν* quid, id est, ait Galenus, est ab humore melancholico quatenus est quid viscidum, lentum, crassum, propter similitudinem ad pituitam accedens: vt tum humor melancholicus, tum pituitosus illius affectus causa dicatur. Quanquam stupor & *ἀνάρτησις* linguæ non sunt affectus melancholici, id est qui redeant, resipiantque naturam veri humoris melancholici. Sed homonymos affectus melancholici dicuntur. Priorem rationem de analogia inter humorem melancholicum & pituitam fusiùs explicat Galenus; ait enim apoplexias, conuulsiones, cecitates promiscuè & ab humore melancholico, & à pituita fieri,

Epid.

*Com. in
part. 20.
lib. 1.
Pteriba.*

*Aph. 40.
lib. 7.*

*Com. in
Aph. 56.
lib. 6.*

420 CONSILIORVM MEDICINALIVM
immobilitatem inducat? Nam hoc ex superioribus demonstra-

Hippocr. tum est. ² Soporosus erat: an ille sopor malus? Locus est ill.

signis apud Hippocratem quo quirit *το κριτὸν δὲ ἀπὸ τῶν κριτῶν* An

1674. affectio carotica aut somnus profundus siue sopor ubique ma-

1b. 6 E- lusa? Cūm autem idem 85 in bonum partem 85 in malam fumam

pid. ^{ius.} Cuiusmodi ^{eggs} & in bonam partem & in malam
tur/quancumque duxerit, ficut

tur (quandquam omnis à quacumque causa ortum duxerit,

Par. 29. Iomno naturali a causis moderatis & naturalibus orto co.

libr. 2 tur, in malis poni potest) dubitari potest an existere possit
Exoribet.

non terrefaciat Medicos, & ij non statim adinoneatur ad qu

uis moliendum contra soporem inexpugnabilem. Somnus

turalis fit à bona cerebri temperie. & suavi blandoque vaporibus.

Nos non pluribus explicabimus somni & soporis differentias.

8. à quibus causis oriuntur quibus re signis distinguantur, cum

& a quibus eadem oriantur, quibus velignis distinguantur illae nucleata à nobis fuerint, antè. Calanus, eorum in partem

illa enucleata a nobis fuerint ante. Galenus confirmat
ill. multis modis. *vis* & *potentia* & *laxitas* & *comnum*

illam multis modis contingere posse docet, & rati-

vix excitabilem solutūque difficilem (quomodo

tur) aliquando bonum esse posse vt signum & vt causam

cavit. Sed addit, si carus intelligitur profundus, & vix eximius.

Somnus, & carius morbosus nullam genere dissidentem diathesin habet.

id est, si nulla sit mala dispositio aut humoris, aut partis, vlt

si præter excessum quemdam humoris quantitate opprimen-

ris & sensus ligantis: vel nomine & origine & naturam; & con

ditionem effectus audiamus. Ut 6. 110: queritur morboſus &

ditionem affectus audiemus. Vt ^{habet} distinguatur in

somno profundo, quod somnus profundus ex copia

vtilis generari possit; *ναεος νουαδης* ex pituita vnde cerebrum affectionem

medatur & refrigeratur, & iam ad lethargicam affectum multum,

accedit. ³ Sic profundus somnus habet humorem multum hume-

vtilem, quantitate peccantem, cerebrum ferè solum hunc

Crantem: *καρὸς, ῥῆμα, κατὰ δύναμιν*, frigidum: *λεπτόν, ψυχρόν*, lentum: *ῥαβδόν, ἄσπετον*, viscosumque: *ῥαβδόν, ἄσπετον*.

inexugnabilem humorem ^{durissimum} & carentiam quandam

inexpugnabilem humorem ^{anxiosum} & carentiam quā
sus inuehntem. Et hoc modo omnis carus malus. Profundus

ius influentem. Et hoc modo omnis carus malus. *Galenus ait, opor-*

tenius improprie ~~regis~~ dici potest. Itaque Galenus

ἰνδρῶν καὶ διδασκῶν, ἐν ὁνόματι κυρίου καὶ διχαρῶν ὅτι: dummodo faciant

thesin somni profundi, & recipi non distingui, de solo nomine mulentosi.

vertitur. Profundè dormire multos ponit Galenus remedia

Qui sine motu & sensu soporantur, qui nec voce, nec punctu-
ris, nec stimulis excitantur.

Quibus musculus temporalis percutitur.

In principiis accessionum febrilium, immò in febribus arden-
tibus.

Et hic profundus somnus malus, vt signum, & vt causa & *καὶ αἴτια*,
& *ἀλλόθεν*, & *ἐξ αὐτῆς*, & *κατὰ φύσιν* que nominari potest. Omnis talis sopor
malus vt signum & vt causa. Nam & causa longè contra natu-
ram est quantitate & qualitate peccans, & resolutio, oppressio-
que nonnunquam primi sensifici, id est cerebri, adest. In no-
stro agro sopor iste malus erat. De funere iam cogitabamus.
Sed cum die duodecimo febris aucta videretur, & natura re-
creata, venam aperuimus: inde omnia foeliciora fuerunt. Cre-
do naturam istâ sectione quasi flabellato sanguine erectam.
Decimoquarto sudores. Urinæ boni quidem coloris, sed non
indicabant illud incendium quod intus erat. Alius perpetuo
fluebat symptomaticè. Videbatur in nescio qua materia secre-
ta à venis calor conceptus. Sed cum febris continua esset, ta-
men sæpè *τὸ ἀπυρεξίης* sensus erat aliquis, cum tamen nulla foret:
immutarique illa febris falsa erat & mentita. Simile quid in E-
pidemiis legitur, cum tamen febres essent continuæ. Nam *histo. 12*
Hippocrates per tres dies apparuisse febris vacuitatem fatetur. *cap. 13.*
Ex hac historia doceri possumus symptomaticas sæpè alui flu- *pars 1. lib. 1.*
xiones, vt cum sine sensu ægri, sensim atque sensim humores *Epid.*
secedunt (*ἀπὸ τοῦ σώματος τὰ ἰδιώματα*, vocat Hippocrates) quod & copiam
& perpetuam generationem, & naturæ quandam resolutionem *aphor.*
significat, profuisse *κατὰ συμβεβηκός*. In morbis omnibus malignis
qualiscumque fuerit excretio, quoniam virulentæ materiæ ex-
cretionem quomodocumque id fiat, iuuatur plurimum, profu-
tura est. Et quod & humoris qualitate, & excretionis modo
symptomaticum esse dicetur, id ex euentu, si quid vitium re-
sisterit, criticum erit. Secundo puto idcò laxis fibris aluum la-
xatum esse, quod ad diem ferè criticum medicamentum datum
sit. At iam ex Hippocrate docuimus medicamentis præscriptis
diebus instantibus criticis, aut secta vena hypercatharsis esse
faciles: quod nos in plerisque obseruauimus. Nam sequuntur
sæpè sudores diaphoretici. Si natura valeat, aut arte erecta fue-
rit, liberantur quidem, sed diu imbecilli manent, & vix à mor-
bis releuantur: sin imbecilla fuerit natura, eodem die quo vel

Ggg ij

medicamentum datum, vel secta vena, moriuntur. Quod calamitatis & infamiae est plenissimum. Verum antequam huic consilio finem imponamus, non erit alienum annotare quae paulò ante diximus ex Galen. comment. in Prorrhēt. In affectionibus febrilibus, praesertim ἐν ἐπισημασίαις, cum exacerbantur morbi ac repullulant, saepe esse κίερον ἢ κῶμα. Mirum cur Galenus non dixit κατὰ τὸν πυρετὸν, sed dixit κατὰ νόσους πυρετώδεις. Quod fortè abs re dictum non est, & magnā animaduersione dignum existimo. Ac primum scire oportet duplicem esse febrem, vnā essentialē, symptomaticā aliam. A febribus autem absolute dictis & essentialibus dicuntur capi qui absque inflammatione, vel abscessu, vel dolore, vel erysipelate, vel absque aliquo membro praecipue affecto agrotant. Item addit comment. in aphor. 66. lib. 4. *Contumacem obstructionem & fortem, cui febris superueniens symptomatica esse dicitur.* Si autem vel inflammatio aliqua sit, vel aliquid simile quod febrem excitet, is absolute febricitare non dicitur. Haec Galenus. Cum itaque in febrium exacerbationibus κατὰ νόσους πυρετώδεις per febriles morbos, non autem absolute dixit κατὰ τὸν πυρετὸν, videtur id significare. Catoche, cataleptica affectio cadit in febres, praesertim eas quas committit nescio quae in parte dispositio; vt cum materia est in cerebro, & doctrina gratia febris cephalica dicitur, per motum humoris in capite contenti, quia a massa sanguinis & concretionē separatus esse dicitur: aut cum est in ventriculo, aut in hepate fit febris Elodes, Typhodes, Erysipelatodes: atque tunc si catochē incidat, non dicitur propriè cadere in febrem, sed in affectum febrilem. nam febres essentialē, quarum materia per venas sparsa & fusa est, ex se non habent coniunctas catochas, cataleptēis, comata. Sed sub finem earum symptomaticè potest aut coma, aut similis affectio aduenire, & hoc malum vt signum & vt causa. Sed cum in Epistimasia morborum febrilium soporosi affectus surgunt, affectionem & prauam dispositionem non in genere venoso, sed aut in ventriculo, aut mesenterio, aut in cerebro ipso significat: & ad prauum exitum saepe haec febres tendunt. In tribus id genus febris obseruauimus. Vxor domini Vieillard, de qua abundè supra, eam habuit, & febris erat typhodis, exacerbataque febre mox delirabat, mox atrocinita sopitaque planè erat. Filius domini Magni Medici annos 10 natus, idem passus est. Idem quoque & Procurator Dumont.

tier, de quo in principio ferè huius libri. Quæ omnia annotata volui, vt hoc tanquam insolens non dicant Medici, sed vt in-
quisitâ tanti mali causâ, legitima medendi methodus inuenia-
tur.

ANNOTATIONES.

1. In eo sensu ἰσχυρὸς καὶ παρὰ τὸν ἄνθρωπον, id est *tristis* *melancholi-*
cos morbos experiri solere: quod mirum est, cum utrique sint frigidi, hu-
midi, molles, effeminati, & veluti aquei. Hippocrates lib. 2. Epidem.
sect. 5.

2. De somno initio febrium, in febribus, & dum corpus astuat intus.
Hippocrates comment. in part. 17. sect. 4. lib. 6 Epid.

3. Tamen quidam Coma ab oppressione cerebri oriri dicunt; Caron ab
eiusdem resolutione.

4. Reperio etiam soporosam affectionem Lethargum appellatam, id-
que ob speciem quandam peripneumonice. Vide lib. 2 nostri Ephemer.
Quomodo comata etiam in principio febrium ardentium inciderint, an-
notat Galenus ex Hippocrate comm. in partic. 37. sect. 3. lib. 3 Epid.

5. Etsi per hypercatharsin istam educuntur patria, corruptaque; tamen
melius fuerat ea non agitauisse. Multa enim sunt in corpore corrupta quæ
suo gremio adhuc natura continet ac regit, et si facultatem eius retentiri-
sem foris medicamento & attrahente concutias; non miram si laxatis fi-
bris omnia effluant magno virium dispendio.

6. Quæstio verò esse possit an coma incidens in febrem sub finem fiat
vitio particularis cerebri, vel vitio totius corporis. Particulari vitio, vt
quoniam in morbo longis & acutis quibusdam singula partes sese exone-
rant, si in cerebro materia moueatur quæ coma inferat. Vniuersi corporis
vitio, vt fiat per depositionem venient morbum causantis in cerebrum
ipsum; & talia comata & symptomata incidunt in febres desinentes na-
tura falsas crises moliente. Id enim est indicatorium, non indicans.

CONSILIVM LXXXV.

De febre maligna.

IOANNES de Longueuille à castris rediens febre malignâ
prehenus est, quæ multos in castris stativis ad Rupellam iu-

424 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 gulavit. Admirabile est qualia symptomata contigerint, ut po-
 stea narrabo. Initio febris mitis, qualis accendi solet potius in
 spiritibus & in materia phlegmatica quam in biliosa, quod mo-
 tus subitos non haberet. Dolor capitis ab initio sæuissimus: do-
 lores vagi: calor multus intus: pulsus satis frequens, sed non
 multum elatus: lingua initio planè arida, & tamen calor similis
 non percipiebatur. Aluus satis bellè reddebat. Circa septimum
 lecta vena; & sanguis planè putris educitur. Singulis noctibus
 omnia grauiora: visa est lingua nigricans: vrinae initio confuse
 & flammeæ, biliosæ. Nono vrina citrina, mala, lusa. Delira-
 bat: facies *ἡσυχία*; oculi ardentes, aliàs comatosus: delirij aut
 lethargici affectus erat metus. Itaque consilio quorundam pra-
 cticorum non reformidantium vsum vehementioris catharti-
 ci, tametsi febrilis calor dehortari videatur, data est tabella ele-
 ctuarij diacarthami in iusculo, quæ elicit multam materiam
 solidam, albicantem, ac si diceretis pultem quandam. Hoc autem
 factum ut maiore vi reuelleretur vapor ab ista materia eleuatus
 qui subest, aut coma, aut lethargum esset inducturus, vnde pa-
 rotidon metus fieret. Noctem vndecimam molestiarum ple-
 nissimam habuit. Manè deficiebat pulsus, mox formicans ap-
 paruit. Idem penè per tres horas mansit. Mortem in propinquo
 denūciabamus. Credibile tunc naturam moliri voluisse crisi-
 sed & debilis, & materiâ nondum præparatâ id non potuit.
 Cordi applicatur catapl. ex mithridatio, theriaca, addito pul-
 uere diamargar. frigid. Potu datur theriaca, confectio Alker-
 mes cum aqua theriacali, aquis cardiacis, vino albo, syrup. gra-
 natorum & granis aliquot ambræ. Pulsus ad se redit post infi-
 gnem illam mutationem, & iactationes multas. Vrinae ab eo
 tempore inæquales, sed maxima ex parte crudæ erant & aqueæ:
 & tamen non habebant alienum colorem aut contentum. Nil
 de incēdio interno declarabant, omnia cruda erant. Cibum ca-
 piebat, lingua aridissima; quod mirum, cum vrinae aliter sese ha-
 berent. Aluus cœpit liquida deicere. Decimoquarto nil com-
 memorabile. Semisopitus. Nil de materia in præcordiis con-
 tenta excernebatur, quæ verè illius febris causa erat, & seges.
 Summa erat virium infirmitas. Decimosexto datum rheum: te-
 nuia *ὑδατόρροια* excreuit: nil crassum: nullus sudor. Vrinae tenues
 perseverabant: tales apparuerunt quales in Clazomenio: & lon-
 gitudo morbi significata est. Et nisi ætatis firmitas obstitisset,

vix eam vim morbi sustinuisse. A die duodecimo nil secessit
erassum nisi sub finem effectus medicamenti. Morbus qui acu-
tus erat, incipit longus esse: sensim euacuatur educiturque ma-
teria in hypochondriis contenta: & quod educitur, crassitie
pultem referebat. Sic conualefcit. Consultum est vt ad tenuis
ichoris excretionem qui sæpè spiritus contaminat febre etiam-
num præsentē, sed concedente multū exhiberentur ꝛ viij
decoctionis schinæ cum multa scabiosa paratę, additā ꝓ cin-
namomi.

Hinc discere oportet eos qui optimo habitu præditi sunt, &
integrā sanitate, non lubricā, vt plerique biliosi, tenues, fruun-
tur, dum de sanitatis statione depelluntur, crudos admodū
morbos experiri, & horum vires sustentari debere donec mor-
bus mitificetur. Vnde in plerisque qui omnium robustissimi es-
sent, istā malignā temporis constitutione horrenda symptoma-
ta obseruauimus: & ij penē sani morbis tentati sunt, ab iisdem-
que iugulati sunt. Itaque hīc magna cautio adhibenda, ne si va-
lida initio medicamenta data fuerint, agitemus materiam quam
educere nequeamus; intereāque nil aliud agamus quā vt na-
turam infirmemus, minúsque idoneam reddamus ad sustinen-
dam tantam morbi contumaciam & longitudinem.

CONSILIVM LXXXVI.

De febre maligna.

IOANNES du Teil simili ferè morbo correptus est. Is iuuenis
erat, robustus, lacertosus, expeditus; & incredibile dictu
quot & quanta affuerint symptomata, vt ancipites fuerimus de
morbis exitu ad vicesimum quintum diem. Audio illum mæcro-
re aliquo affectum quòd res in Amore secundæ non essent: At
tamen si quorundam Medicorum opinione, procatarcticarum
causarum obseruatio in morbis curandis inutilis videatur, ta-
men in dignoscendis, præsertim quod ad ideam morbi spectat,
plurimum posse videtur. Hinc Hippocrates in historia de Si-
leno, causarum procatarcticarum meminit, & non abs re, vt
Galenus in Comment. docet. Mirum quod ait Galenus in lib.
de different. febr. febres putridas à causa procatarctica non

Hist. 2.
sect. 3. lib.
1 Epid.
Cap. 74
lib. 2

Tom 1.

Hhh

426 CONSILIORVM MEDICINALIVM

oriri. Cur itaque Hippocrates causerum procatarcticarum me-
minit, vt cum loquitur de quodam, qui cum rudimentum fe-
bris haberet, incidit in febrem perniciosam: quod cum iam
leuiter febricitaret, largiter potauit. Illum errorem commis-
sum tanti facit Galenus, vt periculum creauisse existimarit. Itē
dum Euryanactidis filiae historiam commemorat, causam pro-
catarticam quandam non omisit: hanc racemum gustasse di-
cebant. Et si conditio vitæ, vt si quis ruri degat, aut in vrbe, ad
constitutionem morborum tenendam apprimè conducit, cur
non & causa procatarctica? Sed cum Galenus loco supradicto
ait causas procatarcticas putridam febrem non parere, non ne-
gat quin possit excitari à causa procatarctica, sed putrens nisi
fuerit humor, non generatur febris putrida. Nam loquens de
Sileno ait, illum in diariam debuisse incidere ob causas istas ex-
ternas: sed quia corpus morbo erat obnoxium, facile impressio
facta est in humoribus. Pluribus commentari in illam historiam
explicat quā ratione à causis illis procatarcticis tam perniciosæ
febres excitentur. Itaque mœstitia concepta potuit aliquid af-
ferre. Et hinc non verebor dicere obseruasse me omnes morbos
qui mœroribus affectibusque animi successere, aut eosdem
perpetuos comites habent, esse *συνπνεύοντες, συνήντες*. Cum medica-
mentum blandum sumpisset, voluit sibi venam secari postri-
die: & cum noctem implacidissimam habuisset, manè toto
erupit sudor corpore: & cum indicta esset hora Chirurgo se-
candæ venæ, aut erumpebat adhuc sudor, aut paulò antè præ-
cesserat, cum imprudenter iam præ sudore corpore resoluta
vena referatur, vnde animus defecit, nec mirum est. Adeo oc-
casio præcepta est, & aliàs captanda est, aliàs omittenda: tamen si
hoc vel illud agendum meritò videatur. Parum sanguinis de-
tractum est, ob deliquium succedens. Ab eo tempore adeo lan-
guidus fuit, vt nullā parte corpus mouere posset, immò nemi-
nimam manus contrectationem ferebat: an id ab illo errore
commissio manarit, ignoratur. Tamen hoc potuit iuuare pluri-
mum. Febris erat adeo *καταρκτητική*, (morbum autem malè moratum
definit Galenus cum mitior non sit, tamen si omnia legitimè
fuerint administrata) vt id ratione febris contingere potuerit.
Febris continua: iactationes assiduæ, virium lapsus. Ad sextum
diem pulsus plenus quasi explicatā febre, hinc capitur secandæ
venæ occasio. Nil alleuatur. Vrinæ flammæ, aliàs sanorum

*Hist. 2.
et 3. lib.
1 Epid.
Hist. 6.
sect. 2. li.
3 Epid.*

*Com. in
par. 1. sec.
3. lib. 1
Epid.*

*Quid
morbus
καταρκτη-
τικός.*

*Com. in
par. 1.
sect. 1. li.
1 Epid.*

similes, cum tamen febris perseveraret: quod in superiore ægro observatum est. Non sentiebat quicquam mali, sed mens agrotabat. Morbus in eodem statu perseverabat: non meminerat multorum: semisopitus erat: comatosus: & reverà nisi symptomata per alium euacuatio successisset (quam euacuationem qualicumque sit, in malis morbis iuvare plurimum, antè demonstratum est) aut comatosus interiisset, aut molestas parotides habuisset. Sed subductio alui illa, illo minimè sentiente, & perenniter suas syndones concatante, infortunio eo exitu illum liberauit. Item urinam reddere non meminerat. Satis bellè cibum capiebat, & capere meminerat: cetera obliuiscébatur. Fluente aluo etiam nil manifestò febris remittebatur: sed tandem observatum illum fluorem febris finem attulisse. Tanquam pondus iners in lecto iacebat, prouoluebatur non suo, sed aliorum nutu. In neutrum latus suo nutu decumbere poterat. Nulla mutatio in pulsu, in urinis erat. Et quod mirum, diebus criticis natura aliquid moliri volebat: sed cum nil præclare facere posset, manabant sudores frigidi: pulsus deficiebat, contrahébat. Si natura potens fuisset, crisis in eos dies incidisset. Deinde prior pulsus redibat. Lingua aridissima, sitis tamen nulla; nec enim se sitire putabat. At *ἡ ψυχὴ παραλόγως λυθεῖσα κενόν*. Sed delirabat. Ignorabatur quæ causa tantæ virium ruinæ foret cum corpus iuuenile foret. mos illius morbi inauditus. Nō potuit non suspectus esse morbus, quòd sine causa manifesta ad eò impotēs factus fuisset. Ad decimū sextū & septimū diem circa os sacrum tumor niger ambusto & carbunculo similis apparuit. Non sentiebat, licet esset dolorificus. Erat carbūculus. Aluus fluebat, & id commodè. Circa vicesimum diem restitit aluus: spes salutis fuit: ad se rediit. Corpus erat arens, squalidum, velut exustum. Erat occultum incendium quod humores exusserat.

Febris erat *ἀνταρτία*, pestilens, quæ illum interemisset, nisi alui profluuium etiam symptomaticum (quanquam omnia quæ sunt symptomaticè sunt suspecta) successisset. Iuuit quoque ætas, quam magni facit Galenus comm. in Epidemior. libros, ad sustinendam malignam vim morborum & longitudinem.

ANNOTATIONES.

1. Vide locum præclarum de malis excretionibus quæ aliquando bonæ sunt æstimandæ ex fine, non ex causa, in sequentibus. & ante Consiliū III.

H II

428 CONSILIORVM MEDICINALIVM

2. Hoc non fuit criticum, sed symptomaticum, etsi multa talia excreta fuissent: illi fortè melius fuisset, vt ex lib. de atra bile constat, cap. 4. Tamen vtrumque hoc naturam iuuat.

Proprè erat phygethlon, vt in explicatione aphor. de gibbis diximus.
3. De eo verus aphorismus in Coacis: Mentis emotiones taciturnae, non quiescentes, oculis circumspectantes, spiritum extra effe-
rentes, perniciosae sunt: sed & ita affecti ad insaniam deueniunt. Qui verò in ventris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa indicationem prodeunt. Quod huic egro contigit. Et si vires suffe-
cissent, vix contineri potuisset.

CONSILIVM LXXXVII.

De destillatione in pulmones.

Hist. 6.
sect. 2. li.
3 Epid.

ILLVSTRIS VIRI filia (cuius nomini parcendum ducimus) annos nata quinque, coepit valetudinaria esse, c. m. annis superioribus integrâ sanitate, prout tulit aetas, frueretur. Nata est aui agibbosa, proinde procliu ad affectus pulmonis. Hinc congenita ad tabem dispositio. Hippocrates in Epidem. meminit cuiusdam filiae ad tabem propensae, cuius dispositio ad tabem mediocris morbi, & ad necandum non sufficientis aduentum ita adiuvit, vt in ista morbi lenitudine obiuerit. Et idcò Hippocrates sub finem historiae adiecit, *ἢ δὲ συνηνέον ἐστὶν ἀποθνήσκειν*. Quod ab Hippocrate Galenus in Commentario adiectum dixit, vt conuellatur quorundam Sophistarum opinio existimatum nullum esse congenitum affectum: vnde mirum quid fiat vt haec puella cum olim excederet humiditatis puerilis mediocritatē, vnde *αὐτὸς ὄρεος* apparebat, vt nec articuli, nec venae foret conspicuae: nunc quasi mutato temperamento, praeter rationē macra, λεπτή, extenuatāque appareat; vt omnes & articuli & venae facili sub aspectum cadant. Hoc ad vermes relatum est: sed tamen cum malum perseverare videretur, & summa esset catarri & destillationis in pulmones facilitas, immò & sororem habuisset quae à congestione humoris frigidi cataleptica interierit, ferinam destillationem huius mali occasionem arbitramur. Accedit quod praeter etatem, praeterque morem hemorrhagiam patiat, quod, sicut & genarum rubor pulmonis

corum proprium existit. Sic de illa tria quæ sita sunt: Cur præter rationem macruerit, cur à natura & statu abs re ita descuerit; an lacti asinino locus sit, & num id vermium generationi, cui obnoxia est, officiat. Sanitas quidem in firmitate aliquâ consistit, & actionum bonitate: & eos dicimus sanos quibus corpus ^{visum} & solidum est: tamen vtrumque fallax. Etenim pulmonis suffunditur rubore facies ob affluxum sanguinis & caloris vaporem, & tamen iste rubor bonus est. Extenuationis cause sunt penuria alimenti, exercitationes plures, vigiliæ, dolor, morbus, & præcipue si colliquans fuerit, prauitas humorum, imbecillitas denique ipsa. In hac vermes fortè aliquid potuerunt², sed destillatio multum potest: vnde videmus eos facile marcescere quibus destillationes sunt perennes, nisi insufflentur ac intumescant. Querebatur num lac asininum ex vsu foret; quoniam calor acer quodammodo est, æruginosa expectorat quæ moram in substantia pulmonis trahentia erodunt, & ideo sputum cruentum promouent, ideo lac ex vsu foret. Nam vt seri exuberantia superat, ita pinguedine cæteris cedit: & mel aut saccharum admiscendum vt seri acrimonia retundatur, quod in ventriculum vacuum ingestum facile fundum refrigeraret.

Sed obiciet; minimâ alteratione opus habet; immò Galen. videtur velle lac alterationem in ventriculo non habere. Item cum laudemus lac asinæ, quod facile transeat, mel aut saccharum istam transeundi facilitatem impediet; vtrumque enim admistum lac ipsum incrassat. Tamen tum vt lac ipsum suâ serositate fundum ventriculi non lædat, nec facile irritando diarrhoeam aliquam afferat, saccharum admiscemus; faciet enim vt moram in ventriculo aliquam trahat, & ita coquatur, deinde coctum à natura distribuatur. Et vt aliis locis obseruauimus ex Galeno, si aut mel, aut sal lacti admisceatur, fieri non potest vt lac in ventriculo concreseat. Immò dum serum præscribit iis quibus ilia obmurmurant, & salem & mel remiscet. Cæterum visum est è re fore si loco lactis asinini, hyeme præsertim, quo tempore butyrosus lac non suppetit ob herbarum penuriam, aut negligentiam eorum qui non ad auxilium, sed ad quæstum, asinas alunt, vteretur iusculo consumpto ferè pullo & carne vitulinâ, cum passulis, hordeo ritè lauto, cichorio, lactuc. seride, acetosa, & pugillus hyssopi sub finem in eo iure madescat. Ni

Hhh iij

Cap. 6.
lib. 6 de
placitis.

de alim.
mentis.

Com. in
apho. 6. 4.
lib. 5.

430 CONSILIORVM MEDICINALIVM
aliud in ientaculo dabitur. Quod si magno vsu eiusmodi iuscu-
lorum fibræ alui laxentur, aut albicans deiectio appareat, tem-
perandum erit: firmatâ deinde aluo redeundum erit. Cùm ca-
tarrhus infestabit, bolus cassiæ deuorabitur: aut si aluus lique-
scat, eiusmodi tabellæ concinnabuntur.

*℞ electuar. diaireos simplicis 3 s. electuarij triasant. simplicis 3j.
rasura ebor. cornu cerui, puluer. glycyrr. an. gr. vj. cinnamomi gr. 3. am-
bre grisea gr. ij. rhabarb. 3 ij. s. cum saccharo in aqua rosar. soluo.
Fiant tabellæ 3 ij. deaurata. Utatur sepe.*

Vtetur pincis & amygdalis decorticatis cum saccharo. Vel
pineæ excipientur saccharo rosato. Sæpè syrup. de bechio,
conserua bechij, syrupo de siccis. Liberale prandium esto, par-
ca cœna: serò assa, elixa manè conuenient. Caput vernice sus-
fiendum. Thorax illinendus, & panno escarlatæ contegendus.
Hydromel hyeme conueniet. In aqua mica panis albi macera-
bitur. Vitandus statim à cibo somnus. Coriâdrum sæpè mādēt.
Panis erit syncomistus: sin macrescere videbitur, vtetur pane
pisto & subacto in lacte. Vitanda ciborum varietas. Iupiter fri-
gidus fugiendus. Hyeme aëre calido moderatōque contine-
bitur.

ANNOTATIONES.

1. Nam Aristoteles vult puellas ante statum menstruorum tempus
nec varicosas, nec hemorrhagicas, nec menstruas esse debere.
2. Initio destillationum quidem corpus plenum est, sed post emacia-
tur ac extenuatur, ut ex lib. 1. de morbis apparet.

CONSILIVM LXXXVIII.

*In quo quaritur, Cur exigua puris excretionē animus facile
deficit?*

CIVM Medici vulgò in missione sanguinis liberales esse so-
leant, mirum sit cur in educendo pure tam restringantur.
Tamen quæ materies in pus abit, sanguis aëtu erat, siue is intra
naturæ limites contineretur, siue ab iisdem recederet. At ex-
perientia probauit exiguò pure aut vi excreto, aut suâ spon-
te

mananti, maiorem virium iacturam contingere, quàm si sanguis aut plenius detrahatur, aut sponte fundatur. Ideò vetabat Hippocrates ne purulentis conferta fiat euacuatio: & tamen lulentæ venæ sectiones ab eodem commendantur; immò procedit sæpè donec sectione animus linquat, deficiatque. Quæ duo inter se pugnant. Cur si dum tumor aliquis partem occupat cum tensione & rubore, sectione ad leipothymiam celebratâ, tumorem prohibemus incremento, immò non modò materiam antecedentem auertimus, sed de coniuncta adimimus (quod liuor sanguinis docet) quæ proxima puris materia est? immò ferè pus est, cur cum sanguis iam actu & reapse pus erit, idem non facitabitur? Sed contraeductio paulatim fit metu exolutionis virium & spirituum. Testamur nos dolorem lateris quatrduanum & vchementem, cum frustra ternam sectionem celebrauissemus, & sanguinem laudabilem detraxissemus, sectâ quarto venâ radicibus sustulisse, cum tria insignia vascula sanguine purulento plena detracta essent. Itaque allectio ægri tam subita, & eductæ materiæ qualitas, coniunctam ipsam materiam decisam detractamque confirmauit, & tamen conferta est euacuatio, cur non animus deficiebat? Cur itaque conferta sanguinis excretio non eque exoluat ac puris ipsiuseductio? Nam in febribus putridis cum sanguis subviridis, aut purulentus adimitur, idque insigniter, minus id naturæ molestum est quàm si in iisdem febribus laudabilis sanguis minore copiâ detraheretur? Declarat ægri alacritas cum saniosus sanguis eductus est: sed num iste saniosus sanguis puri analogos est? Ideò Princeps aliter quàm quidam Medici, quorum opinionem exposuit Galenus, qui post quartum diem nefas esse duceret ferire venam, in periodicis febribus tertium paroxysmum expectari voluit, vt non prius celebretur sectio quàm à se mutatus sanguis fuerit: ac si putaret naturam alacriorè fore putri excretâ materiâ, quàm sanguine laudabili. Dysenteria & hæmorrhagia sæpè videntur *αυτοματοι*. In quibus *αυτοματοι* sanguis educitur: mulieres aliàs vomunt, aliàs insignes satis per vterum effluxiones patiuntur exiguo virium dispendio, & tantula puris excretio, tantæ virium exolutionis causa existit? Galenus explicat quidem cur à ruptione interni phymatis puris effusio leipothymiam accersat, dicitque id fieri ob spiritus vitalis dissipationem. An non etiam missio sanguinis

*Aph. 29.
lib. 6.*

*Aph. 23.
lib. 1:*

*Et 4/a
m. tuch*

*Com. in
hystor. de
anaxio-
ne.*

*Com. in
aphor. 8.
lib. 7:*

432 CONSILIORVM MEDICINALIVM

spiritus effluunt? Cur spiritus sanguinis ac puris non æquè sunt comites? Immò pus contra naturam quid est, & sin exclusione indicat, vt sanguis sui conseruationem. Quod si & pure & sanguine effluente spiritus vitales inaniuntur, in phlebotomia cum sanguinis largior sit excretio, maior quoque spirituum erit euacuatio. At credo, arteriotomia sine manifesta ista exolutione fit, & tamen confertim spiritus vitales effluunt ac exiliunt.

Sunt qui ad dolorem qui in aperienda vomica infligitur, recurrunt, vt idem fiat quod in sectione venæ malleoli; quæ quoniam dolorifica est, idè deliquium affert potius quam sectio in aliavis parte. Sic quia aperta vomica cauterio aut ferro dolor fit, pus membranas pungit dum effluit, spiritus euacuantur, neruuli necessariò feriuntur, tumor aderat dolorificus (at nil aliud què vires deicit ac dolor) eoque magis, quò partibus neruosis est propinquior, aut emunctoriis partium: immò in minimis furunculis tantus sæpe dolor adest, cum exigua moles sit materia, vt animus sæpe linquat (nisi fortè ad id referatur) mirumne sit si ratione doloris qui ob tumorem & inflammationem præcedit, & eius qui aut cauterio, aut ferro infligitur, & ratione cætionis neruulorum arteriolarumque, & actionis rei effluentis, & vaporis qui à mota putri materia excitari solet, tantopere vires exoluantur? Immò, quod mirum, si portiuncula aliqua sanguinis cum pure effluat, vt pus cruentum sit, maior est virium ruina. Vnde hoc est si dolor hanc leipothymiam affert ob discissionem corpusculorum illorum, in sectione venæ secantur quoque vasa & cutis: item diu sanguis effluit donec tria compleantur vasa, non tam diu pus fluit. Cursus sanguinis diuturnior non afferat eam leipothymiam, quàm breuissimo tempore puris effusio? Dum absceditur sphacelatum crus, arteriæ magnæ & nerui scinduntur nullâ ferè animi defectione, in tormentis festuca contunduntur rumpunturque artus, & tamen nullus animo deficit. Minima arteriolarum sectio tantæ exolutionis autor erit? Nihil fortè dicas in cruris ablatione, & artuum confractione violentam esse spirituum agitationem, vt natura omnes tum vires & opes explicet maiori vi non cessura. At cum pus educitur, languet natura, nec sese ita erigit.

Alij existimant idè puris educationem maiorem virium leturam intendere, quod natura in partem abscessu occupatam multum

multum sanguinis & spiritus miserit tanquam suppetias suas. Quorum omnium euacuatio contingit cum pus effluit; hinc animi defectio. Natura quidem opem subsidiariam latura in affectam partem ea relegauit. At non est probabile ob euacuationem sanguinis & spiritus in subsidium missorum tantam perturbationem & defectionem euenire. Multo enim maior vtriusque sit euacuatio in phlebotomia, quam in efflyctione puris: immo spiritus in parte ipsa contenti, & sanguis iam corrupti sunt, & a sua temperie descierunt: dum per sectionem sanguis mittitur, spiritus limpidi & puri effluunt. At credibilis est naturam amantem esse rerum gratarum quam ingratarum, ut crises liberales testantur: quanquam concedimus in tetro etiam pure spiritus laudabiles contineri, sed quæ abscessit & deposita est materia naturæ molesta est, cum in pus versa nonnisi sui exclusionem insinuat: secreta iam est, & ideo exclusioni parata, particularem quandam in membro affecto plethoram facit. Ideo exclusio videtur à natura fieri. At cedò, quanta solet esse naturæ alacritas cum id excluditur quo premebatur?

Galenus causam videtur aliqua ex parte explicasse, cur conferta aquæ aut puris exclusio non sit molienda; non quin tota excludi debeat, sed non ἀπὸ πύου. Et cum illud ἀπὸ πύου significet contrarium τῷ πύου βελγῷ, & τῷ πύου σπινθηρί, id est, & ad quantitatem, & ad tempus referatur: ita hoc loco sumitur, ut fiat exclusio totius puris, non in vno tempore, sed in pluribus, ut pluribus vicibus vna conferta copiosaque exclusio compensetur. Quod autem nunc aperta vomica excernitur, confertim quodammodo fieri debet, ne si pauca puris excretio longo tempore fiat, ista diuturnitate debilitet: sed vno tempore omnis euacuatio non est molienda. Gal. verba sunt: *Cum quis tumor suppurat, & is magnus, æque est periculosa in aliis partibus confertim facta euacuatio, ac aquæ in ventre, & in thorace puris, cum illud animus linquat, vires labascant, ut ei imbecillitati viriumque ruine remedium queratur. In his itaque ob magnam corporum diuisionem, dissidium ac distentionem oscilla corporum quorundam arteriosorum adaperiuntur, quæ prius tanquam στήματα quoddam, id est, operculum pus ipsum continebant, quo confertim euacuato, multorum una spirituum effluxio contingit, & consecutio. (utitur enim verbis στήματα καὶ σπινθηρίαι) hincque laborantibus creatur periculum. Hic meminit tumoris magni, qui necessario diremptionem, dissidium, distentionemque magnam affert; vnde dolo-*

Tom. I.

Iii

434 CONSILIORVM MEDICINALIVM

res, vt & distentio, & tumoris magnitudo ad inducendam istā, de qua sermo est, imbecillitatem, videantur concurrere. Tamen si diligenter locus legatur, eam virium iacturam vni spirituum euacuationi attribuit: Euacuationem ipsam infert arteriarum sectio, quæ pus ipsum continebant tanquam operculum quoddam. At iam docuimus non sufficere ad leipothymiam inducendam istam spirituum exclusionem, cum & in arteriotomia arteriarum corpus secetur (dicitur enim *ἀπὸ τοῦ τῶ ἀρτηρίας τὴν πύλιν*) & in phlebotomia spirituum fiet euacuatio. Alio in loco autem puris exclusione *ἐκλύουσι* induci ob exclusionem spiritus vitalis docet. Hic generalius *τὸ πνεύματος* exhaustum recenset, non addit *τὸ ζωτικὸν πνεύματος*: & hoc necit theoremata: *Commune est omnibus ruptionibus vt exolutio virium defectioque animi consequatur, idque ob spiritus vitalis effluxum.* At antè quæsitum est, cur eruptione puris sequatur potius vitalis spiritus inanitio, quam sanguinis detractione? Nam non ineptè quidam interpretantur eam leipothymiam ad quam vsque ducit aliquando Hippocrates in magnis doloribus & inflammationibus, de exclusionem spiritus animalis, eaque non inclusiua, sed exclusiua, vt desinat fluere cum ea aduentat, non cum actu iam est: quoniam vacuatio spiritus vitalis plus periculi intentet, quam spiritus animalis. Propterea *τὸ συκοπῆς* nomen vsurpant pro præcipiti omnium virium ruina, euacuato aut dissipato spiritu vitali, qui spirituum animalium est fons & scaturigo. Nomen autem Leipothymia & *λειποθυμία* ad defectionem animi referunt ob spiritus animales exhaustos; vt *τὸ ἐκλύσεως* nomen ad vtrumque refertur. Cum tamen ait commune esse omnium ruptionum vt animi defectio contingat, non est vsus verbo syncopes, sed leipothymia: vim autem eius adauget nomine *τὸ ἐκλύσεως*, quam ferè vocem *ἀντὶ τὸ ἐκλύσεως*, aut *τὸ ἀδυναμίας* vsurpant. Et cum leipothymia ipsa potest virium *ἀνταγρία* esse, cum syncope non potest esse. Nos autem cum parum probabiles tantæ exolutionis causas ob paucitatem effluentis puris comperianus, alias excogitare, & breuè exponere in animo est. Paulò antè cumulum rationum adduximus ob quas ea dissolutio eueniat, quoniam (pace Galeni dicam) non est satis dicere id fieri ob spirituum effluxum. Dolor qui à ferro aut cauterio infligitur, immò & doloris opinio quæ inhorrescunt cum abscessus ruptionem subolfaciunt punctio membranarum dum pus fluit, euacuatio spirituum

Com. in
aphor. 8.
lib. 7.

fectio neruulorum, arteriolarumque & cutis, dolor qui primus
 aderat ob puris ebullitionem & putredinem, necnon partium
 tum distentionem, tum diremptum, tetra anathymiasis ab erū-
 pente elata pure; denique hæ omnes causæ in vnum coeuntes
 hanc fortè exolutionem afferunt, non autem vna atque altera
 causa, alioqui sanguinis detractio maiorem virium prosterne-
 ndarum occasionem afferret. At nos probabiles alias causas com-
 miniscimur. Pus etsi exclusionem sui indicat, naturæ tamen
 opus est, immò quid elaboratius quàm sanguis: & cum in causa
 antecedente sanguis sit laudabilis, ex euentu aliena sit natura,
 quoniam tanquam onus depositum est in partem, aut in ea ipsa
 parte ob imbecillitatem collectus, aut vi aliquâ attractus, &
 quantum potest nititur natura eum partibus solidis assimilare.
 Porro natura est vis ipsa partium solidarum. Et si vis infertur par-
 tibus solidis, non sine querela id fit. Æqualitas, albor, laxitas de-
 clarat naturam eò processisse, vt si materies pateretur, id totum
 exactum excultumque tanquam cambium, vltimâ assimilatio-
 ne in naturam partis conuerteret. ³ Sic & ratione qualitatis,
 quatenus refert ideam spermaticarum partium, & ratione spi-
 ritus tum in materia coerciti, tum ad eam perenniter affluentis,
 non potest artificio Medici erumpere, nisi naturâ reclamante;
 tum quia spiritus exiliunt, tum quod pepasimum receperat, ac
 idem ei pene sit ac si propria foret ^{πεψις}. Eodem enim in pepsi
 & pepasmo naturæ consilium dirigitur. Hippocrates scribit
^{πύον ἡλικὸς καὶ ἀρτηρίας τροφή} *Pus vena & arterie est alimentum*: vel arteria
 & vena propriè nutriuntur materiâ albâ & sanguine dealbato,
 vel cum natura morâ conficit sanguinem in pus tanquam in fa-
 miliarem materiam agit ac si ea in alimentum esset cessura. Hinc
 videmus si parum sanguinis cum pure effluit, exolutionem ma-
 iorem sequi, quod ex eo sanguine tanquam vltimo alimento in
 sinu iam partis deposito natura carere nequeat, & non, nisi cum
 querela, effluere sinat. Quid si puri cum spermate tantam ana-
 logiam esse dicamus, vt quemadmodum tantula seminis ex-
 cretio ob materiei ipsius naturam, quod iam ferè pars solida sit,
 & res naturæ benigna, & spirituum copiam, corpus breuè pro-
 sternat, ita & puris eruptio? In vtroque naturæ caractere elu-
 cet; ideo Hippocrates semen partem hominis potentissimam
 conuincit, quod eo tantulo excreto homo imbecillimus relin-
 quatur. ³ Pus & semen partes potentes dici possunt, quod in

Lib. de
 genit.

436 CONSILIORVM MEDICINALIVM

utrumque natura vires excreuerit, tanquam in rem proximè in alimentum cessuram, non partium carnosarum, sed spermaticarum. At sanguis etsi naturæ gratus, non adeò tamen gratus ac id quod iam characterem, ideam & naturam partis solidæ (in qua vis omnis hæret) suscepit. Accedit quod multus adeò in corpore sanguis sit, ut detractio incommoðū (nisi quis adeò imbecillus sit ut minimum non ferat in corpore tumultum) non facile sentiatur. Addam ad superiores rationes vnam, in pure quid malignum continetur, ut eo agitato per sectionem facile per arteriolas ad cor vis deferatur. Hinc in malignis tumoribus, præsertim si nervis insignibus propinqui sint, vulgò eruptione pauci puris tanta exolutio sequatur, ut in propinquo mors esse videatur. Et quòd sanguis tumorem faciens extra vasa sit, minus molesta esse deberet detractio quàm si in vasis contineretur, & à natura regeretur. At quia è vasis effluxit, facilius corrumpitur, tetrumque vaporem spirat, unde nisi tempore excludatur, cum confectum pus est, breui liuescit & graueolet, & inficit partem. Quod ab Hippocrate dictum, *Si sanguis in tumorem effunditur, suppurat*. Galenus ait melius esse si dicamus corrumpi. Hinc patet egressum sanguinis è cõceptaculis corruptionis causam esse. Quæ corruptio inficiens spiritus dum mouetur (quia omnis materia putris quiescens minus mala esse solet quàm si moueatur) & excluditur, mirum-ne sit si *ἀποδιώσεται*, aut *ἐκλυσι* consequatur.

ANNOTATIONES.

1. Immo in praxi obseruamus cum sanguis impurus educitur luculenter, id fieri & exiguo virium dispendio, dummodò corpus sit repurgatum: cum sanguis purus educitur, statim exolutio sequitur: at impuro sanguini cum pure analogia est.
2. Et sudor, & seminis excretio licet exigua, & puris, vires conuellit.
3. Videmus chylosam euacuationem per aluum plus asserre exolutionis virium, quàm multam aliam euacuationem.
4. Qui sit ut copiosa hemorrhagia, aut per aluum exclusio non tam deiciat vires quàm sudor? Quoniam cum sudore spiritus euacuantur multi, & rori ipsi, id est, ultimo partium alimento vis inferitur. Quomodo & cum pus tanquam partis vltimum alimentum, demitur, vis quoque parti inferri videtur.

5. Tamen aliquis obiciat de lacte, quod cum sit ultimum alimentum, & album, tamen magna satis copia detrahatur innocuè. Alij recurrunt ad opinionem Aristotelis, qui putat mutationem tam subitam incidere cum pus, aut simile quid effluit, quod in locum euacuati puris calidi succedat aer frigidus, minime mutatus, qui ferit membranas.

• CONSILIUM LXXXIX.

De Parotidibus.

IN ANO Memmio dolores aurium tertio die excitantur. Quæritur an isti dolores & hæmorrhagiæ in tertium & quintum diem incidentes criticae? Cur non criticae essent? & tamen vtrūque tertio & quinto die Medicis suspectum fuit. Si sudores tertio & quinto incipientes boni, cur non & parotides, & alia id genus? Galenus in comment. ait non sudores tantum in eos dies incidentes, bonos, sed & deiectiones, & abscessus, si modò effatu digni. Scio quidem Hippocratem nolle eos dies esse decretorios; tamen *τῶν κριτικῶν* in eos dies possunt incidere: Ac si dicat, iudicatoria quæ non iudicant suspecta sunt: sed hoc bonum si saltem iudicatoria in dies indices & intercalares. Itaque eo modo tertius & quintus iudicantes erunt, quatenus signa, & casus qui diebus illis apparent non sunt mala, si dies illi cum aliis malis diebus comparentur. Nec abs re ait, si sudores tertio incipiant, vt per verbum, incipere, significetur aggressio naturæ quæ ob tarditatem non potest adhuc indicare: cur non etiam quartus dies iudicatoria tantum signa habere dicatur, cum nebula quarto apparens sit iudicatoria, non iudicans. Sed alia est ratio, nam index dicitur, & nebula indicium dat futuræ criseos. Sed cum tertio aut quarto die sudores incipiunt, vt concedam eos non iudicare, quia tamen iam potentis naturæ aggressionem significant, idè in bonis sunt. Et oportet illud quod sit naturam validam ostendere, vt si riuulosè iis diebus fluat sanguis, licet non indicet, tamen bonum est id fieri factâ collatione cum alio naturæ conatu languidiusculo. Nec abs re addit Galenus, *deiectiones* (quod idem de ceteris excretionibus debet intelligi) *tertio & quarto die apparentes, & incipientes* (quod posterius verbū debet notari) *bono esse si modò sint ἀγένοποι*. Sed omninò parotides

Lii iij.

438 CONSILIORVM MEDICINALIVM

non videntur critica, sed potiùs iudicatoria, quocumque modo & die apparuerint, quoniam sunt abscessus morbo impares, nec febrem solvunt; & quia dolorifica sunt, & propter vicinitatem cerebri: tum maximè quia omnis translatio à partibus inferis ad superas suspecta esse debet. Quæ omnia plenius Galenus comm. in Prorrhet.

Com. in
part. 67.
sect. 3. li.
Prorrhet.

CONSILIVM XC.

Ad Quartanam leipothymie implexam.

SUPERIORIBVS paginis duarum mulierum quartanâ laborantium historia commemorata est, ac præsertim eius quæ Dorseti Præsidis vxorem occupabat. Nunc verò æquum est adiacere ea quæ euenerint, & de quibus coacti Medici deliberarint. Cùm difficultas esset summa in inuestiganda causa cuiusdam leipothymie quæ illam terrefaciebat, consilium inritum est ea de re satis celebre. Tum demum ea deliquia quæ comites habent sudores frigidos, & partium extimarum, sed præsertim crurum & tibiæ rigores, cùm accessiones febris quartanæ definere visæ sunt, aut cùm parum commemorabiles forent, complicatas diebus intercalariis alias accessiones, ordinatis deteriores haberent: vt aut semitertianæ febris suspicio esset, aut lentæ, aut complicatarum accessionum, aut nouæ materię in nouo foco excitatæ. Et quod mirum est, tum demum semen morbi quod sepultum visum est, excitatur ac reuiuiscit cùm menses erumpunt: immò obseruauit omnia in peius ruere, tum cùm fluxerunt menses, etsi copiosè satis profluxerint. Nos huius rei duas tresve causas affingere voluimus: nam incertarum rerum non ita firma certaque ratio reddi potest: Prima est illa perturbatio quæ euenit erumpentibus mensibus, vt quemadmodum alias menstruas mulieres ante effluxum sanguinis varia attingunt symptomata (vnde malæ septimanæ vulgo dicuntur) si hanc illa symptomata sequantur. Ante eruptionem enim nihil penè affligitur. Secunda est, quia cùm ipsa satis superque ex obseruatione suæ peculiaris naturæ phlebotomiam non ferat quantulacumque sit, mirum non sit si per vterum excretionem floriduli sanguinis non ferat, tametsi excretio illa sola sit

naturalis, & mirificè alias mulieres iuuet; ² quia paucò abundat sanguine, siccum habet aridumque & calens impensè hepar, vt eius minimam iacturam non patiatur. Tertia est ^{per iuueniles}, quò maximè tenetur post eruptionem mensium; quasi vasa vteri ita conuineant & concidant, vt illa fœda excretio non fiat nisi vi naturæ vasa ad fluxum mensium referentur: vt materia fluxus illius fœdi quæ veluti prostat & pro foribus est, quâ data porta larga copia excernatur. Ac reuerà multò cumulatiùs & magis affatim excernitur fluxus menstruus, quàm antequàm fluxerint. Accedit quod omnis commotio materiei fœdæ & lutosæ inquiet & inficiat prauis halitibus spiracula corporis & partes maximè momentaneas afficiat, quasi commota camarina, vt aiunt. Sic quia omnes quasi partes commouentur, colluies re-stagnans resque excitatur, quæ in corpore præsertim languidiusculo magnos excitat tumultus. Si mineræ virtutum staret, non ita percelleretur. At minimis momentis corpora natura imbecilla, & infirmis partibus prædita, & maximè morbis afflictiora debiliora reddita, valde turbantur ac eliduntur. Nos autem satis obseruauimus partes internas imbecillas esse: siquandò autem mutatio commotiòque accidat, id fit maximè cum vteri vasa referantur, aut vterus ipse mouetur. Nam si qua pars alia toti corpori consentit, & ex Hippocrate totum corpus ^{aut} ^{Lib. de} ^{locis in} ^{benz.} commouetur, vt vnius motum altera pars facillè excipiat. Deliquia ista non ita nos terrebant quod syncoptica non videntur; nam nec magna, nec frequentia, nec sine causa erant manifesta: quanquam successu temporis euenire posset vt ad eam naturam accederent. Mulier ista ferè hypochondriaca est, obstructionibus mirum in modum patet; quod declarauerunt fœdi colores quibus illa per annos duodecim laborauit. Si autem exquisitus sensus ventriculi, aut nativa infirmitas deliquij causa foret, cur non aliis temporibus æquè deficeret anima? Narrauit quidem percepisse se à sinistro hypochondrio surgentem anathymiasin quæ cor petiisset. Duo erant valde notanda, quid causæ esset cur in accessionibus ordinatis non deficeret animus, sed in extraordinariis? vt ita dicam. Posterius, si ita obstructas habet mesenterij, venas (quod solemnia alui profluvia declarant) quid causæ sit vt tantum meiat, & crassas admodum vrinas habeat. Nam & exiguus mictus esse deberet, & vrinæ tenues ac veluti percolatæ esse deberent. De vrinis ita dicen-

dum. Multæ urinae fiunt aut copiam potus, aut defluxu catarrho-
so, aut per expressionem aliquam, aut per attractionem, ut in
diabete fit. In hac perennis est defluxio à capite, nitrosi sunt
humores, hepar squalens & calens, ut idem hepatis contingat,
quod renibus in diabete: immò perpetuò sentit quoddam in-
cendium in regione hepatis. Et nisi aut defluxio perennis esset,
aut metu hydropis ipsa sibi à potu temperaret, sitim haberet
inextinguibilem; immò non potest fallere sitim, nec aliorum
more qui pitissatione contenti sunt, eam explet nisi plenissimo
haustu. Probabilem *istius muliebris causam* asserimus ex
Hippocrate, quod ex cerebro esset: *si mordet, à ventre est*, ait
Hippocrates; *si non mordet, à capite*. Quamquam lib. de locis in
homine, id quod ab interno capite manat, mordere asseruat.
Summa est inappetentia, quia cum summa cura excogitatur ci-
bus, & cum offertur statim abominabilis est, summæ inappe-
tentia est argumentum, ait Galenus in historia de Euryanacti-
dis filia.

Lib. de
natura
muliebris

Hist. 6.
part. sect.
2. lib. 3.
Epidem.

Maximè verò omnium tantæ mutationis causam ad solstitium
hibernum reduximus. Nam quemadmodum circa æquinoctium
autumnale ea grauissimè habuit, ita instante hyberno solstitio
non mirum sit si tanta mutatio eueniat.

Verum quod maximè in ea mirandum fuit, est *ex illa* illa in
qua omnium quidem meminit, ratiocinatur probè, cibum ca-
pit, nec est *ἀπώστος*, & tamen ne minimum ferè corpus mouere
potest, immò ne manum quidem ad os adducere, adeò impo-
tens fit. Et id maximè euenit cum febris suscitatur: nam eodem
pene momento facies tota erubescit, calor in suris tibiarum
acerrimus percipitur, & manet tanquam *ἐκλεπιδία*. Credibile est
per cæcos meatus tetrum vaporem sese insinuare, qui si aut re-
ctà in cor ferretur, aut in principium neruorum, terrifica magis
symptomata excitaret. Vix autem talis morbus, & quod id in-
genium habeat, vnquam à Medicis est obseruatum. Nescitur
quo id referendum sit. Et, quod mirandum magis, nulla ferè in
pulsu mutatio percipitur etiam manentibus istis deliquiis. Ad
ea symptomata corrigenda hæc sunt ordinata:

Frictiones crurum & tibiarum: Applicatio cucurbitularum
internis fœmoribus: Item maiora frustula panis tosti iisdem
fœmoribus applicata. Noduli ex rosis & caryophyllis qui ma-
cerantur in aceto ut naribus admoveantur. Item frustula panis
tosti

roſti in aceto macerata, & quæ admoucantur naribus. Grana granatorum deſtillata frequentia. Et hæ tabellæ.

℞ pulueris electuar. diamb. & latit. Gal. an. ℥ j. diarrhodon abb. ʒ ſ. rafura ebo. cornu cerui, margar. elect. an. ℥ j. rafura vnicor. gr. x. cum ſacch. ſoluto in aq. roſ. ſiant tabellæ.

Item ℞ conſect. Alkermes ʒ j. theriac. & mithridat. an. ʒ ij. conſer. bugloſ. & meliſſ. an. ʒ ij. pulu. diamarg. frig. ℥ ij. Fiat pulis admo- uenda cordi ſuper membranulam.

℞ ambra griſ. gr. ij. rafura vnicorn. gr. vj. rhabarb. gr. x. Fiant pi- lule cum vino albo.

℞ aquar. meliſ. card. bugloſ. & morſus an. ʒ ij. colentur per mani- cam hippocr. cum elect. diatrag. frig. ſant. roſ. & pauco cinam. Capias cum parte deſtill. reſtauratiui ſequentis.

℞ conſer. bugloſ. nenuphar. viol. meliſ. flor. cichorij & vngul. an. ʒ ij. iuiub. ſebeſt. an. xx. num. pincarum piſtaciarum an. ʒ ij. paſſul. mundat. quar. j. glycyrr. contuſe ʒ ij. carnem caudarum cancrorum flu- uiatil. parat. & macerat. in lacte lib. ſ. carnem duorum aut trium tur- turum, carnem vnius capi iuuenis & duarum perdicum, ſem. bombacis, curij, melonum, an. ʒ ſ. decoct. duorum pullorum cum hor- deo, ſcariol. acetos. bugloſ. & borag. alteratorum, lib. vj. Miſcean- tur omnia diligenter ſecundum artem. Diſtillantur per cineres in alam- bico vitro.

℞ præd. deſtillati lib. ſ. paſſetur per manicam hippocratis cum ſacch. cando. capiat tempore deliquij cum tertia parte aquarum ſtillatitiarum.

ANNOTATIONES.

1. Nam Hippocrates lib. 1. de morbis mulier. annotat bilioſis mu- lieribus ob menſtruam purgationem, puſilanimitem, & multa alia incommoda ſequi.

2. Si Galenus cap. 13. lib. de miſſione ſanguinis, dum loquitur de vi- ris, ait tum liberalius vacuandum cum homines ſunt mediocriter graci- les, & amplas venas habent, & minimè candidi ſunt, nec tenerâ carne præditi. At hæc mulier tenerâ carne prædita eſt, gracilis, venas anguſtas habet, &c.

3. Illam valde exercuit immodicus ſanguinis fluor. Mirum non fuit ſi pro aſſumpti cibi ratione non roboretur, ac præſertim pedes exangues penè ſint. Hippocrates lib. 2. de morbis mulier. ſcribit vnum valde no- tandum: Sanguis rubicundus multus fluit ex febrilibus, & torpor

Tom. 1.

Kkk

442 CONSILIORVM MEDICINALIVM
corporis, & crurum perfrigeratio aduenit, dolor clauicularum.
*Non abs re dicitur ex febribus; & hoc commentario dignum est. Nam
contrà, alijs mulieribus affectis febre in totum menses desinunt: cur ergo
alijs febres excitantur?*

3. Et ei cum immoderatiùs fluere menses, visum est optimum ut
raretur Symplicius astringens quo medio mensium cursu videretur ad reprimendum illum, & ad succum & vim recuperandam in ribis litus ex oleo
violato comparatus est prius lauto decocto chamæm. & rosar. Forus ex decocto
amazorum addito vino albo.

CONSILIVM XCI.

De hepatis phlogosi.

DO. Lyssæi feruus febre acutâ corripitur. Dolor ad hypochondrium dextrum. Satis colligebamus non esse pleuritim. Tamen summa erat difficultas ducendæ animæ, & quæ in horas increfceret. Spes erat eam sedatum iri vno medicamento. Contrà aucta est. Metus suffocationis. Reuerà phlogosis erat pituitosa circum eas partes, & nisi ternâ sectione venarum prouisum fuisset, metus erat abscessus. Hippocrates scripsit:
Quibus dolor ad hypochondrium sine inflammatione, his febris superveniens, solutio. Si morfus est, & dolor, hoc inflammationem, aut quid simile significat. Si talis dispositio non adfuerit, & morfus abfuerit, dolor tum fit aut propter obstructionem, aut flatum, aut inæqualem aliquam intemperiem: quæ omnia calor febrilis tollit. Quanquam de obstructione dubitari potest. Nam si magna febrium putridarum pars ab obstructione est, obstructio ista febrem afferret, nedum febris eam tolleret. Sed cum febris in isto ægro sequiret magis, nec de flatu, nec de sola obstructione verebatur, sed de inflammatione potiùs, aut simili aliqua affectione. Et verò ex Galeno ita ratiocinabamur: Carnosâ parte hepatis inflammata grauis fit dolor: tunica circumducta, vel valis inflammatis, acutus. Sed biliosus humor & acutus dolorem auget: item spiritus flatuosus exitura non habens: remittit autem pituitosus. Si mediocris dolor est, & non pungit, ut qui in membrana succingente est, nec ad clauiculam aut ilia pertingit: contingit ipsum dolorem fieri, carnosus

*Aph. 40.
lib. 6.*

*Com. in
aphor. 5.
lib. 6.*

costarum partibus aëstis: ideo non est periculosum, nec magno eget auxilio. Ceterum cum hepate inflammato dolor ad iugulum peruenit, potius sequitur venæ cauæ aut arteriæ distensionem quam membranæ. Nam proprius dolor venæ & arteriæ est tanquam extensa in longum chordæ. Nil prius fuit quam & ad auerterendam istam inflammationem quam futuram suspicabamur, & ad febrem iugulandam quâ forrè consumptus esset, ter venam ferire, & largiter sanguinem detrahare.

ANNOTATIONES.

1. In plerisque mulieribus, præsertim quibus hepatis præcalidum, & quæ in usu vini essent liberaliores, talem affectum animaduertimus, ut in ea quæ ad rosam rubram habitat. Cum causa quæ affectum parit, præsertim calidum, extra diaphragma est, adest quidem spirandi difficultas, sed tussis non adest: nisi proximè attingat diaphragma, ut in inflammatione gibbarum hepatis contingit, in qua inanis est tussis, non propriè dicta tussis, quod id contingat ob transudationem quandam.

2. In febribus circa viscera dolores mali, aphor. 66. lib. 4. Galenus istos dolores non vult esse à forti obstructione, ab inflammatione, ab erysipelate, aut abscessu, alioqui quæ adesset febris ea tantum symptomatica foret. Comment. in aphor. illum. & in aphor. 73. lib. 4.

CONSILIVM XCII.

De præcautione febris lentæ & destillationis in pulmones.

HVC ONI scribæ in metu febris lentæ & destillationis in pulmones, cum hepar in vitio videretur, maioraque potestâ minarenrur, hæc instituuntur.

℞. radicū cicor. acetos. gram. polyp. glyc. asparagi an. ℥j. endiuie, buglos. borag. fumar. agrimon. scariolæ, scolopend. ceterach. cortic. interioris ramorum viridium tamaricis an. m. j. sem. melon. citrij. cardui benedicti & carib. an. ℥ iij. sem. anisi, papauer. alb. an. ℥ j. passul. integr. prunorum dulc. an. p. 4. corticum pomor. redolentium ℥ ij. Fiat decoct. ad lib. ij. ad consumptionem medietatis.

℞. præd. decoctionis lib. s. succi pomor. dulc. fragran. quart. j. sacch. & syrup. viol. an. ℥ j. s. fiat iulep. clarum aromatiz. santal. citrino, &c.

Kkk ij

444 CONSILIORVM MEDICINALIVM

cortice citrj secco. Capiat alternis matutinis tribus horis ante cibum.

℞. eiusdem decoct. lib. s. succi pomorum dulc. ℥ iij. vini albi debili ℥ ij. folior. sena ℥ s. agarici trochis. ℥ ij. rhabarb. ℥ iij. cinam. santal. citrini & ligni aloes veri an. ℥ j. Infunde per noctem. fiat express. dissil. sacch ℥ ij. syrup. viol. & de cichor. simpl. an. ℥ j. Fiat apozema, clarific. & aromatis. utatur sigillatim post singulas apozematis doses.

℞ pulu. electuarj diatrag. frig. diatrium santal. diamarg. frig. an. ℥ j. diarrhod. abb. ℥ j. arom. ros. Gabr. ℥ s. Fiat electuar. per tabell. pond. ℥ ij. cum sacchar. soluto in aqu. ros. endiuie, in quibus prius ℥ ij. glycyrrad. infuse fuerint. Sumat unam manè ante suum iusculum.

Bis mense supraddicto syrupo purgetur, vel syrupo de cichor. compos. cum rhabarb.

Alius puluis.

℞. pulu. elect. diatrag. frig. & diaireos an. ℥ j. lign. al. ℥ s. boli arm. ℥ s. rhabarb. gr. xij. sacchari penid. ℥ s. margar. elect. gr. vj. unicorn. gr. ij. cum sacch. soluto aqu. buglos. macerat. ros. siccar. & infusion. gr. vj. cinnam. fiant tabella.

Iuuabit aliquando tempore pluuioso aloë ad ℥ ij. cum pane sacerdotali ita ut toto die utatur iusculo refrigerante, & elixis, & capiat ℥ vj. aqua. saccharata, & fiet in ingressu lecti post cœnam sobriam.

Capiat lac asininum ex saccharo prius soluto in aqua ex cochleari ut minus hereat.

Utatur vino diluto. Vinum autem diluetur aqua in qua pomi à curti pendulo frusta aliquot maduerint.

℞. polypod. ℥ ij. rad. cichor. glycyrr. an. ℥ j. buglos. m. j. meliss. scarol. an. m. j. ceterach m. ij. sem. citon. melon. concisor. an. ℥ iij. flor. violar. tapsi barb. an. p. ij. Coqu. in lib. j. s. succi pomorum. dissil. sacchar. lib. j. utatur quotidie manè & serò, si volet.

CONSILIVM XCIII.

De Arthritide.

MORBORVM quidam cogniti sunt, incogniti alij. Ad incognitos multa remedia adhibentur analogismo quodam & epilogismo quæsitâ, periculi faciendi causâ: & ita infra modum confidetur, ut si non aliquod commemorabile auxilium afferimus, saltem non obsumus. Et interea si secundum rationem

omnia fiant, ne tamen pro agentium voto res procedant, per-
seuerandum in remediis quoad aut certum magis sit de morbo
ac constituatur, aut noua occasio, nonnunquam consilium que-
ratur. Cognitio morbi plurimum ad remedij inuentionem va-
let, immò & cognitio morbi & curatio retro meant ac recipro-
cantur, vt quodam in loco asseuerat Hippocrates. Non tamen
si morbus cognitus, omninò curationem admittit. In eo genere
sunt epilepsia, febris quartana, apoplexia, cephalalgia, calcu-
lus, quorum sæpe causa & idea sunt in propatulo, & tamen pro-
derelictis habentur. In horum censu habenda arthritidis (quæ
tum dicitur cum aut omnes partes occupantur, cumque errati-
cè modò pars vna, modò altera obsidetur?) Ita enim doctè ad-
modum Galenus distinguit arthritin ab articulorum dolore ge-
neraliter dicto. Nam illo in aphorismo Hippocrates ait arthri-
tides in squaloribus oriri; Galenus functus legitimo interpretis
officio negat arthritin verè dictam in siccis temporibus oriri
posse: Ac si dicat necessariò humorem adesse debere: at qui ad-
esse potest in siccitatibus (quas αὐγὴν vocat) Itaque dolores
quidem articulorum excitari possunt tali in tempore, at non ar-
thritidis. Et citat Hippocratem in Epidem. *In Aeno legumina come-*
dentibus infirmitas crurum, & qui orobis vescebantur genuum dolores
habebant: non arthriticos vocat, sed genua dolentes. Sic aliud
est arthritidis, aliud articulorum dolor: & tandem concludit ar-
thritin vocari non cum vnius articuli dolor est, sed cum mul-
torum. Quanquam mancus etiam est eo loco Galenus. Et cum
pars vna siue articulus laborat, tum à parte nomen sortitur mor-
bus, diciturque aut chiragra, si manus; aut podagra, si pedes oc-
cupentur. Ac de arthritidis causa, periodis, materia, scaturigi-
ne, morbi essentia, hyparxi, motu, cur si sequantur inflamma-
tiones conuulsiones non oriantur, an vnus sit humor, an multi-
plex, immò & de remediis ita inter Medicos pugnatur, vt nil
dum hætenus statutum sit. Vnde Paulus: *Huius affectus varia*
cause à me explicantur, interdum verò caca ipsius origo est. Et mirum
esse possit cur qui ischiade laborant ferè de aliis articulis non
cōquerantur, cum tamē morbus coxarius ad arthritin pertineat:
at si vel gonagravel podagra quēpiā molestat, nō priùs hunc do-
lorem ad arthritin referimus, quàm viderimus aliam partem
occupari ac dolere; immò, vt antè exposuimus, arthritidis es-
sentia in hoc consistit, vt vagus, incertus, & periodicus dolor

Com. in
aphor. 16
lib. 3.

Lib. 2.
Epid. 69
part. 13.
sect. 4. l.
& Epid.

Cap. 78.
lib. 3.

246 CONSILIORVM MEDICINALIVM

fit articularum cum tensione & magna acerbitate. Si in aliis
speciebus arthritidis non vna pars laborat, cur non & materia
quæ ischiadicū morbū facit aliō transfertur, & in aliis articulis
dolorem excitat? Nam Paulus scribit coxendicem (id est co-
xendicis morbum) ab articulari morbo nihil differre, nisi quod
ipsius causa in sola coxarum compage articuloque concretus
insideat; & tacite diluit quæstionem istam; ac si dicat, in cox-
ario morbo materiam contumacem esse magis & crassam, in aliis
speciebus articularis morbi magis mobilem; vt mirum non sit
si aliæ atque aliæ partes obsideantur. Quanquam & vidimus in
quibusdam ischiadicis erraticam esse affectionem, & occupati
summā natium parte articulos quoque pedum influxu eiusdem
materiei conflictari. Sed rarius. Gorraeus arthritin definit
articuli tumorem dolorificum, quem fluxio in eum decumbens
excitauit. Quidam inflammationem definiunt, sed malè, quod
plus aliquando sit oedematis, quàm inflammationis. Marcellus
vt diligenter annotat Manardus, definiebat inflammationem
esse permanentem, malè affectis neruis dolores grauissimos
excitantem. At fit saepe sine inflammatione, nec permanens est
dolor iste semper, nec in neruis fit semper, nec semper validis-
simos affert dolores. Ceterum ossa connectuntur tribus mo-
dis: vel enim inuicem coalescunt, modò sine materiei alicuius
interuentu, vt in mollioribus & fungosis, modò intercedente
aliquâ materia, vt in duris & siccis per symphyfin. Vel id
committuntur inter se, vt obscurum & difficile motum ha-
beant per synarthrosin; vel manifestum & euidentem per dia-
throsin. In prima articularum connexione dolores non sunt
articularum, in secunda rarò, nisi quod tophi & oedematis
tumores fiant, vt in articulationibus carpi & metacarpi. Tertia
verò arthritidis sedes est inter membranas, tendones, & liga-
menta quæ à periostio oriuntur, & proinde sensum habent; ex
quibus omnibus firmatur articulus: hinc dolor vehemens
excitatur, si qua illic materia intercipiatur: siue acrimonia
humor agat, vt bilis; siue frigidityte, vt pituita; siue asperitate,
vt gypsea; siue distensione membranarum, & ligamentorum
aut inflammatione, quod ab omnibus humoribus fieri potest
cum symptōmatis tamen cuiusque humoris propriis. Ac de ar-
thritide dicam, vt quæ causâ, quæ materiei scaturigo, an san-
guis eam possit committere, an à venis & arteriis, an à capite

solo, an sit inflammatio, an in acetabulo materia contineatur, an ligamenta humore imbuantur, & quæ multi varia disputant, ac inter ceteros Fernelius hac in parte *παραδοξοποιός*. Quamquam tanto viro suppeditant sue rationes: nos quidem soluere, plenisque velis nauigare deliberaueramus, sed cum ex recentioribus plerique multa de ea re scriptitarint, & contra Fernelium edisseruerint, contractis orationis velis pauca afferre cogitamus; ne idem quod illi cum fastidio legentium scribamus, & ne sinudati fuerimus aliorum coloribus, vt Horatiana Cornicula implumes ridiculique maneamus. Ac primum, an sanguis sit materia? Quidam asserunt sanguinem arthritin non posse committere, quod necessum esset suppurari si in articulum incidere. At non est necesse omnem sanguinis affluxum affusionemque phlegmonem concitare, nisi in musculum, aut in carnem fiat, nec in pus abit nisi calore loci suppuratio adiuuetur. Id quod in articulo ex angui, membranoso, frigidoque contineri non potest. Sic arthritis phlegmone proprie non dicitur, sed tumor phlegmonodes dici potest.

Dubitant an in pyxidem influat humor, an non? Fernelius negat in cauum articuli humorem descendere, aut in spatium quod inter ossium extrema interest, sed in vincula duntaxat, atque eas membranas quæ extrinsecus ossium extrema necant atque ambiunt, ac etiam in tendines eò directos. At duo argumenta affert: prius quod in chiragra tophacea humor in calculo concretus apertâ cute ex articulis digitorum eruat, vinculo quod situm in pyxide vtrumque os colligat, intacto, ac illaeso. Posterius, si in ischiade humor noxius in coxendicis pyxidem conderetur, non tam vehementem dolorem inferret, quod vinculum expers sensus sit, nec tam latè diffusum. Et Galenus explicans quomodo abscessus fiant in febribus laboriosis in articulos, aut subiectam materiam laborum & sponte naturæ & non sponte naturæ esse totum genus musculosum, & caliditatem maximè efficere quid in laboribus ex motu; vt mirum non sit si vnâ cum musculis articuli laborent, & ad hos articulos abscessus fiat, quod vtrique & musculi & articuli concaluerint: vnde tamen non patet an velit in ipsos articulos fluxionem fieri. Nec valet argumentum Fernelij de illaeso vinculo interno (nam de externo nil dicimus.) nam si fateatur in acetabulo ipso lapidem aut tophum concrefcere, fateaturque quo-

Com in
apud 81.
lib. 4.

448 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 que necesse est materiam in illud inane spatium irrumperē. Et
 quoniam illud vinculum forte est & validum & insensibile, non
 ita ab humore afficitur. Et tametsi expers ipsius per se sit sensus,
 non sequitur tamen dolorem in ea parte non excitari per disten-
 sionem, & quia res aliena in loco ubi non debet, includatur.
 Melius Gorraeus cum explicat quid sit articulum occupare, ar-
 ticuli nomine non modò ossis, quod inseritur caput, nec alteri-
 rius ossis cotylen intelligo, sed & ligamenta, & membranas, &
 tendines, & quicquid ad articuli structuram firmitatemque na-
 tam comparauit. Nam per arthritides non modò ex partes à
 morbo sunt immunes, cum etiam in longius distitas partes affe-
 ctionis labes perueniat. Sed non explicat in cauitatemne ipsam
 humor illabatur. Porro cum duplicia sint ligamenta, alia sensu
 sunt prædita, alia non. Quæ à media ossis parte oriuntur, vt que
 tibiam cum coxa coniungunt, ea sensu vacant. Quæ à periosio
 sunt, ea sensum habent exquisitum. Atque hæc sicut & tendines
 in arthritide maximè laborant, doloremque inferunt. Nam in-
 ter tendinem & ligamentum quod tendinem integit, colligitur
 materia; hinc dolores.

Maiores difficultas de materia, & de parte à qua illa desuat ma-
 teria. Inter ceteros mordicus pertinaciterque, non sine proba-
 bilitate tamen, defendit Fernelius, & à capite solo esse, & hu-
 morem pituitosum serosumque, non sanguinem, non bilem,
 aut succum melancholicum. Ac rationes quidem eius in turba
 valent, sed singulas facile est discutere ac dissoluere.

Ac primum, si humor frigidus est uti vult, cur non potius stu-
 pore affert? Nam ait Galenus, *Pituita & sero eius inest ut torpo-*
rem efficiat, non mordacitatem, nisi forte ita sit alienum à natura, ut aut
salsum, aut acidum fiat. Et cum, authore Fernelio, pituitosus &
 frigidus humor autor sit arthritidos, unde tanta doloris acerbi-
 tas surget? Et in Aphorismis dum reddit rationem cur hyeme
 & autumno dolores podagrici excitentur, ait hyeme quidem id
 fieri, quòd quantitate & qualitate humores infestent, ac pec-
 cent. Autumno autem solum secundum qualitatem. Hinc
 patet qualitatem humoris solam ad podagram sufficere, vt ea
 copia non requiratur pituitæ, quam vult Fernelius.
 Rondeletius dum agitare vult Fernelium, malè illius verba ci-
 tat. Nam non placet Fernelio per venas, & per spinalem mecul-
 lam, & per neruos fluxionem fieri: sed per inanes mæandros &
 taquæ

Com. in
 part. 38,
 sect. 2 lib
 6, Epid.
 Com. in
 aphor. 55
 lib. 6.

aquæ ductus sub cute. Item non vult illum mucum qui per palatum deerrat arthritin committere: sed per partes capitis externas extra caluam positas vult sensim decurrere humorem. *Lib. 1. de loc. aff.*

Reuera pro Fernelio facit locus præclarus quo Hippocrates explicat septem fluxiones è capite: & loquens de fluxione quæ retrò fit, ait; *Finiunt articulum ac coxendicum dolores à talibus morbis (id est hydropè & suffusionibus aquæ) sanatis, cum id quod morbum efficit sanatur, & quod in carne relictum fuerit, cui non sit exitus, nec intro, nec foras egressum fuerit, sed tuberculum efficiens, fugit in id quod cedit, ac tum dolores articulum efficit.*

Sed contra Ferneliū facit id quod ab eodem Hippocrate *ibid.* scribitur. nam loquens de ophthalmia, duplicem mucum statuit, vnum ab interno capite, & hic falsus est, doloremque excitat, alium de foris per extremam cutim capitis, eumque compressum; & hic falsus cum non sit, dolorem non mouet in oculis: ergo pari ratione dolorem non excitabit si in articulos incidit: credibiliusque eum humorem qui in articulis dolorem excitat, ab interno capite emanare.

At à pericranio, ait, humor descendit. Si à solo pericranio, cur non aliæ partes debiles humorem depositum à partibus robustis excipiant? Quasi verò articuli nequeant tanquam inbecilli ab aliis partibus validis humorem superuacuum recipere. Et sit ita, magna fluxionum pars à capite fit, quod attinet nouos hos sub cute aquæ ductus comminisci, & non potius apertos ductus & canales consignare? Et cum auctore Hippocrate abscessus fiant per neruos, arterias, venas, membranas, ossaque ipsa, credibilius est humorem per eas partes fluere ac reflueri, per quas alimentum decurrit & defluit ad partes alendas. At coactius est ad caput confugere, quod credibile non existimet tam syncerum humorem è venis complectentibus reliquos humores fecerni qui articulare dolorem sit generaturus. At facile syncerus humor fit, si vel in parte fiat congestio, vel si à cerebro humor descendat. Non quod ea sit pituita quæ per infundibulum in ventriculum, aut pulmones deerrat, quia oporteret eam in venas refumi, quod est absurdum. Sed quæ sub cute per inania quædam laxaque musculorum spatia (vnde doloris in transitu vacuitas est) fluxionis hunc modum tenet, vt quasi inundatio aluei & eluuius quædam in cavitatem articulum & partes vicinas incurrat ac illabatur. At si Fernelius negat ideo

ab interno corpore in articulos humorem rapi posse, quod & via non sit facilis, & secretionem oporteat fieri humoris à massa sanguinis: Quid primum respondebit de abscessibus qui fiunt in crisi in articulos materiâ morbificâ & secretâ à massa sanguinis, aut saltem in ventre contentâ? Liber quartus Aphorismorum testatur abundè & resurgentibus à morbo, & laboriosis febribus detentis, & aliis similiter affectis in maxillas & alios articulos humorem rapi, cum absurdum sit capitis partibus extimis eum descendere. Cum copiosa urina à profluens Archigenis seruū ab abscessu in articulos liberauit, an non materia illa in venis contenta erat? Alba, leuis, & æqualis materies copiosa, & quæ per urinas fluere debet dum abscessum in articulum facit, an non à capite emanat? Hoc asserere puerile foret. Præterea dum fiunt apostemata modò syncera, modò mista, carbones, exanthemata, & alia id genus materia seposita & secreta, nunquid à venis & arteriis fluxit, & eadem potest in partes circumscriptas articulis influere, & dolorem excitare? At caput in vitio non est. Sed audiamus Galenum Comment. in 6 Epidemior. dum explicat quomodo audiendum sit quod Hippocrates scribit quod ex citato dolore colico quieuerit arthriticus dolor, & contrâ hanc rationem reddit: *Idèd hoc fit, ait, quod humorum in artus currentium ad colon intestinum impetus conuersus est. Quod satis apertè ab interno corpore facilè per ductus tum manifestos, tum cacos humores modò in hanc partem, modò in illam, rapi posse, necnon fieri communicationem inter artus & intestina. Quanquam de hoc fortè dubitari potest.*

com. in
part. 3.
sect. 3. li.
6 Epid.

Præterea quid respondeat Fernelius Hippocrati, qui ita scribit; *Dysenteria intempestiue suppressa abscessum in costis aut visceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? Vbi duo aduersus Fernelium notari possunt: prius est, si humor qui dysenteriam committit, siue biliosus, siue melancholicus sit, inclinationem habet in aluum interiorem: & idem in artus potest abscedere, & rursus ab artubus in aluum. Ergo error est manifestus Ferneli, comminisci à capitis tantum partibus externis humorem dimanare qui arthritin sit commissurus? Posterius est quod tacitè biliosas etiam fluxiones & synceras in articulo fieri indicat Hippocrates, quod tamen non arripet*

In Coac.

Fernelio, vt qui omnem arthritin ab humore frigido esse velit: Tamen loco illi de dysenteria respondere posset Fernelius, quod nimirum fluxionum alui & dysenteriarum sæpè Hippocratis opinione caput origo sit: quod si verum est, nil hic locus contra illum facit. Nam qui humor à capite delabens dysenteriam facit, si desinat dysenteriam inducere, & aliò cursum suum inflectat, vtpote in partes externas, tum articulares affectiones potest inducere. Vt cum Hippocrates scribit in Aphorismis vomitum diuturnam diarrhoeam soluere, id videtur fieri quòd à capite humor in ventrem descendat, qui aluum sollicitans & laeuigans id afferat. Quod si illa materia vomitione excludatur, cessat affectus. Sic cum humor à capite delabens in extima cutis deerrat, dysenteriae finem affert. Atque hæc probabilitate nituntur. Contra Fernelium & id facit. Si lassitudines spontaneæ & articularum quædam debilitationes & effæminationes vt gressus impotentia sit, ab humorum per corpus sparforum, & à maligno sero quod in corpore superfluit, oriuntur: numquid causa aucta articularum veros dolores excitabit? & tamen caput in vitio non est. Vidimus iuuenem annos 15 natum, arthriticum, eam maximè ratione factum, quòd in eruptione exanthematica non esset legitimè repurgatus: an non humor iste à capite est? Et Hippocrates aliud videtur contra Fernelium obicere; *Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas & grauitas ex leui causa, & alui suppressa, ventriculo probe agente, his ischias, aut renum dolor, aut urine stillicidium contigerit fortè.* Hic declarat ischiadem (quæ ad arthritidin refertur, quanquam Galenus ischiadicos negat propriè arthriticos à Græcis appellari) oriri non tam ab externo capite, quàm ab interno corpore. Et si suppressio mensium, aut hæmorrhoidum, aut solemnis alui cuius euacuationis potest arthritin inmittere, cur necessario caput tanquam mali autorem accusabis. Internas autem humorum *in ischium aut articulos manifestissimè aliis in aphorismis Hippocrates docuit, idque contra Fernelium.* Atque vtinam summus vir Fernelius eas audiuisset. *Quibus de repente dum sine febre sunt, præcordij & oris ventriculi dolor, ac circa crura ac infernas partes, & alui in tumorem eleuatur, soluit vene sectio & alui fluxio: his febre nocet. Longè enim febres sunt, & ruses, & singultus, his ad solutionem tendenti-*

bus dolor fortis coxarum aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priuatio contingit. Item: Dolores ad hypochondria in febre, voce interceptâ, sine sudore soluti, malum; his ad coxendices dolores sunt. Quibus ex locis patet materiam coxarum morbum effecturam in hypochondrio latere, non autem à capite derivari.

Rationes quidem multas, easque probabiles Fernelius affert, quibus convincere se posse putat necessarium esse humoris arthritin commissuri defluxum à capite, tum quod non ita syncerus humor ab interno corpore ex venis & arteriis reperetur ad morbum generandum. Neque tam liber aditus foret, quàm est pituitæ, aut sero à capite prolapsa per subiectas cuti partes & occultas quasdam vias. Attamen videmur multa opposuisse Fernelio quæ eius sententiam valdè debilitant.

Non videtur parum verisimilis ea ratio quam affert de crudo succo qui in hydropicis tibiis occupat, tumoremque facit, & tamen articulare morbum non parit. Gorraeus putat hoc argumento voluisse Fernelium pituitam non committere arthritin, & rationum machinas in Fernelium struit. Sed errat toto cælo Gorraeus. Nec enim hoc placuit Fernelio, alioqui sui planè dissimilis foret ut qui acriter defendat omnem arthritin à pituita frigidòque humore esse aut eius sero. Sed hoc voluit Fernelius tuendo pertinaciter suam sententiam, à cerebro necessariò defluere humorem frigidum qui malum committat: Quia si humor qui ab interno corpore aut per venas, aut per arterias, aut per alios aquæ ductus in tibiis crurâque natus esse generare arthritin, maximè id fieret in copia succi crudi ac pituitosi, qui etiam redundat in tibiis & brachiis hydropicorum. At hic humor non id facit.

Sed respondeat Fernelius. Nunquid qui fluit ac refluit in tibiis hydropicorum pituitosus humor si in articulum influat potest facere dolorem & arthritin? Si idem humor & natura & ingenio, & numero à cerebro manaret, numquid arthritin posset committere in articulum illapsus? Quid impedit quominus id faciat? An quia per venas & arterias influit? At tu ipse fateris per alios ductus quàm per venas fluere? Numquid iidem sunt ductus occulti per quos & humor à cerebro deflueret? An quia iste humor non à cerebro est? Quasi verò humor crudus aut vitiosus ab hepate malo & malè officium

faciēte non æquē dolores excitaret ac qui à cerebro est? Quasi
 verò in cerebro istam idiosyncrasiā, indolem, naturam, ac
 propriē talem acquirat quā dolores arthriticos efficiat? Cur er-
 go in tumentibus tibiis virginum fœdos colores patientium
 dolores etiam in vacuitate quadam febris quotidie observa-
 mus acerbiores? Numquid idem humor qui fusus dolores in
 tibiis excitat, si idem in articulum quempiam incideret, articu-
 lum quoque diuexaret? In ictericis quibusdam fuso ab hepate
 & interno corpore sero humorum acri ac maligno implacabi-
 les dolores comperimus, nihil etiamnum hepate ad id confe-
 rente. Hippocrates autor admirabilis obscurē quidem ratio-
 nē videtur dedisse cur in hydrope cum multus circum articu-
 los humor sit qui distentionem faciat (distentio autem maximē
 dolorem in articulis facit, ait Galenus) dolor quoque non affit:
 in arthritide autem cum paucus humor sit, tanta doloris sit
 acerbitas. Ita autem scribit postquam de hydrope locutus est:
*Si modicus fluxus fuerit (respectu magni fluxus qui in hydrope sit, unde
 repenti intumescere & detumescere partem videmus) coxendicum &
 articulorum dolorem facit cum fluere cessauerit. Nam ut modicus &
 vndeque ab omnibus partibus fortioribus depulsus ad articulos refu-
 giū facit.* Tamen non videtur hæc ratio satis. Nam si paucus
 humor arthritin facit, cur non multus faciet? In cachexia &
 hydrope multus est. Frustrā igitur & temerē Fernellius affert
 tumorem istum cachecticorum vt doceat necessariò à cerebro
 affluere humorem, quia qui ab aliis partibus emanat humor na-
 tus esset dolores arthriticos parere, id maximē fieret in copia
 succi crudioris. Pace tanti viri dicam, id ipsum non intellexit.
 Atque dicendi confutandique initium ab ipso Hippocrate su-
 mam. Et quia mancus in hac parte est, cætera supplebo. Triā
 requirit loco superiùs adducto vt fiat dolor articularis, vt sit
 modicus fluxus, vt fluere desinat, vt refugiat ad articulum:
 quarum & addemus, quod vim quoque suam habet, vt à par-
 tibus omnibus fortioribus ad articulum depulsus sit. Vis in eo
 ponitur, quod dicit paucum esse & depulsū à partibus omni-
 bus fortioribus, nam si multus est, æqualem quandam intem-
 periem facit, immò suā mole obruens indolentiam affert. Et
 quibus instrumentis tibiæ, brachia, artus quoque ipsi (vt *ad ap. Spor*
 dicantur) ij stuporis sensum habent: sed cum paucus & effusus
 in nervos cum mole sua non obruat, satis quid eius possit quæ-

*Lib. de
 locis in
 hom.*

*Com. in
 aph. 49.
 lib. 6.*

*Lib. de
 locis in
 hom.*

litas ostendit. Deinde quòd à partibus pellatur satis indicat suà qualitate adedò molestum esse, vt necessarium sit aliquid virulentiaē habere, declarat acerbitas doloris, orgasmus. Nam nunc hic articulus obsidetur, nunc ille: & totius manus & pedis, modò hic digitus, modò ille, modò veterem sedem occupans in ea consistit & furorem exercet. Vnde videmus sæpè magnos esse cruciatus cū nil tumens & dissimile appareat, nil lacunosum, nil salebrosū. At in leucophlegmatia cū intumeat corpus rotū prae copia crudī humoris, & in cachexia cū redundet humor serolus & malus, sæpè à dolore vacuitas est quædam. Secunda conditio est vt humor fluere desinat; quod bifariam audiendum, vel vt iam actū consistat fluxio, alioqui dolor non adesset, nisi fugax fortassis, vel vt per neruosum genus, non autem per venosum humor vagetur. Quod ad prius attinet, falsum est dicere non excitari dolorem nisi consistat fluxio: oportet quidem materieī partem consistere, aut omninò fluxionem cessare non oportet. Sed vt dolor perseveret, humor consistat oportet. De posteriore ita dicam. Hippocrates primus docuit morbos venarū leuiore esse, fugaces, contra nervorum obstinatos ac contumaces. Et hic locus maximè conferet ad eorum intelligentiam, perspicientiamque quæ dicimus. Ac primū audiatur Hippocrates: *Quicumque morbus à venis oritur debiliior & leuior est quàm qui à nervis. Diffluit enim vñ cum humore qui in venis inest, & non quiescit. Et nature venis in humore est in carnibus, Grace & à quoniam tunc exsistit & vñ est, & non quiescit.* Nervi autem sicci sunt, & caritates non habent, & ad ossa consistunt, & maxime ab ossibus nutriuntur; nutriuntur autem & à carnibus, & carnem inter carnem & ossa medium habent, & humidiores sunt ac carniores quàm ossa, sicciore & magis essci quàm carnes. Quicumque morbus ad nervos ipsos pervenerit, firmatur, & quiescit eodem loco, & difficile est ipsū educere. Qui locus docere potuit Fernelium quæ causa sit cur sæpè tumeant detumescentq; partes, cū tantē dolores non excitentur in articulis. Humor enim in venis continetur, non in nervis, aut saltem non consistit quiescitque in nervis. Oportet autem quietem habere antequam ibi dolorem creare possit. Et antequam vltra progredior quoniam ille locus obscurus est quo antè paulò dixi, & natura venis in humore est in carnibus: & nonnullis difficultatem

negetiumque dedit, illum explicabo. Comparat genus venosum cum nervoso. Nervosi generis nomine & membranas & tendines, & ligamenta, & periostium intelligit, item & nervos propriè dictos qui musculos propriè dictos conduxunt. Nam caro simplex, nervi & venæ musculum conduunt. Et dum ita comparat nervos cum venis vult venarum naturam humidiorē esse duabus de causis, tum quod ratione suarum cavitatum humores contineant, qui cum *in* dicantur, & consistentiam liquidam habeant, & humectent corpus cui insunt, & quod sæpe perfluunt & perluunt: tum quod venæ in carnibus ipsis sint quas enutriunt: Sic cum dicit, *Natura venis in humore est in carnibus*, id est, proprium est venarum, ut & humorem contineant, & in re humida sint, id est, in carne: Et nisi multiplex earum tunica impediret, facile rumperentur. Sic nervi venis dicuntur duriores, (quantum multiplex sit tunica) quod cavitatem non habeant, quod tendines sint, quod ligamenta, membrana, venæ molliores ob cavitatem, quia in carne molli sunt, quia continent fluxilem. Sic metonymicos res continens dicitur molli & humida ratione & rei quam continet, & rei in qua continetur & fouetur. Vel cum dicit, *Natura venis est in humore, in carnibus*: ut nomen illud, carnibus sit explicatio nominis, *in humore*. Caro enim res humida est, sic vena in humore est, id est in carnibus, in quibus, & sedem, & firmitatem, & augmentum, & munus habet vena. At nervi sicci sunt, quia non sunt in carnibus, & res humidas non continent ut venæ, & à rebus siccis oriuntur, id est, ab ossibus, quod ipse Hippocrates docet dum ait, Nervus ad ossa consistunt, & maximam partem ab ossibus nutriuntur: Quanquam sunt & alij qui à carnibus nutriuntur, ut qui musculos componunt. Et ut omissa interpretatione illius periodi quam obiter explicavimus, ad rem redeamus, ideo morbi qui in nervis sunt, firmanitur quod dura eorum consistentia sit, qui in venis, id est, à venis sunt, fluunt fugacēsque sunt magis: quod hac ratione maximè demonstrat Hippocr. *Communicant omnes venæ & confluunt inter se mutuo, aliæ sibi ipsis committuntur ac coincidunt, aliæ venarum & venulas è venis extant.* Ac de distinctione morborum nervos occupantium ac genus venosum initio illius libri de locis in homine ita scribit, *Quod siccus est morbus magis recipit,*

Lib. de
locis in
homine

456 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*& magis dolet à natura: humidum verò minus. Morbus qui in sicco
stabilitur à consistit, qui in humido est, diffluit, & aliàs aliam partem
occupat, & transmittans quietem facit, & citius sedatur ut pote in hu-
mido non stabilitur. Quem locum de intemperie humida & sic-
ca intelligunt, sed male: Vere enim hic locus pertinet ad alium
qui sequitur de morbis neruorum ac venarum. Sed hæc relin-
quamus.*

Tertia conditio ex his quas proposuimus, est vt ad arthri-
dis generationem humor in articulum, aut saltem partes proxi-
mè articulum ambientes, & exquisito præditas sensu, incurrat.
Quòd miror non animaduertisse Fernelium, qui indistinctè
proponit in cachexia non oboriri arthritin, cum tamen sit hu-
mor crudus: proinde necessariò à cerebri manare. Adeone
ignarus Fernelius vt non fateatur oboriri dolorem articulare
si qui redundat in cachecticis humor in articulum descendat,
includatur, atque ibi interceptus interclususque corrumpatur.
Nam non omne excrementum quod in partem impingitur ita-
tim dolorem parit, sed aliàs cum sua natura efferum est & mor-
dax primò quoque tempore dolorem infligit: aliàs non nisi
temporis successu acrimoniàm, aut dolorificam aliam qualita-
tem nanciscens eundem infert dolorem. Itaque pace Fernelij
dicam nil quicquã efficit quod de humore cachecticorum ob-
iicit. Siquidem si pituita sit *cruda*; si tantùm sit erudus humor. In-
fra sanguinem, sed qui proximè in sanguinè degeneret, si calor
esset melior, non est necesse à tali humore, dolorem excitari.
Nullas enim molestias exhibet, vt nec sanguis.

Nam in hydropicis quoniam hepar aliqua ex parte est refri-
geratum, sanguis quoque aliqua ex parte refrigeratus est, & cru-
dus: sed incoctus non dicitur. Alibi autem ex Galeno distingui-
mus *επιποικίλον & αμύλον*. Et talis sememicoctus sanguis dolorem non
creat. Hinc lencophlegmaticos nō videmus laborare: In cache-
cticis quibusdam & iis præsertim virginibus quas fœdus detur-
pat color, dolores capitis, artium & surarum intolerabiles vi-
demus. Et quemadmodum ex muccis & pituitis quæ à capite
descendunt aliæ tussis excitant aliàs humidas, aliàs siccas, non
nullæ nullas tussis proritant, aliæ statim negotium dant pulmo-
ni cùmque vlcérant, vt quæ sunt efferæ & ichore præditæ, aliæ
etiam ingenti copia nil incommodi afferunt, sed postquam mor-
ram aliquam in pulmone sine vlla molestia egerunt, coactæ cras-
sæ.

sefastæque facillimè extunduntur: Idem iudicium est de humoribus qui in artus dilabuntur. Nam cum tibiæ intumescunt humore, aut brachia, & articulorum loci, non statim dolor fit, ne si quidem in articulum humor influxerit, sed requiritur certa quædam qualitas qua humor donatus repentè concitat dolores atroces. Et in hoc disputationis cardo vertitur. Proinde docuimus antè ex Galeno in libro 6. Epid. pituitam quidem torporem inducere, sed si aut salsa sit, aut acida ea atrocissimis cum doloribus sese prodit. Quod & in doloribus colicis vsuuenit. Quot sunt enim quorū intestina multa pituita sunt oblita obstitaque, quos nullus coli dolor cruciauit? At si gypsea est pituita, salsa, acidaque, aut vitrea; ea suæ præsentia excitandis grauibz doloribus notas ac argumenta edit. Et hæc aduersus Ferneliū de loco, quanquam pluribus res explicari posset: obiterque de humoris qualitate & conditione diximus, sed rem totam negotiumque de humore accuratiū sumus iam pertractaturi.

De humore qui causa est arthritidis, ita sentit Ferneliū: *Humor continens arthritidis causa tam varius non est atque traditur: nec enim sanguineus, nec biliosus, nec melancholicus est vnquam, sed omnino, vel pituitosus, vel serosus.* Tam grauitè iterum peccandi, & hoc contra veteres asserendi occasionem dedit illa alia erronea opinio quàm paulò antè explosimus, de origine arthritidon omnium cerebro, quod aut pituitosum solum humorem, aut serosum cerebrum suppeditet. Sic duas illas erroneas opiniones ita complicauit, vt alia alteram pepererit, & toti antiquitati opposuerit. Si enim humor vnus foret pituitosus tam sæui articulorum hostis autor, quid veteres practicos in eam opinionem adduceret, vt pro arthritidon distinctione & causarum, remedia quoque distinguerent? At remedia instituunt ad biliosam arthritin, ad sanguineam, ad serosam. Ergo verum est tot esse species, alioqui in rem ægrorum grauissimè peccaretur. Atque antè iam refutauimus argumenta eorum qui negant fluxionem vllam esse sanguineam quæ arthritin quoque sanguineam creet, quod necesse esset in pus sanguinem verti. At sanguis quidem cum dicitur suppurari eum in ventrem erumpit, verbum suppurari generalius pro corrumpi sumitur, ait Galenus. Et aliud est in ventrem, aliud in articulum irruere. Quanquam & in articulo suppurat, id est corrumpitur, malam alienamque qualita-

Tom. I.

M m m

*Adrius
terrab. 3.
sermo 4.
14. 15. 16*

tem accersit, vnde in sua generatione, & in loco, à quo mittitur, laudabilis ex euentu mala qualitate insignitur. Deinde sanguis in carnibus corrumpitur quidem ac suppurat proprie, sed non in articulis. Immo cum in articulum incidit recrudescit quodammodo, & suam maturitatem amittit. Quod fortè imposuit Fernelio, quod videat inflammationes in articulis non nisi intra 40 dies solui, & pituitescere quodammodo omnes qui in articulos fluunt humores: immò si prius calidi forent, ob loci naturam incrudescere. Quod mirum ne sit. Nam & Hippocrates in libris de morbis scribit contingere, vt à pulmone ipso pus in thoracem erumpat, & tamen si antequam eruperit maturum sit, tamen dies aliquot expectari vult donec rursus pus ipsum maturescat: Sic mutatione loci maturitas puris exolefcit, aut saltem diminuta retunditur tanquam materia perfrigerata.

*Lib. 3.
de mor-
bis cap.
de pleu-
ritide ex
dorso.*

*Com. in
part. 15.
sect. 3.
lib. 6.
Epid.*

*Lib. de
serde.*

*Com. in
Apho. 9.
lib. 6.
Apho.*

Similiter in febribus materia cocta mitificatàque in partem aliquam relegata recrudescit. Et in sexto Epidemiorum cum loquitur Hippo. de concretionem lapidis in vesica, ait Gal. frigiditate vesicæ, tanquam corporis ex angustia lapidis coagmentationem iuuari. Itaque fieri potest vt frigiditate articuli sanguis, aut alius humor eò influens, licet sit calidus, faciliè suum calorem amittat. Non tamen ideo frigidus humor arthritidis causa est. Ideò Hippo. dicebat sanguinem esse natura frigidum, quia cum sit de genere aëneorum, faciliè suum calorem amittat. Sed ad huius rei demonstrationem conferet plurimum ea demonstratio quam attulit Gal. in Aphor. explicans cur inflammatio in podagricis intra dies quadraginta cesset, & non ante. Quod fortè pro Fernelio faciet. Nam inflammationem quæ arthritidi superuenit ex euentu tantum contingere ait, nempe vi doloris. Ita autem scribit, *Quæ carnosas partes occupat inflammatio morborum acutorum subiicitur termino, quoniam carnis substantia mollior est & variior natura ligamentorum. Vnde & tardius inflammantur chordæ ac nervi si vulnerati fuerint (Græcè ῥοδίνες, Leoniceus vertit, ex ictu) & longiori tempore ad consistentiam inflammationis perueniunt & tardius sanantur. Quæ enim ratione vix aliquid externi in se recipiunt, cum duræ sint ac densæ huiusmodi partes, hæc ipsa ratione vix à se dimittunt. Quapropter solutionis terminus, hæc dies quadragesimus, quia quum in articulationibus humores sint, & h-*

gamenta amplexantia ipsas oportet euacuari *articulos*, id est, in modum vaporis. Mirum autem est cur dicat tam aegrè admitti humores à membranis & ligamentis, & à nervis cum videamus eos qui articulari dolore tenentur facillimè modò hanc partem, modò illam laborare. At si tam aegrè admitterent humores non tam subito dolor indè surgeret. Quinetiam facillimè & tremores, & convulsiones in febribus videmus excitari: si nervorum ea est durities & tendinum & membranarum, quomodo tanta est aptitudo? Nam videtur æquum esse ut idem fiat, quod & in pleuritide fieri scribit Galenus: dum enim confert pulmonem cum membrana costas succingente, ait pulmonem ratione suæ mollitudinis paratum esse ad recipiendum quemvis humorem, non item membranas, quod hæ non ita facile admittant humorem quemvis, sed biliosos magis: unde maior pleuritidon pars ab humore est bilioso. Si articularum ea comparata ratio est ut eadem horum sit natura, atque membranarum succingentium costas, oportet necessariò, aut tenuem & biliosum, aut planè serosum humorem qui arthritides faciat, aut falsum est quod in hoc atque illo articulo tam subito dolor excitetur. Duræ sunt partes, humor est frigidus & pituita, ut vult Fernelius: immò negat, aut esse bilem, aut sanguinem, quomodo tam facile humor admittitur: æquum non videtur. Quomodo enim tam crassus humor in cavitatem & locum *superioris*, subiret, cum lentor & pigrities id impediat? Quanquam possit quis respondere imbecillitatem partis quandam dissectionem asferre, & aptitudinem ad fluctionem facile admittendam. Accedit quod humorem in orgasmo esse oporteat: orgasmum autem adiuuat ichor quidam malignus qui animat, impellit, ciet, & movet humorem suâ natura segnem & pigrum. Atque articulares dolores etiam à valde calida causa oboriri testatur Gal. ubi docet morbos connutritos in senectate relinquere: interpretatur de calida hemicrania, calido renum affectu & articularibus doloribus à calida causa obortis, quibus omnibus obrepens senectus tanquam frigida remedio existit. Nec dissenteanea docet in Apho. dum ait dolores articularum in squaloribus à fluxione non fieri, quod cum tempus siccum sit non videtur natum ad superfluitates generandas quæ arthritin committat: Sed si caliditas immodica fuerit ab acris humoribus possunt arthritides excitari. Itaque miror quomodo

Com. in
Aphor.
13. lib.
6.

Com. in
part. 6.
1. titio 5.
lib. 6.
epid.

Com. in
Apho. 16.
lib. 3.

460 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Fernelius tam lōgè à veterum dogmatis descuerit, vt præiudi-
 catam suam opinionem tam mordicū defendat. Etsi enim
 Gal. ad magna arthritidō pars, siue per defluxū id fiat, siue per conge-
 Apho. 2. stionē, ab humore frigido est, tamen errore non vacat asserere
 lib. 6. omnes ab humore frigido esse cōque à capite emananti. In quo
 grauiter in agrorū commoda peccatur. Nā est vbi calidis vtē-
 dū remediis, est vbi frigidis, est vbi moderatis: Quod sit omnis
 à pituita esset ad calfacientia perpetuò esset recurrēdū. Item
 aliud est agitare medicamentis caput eique consulere, aliud
 aliam partem. At si solum caput autor existeret, ad id vnum di-
 rigendū esset omne consiliū nostrum. Itaq; magni interest
 ad curationē morbi, & ad agrorū salutem multo ante cōstitūere
 an soli capiti malū acceptum sit ferendū, an sola pituita aut eius
 serum in vitio sit. Quāquam vt antè dictū est fortè imposuit
 Fernelio quod humor qui actu in articulo cōtinetur quadamte-
 nus frigidus, aut frigefactus sit, quod ita sit comparata ratio ar-
 ticularum, vt quia multas habeant partes spermaticas & frigi-
 das, affluentem humorem etiam natura calidum, & à calido
 loco deriuatum in frigidum ac incrudent, vt ita loquar, quod ex
 Hippo- Hippocrate demonstratum est. Cum itaque & experientia, &
 crates lib. de inscruis affectio-
 nibus, ratio, & autoritas Hippocr. 1^o quam suprà non meminimus
 asserere, quæ statuit aliquas arthritides à bile esse, dictet præter
 pituitam alias esse causas arthritidis, & aliam autorem mali par-
 tem quam caput, relicto Fernelio amplecti oportet methodum
 medendi aliorum, ne mala rei opinione inducti malè remedia
 alia pro aliis usurpemus: Ac facillè mihi persuadeo, idè sæpè
 articulares dolores inualefcere magis, ac aegrescere medendo
 aegros, quod audito arthritidis nomine statim ad calida remedia
 deueniamus eaque impensè calfacientia & digerentia. Quod
 si semper materia frigida foret, non esset verisimilè, ita malum
 insolefcere, ac furere, cū contrariorum curatio per contraria
 legitimè instituitur, nisi fortè dicas (quod etiam probabile est)
 dolorē quoq; augescere, quod vsu rerum ita calidarum quibus
 statim vtimur sine iudicio & distinctione, quod morbi nulle sint
 induciæ, sæpè fluxiones irritētur, qua irritatione dolor quoque
 increfcit. Dum enim humor turgēt fluitque nil est deterius quā
 fortibus, aut emplastris ex rebus calidis vtī: Vel etiam vsu no-
 strorum remediorum sæpè dolor augetur, quod materia sit
 frigida, vt quod remedium vni humoris parti conuenit, alteri

plurimum obsit, vt quod remedium primo loco vsurpandum duxeris, illo relicto statim ad aliud confugas. Accedit quod humor qui arthritides efficit, maxima ex parte venenati cuiusdam serinaturam respiciat redoleatque quod per se pepasimum mitigationemque non admittit: Immo vsu remediorum, nisi valde sint anodyna, incandescit ferocitque magis. Nec mirum est si sæpè irrita sit opera nostra, morbusque iste medicorum nuncupetur opprobrium.¹¹ Caterùm contrà quàm senserit Fernelius certa sunt signa quibus dignoscas à capite humorem subtus cutim, aut per spinalem medullam defluere, aut ab hepate & visceribus per venas & arterias deriuari. Et quæ defluxiones à capite sunt magis, sunt synceræ, quæ à visceribus minùs synceræ sunt, quod humores promiscuè in vasis coerceantur ac confluant.¹² Quod miror Fernelium non animaduertisse. Signa ista diagnostica & Aëtius & Rondeletius sunt persecuti. Nos illa omitemus & si quando vsus inciderit, ex istis venabimur, ne si illa adiiciamus in molem oratio excreseat.

Cum iniretur consilium pro Forcerij mercatoris cognato cui dolores arthritici sunt familiares, & autumno & verè repetunt maximè, creditum est serum maximè putre à visceribus manante, causam reducis istius mali esse. Declarat curatio. Nam nulla habita capitis ratione cum primùm expurgata regio prima ventriculi & educti multi serosi humores electuario diacarth. & syrup. rosarum solutiuo, præripiebatur occasio reditus: Ac quesitum est, si humor frigidus & pituita arthritidis author, cur pituitosi non sunt podagrici, cū peculiaris iste humor redundet?

Si à capite est cur qui charadas habent, quarum origo maximè tribuitur ab Hippocrate, non sunt podagrici, aut alia specie arthritidis laborant? verisimile id esset si caput autor esset mali. Nil obstat obiiere tophos qui in arthritide apparent vt doceas materiam esse phlegmaticam: nam biliosus humor & alius à pituita vsu refrigerantium, aut digerētium nimium, aut à parte frigida frigefactus tophos inducere potest.

Multi olim arthritici liberati sunt morbo, sed epileptici, aut apoplectici interiëre: repertum est cerebrum aqua plenum, sic verisimile est à cerebro malum esse.

Si semper à frigido humore esset arthritidis còque à cerebro labente charadas efficeret, aut dolores in transitu excitarer, aut præcuntem haberet grauitatem capitis, aut nucae colli. At sæpè

462 CONSILIORVM MEDICINALIVM

nil tale apparet, vnde colligas aliundè plerumque esse.

Ad præcautionem tam sæui mali, & euacuationem ferillius putris morbi relapsum committentis visum est vt vteretur hyeme decoct. foliorum senæ cum hermodactylis, & sæpè syrup. rosarum pallidarum cum succo mercurialis.

Vere pilulæ commendantur sine quibus, de hermodactylis & foetidæ. Autumno & vere si quid suadeat tundatur vena, vti uat abstemius.

Partibus dolentibus adhibeatur vnguentum de limacibus aut madeant panni in mucagine limacum.

Vrgentibus doloribus folia hyoscyami cocta in lacte cum capitibus papau. & floribus chamæmeli adhibeantur parti.

ANNOTATIONES.

¹ Hipp. lib. de dieb. Decretoriis docet Ischiadicos dolores esse à conge-
stione & concretione humorum in acetabulis præsertim post incalifica-
tionem à sole.

² Gal. Com. ad Aphor. 49 lib. 6. ita ait, fluctionem arthritin facien-
tem primum suscipiunt loca de articulationum, deinceps circumstantia
omnia ad cutim usque. Et quia implentur articulationes etiam quæ cir-
cumiacent ligamenta extenduntur. Nervi & chordæ illi non inflan-
tantur, sed tantum dolent cum de articulationes extenduntur.

³ Galenus Com. in Apho. 49. lib. 6. tanti doloris in arthritide cau-
sam ad distensionem reuocauit.

⁴ Fernellius hic valde ratione niteretur, quod si humor biliosus ar-
thritin committeret necessario inflammationem faceret. Cur enim memo-
brana in thorace tam facile inflammantur in pleuritide, & in arthritide
tam agere si eadem est materia?

⁵ Et in 2. Epid. 1. sectio. 3. splenis & viscerum tumores & inflam-
mationes in articularum morbos desinunt per translationem, ut
Epid. Tusses in articularum morbos desinunt per translationem, ut
credere est. Maxime verò sunt sicce tusses, quia alio materia præripuit.
Et sub finem sect. 8. lib. 6. Epid. in suppressione mensium dolores &
rubores articularum nascuntur: ergo, id est, ab interno corpore non à ca-
pite. Et quod maius, in ulceribus articularum & partium externarum si
tumores sint rubicundi, & statim euanescent, dysenteria cruenta oboritur,
vide consensum externorum cum internis, ut à capite id non fiat.

6^a Locus est præclarus cap. 12. Sermonis 4. Tetrab. 3. Aetij ubi docet multas causas ob quas suppuratio in articulis non fiat.

7^a Hippocr. lib. 2. Epid. part. siue historia 3. docet quomodo topi in arthritide generentur.

8^a Anno 1575. qui siccus & squalidus erat maxima fuit articulorum dolorum ubertas.

9^a Hic locus est valde notandus: & contra Ferneliū facit, idem in cerebro visum: nam substantia cerebri vaporem calidum & refrigerat. Quod si quis neget illum librum germanum esse librum Hippocratis, legat Aphorismum 25. lib. 5. Apho. ubi vult auctor affusione aque frigidae articulorum tumores & dolores tollere, tum ob reuocationem caloris, tum propter inductionem torporis. Quid respondebitur Galeno qui inco-
xendit dolore in malleolo arteriam secuit cum affectus esset ab humore calidissimo: sub finem lib. de sanguinis missione. Quid diceret Ferneli. quum plerique acerbis articulorum doloribus vexantur, cum nullo aut exiguo dolore, aut in capite, aut in collo senserint? Quasi vero tam effera materia & serum à capite manare queat, & non excitare dolores transeundo: fieri id non posset. Si nitrosa & salsa fluxio à capite tantos in transitu dolores excitat, immò & in metaphreno, & quā transit quandam inducit phthisin; an credibile materiam quæ guttam facit pasmus ex se experiem, opinione Fernelij per tot partes subitus & cunctosè transmitti, & nullos penè dolores excitari? Sic credendum est imbecillitatem naturalem partis, aut acquisitam, quia omnis dolor in parte digestiuam facultatem & coëtricem debilitat, & propterea facilis fit prouentus excrementi loco vera nutritionis, facile ad arthritin facere, ut si qua depuratio & defœcatio sit sanguinis, eam fecem facile admittat. Nisi Fernelius dicat in sua generatione non esse iam malam materiam, sed tempore & mora eam acquirere malignitatem. Quod idem dixit Gal. de tussis materia quæ in scrotum descendit part. 12. sect. 1. lib. 1. Epid.

11^a Si cruditates, crapula & similia eiusmodi arthriticos efficiunt quid cause est cur caput accuset?

12^a Quid impediet quominus dicamus nec à capite esse materiam arthritidis, nec forte ab interno corpore, sed eo modo per dispositionem articulare generari in habitu corpori quo elephas in aliis, & chærades in aliis. Nam in habitu ipso vitium est, & cancroja & chæradica dispositio, & articulosa, ut sic dicam.

CONSILIVM XCII.

De Gonorrhœa virulenta.

QUENDAM fœda Gonorrhœa detinebat. Cum eam negligenter, nec medicorum consilio satis diligenter audiret, suppressa est, & ea contingere de quibus paulò antè dictum est. Imprudenter & parum sciens quid tam virulentæ materiæ suppressio vehat, uxorem suam compressit. Medio graviditatis tempore dysentericum & serosum profluuium mulier patitur, quo vix liberatur. Ac prudenter Medici non censuerunt statim suppresso isto profluuiio, laboranti consultum iri. Audierant enim nonnihil de mariti diuersione ad alias mulieres & quævis impura prostibula. Ideò in eam suspicionem venerunt, vt contractum hoc malum à portione virulenti feri crederent. Ac, opinor, ea fortè in luem veneream incidisset. Nonno mense fœtus educitur purus & incontaminatus. Quod mirum fuit cum satus esset patre adhuc semen tam diri venenico-
tinente. Sed non diu impunè tulit innocens hæc proles impuritatis paternæ luens pœnas. Nam cum fortè matri propinatum esset pharmacum alius rei causa, & iussum esset lactari infan-
tem etiam medio purgationis tempore: Repente multis corporis partibus argumenta certa luis & scabiei Hispanicæ paruerunt. Continuo vocari medicos & Chirurgos, iniri consilium, rem reformidari, metui matri nutrici. Ablactatur infans nondum duos menses natus. Paruo lacte pascitur ex vitreo vasci-
collum gruis habente. Prouisum puello hoc remediolo:

℞. butyr. recentis non salsi lauri in aqu. saluie ℥iij. argenti vivi extincti aqu. eadem saluie ℥ij. facta subactione in mortario diligenter paretur linimentum.

Ad arcendam autem luem veneream quæ verè eam possidet tandem adoriri, ita matri prouidetur:

℞. Limaturæ li. ni sancti ℥iij. siliu. beton. cham. epit. stœcha dos viridis que, meliss. morsus & scabios. an. m. j. s. Absinth. centaury minoris buglos. borag. an. m. j. rad. ireos florent. scordi, tormentil. tauricu & alii

flam. an. ʒj. s. seminis cit. card. sesel. sileris mont. pæonia an. ʒs. rad.
 icis pæonia & angel. an. s. gentiana ʒij. theriac. veteris & mithrid.
 an. ʒi. s. Opiata Fernelij ʒi. s. madeant omnia in vino albo odorifero,
 adde succi pomorum ʒij pul. diamarg. frig. letit. & diarrh. abb. an. ʒj.
 aqu. nenuph. lib. s. concludantur omnia alambico, & fiat distillatio.

℞. Conf. flo. nenuph. bugl. anih. an. ʒj. conserua acori ʒs. cort. ci-
 trij. cond. ʒij. pul. el. diamar. coral. rub. carab. seminis angel. & rad.
 bisort. an. ʒj. marg. elect. ʒj. elect. diarrh. abb. triasant. an. ʒi. mi-
 thrid. ʒij. cum syrup. conseru. citrij fiat opiata, vtenda ad ʒij. hora somni.

℞. aq. theriac. scab. cardui. an. ʒij. s. passentur per manicam Hipp.
 cum sacch. & pauco cinn. cap. cochle. duo ieiunus à sommo excitatus.

℞. Sarsaparil. q. i. meliss. stæchados radicum omn. aperit. scordij,
 mercur. saluæ, beton. an. m. j. rad. acori, eryng. aristo. ang. an. ʒs.
 enul. camp. m. j. frusta pomorum redolentium, fumar. absinth. an. p. j.
 bipinell. m. j. poly. passul. an. m. j. seminis pæon. sesel. an. ʒs. fiat de-
 coctio ad lib. j. infunde foliorum sene ʒij. adde express. ʒj. s. agar.
 trochis. infusa in aqu. beton. & sal. cum ʒij. cinnam. & ligni aloës ʒj.
 adde syrup. ros. pallid. ʒij. & sacch. sufficiens.

℞. conserua stæch. sal. beton. meliss. anih. an. ʒj. s. cort. citrij conditi.
 ʒj. zinzib. conditi. ʒj. conser. accori ʒi. s. myrob. emblic. & confe-
 ctionis alk. an. ʒij. conserua buglos. ʒy. theriacis ʒij. opiata Fernelij.
 ʒj. s. excipiantur omnia cum syrup. conseruationis citrij.

℞. Ambra griz. ʒj. pul. let. de gemmis archonit. an. ʒs. diarr.
 abb. & diamarg. frig. an. ʒi. cinnam. gr. 4. pul. radicis angel. & tor-
 mentilla. an. ʒj. cum sacch. soluto. in aqua card. infusionis ʒs. ligni
 aloës. fiant tabella pondere ʒs. vtenda.

℞. Theriacis, mithrid. an. ʒij. confectio Alkermes ʒ6. elect. de
 gemmis ʒs. limatura interioris guaiaci. ʒij. seminis pæonia & citrij.
 an. ʒ6. conserua viol. & buglos. an. ʒi s. succi pomor. odorifero. & aq.
 nenuph. an. lib. s. Ponantur omnia in alambico & vtatur ea aqu. in-
 trando in laconicum.

Item ℞. rad. enula, angel. tormentil. cappari. Eringio. apij, petro, po-
 ly. an. ʒij. meliss. scab. bipinel. plantag. an. m. ij, lupul. huglos. scolop.
 ceterach. an. m. j. fumar. primul. veris. an. p. j. semin. bomb. dictam.
 citri. an. ʒy. conf. enul. camp. acori. meliss. an. ʒi s. pul. elect. de succo
 rosarum diamarg. frig. an. ʒs. decoct. ʒij. guaiaci, & ʒy. schina ʒij.
 decocti plantag. ʒij. theriac. & mithrid. an. ʒi s. Adde aquarum cor-
 dialium. lib. ij. Ponantur omnia in alambico.

Tom. I.

Nna

De febre lenta Symptomatica.

CONSILIVM XCIV.

CONSVLIS Amoræi filia annos duodecim plus minùs nata sæpè animo deficitur, immò aliàs putat sibi præcludi fauces, aliàs halitum nescio quem sentit cum cardiogmo, capitis dolore, præsertim in anteriore parte. Dolor non est perinax¹. Coloris est vicissitudo in facie, modò cum pallore quodam rubescit, modò pallet solùm, suffusa aliàs aliqua ex parte est facies. Argumenta sunt foedorum colorum: destillatio tenuis est in pulmones, aliquando spirandi difficultas. Metuebatur illi ne periculoso aliquo tandem cerebri morbo tacta intereat: ut eius sorori contigit, quæ Cataleptica post febres erraticas, interiiit.

² Initum consilium prophylacticum potiùs quam therapeuticum calido & sicco hepate erat, adeoque calido ut partim alimentum corrumperet, (vnde illud 6. Epid. *qui ventre sunt calido, carnes habent frigidas*) partim aliquid attraheret, reliquum media veluti via in lactibus resideret. Nam quoties repurgatur, pulti simillimam excretionem facit biliosam, olidam, vermium parentem; vnde & aliquando vermium molestiam sustinuit. Sic obstructio id ipsum iuuat. Quod autem obstructio sit eaque cruda, declarant urinæ in calidiusculo corpore aqueæ existentes. At nec ratione corporis, nec ratione febriculæ quæ sæpè apparet, nec ætatis ratione tales apparere debent. Nam in pueris aqueæ urinæ ab Hippocrate damnantur in prognostico. Quamquam in nostris Epidemiorum libris animaduertimus ex Hipp. *In erraticis febribus aqueas urinas splenicis esse.* Quòd fortè in hac contingit puella. Mutationem colorum ad elationem vaporum fugacium referebamus, nec non ad animi imbecillitatem & caloris, qui facile intro recurrat. Hippocrates huius quidem rei generalem rationem dedit, *Colorum mutationes fiunt corde constringente se, aut laxante: laxante quidem fiunt bene colorati & rubicundi, constringente verò pallidi & virides.* Et illa *constringente* quæ aliquando apparet, in malis poni potest, aut homonymis

In Cod.
cis.

Lib. de
Corde.

bona est. Caloris in pulmonibus maioris indicium esse potest. Videtur quidem dolor iste capitis symptomaticus esse, tum quod fugax sit (quanquam si dolor capitis per protopathiam sit, necessario non existat stabilis) & videatur tantum per vaporis, aut exhalationis elationem fieri. Nam punitionem morsumque in ventriculo praesentit. At verendum tandem ne dolor iste ita ius vindictarum in caput habeat, ut non amplius per sympathiam, sed per protopathiam fiat. Nam cum partes laborant per consensum, id fit aut quia facultas non suppeditatur, aut materia ut in respiratione, aut per vapores. Cum prioribus duobus modis sit id, actio quidem laesa est, sed pars a qua suscipitur actio illaesa est, sed cum pars aliqua per consensum laborat ob summissos vapores, actio quidem partis laeditur, & ipsa pars laborans per sympathiam afficitur: sed ita afficitur, ut si dispositio in parte aliqua fiat, iam non amplius secundario, sed primario pars laboret ipsa. Ac probabile excitari ichores a partibus inferis. Porro opinione Galen. ichores tribus de causis in ventriculum incidunt, aut propter mœrores, aut dolores, aut infirmitatem ventriculi: Accedit & longa abstinencia, & compassio. Ac reuera statuere oportet in hoc corpusculo caliditatem & siccitatem cum squalore, unde magna excitandorum humorum occasio nata est. Quemadmodum enim excedens humiditas immoderato calori iuncta corpus languidum & decoctum reddit, necnon effoeminatum: Ita calor acer mordaxque dum humores accendit, acuit, irritat, excitandis vaporibus magnam ansam porrigit. Post unam atque alteram purgationem syrup. solennis est institutus ex bechicis, thoracicis, splenicis, folliculis, fœna, agarico praeparatis, & coctis ut decet. Item hæ tabellæ institutæ.

℞. Seminis pœonie gra. 8. marg. el. corall. vtriusque spod. tochiscorum & carabe. an. ℥j. eboris, cornu cervi. an. ℥ss. ossis de corde cervi pulueris coriandri & diarrh. abb. an. ℥j. cum sacch. in aqu. card. soluto, fiat tabell.

℞. Conseru. beton. stæchad. ros. buglos. an. ℥. j. conserue anthos 3j. corticis citrij conditi 3iij. rasura eboris, cornu cervi an. ℥j. theriacis 3j. fiat opiata cum syrup. conseru. myrob.

℞. Pulueris hiera 3j. agar. troch. & rhab. an. ℥j. cap. ℥j. aut 3ss. huius masse.

Utatur quotidie in sculo mane in egressu lecti: estate lacte asinae.

Nun 3j

Cap. 6.
lib. 1. de
loc. aff.

Com. in
apho. 5.
lib. 6.

468 CONSILIORVM MEDICINALIVM
Paretur pulvis ex lumbricis terra & chalybe preparato si utile vi-
deatur.

ANNOTATIONES.

1. Febris ista lenta est & continua, & symptomatica qualem Ferneli-
us describit libro de febribus cap. de symptomatice lentis.
2. Huc pertinet locus commemorabilis lib. 2. de Dieta acutorum parti. 2.
Quod Hippoc. Velit concoctionem esse elixationi similem docet, tanquam
coctio fiat à calido non sicco squalentique, cuiusmodi est febris, sed
humido & vaporoso, cuiusmodi est qui in animalibus secundum natu-
ram existit. Fernelius cap. 13. lib. de urinis istis tenuibus, & aquis
abundè satis.
3. Arculanus cap. de Cephalæa, ait, qui dolores capitis sunt per sympathiam,
sepè cum periodis, & cum paroxysmis sunt prout sunt cause periodi, in
membro communicante. Quamquam hoc non verum est perpetuò. Nam
etiamsi in capite humor sit qui morbum per protopathiam faciat, tamen
non perpetuò vexat, sed suas habet periodos: Id ut intelligatur, qua-
niam difficile est admodum, legendus est comment. ad Aphor. 28. lib. 6.
Aphor. Et de hoc diximus lib. 2. nostrorum consiliorum in hist. de
fratre huius puella.

Nam Galenus com. in Apho. 19. lib. 2. de Chronicis morbis disputans,
ait illos à crasis humoribus fieri, & paucos ex his per sympathiam fieri,
& absque loco affecto, ut potè venis aqualiter humores corruptos conti-
nentibus. Sed diadēctis vocat, ut in hemicraniis longis contingit, pos-
sunt esse sine humoribus illis crasis. Sic aliud est, & εἰς τὴν νόσον, aliud
diadēctis νοσίου. Ceterum cum dolor est per propriam affectionem est ma-
gis continuus quam cum est per sympathiam. Et vis ponenda in verbo,
magis, id autem fit, ait Arculanus, aut quia membrum, longo dolore
debilitatum facit aliarum partium excrementa excipit: aut quia per
dolorem spiritibus resolutis digestiva & expulsiva facultas, languet
unde non probe conficit alimentum, nec superfluitates quæ in qualibet
digestione reserantur, debite expellit, &c.

De Pleuritide notha.

CONSILIVM XCVI.

IOHANNES LE MIRE, mercator, cum meloduno Parisicos lintre deuectus petit rigente admodum hyeme, visfrigoris ita calor intrò cogitur, vt indè horruerit valdè, deindè calorem ingentem còceperit. Media nocte cœpit quæri de dolore fixo ac pungente ad nothas costas. Magna nothæ pleuritidis suspicio est. Is narrabat sèpè se ea in parte dolores quos collicos vocabat, solitum esse sentire, qui fomentorum vsu non ita multò post leuantur. Ac primùm ei credidimus cum tamen apud nos potius valeret opinio ac suspicio pleuritidis per congestionem aliquam excitatæ, quam narratio de veterè dolore, coegimus vt aluus enemate sublueretur. Ac dolore perseverante, vt vrgeretur occasio, tertia pomeridiana bolum cassiæ addita confectionis de dactylis portiuncula ne medicamentulum ignauum maneret, exhibuimus: huius vsu multa corrupta admodum educta sunt. Sequenti die relicta sede priorè, dolor ad orificium ventriculi pertinebat. Tunc nos pœnituit, quod non die præcedente venam secuissemus, vt ne inflammatio ad aliam nobilem partem, vti contigit, serperet, ac oberraret. Valdèque timuimus ne in ventriculo malum figeretur, grauioræque omnia nascerentur. Quod aliquando à nobis obseruatum est in vitriarij filio: Qui cum per tres dies de dolore lateris quæstus esset, & neglecta iterùm esset phlebotomia, repente malum regionem ventriculi ad xiphoidem cartilaginem obsedit. vomendi desiderium, febris *ἀσώδης*, lipyria, mors repentina. Per tres dies continuos venam ter secuimus: purulentus sanguis detractus est, ne guttula quidem puri sanguinis viribus metuebatur ob ætatem ingrauescentem. Dolor non erat fixus. Thoracem dilatare omnino non poterat. Respiratio alioqui erat facilis, nisi cum magnum respirare cogeremus. At tum narrabat se aliquid imis costis inhærens sentire quod respirationem elideret. Sitis & febris erat ingens, omnia crudam. Nam nec aluus nisi sollicitata ferebatur, nec quicquam ex facili.

N n n iij

è pulmone educebatur. Dubitabamus an diaphragmatis esset inflammatio præsertim in parte concaua, præsertim quâ attingit nothas costas, si inflammatio foret illius partis cur non deliraret, quærebat. Suspicabamur collectam ibi illam marcenti & præsertim serosam (quod dolores vagi apparerent) quæ olim colicos dolores excitarat. Idque euenisse arbitrabamur ob ambientem impensè frigidum, vnde suppressio nata foret. Ad id cogitandum situs partis dolentis incitabat. Tamen quærebat, si ea in parte inflammatio esset cur non ad clauiculas dolor pertineret? Sed sectio corporis post mortem omnia de quibus dubitabamus aperuit. Ergo cum circa finem diei quarti dubitabamus an quartò secanda vena esset in tanta siccitate morbi, febre, difficultate spirandi, dolore: Ecce primarius medicus videns nostras sectiones inutiles, ratus collectionem esse quandam (vti antè monuimus) ad catharticum confugit idque vehementius admodum, vt vi deturbaretur humor qui infra diaphragma cõsisteret. At cum humor nullus esset infra diaphragma morbi autor irritum medicamentũ fuit, & duabus post horis hypercatharsin induxit, perturbationem tantam vt breui ægro intereundum fuerit. At vt Hippocrates scripsit: *Turpis est clauiculas dato medicamento eodem die ægrum interire.* Erat infra subsistendum.

*Lib. de
medica-
mentis.*

Quamquam hic difficultas magna est. Nam nouimus mulierem cui post phlebotomiam cum datum esset medicamentum sequenti die, quia inane fuit medicamentum & non potens factis, statim delira facta est. Vehementia febris à tam valido medicamento debebat dehortari, item virium infirmitas, tum ratione ætatis, tum multa venæ sectione inducta. Potius sequendum erat Gal. consilium cuius verba ad vnguem tenenda sunt. *Vbi non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, multò magis vitanda purgatio, atque per sectionem venæ vacuandum magis etiam si ad hypochondrium dolor inniatur. Nempe & si minus quidè auxilium quàm per purgationem venæ sequatur, securius tamen multò existit. Immo nullum periculum imminet ex eo quod fit per sectionem venæ, eo discrimen maximũ subuenit quod per purgationem tentatur, maximè si laborantis naturam non fueris expertus. Si enim naturã non noveris, metus est ne plus iusto moueas, aut nullo pacto naturã moueas, aut si moueris, non sufficienter op-*

*Com. ad
part. II.
lib. 2. de
Diat.
ægr.*

ues. Quæ omnia magnis in morbis offensas pariunt: quod non facile ut in iis qui non febricitant, emendatur. Cum igitur febris non fuerit vehemens, & naturam laborantis expertus fueris, ad medicamentum purgans te conferes, iis quæ ab Hippocrate dicta sunt vsus. Atque hoc in loco tria, animaduertere oportet dum sectionem venæ anteferat purgationi: primum est cum meminit febris vehementissima, ut vehementia febris dehortari debeat purgationem, præsertim & cum ad sit inflammatio: febris autem vehemens & inflammatio purgationem dehortatur, quod medicamentum calorem sit adaucturum: Secundum quod minus auxilium à sectione venæ sequatur, quam à purgatione: Tertium, quod securitas sit magna in sectione venæ, non item in purgatione.

Quæ tria sunt diligenter animaduertenda, ne fortè sententia Galeni malè intellecta nos valdè munitos putemus, cum alioqui grauissimè erremus. Quid enim obest illud quod obiicitur de febre ardentissima, nam in pleuritide ea præsertim quæ occupat hypochondrium: (de ea enim illo loco agit, quanquam & generaliter illud intelligi potest) non est tanta febris: si non tanta febris, & si minùs auxilium affert sectio venæ quam catharsis, ut idem fatetur Galenus, omni ratione amplexanda est purgatio, non autem purgationi præferenda sectio ut securius consilium, & remedium.

Quorsum enim ista securitas, si non profit remedium? Præterea si febris vehemens, possumus dare medicamentum non ita eradicans, non calfaciens, non agitans. Item quod ad eum calorem quem præbitum medicamentum afferet, iam respondit Galenus in Apho. medicamentum quidem calfacere, sed maius sequi commodum ex euacuatione humorum morbificorum, quàm incommodum ex ea calfactione & febris auctione. Denique si purgatio in vehementia febris nocet, cur non & sectio venæ? Relinquamus Arabas qui in biliosis morbis phlebotomiâ reformidant, sequamur ipsum Galen. Is Com. in part. 6. Prorrh. ait resiccatos, nec rigore, nec vacuationem insignē, nec simile quid ferrè. Ac exiccatorum nomine & biliosos audiemus, & eos qui biliosissimis & siccis morbis tenebuntur. Pleuritides maxima ex parte biliosæ sunt ex Gal. Cum ergo siccus sit morbus bifariam, & ratione *scilicet* & quia sæpè nil excernitur præsertim initio, & febris iuncta est, affectus & siccus, & siccans, an locus erit vacuationi per phlebotomiam?

Apho.
2. p. lib. 2.

Com. in
part. 6.
sectio. 4.

Com. in
Apho.
1. p. lib. 2.

Præterea si ex Hippo. in mulieribus biliosis etiam naturalis mensium eruptio formidabilia affert symptomata, ut ipse eo loco docet, frequens sectio venæ conferet? Quamquam in Cōment. in Aphorif. 23. lib. 1. in biliosis & ardentibus febribus nō reformidat sectionem venæ, etiam ad leipothymiam usq; Galenus³, Ad superiora vno verbo respondebimus. Omnis inflammatio facili iuuatur & tollitur sectione venæ: Nil enim est quod tā facile refrigeret corpus, & inflammationis occasionem tollat. At pleuritis inflammatio est. Quod autem medicamentum daretur, illud suo calore febrem & augebit & corpus siccabit, & vix de inflammato loco quicquam educet. Cum dicit minus auxilium à sectione afferri, sed securius illud intelliges de inferiorum costarum inflammatione. Nam si de inflammatione superiorum intelligeret, hoc falsum esset.⁴ Non enim liber est exitus ad excretionem materiæ per partes infernas. At cum pleuritis inferior est, cum fiat à congestione potius, & quæ infra diaphragma sunt purgatione per inferiora potius exigi debeant quam alia arte, libero etiam existente exitu, potius ad catharsin accedendum est. Sed ignoratione naturæ eius qui purgatur, & metu incrementi febris vult nos impedire ne tam audacter purgemus, ac venam secemus. Iam verò hoc loco statuendum est purgationi potius intendendum esse in pleuritide & dolore occupatæ nothas costas, si tria illa animo comprehenderes: Si medicamentum non sit perturbans & calfaciens multum, si febris non sit intensa: si inflammatio non sit magna, sed potius dolor à congestione quadam humoris. Vnde grauius hodie peccatur ab iis qui festinanter nimis audito nomine doloris ad latus (vbi cumque is dolor sit) statim ad sectionem venæ confugiunt. Immo etiam si nulla ad sit febris, aut exigua, etiam audacter venam secant, persuasi illa sententiā Galeni superius adducta, quod securius sit remedium phlebotomia, minus tamen auxilium. At nosse debent illas condiciones quas attulimus, & quas nisi nouerint, non sunt digni medicorum nomine. Itaque quemadmodum tardos nimium esse non oportet in sectione venæ celebranda, ita festinatio probro est. Multi enim dolores pleuritici mentiuntur, in quibus aut solum fomentum, aut leuiuscula purgatio abunde erit: ut ita in humano sanguine fundentur.

fundendo liberaliores non sumus. Nec nos ad sectionem venæ iteratò immò pluries faciundā incitabit impuri sanguinis effluxus: Quod plerisque occasionem porrexit celebrandæ phlebotomiæ sapius, & virium frangendarum non sine magno vitæ periculo.

Aperto cadauere ægri nostri ren sinister planè putris & corruptus repertus est. Inuenti duo in vesica calculi, qui suppressioni urinæ in progressu morbi occasionem dederant. Morbi mortisque causa erat hæc: Pulmo erat admodum amplus, thorax angustus. Semiputris erat pulmo: Et ita contumaciter ad latus dextrum adharescebat, vt vix auelli potuerit. Abscessus in ea parte erat. Et sua mole & magnitudine ad nothas ferè costas descēderat. Erat inflammatio mediæ partis pulmonis, præsertim eius quæ abscessum fouebat. Adactò cultello chirurgico putris & foetens sanies manauit, cuius portio dum decurreret per membranarum continuitatem, dolorem excitabat: & eum esuebat, dolor cessabat. Vt mirum non esset, si modò pars doleret, modò non doleret. Et quoniam osculum alui medium diaphragma transcurrit & secatur, dum per gibbas diaphragmatis serum decurreret à parte putrefacta manans attingeretque osculum ventriculi, non mirum si dolorem in ventriculo sentiret, ac si in capacitate eius malum foret. Quanquam non erat inflammatio in ventriculo; tametsi adesse videretur. Hippocrates in libris de morbis falsæ, ementitæque illius pleuritidis descriptionem facit: *Fiunt suppurati si à capite delapsa pituita adlatus agglutinata fuerit & pueruerit. Tunc enim latus vt plurimum inflammatur & patitur eadem quæ & ex pleuritide suppuratus.* Et quòd de pituita à capite delapsa, dicit Hippocr. Idem potest audiri de pituita cui localis est in pulmone generatio, maximè verò in senibus, aut quibus pulmones non benè perspirant ob crassitiem, vt in quibusdā, visum est, quorum pulmonis substantia caseo duriusculo erat assimilis. Aut propter immoderatam vitæ rationem. Quod huic ægro nostro contigerat. Nam maiore suæ vitæ partem in venando occupabat, in cibo & potu, cum nulla vitæ ratio eius animū aliò reuocaret. Inter cætera hepar erat maximè vitiatum, & præsertim pars eius superior erat friabilis, & ~~incolabile~~. Actum Calend. Febr. 1575.

Tom. 1.

O o o

474 CONSILIORVM MEDICINALIVM
ANNOTATIONES.

1 Hippo. lib. 2. de morbis mulierum, ait saluum fluorem mulieri curare cum exhaustus per alium fluorem sanguis, biliosus sit: unde patet euacuationem sanguinis bile facere humores, & reliquū quod adest. Sic in biliosis pleuritidibus frequens scitio non confert. Et ut dicam conferre nunc ad malum vrgens, dum biliosior est factus sanguis maior est in pleuritide incidendi occasio.

2 Si Arabum opinio valeret minus tutū in pleuritidibus vena secaretur quod omnes ferē sint biliose declarat periculus. Immo Hippo. lib. 2. locis in homine nomine bilis plenitudo intelligit.

3 Hippo. part. 74. lib. 4. Acuto. In pleuritide sanguinem ad leipthymiam mittit, si dolor acutus fuerit. At acuti morbi bilis facit. Ergo presente bile leipthymia sectione induci potest. Gal. non probat omnino illud Hippocratis, aut quidem plus sanguinis vacuari debere quod dolor sit acutus, sed quod liberius sinamus fluere non ab acutis sumitur indicatio, sed si vires valent, si etas floruerit, sanguis abundaret, laborantis natura densior, & minus perspirabilis si consentit tempus anni.

4 Manardus ea de re disputavit copiose satis Epist. 5. lib. 12. Sed & locus est apud Galenum in arte parua ubi scribit, ubi corpus plenum est, vniuersum per partem affectam vacuandum non est: quo ex loco possis reprehendere sectionem vene que fit in pleuritide corpore vniuerso pleno, aut cum pleuritis per regurgitationem sanguinis fit ab hepate. Tunc enim necessaria foret hunc locum adduxit Scaliger in com. de insomniis docens sectionem que fit in parte opposita necessariam esse. Vide Com. Akakia in locum predict. Idem Akakia com. in lib. 2. ad glaucon. difficultates istas proponit constanter defendens opinionem de sectione vene ex eodem latere. Sed mihi videtur falsum attexere, quod inflammato utero sit potius demendus sanguis ex malleolo.

De Ischiade.
CONSILIVM XCXV.

DVos exercuere dolores ischiadici, alij quidem oborti per humoris ~~inflammationem~~, sub finem febris longæ: alteri verò media

hyeme per decubitus materiae in musculos natum. Atque ad
vtriusque dolores compescendos, tum ad causam morbi amo-
uendam multa remedia sunt instituta inter quae nonnulla huc
transtulimus.

℞. Massa pilul. de agar. cocciarum, & sine quibus an. ℞j. mala-
xentur cum infusion. ℞j. turbith. gummosi. infusi in hydromel. cum an-
gib. fiant pilulae.

Item ℞. pulueris diacarib. ℞ij. pul. aromat. rosati, & triasantal.
an. ℞ss. cum sacch. soluto in aqua cuscute infusionis. ℞ij. foliorum senae
mundatorum fiat elect. per lozangas.

℞. Summitatum saenicul. aneth. & centaur. minoris. an. p. j.
baccarum lauri. ℞ss. seminis anisi & cumini. an. ℞ss. yuae arthrit. hyperici.
an. m. s. salviae majora. an. m. j. rad. capp. ireos, eryng. an. ℞j.
fiat decoct. infundendo agar. optimi, & turbith. gummosi. an. ℞j.
ol. aneth. dissolu. ad ℞j. & mel anthosatum cum diaphoenico: fiat clyst.

Aliquando bulliant. in decoct. clysteris folia senae: hermodactyl. pul-
uerisat.

Apozemata ex salvia, bysso. stachade folliculis & agar. conferunt.

℞. Rasura ligni guajaci ℞j. passul. ℞ss. gly. ℞ss. coriand. ℞ij. infun-
de per horas sex in libris sex aquae: fiet decoct. ad medias: Coletur cum
cinnam. capp. ℞6. mane ad sudores pronocandos.

℞. Mal. bis mal. pariet. flor. chamemeli summitatum aneth. an. m. j. s.
seminis anisi & saenicul. an. ℞j. fiat decoct. in sacculis in aqua & vino
pro foru locorum dolentium.

Sunt qui ceroneum applicarunt ex emplastr. philagr. de melilo.
ceroneo, & oxycro. diachylo. alb. gummi elemj. puluer. hermoda-
ctylo. ereos & baccis lauri.

℞. Rad. alth. cucum. agrest. cyp. calam. arom. an. ℞ss. folio. ebul.
yuae arthrit. & herbae paraly. an. m. j. chama. m. j. semi. anisi. saenic. se-
lecos. an. ℞ij. absinth. ro. an. p. j. fiat sacculi. bulliant ad forum.

Linatur pars oleo lilio. lumbricorum cum aliqua parte olei de salvia.

℞. Rad. camp. bryoniae, sigil. beatae Mariae an. ℞j. mal. bis. pariet.
yuae, hyper. salu. beto. meliss. maio. an. m. j. chama. p. j. rad. cyp. cala-
mi arom. schœnuanth. an. ℞ss. seminis lini. alth. & fenig. an. ℞ss. fiat
decoct. pro foru.

℞. Eadem materialia pistentur. adde facis vini ℞ij. pone in
suppis comabinis macerannis in aqua vite.

℞. Rad. lilio. cocta cum vino alb. ℞ij. axung. huma. & suill. an.
℞j. ol. chama. ℞ij. fiat litus.

476 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞. Empl. de melilo. & cerati philag. an. ℥ iij. pul. rad. ireos fl.
vent. & cyp. an. ℥ s. ol. lumbrico. ℥ ij. cere noua, quod suff.

℞. Picis nigra ℥ 6. terebinth. Veneta ℥ ij. cere noua ℥ iij. sulphu-
vis vini. ℥ s. rad. ireos pulu. ℥ ij. fiat emplastr.

Post vsum causticorum hec sunt admota.

℞. Vnguenti martiati & comitissa an. ℥ ij. emplastr. palmei ℥ i.
de melilo, & mucag. an. ℥ s. ol. myrt. & irini. quod suff.

Ad confirmationem ventriculi hoc electuarium præscri-
ptum est.

℞. Pul. elect. triasant. ℥ ij. rasura eb. cornu cerui margarit. ele-
ctarum coral. rub. an. ℥ j. rhub. ℥ ij. sacch. dissolut. ℥ ij. fiat elect.
per tabell.

℞. Casia ℥ ij. catholici & manna. an. ℥ j. pulpæ sebesth. ℥ s. se-
liorum senæ puluer. ℥ j. cum syrup. violato. fiat opiata.

Pro carcinomate vteri.

CONSILIVM XCVI.

MVLIER Xantonensis carcinomate in vtero laborabat.
ita consultum est à medicis.

Purgatio fit blanda corporis per interualla, clysteres ano-
dyni, fatus, infessus ex anodynis, iniectiones in vterum ex lacte
alinino, vaccino tum perse, tum ex succis plantag. solatri, hyo-
scyami si dolores vrgeant addito etiam momento Philonij.

Post iniectiones insuffletur puluis lithargy. pompholigos,
myrrhæ, aristoloch. lotæ in aqua solatri & ficcata, fiant peli
ex vnguento diapompholigos inducto super linteum, & im-
misso in vterum per specillum vt proximè contingat tumorem
filo appenso, vt extrahi queat. Vitentur calidiora. Ratio victus
euchyma. Utatur vino rubello subastringente. Prouideatur ro-
bori partium principum elect. conditis, epith. His remediis
non curationem quæ sperari possit, sed paulò longiorem vi-
tam & dolorum leuationem speramus. Id apud Io. Gorraum
foelicem & primarium medicum fuit decretum.

Ad destillationem in pulmones.

CONSILIVM XCVII.

QVIDAM difficultate spirandi detinebatur : necnon catarrhus in pulmones cum infestabat. Consultum illi est cassia & catholico in boli forma, hordeatis, syrupis promouentibus sputum & suspendentibus catarrhum.

℞. Rad. gram. polij. passul. gly. an. ℥ss. agrimo. beton. hyssopi semini frigid. an. ℥ij. iuiub. sebesth. an. m. 6. ficus pingues & dactyl. num. 4. florum. p. j. fiat decoct. ad lib. j.

℞. Prædicta decoct. medium infunde foliorum senæ ℥j. infunde in col. agarici trochisc. ℥ss. dissolu. syrup. viol. & capil. ven. an. ℥ij. sacch. candi. ℥ss. fiat ut syrup. coctus, in reliquo dissolue diatrag. frig. ℥j. diatr. simpl. ℥ss. syrup. capill. ven. ℥ij. fiat syrup. utend. loco lohor.

℞. Salvia major. flor. nenuph. an. m. j. rosarum. p. j. cinn. ligni aloes caryo. an. ℥j. ponantur simul pro cucupha.

℞. Succu bras. rub. ℥ij. sacch. candi. ℥j. oxymel. ℥j. fiat lohor.

℞. Rad. acer. pæonia. aristolo. rotun. poly. petro. aspa. an. ℥ss. foliorum beton. samb. agrimo. meliss. scolop. an. m. j. flor. stæch. roris m. sal. an. p. j. passul. glycy. thamar. an. ℥ij. scyllæ præparate ℥ss. fiat decoct. in qua infunde folio. senæ. ℥ij. s. agar. ℥j. santal. citr. ℥j. rhub. ℥ss. diss. sacch. lib. j. syrup. de præsis, & de stæchade. an. ℥ij.

De febre continua.

CONSILIVM XCVIII.

QVIDAM annos natus 20. Delphinus à multo labore in febrem incidit. Tempus erat æstium & australe, febris insignis, corpus squalidum & macilentum. Tertiò die sexta vena. Sexto fluxit sanguis è naribus liberaliter, perseverat totò die nocte. Fit tum symptomatica. Nulla arte compesci.

ooo iij

478 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
 potuit. Qui aderat medicus sinebat fluere sanguinem id natura esse ratus. Cum tamen minuerentur vires, fistendo illi incumbitur fit pessus in nares ex fimo asinino in oxycrato lauto, nihil non fit, sed in palatum effluxit, & vt credibile in ventriculo. Singultiebat: ac dubium erat an singultus esset ab inanitione, an à grymo sanguinis in ventriculo, de vtroque suspicio erat: hoc præscribitur.

℞. Terre sigil. boli arm. an. ʒ. ss. corall. rub. lapid. hem. an. ʒ. i. sacch. ʒ. ss. cum aqu. ros. fiat potus.

℞. Destill. restaur. lib. s. succi granat. ʒ. j. qu. plantag. & ros. an. vnc. s. cum sacch. fiat iulep.

Litus regio. ventriculi ex ol. rosato de absinth.

℞. Confectionis alkermes. ʒ. ss. diamarg. frigid. rasur. eb. corall. rub. an. ʒ. j. theriac. ʒ. ss. cum syrup. granat. fiat opiata.

℞. Conseru. ros. viol. bugl. an. ʒ. j. diamarg. frig. ʒ. ss. corall. ʒ. j. theria. ʒ. ss. fiat bolus cum syrup. granato.

Ad nonum diē tremulus erat, delirabat, cogitabundus, melanchol. vrinæ perturbata, nigricantes, in visceribus incendiū erat, & xg. d. Medici negabant conualiturum, ne si centies essent coctæ vrinæ: alius foetida deiciebat, nigricantia. Parotides futura prædicebantur, nisi hæmorrhagia auertisset. Et quid mirum circa diē 13. rudimenta parotidon apparuerunt, dolores que ponē aures surgere incipiebat.

Iniecti sunt clysteres refrigerantes.

℞. Aqu. ros. scabios. mors. nenuph. an. ʒ. ij. succi lymonum crudi. vnc. ʒ. passentur per manicam cum ʒ. ss. santali.

℞. Vnguenti rosati refriger. vnc. y. succi semperu. & lact. vnc. j. contundantur omnia in mortario cum aceto ros. pro vnctione lumborum & spine dorsi: Decimo septimo interiūt.

De Dysuria.

CONSILIVM XCIX.

GRATIVS querebatur de ardore vrinæ & dysuria. Parabat in vesica calculum esse quod tenues vring, deinde subibide fluerent: necnon aderat desidendi cupiditas, & penis

pruribat. Retulit tum demum se prima huius mali rudimenta
sensisse cum criticè post ardentem febrem multa vrina fluxis-
set. Et cum ille indulgisset veneri multum, non mirum si partes
illæ debiles facillè vlcerae fuerint profluuium vrinae criticae.
Quæ autem causa effecit plurimum, est quod diureticis sapè
vltus fuerit, falsò persuasus calculum esse: vsu eorum prouoca-
ta vrina & partes calfactæ vlcerari potuere, verisimile quoque
parastatas suo glutinoso humore destitutos, vt facillè vim tran-
seuntis & seminis & vrinae non sustineant. Res ad catheteris fi-
dem reuocatur. Nullus lapis deprehenditur: immisso cathe-
tere purulenta ferè vrina profluxit. Sic suspicio erat vlceris.
Asperitates quædam in collo vesicae deprehenduntur. Ac illud
non omittendum perennem fuisse defluxionem falsæ pituitæ
à capite. Quod facillè irritationem in vesica excitabat. Nam
facillè ventriculus laxabatur: aluus irritabatur, & eodem filo in
vesica stranguria excitabatur. Narrabat se nocturna seminis
excretionem intolerabilem dolorem sentire, anodynis fomentis
perinaei somnus conciliatus est: vsu hydromelitis aquosi initio
pastus & intermissione vini prouisum est. Ventriculo consultū.
*℞. Mastiches. ʒ. s. cori. ciur. maior. absinth. cyp. an. ʒi. s. nucis
moscata, caryoph. galang. an. ʒj. Cum oleo de absinth. fiat scutum.*

Item vsus tabellis roborantibus stomachum vt artis est.
Magna erant argumenta vlceris aliqua in parte latentis.
Tamen dicebat se nunquam renes laborauisse. Imperata sunt
ea quæ humores mitigarent. Aliquando excernebatur per vri-
nas materia pituitosa lenta, ductilis & longa instar filamenti.
Dominus magnus dicebat duo esse in eo incommoda, exulce-
rationem orificij vesicae, & contractionem. Hæc facit vt ferè
indefinenter vrina ad excretionem tendat, immò & inuolun-
taria aliquando seminis sit excretio. Illa verò vt dolorem vrina
transitu ipso inferat. Sic censuit vtendum decocto falsepar.
aliàs, aliàs lacte asinino. Ad vigilias assiduas & dolores ei
prouisum est vsu philonij rom.

De mola & fluore vterino.

CONSILIVM C.

NOBILIS mulier querebatur de mola, & vterino profluuio, vt nulla esset conceptus spes, hæc sunt præscripta.

Molæ & vterini effluuij tam frequentis causa videtur nimia sanguinis humidioris copia, qua semen & eius vis prolificatione tanquam puerperia per mensem integrum, eoque amplius fluentia. Itaque corpus siccabitur victus ratione, medicamentis, & iis quæ prouocant vrinas & sudores, corporis exercitatione, fame, pauciore victu, & iusculorum abstinencia. Particulatim verò siccandus vterus, tum fotu, tum ceratis quæ eam vim habent, nec menses mouendi. Vere & autumnu vteris decoctio. rad. schinæ. Aliquâdo è basilica sanguis parcius adimetur. Si verò humidior temperamêto videbitur, semênq; habere humidius, eadem ratione victus vtetur. Parciôr sit vterus, quâ tamen commodè vtetur tribus aut quatuor diebus à mensium eruptione.

Ad animi defectionem.

CONSILIVM CI.

IOANNI RIVIERE, sine febre frequentes animi defectiones, præsertim si animo moueretur: Erat enim oxythymus, frigidiusculo temperamento præditus. Ei consultum est infuso rhei ad corroboratiônem ventriculi, & sequentibus pilulis.

℞. Aloes lotæ in aqu. endiu. ʒ ij. rhub. ʒ i. s. specier. aromat. ʒ ss. cum syrup. de absinth. fiat massa.

℞. Rad. cicchor. ʒ i. s. fiat decoct. in qua infunde absin. pont. p. ʒ in col. ad vnc. ij. dissolu. vini alb. vnc. s. fiat potio arom. cinn. & dulcorata.

Dati

Data opiata ex confectione Alkermes & conseruis.
Fotus est ventriculus decoct. solenn. herbarum stomachicarum.

Ad facilem vteri gestationem.

CONSILIVM CII.

MVLIER ægrè ferebat quod vterum gestare non posset,
 ci post purgationem totius corporis iis remediis con-
 sulitur.

℞. Galiopseos. matricar. calamenti, puleg. an. m. j. major. p. j. cyp.
 calam. aromati. an. ℥ j. fiat decoct. pro fotu, vel semicupio.

℞. Picis cedrina ℥ ij. ladan. stiracis calamithe, benjoing. arte-
 mis. & storum melilo. an. ℥ j. cum ol. & cera fiat empl. pro ventre &
 osse sacro.

Contineat se in lecto, & utatur syrup. capil. vener. cum decoct. arte-
 misia & galiopseos aromat.

℞. Galanga & ammo. an. ℥ j. inuoluatur baculus crassus ad longi-
 tudinem sinus vteri: ex iis solutis cum cera & puluere majorana fiat
 pessarium.

Pro vlcere in regione pubis.

CONSILIVM CIII.

NOBILIS mulier Xantonensis annos nata 40. laborabat
 vlcere in regione pubis. Aliquando foetens materia in-
 star facis excernebatur illac. Cum hic tumor & vlcus multis
 de causis oriri possit, vel in ipsis inguinum glandulis, vel ab in-
 testini, aut omenti prolapsu, vel ab vtero in eam incumbente
 partem, vix resciri potest vnde hoc fit, cum non rescriptum
 fuerit an antè tormina præcesserint, an menses suppressi fue-
 rint. Itaque nullis apparentibus signis, aut malè affecti vteri,
 aut intestini maioris, aut ilei, verisimile est in inguen prolapsam
 esse cæci intestini apophysin, quæ tandem computruit & sinum

Tom. I.

P p p

482 CONSILIORVM MEDICINALIVM
efficit: Ea apophysi ita affecta non est necesse ea sequi sympto-
mata quæ consequi solent in aliorum, aut tenuiorum, aut cras-
siorum intestinorum affectu, vt sunt voluulus, alui profuua,
vomitiones. Remedia non alia sint quam quæ ad detergenda
vlcera conueniunt, vt sunt iniectiones frequētes, immò & vsus
lactis asinini. Si malè affecti vteri signa aderunt, huic proui-
dendum.

De vrinae incontinentia.

CONSILIVM CIV.

VIRGO iam matura viro urinam continere non poterat,
quod parentibus valdè molestum erat: Ea arte illi oc-
cursum est. Abstineat omni iusculo, præsertim in quo radices
vreticæ inerunt. Institutus syrupus laxatius ex agarico, foliis
& rheu. additis in decoct. myrobalan. addito quoque syrup.
rosarum pall. & addita in coquendo plantag.

*℞. Salvia major. orig. calam. prima veris, lauandule, ruta. an. m. j.
acori cy. an. ℥j. flor. chamem. p. j. absinth. p. j. medij corticis quercus &
balaust. an. p. j. fiat saccu. qui bulliat in aquis partibus vini astring.
& aque fabror. foveatur extremo pars spinæ.*

*℞. Ol. costini, & ol. samb. an. ℥j. s. de hyperico. ℥. 6. pul. cyp. inco-
floreant. an. ℥ij. pul. balaust. ℥ s. fiat litus. Item valet emplastr. con-
tra rupturam.*

*℞. Osum omnium myrobal. assatorum & extinctorum aceto. an. ℥j.
seminis nasturi. coriandri præparati extincti succo omphacij. an. ℥i. s.
ambra citrina, cupul. gland. nucis cupress. an. ℥iij. cum sacch. suff.
fiet puluis adde cinn. & corall. rub. an. ℥j. pellicula interioris stomachi.
gall. ℥iij. vtetur iure lentium coctarum.*

*Vtatur chysteribus ex carminatiuis cyp. acoro, calamo arom. sal.
majorana melle anthosato, & confectione hieræ.*

ANNOTATIO.

*Ea de re caput ab Hollerio conscriptum est cap. de iis qui noctu peri-
meiunt lectum, lib. de compos. Medicamentorum.*

CONSILIVM CV.

Ad visus imbecillitatem.

QVIDAM annos vnde viginti nato non ita acutus erat visus, sed in rem intuenti acrius imminuebatur, sentiebátq; tenebricosum quid ob oculos obuersari: Quod potius ad vitium ventriculi cruditate laborantis relatum est. Itaque his remediis prouidetur.

℞. Specierum hieræ picræ dupl. aloë, massæ pilul. sine quibus. an. ʒj. fiant pilule cum aqu. euphrag. utatur sæpè drageta communi à pastu.

℞. Aqu. fœnicul. chelid. rute. an. ʒ6. aqu. ros. & berb. an. ʒj. misce pro ablutione oculorum.

℞. Seminis fœnicul. aceto macerati & exiccati. ʒj. pulu. euphrag. coriandri prepar. an. ʒss. cinnam. & mast. an. ʒj. seminis end. mel. & citrij mundati. an. ʒij. diarrh. abb. & diamarg. frig. an. ʒj. sacch. ros. quod suff. fiat puluis utend. à pastu.

Frictiones capitis, cucurbitule, iussus mandere caryophyl. & edoariam, fœniculum dulce.

℞. Specierum aromat. ros. ʒj. seminis fœnic. dul. pulueris euph. an. ʒj. cinnam. ʒj. macis gra. 4. sacch. ʒij. fiat. pulu.

CONSILIVM CVI.

Pro quodam qui iam per tres menses integros laborârat, ut tantæ diuturnitatis causa in medicos tacitè referretur.

DVO maximè hoc loco quærantur, quæ tam diuturni huius mali causa esse videatur: & an ars nostra tantum possit, ut qui morbus, tum ratione sui, tum ex euentu fortè protractus est, is breuior artificio nostro reddatur. Nam hoc videmus in tacitis eorum qui huc venere, & qui ægro assunt, aut amicitie gratia cum inuisunt, eo maximè animo ut si aut re, aut alia ratione iuuare possent, id ipsum lubentissimè præstarent ne amici

Ppp iij

deessent officio: tacitis, inquani, animis, & mirum & latens esse, vt frequentiore & crebriore medicorum, & coitione & consilio promptius aliquod diuturni languoris praesidium expectent. Quasi factum sit, aut incuria medici qui quotidiana diligentia praestitit, aut artis defectu, ac impotentia, vt qui morbus & specie, & natura longus futurus erat, talis forte recederetur. Ac primum & veterum autoritas, & ratio ipsa, & medendi vsus iam confirmavit necessario morbos existere chronicos, in quibus potius aegrotantis miseri patientia tolerantiaque leniendum est desiderium, quam vt se sinat flagrantior sanitatis (cuius absentia extabuit penè ac afflictus est) cupiditate languescere ac consumi. Vt iis contingit qui rem aliquam voluptate impulsu depereunt, tantoque magis affliguntur ac languent, quanto id ipsum quod tantopere expetunt, longius abesse opinantur. At iis minuenda leuandaque opinio. Cum Hippo. scribit, *Natura morborum Medici*. Duo maxime proponit, & in morbis plerisque naturam cum arte concurrere ad oppugnationem morbi, & etiam sine arte, id est, sine artis manifesto ministerio, naturam morbos tandem euincere ac superare. Non quod hoc de natura elogio Hippocrates artis medicae dignitate offendat, aut tollat, sed vt & naturae & arti, duobus morborum oppugnationibus, quae debetur in euictione morborum gratia referatur. Nam si sola haec natura morbis mederetur, cur tot se fregisset laboribus in arte excolenda quae multis profuit. An tanquam quid fortuitum, & in fortunae inani conatu positum? Scio enim id quod a Celso scribitur. *Cum in morbis multum & fortuna conferat, eademque saepe salutaria, saepe vana sint, dubitari potest secunda valetudo medicinae, an corporis beneficio contigerit. In his quoque in quibus medicamentis maxime utimur, quamuis profectus euidentior est tamen & sanitatem, & per haec frustra queri, & sine his reddi manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui a medicis diu exati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quae manu curat, euidentius est omnem profectum (vt aliquid ab aliis adiunctur) huic tantum plurimum trahere. Et Aetius disputans de melancholiae hypochondriacae curatione & essentia, monet, vt saepe desistamus instituto, vt potè operam ludentes & temerè validis medicamentis nullum operae pretium afferentibus miseros aegros fatigantes & vexantes. Vt iam infinitorum morborum cura*

G. Epid.
per. 1.
sect. 5.

Cap. 1.
lib. 7.

relinquatur, magno medicorum dedecore: Immo & plerique contumaces morbi magna cum eorum vituperatione, medicorum vocentur opprobrium: vt iam in iis tantum morbis sese iactent venditentque medici, qui sua sponte soloque naturæ adminiculo facile sanarentur. Sed quorum morborum abstrusior est cognitio & paulum ardua curatio, eos pro derelictis & conclamatis habent: in quibus tamen (si quis artis medicæ, & honos, & vsus, & profectus esset) suam industriam & acuerè & explicare deberent.

Atque idem ferè medicis contingit quod & nauium gubernatoribus. *Qui nauem regunt in tranquillitate, si fortè aut deficiant, aut delinquant, non sunt manifesti: cum verò deprehenderit ipsos ventus & tempestas, palàm iam conspicui sunt omnibus hominibus quod & ignorantia & culpa erroris sui nauem perdiderint. Sic sanè & multi mali medici cum curant homines nil graue patientes: in quos etiam si quis grauius delinquant, nil graue faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multò sapius quàm graues hominibus accidunt. In talibus sanè delinquentes non sunt manifesti hominibus idiotis: vbi verò obtigerit magnus, & fortis & periculosus morbus, tum ipsorum delicta, & ars omnibus in conspicuo sunt. Nec enim longè absunt singulorum pœne ac cruces, sed breuè adsunt. Hæc Hippocrates. Atque his docet & artis vim, & medici industriam maximè elucere in magnis morbis, cum & leues morbi facile per se ipsi sanescant, & si quid in iis satagat medicus nullum tamen operæ pretium faciat, cum nulla hæc artis vis vigeat. Atque Aetium loco prædicto audiamus: Multi melancholici ex efficacioribus vomitoris malè habuerunt. At proinde operæ pretium est nosse, quod multi sic ægrotantes in temporis curationis parum commodi perceperunt. Dimissa verò curatione restituti sunt, natura ante curationem praua lente contrà morbos debiles ex medela factos. Quapropter nature remissionem dare oportet. Videtur enim vnà cum curationibus affligi: in quiete verò inualescere & superare morbos iam attenuatos. Cum itaque morbi, aut breues, aut longi sint, & in breuium curatione nil habeat quod ostentet medicus præsertim si leues sint, cum etiam solo sudor extemporaneam afferat medelam, longi autem officiat quàm profit: videndum an non casu & fortuna sanitas contingat. Ac primum: idem olim in artem medicam omnium præstantissimam & apprimè ad humani generis salutem*

Hippocrates
lib. de
veteri
medici-
na.

Aetius
cap. 10.
Tetrab.
2. sermo.
2.

facientem coniciebatur quod & nunc. Nam primum quod
desperatis salus artis ope restitui nequeat, id vitio arti tradunt.
quod autem restituantur aliqui, id à fortuna pendere contem-
dunt. Ac si cæcus & temerarius fortunæ conatus in hac maxi-
mè arte spectetur: Hippo. à talibus conuitiis artem, vtpotè in-
nocentem quibus olim illam verberabant vindicauit. Ego, autem
Hipp. li. de Aric. non priuabo fortunam tanquam nihil operæ pretij afferat. Puto enim
morbis qui malè curantur infortunium accedere, qui verò benè, eos ho-
nam fortunam nancisci. At eo loco multam commendationem
arti attribuit, quàm ipsi fortunæ detrahit. Alioqui agris labo-
rantibus erat ad fortunam confugiendum, non ad artem. Con-
Ibidem. trà tamen faciunt: ac sic orationi factum dissonat. Idem Hippo.
superius dictum ampliùs confirmat: *Non est quod amplius aliqui
eorum qui sine medico conualuerunt casum spontaneum vero sermo-
ne vehere possit tanquam sanationis causam. Spontaneum quidem nihil
apparet ac deprehenditur. Omne enim quod fit propter aliquid fieri com-
peritur: atque etiam in singulis adeo propter aliquid fieri videtur, spon-
taneum autem nullam essentiam habet, sed nudum nomen est. Medicina
& essentiam habet, & de industria aliquid agit. Et alio in loco pro-
clarius multò docet: Medicina tota inuenta esse dicitur quæ sic lo-
bet & docet singulas consuetudines & occasiones. Qui sic medici-
nam nouit, minimè fortunam respicit, aut expectat, sed & citra for-
tunam, & cum fortuna rectè facit. Constans enim ac firma est medicina,
& doctrina in ea optimè composita minimè fortuna egent. Nam for-
tuna sui iuris est, & nullius imperio subest, nec optantis est adeam perue-
nire. Si enim morborum medicamenta clara sunt, non expectant suam
fortunam ad sanandos morbos.*

Sed est vbi medicus fortuna vti videtur, est vbi non vide-
tur. Vt si cum dat pharmacum ad vnum finem tendens, & duo
sequantur fœlices exitus, fortunatus dicitur: Contrà si dum
datur medicamentum iustè & legitimè, & loco & tempore præ-
scriptum, & in purgatione ipsa casu fortèque vena rumpitur,
aut abscessus, cum hoc minimè medicamenti viribus tribui
debeat, tamen *τύχη*, dicitur infœlixque euentus. Quæ omnia
Lib. I. plenissimè ab Hippo. Describuntur in libris de morbis, & sub
finem libri de locis in homine.

An fortuna partes aliquas in arte medica teneat disputatum
Cap. vlt. lib. 5. de locis aff. est eo modo quo Galenus dicit fortunam: *Sæpè medico non con-
temnendam acquirendam laudis occasionem porrigere, quæ tamen ob im-*

Lib. de
Arto.

Lib. 1. de
morbis.

Lib. de
morbo
sacro :
Initio
libri π-
ei π-
τω.

Com. in
Aph 42.
lib. 7.
Sub finē
lib. 2.
Epid.

488 CONSILIORVM MEDICINALIVM
fubesse docuerit. Verum vt experientia manifestum facit
omnis mos, indoles & ingenium morborum, aut pituitam, aut
bilem facile resipit.

*Com. in
Aphor.
42. li. 7.
Aphor.* Nam sanguis facile in bilem degenerat, immò & videtur
Galenus dicere pituitam, per putrefactionem bilis naturam
redolere: succus autem melancholicus & pituita aliquid ha-
bent *συσπνέει*, vt Galenus demonstrat in Aphor. com. Itaque qui
duos humores constituit, aliorum vim quodammodo adumbrat,
& satis indicat duo summa morborum genera, vnum acutum
alterum longorum. Atque illorum *κρίσις*, est & repentina muta-
tio litisque contestata diremptio, horum verò *λυσίς*, vt in libris

*Com. in
Aph. 50.
lib. 6.
E 40
lib. 7.* de crisibus demonstrat Gal. Itaque ex humorum natura quin-
terna sunt insitæque nostræ generationis principia necessario
statuere oportet morbos longos, alios breues. Vt omnem vim
naturæ generationisque primordia adimere conentur, qui om-
nes longos morbos, aut breues omnes esse posse credant. Sic
humorum vis ipsa & natura pro morborum varietate pugnat.

*Com. in
Aph. 19.
lib. 2.
Hipp.
li. 1. de
morbis.* Atque Galenus & Hippocrates ex humorum varietate duo illa
summa morborum genera duxerunt: *Μορβὶ ἀκροὶ εἰσὶν, αἵ
quorum natura in humoribus calidis consistit, qui vel equaliter per
omnes partes animalis fusi sunt, vel aliquam partem obsederunt. Morbi
verò longi ob lentos, crassos ac frigidos humores sunt qui non facile con-
coqui possunt, & in partibus patientibus impacti sunt. Ita ut eorum
dispositiones magis præduri tumoribus quàm inflammationibus simili-
existant. Deinde subdit morbos istos longos, aut atre bilis, aut pitui-
tæ naturam habere.* Porro illud verum, quod scribit Galenus

*Com. in
Aph. 39.
lib. 2.* omnes morbos diuturnos frigidos esse: quanquã in Epidemio
quosdam affectus calidos diuturnos esse docet, & qui successu
temporis conquiescant, ac præsertim ætate senili. Atque hos
affectus, *νέκροι σπυγνέες* vocat, nomine *τενέες*, generalius sumptis
quemadmodum & ab ipso Hippocrate fames morbus appella-
tur. Immo generaliter, quicquid homini molestiam ac irrisum affert,
id morbus vocatur. Affectus autem isti diuturni & calidi tamen
sunt renum passionibus calidæ & hemicranie calidæ. Quanquam
maxima ex parte succus frigidus morbos longos facit, calidos
breues. Quod & Galenus explicat, dum docet quid Hippoc-
nomine veteris doloris aut recentis cranone oborri velit.

*Part. 6.
sect. 5.
lib. 6.
Epid.* Itaque iam apparet quomodo ex parte humorum qui morbo-
rum sunt parentes & causa materialis, alij morbi sint longi, alij
breues.

breues. Eodem pertinet ætas, tempus, regio. Nam hyeme etiam omnes humores pituitescunt. Immò ex Hippocrate si medicamentum etiam quoduis hyeme dederis, pituitam multam eliciet, tametsi cholagogon sit, ob dominatum humoris illa tempestate, hinc qui in eam incidunt morbi, longi sunt, tum quia materia est contumax, tum quia vires ad tantam diuturnitatem ferendam sufficiunt. Sed præter humores qui causæ sunt aut breuitatis, aut diuturnitatis morborum, est & alia causa potentissima, nempe *diathesis*, quædam in partibus, quam efficere potissimum vult Galenus relapsum, & circuitiorem morborum. Vnde tametsi omni arte curaque effeceris, vt humores pellantur, nihil tamen præstiteris nisi dispositio ipsa penitus sublata fuerit. Vt mirum sit cur post diuturnum profluuium quo omnis corporis sentina exhausta est, febres etiamnum mancant æquæ pertinaces ac antè. Adeò magna vis ipsius *diathesis*, ad alendum fouendumque morborum semen. Ac propterea plerisque visum est tantæ in febre quartana diuturnitatis causam non aliundè petendam quam ex cancrosa dispositione in corpore lienis. Nam quas quartanas solus humor melancholicus accendit, eæ non sunt ita diuturnæ: Sed cum lienis ipsius temperies est mutata, citra inflammationem, aut scirrhum, aut obstructionem (quod de hepatis *κακοσχηγία*, docet Galen.) mirum quam protrahantur affectus ipsi. At cum nō sit in manu medici, sitū, istam aut partis *διαστροφή*, aut *διαθέσις*, aut notam quæ elui nō potest, & quæ lanis assyrio colore tinctis similis est tollere (vt de alterato cerebro loquitur Gal.) non est quoque in potestate illius vt morbos inde natos, fautos, productos & altos tollat. Immò ne impediatur sæpè quominus, aut septennis, aut septimestris morbus fiat. Itaque non humori hæc morborum tædiosa prolixitas, non naturæ, non artis impotentia tribuatur, sed isti partium *διαθέσις*, quæ fomitis instar & alit, & fouet & renouat morbos ferè extinctos.

Lib. de Natu. humana.

Apho. 25. lib. 2.

In fine lib. 2. differ. febr.

Cap. 8. lib. 5. De loc. aff.

Com in pars. ut. simam lib. 1. Protrah.

ANNOTATIONES.

Idco Hippo. lib. 2. Apho. monebat omnia secundum rationem agendi &c. Et Galen. apud ad hunc locum, vt cum gutta lapidem feris, vix est in lapide sensibilis passio: sic in crudis coctisque difficilibus dispositionibus, in quibus cum aliquid sit cum ratione, non desistendum.

Tom. I.

Q99

Id fortassis mirum fuerit, sed Gal. idem demonstrat, com. ad part. 17. sect. 2. lib. I. Prorrh. Vbi docet non proficere quicquam humo- rum euacuationem, cum iam morbus inductus est.

CONSILIUM CVII.

De Febre quartana arthritide & variis affectibus.

IOANNES FORMAGEVS dum iuuenis esset valde famelicus erat & ciborum appetens. Vix famen satiabat. Obseruarunt primarij medici eos quibus, aut imbecillus est lien, vt potè non satis officiosè expurgas hepar, aut putris, voraces esse ac veluti voulimo quodam generaliter dicto occupari. Ac reuera hic de quo nunc agimus splenicus erat, corpore & habitu melancholicus per adustionem, sed tamen moribus & animo satis festiuus & hilaris. Sed literæ illæ interiores, quibus viti- fissima etiam natura potest emendari (exemplo Socratis,) illi ad istam æquitatem & hilaritatem traducere potuerant. At febris quartana longa quâ detentus fuerat, & dolor fixus ad hypochondrium sinistrum, & apertio cadaueris satis testantur quale in liene vitium fuerit. Vix enim quis diuturna febre quartana, & nulla arte medicinali detinetur quin vitium sit in liene, & antecedens, & consequens. Antecedens verò vitium infirmitatem, aut in substantia ipsa aliquid latens & contra naturam quod congenerem affinemque morbum accersat, pariat, alar, foueat, & in multos dies ac annos etiam deducat. Si enim quâdam congestionem, humoris melancholici sustuleris, quæ autumnalis, aut hyemalis quartanæ febris author esse potest, ferè fit, vt diuturnæ quartanæ focum habeat in liene, sed tanto diuturniores fiant, quanto vitium est interiùs, vt totius substantiæ esse dicatur morbus, & *κακομαζία*, contingat in parte ipsa. Cōsequens autem vitium voco, illud quod sequitur ex longa obli- dione & occupatione ipsius partis. Nam non potest fieri vt morbus aliquis in parte diutius stabuletur, quin partem ipsam in qua resider infirmet officiâtque, immò deteriorẽ faciat quàm antequam morbus ipse eam occuparit. Dolor autem qui illum sæpè affligebat in sinistro hypochondrio, satis indicabat

subesse quippiam contra naturam. Si verum illud quod scribit Hippo. *Vbi dolor & calor ibi morbus.* Et cum cibum ingesserat, cōquiescebat dolor. Sic enim credeatur esse ab inanitione, quod ingesto cibo mitesceret. At palliativa & fictitia ista erat doloris sedatio. Atque eo modo multa fiunt & adhibentur quæ dolorem leniunt, cum tamen ea non sint legitima illius doloris sedandi remedia. Sed id fit *κατὰ τὸ συμβεβηκός.* Aperto autem caduere putris & semilacer inuentus lien, & in magnam molem excreuerat, sed corruptione propriæ substantiæ in partes veluti minimas concisus & semirofus videbatur. Præter autem naturale & insitum ipsi lieni vitium, quod corpusculum istud in tantam corruptionem adducere non poterat, sed iuuare tantum, causa erat *περὶ τὴν τοῦ ἵκνου*, quæ noxam magnam intulerat ipsi lieni. Nam cum fortè in equum conscendisset, vt cum fingeret & moderaretur, artis equestris parum peritus tanta vi ab equo depressus ac decussus est in solum, vt mirum fuerit cur repète oppressus non sit. Inciderat in latus sinistrum, & pulmo & lien vitium ceperant. Nam lobi pulmonis sinistri adhæserant costis, & in liene sanguis concretus erat qui è propriis vasibus effusus, tandem ruptis tunicis quibus concludebatur inopinatam mortem eo quo dicemus modo, intulit.

Ad medium mensis Martij dolere cœpit pedem dextrum, reuera arthritidis erat, eaque residua ex febre illa quartana de qua paulò antè dictum est. Nam narrabat se diuturnitatis suæ febris quartanæ tædio affectum omnia remedia vndique quasiuissè quibus posset citò (sed non tutò) febre ista defungi. Consultum est vt hauriret cyathum vnum aceti destillati aqua diluti. Reuera febris visa est extingui. Sed vice illius totū corpus scabie est infectum, nec non ab eo tempore in magnis temporum mutationibus articularibus doloribus est impeditus. Cum ergo duos integros dies magno pedis articulo laborasset, & ad anodyna more solito confugisset, dum cessat dolor iste, paulò post de doloribus hypochondriorum, & præsertim sinistri conqueritur, in neutrum decumbere poterat. Erecta ceruice spirare cogeatur. Murmur erat magum & flatuum Ilias, dolores istos à flatibus esse putabamus, alij verò ab illius refluxu materiæ, & orgasmo materiæ antecedentis, quæ eiusdem erat naturæ cum ea quæ dolores articulares committebat. Reuera autem, vt multis colligebatur argumentis, contra para-

492 CONSILIORVM MEDICINALIVM

doxon Fernelij dolores isti articulares non à capite erant, sed ab interno corpore. Etenim antè docuimus quomodo cessans quartana febris in arthritin cesserit. Credibile esse putabamus quod Hippo. in Epid. scripsisset: *Cui intestinū in dextra parte dolebat & articularū morbo laborauit, erat quietior, postquā hic curat⁹ fuit, erat dolēti⁹.* Huius in com. Duas causas Gal. reddit: Priorē, quod duobus doloribus unā non eundem locū infestantibus, maior obscurat minorem: Posteriorē, quod humorum in artus currentium impetus ad colon intestinum conuersus est. Allegabatur illud Hippo. De eo cui pollex in pede affectus tam repentinam mortem intentauit. Et de Caluo cui femur doluit & desinente femoris dolore mentis alienatio subinde est consecuta, & quarto die mors. Ac tam subita spiritus interceptio, tam subitus dolor, & impotentia decumbendi in alterutrum latus, magnam translationis symptomatice à parte affecta, ad ventrem suspicionem afferebat. Et reuerā adiuuans causa esse potuit, datum medicamentum ex Catholicone: totus dies quo datum medicamentum plenus fuit molestiarum & leipothymiarum. Quæ excernebantur erant virulenta: & istas animi defectiones, à motu istius virosæ materiei esse putabamus. Vox faucibus penè hærebat, facies ferè hippocratica reddita est repētē. Quod omnib⁹ terrificum fuit. Accusabatur medicamentum innocēs, quod satius fuisset secare venam quam purgare. Duabus tribusue de causis abstinendum fuisse à medicamento contendebant: prima est in generali illo proloquio firmata, quoties duorum solennium remediorum purgationis, & venæ sectionis vsus incidit necessarius, à phlebotomia est auspicandum: quod cum aliās ex vsu esset, tum maximè in isto casu erat vsurpandum. Nam inflammatio, & dolor qui aderat, & orgasmus maximè phlebotomiam postulabant. Sed inter cæteras causas orgasmus. Nil est enim quod efferos, & tumultuariè agitados humores compescat æquè cito ac phlebotomia. Quod non citò, nec tam facile facit purgatio. Immò purgatio sæpè turbat humores, & motu ipso deteriores reddit. Omnis enim humor prauus motus, deterior seipso fit dum quiescit. Ac præsertim ad sectionē venæ festinandum est, cum per vasa fluxus, refluxusque esse videtur. Quod si in ventre humor est ac veluti à massa secretus, tum per aluum, aut aliam commodam viam, aptè repurgatur. Alia ratio quæ nos ad sectionē venæ adducere debuerat, est illud quod vulgò obseruatur, in articularibus doloribus, & ve-

Part. 3.
sect. 4.
lib. 6.
Epid.

Hippo. 9.
sect. 3.
lib. 1.
Epid.

Com. in
partic.
6. sect. 1.
lib. 6.
Epid.

mitionibus, & cholera morbo, dum humor est in motu, agita-
 turque huc & illuc, à medicamentis purgantibus magna infer-
 tur noxa, si tum vsurpantur, cum humores efferi sunt, ac tumul-
 tuosè euagantur. Nam rursus agitati à medicamento effe-
 rantur magis, & naturæ vis infertur, vt quæ lædatur valdè ob
 dolores varios quos modo in hac parte, in quam repit humor,
 perferunt, modo in illa in quam suam tyrannidem humor illa-
 bens exercet. Immo fatiscit sæpè natura in eiusmodi purga-
 tionibus repentè factis dum humor in, nisi expectes sedatio-
 nem aliquam & quietem ipsius humoris. Quod si tibi certò
 constaret medicamenti vsu humorem vagantem variâsque in
 partes deductum, in ventrem liberumque spatium impulsu-
 m, quo natura sese illo facillè expediat, tunc tutò purgabis. Sed
 quia sæpè dum tu intendis auocare humorem, & in aluum
 intestinâque tanquam idonea & conferentia ad euacuandum
 loca, intruditur humor in partes inanes & membranarum in-
 terstitia, vnde crudelissimi oboriuntur dolores, præclarè con-
 sulunt, vt coquatur humor: id est mitigetur, reprimatur, mo-
 dificaretur; (nam coctio propriè dicta humorum est crassorum,
 non autem, tenuium & efferorum,) ne impellatur, quò non
 oportet, & maiores in ea parte excitet turbas quam antè, & vis
 naturæ inferatur. Propterea ita audire oportet sententiâ istam.
 Alioqui facillè quis persuaderi possit, tum maximè purgationi
 locum esse cum turbatur & vagabundè incitatur humor. Ideò
 dum in arthritide dolores implacabiles excitantur; mo-
 do in hac, modo in illa parte, propter raptum humorum,
 conferret (diceret aliquis) humorem purgare: non expecta-
 re donec quiescat, quia fortè serò nimis id fieret, & metus
 est ne dum ita fuerit effrænus humor, nobilem partem obsideat,
 antèquam illam suo virore contamineat quam opè subsidiumq;
 præstare afferre possis. Ratio autem ista versatur in Aphorismo
 Hipp. *Concocta medicari oportet, non cruda, neque in principiis, modo*
non turgeant. Dum addit, *modo non turgeant,* videtur insinuare oc-
 casionem purgandi maximè dum iactatur humor, nec consistit.
 Ac si dicat Hippo. tum maximè purgationi locum esse cū impetū
 humores faciunt, & dolores suo motu excitant: Nā motus iste
 quodammodo adiuuabit & attractionem & exclusionem. Cō-
 tra si figi humorem siuerimus, & tempore ad eum exigendum
 opus erit, & maiore vi amolendi humorem iam consistentem.

Qq q iij

In Com-
ment.

& fixum. Cui opinioni Galenus subscribit nos admonens, primo quoque tempore accingamur ad amouendos vacuosque humores qui insolenti motu & tumultuario huc atque illuc feruntur. Verba Galeni hæc sunt: *Tales humores euacuari conuenit, hoc est, qui agitantur, & de loco ad locum mouentur, ac transfluunt. Eos vero qui sunt aliqua in parte firmati, nec alio auxilio mouere oportet, nec medicari antè coctionem. Tunc enim naturam habemus euacuationi adminiculantem, &c.*

Atque ex hoc loco adduci facile possumus, vt in clamosis ipsis arthritidis doloribus corpus repurgemus. Tamen cauendum id est valde: alioqui dum commouebis humores, verendum est ne eos inflammes, & in partem affectam incites & impellas, & consistendum in eo quod diximus antè: Si dum purgans medicamentum damus, nobis constaret mitificatum esse & quodammodo repressum humorem qui tantas in corpore excitat tragœdias, & liberos esse exitus, tutò id quidem fieret. Sed cum in artus, aut per vasa, aut per inanitates feratur, metus est ne augeatur fluxus: Ideò videndum, vt dolores placentur (quibus infirmum corpus redditur) quos excitat materia coniuncta, & è vasis elapsa, at tutò tum ad antecedentem concurrat. Quanquam concedimus clysmata, aut eccoprotica, non ea quæ calore suo, & vi incitent magis humores & commoueant. Ac præsertim cunctari oportet, & à valido medicamento abstinere cum materia est valde effera nullumque pepasim admittit. Contemperanda est potius, deinde contemperata mitificataque impuniùs euacuabitur. Materia autem arthritin faciens ferè illius modi est. Et eo fortè in sensu Hippoc. eos qui prauo vtuntur cibo ægrè medicamenta ferre scribit, nomine eorum qui prauo vtuntur cibo, iis intellectis, & qui prauos assumunt cibos, & quibus intus tanquam diarium reconditi sunt humores prauis, qui nomine *τῆς τροφῆς*, maximè comprehenduntur Hippoc. libro *περὶ τροφῆς*. Sed ista relinquamus.

Mors quæ repentè ingruit non fuit (quemadmodum putabamus) recursus illius materiæ quæ in pede dolores excitauerat, aut suppressæ materiæ virulentæ & antecedentis cōmotiæ, sed rupta veluti vomica interiit. Etenim pulsatio erat in hypochondrio sinistro adeo potens, vt quæcunque ei hypochondrio superessent ea subsultarent: & pulsatio talis percipiebatur, qualis in abscessibus ad suppuratū tendentibus. Sed quæstio vnde

Aph. 36.
lib. 1.

collectio ista sanguinis. Eam ad casum prædictum referebamus, ut idem ei contingerit quod & Barnabæ Pantho con-
 sarcinatori, (de quo ante) qui apostema annum ferè fouit ac
 aluit intus à casu infictum, quo repenti interiit. Et reuerà
 casus iste iuuare potuit, & infirmitas lienii innata quæ tam
 diuturnam febrem quartanam fouerat. Quanquam audio
 illum solitū esse queri de sinistro hypochondrio ante casum
 istum. Sed infirmitas & debilitatio partis & mala diathe-
 sis maximè effecit, ut res admodum leuis, & occasio exigua
 tam formidandum malum aduexerit. Nunquam memoria
 nostra tam altè palpitans pulsansque hypochondrium con-
 tingeramus. Ut mirum non fuerit si ei pars hæc doluerit sem-
 per, & si ita repentinæ cladis interitūque causam intus foue-
 rit. Ac initio quidem tanti momenti rem esse nō putabamus.
 Sed quemadmodum Galenus annotat, *In doloribus ita obortis*
nec præcipit ante timidum, nec temerè securum esse oportet. Ac nos
 fateri oportet mali essentiam ignorasse deceptosque simili-
 tudine tantum. Idem de se confessus est Hippocrates, ait
 Celsus, more magnorum virorum & rerum magnarum fidu-
 ciam habentium, quibus nimirum conuenit simplex erroris
 veri confessio præsertim in eo ministerio quod utilitatis pu-
 blicæ causa memoriæ traditur. Quod si cuiusmodi euentus
 rei foret animaduertissemus, nec rem in certa desperatione
 positam antè nouissemus prognostico (quod aiunt) reliquis-
 semus. Nec illud euenisset, magnā artis nostræ quæ multis
 est auxilio, calumniā, quod contigit. Nam tribus à venæ se-
 ctione horis, de repente arteria vasisque aliis, ut credibile est,
 in lienis regione ruptis interiit. *Turpis autem est calamitas*
dato medicamento eodem die egrum interire, ait Hippocra-
 tes. Idem de phlebotomia solenni remedio dici potest. Et quem-
 admodum præclare scribit Celsus: *Prudentis est hominis primum*
eum qui seruari non potest non attingere, nec subire suspicionem eius ut
odeis, quem fors ipsius peremit. Aliaque commemorabilia illic
 scribuntur. Sed mirum quod contigit: Natura conabatur
 per vas venosum in capacitatem reiectare eum sanguinē qui
 sua copia & quantitate molestus erat: unde adeo intumu-
 it induruitque ventriculus, ut saxeus lapideūque esse vi-
 deretur. Sed, credo, libera non erat via qua id præstaretur.
 Ac plerique eructatione viscerum in ventriculum aut san-

Com. in
 historiā
 5. sect. 3.
 lib. 3.
 Epid.

Cap. 4.
 lib. 8.

Lib. de
 medica,
 purgati-
 sibus.
 Cap. 26.
 lib. 5.

guinis, aut humoris à subita repentinâque morte sunt vindicati.

Cap. 1.
lib. 6.
loco. aff.

Atque eum in sensum ita scribit Galenus de euacuatione sanguinis ex corpore lienis, eâque naturali: Lien, ait, hepatis exemplo excrementa ex se reuocat, ita ut & vomitione melancholicum sanguinem aliquando excernat, qui interdum per inferiora quoque detrahit. Et alio loco ita scribit, Sunt qui putent nequaquam fieri posse ut sanguis vel ab hepate, vel à liene effluens per ipsum euacuetur: Similiter de pure ab ipsis erumpente existimant: Verum per artis exercitationem utramque opinionem contemplanti mihi, visa est per ipsum ventriculum fieri euacuatio ex dictis visceribus.

Cap. 6.
lib. 5.
De loco.
aff.

Non dicit an id commodè fiat, an non. Sed generaliter de his dictum in aphorismis.

Aph. 25.
lib. 4.

Sanguis quidem supra, qualiscunque fuerit malus, insua bonus. Talis aliquando videmus excerni. Et iuuari ægros plurimum tali excretionem, si modo sint ferendo: Item si non sit perennis generatio, sed tantum congestio. Quomodo & Galenus docet prauas etiam urinas tum colore, tum substantia, tum contentis laudabiles esse ob eam commoditatem quæ inde consequitur. Nam, ut ait, tales urinae excernuntur viscere aliquo ac præcipue iecore sese repurgante facultate sua exputrice.

Cap. ultimo.
lib. 5.
loco. aff.

At verò in dextro hypochondrio παλις, erat iste & pulsus qui aneurisma subesse declarabat. Itaque ne quis decipiarur eadem ratione qua nos decepti sumus de aneurismate, pal-

Videc. 8.
lib. quod
animi
mores.

mo & pulsatione valida in parte aliqua, paucis est expeditum. Hippocratem dicunt aut nunquam, aut raro in libris qui extant meminisse, τὸ σπυγμὴ, eo modo quem accipimus, & Galenus ipse accepit in longa enarratione de pulsibus.

Hec Gal.
cap. 9.
lib. 6.
De De-

cretis
Hippo.

Sectio. 5.
lib. 2.
Epid.

Lib. 3.
de Dia-

gnosis.
Cap. 9.
lib. 6.
De De-

cretis.

Sed quoties nomen τὸ σπυγμὴ, reperitur in germanis libris Hippocr. pro manifesta & sensibus conspicua arteriarum pulsatione sumitur. Sic in Ep. scribit, Cui vena in cubito pulsant, iuuat.

Sanus & iracundus est, Græcè, ἡρετὴς καὶ σπύγμης: Vtitur verbo σπύγμης, hoc

Et in libro acutorum loquens de usu vini meracioris, ait, hoc autem meracius sumptum παλιὸν τὸ φλεβόν, id est, Censuam potius facit:

Et alio loco dum loquitur de iis qui plus solito comestunt, οἱ κρόταροι πάλιν τας id est, αἱ ἀρτηρίαι ἐν τοῖς κροτάροις κινεῖται, τὰς ἀρτηρίας, nomine

arteriarum temporum micant & pulsant manifestò, nomine τῆς φλεβὸς ἀντὶ τῆς ἀρτηρίας, vetustè sumpto. Et Hippocrates τὸ σπυγμὴ, nomine, generaliter παλιὸν continet, παλιὸν δὲ κίνησι, ut vocat Galenus.

Galenus in Aphorismis (vt paulò post dicemus) omnemque motum cordis & arteriarum, siue is naturalis sit, siue contra naturam. Quanquam vt propriè accipiat nil nomen *σφυγμὸς*, homonymon habet vt contra Agathinum disputat Galenus. Agathinus enim nomine *σφυγμὸς*, & pulsum propriè dictum, & palpitationem, & vehementem istum motum qui in furiosorum hypochondriis percipitur comprehendebat. Et tamen ea in re Hippocratem fortè secutus est Agathinus. Sed debuerat nosse Hippocratem nondum de proprietate *τῶ σφυγμῷ* statuisset. Galenus verò diligens scrutator doctrinæ de pulsibus, rerum distinctiones diligentius persecutus est.

Com. in
Apho.
s. lib. 4.

Cap. 11.
lib. 4.
De Diff-
ferentia
puls.

Sed de pulsante hypochondrio, seu palpitante, nunc plenius dicamus, huius meminit plerisque in locis Hippocrates. Propriè autem palpitans hypochondrium, vel cum pulsus percipitur à medico, aut ab ægro eo modo quo dum contingitur arteria in carpo, vel cum tumultuariè palpitat hypochondrium, vt idem percipiat quod in corde dum palpitatorio motu agitur vitio vel existente in corde ipso, eiusque ambiente membrana, vel aliunde elata materia subiectaque in cor. Ac primum de Sileno; Hypochondrij contentio sub mollis utrinque promissa ad vmbilicum. Gal. in comm. de contentione illa Hypochon. & de palpitatione assidua eiusdem Hypochondrij loquens, (nam Hippoc. addit sub finem historiarum, Hypochondrij perpetua palpitatione fuit,) Ita scribit: Palpitatio illa perturbationis, vel delirii signum fuit, videtur & aliqua inflammatio fuisse in septo transuerso. Duntaxat enim, ait Hippo. sub mollis contentio Græcè *σπασμὸς*, id est, *σπασμός*, subuacua, id est, citra tumorem qui tumor adest cum hypochondria inflammantur. Sed ubi inflammatione septi transuersi hypochondrium per continuitatem sursum trahitur, contenditur absque tumore. Atque illo loco apparet hypochondrij palpitationem perturbationis signum esse aut delirii. Et hoc in acutis morbis verum est. Hinc Hippocrates in prognosticis ita scribit: Si pulsus insit hypochondrio, Græcè *ἢ σφυγμὸς ἐν τῷ σπασμῷ*, perturbationem significat, aut delirium, Græcè *δὲ σφυγμὸς ἢ σπασμὸς*: pulsum intelligit perceptionem motus arteriarum, aut à medico, aut ægro sine admotione manus. Quidam legunt non pulsum, sed palpitationem, vt legatur eodem modo quo & in historia de Sileno cui erat palpitatione in hypochondrio assidua, eaque aut perturbationis, aut delirii erat velut antesignanus & prænuntia, quan-

Hist. 2.
sectio. 3.
lib. 1.
Epid. 3.

Paris.
cal. 31.
lib. 1.
prognost.

498 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quam de vera palpitatione hoc non potest audiri: hæc enim
 a spiritu crasso & flatulento fit. Sed pulsus & palpitatio
 nis nomine audienda vehemens & perceptibilis quædam mo-
 tio arteriarum, aut magnæ arteriæ dorso incumbentis, eo mo-
 do quo in magnis inflammationibus, ac præcipuè cum ad sup-
 puratum tendunt, contingit. Nec enim omni inflammationi
 pulsus adest, sed si ea sit ingens, & suppurato proxima, ut ait
 Gal. Atque apud Galenum locus est præclarus quo docet pal-
 pitantem motum in magnis inflammationibus contingere: con-
 sentit enim iis qui istum Aphorismum ita interpretantur. Infe-
 bribus circa ventriculum, & fortis æstus, & cordis morsus, vel dolor, ma-
 lum: nomine tunc æstus, audiunt quidam (ait Galenus) crebrum & mo-
 locem cordis motum & præcipuè palpitatiōi similem. Ac tum ex-
 mum malum significatur, vim scilicet vitalem maximo incendio labo-
 rare. Ergo pulsus seu palpitatio, seu perceptibilis motus attente
 rum in hypochondrio delirium faciliè declarat & perturbatio-
 nem: delirium quidem si cætera consenserint. Ideo subiungit
 Hippoc. Sed oculos inspicere oportet, &c. Sed maximè deli-
 rium significatur, si inflammatio sit, aut in ventriculo, aut in septo
 trāsverso, eaque quæ in ventriculo satis insignis, ut in cōmen-
 tario scribit Galenus. Iecur & lien, & magna arteria partes sunt in
 corpore quæ momentaneæ sunt, & maximè magna arteria, ait
 Galenus, quæ si inflāmata fuerint fortè non illud delirium quod
 aut venterculus, aut diaphragma inflāmata afferunt, inducet, sed
 perturbationē. Quanquā si insignis inflāmatio fuerit, pernicio-
 sum & lethale est. Et nomine perturbationis Galen. *Valis intelligi*
cōmune accidens periculosarū omnium afflictionum ex quibus non mori
ægrī, sed & medici perturbantur: Ut delirium & insania sit quid
 maius quam perturbatio: sed ipsa perturbatio adest proximè
 ad delirium accedens. Volunt quidam perturbationem signifi-
 ficare timorem quendam de periculo mortis, & ipsius ægrī tur-
 bationem, nempe corporis ipsius. Atque duo hîc notare oportet,
 prius cur Galenus dixit perturbationem dici relatiuè, & ad
 ægros, & ad medicos. Hoc enim ridiculum videtur: Posterius
 quid sit intelligendum, per verbum *idem*. De priore dicam. Mi-
 ror cur Gal. dicat pulsum significare perturbationem, id est, ut
 perturbetur & æger tum animo, tum corpore, & medicus vi-
 dens ipsum pulsum hypochondrij. Nam idem Galenus, Rides
 simile interpretationē dicti Hippocra. in Prorrh. &c. *Faciei calorem*

Cap. 1.
 lib. 3.
 Method.

Part. 14.
 lib. 2.
 Prorrh.

LIBER PRIMVS.

409

bonus, & mæstitia mala, malum. Subsannat enim interpretes Hippoc. qui referebant nomen mæstitiæ ad medicos, & ad æ-
 gros: ad ægros quod qui colore rubro saturati sunt facillè in
 melancholiam incidant, dum corpus perspiratione caret, vt
 docet Galenus *mel. de usu par.*: & ad medicos, vt qui doleant & ter-
 reantur, cum viderint bonum colorem in ægro præter rationem
 Posterius est de verbo *enim*. Vtitur enim verbo isto cum magna
 energia & significationis vi: Significat enim vel pulsus, vel
 palpitationem profundam, vt excludatur pulsus & palpitatione
 musculorum abdominis, qui aut pulsantes, aut palpitantes, nec
 delirij, nec perturbationis signum dant vllum. Præterea in ter-
 tio Epid. dum loquitur de Philista ait, dextrum hypochon-
 drium, intrò contractum est ac inclinans: & in Com. Gale. ait,
 Hypochondrij contentione fieri cum septum transversum
 alias partes conuellit: tenditur autem septum per idiopathiam
 & sympathiam. Per sympathiam ratione pleuritidis ob inflam-
 mationis magnitudinem, & ob neruorum ipsius tensionem.
 Per idiopathiam ob ipsius inflammationem. Denique inflam-
 matio lienis, hepatis, & septi transversi eam contentione hypo-
 chondriorum asserre solet Galeni opinione. Denique vt gene-
 raliter dicamus quoties apud Hippocratem legitur, Hypo-
 chondrium hoc vel illo modo contentum esse, in eo febrilis
 affectionis sedem esse oportet, ait Galenus. Comment. in hi-
 stor. de Hermocrate, hist. 2. sectio. 1. lib. 3. Epid.

Cap. 7.
lib. 3.
de loc.
aff.

Hist. 4. sect. 2.
lib. 3.
Epid.

Com. in
hist. 8.
sect. 2.
lib. 3.
Epid. 3.
Historia
ultima
lib. 3.
Epid.

Atque sunt plerique alij loci, in quibus palpitantis Hypo-
 chondrij meminit Hippo. vt in historia eius qui in dealcis hor-
 to iacebat, lib. 3. Epid. scribit, *Ad umbilicum perpetua erat*
palpitatio. Et in Coacis, iuxta ventrem in fibre palpitantes, men-
tis emotiones inducunt, Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Item,
dolores circa umbilicum palpitatorii habent, & aliquid mentis emota-
rium, &c. Ac de ægro nostro hoc verum fuit quod & in Coacis
 Hippo. scribit: *Quibus præcordiorum dolores, oris ventriculi, hepatis,*
parium circa umbilicum hi sanguine per aluum egesto seruantur, non
egesto moriuntur. Quis enim dubitat quin si per venam aliene in
 ventriculum tendentem, aut per aluum fluxisset, sanguinis co-
 pia seruatus fuisset? Atque ad perpetuam memoriam hoc est
 menti insigendum, quoties quis etiam dum rectus agit de do-
 lore hypochondriorum præsertim profundo conqueritur,
 oportet non temerè securum esse, sed verendum est de reali-

B r r ij

500 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Hist. 13.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

qualatente. Declarat hic noster æger, & Apollonius in Epidemias cui consuetus dolor erat ad dextrum Hypochondrium, & hic mortis causa tandem fuit, cum leui alia de causa laborasset. Nam mirantur aliqui, quod nos leui de causa in morbos incidere: at hæc per se non est causa sufficiens: Etenim, ait Galen.

Com. in
part. 15.
sect. 1.
lib. 3.
Epid. &
Et com.
ad Hi-
storiæ
de Sile-
no lib. 1.
Epid.

quædam quæ per se ipsa committere morbum nequeunt, quæ si ad corpus, morbo opportunum accesserint, totius causam morbi creduntur sustinere.

Duo nunc restant breuiter explicanda, prius de sanguine cui non conuersus in pus fuerit tanti temporis diuturnitate: postea rursus de aneurysmate. De Priore dicam, Hippocrates ita scribit: Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari Græcè ἐν τῷ κοιλίῳ, id est, ἐν τῷ κοιλίῳ, corrumpi & in pus verti. Ac primum nosse oportet id quod placet Hippo. Si vnamquam sanguis à propria cavitatem in aliam quamcunque peruenit, omnino est impossibile ut sanguis permaneat. Sed an necesse suppurari? Non placet Galeno, cum suppurari nomen sit vnius mutationis in sanguine factæ. Itaque generalius referunt ad τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ, id est, vitari. Sed tribus modis vitatur sanguis, aut enim in pus vertitur, aut liuescit, aut grumescit, grumescit autem præsertim si in magnam cavitatem ceciderit. Atque non mirum si in ægro nostro non suppuratus fuerit sanguis, sed nigrefactus, & in grumos versus: erat enim magna pars eius in amplam cavitatem elapsa. Nec necesse fuit in grumos verti quod quibusdam placere visum est. Et Galenus ait, dolor pulsans inflammationis est comes, suppuratio autem magnarum tantum inflammationum comes est. Sic sanguis in ventrem illapsus non proprie suppurat, nisi adsit inflammatio magna. Caterum in magnis inflammationibus, & phlegmonis sanguis per minimas partes dispergitur, in eas cavitates quæ sunt in musculis quas sola ratione contemplamur: sed in cecum, moli in spatia quæ vasis circumiacent effunditur, ut ait Galenus. Ac obiter ne quis dissimilitudine vocum decipiatur aliud est, ἐν τῷ κοιλίῳ, aliud, ἐν τῷ κοιλίῳ. Nam ἐν τῷ κοιλίῳ, significat suffusionem humoris non egressi à propriis conceptaculis, (vnde τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ, vocat) ἐν τῷ κοιλίῳ autem, significat effusionem humoris à propriis conceptaculis eo modo qui dictus est. Et Galenus vocat τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ, ex vasculis effusiones & inanitiones. Sic quando diu sanguis à natura regitur ac præsertim si in magnam cavitatem effusus fuerit, non vertitur in pus, aut aliquid simile,

Gal. in
Com.
Aphorismis
lib. 1.

Cap. 3.
lib. 2.
De leui
aff.

Com. in
Aph. 20.
lib. 6.
Et com.
in part.
9. sect. 2.
lib. 6.
Epid.
Lib. de
humori-
bus.

¶

præsertim si inflammatio, aut ingens fuerit febris, quæ sanguini ut & humori omni facile malam qualitatem accersat, sed manet in grumos versus. Ac in ægro nostro multus erat effusus, deinde rursus aneurismatis ruptio repentinam mortem attulit. Sic iste magnus & apparens pulsus non delirium significabat, sed contineri aliquid contra naturam in capacitate ista, & arteriam dilatatam valde. Ac fortè de isto ægro audiri potest *Aph. 28 lib. 4.* Quibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, siue quous alio modo extenuatis nigra bilis, siue uti sanguis niger desubier exierit, postridie moriuntur. Sed inter cæteros locos vnus est commemorabilis libro primo de morbis: sæpè quibus venarum aliqua rupta est à laboribus, aut exercitiis, cum coaluerit alio tempore iterum rumpitur: Vbi verò iterum rupta est sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum fundentes, pus autem per totum diem excrenantes, cõsimili modo pereunt, Veluti in aliis morbis dictum est. Hæc Hippocrates. Ceterum de aneurysmate, aut aneurymate cum litera, y, dicendum puto, quod ad tumoris genus relatum sæpè videtur, & tamen de eius vera essentia *Cap. 22 lib. de sang. miss.* nondum planè constat. Galenus de aneurismate, ita agit: Cum quis secare venam rursus arteriam vulneravit, ægrò confestim sanguis compescitur. Tamen si res optimè cadat perducta nimirum ad cicatricem diuisione, tamen aneurisma fit. Sic ea essentia est aneurismatis, ut dilatatio vulnusque etiamnum ipsius arteriæ adsit, cutè ad cicatricem perducta. Magna porro quæstio est, an in aneurismate sit dilatatio solùm, potè vena, aut arteria, ob sanguinis impetum valde ampliata, ac dilatata, an re ipsa sanguis è vase sensim profluat profiliatque. Et id pertinet ad ea de quibus iam à nobis actum est, dū quæreremus an necesse sit sanguinè è proprio vase elapsum, sed tamen aliqua ratione in capacitate retentum ac cohibitum, putrescere. Si enim in aneurismate sanguis & spiritus è vase effluxit, si corrumpitur, cur nõ abscessum facit, & pus fit? Quæ ratio impulit Fernelium, ut credat *Cap. 2 lib. 7. Pusio.* id non fieri: Credi vix potest, ait, per varicem & aneurysma ruptam apertamque esse venam aut arteriam. Si enim sanguis è vena aut arteria perfiliens, non amplius illis contineretur, mox corruptus putresceret, tumorque fieret *Lib. 2. d. tumoribus.* In quo à Galeno in duobus dissentit. Fam esse aneurysmatis naturam statuit, ut sectæ arteriæ vulnus non meat, nec coarctatur, nec coarctatur, nec glutinata, nec *contra naturam.* Si vulnus manet, ergo ut sanguis, & spiritus de

502 CONSILIORVM MEDICINALIVM

filiat necesse est. Tamen hoc absurdum esse Fernellius contendit. Posterius in quo dissentit est, quod si sanguis efflueret, putresceret, & abscessum diuersi generis faceret. At iam superius ex Galeno docuimus non esse necesse, vt sanguis è vasis suis elapsus putrescat ac suppuret. Alias enim mutationes subire posse sanguinem à pure demonstrauit. Tamen probabilitate quadam nititur opinio Fernelli. Si enim maneret arteria aperta, intra dies aliquot, aut intumesceret valde pars, aut si præ conformatione obsequi ampliùsque dilatari non posset, creparet diffringereturque media. At aneurysma diutius etiam durasse oculata testatur fides. Aut igitur ita vulneratum vas conuiuet, vt parum admodum transfiliat ac exudet, aut si vas apertum hiansque supponitur, breue intra tempus abrumpitur tumor: vnde Galenus lib. de sanguinis missione asserit se aduocatum esse vt arteriæ vulneratæ mederetur in malleolo, quod sanguinis cursus non posset cohiberi, credibile est aneurysma fieri non potuisse, quod aperto nimis arteriæ corpore sanguis & spiritus largius coeffunderetur. An verò necessario è vasis propriis effusus sanguis putrescat, aliud fortè est loci atque temporis. Ceterum aneurysma à varice seiungunt, quod varix ad venæ dilationem referatur, eamque à sanguine, aneurysma autem ad arteriam dilatatam idque copia spiritus & sanguinis tenuioris. At varix in cruribus propriè intelligitur, quanquam & ad alias partes potest pertinere. Hippocrates dilationem venarum in pulmonibus veluti varicosam astruit, idque *aneurysma* vocat *ἀνὺ τοῦ ἀνῶδου*, quod præ dilatatione diuellantur membranae præ sanguinis copia ibi inundantis Et sic in omnibus corporis partibus ob violentum aliquè conatum ille *aneurysma*, seu, *ανῶδου*, potest contingere. Et eodem modo se res habet in aliis partibus ac in cruribus. Aetius de aneurysmate abundè differit, & eius interpretes communiter vasorum dilationem vocat: vel quod omnis vasorum dilatio aneurysmatis nomine præhendi possit, vel quod aneurysma æqualiter, & ad arterias, & ad venas pertineat, vel quod cum aneurysmatis naturam constituat arteriæ sectio, alia simul vasorum sit dilatio & explicatio. Atque in omnibus corporis partibus aneurysma fieri posse docet, sed in quibusdam peculiariter. Deinde subdit: *Oritur autem omnino vasorum dilatio, aut dum sanguis & spiritus ex arteriis*

Com. ad
Apt. 1. 10.
lib. 6.

In libris
de mor-
bis.

Cap. 19.
sermo. 3.
Terrib.
42

*persultant, aut dum oscula earum rumpuntur, aut aperiuntur. Sanguis autem & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Et tunc signa sunt certa eius rei, (de quibus eo loco) ut tumor parvus aut magnus, concolor, indolens, ad tactum mollis & spongiosam laxitatem præ se ferens. Digitorum pressui cedit, ut firè evanescat, sed amotis digitis statim reuertitur: Id quod in aneurysmatis quæ sine vulnere sunt apparet. Sed cum arteriæ vulnus præcessit, & deinceps coalescente cute vasorum dilatatio contingit, tumor non similiter mollis percipitur. Sanguis enim copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem attollit. Sic explicat clarissimè aneurysmatis naturam, & paucos animadvertisse credo illius morbi veras notas. Et ex eius doctrina licet aneurysmatis omnis duplex genus statuere, ut aliàs sit cum vulnere arteriæ, atque tunc plus sanguinis quam spiritus est, coëffunditur enim ratione vulneris: vel sine vlcere est, quod fit, aut, ob conatum, aut causam externam, aut internam. Inter nam ut in melancholicis in quibus malignitas est sanguinis. Atque sit vera dilatatio, & effluxio spiritus & spirituosus sanguinis per quandam *σπασμὸν*, quandam speciem *ἀναστομῶνος*. Quamquam in quibusdam sine apertione manifesta, aut ruptione potest fieri dilatatio eo modo quo in varicosis venis. Quis enim dicat effluere è vasis ruptis, aut erosis, aut apertis sanguinem? Quæ opinio impulit Fernelium, ut crederet non exilire è vasis sanguinem in aneurysmate. Sed errat Fernelius, & quicumque credit, aut in omni aneurysmate esse effluxionem re ipsa factam, aut nunquam effluxionem esse. Vtérque enim grauiterrat rerum ignorance & neglecta autorum autoritate. Cum Hippoc. ut paulò antè memini & docet in pulmonibus *σπασμὸν*, fieri & vasorum *σπασμὸν*, (vulsuram ad verbum Cornarius vertit) ut in vasis sit tanquam quædam varix (Græcè *κυστὶς*) si ea in parte magna dilatatio fiat, quis tandem non opinetur verum aneurysma fieri? Atque cum arteria dilatata est valdè tum in signis pullatio adest. De aneurysmate, quod *ἀπὸ τοῦ σπασμῶνος*, ducitur quod ampliare, & dilatare significat, ut potius per *τὸν*, quàm per *τὴν*, scribi oporteat, abundè clarissimus Gorraeus in definitionibus medicis pertractauit. Atque inter cetera bellè explicuit quomodo differant aneurysmata in quibus iam cōclusus sanguis est, & in quibus sensim*

504 CONSILIORVM MEDICINALIVM

influit ac effluit spiritus in capacitatē coalescēte iā carne.

Quod ad partes aneurysmata pertinet, cū alia externas corporis occupent, alia internas, cum in omnibus difficilis admodū curatio sit, maximē verò in partiū internarum aneurysmatibus. Quæ in caput & guttur incidunt ea medentis manum non admittunt. Quæ ad internas partes spectant, ea derepentē & minimē opinantibus medicis ægros ad exitium præcipitant.

Quæri hoc loco potest, an si in sinistro hypochondrio lateat, tutū sectio fieri possit. Hippocrates in libris de affectionibus vrit sæpē regionem hepatis, renum, & lienis: sed in earum partium aneurysmate minimē, hoc tutum non est.

Remedia ægro instituta, cum tamen non ei latenti & incurabili aneurysmati occurreretur, hæc sequuntur.

Iniecta enemata carminatiua quæ ob dissipationem flatuum quibus ille abundabat, aliquam alleuationem attulerunt.

Dolenti lienis regioni fots ex anodynis ex rad. bryoniæ, scolopendrij, florum chamæmel. baccarum lauri, iuniperi, & min. ratæ adhibentur.

Applicantur frequenter cucurbitulæ: & iis remed. alleuatur.

Opiata hæc instituta:

℞. Myrobalanum emblicam unam minutim concisam, confusum buglos. viol. nenuph. & anthos. an. ʒ iij. corticis citrij condus. rasura eboris, cornu cerui, margarit. elect. an. ʒj ossis e corde cervi. ʒ pulueris diarrhodonis abb. & letitiæ. an. gran. 10. ambre griseæ gran. cum syrup. conseruationis citrij, fiat opiata.

Mirum hoc est, cum remedia à nobis instituta directē non oppugnarent morbum, cum ille medicis incognitus foret, vt euentus probauit, quomodo tamen fotuū vsu se leuari animi. Caue ne nimium credas ægro, & non interim diligenter animi neruos intendas ad inuestigationem morbi, vt non cesses quandiu certis notis morbum deprehendas. Sunt enim plerique qui malum lenientes quibusdam remediis satis ægro factum credunt: atque interea miserrimē ægri opprimuntur morbo, & raptim moriuntur. At hoc non satis. Et hac vna re multi sunt decepti, qui applicito vno remedio videntes dolorem leniri, ab inuestigatione ideæ morborum desistunt. Quod multos in vitæ discrimen adduxit.

Et hæc Historia à nobis ad ducta cautiore nos & diligentior

res debet reddere, ne cum ignoratione nostra iuncta sit ag-
rum calamitas magno cum artis vituperio, quam tanta homi-
num coluit celebritas.

Atque ad historiam morbi hoc quoque addi potest, forte
vfu cucurbitularum & fotuum, & cataplasmaton ex radice
Bryoniae (quae omnia confusè administrata sunt vt nihil non
agere videremur) attractionem maiorem factam fuisse, & mor-
tem acceleratam. Quod in primis Aetius commemorat, & hoc
loco siccè non est praetereundum, ne sinamus longius manare
errores qui quotidie committuntur: *Vidisti tu eodem tempore cum
fomentum cuidam adhiberetur eum difficulter spirasse omni superflui-
tate ad praecordia per calorem attracta. Hic itaque mortuus est cum ca-
taplasmata instar cucurbitae superfluitates ad partem attrahant. Qui-
dam etiam ipsa cucurbita vfi sunt in praecordiis, hoc unum ipsi cogitantes
vt aliquid circa agros agere viderentur.* Actum die 12. May 1575.

ANNOTATIONES.

¹ Hipp. sectio. 3. lib. 2. Epid. Narrat quartanam quoque febrem
longam facto impetu in vniuersum corpus, & tumore qui ad lienem erat
evanescente defuisse.

Idem contigit Ioanni Meresse, cuius totum corpus lassitudine *δυσκονία*,
laborabat facta translatione à centro ad totum corpus. Et 4. Epid. no-
tat. De quodam seruo quartanario cui febris conquieuit cum factus esset
νῦν δὲ δῶς, aut *νῦν δὲ δῶς*: id est stupidus, vel in totum corpus translata mate-
ria, vel in caput. Vnde comatosam & catalepticam induxit affectionem.

² Hinc discas in metu arthritidis, non nisi cum cautione purgandum
quoniam irritatur saepe materia: Vide librum 2. meorum Epidemiorum.

³ Hoc aduerbio, impuuius utitur Cicero. 2. de Diuinatione.

⁴ In Coacis dum de lethargo disputat utitur nomine *οὐκισμῶς*, proprie
accepto.

⁵ De palmo summo & admirabili ad umbilicum & os pectinis nar-
rat, sed rationem non reddit Hippo. 7. Epid. initio in historia de filio
Eratolai dysenterico.

⁶ Et Hipp. notat 5. Epid. Vxori Gorgia pulsum in utero extitisse, id
est, motum arteriarum manifestum post menses suppressos. In uxore
Philini historia 4. sectio. 3. lib. 1. Epid. die 14. palpitationes fuerunt,
sed eas ad crassos & crudos succos in Corn. Galenus refert.

⁷ Magna arteria pars est principalis, com. in part. 31. lib. 1. pro-
gnost.

Tom. 1.

Sff

⁸ In Collegio Rhemenſi cuidam ſacerdoti aneurysma erat in cruribus. Aperto cadauere reperta eſt magna dilatatio arteria, & ſanguis in ea arteria concreuerat indurueratque: Indurationis cauſa tribuebatur immoderato rerum refrigerantium uſui.

⁹ Multi falluntur in principio aneurysmatis à ſeſſione arteria moti. Credunt enim non eſſe aneurysma, ſed tumorem tantum aliquem præter naturam. Si enim à ſeſſione arteria non incipit non eſt neceſſe ut ſit ea pulſatio quæ ad eſſe ſolet arteria vulnerata.

¹⁰ Quæſtio eſt an in omni aneurysmate neceſſaria ſit pulſatio, ſine his enim ne aneurysmatis quidem rudimentum eſſe poſſe contendunt.

CONSILIVM CVIII.

De febre maligna.

Nobilis vir D. de Cernenay, ad inſigne crucis viridis cili accubiſſet vxori ſuæ exanthemata patienti in febre degenerem incidit. Erat continua, ſed exacerbationes habes noctu. Dolores quidam erant circum nothas coſtas, ſed ij adeo parum erant moleſti, ut medicos non adduxerint ut eis mederentur. Corpus erat planè bile ac ictero infectum: Præcalida habebat viſcera, & ante quartana annua laborarat. Pulſus erat parum elatus, non febris, ac calori, ac linguæ reſpondens. Qui ſanguis detractus eſt bilioſa ſanie plenus erat & corruptus, deiectiones planè bilioſæ. Et quod nos terruit quinto aut ſexto die inopinato ſputum reddidit permixtum ſanguine & bile, & parum nigricans. Pleuritim eſſe dicebant quod febris eſſet, & tuſſis: At iſta tuſſis erat à collecta corrupta iſta materia in pulmone. Reuera ſi pulmonia aut vera pleuritis cum adorta fuiſſet in tanta materie in pulmone collectæ corruptione, intra paucos dies interiuiſſet, accedente maximè pulmonis imbecillitate. Sed quoniam nondum aderat occaſio, ut aut coſtæ aut pulmones laborarent, febris tantum continua occupauit vera & eſſentialis. Dicat quis, quid illa ſputa tam praua & horrenda deſignabant? Si ſputum album eſſe debet, & omnis expertincturæ, ſi vomitiones humorum qui colores alienos habent, aut graueolent male ſunt, cur non & excreatio alieno colore

imbuta? reuera si ista colorum prauitas inflammationis comes
fuiſſet, aut ſi actu inflammatio pulmonem prehendiſſet (vt an-
tè dictum eſt) vix vlla vitæ ſalus ſperabilis fuiſſet. Sic erat ex-
crementum collectionis, non ſubitæ generationis, aut inflam-
mationis conſequens. Atque in hoc maximè ægro, vt & in fi-
lio Noëi fabri lignarij verum comperimus quod ſcripſit Hip-
pocrates, *mei ἀποχρεῖται: In febribus que non intermittunt excrea-* ap. 47.
lib. 4.
tiones ſanguinolenta, liuentes, graucolentes, biliſe, omnes mala ſunt.
Si benè procedant, bona: eadēque ineunda ratio in iis que per aluum
& vrinas feruntur: Quid? fieri ne poteſt, vt quantumuis facilè
cedant ſputa cruenta, biliſa, graucolentia, liuentia, ea ad ſa-
lutem pertineant? Sunt enim malæ vt ſignum, quod partium à
quibus manant vitium & corruptionem ſignificent. Nam non
modo videndum quàm benè procedant iſta, ſed vt in qualita-
te tantopere non peccent. Galenus in com. Ait Hippo. debuſſe
poſſus dicere omnes malas excretiones, ſi facile ſiant, bonas eſſe excretio-
nis modo, non qualitate, non loco, non materia, non cauſa. Nam omnes
mala excretiones prauarum ſigna ſunt diſpoſitionum, & ſunt eo modo
quo in ulceribus putridis quibus ichores ſaniſſi deſluunt, nil diſpoſitioni
conferentes. Nonnumquam verò ita ſicuti pus ex abſceſſu dirupto benè
expurgans partem laborantem. Indicia verò quod benè excernatur,
maxima ſunt, & coctio & agri tolerantia, item morbi ſpecies, tempus
ni regio, etas, naturæque ægotantis.

At ſæpè coctionis argumenta non apparent, cum ea materia
quæ excernitur non ſit morbi vllius, ſed tantùm congeſta ſit in
parte, vt de inſtituto in ea matificanda regendæque Natura non
fuerit occupata. De excretionem è pulmonibus multa Hippocr.
In prognosticis, ſed tū de apparentibus pulmonū morbis, vt de Part. 44.
lib. 2.
progn.
pleuritide aut peripneumonia loquitur. *Inter cetera, ait, permix-*
ta appareat ſlaua bilis admodum ſcreatione oportet. Screation ſlaua ſi ſyn-
cera eſt, cum periculo eſt, cādida verò, glutinoſa & rotunda, inutilis eſt.
Si viridis & ſpumans admodum eſt, mala eſt. Numquid hīc alienos
colores, alienāmque qualitatem in ptyaliſmo vituperat: & ta-
men docuimus & ex quarto Aphoriſmorum, & ex hiſtoria quā
hoc loco narrauimus excretionem è pulmone prauas aliquando
bonas eſſe propter eam vtilitatem quæ conſequitur ex tali ex-
cretionem, quod interea partes liberantur ea corrupta materia
quā præpediebantur. Tameſi enim materia mala ſit, per acci-
dens tamen ratione ſinis & boni qui inde ſecutus eſt euentus,

bona dicetur esse. Sic tamen Natura fluxum sanguinis per hæmorrhoides non instituerit, tamen quia inde commoditates ad sanitatis & custodiam & morborum repulsam consequuntur, fluxus iste opus naturæ ex instituto paratum dicitur è Galeno.

Ac duo sunt celebres loci, & omni memoria digni apud Galenum, ut iubeamus valere & exulare imprudentem quorundam temeritatem & crassam ignorantiam cum vident prauas aliquas excretiones: Prior est in lib. de locis affectis. *Sapè, inquit, hepate robustiore aliqua ex parte effecto pessima excretiones & colore & consistentia apparent, item & urina. Unde decepti medici putant grauisimum morbi periculum subesse. Sed errant. Nam quibus sine ratiocinatione rudis duntaxat experientia suffragatur, de his quæ rarò accidunt, experimenta habere nequeunt, veluti eorum quæ sæpè accidunt, facile meminerunt.* Alter locus quo explicat illum Hippocr. locum. *Omnis creatio mala quæ non sedat dolorem, quæ verò sedat dolorem, omnis melior est. Sæpè valuit natura, (ait Gal.) prauam vincens affectionem expurgare corpus: & in hoc terrentur multi aspicientes secreta vitium materie, nequaquam cognoscentes utrum id symptomatis fiat ratione, an quia natura prauam materiam foras expellat. Atque excretionis bonæ & utilis notas assignat leuationem doloris (quanquam id non sufficit Galeno) & in primo Aphorismorum, εὐφραίνει². Atque ut id terminemus de quo dictum est: Notanda duo sunt, prius cur Hippo. vsus sit nomine ἀποχρῆσις, non πύλις, ut in progn. aut πύσις: posterius, cur dixit, in febribus non intermittentibus. Quasi verò in febribus essentialibus (nam nomen πύσις, absolutè positum febres essentialis notat) excreatio alicuius sit momèti, propriumque sit excrementum febris, cum eius materia sit in maioribus vasibus clausa non in pulmone. Nam quemadmodum in morbis thoracis parui penditur vinarum inspectio, quod nō sit proprium pulmonis excrementum: Ita in febribus ipsis veris non valet sputorum inspectio, nisi auctoris vice. Quia si ad bonitatem actionis ipsius materiei febrilis sputorum appareat adiungaturque bonitas & facilis eductio, bonum id signum. Ego verò coniecturas aliquas afferam quibus adductus fortè fuit Hippoc. ut πύσις ἀποχρῆσις, meminerit. Ac primum id docere voluit ut si occurrat qui praeproperè ac præcipitè de morbi iudicant, & cum vident aliquid alienius è parte, ac præsertim è pulmone excerni, quod non viderint, statim malè de morbo ominantur.*

Sub finem lib. 5.

Part. 51. lib. 2. prog.

Com. in Apho. 2. lib. 1.

tur, ac sinistrum euentum prædicunt. Immò putres esse pulmo-
 nes dicunt, vt si contingat ægris mori suam incertiam (cum for-
 tē malē curauerint febrim ipsam essentialē) excusatione ista
 tegant. Aut dixit hoc, ne relicta febre ad excreationes istas
 malas conuertant se, cum tamen malē id fiat. Collectio tantum
 erat per transudationem ichoris à caco-chymia traducti in pul-
 monem. Aut monet hoc Hippo. ne territi medici inspectione
 eorum malorum sputorum ægros deferant tanquam concla-
 matos. At, tametsi materia ista mala sit, bona tamen est si ex-
 cretionis modus affit legitimus, quod vis naturæ paruerit in
 desiccanda materia quæ ob moram talem corruptelam contra-
 xerat. Nonne etiam videmus integra fruētes sanitate mun-
 gētes sub viride saniosum, *δυσωδης*. Et tamen cū mala sit materia,
 bonum est quod virtus expultrix valeat in excernenda ista ma-
 teria, quæ alioquin maiore mora partem labefecisset. Quod si
 pleuritis adesset, aut morbus proprius pulmonis, & tale sputū
 appareret, fortē non tam securum esset, quam si in essentiali
 febre appareret. Quare? Quoniam si vigeret morbus pul-
 monis cum tali sputo, generationis perennis talis sputi sus-
 picio foret, quod malum est. Sed cum inopinato in febre
 essentiali talis mala *ἀποχρημψις* apparet, non tam generatio est,
 quam veteris excrementi collectio, vt ista mala qualitas & co-
 loratio non tam nata sit ob alienum calorem, quam moram
 longam in pulmone. Quamquam non dubium est quin si illa
 putresceret inflammationēque accerferet in pulmone, ma-
 lum deterius inueheret, quam si alius esset coloris & consisten-
 tiæ. Vnde in prognosticis spumantem & viridem ex pulmo-
 ne excretionem vituperat & maximē si sincēra sit excretio.
 Præterea duo notari debent cur dixerit *ἀποχρημψις*, & febres nō
 intermittentes, quod vtrumque (si potest coniectura aliquid)
 non citra rationem adiectum est. Nam cum nomine *τῆς ἀπο-
 χρημψις*, vtitur non autem nomine *τῆς πυέλης*, videtur significanter
 notare non tam esse materiam thoracis morbificam quæ excer-
 nitur, quam excrementum aliarum partium, quod in pulmo-
 nem influxit, & ob moram aliquam alienū colorem accersuit.
 Cū autem significatur vera excretio è pulmone, si quis affe-
 ctus instrumenta respirationi deuota tenuerit, vtitur voce
ἀπύσσω, aut, *πύων*. Ideo dixit, in febribus, non intermittētibz:
 vt declaret ratione præsentis caco-chymia & vi caloris humores

fundentis, & per modum attractionis ipsius pulmonis à parti-
bus inferis, aut per modum transsumptionis & transsudationis
colligi in pulmone materiam alienam, quæ aut tussi, aut alio
modo expectoratur. Et sic de pulmone malè affecto non
oportet nos malè ominari. Per quandam anastomofin, aut
similem passionem cruentæ possunt fieri excretiones è pul-
mone agitatæ humoribus, & ob suam acrimoniam vala re-
ferantibus. Si enim facilè in febribus continuis autore Hip-
pocrate, & inflammationes cerebri, & pulmonis facilè pos-
sunt succedere; nunquid pars materiæ febrilis à pulmone
potest attrahi iam per se maligna, & *αἰχμηδὴς*, & alieno colore
imbura, quæ sputa ordinaria potest tingere, vt inde excre-
tio derepente immutetur? Vnde dubium esse non debet,
quin, si materia illa diutiùs moretur ibi, pulmones inficiat,
ac labefaciet. Itaque peropportunè excernitur, bonoque
est si eius facilis fiateductio, & sola fiat *ἀπὸ χευλῆς*, id est, per
simplicem excreationem sine vi, sine tussi, sine violento mo-
tu aliquo *ἐκπνεύσει*, vt loquitur in libro *πλευριτικῶν*,eductio fiat.
Sic nomen *τῆ ἀπὸ χευλῆς*, facilitatem excretionis declarat, ac si
materia ipsa in os occurrat eo modo quo cum à capite *ἐκπνέται*,
descēdit sine tussi, sed solo linguæ motu expuatur & excre-
tur id ipsum quod occurrit. Et non mirum si *ἀπὸ χευλῆς*, fue-
rit biliosa, nam totum corpus erat biliosum, cacochymum,
& *ἰκτερίδης*. Et cum Hippo. ait ex signis mox apparentibus
de morbo iudicandum esse, vt in qua pleuritide mox sputū
apparet, ea breuior & securior dicatur, hoc debet intelli-
gi de morbi excremento, non autem de illa materia extraordi-
naria. Nam multos pulmonicos & pleuriticos vidimus qui
primo die morbi è pulmone reiecerint quibus & protractus
morbus & mors ingruit. Quoniam educebatur non id quod
morbum faciebat.

ANNOTATIONES.

¹ Error medicorum qui cum sputum, aut cruentum, aut subcruentum,
vident, putant esse, aut pleuritid, aut peripneumoniā. Quæ opinio
etsi opinione Gal. & Hippo. paulò post confutata est, quod ex pulmone
sæpè prauæ fiant excretiones, vt floridæ (id est cruentæ) nigricantes,
pallidæ, cum tamē nec sit inflammatio, nec pleuritis, nec peripneumonia.
Inter cetera locus est cōmemorabilis in hystoria de Pythione, lib. 3. Epid.
part. 4. sectio. 1. ubi docet sexid die varia Pythioni, & cruenta sputa appa-

LIBER PRIMVS.

511

uisse, cum nec peripneumonius, nec pleuriticus foret, nec à capite malum
esset, sed à defluxu tantum materia quæ non erat tanta, ut inflammationē
pareret, aut fortè in pulmone congesta, sed quæ incendium non conceperat.

Huc pertinet locus præclarus, lib. 2. Epid. sectio. 2. ubi loquitur de
eruptione Terminthorum in febre continua, & ait, ager autem erat sub-
splenicus, ac si dicat istam eruptionem non fuisse propriam morbo, sed
corpori.

Ad hunc locum pertinet historia, lib. 5. Epid. de Hippoſthene: is ce-
siderat luctans: cruentum ^{ἐξέρχεται}, ait Hippo. & addit, ^{ἐκ τῆς σπλῆνος}. Non
erat sputum: quod notandum, erat quidem ^{ἀπὸ χεραμίδος}, sed non erat ^{πύα}
^{λοι}, seu ^{σπλῆνος}. Ideo dixit, Videbatur medicis esse peripneumonia, sed
non erat. Sic caue ne quid in his erres. Et puto nomen ^{σπλῆνος}, pro ^{πύα}
sumpsisse. Quanquam ^{σπλῆνος}, significat tantum saluam non sputum.

CONSILIUM CIX.

De cordis palpitatione.

Vxor LYSSÆI annos 22. nata palpitationes cordis per-
sentiscit quas formidinē appellant, alij tremorē & im-
propriè quidē. Quidam ex veteribus imperitè confundūt cū
cardiognmo & cardialgia, malèque tremorē vocant. Etenim
facultatis animalis imbecillæ symptoma nō est, nec mot⁹ est
mixtus naturæ & morbi, & pars loco non dimouetur: quod
trementi parti contingit. At tantum eleuatur & deprimi-
tur pars. Tamen quod ægri putant cor è loco moueri, ideo
tremoris nomine impropriè donatur, quo modo & singul-
tum ventriculi conuulsionem dici demonstrauius. Cona-
tur enim cor excutere id quod ei molestum est: & cordis
eleuatio depressioque definitur subinde præter naturam
facta. Cardiognmos autem, & ^{πνιγμός}, iidem affectus non sunt
quanquam aliquid affine habent. Ante exposuimus Apho-
rismi illius particulam, In febris circa ventriculum & fortis
æstus, & cordis morsus vel dolor, malum. Miror cur Gal. in com-
lis assentiatur qui nomine ^{τὸ καρδιακόν}, intelligant crebrum
velocem & palpitationi similem motum ipsius cordis ob in-
cendium ingens in corde ipso: ex qua Galeni opinione confi-

312 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 ciūt incendiū ac phlegmonē in corde τὸ παρὲν causam esse posse.
 Quod à ratione alienum videtur cum Galenus ipse alio loco
 (sed nondum occurrit locum istum legere) à causa frigida re-
 petat palpitationem. Declarant frigida remedia quæ ad hunc
 affectum instituta videntur. Ac primū magna est absurdi-
 tas statuere idem esse καρδιασμός καὶ παλμός, cum cardiognos ad os
 ventriculi pertineat maximè palpitationem autem cordis affectio
 est, quanquam per aliarum partium, & maximè ventriculi con-
 sensionem nasci potest. Item καρδιασμός, in cholera morbo &
 febribus continuis ob morsum ventriculi à flava bile frequē
 esse solet, vt propterea non debeat numerari inter alia sympto-
 mata mala. Quid verò est dicere cardiognos significare ve-
 hementem quendam motum palpitationi similem? dicam quod
 sentio. Nomine τὸ καρδιασμός, non intelligit affectionem ven-
 triculi ob morsum, sed symptoma quoddam consequens suum
 æstum in febre, siue æstus sit simplex, siue ob ebullientem fla-
 uam bilem in tunicis ventriculi: vt vult in com. Galenus, vt
 ὁ καρδιασμός, indicet cordis ipsius affectionem cuius affinis est mo-
 tus quidam palpitatorius, vt quasi vnum ex alio consequatur.
 Et ideo illi veteres καρδιασμός, non palpitationem significare di-
 xerunt, sed motum vehementem palpitationi similem. Vnde
 ægri dicunt sibi palpitare cor & quasi ardere præ ingenti æstu
 quò conflagrant. Hoc quod diximus ne confingere viden-
 mur, confirmabimus autoritate Hippoc. qui admirabili qua-
 dam explicandi vi docet quænam symptomata consequantur
 erysipelas pulmonis. Atque inter cetera sunt vomitus bilis &
 pituitæ, nec non deliquia animi. Quod mirum esse potest, cum
 erysipelas pulmonis propria sit affectio. Sed admirabilius est
 id quod dicit de causa cur deliquia animi sequantur pulmonis
 inflammationem, propter sanguinis transmutationem repente
 contingentem. Id est, cum inflammatus est pulmo duo sequun-
 tur horrenda, nam spiritus cordis inflammantur: immò & aer
 attractus dum pulmonem transmittit ita incalescit, vt nullum
 solatium refrigerij afferat, sic cor languere, & languidè moveri
 contingit, & dum crebriore & frequentiore motu cietur ali-
 quid παλμώδες contingit: Item attractio fit sanguinis & spiritus
 maior ob ardorem, nam incendium attrahit, ait Hippo. Et ob
 istam attractionē subita fit transmutatio sanguinis quæ palpitatio-
 nis aliquam speciem affert. Sic vides. In magno æstu & de-
 liquia

liquia euenire & palpitationi aliquid simile, vt & deliquium & eleuatio depressioque pulsus, & crebra mutatio coniungantur. Immo & in morbo, & per sanitatem cum euariat pulsus, vt è magno in paruum, è frequenti in rarum, è veloci in tardum mutatio fiat, palpitationis magna sunt argumenta. At dū æstus ingens in corde est, præsertim si de repente magna fiat attractio spiritus & sanguinis, & mutatio pulsus & palpitandi occasio facile incidit. Ergo cum ingens aliquod incendium est, & aliquid est palpitans, ob similitudinem quandam cū palpitatione, motus iste *παλινδρως*, dicitur. Cæterum, vt antè dictum est, volunt ex Galeno veræ palpitationis causam esse frigidam. Quod si verum est cur veteres practici alia remedia instituunt calida, & phlebotomiam præscribunt. Nam in causa frigida venam secare tutum non est. Galenus omnem palpitationem iuuari venæ sectione author est. Et qui Galenum interpretantur idè locum sectioni venæ dant etiam posito quod causa frigida palpitationem inducat, quoniam aut minuatur plethora, aut obstructio sectione venæ liberetur, aut reuellatur cursus materici flatuosæ. Supponit enim Galenus à crasso vapore palpitationem ferè omnem oriri, idè non est dubium quin & ad diuertendum reuellendūque cursum phlebotomia, & ad attenuandum attenuans victus conferat. Mesuæus de sectione venæ loquens in palpitatione ex hypothesi loquitur, Arculanus etiam ad syncopen vsque exclusiue in palpitante sanguinem mittit. An propterea imitando istorum senum consiliū audacter sanguis mittetur? Nequaquam. Nam eorum qui palpitationi sunt obnoxij ita comparata ratio est, vt *βραχυτέρως* sint, ac sæpè in phlebotomiis ipsis & purgationibus opprimantur & moriantur: Quod cum calamitosum sit, prudētis est medici diligenter inspicere ne suspicionem subeat eius, vt occisi quem sua fors peremerit. Mesuæus ita de phlebotomia in palpitatione scribit: Si cum cordis tremore fuerit pulsus velocitas & febris, æger ex basilica minuendus est. Ex dextra quidem, ait Arculanus, ad minuendam plethoram, ex sinistra ad remouendum repletionem vaporosam. Melius enim Arculanus sentit, meo iudicio, de sectione ista venæ partim ex sinistra, partim ex dextra quam Auicennas & Arabes, qui idè dexteram secant, quod palpitationem à sanguine esse credant, sinistras, quod cum à vapore oriatur, commodè id fiat. Vix

Lib. 5.
loco. aff.

Tom. I.

T t t

514 CONSILIORVM MEDICINALIVM

enim euenit vt sanguis hunc morbum pariat, sed à vaporibus potius, aut à causa consimili. Quanquam sunt qui venam in cruribus, aut poplite secant, si præsertim ab hypochondriis malum est, vt per arteriam celiacam à parte sinistra, præsertim verò è lienis regione vapor crassus, quem in cor elatum scilicet cultas ipsius partis tanquã subsulrantem hostem nititur expellere. At erroneum hoc est. Siquidem si hoc valeret, cum palpitationum pars maior ab hypochondriis sit, venas poplitis aut maleoli vtrique aperire conueniret. At hoc non fit. Sed exclusã istã ratione tanquã parũ probabili, duabus de causis inferiorum venarũ reseratio ex vsu futura est, prior est si suppressio aut mensiũ, aut hæmorrhoidon in causa sit, posterior autẽ si reuellendi studiũ est: Alioqui brachiorũ sectio profutura est potius.

Quod autem attinet ad sectionem venæ ad leipothymiam vsque, videtur ea nocens esse, præsertim cum, vt antè dictum est, palpitationi obnoxij ferè dum euacuantur, inopinata precipitque morte eripiuntur. Accedit quod palpitatio cordis, vt annotat quidam in Arculanum, dispositio quædam media sit inter pulsum & debilitatem & syncopen. Quod si verum est, & ideo metuatur iste morbus quod cõnatam in se debilitatem, & quasi annexam syncopen habeat (quæ quidẽ syncope mortis finitima est cum nomen inuenerit *ἀπὸ τοῦ συστοπνῆν*, quod vitæ nostræ filum concidat ac defecet) quid attinet nostrã largã sanguinis euacuatione, in qua spirituum magna sit dissipatio, accersere syncopen, & ita mortis periculum creare? Sed Arculanus vt acutus & optimus autor, vnã tantum rationẽ affert, quæ nos inducere possit ad tam luculentam & copiosam in palpitatione sanguinis effusionem, vt potè cum in sanguinis copia & orgasmo, & ad cordis arcem raptu metuitur, ne derepente in corde apostema concipiatur, & mors proinde subita intuentetur: Aut etiam si inflammationis subita sint argumenta quæ ipsius palpitationis causa sit. In isto enim casu, quoniã insignis & subita refrigeratio requiritur, ne breui tota ipsa rege inflametur ac conflagret, nullum præsentius auxiliũ venarũ sectione eaque conferta & copiosa. In ceteris à largis istis euacuationibus temperandum est. Ac de causis illius morbi, qui per se terrificus est, dum cætera sedulo lectori legenda relinquimus, breuiter percurramus. Aliquando in corde ipso affectionis causa est, & tum periculosior existit: aliquando à

partibus vicinis est, aliquando à remotioribus, vt ab vtero, à maligno tibiæ vlcere. Tuberculum in corde, abscessus item affectionis causa esse potest, multus sanguis obstructionem faciens, intemperies calida, vermes cor vellicant, subita euacuatio, imprægnatio. Quemadmodum enim mulieres quædam veteribus affectionibus præhendi solitæ, cum vtero conceperunt iis liberantur & miraculo absoluuntur, edito verò fœtu repetunt, ita quoque prægnantes mulieres, insolentes morbi possunt inuadere, vt palpitatio-nes & Epilepsia, dentium dolores implacabiles, & capitis grauitates. Præter causas commemoratas inflammatio, aqua tunica cordis inclusa, item si tunica, aut humorem putrem ac malè olentem in se contineat, aut lapillos, palmum inducit. Item venenata qualitas, spirituosus, aut crassus halitus, vel ab arteriis, vel à corpore cordis, aut à pulmone, aut à liene aliâve parte, aut propinquiore, aut remotiore elatus: Constrictio maior, decubitus in renes & dorsum, præsertim si magna arteria perreptans spinam prematur, à succensis putribus lignis elatus vapor, ductus & attractio spiritus auræque pestilentis. Adhæsiopericardij corpori ipsius cordis, quod in duobus hydropicis obseruatum est. Mucus per quandam colliquationem in cor illabens, (vnde dicunt vulgò quosdam repente interire quod adeps colliquatus in cor influxerit,) ac tum cum colliquationis modo mucus iste in cor labitur falsò asthmatici creduntur ægri. Si palpitatiōem aut inflammatio aut erysipelas committit febris ingens est, pulsus durus & veluti ferrans. Si à venenata aura infernè in cor surgente, fugax est malum. Cum à venenata aura in pestilente statu, præceps virium omnium lapsus est. Cum à muco per modum colliquationis in cor fuso, æger sit anhelosus, parua & densa spiratio est. Vidimus palpitantem affectum ob aneurisma in liene, quod si in corde ipso aneurisma sit, lethalis est affectus. Quæ palpitatio syncopen veram iunctam habet, insanabilis est. Quæ ab adhæsiopericardij est, lethalis est. Quæ à colliquatione est, insanabilis quoque est: Item & ea quæ à venenata aura est. Atque inter ceteras palpitatiōis causas vna & communis & vulgaris est, intemperis frigida ventriculi, & iecoris calida. Dum enim ventriculus non benè suum facit officium, & secundam coctionem tanquam correctionem & emendatricem sui prima

Apho.
vltimo
lib. 5.

Corr. in
aphor.
vltimo
lib.

6. Epid.

non agnoscit, iecur calidius rapit erudius alimentum, hinc an-
thymiascon proventus multus, obstructionum ilias, & ab illis
obstructionibus palpitandi occasio.¹⁰. Quod hypochondria-
cis solenne est, cachecticis, & virginibus scditate coloris in-
fectis vsu-uenit. Galenus horum demonstrationem videtur
afferre tanquam aliud agens com. in istum Aphorismum, *Qui
regio morbo laborant, non multum ventosi sunt*: Nam ventorum
flatuumque generationem à duabus causis repetit, vna est ma-
teries ipsa, altera est partium corporis earum præsertim quæ ad
ventrem attinent, debilitas. Materia est crudus, pituitosus ac
frigidus humor qui faciliè in flatum soluitur. Atque cum regio
morbo laborantes calorem habeant acrem, nec non bile potius
abundent quam phlegmate, credibilius est flatuosos non fieri
cum desit materia. Sed debilitas ventriculi & primarum vena-
rum status potest esse parens ob cruditatem. Cruditas autem
ipsa idem ferè præstat, quod ad generationem ventorum spe-
ctat, quod & pituitosus humor. Quanquam diuerso quodam-
modo id fit. Sic icterici, & qui calore abundant acri ferè in
tympanitem incidunt, speciem hydropis à flatuum copia nati,
non ratione phlegmatis in flatu soluti, sed ob debilitatem ven-
triculi, & cruditatem & corruptionem alimenti ob domina-
tum caloris acris omnia corruptentis, & tetros halitus flatuq;
in chylo corrupto & intercepto mediis viis excitantis. Vt mi-
rum sit cur dicat Gal. *Non admodum contingere, ut si icterici
partium ad ventrem attinentium habeant imbecillitatem*. Nam tales
icterici sæpè corrumpunt alimentum, coquunt quidem sed ma-
lè. Cum enim Hipp. ait, *σφοδρῶς*, carnes frigidas habere, nun-
quid *σφοδρῶς*, & *ποσιντερόδης* confundere possumus? Quan-
quam ita Galeni auctoritatem audire possumus, ut dicamus
ictericos rarò habere imbecillitatem partium ad ventrem atti-
nentium præsertim quod ad munus coctionis attinet: coquunt
enim faciliè etiam *δυσπνέοντα*. Non quin dicamus malè coque-
re, id est, inducere prauitatem quandam in cibum, unde eos vi-
demus subuiridia, & biliosa faciliè & vomitu, & per alium ex-
cludere, sed non est ea debilitas, ut malè coquat, id est, immi-
nutè. Ac si dicamus, icterici, & *σφοδρῶς*, cum calore multo,
sed eo quodammodo alieno abundant, suprà chylum coquunt,
& plus biliosi humoris, in massa sanguinis generant: quibus de-
bilitas est ventriculi infra chylum coquunt, & imminutè. Hic
est quædam *εσθμύλια*, & chylus dicitur *αἶμα*, illic *δυσπνέοντα*, ob ex-

cessum qualitatis, & chylus ^{ameros} dicetur: id est, eò modo affectus ob qualitatem, vt in laudabilem succum non vertatur. Atque ex iis facillè est demonstrare valdè credibile esse eos palpitationibus obnoxios esse quibus ventriculus, & hepar contrariis ferè prædita sunt temperamentis, ratione cruditatum quæ hinc oriuntur.

Ergo cum palpitationis motus sit cordis præternaturam, medio veluti situs inter pulsum, debilitatem & syncopen, quò referri debeat, videndum. Quatuor omnino motus contra naturam genera statuuntur, conuulsivus, tremulus, concussivus & palpitans. Tremulus & palpitans causam morbosam sequitur: quandiu quis palpat, tandiu se locunditati tradere non potest. Si quid incidat impediens vicissitudinem systoles & diastoles, attractionem & exclusionem spiritus, id causa esse potest palpitationis. Porro cum quæritur, an quia cor dilatatur, impleatur, an verò contra, respondendum est, cum cor bene affectum est, quia dilatatur, impletur, at cum malè habet, quia impletur, dilatatur, quod cum maximè in palmo contingat, à causa solam morbificam palpitationis pendeat, necessum est.

Ac de palpitatione plura non scribemus, cum operosum hoc foret, & plenam opinionibus ex aliorum scriptis desumptam tractationem conscribere ridiculum esset, tantum aliquot remedia huic Daniellæ, cuius ergò hæc Commentatio suscepta est, instituta ascribemus. In ea maximè duas causas palpitationis agnoscimus, vnam latentem quandam arteriæ dilationem in corpore ipsius lienis, quod verisimile, cum in regione ipsius lienis palpitans pulsatio percipiatur. Ac id contingere potuit ob diurnitatem quartanæ febris quæ est conflictata. Quartana autem aliquid semper residui facit. Alteram, ventriculi imbecillitatem ob caloris imbecillitatem, & iecoris calidam temperiem: quod ex excrementis, & colore, & actionibus facillè collegimus.

℞. Melissæ, buglos. foliorum cardui, scabios. calendula. an. m. j. s. scolopend. caterach. chamædry. an. m. j. agrimo. scariol. an. m. ij. seminis endiuie melonum, citri, card. an. ʒij. fumiter. absinth. pont. an. p. j. seminis angelicæ & pæoniæ. an. ʒij. fiat dec. ad libi j. s. Infunde in col. foliorum senæ. ʒij. seta in Kermes tinctæ ʒss. granorum kermes. ʒij. bulliant ad lib. j. In col. dissolue sacch. ros. lib. j. expressio. ʒij. rheib. & ʒss. agar. in nodulo positi, cum ʒi. s. cinna. infusorum

Ttt iii

518 CONSILIORVM MEDICINALIVM

parte decocti: fiat syrup. mediocriter coctus.¹²

℞. Meliss. foliorum lauri, calamenti, chamem. anethi & melili.
an. p. j. seminis cum. baccarum lauri confusa. an. ℥ss. rad. bryonia te-
leolatum secte capp. an. ℥j. sabin. p. ij. fiat sacculus bulliat in aqu. cha-
lyb. cum vino rub. pro fotu lienis cum spongiis: adde santala.

Adhibeatur cucurbitula magna, post fotum ante sequentem li-
tum.

℞. Ladani soluti in aceto, benioing. & stiracis solutorum in succo
amygdal. dulcium. an. ℥ij. express. nucis moscatae. ℥ ij. pul. nucis cupress.
santalorum, rosarum & cyperi. an. ℥j. cere noue, & ol. de cappari-
bus quod suff. fiat litus ad regionem lienis.

℞. Conseruæ meliss. buglos. nenuph. an. ℥j. elect. diamarg. frig. ℥ij.
confectionis alkermes. ℥j. theriacis & mithrid. an. ℥j. cum syrup. de
pomis: fiat opiata.

Institutus syrupus ex succis in quo mader seta in xermestincta.

ANNOTATIONES.

¹ Galen. aliquando sumpsit nomen τρεμωσις aut τρεμωσις. Que causa sit
nonnullis cur existimarent tremorem & palpitationem idem esse. At
differunt longè & ipsa definitione, & aliis multis: Nam palpitatione
est momentaneus, tremor diu affligit. Is porro nascitur ex diuersis
causis quæ facultatem possunt labefactare: & pro varietate causarum
uariè curatur. Palpitationis una causa est, una curatio, nempe flatus dis-
cussio, hæc Iosephus Struthius in arte phrygmica. An sint vera conside-
rato. Aristotelis interpres τρεμωσις, pro tremore accipit. cap. 4. lib. de re-
spiratione, vide lib. 2. Epid. medrum.

² Sauaronota tremorem cordis & palpitationem confundit cum car-
diaca passione. Aliud tamen longè est. Et id desumpsit ex com. Apho-
risimi de quo hac in pagina, in quo Galenus videtur τρεμωσις, confunde-
re cum ea affectione cordis in qua crebra & vehemens est pulsatio pal-
pitationi similis? Quod si ita est, nomen καρδιακή, cum cardiaca affe-
ctione confundit.

³ Istud languide moueri non est accipiendum quin sit vehementior
cordis agitatio; sed ea agitatio est cum crebritate quadam, & quæ
cum extremo conatu cordis. Immo cum est iste astus in pulmonibus &
erysipelatoses dispositio, dum pulmo vehementer attrahit, sese sanguine
implet, & egri obruuntur conculcato in pulmone sanguine: & est ea affe-
ctio quæ à Gordonio sanguisugum dicitur, egerque sanguisugosus nomi-

natur. Quoniam proprie sanguisugum dicitur cum non potest pra obstructione, aut densatione aerem foris attrahere, intus è partibus propinquis sanguinem & spiritum attrahit & sanguinem pro aere veluti fugit & eo impletur, unde praesens suffocationis est periculum.

Pulsus palpitantes aliquando in senibus observantur: sed id nihil fieri debet. Si enim per totum corpus alia arteria palpitent, deterius multo est. Atque huc pertinet questio, an cor palpitare potest, & arteriae naturaliter moueantur? Struthius enim observat contingere, ut cor ex irritatione edat maiorem pulsum, celeriores & vehementiores quam quoniam in arteriis appareat. Et qui egrotant de pulsu, aut saltu cordis conqueruntur. Hoc autem contingit in febribus continuis phlegmaticis cum venae & arteriae crudis & frigidis refertiuntur humoribus: Interea tamen cor contentis suis calidum est, arteriae frigidae. Et caliditas cordis, frigiditasque arteriarum dum concurrunt moderatum quendam pulsum (saltem quod ad sensum pertinet) efficiunt: Et tamen cor ipsum aliter multo efficitur & mouetur quam arteriae ipsae. Unde medici hinc decepti putant tales egrotos non febricitare cum tamen periculosè febricitent.

Si natura ad motum palpitatorum concurreret, palpitatio ipsa esset affectio non à solo pendens morbo, sed à natura. Tremor quidem & morbi est & naturae, at palpitatio solius morbi effectus, si hoc verum est, quare vaporem palpitationis causam tanquam hostem natura nitetur expellere?

Si enim ratione etiam cuiusdam doloris irritetur fluxio in partem aliquam, & metu maioris raptus commodè vena percutiatur, cur non id fiet, in metu raptus & sanguinis, & spiritus ad cor?

In omni palpitacione cordis est flatulentum quid & aeris. At ad hoc valet maximè phlebotomia, ut sectio. 5. lib. 2. Epid. Hippo. Contra multorum opinionem facit. Horum praclara est demonstratio, lib. de flatibus. Et quodam in loco scribit, Hippocr. em uia al xon na dia qra

ut in iuuenibus excedentibus ex ephebis quibus debet esse frequens haemorrhagia, si ea desit, palpitatio potest contingere. Idem & non menstruis virginibus potest contingere remeante ad superiores partes sanguine.

Causa potentissima palpitacionis est metus. Unde etiam dum quis metuit, ei videtur cor palpitare. Et vidimus quendam baiulum qui forte in grassantium manus inciderat, cui pra metu tanta immutatio in pulsum incidit, ut per longum tempus pulsus palpitans esse videretur.

¹⁰ Omnes Hypochondriaci specie cruditatis laborant: Vnde non mirum si grauitur confluentur, & si facile in palmum cordis incidunt.
 11 In iis qui palmo cordis sunt obnoxij manifestus arteriarum motus percipitur & micatio: & huius micationis manifeste causam dicunt plenitudinem humoris: quanquam in iis qui fædus colores habent, & in melancholici, flatus melancholici resolutio potest facile istam micationem & pulsationem venarum inducere. Aristo. cap. 4. lib. de respiratione, de palpitatione, suo modo Philosophatur. Legendus iste locus si forte de eo dicendum sit.

12. Rhabarbarum hic in palpitationibus cordis ratione morbi non quærat, sed ob ventriculum qui cordi maxime consentit, & ad vehementiam morbi augendam facit.

De febre continua cum multis & grauissimis
 Symptomatis.

CONSILIVM CX.

SANGERMANVS annos 50. natus plethoricus tum quia desiderem maximè vitam ageret, tum quia auidè & multum comederet, ut potè magnis præditus visceribus, in febrem incidit. 1 Ea primis quidem diebus blanda visa est, ut propterea eam negligeret, & à consuetis & muniis, & cibis non abstinere. At satis ex historia quadam Hippo. in Epid. patet quantum periculi attulerit intempestiua coena, cum aliqui febribus subobscura tantum foret.

Historia
 m. fest.
 3. Epid.
 lib. 1.

Quantò verò magis isti viro prauis & multis pleno humoribus nocuit quatríduana morbi tolerantia, & coena satis liberis cum noctes febriles forent? Ut non mirum sit, si inde mortis periculum aduentarit. Morbi hæc fuit historia. Cum quatuor iam dies morbum tulisset, de repente suffocatorius dolor oboritur, & peripnemoniæ, necnon cuiusdam hepatidis magna adsunt argumenta, frequens erat respiratio, pulsus serans, vibrans, & durus, lateris dextri & scapularum dolores erant, & sensus ponderis in sterno: non poterat thoracem distendere, latere falsò putabant esse pleuritidem, cum, ut antè mentum est, peripnemoniæ & sterni, & laterum, & scapularum dolores habebant.

habeant familiares, immò tanquam quid *παρ' ἑωυτοῦ*. Pote-
 rat quidem & esse fluxio à partibus superis. Huius rei fidem
 faciebat, & quòd superioribus temporibus grauissimis dolori-
 bus ob fluxionem à capite prahensus esset, item quòd ne mini-
 mum quidem manus appulsum ferret, in partibus metaphreni.
 Quamquam & inflammatio ista interna facere poterat. Sed
 maximè suavit hoc quòd, eo tempore vagarentur morbi simi-
 les, quos partim à descensu latentis materiei offerre & nitrosæ,
 & pepasmi incapace oriri credebamus, partim à refudante fero
 tenui & maligno à genere venoso in neruofum, vnde vlcerofus
 fuit sensus in multis, & *ὀσκόπος* adeò incredibilis, vt blandæ
 manus appulsum ægri non ferrent. Sic in ægro crudelis huius
 affectionis causas & à descensu materiæ repetebamus, & à ge-
 nere venoso pleno feri maligni (quod ex phlebotomiis illius
 temporis maximè intelligere potuimus) transcolationem, & ra-
 ptum à visceribus. Nam pulmo inflammatus attrahit, & in-
 cendium quod inerat abdomini valdè inflato orgasmum facit
 materiæ. Et illud est quod Hipp. scribit, *Venulas arefactas icho-*
res à partibus attrahere. Febris erat assidua, alius non redde-
 bat nisi *ὀδύνη*, licet alius aliqua ratione medicamentis irritata
 fueret, non leuius habebat, nec subsidebat abdomen, inæqua-
 litates multæ erant, mox manus temperatæ erant, mox æstua-
 bant, morbus erat planè siccus, vrinæ non satis tinctæ, nec mor-
 bo, nec redundanti humori analogæ, difficilis spiratio mane-
 bat, non aderat dolor capitis. Septimò die sudor diaphoreti-
 cus. At quartus tantum dies erat decubitus & apparentis exa-
 cerbationis: aliis enim diebus senarrabat *ἀπυρετικὴν*: manus re-
 frigerantur & pedes: vesperi mors. Noctes erant inquietio-
 res & insomnes: vix loco consistebat. Reduplicaciones ves-
 perifuebant, pulsus durus, vibrans & ferrans manebat: detra-
 ctus sanguis perfectè corruptus erat & *χλωρός*.

Hoc verò loco tria aut quatuor quæri possunt, quorum co-
 gnitio plurimi sit momenti. Primum quid significarent istæ
 inæqualitates, an purulentum quid, an materiæ *ἀπομαλίας* & *τὸ ἰσχυ-
 ρότερον*, an caloris naturalis paupertatem, dominatum verò calo-
 ris contra naturam, an aliud præterea. Secundum an in feбри-
 bus continuis *παροξυσμὸς* esse possint, an non potius *τὸ παροξυσμὸς*, no-
 men *ἢ ἀνὰ διημέρας*, ad febres interpolatas referatur. Tertium,
 cum tanta humorum saburra foret eaque tum medicamentis,

§22 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tum clysmatis agitata, cur aluus non fuerit soluta biliosis incrementis, aut planè astricta ob phlogosin. Quartum accedit, an non ad inflammationem lactium & ventris contulerit frequēs & quotidianus vsus hydromelitis cum esset

Quod non abs re in quæstionem vocatur ne temerè iis assentiamur, qui quoniam hoc vel illo potu delectantur, promiscuè omnibus aëris illud propinandum putant quod illis in deliciis est. At vt concedam vinum, aquam, hydromeli, oxymeli, absinthites & sexcenta alia, magnas habere opportunitates, habent quoque & sua incommoda. Sic in vsu, in arteque medicandi alium cibum poculumque pro alio substituere ignorantia, & inscitia plenum est, vt & indistinctè hunc eare interdiceret, alium verò ad eandem inuitare temeritatem redolet. Vt non abs re quosdam ætatis suæ medicos redarguerit Hippo. qui absolutè pronuntiabant vinum bonum esse, cascum malum, & id genus alia, quorum aliquis vsus foret, & incommoditas quædam, prout vel locò, vel iurè, vel temporì in vsum aptarentur.

*Libro de
veteri
medici-
na.*

Ac de inæqualitatibus, de quibus primò duximus agendum, iam suprà aliquatenus satis esse factum puto, non abs re fuisse tamen nonnihil attingere. Multis modis videmus in febribus etiam dum æstus adest horrores leues incidere, ac si noui paroxysmi noua foret occasio: Item & manus videmus aliàs moderato calore perfusas, aliàs veluti incendio confragere. Quæ duo aliquando simul incidunt aliquando seorsim visuntur. Visuntur simul in ingenti cacochymia, cum non modo in mesenterio, quod est totius corporis sentina, verum etiam in genere venoso corruptio est humorum & sanguinis, & qui detrahitur sanguis purulentus est: Hinc & vulgares dicunt se malum sanguinis cursum sentire. Quod non abs re dictum, Etenim sectâ illis bis aut ter venâ,eductoque sanioso sanguine & subuiridi, sensum punctionis quem habebant, & horrores illos paruos ampliùs non habent. Domina à Chalmontio hoc docuit satis: Nam per totum cursum morbi perpetui fuerunt horrores (quod fortè nunquam visum est) & sanguis omnis in massa sanguinis contentus putruerat atque exalbuerat. Aperto corpore quicunque è venis effluebat sanguis merum pus erat. Quod ob dominatum caloris contra naturam omnia corrumpentis contigerat, nec non corporis interioris intestinâ cacochymia toti sanguinis massæ ita communicata, vt inde totius corporis corruptio insecuta fuerit. Id

Vicario sancti Geruasi; sensus deambulationis formicarum quem in brachiis & metaphreno percipiebat, & quædam inæqualitatis sensio, non aliunde erat quam à sanguinis corruptela per venas fusi. Declarauit curatio. Nam ista cessarunt misso ter aut quater sanguine satis cumulatè.

Horum demonstratio peti potest, ex lib. 6. Epid. Vbi Galenus scribit, *Omnes cacochymos, cum repente incalescunt, inhorrescere.* Testatur & quotidiana experientia. Nam si quis prauis scatens excrementis in sole versetur, statim inde redibit inhorrescens. Sic calor febrilis dum agitat humores putres idem præstat quod & solis calor. Inducit enim rigores & horrores, nam humores corrupti incalcrafti seipsis acriores fiunt, mouentur & ita lancinant atque feriunt membranas, item & ichor excitatur à calore agitante qui sensum horrois, morsus, & inæqualitatem inuehit. Atque eorum qui in febribus ex facili horrescunt multa genera reperio à variis causis nata, vt non sit temerè pronuntiandum, de hac aut illa causa si quis inæqualiter horreat. Nam quidam cum vident istos horrores & inæqualitates sæpè incipientes de suppurato verentur, ac sæpè eò recurrunt, at falsò. Inter cætera videmus istos rigores & horrores (nam rigores parui de quibus sæpè in Epid. Hippo. non differunt ab horroribus, vt doctè explicauit Galenus) initio paroxysmorum contingere, de iis non loquimur. Aliquando per totam febrem adsunt, quod de semitertiana intelligit Gal. in qua horrores per omne tēpus & particulare, & generale febris percipiuntur, siue intensio (Græcè *ἐνταύτης*) faciat reduplicationē, siue ascensus fiat inæqualis, ideo *φεινάδης*, dicitur *ἡ ἐνταύτης*: Hoc efficit materiæ diuersitas in qua febris acceditur. Etenim ex duobus humoribus contrariis simul mixtis fit, bilioso & pituitoso, atque dū biliosus incanduit, calfit pituitosus, & sic ascensus inæqualis fit, idēque contingit quod & initio paroxysmorum, quo præsertim tempore vrgent horrores. Quia enim inæqualiter & calfit & mouetur humor vnus: ideo inæqualitas contingit & horror. Cum totus humor æqualiter affectus est, desinunt horrores, & tum incrementum & vigor adest. Quod si in vno humore interpolatam febrem committente fit, multò magis in duobus confusis fieri potest. Immò & febris *τετανοειδής*, de qua sicuti & de hemitritæo amplissimè diximus in nostris definitionibus medicis, ab humore bilioso fit maioribus vasis cōcluso, cōque,

Com. in
part. 23.
sectio. 2.
lib. 1.
Epid.

Com. ad
part. 5.
sectio. 3.
lib. 1.
Epid.

§24 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Loco su-
pra alle-
gato.

Part. 25
sectio 2.
Lib. 1.
Epid.
Vide
Hipp.
lib. 1.
Epid. in
Historia
Sileni.

vt ait Gal. & pigriore ad motum, & coctionis difficilioris, & quia à sua natura ita bilis degenerauit, horrores quoque iunctos habet: Immò & ea ratione *quædam* appellare possemus. Nam de ea loquens ita disputat, febres erant continuæ, vno die tem- peratiores, altero acerbiores, rigores parui (id est horrores, ait Gal.) erant omnibus sine ordine, & erraticè, ac minimi in his febribus fuerunt. Quod dixit vt non confundatur *vt ita quidam*, cum hemitritæo: cum in hemitritæo sint horrores magni & ve- lut cum ordine. Quod mirum quomodo febris *vt ita quidam*, si vnus humorem habet, nempe biliosum motum pigriorem habètem, id est biliosum quodammodo pituitosum ita continenter horrores inducat. De hemitritæo quidem minùs mirum esse debet, cum hic agnoscat autorem sui duplicem humorem bilio- sum & pituitosum simul confusum. Ac dicere oportet du- plicem esse *vt ita quidam* febrem, vna est quæ duplicem habet quo- que humorem, sed non paribus gradibus affectum, vt est in hemitritæo, altera vnum habet tantum nempe biliosum pituitosiorum. Quæ duplicem habet humorem ea ferè con- funditur cum hemitritæo, quæ vnum habet, ea longius ab he- mitritæo differt. Quo in sensu audienda sunt quæ ab Hippo. & Gal. dicuntur. Nam cum vterque vult distinctionem dua- rum illarum febrium afferre, vtramque confundit, & in causa, & in specie, & in more. Nam quodam in loco tu leges *vt ita quidam* febrem agnoscere vnum humorem, alio duos, quod difficile est ad cognoscendum, cum ista ex aduerso pugnent. At dicemus (vt rerum distinctio audiatur:) ideo in triteophyca febre, ta- met si humor vnus statuatur, horrores contingere posse quod & multus sit humor circum maiora vasa cōclusus, & cum sit vnus, habet in se partes quasdam *vt ita quidam*, quarum ratione horrores inducitur sensus, ac præsertim dum calor extraneus sese in- sinuat in materiam istam. Quod dum æquabiliter in omnes materiæ partes non præstat, ideo inæqualitatis sensus adest. Sic tres causas istas animo concipies, vt distinctionis notas comprehendas. Prima est de multitudine humoris ad conci- piendum incendiū & putredinem parati. Secunda, quod vnus humor diuersas partes contineat. Tertia est de calore. Quod ad multitudinem humoris spectat, id verisimile: Nam in febribus interpolatis pauca est materia, & longè à magno fo- co semota, ideo tota digeritur in accessione, dum manet inte-

reâ empyreuma, quod concurrentibus aliis causis, nouæ ac-
 cessionis author existit. In triteophyca multus est humor, maio-
 ribus vasis contentus, cuius cum pars digesta est & euicta, dum
 continenter calor agit, fit anadiplosis, & nouus veluti paro-
 xysmus, vt quod semel fit in febre intermittente fit ob pau-
 cam materiam eamque sub finem paroxysmi dissipatam, id fiat
 sæpius confusione quâdam paroxysmorum. Nam pars eua-
 nuit, & exhalauit, pars putredini obnoxia, affecta, mota, irrita-
 ta, nouam affert exacerbationem. Quanquam remissio aliqua
 præcesserit remissis ac temperatis partibus materiæ quæ vigore
 & incrementum suum materiæ suæ proportionatum habuerat. *Comm. in*
part. 48.
 Galenus enim vni humori duplicem inesse posse substantiam *sectio. 3.*
 statuit, vnam crassiorem, tenuiorem alteram. Quis enim dubi-
 tar à materia putrente in maioribus vasis non eripi ac surgere *lib. 3.*
 tenuem aliquam & halituosam partem quæ dolores in capite &
 partibus propinquis excitet, cum alia pars crassior in intestinis
 desces sui generis alia pariat symptomata? Sic tenuior pars ma-
 teriæ biliosæ multæ, pituitæ factæ quodammodo, pigrioris, co-
 ctumitificatæque difficilioris quæ *ἡ ἰσχυρὴ*, facit accessiones, fa-
 cit momentaneas, dissipabiles, quia materia ista tenuis exha-
 lat faciliè ac digeritur, alia crudior pars & crassior continuita-
 tem facit, & per calorem pars alia attenuata similes prioribus
 accessiones inducit. Sed in semitertiana cum duplex sit mate-
 ria confusa (quanquam duos focos statuunt quidam) mali mo-
 ris dum calidior febrem acutam accendit statimque discuti-
 tur, & dum corpus tenetur istâ acutâ febre contingit inte-
 reâ frigidioribus corrumpi ac putrescere, & sic accendi ex illa
 remissione, quod est veluti requie & imminutione febris.
 Quod & Galenus de triteophyis dixit, sed vt antè dictum est,
 tales *ἡσυχαστικὴ*, proximè ad semitertianas accedunt & in motu,
 ingenio, specie, causâ & consimilibus affectionibus. Ergo in-
 qualitatis vna & maximè præcipua causa est humorum varie-
 tas, ac præsertim eorum qui genere & naturâ dissident, vt sunt
 pituita & bilis; vt quoties inæqualitates, varios insultus, rigo-
 res paruos & horrores audias, toties de varietate ista materiæ
 non dubites, tantòque magis metuere oportet, quanto in febre
 bus continuis frequentius id euenire conspexeris. Addam
 & illud, frequentia ista horrorem & reduplicationum mala est,
 vt signum & causa, vt signum quidem, quoniam declarat va-

rietatem materiæ putredinem concipientis. At quò plures humores vitium contraxere, eò multò plus metuendum: & quò plures humores negotium dant, diuersis/que temporibus, eò natura plus habet negotij, & malo victa potius succumbit: Vt causa, quoniam naturam dum proritat ad pugnam plus illi molestiarum infert, & cum natura post vnā atque alteram pugnam vires colligere vult, id non facillè potest, quoniam noua est in procinctu materia, quæ naturam rursus ad conferendas manus prouocat iam iam fractam debilitatamque priore discrimine. Interea cum alternâ requie & induciis, quibus sese paululum colligat ac erigat, cārere videatur, non mirum si langueat ac victa succumbat. Ideo Hippo. dicebat, *Quoquomodo febres intermiserint, periculum abesse significant.* Et quod Galenus dixit de febribus quas vocat ^{tertio quæ} *tertio quæ*, more malignorum morborum, diebus criticis deteriores fieri, id est, deterior status & conditio est. Signa cruditatis repræsentantur, quo loco signa coctionis adesse deberent. Atque eo modo possumus id interpretari, quod meo iudicio est difficillimum, & à nullo, quod sciam, animaduersum, nimirum, quare propriū sit febrium ^{tertio quæ} *tertio quæ*, quemadmodum & malignarum, vt diebus criticis deteriores fiant, possumus (inquam) interpretari eo modo quo & Gal. explicat, *Circa, initia & fines omnia esse imbecilliora, cum vero consistunt, fortiora: symptomata quidem & accessiones in vigore fortiora esse multò, quam aut in fine, aut initio, sed dispositio morbi in iis qui saluari debent, melior est multò quam initio:* Id est, symptomata grauiora, quoniā iudicium instat, & in procinctu res est, sed si morbus funestus non sit, quoniam cruditatis signa non ad sunt, dispositio morbi melior est. Vt, dum in apostemate febris augetur ob suppuratum quod actu iam sit, symptomata quidem augetur, & ratione symptomatis in vigore omnia fiunt fortiora, nempe & dolores, & febres, sed morbi dispositio melior est, quia euicta putredine & cruditate, læuitas, æqualitas, & albor in pus inducitur, qui sunt legitimi characteres bonæ materiæ, & melioris factæ per naturæ victoriæ. Sic in febribus continuis, iis præsertim in quibus naturæ multum negotij datum est ob varietatem materiæ, ob continuitatem, ob malignitatem morbi, cum diebus criticis symptomata quidem sauiora esse debeant, & ob materiæ coctionem

Ad A-
pho. 29.
§ 30.
lib. 2.

Quid sit
deterio-
rem fieri
morbum
diebus
criticis.

LIBER PRIMVS.

327

dispositio febrilis & morbifica melior esse debeat, tunc dicuntur omnia esse diebus criticis deteriora, id est, dispositio morbi deterior est, cum alioqui melior esse deberet ob signa coctionis apparentia. Dicā id quod ego observavi in plerisque laborantibus febre continuā quā ipsi interierint, septimo & nono & undecimo die febris videbatur remissior, urina, quæ notas coctionis paulò antè habebat, crudior erat ac turbata magis: sic omnia fiunt *ὅτε ἐστὶν ἀποσπασμένη*. Quandoquidem febris & alia symptomata vehementiora esse debebant, urinae coctiones esse quoque debebant: Sic dispositio morbi deterior est, symptomata remissiora sunt & imbecilliora. Atque meo quidem iudicio, hoc est, in febribus *πυρεταῖς* & malignis, deteriores esse criticis diebus morbos, id est morbi *διὰ κρίσεως*. Quod valdè notari debet, quoniam puto id neminem unquam pro reidignitate, animaduertisse.

Vnam verò maximè causam inæqualitatis & horroris in febribus explicuimus exemplo hemitritæon, & *πειταιφύων*, ut hoc posito exemplo de similibus iudicare liceat. In quo longiores de instituto fuimus, ut id innotesceret maximè quod obscurum est, & ut temerè non pronuntiemus huic vel illum ideo suppurato teneri quod in febribus inordinatè horreat. Tale enim iudicium puerile est, & ineruditum, cum sedulò magis causæ huius rei vestigandæ sint ac perlustrandæ. Atque cæteras causas istorum horrorū sigillatim persequi accommodatè ad id quod quærimus, deliberaueramus, sed longitudine sermonis territi, & quod passim alibi & cursum, & abundè ea de re attigerimus, superfluum & *ταυτολογία*, plenum existeret, translatione ista sumus superflui. Nunc verò tria persequi breuiter in animo est. Primum, quæ causa fuerit in nostro agro Sangermano inæqualitatis istius: secundum, si humorum varietas causa est tam frequentis insultus cur non idem in omnibus & interpolatis, & continuis febribus eueniat, cum ubique saltem & duo, & tres humores in vicio sint, & ferè semper & bilis & pituita in mesenterio confusa sint, quorum vnus sine altero vix attingitur, saltem vix *de diff. febr.* calsit vnus sine altero. Nam quod de humoribus & spiritibus dixit Gal. exemplo lebetis, nimirum dum incaluerunt spiritus, humores quoque partem caloris concipere, & dum humores incaluerunt, in solidis partibus calorem quoque con-

528 CONSILIORVM MEDICINALIVM
cipi, id hoc loco maximè considerandum. Quasi verò siue
humores sint confusi, siue separati sint, fieri queat vt intacto
alio, alius ardeat. Quod si fit, cur non in omnibus febribus
inæqualitates & horrores fiunt. Tertium à nobis propositum,
est vt Arculani doctissimi opinionem proponamus necnon
Hollerij artis nostræ scientissimi de febribus horrificis, & hor-
roribus qui in febres incidunt.

De causis inæqualitatis in ægro ita statuo. Phlogosis erat in-
terna maxima, maxima saburra humorū ita conclusa, vt nil eua-
cuari arte posset, credo proximè hepar putrefactos humores ita
fuisse conclusos, vt proximè eius parenchyma afficerent, yrinæ
nihil biliosi humoris in tāto æstu continebant: pulsus durus &
vibrans ita totam massam & sanguinis per omnes humores pro-
miscuè confusos arsisse ac putruisse significabat, vt non possent
non multi horrores & inæqualitates surgere. Nam cum vapora
putrentibus humoribus calidus efferebatur, sensum caloris
proximum inducebat, qui cum exhalauerat, tepor partium re-
manebat. Atque ita factum est, vt septimo die de repente
ferè interierit, calore naturali victo à calore contra naturam,
qui vnà quoque extinctus est vt denuo reaccendi non potuerit.
Quod sciri ampliùs potest ex his quæ à Galeno dicuntur in hi-
storia de Pythione, vt antè explicuimus. Recurre ad lo-
cum istum. Item Galenus, *In morbis summè malignis par-*
tium extimarum permutatio vnà horâ ad contraria efficitur (ideo
Hippo. in textu dixit,) *Si celeriter partes commutentur.* Inter-
dum quidem vt hyeme fit, perfrigescant, interdum, vt æstate fit, vt or-
calescant. Id autem contingit cum propriam caliditatem non habuerint,
atque à febrili calefiant. Quæ à corporis mediò incipiens, flammisq;
similis totum corpus depascens, extrema concalfacit, quæ & cum transi-
rauerit, statim & ea refrigescunt, extincta nimirum nativâ caliditate.
Est enim magnum argumentum calamitatis cū ne sufficit qui-
dem calor minimus ad conseruandum mediocrem caliditatem
in manibus & pedibus. Immò & extinguatur ipse calor contra
naturam. Nam in quibus multus inest & expansus, saltem ma-
nus sua caliditate acri perfundit. Maximè verò sensus horro-
ris & inæqualitatis adest, cum non modo contenti in mesente-
rio & præcordiis humores sunt affecti & putrefacti, sed cum in
venosum genus labes ipsa serpsit ac dimanauit. Quod huic ma-
ximè viro contigerat.

Quod

Quod ad quæstionem secundo loco positam, nimirum cum in corpore raro vnus humor peccet, vt declarant euacuationes quotidianæ, & quòd quotidie dantur cathartica non vnum humorem euacuantia, sed multos simul, quare non omnes sunt febres horrificæ! Dicendum alios quidem humores ob communicationem incallescere, sed vnus maximè incalescit per putredinem, alij nondum putredinem contraxere. Vel, dicemus multitudinem materiæ *πυρρῆς*, in semitertianis, & aliis febribus horrificis inæqualitatem inducere, quæ si similis esset in interpolatis febribus, & conclusa in vasis maioribus & confusa, pares rigores induceret. At illa cum initio paroxysmi horrorem induceret, quod diuersiformis quodammodo foret, accedente incremento fit vniusmodi. Et quod in corpore multi sunt humores qui à medicamentis educuntur, sunt potius fœces quàm humores, qui cum abstrusi sunt, si putredinaliter accenderentur, facerēt febrem. Si coniuncti, febrem sui generis, si diuersi & distincti, erraticas febres. In febre tertiana vna pars humoris putret, & alia imputris manet: Item in Epiala, & tamen caloris & frigoris sensus simul non inducitur in vtraque febre. Quod notandum, vt scias quid materiæ varia dispositio, & varietas efficiat.

Tertium de quo diximus nos dicturos explicando quid his de rebus sentiat Arculanus, pertinet quoque secundum vniuersale propositū, quo quæsieramus an in febribus continuis paroxysmi sint. Et an non nomen *πυρρῆς* commodiùs ad intermittentes febres referatur.

Arculanus ita de istis rebus statuit vt doceat, & quomodo febres intermittentes sine rigore, horrore, & frigore incipiant, aut eo saltem leui: item quomodo febres continuæ reduplications habeant cum horrore, rigore (nam non intelligimus hoc loco nomen rigoris qui præcedit crisin aut sudorem in continuis) ac si periodicus esset & typicus. Verba sunt eius, initio phlegmaticæ febris continuæ, ait Auicennas, quod idem de febribus aliis audiri potest, exacerbationes incipiunt à frigore, aut horrore non quia materia eius spargatur per membra sensibilia, sed quia materia mouetur propter copiam sui ad venas minores naturalē calorem suffocantes: Id est, dum putrens materia à loco in quò coarcebatur in venas minores & aliquas angustias mouetur, sensus quidē aut rigoris, aut frigoris percipitur.

Tom. I.

X x x

Cap. 4.
de fe-
brib.

Item quòd febres periodicæ & intermittentes possint incidere in quempiam nullo præeunte typico, aut frigore aut rigore, causa hæc est ait Arculanus, fieri potest vt materia quæ per membra sensilia spargitur eo modo sit disposita quo est post rigorem in incremento alicuius paroxysmi. Atqui in augmento rigorem non infert: quia potis est benigniorem illam materiam esse, & ideo tardè moueri ad membra sensilia, & sicut mouetur, ita calefit, & acquirit dispositionem similem ei quæ est in augmento. Et tunc non suboritur rigor. Immo (ait) in paroxysmis febrium interpolatarum videmus subintrare alium paroxysmum sine rigore, aut frigore. Porro quomodo in febribus continuis paroxysmus fieri dicatur, explicatum est hoc in lib. 2. Et in definitionibus meis medicis. Ex his quatuor quæ à nobis proposita sunt, duo restant breuiter explicanda: prius cur alius nil reddiderit de materia morbifica, cum tamen liquida redderet, sed nil proficientia: posterius de hydromelente. Quod ad prius attinet. Cum in febribus ardentibus, qualis erat ea quæ Sangermanum affligebat, calor multus sit cur non excrementa sunt *αυγαδάστα*? An in febribus istis continuis liquidior alius esse potest? Ita sanè & tunc malum est vt signum & causa. Vt signum quia vel colliquationē significant, vel tantam phlogosin, vt omnia intrò reuocet, & auidè retineat, vt potius sequatur colliquatio, quàm quicquam è materia extrahas, vel significat vi caloris contra naturam labefactatas esse partes naturales, vnde sæpè chylosa excernuntur, vel declarat tantum decedere aliquid liquidiusculum ob copiam potus quò immoderatiùs vtuntur ij quibus interiora æstuant. Vt causa vero, quonià vires intereà labuntur, cum non excernantur qualia excerni debent, cum defraudetur sæpè naturæ genius debilitato ventre, & quod non est ampliùs locus medicamētis solutivis educitur materiam morbificam. Eorum enim vis eluditur ac ista qualicumque versa superfluitate quæ aluo egreditur ac effluit. Et multos sic interire vidimus excretis quibusdam liquidioribus, & retentis partibus crassioribus quæ morbum fouēt. Et in talibus quò plus effluit de ista superflua humiditate, eò magis à calore cōtrà naturam subigente venter intumescit.

Part. 2.
lib. 2.

Medici plerique delectantur tali vacuatione nos contra. Hippocrates in Prognosticis, & in libro Acutorum docet quomodo inflammatis, venis lactium alui fluor symptomaticus cō-

tingat, tum ob *αἰμαδοσιν*, prohibitam vi inflammationis, tum ob generationem ichoris & saniei vi eiusdem inflammationis. Atque in acutis febribus liquidiorē saporē esse aluum docet, ratio est, ait Gal. quoniam tales humores sunt crudi ac serosi, & tenues, quia omnis coctio crassificat. Et in Epid. In febribus continuis obseruat excretionē multarum superfluitatum aquosarum quæ nihil ferè iuuant. Et quod notandum eodem libro ait, duabus de causis profusiorē aluum fieri in acutis, ob colligationem & phlegmonem. Sic diuersa ratione in acutis aluus astringitur & effluit. Mallem astringi, quoniam humectando solueretur, & purgatio sequeretur: sed cum effluit liquidis excrementis ferè rarò proficit, & non purgatio est, sed euacuatio tantum eaque symptomatica. Immo effluunt saporē ea quæ retineri debent. Vide de iis plura capite de fluoribus alui antè, & in nostris definitionibus medicis in voce *αυρεοχολος*.

Nunc ad hydromeli conuertatur oratio. Quærebamus an cum *μεγαλόσπαστος* esset (interpres vertit, viscerosus) non læsus fuerit vsu hydromelitis quotidiano. Ac primum quid *τὸ μέγα-σπαστος*, nomen significet videndum. ¹² Reperio apud Hippocratem *τὸν μεγάλον σπαστον*, & actiue & passiuè sumi. Actiue quidem vt cum dictum est vinum dulce esse *μεγαλόσπαστον* *τὸν σπαστον*, id est, dulci vino inesse vim tumefaciendi, & in molem efferendi splenem & hepar, propter eam quàm paulò post explicabimus rationem. Passiue autem cum dicitur *ὁ αἰσθητός* *μεγαλόσπαστος*, cui hepar & lien, aut alterutrum intumuit, vel ob scirrhum, vel ob phlegmonem, vel œdema aliquod, aut affectum aliquem consimilem, quomodo affectis melicratum nocet, ait Galenus in comm. Tertium venarilicet ex Galeno Commentario in eandem particulam significatum, vt *ὁ μεγάλος σπαστος*, dicatur is cui ex naturæ prima conformatione viscus illud duplex magnum est ac elatum. Atque eo insensu æger noster dum integra sanitate frueretur dici potuit *μεγαλόσπαστος*, erat enim vt sic loquar, iecorarius, id est amplo iecore, feruente, æstuoso, & idè rerum dulcium vsu valdè eum offendi par erat. Immo quod tam saporē ægrotaret, & tam grauibis indomitisque morbis saporē teneretur, non aliundè causa quàm ab vno hepate querenda fuit. Vt etiam cum lubrica sua sanitate vteretur secundum vocis illius *μεγαλόσπαστος*, significatum attribuere non fuerit alienū. non enim dubiū fuit quin latens obstructio, aut ali-

Vide
partic.
12. lib. 3.
acutiori.

quid simile fuerit. Atque melicratum illi obfuit per se & ex
euentu. Ex euentu quidem, quoniam cum melicratum aluum
soluat bifariam, aut generando bilem, quia mel, bilesceat, aut
acquirendo acrimoniam, quia in biliosis æstuosisque aluis mel
facile acrimoniam acquirit, propterea quæ aluū sollicitat, con-
tingit vt iste æger alui libertate donatus neglexerit ea solemnia
remedia quibus propter plethoram & cacochymiam sæpius in
anno utebatur. Satis enim sibi suæque plethoræ factum puta-
bat, quod liquidiusculè aluus ferretur. Immò initio pastum
cum primum hausisset iusculum ad desidendum desurgebat, &
id in lucro deponebat in bonis que ducebat. At ista alui subdu-
ctio non erat naturalis, sed potius erat veluti quædam *σπυγία*, id
est, humida quædam excretio, ita enim verto, non quomodo
interpretes qui nomen *τῆς σπυγίας*, reddidit nomine lienterie. At
aliud longè est. Nam si quis præter consuetudinem nondum
mitificato, aut diuiso cibo edat bibatue, laxatur aluus liquidior
excremento, immò sæpè deliciuntur ea quæ assumpta sunt præ-
rum mitificata, an lienteria dicetur? Nequaquam, sed proprie
σπυγία vocabitur. Quod notandum, vt teneantur rerum distin-
ctiones, quas negligit otiosa hominum sciolorum ignorantia.
Ac dum solennes purgationes neglexit, ita congesti sunt prauis
humores, ita sanguinis massa infecta, vt ad oriente graui mor-
bo, ei necessariò fuerit intereundum. Notandumque vnum
est. Solebat colicis doloribus diuexari. Non eum per annum
integrum insolitò exercuerunt: sed ea praua materia istorum
dolorum parens aliquo tempore feriata infœliciore euentu
suam frequentiam compensauit. At quicumque olim grauius
morbis occupari soliti sunt, tamen si dent inducias, immò plerumque exincti
videantur, de iis securos esse non oportet, cum sæpè alij morbi pro aliis
succedant. Quod multos fefellit, quos incautos, aut renitentes mor-
bi, aut noui & insolentes, aut oppresserunt, aut funditus è medio subu-
lerunt. Porro de hydromelite hoc dici potest, quod de vino
dulci dicit Galenus, docens quomodo & ratione dulcedinis, &
crassitie offendat. Dulcedinis quidem quia omne dulce dum
impense coquitur amarum fit; ratione crassitie, quia cum dulce
sit, & ideo facile attrahatur ab hepate tanquam ferè crudum &
incoctum facile obstruit hepar & lienem. Subit enim minu-
tissimas venas, in quarum anfractibus mel, & aliud dulce con-
tentum dum efferuescit, & incrassatur sibi ipsi viam obstruit, &

Par. 22.
lib. 2.
Acuto-
rum.

Com. in
lib. 3.
acuto.

præcludit. Et notanda sunt ea valdè de distinctione facilitatis
obstructionis in pulmone, hepate, & liene. *Pulmo non ita ladi-* *Ibid.*
tur usu vini dulci, ut hepar & lien, cum bronchia crassum habent hu-
morem. Nam in hepate ex amplis venæ portæ vasis ad angusta vasorum
tum gibba, tum sima progreditur extrema, per quæ eorum omnium quæ in
corpus totum digeruntur transmeatio sit. At in pulmone contrario
euenit modo. Nam per venas multas digestum confectumque in am-
plam bronchiorum, & primo minoram irruiat capacitatem, atque ab ipsis
ad maiora excipitur, secum & crassos tollens humores, quibus non cali-
dus solum, verum quoque & tenuius existit, &c. Neque quæ de
vino crasso dicuntur, ea de melle omninò dici debent. Si qui-
dem non est ea partium crassitudo, quæ inest vino dulci. Vt ne
quis omnino ea ratione hydromelite aquoso carendum putet.
Sed si inflammata sint viscera magnas mel incommoditates af-
fert. Quod non modo de vera inflammatione audiendum est,
sed etiam si quis naturâ hepar habeat præcalidum, & aluum du-
ram habeat ob ventris caliditatem. At noster eger calidissimo
erat temperamento, ut ferè longè à medio discederet. Declara-
bat suffusa rubore facies quàm magno esset hepate, & calido.
Et minimo vini usu offendebar, quod declarabat vim caloris
alieni, & vaporum ab hepate calido excitatorum copiam. Ergo
cum visceribus natiua quædam esset *διεσπασίς*, hydromeli nocuū
fuit. Nam viscera rapiunt mel audissimè, & eo impensè dele- *Com. ad*
ctantur. Quæ omnia à Galeno præclarè demonstrantur. Et *part. 11.*
lib. 3.
acuto.
longum esset ea referre.

Aliam quoque incommoditatem affert mulsa, quàm in hoc
ægro nouimus, biliosa deiicit, aliquando bona, aliquando ma-
la. Bona biliosa non dicuntur, quod quæ excernantur bona sint, *Duplex.*
sed quia serum suum habent, mala biliosa dicuntur ea quæ syn- *bilio-*
sum.
cera sunt, & natiuo suo sero ob colliquationem & ardorem de-
stituta, ut hoc loco & in Aphorismis dixit, hinc ignea bilis est, *Com. ad*
flaua, crassâque quæ mala est ut signum & causa, ut signum, quo- *Apho. 6.*
lib. 7.
niam ardorem immoderatum & phlegmonem inducat, ut cau-
sa quoniâ nil, dum excernitur, iuuat, ardorem nō extinguit, sed
fermè auget: *διάρησις, πυκνότης, & δύσποσις* infert, ut ait Hippo. quod *Gal.*
mirum est, immò & intestina exulcerat¹³. Quærique hoc lo- *com. ad*
co potest an mulsa per se ista biliosa bona, aut malefica mali- *particu-*
gnâque (ut Galenus loquitur insolito loquendi more, dum vo- *las 12. 13.*
cat, biliosum malignum & maleficum ab effectu, & generatio- *14. lib. 3.*
acutioris.

534 **CONSILIORVM MEDICINALIVM**
 nis modo) efficiat, an excernat per se, an ad generationem faci-
 ciat, an eatenus mala, aut bona. Reuerâ facilitatem excretio-
 nis potest afferre, sed dum auget incendium, & promptissime
 bilefcit in vitio viscerum & *διρρηξίῃ*, multis modis potest dici
 afferre *σπέρμα καὶ ἐκλάσας*, læsiones & offensas: multa ad eam rem af-
 ferri possunt, at verendum fuit ne satietas fastidiumque tanta
 orationis prolixitate pariat. De mellelegi aliqua possunt eo
 loco vbi de lacte disputamus.

ANNOTATIONES.

- 1 Hic nunquam salubrius vixerat, nunquam omni ex parte magis
 sanus, quàm cum eo morbo funesto captus est. At *ἐκείνη*, & sanitas
 ista suspecta erat: verumque comperimus illud. Circa faciem coloris su-
 uitas & sudores sine febre, aut vetus stercus subesse significant aut dia-
 re *ἀνταξίαν*, Vide locum præclarum cap. 2. lib. 2. Celsi.
- 2 Vir iste quindecim ante mensibus laborauerat, quâdam specie arthri-
 tidis in omnibus articulis, in collo à corruptione humorum & serò mæli-
 gno. Talem speciem morbi vnus Hippo. animaduertit in fine lib. 2.
Prorrheticon. Quin dicit eos quibus viscera magna sunt, & quibus
 primis annis hæmorrhagia frequentes fuerunt, doloribus articulo-
 rum esse opportunos. Quæ conditiones in isto viro apparuerunt. Præterea de
 eo illud fuit verum quod ait Gal. ad part. 70. sect. 3. lib. 3. Epid. quod
 quibus multus sanguis generatur isque calidus in facili melancholice
 lici sunt.
- 3 Ad Hist. 2. sect. 3. lib. 1. Epid. de Sileno locus est præclarus. Vbi
 docet quomodo & biliosi humores & crudi simul generentur: unde (ait)
 morbi grauißimi generantur. Id quod ad semitertianas extendi
 potest.
4. Verè illius inæqualitatis huius horriffica causam ad phlogosin retri-
 limus. Nam Gal. com. ad part. 42. sect. 2. lib. 1. Prorrh. docet hor-
 rores frequentes circum dorsum, & cum iactatione significare phlegma-
 nem harum partium.
5. Inæqualitas materia maximè facit febres per totum tempus inæ-
 quales vt sunt horriffica. In multis morbis & corporibus vnus humor in
 vitio est, & facit orgasmum. Vt in biliosis ferè sunt febres vnusmodi,
 vt tertiana, aut continua. In melancholicis similiter. At in quibus
 temperamentum ad biliosum tendit, & hepata sunt calidiora, vitia verò
 institutum est pituitosum, aut alia ratione pituita generatur, in his inæ-

quales, erratica sunt febres. Quemadmodum tum cholera morbus pessima & flatuosa & sicca generatur, cum calidis & frigidis simul quis usus est. Quia contrarietas materia impedit uniformem motum. Ita cum simul putrent & mouentur, & concipiunt calorem, sed inaequaliter due materiae, tum duplex natura datur negotium. Declarat vxor Domini Courtilier, & vidua Ioannis Debures. Id quod Gal. ad hist. De Sileno lib. 1. Epid. sect. 3. explicauit. Docet enim grauissimos tunc morbos generari cum est bilis prouentus & crudorum simul humorum. Quomodo autem uterque humor succrescat abunde docet.

6. Hoc saeculo magna pars ardentium febrium à rigore incipit. Tamen Gal. ad part. 7. 5. sect. 2. lib. 1. Epid. ait rigorem statim initio proprium esse malignitatis. Et hoc anno 1580. quotquot ferè correpti sunt peste, iis praecurrit rigor. Et rigor prodromus fuit pestis adorientis.

7. In febribus paroxysmi saepe sunt apparentes aliquando non. Et in continuis annotationes sunt, seu παροξυσμοί, seu ἐπισημασίαι, aliquando diurnae, aliquando nocturnae, sine rigore, aut manifesta molestia. Has ἐπισημασίας ἀδύνατος, Graeci vocant, ut Gal. docet cap. 9. lib. 1. de different. febrium. Interpres vertit incompressas, sed ineptè. Alius, aequales. Minus ineptè, ineptè tamen. Et quamuis cap. 7. eiusdem lib. ἀδύνατος, nomen pro compressione ad pulsum refertur, tamen τὸ ἀδύνατον, pro incompressa sumi non debet. Ergo ἡ ἐπισημασία ἀδύνατος, dicitur, quod careat iis angustiis & molestiis quibus premuntur alij per accessionum initia. Et doctè Galenus explicat, & quomodo illud τὸ ἀδύνατον, in hecticis, & in quibusdam aliis febribus observandum.

8. Vnde, qui tertianarij se lecto continent, saepe rigorem: aut eum exiguum, non sentiunt.

9. In febribus continuis praesertim ubi multa inaequalitas materiae & motus, si corpus debile, & minimè obsequens materia, horrores apparent, & deinde incandescencia, sed isti horrores aggressionis tantum sunt inanis, vide 7. Epid. de muliere quadam.

10. Hippo. lib. 4. Acuto. part. 13. In causo febre non legitimo alium solum docet, non de materia morbifica parte excreta aliqua, sed corruptione alimenti quod sumptum est. Et quod valde notandum docet quomodo foco febris ardentis existente in hepate aliàs alius soluat, aliàs ascripta sit particula 17. lib. 4. acuto.

11. De his verus Aphorismus & quem in multis deprehendimus: Ventris circumentio ad necessitatem liquida deiciens, cito intumescens conuulsuum quippiam habet. Apho. 7. lib. 3. Prorrh.

12. Et fundati sumus opinione ipsius Hippo. nam dum facit mentionem de inflammatione lactium & ieiuni nam inflammationem necessario sequitur alui fluor (& hic fluor non debet dehortari vena sectionem) sed talis fluor, nec dolorem soluit, nec ventrem mollit: Inflammatio autem & morsus intestinorum & doloris causa est, & fouet istum tumorem.

13. Ideo lib. 2. Epid. & in Proverb. fines morborum in deiectiones synceras desinentes damnat, quia sunt male, ut signum & ut causa.

CONSILIVM CXI.

De febre continua & destillatione ferina.

Filius Domini Chaluæi equitis torquati, annos natus decem in febrem continuam incidit cum ferina destillatione coniunctam. Et quemadmodum omnes morbi qui vehementer hominem adoriuntur, facere solent, hic morbus statim terrificam attulit symptomata. Leienterica fuit fluxio, deinde alui planè astricta est. Tussicula erat inanis, arida, effera, tenuis. Metus erat febris hectica, cum videretur calor arens, fuscus, squallidus, genarum rubores fugaces, calor summus in pectore, lingua fuliginosa, sitis, dolores in latere dextro fugaces. Denique morbus erat *ακονδης*. Nam in quavis febre præter rationem collabi, malum. Quod quomodo intelligi debeat, & tamen ad artem faciat plurimum abundè explicuimus antè. Et omnes morbi maligni, quorum aut in acrimonia caloris colligantis natura posita est, aut in ferina destillatione, aut in translatione maligni humoris, hoc habent peculiare, ut subitâ consumptionem, & collapsum afferant citra ullam insignem euacuationem. Ac reuera si is morbus fuisset neglectus, aut si temerè de eo medicis securi fuissent, inopinatò repentè fuisset ereptus sideratis veluti pulmonibus à ferino. Obseruarunt enim primates quidam medici rerum diligentes indagatores in paribus destillationibus sideratis pulmonibus & lateribus redditis *ελητοις & αποπληκτις*, repentè interiisse. Adeo magna est vis *το θειου & θειωδους*. Vide quod sit *το θειωδου*, apud Hippo. lib. 6. Epidemiorum. Atque non tam in metu febris erat, quam destillatio, quæ speciem siccæ pleuriti-

Hipp.
part. II.
lib. 1.
Prognosis.

pleuritis, aut peripneumonia fecisset, tum per translationē à capite, tum per raptum à partibus inferis. Nam pulmo accensus vndelibet trahit magno impetu, & vnam speciem peripneumonia facit eo modo, vt explicuimus ante. Et obseruauimus in eo valde magnam cacochymiam (nunquam enim ærotauerat) euentusque probauit iuuiffe plurimum ad dolorem lateris & accersendam inflammationem colluuiem humorum, vt contra vulgarem opinionem sapius melius fit in doloribus laterum præsertim cum opinio est de translatione tenuiū ichorum à partibus inferis, purgare quam secare venam. Ideo dicebat Gal. minus auxilium ex sectione venæ quam ex purgatione sequi, sed securius: quia medicamenta augent febrem. Nunc verò cum alia habeamus lenientia, & maius, & promptius & æquè securum præsidium in purgatione locabitur.

Sicca erat pleuritis, non eo modo quo dicitur morbus siccus, id est, crudus, sed sicca, sine sputo dicitur. Quod ne mirum sit, hanc appellationē Hippocrates primus inuenit. Vocat enim quandā pleuresin, Pleuritidē *αὐτὴν πύδαν*. Rubor est genarū fugax, & quædā *ἐρυθρία*, quæ in malis ducitur. Et reuera rubor genarum inflammatorum pulmonum, aut inflammationi proximorum est indicium. Quidam aliquando, vt hoc probaret citauit prognosticon Hippo. At reuera de rubore genarum illo loci, ait Hippo. sed de purulentis sermo est: præter ruborem est indolentia, iactatio, dormiendi impotentia, caloris acris, sed fugacis sensio, tussis inanis, scabra lingua, sitis ingens, summi calor in thorace perceptio, sputum cludit spiritum, vt paulo post ex Galeno dicemus. Actussium inanium & aridarum duo sunt cum materia tenui quidem, sed quæ tandem aliquam crassitudinem acquirit in pulmone, cuiusmodi est pleuriticorū tussis initio. Alia est tussis inanis, quæ nil postea relinquit, est autem eius causa spiritus ichorosus, aut ichor spirituosus omnis expers pepasini. De priore agit Hippo. infestabantur arida tussi, nil excreabant, quibusdam testiculus inflammabatur. Qui factus fuisset abscessus illius materiei, nisi moram ea traxisset, & satis eius fuisset ab abscessum commemorabilem? De posteriore potest intelligi ex eo quod Hippo. scribit cum ait in inflammatione hepatis ob serum resudans fieri *ἐν ἡπατί τοῦ πυλῶν*. Tussim & tussendi inaniter desiderium. Tussis, si magis materiale est serum, *πυλῶν*, conatus tussendi si magis efferum, tenue,

Tom. I.

Y yy

3. de
morbis,
lib. x.
Et part.
21. lib.
4. acuto.
Memi-
nit or-
thopnea
sicca ob
spirituū
interce-
ptionem

Part. 12.
sectio. 1.
lib. 1.
Epid.

2. Pro-
nost.

538 CONSILIORVM MEDICINALIVM

spirituosum. De ea materia mala, cacoethe, pepasmi incapace cum passim alibi Hippo. tum maximè in Epid. agit, fauces dolebant, ruborem habebant, rheumata parua, tenuia, acria, statim extenuata, & malè affecta fuerunt. Et de filia Euryanactidis, huic fauces initio dolebant, gurgulio retractus, destillationes multæ, acres, tenues, & addit sub finem *τὸ στενὸν φωνήεν*. Plura nos explicuimus in voce *ἐνέον*. Cæterum non dicam plura de hoc ægro cum idea huius morbi explicata ferè sit, & ad vnum expressa in duobus pueris Ioanne de Heruille, & Melchior du Fresnoy. Tantum de duobus monere oportet, quod video nullos apud Hippocratem legisse duplices esse pleuritides, alias cum sputo, quæ & siccæ & humidæ dici possunt: siccæ, initio, cum nondum procedit sputum. Alias sine sputo, vt quales sæpè hyeme grassantur, & quæ à calore fundente & colliquesfaciente sunt, item quæ à ferino oriuntur, quæ omnium deterrimæ cum sensim cuniculos agant. Alterū est quod omni ratione in siccis pleuritidibus humectare conuenit, tum ad retundendam humoris acrimoniam, tum vt tranquillior redditus cedat Naturæ, nec ita per colliquationem pestilentem hominem *καταπαύει*, offendat ac necet. Et Hippocrates visus est huius morbum pueri & descripsisse, & præsensisse quid futurum fuisset nisi arte cautum fuisset: *Resiccatur id quod influit, & in gutture compactum, vt pote quod non eluitur, sed paulatim influit ac detinetur, tussim excitat, & quod defluit in aortis detentum angustum spiritui locum exhibet, & talem spiritum habere facit, qui veluti defectus semper respirare concupiscit (id est quædam *βραχὺπνοια* & *δυσπνοια* fit) & in pulmone veluti non vehementer humido existente pruritus con-tingit: Cum multum è capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Locus præclarus. Et reuera ista inanis tussis erat à pruritu, & qui tenuis & paucus humor pruritum faciebat, idem dolores fugaces in thorace faciebat. Reuera obseruauimus quod dixit nepè ob pruritum istum difficultate spirandi laborasse: Immò si moueretur minimum, dicebat sibi spiritum deficere. Quomodo autem omniratione in sicca pleuritide humectandum sit Hippocrates docuit, & nos hunc secuti id præstitimus in hoc puero, in Damiscella in hospicio Briennæ. Item & ea quæ omni ratione inspissarent exhibuimus. Sic enim consuluit Gal. Scis, ait, *pulmonem ipsum ab humoribus crassis & viscosis per tusses expurgari. Nam qui sunt aquosi & extremæ tenues, aerem qui tussiendo emittit**

Par. 28.
sectio. 1.
lib. 1.
Epid.

Lib. de
locis in
homine.

Pruritus
in pul-
mone.

Lib. de
locis in
homine.

tur, circumfluunt. Aer enim tanquam manus quedam existit, quæ sursum crassos humores ferat. Quod si crassi fuerint, non humiditate tantum opus est, sed & deterfione quæ ab acidis fiat succis. Itaque puer, de quo agitur, aluo soluta leniendo, temperato calore, sectione venæ, anodynis, & omni humectationis formâ breui restitutus fuit, & suo pulmonis pruritu liberatus. Cæterum vnum annotare oportet qui fiat, vt in multis morbis acutis somnus laborem faciat, conuulsiones & timores afferat, cum contra iuuare debeat. Ac primum quatenus in somno reuocantur intro spiritus, calor vnâque humores, ea ratione nocet maximè in febribus & inflammationibus internis, nisi ratione coctionis quæ fit per reuocationem istam maius commodum sequatur, quàm sit id incommodum quod ex reuocatis intro humoribus insequatur. Nisi quis dicat parum etiam prodesse somnum in febribus ratione primæ & secundæ digestionis, quod per vigilias vrgeat, vtrâque, vt tertia digestio per somnum viger. Vt declarat inuoluntaria seminis excretio quæ nobis dormientibus fit. Ac de somno, causis, vigiliis, vtrorumque formis antè à nobis dictum est. Nunc explicemus qua ratione fiat, vt somnus aliquando obsit in febribus, & quomodo id fiat. Ac primum de somno mirabile est quod ab Hippocrate scribitur: dum enim nititur demonstrare in sanguine magnam vim inesse ad prudentiam & intelligentiam, docet ex contrariis effectis tum in somno, tum in morbis acutis. Atque in somno quidem quoniam refrigeratur sanguis, ideò vacuitatem quandam prudentiæ contingere docet. Nam (ait Hippo.) cum corpus somnus inuaserit sanguis frigesit. Infrigiditato autem sanguine languidiores fiunt meatus, hinc constat, quoniam somno ad grauata corpora reclinantur, & oculi ardent, & prudentia permutatur, opinioniones peregrina mentem occupant, quæ in somnia appellantur. In acutis morbis quoque apparet quantum sanguis ad prudentiam conferat, quoniam cum primum in sanguinem mutatio aliqua euenerit, tum demum mutatur & deterior fit prudentia. Sanguis (ait Hippo.) qui est in sub fine homine, maximam partem ad prudentiam facit, quidam dicunt totum. Cum bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fuerit morbis. Sanguinem ex consueta compage ac motione dimouet, & serosum facit ac calfacit. Calfactus autem etiam totum corpus calfacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Quæ quatuor

Com. in
part. 2.
lib. 3.
acuto-
rum.

Lib. de
flaskis.

sub fine
nem lib.
I. de

540 CONSILIORVM MEDICINALIVM

notanda sunt vt generetur phrenitis, nimirum vt bilis commo-
ueatur, & sanguinem conturbet, vt dimoueat sanguinem ex
compage, *ουσιας* Græcè *κίνησις*: tum vt serofus fiat sanguis, Græ-
cè *διουρεσις*, (cuius verbi magna vis est) & calfiat. Sed hæc
sint *μακροί*, præclara tamen. Ergo somnus refrigerat, interiora
tamen calfacit ex euentu, corpus reddit grauius & stupefacit.
Sed in febribus ob dominatum caloris contra naturam grauius
sæpè inducit symptomata. Ideo, (ait Gal.) in somno & labores,

Com. ad Apho. 67. li. 4. & tremores, & conuulsiones fiunt cum in somno humor infectus ad so-
mnum peruenerit, tunc magis intra, quàm extra natura mota². Et vt
somnia ac cibo replent caput, sic in plethoricis dispositionibus, somni ipsum
replentes ag grauant cerebrum. Et in somnis accruati mali humores
magis euaporant, cum iuncti permaneant, sicuti actiones utiles somnos
conciliant. Et notandum quod in comm. isto addit Galenus, in
morbis exitiis ista terrifica ex somno euenire symptomata
obseruauit. Ac si dicat, non semper euenire, vt somnus noceat,
sed cum victor penè est calor extraneus, & humorum indomi-
ta est *καταρσία*. Alia autem signa lædentis somni ex eodem Gal.

Com. in Apho. 1. lib. 2. sunt, quoniam per somnum non soluuntur febres, immò ex-
tenduntur dolores augentur, fluxiones multiplicantur, crescunt
inflammationes, hæc contingunt ob humorum prauitatem,
quos calor innatus fortior euincit, & coquit. Cum debilior,
succumbit, & ab his viscera aggrauatur: Ac cum iuuat, bonum.
Non quod omnino verum sit propterea saluari ægrum. Non
desinit enim aliquando etiam mori, præsertim si qua dispositio
sit funesta, vt abscessus internus. Et Gal. citat Hippoc. in
Epid. inter hos multi erant graui somno oppressi & delirantes,
Sectio. 3. lib. 3. Epid. nonnulli verò ex somno. Nam illo loco Hippo. meminit phre-
niticorum & febre ardente laborantium, quæ altus sopor
obortus est. Phreniticis quidem ratione accumulati in cerebro
humoris, & ratione affectionis ipsius cerebri, in febribus autem
ob copiam vaporum à calore extraneo summissorum, & exci-
tatorum.

ANNOTATIONES.

*His consentiunt multa præclara lib. de vetere medicina scripta. Vbi
professo docet quid sit coquere in catarrhis, & quomodo à vehemen-
tibus medicinis sit cauendum.*

² Et com. ad particul. 34. sectio. 3. lib. 3. Epid. Notat Gal. crinata in febrem ardentem incidere, & quaratione id feret. Quod nostro Sanguine contigit.

CONSILIVM CXII.

De Hypochondriorum phlogosi.

NICOLÆA LE BE, annos nata quatuordecim nondum menstrua, calidis & squallentibus visceribus prædita, post multam insolationem in ripa sequanæ, & potum tum aquæ immoderatiorem, tum etiam vini (quod tamen ei nocentissimum est) cepit grauiter dolere totum ventrem & hypochondria. Alius substitit. Minimum pressum digitorum non fert in utroque Hypochondrio, nec in pube ipsa, immò nulla non in parte totius abdominis inflammatio erat, & multa colluies humorum, cuius pars tenuior, & ichorosior, & malignior speciem inflammationis fecerat ac si de hydropse subito oborto metus esset. Et reuera siccus hydrops facillè ortus fuisset per lactium inflammationem. Nullam in partem moueri poterat quin quereretur de dolore. Alij ad instans menstruum tempus hoc referebant, quo tempore sæpè orgasmus & impetus fit sanguinis in omnes partes. Hoc quidem iuuare potuit. Nam constat ex libro de virginibus Hippo. quæ & qualia accidunt virginibus instante tempore menstruæ purgationis. Tandem neglectis multis quæ utramque in partem afferri possent, tentato medicamento ad venæ sectionem accessimus ter aut quater repetitam, etiam ex utroque brachio. Magna erant argumenta latentis inflammationis, & quæ vires maiores acquiuisset, nisi tempestiuè puellæ occursum fuisset. Ideò autem cunctantiùs medicamentum tentauimus, quod frustrà nos aliquid agere putaremus, Moniti quoque eramus iis quæ ad hunc ferè scopum ab Hippocrate scripta sunt dum loquitur de Hypochondriis inflammationis phlogosi quadam sine tumore, siue sint *νεφθαλ*, ut ibidem loquitur, id est, ut in partibus ipsis intumescētia sint aliqua: *νεφθαλ*, enim dicitur, *ἀπὸ τοῦ νεφθαλίου*, quòd congeratur, concluda-

Yyy üj

542 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tur, ac colligatur in parte humor aliquis. Verba Hippocra-
 tis hæc sunt. *Hepatis dolores & splenis grauitates, & alie inflam-*
mariones, ac morborum collectiones (id est, ait Galenus) cum vitiosi ali-
qui humores in partem quampiam confluunt, & in ea coaceruantur, quod
a fine suscipi dicitur, solui non possunt, si quis prius medicamentis pur-
gantibus purgare aggrediatur. Nam venæ sectio in talibus principa-
lis est, deinde infusa per clysteres. Et post venæ sectionem, purgans me-
dicamentum securitate ac moderatione opus habet. Quicumque ea quæ
inflammata sunt, statim in principio morborum medicamento soluere
volunt, ij non solum ab intensa & inflammata parte nil adimunt, cum
non cedat quæ cruda est affectio, verum & quæ morbo resistunt, & sana
sunt, absument colligantque. Ductoque ad imbecillitatem corpore
morbus superior euadit, qui vbi corpus vicerit, remedium non habet.
Idē in Aphorismis scripsit. Quicumque, ait Galenus, multa crudi-
tate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, quibus itidem
Hypochondria intenta atque inflata sunt, aut supra modum calida atque
igneæ sunt. (quanquam in quibusdam codicibus legitur) & de
πυρρὰ καὶ ὑπερθερμὰ, sed malè, cum locus desumptus sit ex 4. acuto-
rum vbi legitur πυρρὰ καὶ ὑπερθερμὰ, non autem πυρρὰ καὶ ὑπερθερμὰ)
& si hoc ipso loco aliqua inflammatio est, omnes hi haudquaquam ad pur-
gationes apti sunt.

Sed dicet aliquis: si hæc adsunt, præsertim inflammatio
 Ilium, si adest *πυρρὸν* præsertim calida; morbus acutus est: Si
 acutus initio agendum aliquid; nec valet tum aphorismus
ὅτι πῶς φαρμακίον, quid facias? si nec agrum sine villo remedio in-
 terire? In omni febre ardente numquid phlogosis est,
 si phlogosis, non valet agitatio: Et tamen si quid in ar-
 dente febre agendum, maximè initio morbi dum materia
 turget. Reuera aliud est materiam *ὄρεον*, aliud *πυρρὸν καὶ ὑπερθερμὸν*
ἢ πυρρὸν καὶ ὑπερθερμὸν, aliquam esse. Et vt patet ex com. in aphor. 22.
 lib. 1. Hinc sumitur omnis distinctio & definitio tantæ diffi-
 cultatis. Nisi dicas sæpè inflammationē esse & *πυρρὸν*; & orgas-
 mū esse ob serosos & acres humores attractos à venulis arefa-
 ctis: Si purgas consules orgasmo, sed augebis inflammationē
 & contra Galenum peccabis Et reuera si habetur ratio ipsius
 materiei impactæ, & quæ velut radices in partē egerit, à vali-
 do medicamento abstinebis: quomodo intelligi debet illud
 Hippo. supra citatum, quod à parte inflāmata nil conaberis
 auellere: Sed si iunctus sit orgasmus, ob serosos ichores à par-

tibus inflammatis manantes & grauia symptomata excitantes, aut ob materiam aliquam non ita sequestratam & *συστολῇ* facientem, sed per mesenterium sparsam, & quæ facili arte nostrâ educi queat, non erit alienum tunc moliri euacuationem. Nunc ad Galenum reuertamur. Cum humores, ait, de loco ad locum mouentur, nec consistunt tunc primo quoque tempore euacuandi veniunt, in parte aliqua hærent ac confidunt & impinguntur, expectanda coctio, atque tunc naturam, habituri fumus adminiculantem. plura suprà.

Cæterum cum pleròsque videamus derepente suspensa intentaque habere hypochondria, nec non satis liquidam habere aluum, aut statim, aut ad sectionem venæ veniundum est, quod existimemus distentionem istam ab inflammatione esse, an verò ille fluor alui nos à sectione venæ debet reuocare: quod videmus omnes in eam venire opinionem, vt credant nusquam locum esse venæ sectioni dum aluus lubrica est. De his ergo breuiter quæramus, quanquam & in nostris definitionibus medicis in voce *σπασμῶδης*, dictum est, & in historia de Sangermano. Audiamus Hippocratem, *Part. 25. lib. 4. acut.*
Obsessa, inflammatione Hypochondria non spirituum interceptione, septi transuersi intentio, vel spirituum protensiones, sed à spirituum interceptione pathemata hæc superueniunt. Hæc inquam sectione venæ soluantur. Vbi notandum est hac prima periodo tres affectus indigere venæ sectione, Hypochondrij inflammatione non spirituum interceptione, id est, si modo quæ iuncta est tumefactio & inflatio inflammationi non sit à flatu, quamquam habere potest status coniuictos: Secundò diaphragmatis intentio, Græcè *ἐν τῇ τῆς*: Tertio spirituum protensiones, Græcè *τῇ πνεύματι*. Sed cum venam secat in Hypochondrij inflammatione, excipit, si non sit *ἐν τῇ ἀπὸ τῆς πνεύματος*, si non sit ex spirituum interceptione, cum autem in septi transuersi intentione, & spirituum protensionibus venam secat, ait hæc, id est, & transuersi septi intentionem, & spirituum protensiones ex spirituum interceptionibus esse. Si ergo cum sint à spirituum interceptione, quemadmodum & inflammata Hypochondria cum spirituum interceptione esse possunt, cur hæc circumstantia, Spirituum interceptio: Indicat non secandam venam in inflammatione hypochon-

544 CONSILIORVM MEDICINALIVM

driorum, in diaphragmatis intentione, & spiritus protensione eadem conditio suadet sectionem venæ? Ait enim Galenus: Qui à spiritus interceptione patiuntur difficultatem spirandi, ij sectâ venâ iuuantur. Cauet autem ne venam secemus in Hypochondriis inflammatis si spirituum interceptio sit. Sed quod dixit Hippocrates hunc habet sensum. Primum cum dicit, Obsessa Hypochondria inflammatione, non spirituum interceptione, hoc ambiguum est. Non enim spiritus interceptio inflammationem infert. Quare ergo dicit, hypochondria inflammata non spirituum interceptione, quasi verò ἀπὸ πλεονεξίας, spirituum inflammationem accersat? Nequaquam. Etenim Galenus ita scribit, Numquam spiritus interceptio flagrantem Hypochondrio diathesin infert. Sed flagrans diathesis potest prouentum flatuum facere, vt de ictericis antè abundè demonstratum est. Atque Gal. vt doceat cur Hippocrates hæc verba addat, *Non spirituum interceptione*, quoniam nulla est coherentia cum his, *Hypochondria inflammata*, scribit nihil aliud hoc loco esse apud Hippo. τὰ ὑποχόνδρια φλεγμαίνοντα, quam τὰ ὑποχόνδρια εἰς τὸ ἔλκετον ἤρμενα, id est, Hypochondria in tumorem elata: Sic valet conclusio, Hypochondria in tumorem eleuata, non spirituum interceptione, id est, vt ista eleuatio non sit à spiritu, sed ab inflammatione. Nam inflatio vel sit à flatibus, vel à mucore, aut thrombo, aut ab inflammatione. Et talis sensus est Hippoer. Si Hypochondria eleuentur, (cum enim διανοήσεως, meminit tacitè audit tumorem aliquem excitari) sectio confert venæ, sed hoc verum si eleuatio sit inflammatoria non πνεύματός τις, id est à flatu excitata. Non quin non eadem sit ratio medendi, si inflammatio Hypochondrij sit cum flatu aut sine flatu, sed oportet signis syllogisticis assequi an flatus interceptio non causetur istam eleuationem. Hic in verbo φλεγμαίνοντα, audit tacitè aliquā eleuationem. Et Gal. citans ferè hunc Apho. in lib. 1. Apho. docens quibus non conueniat medicamentum, ait: *Non conuenit medicamentum*, οἷσι τὰ ὑποχόνδρια διατεταμένα περυσσονται, ἢ ὑπερξυλλόντων τῶν δεξιῶν πνεύμα, vt τὸ διατεταμένον, ad caliditatem tanquam ad causam referatur. Nam si alia de causa distendatur venter quis dubitat quin sit locus medicamento calido. At cum Hypochondria sunt eleuata & calefacta ob phlegmonem, non conuenit purgatio metu πυρρίσεως. Cæterum si spirituum interceptio difficultatem spirandi & orthopnoeam inducat sectio confert, præfertim

Com. in
part. 21.
lib. 4.
acutro.

LIBER PRIMVS.

547

fertim si aliqua sit phlogosis. Et quæ spirituum interceptio per se non postulat phlebotomiam in ventre inferiore, eadem postulat in ventre superiore. Nam cum spirituum interceptio est, aperiendo secta vena iuuat. Quanquam dubitari potest, nisi suspicio sit de phlegmone, quod Galenus videtur indicasse, com. in illam particulam 21. lib. 4. acutorum.

Duo restant explicanda, prius quomodo isti puellæ inflato toto ventre per inflammationem putrefacto quodammodo istam faciente phlogosin alui etiamnum liquida deiecerit: secundum quomodo audacter liquidior, & veluti diarrhœicâ fluxione tentatâ alui missus fuerit sanguis: duo alia addentur præter rem quidem, sed non omittenda, cur in ista phlogosi non fuerit insignis febris, & an causa procatactica aliquid efficiat ad morborum generationem. Primum explicuimus antè, & ad hoc intelligendum valent ea quæ Hippo. scripsit in 2. prognostic. Vbi Galenus explicat, quomodo hydrops ab inflammatione lactium & ieiuni nascatur, & multis de causis iunctus sit alui fluor. Quod non idem contingit in hepatis inflammatione. Sed talis fluor, ait Hipp. nec mollit deprimîtque ventrem, nec doloris leuatorius est.

Secundum, an fluente alui potest tutò vena secari, quod in ista puella fecimus. Nam contra docet Hippo. *Sicui sanguinem auferre confert, ventrem confirmabis.* Gal. in Com. *Si post detractionem persuerat fluor, virtutem prosterne.* Sed cum phlogosis est, aut calor adurens & colliquans non alienum est demere sanguinem, vt ardorem extinguas.

Ceterum valdè notandum est illud tertium quod quærebamus quomodo non erat magna febris cum æstuant Hypochondria. Videtur enim æquum esse vt febris insignis internas inflammationes consequatur. Tamen id non placet Galeno, is enim etiam de inflammatione hepatis & diaphragmatis loquens ait: *Si in iecore, septo, ventriculo phlegmone oriatur acuta febris forsitan fuerit, quanquam ne hoc quidem perpetuò verum, nondum verò maligna est.* Et in Apho. vult magnas esse inflammationes in partibus internis vt acuta febris sequatur: Non simpliciter dixit, inflammationes, sed magnas. Et de vtero loquens vult etiam magnas esse inflammationes vt febris consequatur acuta. Sic si sit phlegmone, aut phlogosis mediocris, ad manum mordax febris non insequitur.

Tom. I.

Zzz

546 CONSILIORVM MEDICINALIVM

De causis procatarëticis ita statuendum. Placet quibusdam earum non esse habendam rationem in morborum curatione. Quanquam earum magna vis existit. Et in Epid. narraturus de febribus continuis, sæpè comestationis meminit, irarum, insolationis, intempestiue cœnæ, laborum & confimilium causarum procatarëticarum. Et notandum est quod de his scripsit Gal. Corpore nostro ad morbosam dispositionem nonnumquam parato, ita ut propè completa sit, externum quippiam obueniens eam manifestauit, febrem videlicet accendens, vel capitis dolorem, vel catarrhum excitans. Deinde ex eo continenter ad morbosæ affectionis preparationem non sine periculo languent. Item & alia multa præclara illo loco scribuntur.

Cum ter puellæ venam aperuissimus omni ratione dolorem sedare & mitigare conati sumus, phlogosin istam metu abscessus: ferè in maleolo vena secta est ad reuellendum ad partes inferiores.⁵

℞. Maluæ totius, acetosæ, violariæ, florum chama. melilo. an. m. j. senecionis & crefionis. an. m. s. seminis melonum cucurr. lact. an. m. j. seminis lactuca. ℥j. senum psyllij & fœnig. an. ℥i. s. fiat decoct. in sero lactis pro fotu: Deinde extrahatur mucag. cum qua ponantur ol. rosati. ℥ij. Aceti ℥i. s.

℞. Ceroti santal. macerati in oxyrhodino lib. s. fiat litus ad totum ventrem.

Item ℞. ol. de nymph. & rosati. an. ℥ij. aceti. ℥i. s. capbure parum pro litu.

Collomadeat in ol. viol. & butyro recenti & applicetur & repetatur sæpè: Item vesica suilla impleta lacte admoncantur.⁶

℞. Decoctionis omazorum libr. s. in quibus coque folia vitis, salicis, acetos. lactucam, caput papaueris & flores nymph. & semina frigida. maior. Addatur serum lactis ad lib. i. s. dissolu. ol. rosati. ℥i. s. cassiam & similia. Item Syrupum de nenuph. succum lactuce pro chysmatis.

Date portiones ex syrup. nenupharino, decoct. lactucar. & cap. papauer. Item hordeata.

Immissa in balneum aque dulcis. Sic reseratis viis, materia temperata, sedato aestu facillimè ea aluus lata est quæ aquosis tantum ferebatur.

ANNOTATIONES.

1. Nam in quibusdam vi ipsius inflammationis circa aliquas abdominis partes videtur colligi quippiam. Et id *συσπώδης*, propriè nuncupatur.
2. Quanquam Hippo. sectio. 5. lib. 2. Epid. venositatem flatuosam quam vocat *αἰσώδης*, vene sectione soluit.
3. Ad curationem huius mali, ut & ad tympanem ortum ob phlogosin lactium valet illud Hippo. 2. Epid. sect. 5. Ventositatem flatuosam, (Græcè *αἰσώδης*), phlebotomia soluit. Nam præ calore spiritus multus excitatur qui distendit & vexat.
4. De hac verum illud erat. Dolores Hypochondriorum hepatis, umbilici sanguinis missione leuantur. In coacis.
5. In Hypochondriorum tumoribus, nec mollientia nimis, nec siccantia valent.
6. Enemata ex pinguibus præscripsimus secuti consilium Hippo. li. 4. acutorum, cum loquitur de Cholera arida, in qua flatus seditionem faciunt estque calor acer & mordax.

CONSILIUM CXIII.

Ad febrem continuam horrificam & destillationem.

DE Tonfore Caroli successore superius dictum est. Idem eodem tempore quo & Sangermanus febre assidua horrida laborauit. Ingens erat cacochymia, & destillatio à fero nitroso omnes neruorum propagines quæ à ceruicis vertebra, & principio vertebrarum dorsi oriuntur, imbuente, quo tanto perè diuexabatur, ut ne minimum tactum ferret, eo modo quo & ij qui vlcerosa lassitudine detinentur. Nec non ingens renum dolor erat, & cum nephriticus sit & lapidosus, metuebamus de renis inflammatione aut consimili affectu: Et herclè multa erant argumenta. Quoties is laborat putrida febre maximè laborat, cum hepate sit præditus calidissimo & cibos corrumpente, ut deiectiones, & alia satis detexerunt. Et cum vena cava plena prauo sanguine incubas spinæ dorsi tota ardet & æstuat, non mirum si doloribus lumborum valdè diuexatur si

Z z z ij

iactatur perpetuò, & magnam scabritiem habet, nec nò *apoplectus*.
 Et reuera peculiaris quædam erat affectio in renum regione,
 peculiaris in dorso, vnde vix spirare poterat: & aderat febris
 partim essentialis, partim symptomatica ob eos affectus com-
 memoratos. Renis affectum cum esse dicebamus quem Hip-
 pocrates explicat, & reuera magna erat affinitas, verba Hipp.
 hæc sunt. *Quartus renum morbus à bile fit & pituita maximè estate.*
Dolores urgent in laterum mollitudine, & in lumbis & lumborum
musculis, & patitur qualia solet mulier ex partu laborans, & non po-
test in sanam partem decumbere, sed valdè dolet, & ex lateris mollitu-
dine quadam pendere videntur velut abrupta. Urina vix prodit præ
 sua pituitositate & visciditate. Pari morbo nutrix Domini Roysæ
 laborauit, & iste piscator qui decubebat in vico de la Mortelle-
 rie, è regione vretoris. Quod attinet ad dolores sùmos quos cir-
 cū dorsū, & præsertim omoplasas sentiebat, vt necliberè spira-
 re, nec moueri, nec decumbere posset; immò blandæ manus
 appulsum non ferret, etsi ob consensum aliarum partium infer-
 narum poterat laborare, omnino tamen id erat à diffusionem ni-
 trofi feri, offeri, & pepasmi expertis qui dum imbueret quartā,
 quintam & sextam coniugationem neruorum à vertebra collis
 nascentium, difficultatem spirandi summam afferebat ob dia-
 phragmatis consensum². Nam, vt anatomici scribunt, sextæ
 coniugationis pars diaphragmatis neruo inserta non modicè
 cum augeat. Et qui diaphragma moturi sunt nerui, è ceruicis
 medulla omnes prodeunt, in partem diaphragmatis mediam
 sese inferunt, in ipsâque via fulciuntur intersepiente membra-
 na thoracis. Duo alij per initia his copulantur nerui, qui ta-
 men mox inde intrò sub os pectoris euecti, tandem in dia-
 phragmatis finem & ad mali punici sedem contendunt, vt mirū
 non sit, si initio istorum morborum affecto, aut imbuto humore
 prauo & maligno difficultas sit respirandi, vt istius difficultatis
 causa non sit reuocanda ad propriam affectionem diaphragma-
 tis, sed ad neruorum principium ita laborans. Et reuera co-
 tempore quo iste laborauit, vulgò grassabantur istæ malignæ
 fluctiones in omoplasas, & partes posticas thoracis¹. Egròque
 nostro omni ratione occurrimus fotibus, & cataplasmatibus, tan-
 dem erumpente sudore: die iudice planè dolores isti conque-
 uerunt effluente isto sero quod villos & stamina, neruorum ita
 obliuerat imbueratque, atque dicto citius facilitas ducendi spi-

Ferne-
lius ca.
10. li. 1.
Physio.

ritus est restituta. Hoc notatum volumus quia sæpè difficultates respirandi adsunt aut propter istorum neruorum à spinali medulla ortorum affectionem, aut propter affectum renalem¹, aut hepaticum, aut hypochondriacam affectionem, & temerè inscienterque multi recurrunt ad pulmones & thoracem, putantque affectionis causam illic latere, falluntur autem plurimum, & sæpè deterius esse putant quam sit. Et ita interpretandus Aphorismus Hippo. *In febre assidua difficultas spirandi & delirium si acciderit lethale.*

ANNOTATIONES.

1. Reuera in eo erat ulcerosa lassitudo & ostocopos quæ in causam solet incidere. Nam, ut Gal. docet part. 2. lib. 4. acutorum totum corpus laborat lassitudine ulcerosa propter tenuium humiditatum acrimoniam declarauit morbi exitus. Nam cum nulla ratione cessaret dolor iste & lassitudo ossæaria, copioso manante sudore omnino sanus euasit. Quidam cum hæc vident ad catarrhum hos dolores renocant. Male. Quamquam & desillationes à capite idem causantur præsertim quæ à sero sunt malo. Et credibile, & serum per corpus sparsum cum eo quod à capite est concurrere.
2. Et in historia de Pythione docet com. in part. 4. Quomodo occupatio neruorum qui à primis Spondylis ceruicis ducuntur, difficultatem motus in manibus afferat immò & tremorem. Et lib. 6. Epid. par. 4. sect. 4. de filia Agesij docet quomodo imbibitio primorum colli spondylorum noxam communicet manibus.
3. Si quando id contigit in paruo Petro euenit à desillatione seri crudi in partes subiectas, ac si *παρὰ τὸν σπινάθρα*, esset *παρὰ τὸν σπινάθρα*.
4. Difficilis inflexio spine, & ad lumbos dolores sunt lapidis indicia.

CONSILIVM CXIV.

De capitis dolore.

MARIA BERTHIER, iam annos aliquot capitis anteriora dolet, frigus se sentire in futura coronaria narrat. Sed vno ab hinc anno manifestò sentit fluxionem à capite in scoptula aperta per collum, in metaphrenum & lumbos. Et eo humore fluente dolores sentit vehementes, & sensus caloris & acrimoniæ adest. Si hic humor subeat artus & membrorum articulationes illam arthriticam reddet. Sed dum subtus cutim fluit, nec in interiores capacitates sese insinuat ac infert, nondum profundos dolores & arthriticos infert. Atque hæ sunt rationes quibus aduersus Fernelium contendimus in eo commentario quem de arthritide conscripsimus. Etenim; si omnis dolor articulorum materiam & causam sui repetit à cerebro, cum tantos dolores in articulis excitet, cum in sua prima origine sit humor veneratus, acer, nitrosus, & ~~humorosus~~ (quam non negamus quin etiam maiorem tractu temporis malitiam acquirat) an esset verisimile à capite subtus cutim defluere, & nullum dolorem excitare? Nequaquam. At videmus multos arthriticos derepente conquerentes de dolore pedis aut genuum, nullo prægresso dolore in metaphreno & partibus superioribus, quibus acuties est sensus, per quas tamen partes decurrere humorem à capite labentem Fernel. contendit. Sic quæritur hoc loco quomodo generetur iste humor in capite & inde effluat, qualis sit, an ratione caloris, an ratione frigoris, & si acer, nitrosusque est, cur tam facilè horreant. Hippo. duplicem mucum facit à capite orientem & dolorem excitantem vnum ab interno cerebri corpore per infundibulum defluentem, alterum à transudatione sub pericranio in partes externas sese proripientem. Si ab interno capite est mordet & dolorem facit, si ab externa parte non mordet. Hoc tantum probabile est: sicut & illud quod scribit si fluxus mulieris mordet à corpore est, id est, ventre ipso in quo prauus humor latitet, si non mordet à capite est. Nam in hac muliere, de qua agimus do-

*Lib. de
locis in
homine.
Lib. de
natura
mulie-
bris.*

LIBER PRIMVS.

lores capitis & vicinitas locorum qui primùm dolent, deinde transfundunt eundem dolorem in partes contingentes, & significat à capite humorem manare, qui nitrosus est, malus, effusus, & qui quancumque in partem irruerit, suæ malitiæ virus expandet. Tabem enim inferet & ea omnia quæ ab Hippo. explicantur. Huiusmodi humoris & generationem, & fontem, & effectus Hipp. explicat, & sæpè experientia patent. Si enim constat partes omnes internas sæpè labefieri ob nitrosum salisumque humorem à capite manantem, cur humor qui in partes externas refunditur, aut liquatus subit, aut expellitur vi pellente naturæ, & qui cum eo qui interiora subit habet & affinitatē, & vt verbo Hippo. accommodato vtar, *ἐπεὶ οὖν ἐστὶν*, similia symptomata non progignet?

Lib. de Glandulis.

Audiamus Hippo. *Tabes ex fluxione retrorsum, qui hac affectus est, caput ei purgabitur debili pharmaco*: Deinde ait paulo ante, *cum retrò in carnem iuxta vertebra fluxus illapsus hydropem fecerit, si medeberis. Caro in collo inter venas crustis vratur, cicatrices quam tenuissimæ inducantur, & quam pituitosissimis vtatur. Quod est intelligendum, quoniam abhorret in omni specie hydropis (si tympanitem exceperis) vti pituitosa & humida diæta: sed primùm nomine hydropis intelligit quandam speciem hydropis dorsalis à ferina destillatione à capite manante per posticas partes, quæ destillatio dum calori & humoris nativo bellum indicit, & tacitam, latentem furtiuamque depassionem & consumptionem partium solidarum & spermaticarum, quæ plurimæ sunt in metapneuro: vnde ab his horrores incipiunt facillè, inducit, & dum inducit naturalis humoris inopia mareorem quandam, aduentitium tumorem infert per excrementi eumulum & veri nutrimenti corruptionem, sic pituitosos cibos consulit, ad istarum partium, quia partim tument tumore aduentitio, siccantur paupertate humidi natui corrupti. Quod nos explicuimus in Histo. Petri Guerard. Et idem Hippo. copiosius explicat eodem lib. *Cum in medullam fluxio contigerit, tabes occulta oritur, cum autem retrò ad vertebra, & in carnes fluxerit, fit hydrops. Sicca sunt partes anteriores caput videlicet & nares, oculis herudo accedit, sunt cum virore pallidi, & reliquum corpus. &c.**

Lib. de locis in homine.

De huius in homine.

Quod notandum valdè. Nam & in hac muliere, & in plerisque in quibus istæ fluctiones fiunt, videris oculos cauos, genas contractas, alias pendulas, & nitorem viriditatemque occu-

lis deesse. Superioribus paginis docuimus quanta sit vis falsarum, acrium & nitrosarum fluctionum ad afferendam consumptionem corpori toti, quoquo se humor proripuerit ac subierit in vico Sandionysiano ab acri sero dolores excitati sūt in omoplati, ardoris & acrimonię sensus erat, & nil iuuabant remedia, immò ne opiū. Talis dolor viginti menses perseuerauit: Ioanni Beauchant, qui laqueo vitam finiuit calamitoso supplicio infinitatem (vt verbo Tulliano vtat) suorum scelerum expiaturus, in omoplati dolores erant incredibiles qui ex interualis repetebant. Aperto cadauere repertum est pingue & efferrum serum quod omnia ligamenta & nervos obliuerat imbibe-ratque.

Et at
domina
du Plif-
ser.

Generatur autem peculiariter tale serum in quibusdam, & cō facilius generatur quò magis tempus & aër est idoneus ad talē generationem, vt austrina constitutione per corruptionem acquisita falsedine & nitrositate. Et ad id facit si calor corporis est acer, corrumpens, squallidus: talis enim calor non actionem facit, sed corrumpit potius, vt pluribus explicuimus antè. Atque primū eius malignitatis prima labes ab hepate est: alimētum enim, id est, sanguis, aliquando acrior est & serosior, & tractu temporis dum maiorem malitiam acquirit, tum virulentus fit quodammodo. Id obseruauimus in ea muliere, & in vxore Domini du Bourglabe, quæ vtraque doloribus capitis est obnoxia & vxor Lodoici Michaëlis, & in iis quibus corpora sunt macilenta, & *deprimenda*, iuxta illud, *Qui ventre sunt calido carnes habent frigidas*. Cuius Aphorismi magna vis, magna intelligentia, vt nos in libris nostris de morbis mulierum conscriptis docuimus. Et inter omnes locos commemorabilis est, vbi docet Hippo. duo, prius cur partes superiores vitium potius capiāt à fluctione, vnde caput etiam ipsum à quo fluxio est, siccatur, extabescit, ac squalescit quòd paulò antè diximus ex Hippocrate: posterius cur biliosi, sicci, arescentes fluctionibus opportuni & eas facilè corpus excipiat quasi lucrum aliquod faciat, sed frustrā. Omitto textum quoniam longiore interpretatione opus haberet.

Lib. de
doc. in
hæm.

Ac præter vitium in sanguine, potest esse peculiaris dispositio in capite, quæ efficiat vt alimētum in capite ipso corrumpatur: Et cum non videamus vllum fluxionibus malignis opportunum (nisi fortè per totum corporis habitum diffusus sit calor

calor acer & corrumpens) qui non doloribus capitis frequenter exerceatur, fit vt propter impressionem à dolore & vim factam parti facultas partis debilitetur, calor infirmetur, & pro natiuo extraneus inducatur, immò & febris quædam capitalis inducatur, id est, calor extraneus, ficcus, malus, corruptor acimenti deprauator. Et sic perennis fit generatio humoris, fit & perenne effluuium, & tum cum extra caput ille humor non educitur, tum vertigines, Epilepsiæ, apoplexiæ quoque fiunt ipsæ. Vide quæ ex Arculano supra annotauimus, & illa est verè *morbus*, quam morborum stata ratâque periodo reducunt causam *morbi*, constituit Galenus.

*Lib. de
diff. feb.
2. sub
finem.*

Et quod notandum istæ mulieres tres de quibus antè dixi, & quæ erunt veluti regulæ aliarum, cum calorem habeant acré, mordacem, multum, & tali humore abundant, tamen se ne minimū frigus posse ferre dicunt, & sibi perpetuò in thachitide, & in occipite, quod parte anteriore est frigidius, sensum quendam frigoris & catarrhi fontem perennitatēque constitutam dicunt: ac si ab ea parte defluat humor tantas in partibus remotis molestias excitaturus. Causam huius rei euoluemus. Cū cerebrum peculiari morbo laborans, & veluti quadam febre sibi propria impeditam, non capiat cum fructum ex alimento quem capere debet, illud corrumpit, vnde pars aliqua iam sequestrata est quæ continuos dolores aut parum intermittentes, committat, pars alia à cerebro valente pellitur foras. Si nitrosum salsumque quid habet *seu* per putredinem, sensum caloris, & acrimoniæ infert, & sic putant sibi partes deūri, si qua pars mixta frigidior & crassior dum confunditur massæ sanguinis, dum neruosum genus ferit & imbuit, sensum quoque frigoris infert, sic paret & surgit ea inæqualitas, & vicissitudo caloris & frigoris quam innumeris locis in hoc volumine explicauimus. Immò si initio paroxysmorum minimus appulsus externi aëris frigidi, aut sparsio humoris etiam calidi & biliosi sensum horrois & rigoris infert, quantò magis id præstabit humor à capite labens, qui tametsi & salsedinem & nitrositatem habens, caliditatem intrinsecam habet, tamen quia omne excrementum retinet aliquid de ea parte cuius est excrementum, cum cerebrum sit natura frigidum, non mirum si in isto humore sit aliquid *inæquale*. Ac de rigoribus & horroribus locus est apud Hippo.

*Lib. 1.
de mor.
bis.*

Rigor, ait, in morbis fit ab externis, ventis, aqua, serenitate.

Tom. I.
A a a a

sub dio degentibus, sit & ab ingestis cibis & potu. Maximè verò fit cum bilis & pituita remissa fuerit sanguini, aut altera ex his, aut utraque. Magis si pituita sola fuerit, nam est frigidissima: calidissimus sanguis. Bilis verò aliquantò frigidior sanguine, Cum autem ambo humores, aut ex his alter, ad sanguinem mixti fuerint, congelant: id est sensum frigoris, aut rigoris, aut horroris inducunt. Vt mirum non sit si catarrhosi sæpè horreant aut rigeant, & in febribus, & extra febres, vt non necesse sit ad istas horripilationes febrem sequi, quod temporibus Hippocratis eveniebat⁷. Nam horrorem rigoremque proximè febris sequebatur. Præter autem aliàs rationes quas aliis in locis, si quid meminimus, explicuimus; hæc fortè probabilis est. Quod si rigoris & horroris primus impetus, & in internis partibus & ab internis sit, præsertim si materia præparata est, maxima ex parte febris suscitatur: sin autè potius de foris est, & ab externa causa, & manifesta occasione, non est ita necesse accenso calore & humoribus febrem consequi.

Lib. 1.
de mor.
bis.

Porro quæ causa sit cur humor refundatur ita breui expeditio. Superiùs vnà ex causis diffusionis pituitæ in capite, quam Hippoc. *διὰ τὸν* vocat, non *διὰ τὴν*, diximus esse & calorem & frigus, quoque modo id fieret explicatum est. Nam instar spongiarum madefactarum quæ manu premuntur, cerebrum oppletum ab ambiète aëre exprimitur aliàs atque aliàs in has aut illas partes. Alia causa diffusionis est vis facultis expultricis quam irritat humor, aut sua qualitate, aut quantitate peccans. Accedit quod omne serum, & humor nitrosus sua mala qualitate præditus facile sibi viam quærat atque parat.

de
morbis.

Porro tum ex Celso, tum Hippocrate eruenda est harum fluctionum medela. Primum quantum spectat ad vsum rerum humidarum (quoniam vulgò dicunt liquidiora non quadrare catarrhis) conuellenda est ista opinio. Quanquam ex Hippocrate quo plus humidi sumitur, plus quoque pituitæ videtur in cerebro (quod plegmatis fontem facit) accumulari, & sic occasio fluctionum suppeditari. Sic hoc expediemus: Deinde an locus sit validis & attrahentibus medicamentis, quod placere Galenò visum est in methodo medendi, vt antè explicuimus, quod est valdè notandum⁸. Tertiò quid sibi velit Hippo. & Celsus qui recurrunt ad ignem & cauteria in his affectibus. Pituitosis & præpinguibus frequens rerum liquidarum vsum non

quadrat, vt nec iis in quibus humiditas multa præsertim excrementitia: Ideo Hippo. in Apho. scribit famem conuenire iis qui humiditas carnes habent, quia fames exiccat ex euentu, ait Galenus in commeto. Et quod dicitur nutritionem per similia faciundam esse, hoc verum quidem est quod ad optimam temperaturam spectat quæ cæterarum sit regula: sed quoniam facile fit ex illa egressio, iuuat mediocris rerum contrariarum vsus. Sic intelligendum putat Galenus naturarum aliam ad hoc vel illud tempus melius habere. Sic quoque explicat Galenus de iis qui humido victu vt consueuere. At catarrhosi maximam partem humiditate multa abundant: Immo cum catarrhus nullius morbi peculiare nomen sit, sed morbidam excretionem significet quæ prout in has aut illas partes procumbit ita varias morbus qui inde sequitur appellationes sortitur, si excessus sit humiditatis quis dubitat quin siccandum sit? At contra aliter faciundum est. Si excessus sit multus humiditatis, si cerebrum sit humidius nemo dubitat quin siccare non sit bonum, contrario contrarium opponendo, At quoniam nitrosæ, acres, falsæ subtiles quoque sunt defluxiones & catarrhi, vel quia qui à partibus inferis surgunt vapores in cerebrum talem naturam habebant, vel quia ob peculiarem in cerebro constitutionem, & malam diathesin talem nanciscatur naturam, vel quia hepar calidius prouentum facit istius humiditatis per modum effumationis & sublimationis, in hoc casu ab humectantibus (etiam si corpus videatur humidiusculum) & ἀποτὶ ἐντρεφτικῶν, abstinere non oportet. Plura ea de re aliàs. De rumpendis crustis ferro candente Hippocratis locus est præclarus antè à nobis expressus, vt repetitioni non sit locus. Hoc autem fit vt fiant emissaria per quæ educatur serum nitrosum quod perreptando corpus totum, & sese sensim insinuando dolores intolerabiles facit, immò & maciem toti corpori conciliat.

Vnum porro obliti fuëramus, quod attexendum erat isti disputationi quam habuimus paulò antè de vsu rerum liquidarum & humidarum, an in fluxionibus istis & ῥευματισμοῖς, nitrosis tutò balnea præscribantur vniuersalia, hoc non caret difficultate. Balnea præscribuntur ad contemperandum non ad euacuandum: nam cum balnea euacuent autore Gal. si tantum in aqua egelidam æger mittitur, nec elicitur sudor, temperatur quo-

556 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Lib. 2.
de morb.
mult. dammodo humor nitrosus per cutim fusus, saltem sub cutim diffuens & dolores excitans partēque labefactans. Quod consilium est Hippocratis dum loquitur πρὸς τὴν γυναικείαν, ab humoribus falsis & acribus & nitrosis: si ea quæ effluunt bilis fuerint & falsago, & non solum internas partes, sed & externas exulcerent diætā transmutabis & humectabis vt fluctiones quam aquosissimæ fiant, & minimè mordaces balneis multis calidis vtēris, & cæt. Et quodam in loco Aëtius in fluctionibus & congestionibus humorum acrium & mordacium vtitur τοῖς ἐμπνευστικοῖς, id est iis quæ affusa, aut circumfusa, aut applicita vim habent mitigandi & moderandi humoris, & eius impetum sistendi: Sic huic nostræ ægræ valēre ac conducere credidimus vsum balneorum ¹⁰.

Atque omnia hæc ad vnguem tenenda sunt, ne temerè, quòd aliàs magno ægorū incommodo factitatum vidimus, quoties quis de defluxionibus conqueritur, ad hidrotica recurramus præsertim valentia, vt est lignum indicum. Nam eius vsu sæpè eam adaugemus intemperiem, quæ tam prauarum fluctionum author existit. Et vt concedam elicitis sudoribus adiumenti aliquid afferri, plus tamen incommodi affertur augendo intemperie omnium malorū causam. Si simplex esset & absoluta humiditas, quæque solum sua quantitate molesta foret, discussione eiusmodi humoris sanitas compararetur huic mulieri Hypochondriacæ syrupus ordinatus sequens in hanc formam.

℞. Cort. pomor. redol. 15. rad. lapath. acut. cichor. acetos. an. ℥ ij. intyb. utriusque ad m. j. bugloss. m. ij. beton. meliss. an. m. j. s. polypod. cum draget. communi cont. ℥ i. s. mercur. p. ij. rad. alth. sectæ enul. campan. an. m. j. passul. iuiub. sebesth. an. num. 20. prun. quart. flor. cordial. an. p. ij. sem. papau. albi. ℥ iij. sem. frigid. ℥ i. s. pæon. angel. fesel. an. ℥ i. s. fiat decoct. ad lib. ij. adde folior. sen. vino albo laut. ℥ iij. fiat ebullitio longa ad lib. in colatur. dissol. express. ℥ i. s. agar. trochisc. in aquameliss. cum ℥ ij. cinnam. & serici crudi in nodulo posiz. ℥ iij. & cum sacch. quart. iij. oxymelit. simpl. ℥ iij. succi pomor. quart. i. fiat syrupus vtendus ex decreto medici.

ANNOTATIONES.

1. Nos tandem deteximus illud totum de quo illa queritur esse hypochondriacum, & non tam caput per se affectum esse quam propter flatulentiam & malignam naturam flatus melancholici & atrabilarij. Olim excretioni sanguinis per nares erat obnoxia, quod forte fecit reddidit que humores synceriores, & veluti suo priuatos sero naturali. Et quod modo de vna parte conquerratur, modo de alia: idque in superficie corporis quid impediet quominus dicamus affectum esse ipsius habitus corporis eo modo quo illam auram qua à pede efferebatur ad conuulsionem non esse ab interno corpore, sed ab externo, ita placet Auicennae, est enim ubi quidam morbi in habitu sunt alij non, & si extuberaret aliquid in cute omnino istis punctiōibus liberaretur.
2. Hippo. in Tabescentibus & phreniticis oculos *emixtus*, puluerulentos possis dicere, obseruauit, part. 17. lib. 1. Proverb.
3. Tandem cum interuisset reperta est collectio putris & olidae materiei in thorace, cuius serum eos dolores faciebat in partibus vicinis, & id pulmonicis est familiare.
4. Caterum videmus plerisque saliuam dulcem & veluti insal-
sam esse, aliis salsam nitrosam, aut alius vehementioris qualitatis, ita quoque de fluctiōibus dici potest. Talis autem generatio peculiarem naturam corporis cuiusque sequitur. Vnde Hippocrates lib. 2. Epid. sub finem sectionis prima vocat corpus *nitrosum*, quod humore nitroso & salso abundat, & à cuius capite maximè fluit talis humor praesertim cum à pulmone caput calefactum fuerit. Quod notandum.
5. Accedit quod mulieres quae calidiore & arente calore sunt praeditae, & corrumpunt alimentum, & prauis vtuntur cibis, vt inde angeatur cacochymia.
6. Immo idem rheuma in coryzis urit & refrigerat, cum in cerebro est calor extraneus, & calor naturalis paucus est dum vi caloris non naturalis excitatur in solum ambitum cerebri, & praesertim in occipitis & syncipitis partem aliquam humor tenuis qui sudoris instar exudat, dum ille humor refrigescit ob membranas sensus adest frigoris: sic calent aliquando, & se gelu sentire dicunt in capite: Causa verò potissima propter quam dum ab interno corpore cerebri exprimitur humor in membranas, aut in pericranium sensum frigoris in ipsis membranis inducit, tametsi & à loco calido efferatur, & forte ipse sit nitrosus &

Aaaa iij

salsus causa inquam, est quoniam iste humor de natura cerebri retinet, at cerebrum frigidum est, quia spermaticum: Deinde quatenus ille humor de natura aquea retinet, tamen sui interiore principio calidus sit, quia nitrosus, quia salsus, tamen quia retinet de natura aque, facile frigiditatem inducit & accipit: sic sanguis ab Hippoc. frigidus dicitur, & humor melancholicus dicitur siccus, cum tamen humidus consistentia sit. Maximè verò puto sensum frigoris inducere ex euentu eo modo quo videmus humorem calidum, à calido loco per sudores profectum inducere sensum frigoris, quia in habitu refrigeratur, & non regitur à calore suo, sed is calor euauit sic, credo, in membranas, roris modo, inutilis humor exprimitur, qui restitans ibi & ob densitatem ossis non transpirans refrigeratur. Et sic à nitroso humore sensus frigoris inducitur.

7. An rigorem febris sequatur. Vide Gal. cap. 5. lib. 2. de diff. feb. libro de inæquali intemperie: com. 3. in lib. 1. Epidemion. Et in nostro lib. de Epiala febre.

8. Præclara est decisio de ea re apud Arculanum cap. de phthisi ubi docet quomodo in phthisi sit euacuandum, & quomodo non euacuandum.

9. Et Hippo. lib. de vetere medicina, abundè docet in salsis & acutis fluxionibus mitigandum esse, non autem euacuandum.

10. Inter cæteros locos, ad hanc maximè mulierem pertinet locus lib. 2. Prorrh. in quem Gal. non scripsit ubi graphicè morbus illius describi videtur.

12. Atque hæc mulier si tussiret, corpus internum subiret catarrhus, nunc verò cum non tussiat, sed externam capacitatem fluctio appetat, non mirum si tot dolores persentiscat. Et duo sunt commemorabiles loci huc pertinentes, prior est ex lib. 2. Epid. sect. 2. ubi docet cuidam virgini manum, & crus syderata esse cum nil commemorabile tussiret, quæse verò suppressio materie quæ tussim excitare deberet, eam syderationem attulerit. Ita Herclès: Nam & Hippo. in Coacis, ait, Quibus salsuginosa, sputa & tussis supprimuntur: His corpus velut à pustulis rubescit. Vide Com. in part. 4. lib. 6. Epid. sectione 4.

13. Ad hanc historiam valet locus præclarus ex sectio 3. lib. 2. Epid. ubi agit de asperitatibus cutis, &c. Et inter cætera Langij Epist. 15. lib. 2. De puncticula. Et lib. nostrum Ephemeridon. Et de exanthematis quæ vè culicum morsus erant: Et Hippo. rationem generationis horum proponit. Quod ad institutum valdè pertinet, lib. 5. Epid. Et Aetius cap. 129. Tetrab. 2. sermonis 1. Febres in quibus puncticule apparent sunt aduerentes, & facile ad manum calor remittit fortè de iis audiendus

locus lib. 6. Epid. sectio. 8. de febribus quas *παραγὰς* vocat. Et lib. 7.
Epid. locus præclarus de eruptione exanthematon *παραγὰς*.

CONSILIVM CXV.

De febre semitertiana.

VXOR proscibæ nomine Guillemine, cum & catarrhosa foret, & colicis doloribus obnoxia, tamen feruidiore hepate in febrem incidit continuam mense Iunio. Vagabantur tunc febres ardentes satis mali moris. Statim initio horrenda fuerunt omnia, dolor ingens capitis, & veluti cuiusdam *παραγὰς*, & perturbationis mentis argumentum, vomitiones frequētes, ardor summus, erat reuera aliquid hemitritæon. Nam humores ita erant *παραγὰς*, & bilis pituitæque adeoque crudi succi, tum qui à capite descendens per quandam colliquationem, aut diffusionem potius in venas, & habitum corporis irruebat horridis sensum inferens, tum peculiariter in eius corpore & redundabat, & ob diuturnitatem constitutionis humidæ & austrinæ, in qua congeritur humor, nec diffilatur; præsertim in mulieribus quarum corpora sunt *καλὰ καὶ ὑπόβια*, succrescebat, copia (inquam) tanta fuit, vt mirum non sit, si inæqualitas summa fuerit, curandi difficultas, & periculum mortis, quam nos certò expectabamus. Varietas enim ista humorum partim confusorum, partim diuerso loco positorum, & putrescentinum, nullum non dat negotium naturæ, febris ad 14. diem perseverauit. Primis diebus multa iudicatoria non iudicantia apparuerunt. Et cum vrinæ initio valdè confusæ existerent, flammæ, tenuiores factæ sunt. Sed id non placebat. Reduplicatio- nes erant nocturnæ, & perfrigeratio quædam levis præcedebat, ac si nouus esset paroxysmus. Sed id motu fiebat nō periodico, sed à venis in venas, & à loco in locum, non in habitum corporis, quomodo fit in febribus intermittētibz periodicis, vt nos in historia de Sangermano explicuimus. Sed tria valdè ter- rifica fuerunt: Primum quod erat comatosa, sed *καὶ*, erat potius *ἀγρυπνία*, & somnus tædebat, nam cum primū in somnum se componeret, statim delirabat. Secundum perfrigeratio ti-

biarum & pedum sæpè erat, vt recalfieri ferè non posset. Vnde in lipyriæ febris suspicionem veniebamus: Tertium pulsus imminutus valdè erat, & nescio quid διαφορικόν. Quartum, metus erat, inflammationis pulmonis, vt pleuritidis latentis. Perpetuò enim ferè de latere dextro ad manus regionem quæstæ est, vt propterea consultum fuerit ei tanquam pleuritica, neglecto reliquo morbo¹. Et de dolore isto lateris valdè laborabamus, an verè esset pleuritis, an congestio ibi esset (erant enim magna congestionis argumèta, vnde excreuit è pulmone multa satis horrenda) an fluxio à capite, an translatio à ventre inferiore: Vnde fit vt (quod Hippo. libris de morbis annotauit) facile febris ardens peripneumoniam & lethargicam quandam dispositionem, non à capite ipso primò affecto, sed pulmone & affecto, & obstructo, vt liber non sit exitus spirituum, & ob copiam vaporum à pulmone incandescente elatorum, & malignè ferientium: Quod notandum. Ac valdè decipiuntur medici. Hac de re Hippo. Caput præclarum scripsit de Lethargo, vbi lethargum ait oriri per quandam peripneumoniam affinitatem, & in isto lethargo potius pulmoni quam capiti consulit. Hoc morbo laborauit Domina le Boindre. Et aliquid simile fuit in vidua Domini Garnier, vt nos in lib. 2. Epid. nostrorum scripsimus. Ac primum consimilem huic historiæ quandam historiam scripsit Hipp. lib. 2. Epid. *In perinthum circa solstitium venimus, &c. Æstate febres ardentes populariter grassate sunt multa.* Et cætera consequuntur quæ longum esset recensere.

Quod ad primum pertinet, quomodo nimirum obfuerit somnus tum ob malignitatem materiei reuocata à superficie ad centrum, tum ob dominatum caloris, dictum iam antè est abundè, quod ad infinitos propè ægros pertinere potest. Nam cum calor contra naturam superat naturalem, ferè turbati sunt somni. Ac reuera terrifica omnia fuerunt, vt antè dictum est, tum ob corruptorum humorum *κακοθειας*, quæ communem corruptionem superat, tum ob caloris febrilis dominatum. Vnde in Epid. notatum est terrifica sæpè accidentia initio morborum euenire, ob summam humorum intus latentium corruptionem vt Gal. annotat. Et inter cætera commemorabilis locus in lib. 2. Prorrh. in quem Gal. non commentus est: *In principiis febriliæ siue delirium accesserit, siue alicuius membri syderatio, periturum hominem scito, si non ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis*

Hippo.
lib. 1.
de morb.
& lib.
3 cap. de
febre ardente,
& lib. 2.
Epid.
morbor.
Quid sit
lethargus
apud
Hippo.
Lib. 3. de
morbis.

ris vires adsunt. At hæc mulier tantoperè initio animo concussa est, & perturbata, vt ea omnino deliratura putaretur.

Valdè perturbabat quòd non poterat *αἰσθεσμεῖν*, & quod frigus erat pedum summū nō periodicū, sed velut iudicatoriū, non iudicans tamen. Multis locis docuimus malum esse in febribus modò calferi modò incalescere, peius verò esse celerrim in vtrumque mutationem: Quod cur fiat non dicendum, cum & ex antecedentibus, & ex lib. nostro Epid. satis patere possit cum distinxerimus frigus positum & priuatiuum. Reuera putabamus frigus esse priuatiuum, sed potius ad positium accedebat, cum & catarrhosa esset, & colicis doloribus à crudo succo obnoxia, quò fit vt ob humorum varietatem hoc facili euenerit. Accedit quod cum frigus istud apparet, natura aliquando idem vult conari quod & in rigoribus, sed cum materia parata non sit illud totum quod apparet iudicatorium est non iudicans. Et reuera nisi in florenti ætate fuisset, interiisset. Numquam enim tot iudicatoria vidimus. At hæc mala sunt. Siquidem verum quod aut mortem intentent, aut malum denuntient. Sed ex lib. 2. Epid. & alio loco patet duo genera esse *κρίσιμων*, quædam enim simpliciter iudicatoria dicuntur, quæ quoniam absolutè non iudicant, aut ob indispositionē materiæ, aut quia omnino natura valida non est, ideo *δυσμετὰ* dicuntur, & iudicarent si nil impediret. Alia iudicatoria præterquā quod vim iudicandi non habent, aut omnimodam materiæ prauitatem significant, aut *παλινδερμῶ* ad partes nobiles, aut naturam labentem, vt vires protritæ omnino fathiscant, vt ad *τὰ κρίσιμα*, nullus ampliùs sit gradus. Et hæc omnino praua sunt. Et verè in morbis malignis apparent in quibus morbi status solet deterior multò apparere diè critico, quo tempore aut perfectæ coctionis, aut saltem incipientis nota aliqua deberet apparere. Quo in sensu accipere oportet illud Gal. quod in morbis malignis proprium sit, vt diebus criticis deteriores fiant. De quo amplius dictum est antè, & tamen sine hac disputatione ea quæ ante dicta sunt nullo modo intelligi possunt. Sed si quando occurrat disputare *περὶ τὰ κρίσιμα*, amplissimus est locus in com. in Prorrheticon. In quo plenis velis ea explicat quæ pertinent ad *τὰ κρίσιμα*, quorum duo genera explicantur, vnum eorum quæ *δυσμετὰ* vocantur, & ea *τὰς ἀκρίσιους* faciunt, alia ad deterius vergunt, & omnino mala sunt, vt cuiusmodi sunt ea quæ in pestilentibus

L. 6. 2.
Epid. i
sect. 1.
Iudicatoria
duplicitè

Part. 355
lib. 3.
Prorrh.

morbis spectantur, vt sudor diaphoreticus, nigrarum deiectionum excretio, & sexcenta alia.

Atque Galenus in comm. in illam particulam maximè inter-
iudicatoria mala numerat partium, aut totius corporis perfrige-
rationem quæ calefieri non potest. Quòd maximè agræ no-
stræ contigit.

Com. in
part. 5.
lib. 2.

Prorrh.
 & in
 partic.
 17. lib. 3.
 Prorrh.

Part. 43.
lib. 4.
acuso.

Part. 43.
lib. 4.
acusto.

Part. 13.
 Lib. 4.
 1017.

Nam causus exactus à flaua bile est, non exactus à pituita quadam falsa aut acida, vnde eorum qui tali causo tenentur lingua falsa seu falsuginosa existit, non autem amarulenta, vt in exquisito causo. Non adeò vrens calor percipitur, vt in verò causo, lingua nigra non est, sunt tamen multa communia symptomata, vt iactationes, vigilię, &c. Et inter cetera notandum est vnum de alui constitutione in vtroque causo, nam dum loquitur de vero causo ait, *deiectiones sunt liquide & pallide*: Est enim consentaneum, vt quoniam humor est tenuis, quoniam facile mouetur, & febris ob perennem generationem ichoris reaccenditur facile, vt aluus soluaturn pallida excretionē, quę est morbo analogā: At in non vero causo dixit simpliciter, aluus soluta, non addit, talibus vel talibus excrementis, quoniam humor pituitosus qui febrem facit nō tam facilem habet exitum, ac humor biliosus & pallidus. Et ideo Galenus in eo comm. ita ait: *Pituitosus humor nec facile excernitur, nec febrem auget, nec sitim ardentem habet, nec in spiritum vertitur. Ideoque de febre à tali humore nata ait Hipp. Aluus soluta, ita quadantenus ea excernatur quę excernere ipsi non aduersatur. Soluitur enim venter non tamen secundum humoris cuiuspiam formam & speciem, sed iis quę in alimentum sunt ministrata, corruptis.* Id est, in verò causo ob tenuitatem materie facile laxatur aluus, eaque redduntur quę morbo sunt analogę ob sequacitatem materie: at in alio non exquisito causo cum materia sit crassior viscosior, si fortè aluus soluitur, non tam ea materia excernitur morbifica, quam cruditas quędam ob ea quę assumpta sunt. Quod nos in Domini Bironij, nepote Domini du Pleſſis obseruauimus: Nam cum laboraret febre continua ad causon non legitimum accedente, & esset habitu pituitoso aliquantum, non excernebantur biliosa, ichorosa, qualia excerni potuissent in verò causo, sed quędam glutinosa, ac si chyli magna pars in gluten & corruptam similem materiam versa fuisset. Et si quando aliàs, in hoc ægro verum comperi quod Hippocrates, & Galenus illo loco conscripserunt.

Nunc vt ad rem reditus fiat, cum duplex iste sit *causus*, vnus verus à bilioso humore, alter nō verus ab humore pituitescente magis: Hippocrates dum secundi *causos* mentionem fecit, meminit refrigerationis extremorum. An verò partium refrigeratio extimarum non æquē ad verum causon ac ad non legitimū

referetur? Galenus meo quidem iudicio non satis distinctè rem explicauit. Ait enim non in causo omninò verum esse vt eueniat partium extimarum refrigeratio, sed si malignus sit. At quis dubitat nò potius in vero causo euenire istam refrigerationem quam in non vero? Nam in vero causo phlogosis est summa in partibus internis cuius occasione reuocatur facilè calor foris intrò, vnde sensus frigoris summus in extimis adest. Et tamen etiam in vero cauto non adest ista refrigeratio extimorum, nisi etiam per se malignus sit. Omnino autem in febre omni partiū extimarum refrigeratio euenit (ait Gal.) aut propter phlegmonem internam, aut summam naturæ imbecillitatem, addo, caloris naturalis paupertatem ex com. in part. 8. lib. 2. Prorrh. Et fieri potest vt secundus causus nascatur ob phlegmonē à crassis & viscosis humoribus natam (nam secundi causi originem & causam à crassis & pituitosis repetiuimus,) & tunc quis dubitat quin ob talem phlegmonem reuocetur intrò calor, & sic partiū extimarum refrigeratio contingat. Et tunc malignus est vt voluit antè Galenus. Sed non video cur potius attribuerit istam extimarum partiū refrigerationem posteriori & illegitimo causo quam priori & legitimo? Ego verò aliam probabiliorem rationem afferam. Cum Hippocrates ex symptomatis propriis secundi causi numerat extimorum refrigerationem, non tam intelligit de ea refrigeratione quæ aut paupertatem caloris sequitur, aut phlegmonem internam, aut summam naturæ imbecillitatem, quæ quæ ob crudos, frigidos, pituitosos, & viscidos succos fit. Prior refrigeratio in veros cautos incidit, & priuatiuum frigus est. Posterior pituitosiores morbos potius comitatur, & positium frigus est. Quomodo catarrhosos, & pituitosos, & crudis abundantes succis videmus refrigerescere in partibus extimis. Sic cum secundus causus agnoscat crudum succum causam sui non mirum si partium quædam refrigeratio contingat non perniciofa. Nisi fortè (vt excusamus Galenū) dicamus istam refrigerationem in secundo causo euenire ob speciem quandam phlogoseos quam fouet crudus humor conculcatus & congestus in parte aliqua, vt in mesenterio & pancreate, ac si interna quædam phlegmone foret.

Quod verò notandum est, & quod pertinet ad historiam de Domina à Chalmontio, vrentis caloris & flammei perceptio nò solum est in biliosis corporibus, & biliosis febribus, sed sæpè

Com. in
part. 16
lib. 4.
acuto.
Et in
part. 47.
eiusdem
libri.

in pituitosis præsertim si pituita sit salsa. Ne quis decipiatu-
 ratus igneum calorem à bile tantum esse, audiatur ea dere Ga-
 lenus: *In pituitosis febrilis fumosa est caliditatis substantia, cum sci-* *Com. in*
licet, vel in ventre, vel hepate, vel pulmone salsus humor putruerit, ob *part. 16.*
quam fumosam substantiam caliditas ignea redditur. *lib. 4.*
 Quod decla- *Acuto.*
 rant peripneumoniæ à pituita salsa, in quibus calor extingui-
 bilis non est, & inexhausta sitis. Nam multò facilius temperatur
 ardor & sitis excitata ob materiam biliosam, quam ob phlegma
 putre & salsum. Et ex duobus quæ ad explicandum, proposita
 fuerunt vnum iam à nobis expositum est. Restat alterum de il-
 lis grauib, vertiginibus quibus plerique vexantur in magnas
 febres causuri. Deinde vnum addemus de alui facilitate, vt
 leienteria metueretur; tamen contulit valde qualiscumque fue-
 rit ista solutio alui, Aphorismus est Hippocratis: *Quibus in fe-* *Par. 42.*
bribus vertigines ab initio & capitis pulsus sunt, & urina tenuis, his *lib. 4.*
ad indicationes vsque febris accessionem expectare oportet, quod si quo- *acutiori.*
que delirent nihil mirum. Quæ omnia huic agræ conueniunt. Et
 quoniam multa præclare dicuntur à Galeno in eo Comment.
 de causa vertiginum, de vi caloris contra naturam in effunden-
 dis & dissipandis, & prouocandis humoribus, quorum intelli-
 gentia ad ea quæ hoc loco dicuntur valde pertinet, Lectorem
 ad eiusmodi Commentarium relegabimus.

Aluus in ea facilis & liquida fuit, quod nos paulò antè do-
 cuimus euenire in causo non legitimo, & quomodo fieret, ape-
 ruimus: Item & in tractatu de Sangermani morbo, nunc adde-
 mus locum præclarum à Galeno conscriptum, dum reddit ra-
 tionem cur in febribus *αἰνῶδες*, quarum focus est in pulmone
 aluus astricta est, maximè verò cum hepar est inflammatum. *Par. 17.*
 Hoc enim inflammatum aliàs excrementa sunt *αἰνῶδες*, aliàs li- *lib. 4.*
 quida, atque ita ait: *Quibus in iecore causi radix subest, & qui ob iecur* *acuto.*
causo laborant, iis quæ excernuntur aliàs sunt liquida, interdum sicca
sunt, combustis scilicet à visceris phlegmone, & in nucleum formatis
excrementis. Cum igitur viscus hoc phlegmone solum tentatur, indu-
 rabuntur excrementa: Verum si cum phlegmone fuerit & imbecillitas,
 liquida deiciuntur, viscere scilicet alimentum ad se attrahere nequeun-
 te. Sed deiectiones eiusmodi ab iis quæ ventre affecto sunt chylositate di-
 stinguntur: *Grὰ τὸ χυλῶδες*, melius chylosificatione, aut chyloscos actio-
 ne interpretaberis. Nam si chylus non attrahitur chylosa ferè sunt excre-
 menta.

ANNOTATIO.

1. Quaecunque mulieres, idem & de viris, dum sanae sunt dolent de latere aliquo, cum febricitant, aequè dolens ac si pleuriticae essent vere. Et reuera curatis, ut cum pleuriticis agendum.

CONSILIVM CXVI.

Ad febrem & dentium dolorem.

Consulis Scaronis pufio sedecimestris, iam per menses, sex aut quinque contabescit ac emaciatur. Magnum argumentum est cutis laxitas. Nam omnis extenuatio primum laxat, deinde distendit, contra refectio distendit, deinde laxitate quadam laudabili, non qualis ab euacuatione insequi solet. Deprehendimus illum febrientem, dentientem erumpentibus dentibus molaribus: Quae omnia febres, vigilias, alui profluvia consecutione quadam afferunt. Notandum enim quod demonstrat Aërius turbari ventrem dentientibus pueris propter exolutionem, & inflammationem ventriculo communicatam. Nam inflammatis gingivis peculiaris in ore febris esse videtur: facile autem ventriculus in illius partis ob continuitatem membranarum trahi solet. Sic putant pleuritidi succedere fluorem alui, inflammationis communicatione cum hepate & partibus nutritioni consecratis. Sed quoniam extenuationis macieique rudimenta aliqua, non ita pridem paruerunt, illius causa altius repetenda, vel à pueri habitu, & *ἐπιτομῇ τοῦ σώματος*, vel à nutrimento. Puer natus est, & satus parentibus biliosis, hepate ficiore & calidiore praeclatis: Nutrix emaciata est, sicca, æstuante corpore & squallido, & ob perpetuas pueri vigilias somno blando non indulget: ut non mirum sit si in symptomaton malorumque communione & pueri & nutricis neuter proficiat. Lac nec colore, nec odore, nec sapore laudabile est. Album esse debet & æquale, gustu dulce & velut mellitum, olfatu gratum, ut pluribus definit Aetius. Itaque providendum nutrici, puero, tum ratione febris, tum ratione dentitionis, tum incuratæ iam emaciationis.

Par. 29.
sectio. 3.
lib. 6.
Epid.

Cap. 9.
T. trab.
1. ser. 4.

Cap. 9.
T. trab.
1. ser. 4.

Adiungenda nutrix alteri ne si altera ablegetur continuo ob insolentiam alterius nutricis puer agrius ferat, & noui casus occasio adfit. Sic interponent operas, & altera alteri vicariam supponet manum. Nutrix præsertim dentitionis tempore vino abstineat Aetij consilio: hordeata aqua vtatur, & iusculis multis alterantibus. Puer nutriatur pane in iusculis infriato: Decocto pullorum: & ad facilitatem exertionis dentium ginginæ melle anacardino aut communi narbonensi illinantur, aut lacte canino, & conferet cerebrum leporinum consilio Aetij: Item circumlinetur oleum dulce partibus vicinis: Item radix colocynthidis in cānula aurea aut argentea inclusa & gestata confert. Aut iaspis viridis. Nil mandat duriusculum: & omnino non est prohibendus alui fluor, alioqui metus est translationis ad partes superiores. Consultus est litus ex oleo rosato in toto corpore, ad caloris contemperationem. Sed cum perseverasset alui fluor, & oborta esset febris continua cū vigiliis iactationibus, vt inde *ἀσθένεια* foret, nec non interiora arderent, partibus externis parum refrigerantibus: Denique vomituriendi finis non esset, & magna esset suspicio febris typhica, & brevis mortis, hæc quæ sequuntur imperantur.

Primum, Epithemata ad regionem cordis & hepatis additis trochiscis de caphura.

Litus ex rosacero tum in ventre, tum in rachitide.

Item eodem confert litus ad totum ventrē ex muccaginibus feminis altheæ psyll. cydoniorū addito succo lactuæ, & oleo rosato cum mastichino. Et cum præter puerorum morem digitum in os immitteret ad ciendum vomitum, hoc suspicionem attulit aut vermis in os ventriculi reptantis (idem enim paulo ante in puellula euenerat, & excretus vermis est) aut oris ventriculi *κακίστος*, quod *ἐπιπασσὶς καὶ ἀλυσίς*, causa est inter cæteras autore Galeno, in primum prognosticon: Ideo visum est medicis vtile fore si grana aliquot theriacæ aqua cardui dissoluerentur, & potui darentur, ad vermem, si quis sit, sopiendum, & *κακὴν ἵδραν*, si qua sit, domandam. Non longè post data infusio ex rheo, & granis vnicornis. Et quoniam ingens erat sitis, & febris, vnaque nutrix vix esset, maximè quoniam calor igneus ex ore pueri manans lac extinguit, aut minuit, nutrix iubetur vino abstinere, iusculis nullis vtī, maximè verò decocto auenæ vbera perfundere: immò & eo decocto in potu vtī, bracteolas seu fo-

568 CONSILIORVM MEDICINALIVM
lia auri mammarum papillis applicare, ad lactis conseruandam
temperiem. Pueri somnus conciliatur litu temporum ex
oxyrho. applicitis foliis lactica: In iusculo pulli incoquantur
tres dragmæ sem. papauer. alb. cum lactuca in taleolas fe-
cta. Miraculo hoc profuit somnum conciliando, & ardorem
mortis, aut marcoris autorem futurum. Non parcitur potui.
Immò ætatula vsum lymonum frustatim incisorum non dissua-
det. Lactæ asinæ dentium acetabula linuntur. conualuit.

CONSILIVM CXVII.

*Seu Enchiridion sanitatis D. Henrico Heruillæo,
in militiam profatino præscriptum.*

Si necessitas vrget infundetur clyisma ex hydrom. aut iuscu-
lo domest. aut aqua salsa dissoluendo catholicon.

Pilulis ex rheo ad 3 j. vtetur si fortè grauior sibi videatur, aut
antè cœnam tres pilul. sine quibus deglutiet.

Si nec febris adest, nec dolor capitis in vino alb. rheum ad
3 ii. s. infundet, sin minus, in ptissana dissoluendo 3 j. syrup.
ros. pallid. aut cath 3 6. diaphœn. 3 j.

Non nisi urgente necessitate deimendus sanguis, nam cum sit
αἱμορραγικός, non faciliè feret phlebotomiã, nisi aut affuerit febris
ἀξιολογος, aut difficultas spirandi, bechicis vtetur si fortè tussis
vrgeat.

Vtetur bolo aut cassiæ, aut catholiconis dupl. Ad viran-
dum aërem corruptum pomum odoriferum gestabit, aut nodu-
lum ex caryophyllis & cinnam.

Vtetur mithridatio ex vino alb. aut conserua rosarum.

Si vulneratus fuerit puluere rhei cum mumia vtetur, addito
mithridatio.

Si fortè oppressus fuerit, aut pessundatus inuoluetur panno
in vino madefacto. Item mithridatio ad proliciendū sudorem.

Si dolor colicus vrgeat, fots ex chamæmelo, & seminibus
lini, & fœnig. vtetur: Valet quoque equinum sterces?

CON

CONSILIVM CXVIII.

De febre continua.

Vicarius Sanctorum Geruas. & Prot. ad Natalitium Domini, cum caput doliisset (sed id ad vsum noui vini referebat) in febrem incidit. Ea erat lenta, & in viscerum latente phlogosi posita. Siquidem fauces erant velut inflammatæ & erysipelatoſa phlogositentatæ. Quod aut exhalationis vi fiebat, aut flammea quadam anathymiaſi. Immò non tam de febre querebatur, quam de amarore quodam oris, & dentium luriditate scabritiæque & squalore, nec non de faucium ardore isto. Alij ad destillationem ferinam referebant, alij ad pulmonum quoddam latens incendium, alij ad viscerum calorem & dyscrasiam, alij quoque ad cordis calorem impensè auctum, & hepatis quandam siccitatem. D. Magnus carbunculosa quandam dispositionem dicebat subesse, vt habitu corporis existente ^{sub dactylis} & ichore sanieque diffusione prohibitis, & calore effumationem diffusionemque non habente, tum ob corporis constitutionem, nam densus est habitu, & quodammodo citrinus, tum tempus ipsum quod austrium fuerat, & post proximè hyems successit quæ omnia suppresserat, sic corpore minimè existente diffabili suppressum est excrementum quod circum periostia dolores excitat, & dū tumultuariè sanguini admisceri vult rigoris cuiusdam sensum exhibet, & veluti formicarij morsus & deambulationis. Ita enim veteres symptoma hoc velut formicarum deambulationi comparauerunt. Et tale symptoma reuera paralyseos aliquando est velut prænuntius & præambulo: aliquando catarrhi est comes, aliquando est cacochymia sanguinis consequens. Vnde videmus cacochymos si in sole apricètur horrere, & sensum punitionis fornicationisque circum partes sentientes habere: fit enim vt morborum principiis sanguis purus existat, vt non calfactus & alteratus à calore febrili qui omnia corrumpit & immutat, item nō mutatus mixture rei alienæ, vt pote feri à cacochymia contenta in mesenterio per transumptionem in vasa communicati. Quod in li-

Tom. I.

Cccc

370 CONSILIORVM MEDICINALIVM

bris de morbis Hippo. appellat accommodato verbo *τὸ αἷμα διῶ.*
περὶ id est serosam naturam acquirere, relicta temperie, & quali-
tate, & propria sanguinis natura, aut ea valde immutata. Reue-
ra in hoc viro, si quo in alio peculiaris excrementi est sup-
pressio ad hanc fecit peculiaris natura, habitus corporis,
tempus, & prætermissa occasio sanitati suæ studendi. Nam cum
diligentius suum munus ecclesiasticum prosequitur, ei non va-
cat esse agroto, & non expectat illud tempus in quo natura
post coctionem tandem secretionem facta victrix ac domitrix
morborum existit. Nullus enim vnquam morbus diuturnus
vnquam superatus est, nisi cum ingenti & longo renum *ἡσυχία*,
profluuiio, aut sudoribus diu emanantibus præsertim à somno
coctis humoribus & domita cacochymia. Quod in plerisque
à nobis obseruatum est, qui diu laborantes vltro citroque pur-
gati, non cessarunt de aduersa valetudine queri, donec per 20.
aut 30. dies copiosus sudor toto corpore emanarit. Sic in hoc
ægro nostro puto exactam quidem portionem materiæ, sed
τὸ ἐμπύρευμα, & anima morbi intus relicta est. Sed & dolor ingens
capitis cum constrictionis sensu, & punctione, & lancinatione
declarat cum dolorem qui olim per sympathiam erat, factum
esse per protopathiam. Vt ea effusio magna facta ob diffu-
sionis cutis prohibitionē caput obsederit, & in venis, arteriisque
cerebri, & iam in quibusdam inanitatibus (alioqui malum non
tam foret rebelle & obstinatum) sedem firmauerit, melanco-
lici humoris iam deterioris, quam antea esset, facti, naturam
adipiscens. *Lib. de arte.* Quomodo audiendum illud Hipp. Cavitates cor-
poris nostri dum sani sumus spiritu plene sunt, dum ægrotamus,
ichore & sanie. Sic qui diu ægrotant, alterato ferè omnino
sanguine & reliquis quæ fluunt & refluunt, modò in hac parte,
6. Epid. modò in illa dolorem sentiunt. Immodò & veluti impetu quodā
facto impetiginosi, aut leprosi, aut scabiosi fiunt, relicto in cu-
te vitio, & perpurgato corporis centro, vt Simoni contigit.
Sic quibus hoc beneficium naturæ negatum est, nisi alia via &
ratione sese natura expediuerit, dum semem morbi & fermen-
tum ipsum fouet, non est mirū si aut in nouos morbos incidant,
aut si priores alant. In hoc ægro & totius corporis, & capitis ra-
tio habenda. Et antequam hyems accedat, præsertim dum au-
tumnales morbi sunt in procinctu, bonum est cum arte iuuare.
Itaque ea methodo progrediendum erit in oppugnatione mali

obstinato animo ægrum impetentis.

Primum parantur clysteres ex decocto melissæ, bugl. borag. & herbarum splenicarum.

Purgabitur decocto radicum aperi. & rerum splenicarum additis hepaticis humidis, vt hepatica, intybo vtroque, scariol. chondrilla, portulac. cichorio omni viol. pomis redolentibus, cardiacis frigidis vt rosa, viol. nymph. ebore, santalis, oxalide, serico crudo; itē splenicis refrigerantibus: Cortice rad. tamari. asplenio, adianto, seride, seminibus frig. foliis vitis, in decocto. agar. folia senæ & turbith. (pauca id quantitate) addentur.

Post duas doses supradictas vtetur apoz. ex his herbis additis succis & serico crudo.

Aperietur vena basilica sinistra.

Dabitur tertia dosis apozematis solutiui.

Balneo vtetur vniuersali ad tres dies.

Caput abluetur lixiuio ex sarmentorum cineribus additis folliculis & agarico.

Si dolor perseveret aperietur vena pulsatis in temporibus.

Apophlegmatismis vtetur.

Tandem si non conquieuerit dolor arteriotome fiet.

ANNOTATIONES.

1. Morbus istius Vicarij erat febris lenta continua, essentialis & cuius ideam, speciem, ingenium & essentiam Fernelius explicauit libello de febribus.
2. Affectio ista redolet aliquid Hypochondriacum. Et admirabilis est successus ætatum in quibus aliàs per quaterniones aliàs per septenarios magna mutationes eueniunt. Et tunc incredibili quodam modo de valetudinis bonæ statu deceditur, & donec tempus istius mutationis transierit, non cessat animans malè habere, & queri de valetudine. Nam & in libris de Dieta Hippocrates docet, quibusdam qui diu sani vixerunt circum 40 annum mutationes euenire & eas perniciosas: cur non etiam eodem modo in ætatibus nostris eueniat, quod & in magnis temporum mutationibus Hipp. lib. de aëre, & locis euenire obseruauit? Quid illud quod Hippocrates vitam nostram septem dierum esse ait?
3. Cum sæpius detractus esset, sanguis quod impurus videretur, tandem mitificatis humoribus, laudabilis apparuit. Nam fallebantur medici existimantes superficiem pituitosam esse sanguinem corruptum.

Cccc ij

572 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Gal. enim docet & aquam, & pituitam sepe in superficie sanguinis apparere. Et medici decipiuntur. Cap. 2. lib. de Attrib. lib.

4. Sensum hunc deambulantium formicarum nunquam legi nisi semel apud Hippocratem dum disputat de tabe dorsali. Et apud Hollerium cum agit de catarrho dorsali com. in coac.

CONSILIVM CXIX.

Ad vermes.


Domino de la Bournaliere, à vermibus afflicto hæc sunt præscripta quibus vere & autumnno appetente vsus est.

℞. Absinth. vulg. agrimo. centaurij minoris. an. m. s. lupul. seminis contra. an. ℥ss. florum chama. stæch. an. p. i. fiat decoct. in aqua hordei in col. ad lib. s. dissolu. confectionis hieræ ℥ij. fiat clyster.

℞. Pul. hieræ dupl. aloë ℥j. rheib. ℥ij. mass. pilul. assaieret & cort. myrob. citrin. an. ℥j. cum syrup. de absinth. fiat massa vtenda ad ℥j. ante pastus.

℞. Conseruæ florum anthos & cichorij beton. an. ℥ss. cortic. cinrij conditi. ℥j. coriandr. prepar. ℥ss. cornu cerni, & rasura eb. an. gr. vj. mithrid. & theri. an. ℥ss. confectionis Alkermes. ℥i. cum syrup. de pomis & stæchade: fiat opiata vtenda sepe.

F I N I S.



INDEX RERVM ET VOCVM MEMORIA scitūque dignarum quę hoc toto opere continentur. Numerus pagi- nam designat.

A.



- A**NIMALIS fa-
cultatis infirmitas
quid faciat in
morbis, & an sit
astimanda. 375
Aqua molles aluo ardenti danda.
377
Aloe etiam calidis corporibus con-
fert. 2
Arthritidis biliosa curatio. 14
& an sit biliosa arthritis ibi-
dem, & cap. de ea de re scripto.
Asthmatis curatio. 40
Aphiosum quid in orificio ventri-
culi. 58
Arabum opinio de phlebotomia in
feb. tertia. 209
Arteria venosa &c. examen. 190,
& sequ.
Auricula cur multiplex cum tempera-
tione. 214
- Arcul. de doloribus capitis. 467
Aluus fluens non dehortatur phle-
botomiam. 531. & 545
Arabum error in phlebotomia. 456
Articularium dolorum paroxysmo
non danda medicamenta. 492
Aqua potus perniciosus cuidam.
310
Antipatri hist. ex Gal. 322
Angine sicca remedium. 292
Apoplex. causa Galeno. 309
Aneurysma. 477
Athletarum habitus. 363
Aristotelis de palpit. opinio. 374
Arthritidis cura. 493
Apoplexia laedit actiones à cere-
bro. 144

B

Biliosa corpora ut sunt me-
lancholica. 3

Ccc. iij

INDEX.

<i>Bilis nigra excretio quorsum.</i>	224	<i>Capitis dolor insignis in quarta-</i>	
<i>Balneū Epilepticis an confert.</i>	158	<i>na.</i>	73
<i>Balneum quibus.</i>	158	<i>Capitis dolor guajaco curatus.</i>	73
<i>Balneum resurgentibus à partu</i>		<i>Colici & nephritici doloris differ-</i>	
<i>an confert.</i>	158	<i>rentia.</i>	79
<i>Bilis bona, bilis mala quid sit.</i>	532	<i>Colica remedia.</i>	64, 119
<i>Balnea p̄p̄uac̄ia confert.</i>	556	<i>Cerebrum autor fluctionum.</i>	64, 74
<i>Bilis & pituita duo principia</i>		<i>Color corporis malus nullo tumore</i>	
<i>Hippo.</i>	477	<i>conspicuo.</i>	45
<i>Balneum cholerae siccae confert.</i>	287	<i>Cal. & frig. mutationes quorsum.</i>	
<i>Bilis nomine quid Hipp. audiat.</i>			208
	477	<i>Capitis lesiones, vt sunt astiman-</i>	
<i>Balnea catarrhosis quando conue-</i>		<i>da.</i>	234
<i>niant.</i>	556	<i>Comatis explicatio.</i>	212
<i>Bilis maligna que.</i>	318. & 532	<i>Colicus dolor an situ percipiat.</i>	
<i>Borborygmi explicatio.</i>	357		272, & 273

C

C <i>Ruda mouere non oportet</i>		<i>Capitis dolorum remedia.</i>	73
<i>quomodo intelligendū.</i>	378	<i>Capitis dolores unde oriantur.</i>	2
<i>Colicos dolores sedans.</i>	381	<i>Catarrhi curatio.</i>	44, & 3
<i>Conceptum inuans.</i>	ibid.	<i>Colicus dolor falsò existimatus,</i>	
<i>Capitis dolorum remedia.</i>	73	<i>ut curetur & quid sit.</i>	9
<i>Capitis dolores unde oriantur.</i>	2	<i>Caput autor longorum fluorum</i>	
<i>Catarrhi curatio.</i>	44, & 3	<i>alui.</i>	20
<i>Colicus dolor falsò existimatus,</i>		<i>Catarrhorum ferinorum curatio.</i>	
<i>ut curetur & quid sit.</i>	9		44, 45
<i>Caput autor longorum fluorum</i>		<i>Cassia catalepticum quid affert.</i>	32
<i>alui.</i>	20	<i>Caros, catalepsis, comata sub finē</i>	
<i>Catarrhorum ferinorum curatio.</i>		<i>morborum incidunt.</i>	32, 312
	44, 45	<i>Comatis in febre curatio.</i>	32
<i>Cassia catalepticum quid affert.</i>	32	<i>Capite se in ventrem exonerante</i>	
<i>Caros, catalepsis, comata sub finē</i>		<i>mali morbi de Aetij sententia.</i>	62
<i>morborum incidunt.</i>	32, 312	<i>Capitis dolorum examen.</i>	466,
<i>Comatis in febre curatio.</i>	32	<i>& sequ.</i>	
<i>Capite se in ventrem exonerante</i>		<i>Causus duplex.</i>	563
<i>mali morbi de Aetij sententia.</i>	62	<i>Calor acer an coquat.</i>	516
		<i>Criticis diebus qui morbi deterio-</i>	
		<i>res.</i>	525, 527, 324
		<i>Corpora macilenta an purganda.</i>	
			516
		<i>Cruditus palpitacionis causa.</i>	516,
		<i>& antè.</i>	
		<i>Causus cum diarrhœa cur.</i>	30
		<i>Catarrhorum origo explicat.</i>	553,
		<i>& antè.</i>	
		<i>Catarrhis non quadrant medica-</i>	
		<i>menta foria.</i>	539
		<i>Catarrhis acerbis non conferunt</i>	

INDEX.

- evacuaciones Hippocrati.* 556
Cal. frig. mutatio in extremis par-
tibus mala in toto corpore non.
 325, 528
Clysteres validi initio colica non
dandi. 304
Coma febrium comes cur. 540
Catholicon cur datur si humor unus
peccat. 530
Corpora sicca etiam catarrhis obno-
xia. 552
Capitis dolores contumaces. 493
Colica mortalis secundum Arnal-
dum. 303
Colica in Iliacam degenerans. ibid.
Corpus in quatuor. 552
Catarrhi maligni quid agant. 537
Carcinomatis vteri cura. 477
Catarrhi ut curandi. 539
Cerebri catarrhoja dispositio expli-
catur abunde. 553
Catarrhos cauteria conueniunt.
 555
Cordis tremor. 510
Convulsionis curanda nona ratio.
 308
Causus an habet iunctam partium
extimarum refrigeratione. 564
Cerebri oppressio an delirij causa.
 312
Coma & Carus in vigore morbo-
rum. 421
Coeliaca celfo. 308
Catarrhos balnea quadrant &
quando. 556
Cholera sicca balneum. 287
Cacochymi incalientes rigent.
 326
Capitis dolor per sympathiam sim-
plicem. 307
Cordis & arteriarum non idem
omnino motus aliquando. 513
Cordis salus quid. ibid.
Cordis vehemens aestus quos motus
creat. 510. & sequ.
Cordis aestus Cardiogmon facit. ibi.
Catarrhosis potulentia conferunt.
 555
Causarum procaceticarum consi-
deratio. 546
Corporis moles non ubique bona.
 363
Capitis dolor repentinus quos mor-
bos facit. 466
Catarrhos sepe rigent & horrent.
 553
Cerebrum leditur puncto nervo.
 306
Coloris mutatio unde. 364
Convulsionis cause queruntur. 305
Convulsio statim in morbum inci-
dens quid significet. 138
Cerebrum hydropis autor. 125
Cari & apoplexia differentia. 144
Convulsionis & melancholia ee-
rebralis an eadem causa. 144
Critico die nil moliendum. 129
Criticorum dierum & periodorum
examen. 138
In crisi bus siccata corpora non va-
cuantur. 132

D

D *Eiectiones mali coloris non*
ubique mala. 9

INDEX.

item pag.	508	monis.	512
Dolores ventris post febres ut curandi.	9	Desipientia an ab inanitione.	311
Dolores hypochondriorum sanguine fluente cessant.	10	Diatheſis in morbis manet humo- ribus eductis.	488
Dysenteriae remedia.	38	Deſectionis animi examen.	439
Dentium factoris remedia.	41	443	
Dolores non cedentes remediis, suspecti sunt.	71	Dolores vagi sunt Hypochondriaci.	142
Dysenteriae caput causa.	63	Derectiones cruenta non sunt hy- dropica.	149, & 153
Dysent. circumſpecta quid.	270	Deiectiones sincere quae.	132
Dysent. ut splenicis confert.	267	Deiectiones colliquativa non ſe- tent aliquid.	132
Dysenteriae ut inappetentia succe- dit.	268	Dioclis explicata ſententia de Hy- pochondriacis.	144
Dysent. an astringentia conferunt.	274		
Dysenteriae remedia.	ibid.		
Dysent. explicatio ex 2. Prox.	277		
Dysent. examen.	270		
Dysent. ſuppreſſa quid inde.	267		
Dyspnoea an vitio renum.	221		
Dolore ceſſante an cauſa tollitur.	156		
Dietæ quæ in pleurit. & perip.	175		
Dorsi dolores vnde.	548		
Dysenteria mulieri gravis an mala.	304		
Dysenteria duplex Hipp.	ibid.		
Deſluxionum cauſa diſputatur.	558,		
& ante.			
Diarrhoea in cauſo cur.	330		
Diatheſis morborum parens.	553		
Dyspnoeae remedia.	477		
Delirium an ab oppreſſione cerebri.	312		
Dolores lumborum vnde.	548		
Diabetes ſi ſuppreſſo ſuccedit.	300		
Deliquia animi in Eryſipellate pul-			

INDEX.

F

- F**ebriticantes multi calescunt
& rigent ferè simul. 378
- Febres intermittentes desinunt in
dolores colicis similes. 10
- Febres hectica pestilens ut oria-
tur. 12
- Febres hectica an perpetuo refri-
gescat à cibo. 12
- Febres lente ut oriantur. 13. & 29
- Fluor alui unde, multiplex, 18,
& 19
- Fluor longus alui non citra caput.
19, & 166
- Fluor nocturnus quid indicet. 19
- Fluoris alui remedia. 38
- Fluoris in tabidis curatio. 47
- Factoris à dentibus remedia. 41
- Fluor dysentericus an in grauida
sistendus. 27
- Febres an sint magnæ in interna
inflammatione. 29, 345, 145
- Febres an hypofarcidion vincere
debet. 54
- Febres desinunt in soporosos affe-
ctus. 54, 312
- Febres maligna aliquando non
suum magnam habent. 35
- Febrium malignarum typus. idem.
- Febres an volutulum sedat. 80
- Fluor alui hydropico malus. 54
- Febres eatarrhosa quid afferat. 57
- Febres singultiens qua. 58
- Febre hydropi iuncta quid agen-
dum. 55
- Febres quotidiana ut tractanda
cum aliud febris, aliud materia
suadet. 55
- Febres semel anno. 228
- Febres cur quasdam non adoritur.
227
- Fluor à pericætos cur malus. 218
- Febres tertiana an phlebotomiam
citò requirit. 199
- Febres hectica putris examen. 173
- Febribus in putrid. cur os non fæ-
tet. 164
- Fluor alui non tollens tumores
malus. 218
- Febrium essentialium & sympto-
maticarum cause. 422
- Fluorum alui examen. 258
- Fluor à mesent. & ab inflam. me-
sent. 264
- Fluoris mesenterici & hepatici
distinctio. 165
- Factor oris. 160
- de Facultatibus examen. 213
- Febre quartana cessante homo fit
typhoidus. 312
- Febribus continuis cur fluor alui
iunctus. 530
- Febrium initio terrificæ symptoma-
ta. 561
- Febrium epialarum natura. 322, 326
- Febres somno aliquando augentur.
540
- Febres ardens in peripneumonia. abir.
561
- Fluori alui syrupus conueniens. 328
- Fluor muliebris. 299, & 351
- Febri quando coma iungitur. 540
- Febres cur non omnes epiala aut
horrificæ. 528

D d d d

INDEX.

- Febres continua habent rigorem*
& rigorem intermittentes non,
& cur. 530
Facultatis animalis an ratio ha-
benda in acutis. 375
Febres horrida quæ. 523
Febris semiteritiana. 523
Febris tertiana. 524
Februm quartanarum focus, causa
364
Febris quartana cum primo præ-
hendit, quid significet. *ibid.*
Feb. quart. quotid. & tertianæ
longa disputatio, 361, &
sequent.
Februm à pituita consideratio. 565
Febres cum vertigine. 566
Flatus cholera morbum facit.
288
Febres quæ in vigore coma ha-
bent 422
Febris Hypochondriis inflamma-
tiis quæ. 545
Febris an sequitur rigorem. 553
Fames quos inuict. 555
Frigus priuatiuū & positum. 324
Frigus partium extimarum fugax
quid. *ibid.*
Fortuna potest in medicina. 477
Febribus in phlegmaticis cor &
arteria non habent eundem mo-
tum semper. 513
Februm essentialium & sympto-
maticarū consideratio. 422, 357
Febribus quibus somnus non pro-
ficat. 513
Februm periodi explicantur. 138
Febris hectica pulsus. 131
- Fernelij opinio de hydropse explosa.*
149
In febribus tertianis an paroxys-
mus euanescent tutus. 138
Febris an est in hypochondriacis.
144
Februm an periodi ad criticos
dies bene comparantur. 138
Febres sine ratione desinentes sus-
pectæ. 139
Febres quartanæ blandè tractan-
de. 130
- G
- G* *Guajaci decoctum valet etiam*
in lapidis curatione. 121
Guajaci decoctum contulit in do-
lore capitis diuturno etiam à
lue non orto. 73
Galenij opinio de morb. compli-
catis. 168
Galenij opinio de phlebotomia in
tertiana, malè intellecta. 199
Gnidiorum reprehensio. 308
Galen. reprehendit Erasistratum
qui omnem morbum vlcus &
tumorem posuit & non repre-
hendit Hippocratem. 151
Galenus sui oblitus in causa hy-
dropis. 152
- H
- H* *ystericæ affectionis reme-*
dium. 596
Hypochondrij tumoris examen.
24.

INDEX.

- Hypochondrium quale debet esse.* 482
ibid.
Hypochondrij tumores arte curan-
di. 25
Hypochondrij dextri dolor quid
notet. 27
Hypochondrij dolorem mentitur
dolor stomachi. 29
Hydrops succedens aliis morbis
malus. 54
Hypochondriaci quid. 142, 62
Hydrope febris iuncto quid agen-
dum. 55
Hepar non desinit male habere, etsi
nil foris apparet. 51
Hydropis aliis morbis succedentis
descriptio. 54
Hydrops corporibus impurgatis
succedit. 54
Hydropicus fluente aluo interit,
146, 54
de Hydrope commentarius. 145
Hypofaricidios morbus est interi-
mens Hippocrati. 149
Hydropicis non sunt cruenta deie-
ctiones. 150, & 154
Hypochond. morbi ut detegendi.
261
Hypochondrij sani notæ. *ibid.*
Hypochondria frustra tentantur.
ibid.
Hepatis intemperati notæ. 202
Horror & rigor etiam in febribus
continuis, in intermittentibus
non. 530
Hydromel non conuenit melancho-
licis & μελαγχολικῶν. 531
Hypochondriaca melanch. reme-
dia. 482
Hypochondriaci faciliè palpitant &
cur. 516, & 517
Humores falsi & nitrosi qui. 552
Hysterica affectionis remedia. 381
Hepar tenditur dulci vino. 533
de Hypochondriis observationes.
542
Hippocrates veteres reprehendit de
qualitatibus. 308
Hypochondrij intentio ratio. 541
Humoribus penè omnibus euacua-
tis non tollitur morbus. 488
Hypochondrij dolor curatur. 441
Hepatis regionis dolor curatur. ib.
Horrorum frequentium causa in
febris continuis. 78
Hypochondrium palpitans quid.
477
Hypochondr. inflammatis quæ fe-
bres. 545
Hypochondrij inflammati reme-
dium. 546
Hypochondriis inflammatis quid
agendum. 541
Hydromelitis vires. 526
Hydrops à suppressis hamorrhoidi-
bus. 152
Hepatis gibbum inter partes su-
periores. 131
Humores veneni vim acquirunt.
137
Hypochondriaca an à phlogosi. 146,
142
Hepatis remedium opt. 136
Hydrops à cerebro. 125
Hypochondriacis vagi dolores. 142
Hypochondriaci an febricitant. 143

Dddd ij

INDEX.

Hydropici an nullam cruentā euacuationem habent. 152
Hydrops omnis an à scirrho. 149
Hypostasis quomodo fiat initio februm acutarū docet Gal. 378

I

I*ntestinatorum dolor siu non percipitur.* 172
Inappetentia dysenteriae succedens. 268
Intestinatorum dolor an maior aut minor prout, vel crassa, vel tenuia laborant. 273
Inappetentia examen. 267
Intemperies calida appetentiam deiecit. *ibid.*
Ischiadis remedia. 474
IctERICI an abundant flatibus & cur. 359, & 516
Icterus duplex. *ibid.*
Iliaca succedit colica. 303
Inequalitatis in febris causa. 527
Inedia exacta cur singultum non affert. 314
Inflammatiō Hypochondrij ut est tractanda. 541
Inappetentia summa quid. 440

L

L*ixinium pro capite.* 14
Lac asinum calculosis confert. 7
Lacte asinino tuto utimur. 29
Lochiorum suppressio hydropis autor. 30

Leipethymia an in peripneumoniis frequens. 68, & 512
Lochiorum suppressio quid. 54
Lactis examen. 236
Luna ad epilep. facit. 150
Leienteria an intestinis aut ventriculo sit laeso. 268
Lienosi ut dysenteria iuuantur. 267
Leipothymiae examen. 439, & 443
Lateris dolor non negligendus licet non sit pleuritis. 323
Lethargum à pulmone. 322
Lateris doloris ante morbos ratio est habenda in morbis. 323
Lateris dolores pleuritici mentientes. 473
Luis venereae remedia. 464
Lapidem in rene arguit spiritus inflexio difficilis & lumborum dolor. 548
Lumborum dolores explicantur. *ibid.*
Lassitudinum consideratio. 326, & 546
Leipothymia quae purgationem postulet, quae non. 443
Lateris dolores aliquando Hypochondriaci. 142

M

M*elancholica corpora non valide purganda.* 36
Macilenta corpora non sunt medicamentis agitanda. 29, 4377
Macilenta corpora ut sunt purganda. *ibid.*

I N D E X.

D d d d iij

INDEX.

res purgans. 528
Morbosissimi desinunt esse morbo si non est tutum. 532
Melancholia hypochondrica. 327
Mulierì grauide an dysenteria mala. 302
Melancholici qui fiant. 230
Morborum initio cur terrifica symptomata. 323
Mole cura. 480
Mel ut nocet. 535
Medica ars à calumniis vindictur. 475
Medicamentū inutile malū affert. 312
Morbi cur necessario aliqui longi. 476
Morbi acuti cum aluo lubrica. 530
Motus contra naturam 4. species. 517
Morbus generaliter dictus. 478
Morbi acuti unde, longi unde. ibi.
Morbi non possunt breuiari licet velit medicus. 474
Mulierum distinctiones ex Hipp. 300
Morbi manent humoribus etiam vacuatis. 479
Morbis incognitis ut medicamenta adhibenda. 364
Mulieres biliosa non ferunt phlebotomiam. 439
Melancholia cereb. & epilep. an causa eadem. 144
Morbi incipientes cum terrificis symptomatis unde. 140, 137
Morbus omnis an vlcus. 151
Mania epilepsiam soluit. 125
Morbi coctio & preparatio quæ. ibi. 129
Medicorum error qui & diebus criticis, & incoctis humores purgant, ibid.
Morbi melancholici an fortiter agitantur. ibid.
Morbus an in vlcere & tumore consistit secundum Erasist. 128
Mador an conferat. 189
Morbi quando blandè tractandi. 129
Medici nil falso debent supponere. 131
Melancholici & epileptici cur delirant. 144
Mania syrupus conueniens. 146
Morbi eadem hora repentes validdè tractandi. 129

N

Nephritica remedia. 6, 19, 120, 121, 255, 256

O

Obstructio ne multum refrigeremus impedit. 8, & 14.
Oculorum remedia in metu cæcitatatis. 39, & 40
Oris fetoris examen. 160, & seq.
Omoplatarum dolores unde, non enim à catarrho ut creditur. 548
Oculorum morbi per se ipsi sanescunt licet fuerint immedicabiles. 474
Oculus puluerulentus quid sit. 552

INDEX.

Obstructio vehemens februm sym-
ptomatarum causa. 422

P

Pulmonū inflammatorum no-
te, curatio. 11

Pulmo febris heclicae sedes non est.
12

Phlegmone interna ne refrigerer-
mus prohibet. ibid.

Pulsus intermittens, & deficiens
quid. 22

Pulmonum remedia multa. 44

Pituita crassa replens rugas ven-
triculi alium fluidam facit. 14

Pulsus granidarum qualis. 28

Peripneumonia an dextra an sini-
stra. 69

Pleuritis falsa à cruditate. 60

Peripneumonia pleuritidi succe-
dens an deterior. 80

Paroxysmi symptomata terrifica
habent initio. 58

In peripneumonia ut phlebotomia
celebranda. 69

Pulmonum affectus an genarum
rubore deprehenditur. 66

Phlebotomia ex brachio sinistro in
peripneumonia. 80

de Peripneumonia multa. 68

Peripneumonia an à bile, an à phleg-
mate. ibid.

Peripneumonia an exactam quæ-
rit dietam. 175

Pleuritis an exactam dietam quæ-
rit. ibid.

Phlebotomia an celebranda in ter-
tiana. 199

Phlebotomia an celebranda san-
guine insigniter mutato. 202

Phthisicis an lac conferat. 238

Procatarepticarum causarum bis.
206, & 546

Pustularum eruptio quid significet.
220

Pulmonis natura, nutritio, victus
ratio in eius morbis tenenda.
175, & 176

Phlebotomia in magnis doloribus
statim usurpanda. 492

Phlebotomia ad leipothym. in pal-
pitatione cordis quando. 515

Phlebotomia ad ventositatē quan-
do. ibid.

Phlebotomia etiam alio fluente.
531, & 545

Phlebotomia quando purgationi
preferenda. 492

Pleuritin mētitur lateris dolor. 560

Pleuritis sine spūto. 537, & c.

Pleuritidis consideratio & metho-
dus curandi. 455, & c.

Pleuritidis falsæ consideratio. 457

Palpitationis remedia. 518

Palpitationis flatus nescio quis
causa. 514

Palpitatio cōtingit loco hemorrha-
gie in iuuenibus, & menstru-
rum in virginibus. 514

Palpitationis cause vere explican-
tur. 516, & 510

Partium extimarum mutationes
ad cal. & frig. periculose. 529

Peripneumonia lethargi speciem
inferens. 560

INDEX.

- Pulmo* iunatur dulci vino. 532
Pulmonis pruritus. 538
Palpitationis causa metus. 515
Pulmonis morbos quando rubor genarum comitatur. 537
Phlebotomia & ratio expenditur. 455
Phlebotomia ex opposito latere an facienda. 456
Paris excretio cur debilitat. 430
Pulsus in *Hypochondrio* sinistro. 477
Pulmonis inflammationis qua signa. 512
Palpitationi cordis an *phlebotomia* conveniat ad *leipothy*. 293
Palpitationi obnoxij *hexybis*, & inter medendum moriuntur. ibi.
In palpitatione cordis prudenter agendum. ibid.
Pulsus palpitantis causa. ibid.
Pulsuum intermissio an mala. 320
de Pulsibus disputatio. ibid.
Phlogmatis nomen bifariam. 360
Phlogosis causa diarrhoe in febre. 530
Phibici an euacuatione egeant. 555
Pituitosis an potulenta quadrent. ibid.
Pulsu intermittente etiam vena secta. 323
Pulsus in utero. 498
Pulsus senum terrificus aliquando, sed frustra. 322
Pulsus intermissio senibus & pueris minus formidabilis. ibid.
Pulsus inaequalitas ob affectum stomachi. 323
Pulsus inaequalitas unde. 328, 323
Pulsus non idem aliquando cordis & arteriarum. 513
Palpitationi confert *Phlebotomia* dextra aliquando sinistra alias & cur. ibid.
Puerorum nutriendorum ratio. 567
Phlebotomia quibusdam sanguineis facilis, aliis non. 363
Pulsus consideratio in febris, 366, & 363.
Pleuritis humida falso dicta phrenitidis generatio. 540, & 287
Pulsuum differentia. 324
Phreniticorum oculus pulverulentus. 552
Phreniticus primo die factus. 137
Partes corporis quae superiores quae inferiores. 130
Purgatio instituenda diebus paribus. 129
Purgatio resiccatis incommoda. 132
Paroxysmi frustra abeuntes suspensi. 136
Quartanis in febris sudor inutulis. 52
Quartana ab adusto humore qualis. ibid.
Quartana cura. 73
Quartana desinens cito fecit hominem catalepticum. 491
Quartana desinit facto in totum corpus abscessu. ibid.
Quartana cur longe. ibid.
Qualitates primae an sanitatis causa. 308
R

INDEX.

R

Rigores frequentes unde. 378
Renum affectus hereditarij. 5
Respiratio difficilis quibuscor aret.

II

Rattuosus morbus quid. 62
Rondeletij error de phlebotomia in
tertiana. 199

Renibus affectis cur dyspnœa. 221

Rubri sunt melancholici. 360

Rhenus idem urit & refrigerat.

553

Rigorem an sequatur febris. ibid.

Rigoris frequens sensio quid signi-

ficat.

317

Renum morbi ex Hippocrate. 546

Respiratio magna desinens ad Res-

pirationem.

303, & 325

Rigoris frequentis in continuis fe-

bribus causa.

521, & 525

Rubri facie sunt melancholici. 145

Rondeletius de febre in Hypochon-

driaces.

ibid.

Rigor initio febrium malignitatis

est signum in continuis præser-

tim.

530

S

Somnus immodicus quid fa-

ciat.

375

Soporifera an in febribus ardenti-

bis, & calidis affect. cerebri

conferunt, & quando. 395, 364

Siccitas facultatem retentricem

firmat.

377, & 214

Sectio vene & purgatio non acce-
leranda in morbis autumnii &
hyemis. 377, 378

Sectio vene citò celebrata vires
frangit. 379

Somnus an à sola refrigeratione.

372

Salinatio multa Hypochondriacis
adeft. 2, & 142

Suffitus in catarrhis non proban-
tur. 3

Siccitas cordis dyspnœam facit. 15

Sputum sanguinis curatur. 46

Soporosi affectus usu castiæ & simi-
lium. 26

Sudor in quartanariis siccis quare.

51

Stranguria cur vulvulum affert. 99

Singultus in febribus senuum her-
nia laborantium. 59, & 306

Singultus in febre qualis. 57

Singultus febris quæ. ibid.

Singultus à pressu costæ. 58

Sputatio multa quid significet. 63,

& 142

Suppressio sanguinis inueterata, &

recens an idem indicet ad phle-

botomiam. 55

Siccus morbus quid. 175

Sanguinis excretio per os quid. 222

Sanguinis insignis mutatio dissua-

det phlebotomiam. 202

Spumosa deiectiones unde. 260

Spumæ origo unde. ibid.

Sternutamenti remedia. 381

Spina difficilis inflectio catarrhū

non designat, sed aliquando

calculus. 548

Eccc

INDEX.

*Scaligeri opinio de phlebotomia op-
positi lateris in pleuritide.* 456
*Singultus a tumore & pressu hepa-
tis.* 466
Sicca pleuritis. 537, &c.
Somni explicatio longa. 376
*Somniferorum medicamentorum
ratio & usus.* ibid.
*Symptomata terrifica initio mor-
borum.* 158
Sternutamenti causa. 309
Somni incommoda in febris. 500,
 & 539
Sputa salsuginosa quid faciant.
 556
Sanguis extra vasa an suppuret.
 499
Singultus & vomitus distinctio.
 310
Singultus cur non fit in inedia. 314
*Spondylorum cervicis affectio ad
manus pertinet.* 548
Sitis remedia. 329
Spine dorsales dolores. 548
*Singultus ab inflammatione ven-
tric. cerebri & meningum.* 310
Somnus quid faciat. 539
Seri maligni vis. 549
*Sanguineorum quidam ferunt
phlebotomiam alij non.* 361
Somnus cur nocet & non. 539
de Somno locus Hipp. praeclar. ibid.
Spirituum interceptio quid. 542
Singultus causae. 306
Sudor initio morborum quid. 139
Syncera deiectiones quae. 135
Sudor multus ex somno quid. 139
Sudor particularis an malus. 140

T

T *Abescentis curatio.* 4, 44,
 45, 46, 47
*Tussis splenicis propria, & male à
catarrho esse putatur.* 15
Tussis remedia multa. 43
*Tabes an morbus hereditarius &
contagiosus.* 42, & 43
Tabescentis fluoris alui curatio. 47
Tussis ut fiat. 43
Tussis initio paroxysmorum. 57
Temperies si una cur tot actiones.
 213
Thermintorum eruptio. 507, &
 327
Thoracica remedia. 42, & sequ.
Tibiarum dolores sedantur. 443
Tympanites unde. 516
*Tabidi & hecticci cur non singul-
tiunt.* 515
Tremor cordis. 510
Tabis causa. 551
Tabes dorsalis. ibid.
*Tabidorum oculus puluerulen-
tus.* 552

V

V *Vigilie immodicae quid fa-
ciant.* 374
Vigilie cur fiant, & in quibus. 375
*Venter ambustus, venter ardens,
& siccus.* 94, & 376
Vterini fluoris remedia. 380
*Vnguentum ad renum & spine ar-
dorem.* ibid.

INDEX.

<i>Vnguentum ad lienem.</i>	73, & 380	<i>examen.</i>	175
<i>Ventriculo conferentes pilula.</i>	3	<i>Vomere improprie dictum.</i>	224
<i>Urina nigra non semper mala.</i>	6	<i>Vteri carcinoma curatur.</i>	476
<i>Volulus multiplex.</i>	9	<i>Urinarum aquearum considera-</i>	363
<i>Ventris dolorem sedatiuum.</i>	23	<i>tio.</i>	363
<i>Vermes aluum fluidam faciunt.</i>	19	<i>Urinarum oleosarum consideratio.</i>	328
<i>Venenum ut in nobis generetur.</i>	35, & 36	<i>Urinae cum sunt tennes non pur-</i>	437
<i>Urina nephriticorum infida.</i>	26	<i>gandum.</i>	437
<i>Volulus multiplex.</i>	81	<i>Urinae crassae & tennes quid agen-</i>	563
<i>In voluulo chylteres Hippocrates</i>	ibid.	<i>dum suadent.</i>	563
<i>dat nouo modo.</i>	ibid.	<i>Urinae crassae purgationem suadent.</i>	561
<i>Voluulo liberatis mali morbi acci-</i>	80	<i>Vteri fluor.</i>	379
<i>dunt Mesuæo.</i>	80	<i>Ventriculi confirmandi ratio.</i>	478
<i>In voluulo an vomitus pessimus.</i>	78	<i>Vomitus & singultus differentia.</i>	310
<i>de Voluulo multa.</i>	77	<i>Virgines decolores palpitant.</i>	516
<i>Volulus an febre sedatur.</i>	99	<i>Vtero inflammato quæ secunda ve-</i>	472
<i>de Vermibus multa.</i>	74, & 75	<i>na.</i>	472
<i>Ventriculi morbi explicantur.</i>	60,	<i>Vini dulcis dotes.</i>	532
<i>& 129</i>		<i>Vinum dulce pulmoni confert non</i>	533
<i>Vinum in febre an dandum.</i>	54	<i>hepati.</i>	498
<i>Urinae suppressio initio morborum</i>	231	<i>Vteri pulsatio.</i>	565
<i>unde.</i>	231	<i>Vertigo in febris.</i>	365
<i>Ventris dolores ex situ non parent.</i>	271, & 273	<i>Veterum error de bono habitu.</i>	365
<i>Urinis coctis an mors sequitur.</i>	204	<i>Vacuatio an phthisicis conueniat.</i>	555
<i>de Urina coctis ad bonum appare-</i>	ibid.	<i>Urina male aliquando ad bonum</i>	418
<i>ibus Galeni explicatio.</i>	199	<i>apparent.</i>	351, & 300
<i>Ventriculi sideratio unde.</i>	198	<i>Vterinus fluor.</i>	473
<i>Vomitionis diurnæ causa.</i>	198	<i>Visus imbecilli cura.</i>	313
<i>Vene arteriosæ examen, &c.</i>	190	<i>Ventriculi oppressio ab hepate an</i>	352
<i>Urinae suppressio an sit obstructo</i>	253	<i>singultus causa.</i>	352
<i>uorene.</i>	217	<i>Vterus an ex alto trahit.</i>	352
<i>Ventris eleuatio aluo fluente mala.</i>	217	<i>Vterus an causa fluoris muliebris.</i>	352
<i>Victus rationis in morbis acutis</i>			

INDEX.


<i>Vomit</i> an cruentus hydropticis.	<i>chondriaca sedes.</i>	142
153	<i>Urina aquea in bilioso corpore</i>	
<i>Urina</i> tenuis suspecta.	quid.	136
<i>Ventricul.</i> an melanch. Hypo-	<i>Vomit</i> us commoda.	129

FINIS.



INDEX
VOCVM GRÆCARVM
memoratu dignarum quæ in hoc opere
continentur numerus paginam
designat.

A

 πεπλον & ὁμὸν differunt. 374	spirationi quid. 302, & 325
Ατμῶδες πειπλωμα. ibid.	Βραχύπνοια, unde & δύσπνοια. 538
Α' ὄραον. 433, & 274	Γ
Αδρόα. ibid.	Γλῶσσα περιπνευμονική. 288
Αυχμῶς. 269, & 292	Γειτόμανον ἀληθινα. 356
Αυχμῶς cum humore, sine humore. 270	Γινώμητι. 216
Ἀχρῶα. 289	Δ
Ἀπτεπλον & ὁμὸν, an idem quod ξηρόν, 270, & 271	Διάσπρις ἐξυσιπλαιτώδης λειπνείαν πα- rit. 297
Ἀιματωσ πύσις. 46	Διάπνοια π. 216
Ἀσπίας & ἀποσπίας διαφορὰ. 267	Διάχυσις. 553
Ἀδνηπλον quid. 535	Διαφθορὰ quid. 490
Ἀλμυρὸν σωμα. 552	Διορθεῖν quid. 540
Ἀπὸλησις τ' πνευμάτων. 542	
Ἀνομαλία, propria febr. putrid. 321	
Ἀδ' ὁρῶσις π. 129	

B

Β' & θυμῶς. 537
Βραχύπνοια succedens magnæ re-

E

Εὐδοκίης quid: item ἐψημένον. 374
Ε' κτασις soluit maniam. 298, & 125

Eeee iij

INDEX.

Επιφύσις ὀχλοδία.	283, & 284		
Ἐπειναστας.	ibid.	Λ	
Ἐπὶ τῷ ἐπιφύσει.	283		
Εἰλεός sumptum generalius.	298	Λ	ἀρβύξ. 291, & 290
Ἐφοδός quid.	299		Λεπτερά. 295, & 296
Ἐπίστασις ἀθρόα.	274		Διππειαν χαλκῶς ἀνεί. 298
Ἐκρυσις quid.	22		Δύειν quid. 296
Ἐκπεσσημός.	ibid.		Δύσις καὶ κρίσις differentia. 478
Ἐυχέσια an malum signum.	64, 361,		
	521, & 537	M	
Ἐμέειν κατὰ χρευστικῶς.	224		
Ἐπιγίνωσις π.	266	M	Αἰαν soluit ἔκτασις. 298, & 125
Ἐξ ἐμέτε quid significet.	310		Μεγαλόσπαστοι qui. 563
Ἐπισυνασσία ἀβλαπῆτος.	530	N	
Ἐκλυσις quid.	443, & ante.		
Ἐκχύμωσις καὶ ἐκχύμωσις differunt.	501		
verbi ἐνείη, vis.	498	N	Ἀρρωπῶς, an in febribus con-
Ἐπιπαραξύνωσις quid.	320, & 321		ferant. 375, & 377
Ἐξέερυθροι quid.	361		Νόσημα ξηρόν. 282, & 269
Ἐξέερυθροι cur melanch,	146		Νέσις ζύντεςτος. 478
		Z	
		H	
		Θ	
Θερμὸν π.	211	Ξ	Ἐξέν quid. 281
Θαυ καὶ θινεώδης vis.	537		Ξηρός νεσός, an idem quod ὠμός
Θῶν frustra in morbis vsurpatur.	321		καὶ ἀπεπτός. 287
Θνήψ & ἀνωμαλία in pulsibus.	ibid.		Ξηρότης πόνη ἢ anginam parit. 282
			Ξερεθδαλμία. 286
			Ξηρόσις. 288
			Ξηρογλῶσσα fictum verbum. 292
		O	
I			
Ιχθὺς.	289	O	Οφθαλμία ξηρά. 282
Ιχθυήρ π.	270		Οφθαλμία φθινώδης. 281, & 283
			Οφθαλμία ἕρπ. 282, & 283
K			Οφθαλμία φθώδης. 280
			Οφθαλμία ξηρά bifariam. 283
Καύσις.	295		Οξυρεμία in fluoribus alui. 14
Καύσις καὶ λεπτείας διαφορῶς.	299		
Κόπος.	326	II	
καρδιακός sumitur aliter apud Gal. in			
Aphorismis.	512	Π	Πείπλυσις ἔξερυθρός. 264, & 271
Κεῖστος καὶ λυσσῶς διαφορῶς.	138		Πλάσσειν. 286

INDEX.

τὰ Πολλὰ π.	207	Συντηξίς.	553
Περίσσεια quid.	206	Συνκινῆσαι, corpus quid fit.	439
Παροξυσμὸς nomen an ad febres inter-			
mittentes pertinet.	530	T	
Πολὺ κράσις.	308		
Παλιὸς ἰατρὸς δειν.	478	T	132, & 271
Παλιὸς χ. τέρας, differentia.	510	Τύφου species.	322

P

Ρῶγυακίαι.	21, 301, & 351
Ρευματικὴ διάθεσις,	260
Ρε cura.	480
Ρῶγυακίαι balnea.	556

Σ

Στυλοκλή.	288
Συνάλη, Συναλχκὸν πᾶσιν, 288,	
& 281	
Συναλχκὸν ῥοιῶδης.	282
πεὶ Συναλχκῶς.	281, 282, 283, & 284
Σπινθηροειδὲς μετὰ πνευμάτιος. quid.	64
Συναλφωδῆσαι quid.	155
Σπατίν quid.	532
Συστασις & κινήσεως causa.	540
Συστάων quid.	502
Συστροφὴ ad Hypochondrium.	542
Συφύμῃ nomen quid Hippocr.	496

T

Υἰατρος ὀπτηδευδής.	374
Υπνωτικὰ quando conferant.	375
376, & 38	
Υδαίνεσθαι.	287
Υδρὸν.	288
Υποβορβορίζειν ἐν ξηρῷ.	282


Φ

Φάρμακον.	291
Φθιγώδης ὀφθαλμία, vide ὀφθαλμία.	
Φθίσις ὀφθαλμῶς.	289
Φθίσις ἀσπερὶς π.	216
Φθίγγη π.	205

X

Χολέρα humida & sicca.	287, & 288
Χολέρα λευκὴν λέγ. 293, 294, & 298	
Ψωροφθαλμία.	289

FINIS.



G V L I E L M I
B A L L O N I I
MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI
CONSILIORVM
MEDICINALIVM LIBER SECVNDVS.

A **IACOBO THEVART**, Facultatis Medicæ Paris. Doctore,
digesti ac in lucem primum editi.

TOMVS SECVNDVS,

In quo pleraq; continentur quæ ad morborum cognitionem, eorum curationem
propositis exemplis ad rem accommodatis, & obscurorum Hippocratis,
& Galeni, & veterum scriptorum intelligentiam pertinebunt.

Α'φόως Γνώσειν, & μὴ λανθάνειν,
Φησὶ ξόμενα πρότερόν τε πεπαίνειν.

P A R I S I I S,
Apud **IACOBVM QVESNEL**, viâ Iacobæ,
sub signo Cochleæ, & Columbarum.

M. DC. XXXVI.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



SVnt qui ea, quæ ab iunioribus conscripta elaboratæque sunt, reiicere ac pro nihilo habere solent, quòd nil nouum & insolens, & de quo non aliquid à priscis scriptum sit, literis mandari posse, ac luci dari asseuerent. Non propterea tamen ab opere cessandum est, ac scriptor, quicumque sit, merita laude fraudandus. Debent enim animaduertere eiusdem intelligentiæ esse, iudicare de aliorum scriptis, dum ea usurpamus, & in vsum conuertimus, ac res ipsas conscribere.

Ex Hippocratis libro primo de Diata.



NOBILISSIMO ET
REVERENDISSIMO VIRO DOMINO
D. CLAVDIO
DARGOVGES,
MONTIS S. QUINTINI
ANTISTITI.

IACOBVS THEVART Doctor Medicus
Parisiensis S. D.




*Lterum hunc Medicinalium
Consiliorum librum à magno illo
BALLONIO amiculo meo
olim conditum, ac per me iam-
primùm editum, nonnullisque ad
obscuriores locos annotationibus
auctū, tuæ Reuerentiæ dum nun-
cupo (Antistes Reuerendissime) non adeo mihi ipse
blandior ut existimem quæ abs tuâ comitate confertim*

EPISTOLA.

in me promanant beneficia tam leui munusculo posse
 compensari, quin potius noui, eiusque eximij beneficij
 loco duxero si patiaris illustre nomen tuum huius
 operis in fronte exaratum legi, unde nimirum & ope-
 ri ipsi auctoritas accessura est haud mediocris, mihi
 uero singularis quedam letitia probata abs te eius,
 quam in eo ipse posui, opera. Quis enim est cuius
 aut approbationem exoptare, aut pertimescere cen-
 suram magis debeam quam eius qui generis nobili-
 tate quidem, sed propria uirtute magis conspicuus
 raram illam omnigena doctrina, cum eximia pro-
 bitate, dignitatis auctoritatisue cum prudentia ac so-
 lertia non vulgari prae se fert misturam? qui quae est
 in improbos quoslibet aut ignauos seueritate, parihu-
 manitate studiosos quosuis amplecti solet? quem ipse
 non semel animaduerti, quanquam grauioribus cu-
 ris (iis maximè quae ad Ecclesiasticam, cui magno
 suo merito praefectus est, disciplinam pertinent) fere
 occupatur, mearum tamen rerum, quantumuis te-
 nues illae sint, sollicitum. Nunquam fecero si propriis
 te coloribus omnibus uelim adumbrare, si recensere
 singula quae te ceteros inter Praefules spectabilem
 reddunt uirtutum sublimiorum ornamenta, de qui-
 bus me amplius dicere uideri potest inane ac super-
 fluum, cum ipsa ex operibus quae facis satis ac su-
 per innatescant: Superba enim illa montis S. Quin-
 tini Basilica per te non ita pridem funditus instaur-
 rata, an non egregiam tuam ne dicam regiam magni-

N V N C V P A T O R I A .

scientiam loquitur apertissimè ? Renouatus in ea
 Dei Optimi Max. cultus nonne pietatem declarat ?
 quid restituta ibidem pristina sua integritati religiosa
 disciplina nisi auctoritatem & zelum ? tot verò
 pauperum tuis opibus subleuata familia quid aliud
 nisi charitatem insignem tuam vocibus in cælum
 usque exaudiendis, prædicant ? Sileo itaque, totque
 præclaras virtutes tuas tacitus ipse veneror, unum
 abs tua humanitate contendens, ut hunc quem tibi
 offero librum perpetua mea erga te observantia mo-
 nimentum esse patiaris. Vale, Lutetia Paris. Idib.
 August. M. DC. XXXV.





BENEVOLO LECTORI.

GVLIELMVS DE BAILLOV

Doct̃or Medicus Parisiensis.

Εἰς πρᾶττειν.



LLI semper mihi videntur præclare de se, deque Republ. mereri, qui, cui-
cunque arti nomen dederint, & ad eam
nobilitandam amplificandamque ani-
mum adiunxerint, ita se gerunt, vt omni
cura, & cogitatione nouum aliquid quærant, quò uti-
litati suæ seruiant, & artis illius dignitatem tueantur.
Quod tamen si citra valetudinis imbecillitatem, & non-
nullum rei domesticæ casum iacturamq; fieri nequeat,
non debet tamen vir industrius recusare, quò minùs,
vel in extremo spiritu, & aliqua rei familiaris offensio-
ne, si quam opem hominibus suis afferre potest, id
omnino experiatur. Nunquam enim quantum profi-
ciat efficiatve, eum pœnitebit. Nam cum præclarum
augustumque sit pro Republ. mortem oppetere, ne-
dum priuata commoda deferere, non tam hîc genus
mortis queritur, quàm causa eius obeundæ, & volun-
tas, eaque honesto aliquo facinore, ac conatu erecta ac
incitata: Cum is solùm non dicatur pro Republ.

AD LECTOREM.

animam profundere, qui medio agmine, incitâte tuba, conferendisque strenuè manibus id faciat, sed qui aliquo præstanti consilio, aut munere, aut umbratili aliqua exercitatione in eam curam incubuerit quæ vberes ex susceptis laboribus fructus Reipublicæ demeret & afferet. Ut qui in cura & meditatione obeundi muneris è vita excefferit, si modò in Rempub. id commodorum retulerit, idem facere credatur, ac qui Hannibalem iam ariete urbis muros quatientem ac euerrentem fugarit, & superarit. Sed qui domi simul militiaeque aliquid potest, tantò tum ceteris, tum se ipso præstantior est, quantò duæ virtutes vni, non numero, sed pondere antecellunt. Atque de Republ. meretur Medicus, ut ceteri artifices omittantur qui ad nos hîc nihil attinent, quicumque non erit iis contentus quæ sedula antiquitas quæsiuerit, coluerit, ac limarit, sed suo Marte aliquid vigil sedulusque inquireret quod ad priscam illam sedulitatem adiungat. Sic cum sibi ingenio consilioque autore dignitatem reperierit, tum præclaro eo conatu cæteros ad id aut imitandum, aut perficiendum incitauerit, ut non tam affecto, quam perfecto opere contenti quiescant. Maximè verò id erit gloriosum, si suscepti huius laboris fructus ad Rempub. emanabit. Quò magis non me abstineo quin hoc loco eos verbo appellem persequarque, qui satis esse factum putant, si modò sibi studuerint, sibi cecinerint, ac vixerint. Nihilò enim à brutis differunt, quorum cura in eo omnis posita est ut ventri obediantur, immo tota in eo vertitur ac consistit. Atque eo modo, quo diximus, aliquis publicam utilitatem amplectetur, suam verò non deferere dicetur, si primùm magnam

AD LECTOREM.

magnam aliquam ex sustinendis laboribus ceperit voluptatem, & assidua cura ac animi contentione ita tempus fefellerit, punctumque temporis puncto nuxerit, ut more eorum qui Endymionis somnum dormiuerunt, omnes temporum molestias & tædia facile vincat & demulceat. Quæ enim vberior amœnitas, maioresque delitiæ, quàm applicando defigendoque in rem aliquam animo explere omnem expectationem diuturni desiderij, & omnes rerum acerbitates iucundo fructu otioque temperare? Quod facilius in iis vsuuenit quorum nulla vnquam futura est satietas. An non is de se mereatur, qui ita in negotio versatur, ut eius honestus iustusque labor honore, præmio atque splendore decoretur? Suscepti verò in rebus non ludicris labores, si quis modò inde fructus redeat, honore debito autorem suum non fraudabunt, quin eum contra omnem inuidiæ tempestatem asserent, atque vindicabunt. Quod iis non contingit qui exiguo lucello mercedulæque contenti, aut rudi adumbratæque rerum cognitione, mollitiæ diffuentes veluti victi, dissoluti, exanimes ac emeriti segni otio, tanquam pigritiæ suæ fomento, voluptuantur. Iam verò locus postulat, ut de instituto aliquid dicam: tametsi scriptio ipsa satis indicet quo animo id fiat, vel ut is qui scribit priuatis suis studiis consulat, vel ut aliqua ratione aut paucorum, aut multorum desiderium leuet, vel omninò id, quantum & qualecumque sit, ad Rempub. referre videatur. Verum ne cui admirationi sit hoc nouum & insolens scribendi genus, si de nostro Consilio aliquid explicem, non erit fortè à recto alienum. Hippocrates Historias morborum particulares scripsit, quod & nos

AD LECTOREM.

hîc facimus, sed more nostro scripta non illustravit. Et non Thucydidis more multa idiotis cognita proposuit vulgôque trita, sed rara & scitu digna cursim perstrinxit, quibus aut certum periculum ægris crearetur, aut aliqua salutis spes illuceret. Commentarium in sua scripta edere indignum erat tanto viro, indignum eius otio. Credo enim illum tanti temporum singula momenta aestimasse, ut ne minimâ horulæ vsuram sibi ipse ad res ludicras concesserit. Quò magis à Commentario in suas historias se abstinuit, quòd fortè hoc ridiculum ac puerile extitisset. Facile est enim aliquid narrando confingere, ut confictio quoque in id còmento aliquid nouum afferre videamur quo auram populare aucupemur. Quæ quidem materies & seges est vberissima ijs qui sese iactare, & ingenioli, argutiarumque nonnullarum specimen aliquod ostentare volunt: necnon si miro quodam modo iis placet Asiaticum scribendi genus sulum, profluens, dilatatum ac dissolutum. Hoc enim est proximè Poëtas imitari, qui rebus còfingendis, & pro libito excogitandis longè vberius fusiúsque dixerunt, quàm si vera, & ad fidè historiæ referenda còscripsisset. Veritas enim ipsa per se lucet, & intra quasdam orationis angustias coërcita, ipsa tamen sese suo nutu sustinet ac tuetur. Quæ verò finguntur, ea orationis diuitiis funduntur, manant & aperiuntur, nec in legentium animos prius influunt, quàm ornatu oratorio, fūco, vestitūque insigniuntur: cum res fictæ, mutæ, inopesque dicendi sui fastidio quemq; à se abalienent. At πολυλογία facile mendacium falsitatemque prætexit & subornat: quod nudè apertæ, contractæ ac conclusæ orationi non contingit. At Hippocrates concisè res

AD LECTOREM.

descripfit, fateor, sed peculiari in dictum quodque cō-
mento opus non fuit, cum ex reliquis libris explicatio
eruat. Præterea quodammodo præuidebat (vt quis-
que sapiens conscius sui, nisi φιλοτιμία animum per-
strinxerit, rerum suarum iudex est & arbiter) tanti
sua scripta posteris futura, vt omnes gregatim, pro sua
quisque parte, de illis illustrandis decorandisque labo-
rarent. At de nobis longè aliter est. Nā eā virgulā non
obtigit, vt credamus fore aliquos qui fœtus inchoatos
abortiuosque ingenij nostri perficiant: nec item nobis
licet esse tam politis. Præterea non est ea nostri inge-
nij vbertas vt plura parturiat, nec vt à posteris id expe-
ctemus quod diuini Hippocratis vis penè suo iure ven-
dicauit. Idem in libris Hippocr. euenit ac si quis in lo-
cupletem domū venerit non explicata veste, nec auro,
nec argento, nec tabulis propalam collocatis, sed ma-
gnificis omnibus rebus constructis ac reconditis. Sic
in Hippocratis libris diuitias & ornamenta illius in-
genij solum per quædam inuolucra & integumenta
perspicere licet. Maximè vero id nos impulit vt stylum
nostrum acueremus, ne scribendi inertia & negligen-
tia obtunderetur ac hebesceret. Prout enim in quoque
eximia quædam est indoles ad aliquid agendum, ita eā
ipsam explicabit: vt si quando educamur ex domestica
exercitatione & umbratili mediū in agmen, in puluere
& in palestram, nō modò ingenij, sed & orationis vis
aliqua appareat. Ad id maximè sumus incitati Cicero-
nis hortatu, qui stylum præstantissimum dicendi ma-
gistrum & effectorem esse ait. *Nam si subitam & fortuitā
orationem commentatio & cogitatio vincit, hanc ipsam profectò
assidua & diligens scriptura superabit.* Et qui à scribēdi consuetu-

AD LECTOREM.

dine ad dicendum venit, hanc affert facultatem ut si etiam subito dicat, tamē ea quæ dicuntur, similia scriptorum esse videantur, atque etiam si in dicendo scriptum afferat aliquid, reliqua similis oratio consequetur. Ut concitato nauigio cum remiges inhibuerunt, retinet tamen ipsa navis motum & cursum suum intermisso impetu pulsūque remorum: Sic in oratione perpetua cū scripta deficiunt, parem tamen retinet oratio ipsa cursum, scriptorum similitudine & vi concitata. At eloquentia non pelluntur morbi, nec etiā absurditate verborum & balbutie, sed honestum est omnes artifices, in suo quemque genere, propriis & aptis ad id quod tractant, verbis uti: ut tametsi quis arte & ingenio valeat, culpa tamen non careat, si lingua hesitet, si voce sit absonus, si vultu motūque corporis vastus atque agrestis. Quæ nos dum cogitaremus, in id studium nos coniecimus ē quo tandem aliquando & fructum maximum capi posse putauimus, & linguæ volubilitatem, verborum flumen, rerum & sententiarū vbertatem manare. Nō quod placeat eorum medicorum industria qui tales ex Commentario euadunt, ut si liber deficiat, ieiuni & tenues appareant, si suppetat vberes & abundantes, sed cū ipsi thesauro memorię credere multa oporteat, quæ in apertum vsumque aliquando depromamus & efferamus, non alienum quoque erit in libris penu promptuariūque aliquod statuere, ē quo breui tempore id compendio comparemus, quod in amplissimo voluminum pelago non nisi lōgo tempore colligere ac venari possimus. Hic noster labor, si quando in quorundam manus deuenierit, eos obsecro obtestorque ut æqui consulant. Atque existiment nos id propositi instituti que habere, ut in seria magis studia operam nostram conuertamus, si quando

AD LECTOREM.

(cū DEO) pax constans otium maius est confirma-
tura. Quis enim in tantis bellorum tumultibus, animo-
rum ardoribus, & fluctibus, tranquillo pacatōque
animo esse possit, cū vix Rempublicam regnūque
totum respirare posse omnes intelligant, nisi armis aut
conditione positis, aut defatigatione abiectis, aut vi-
ctoria detractis? Si tamen Deus tantum impetum re-
presserit, flammam facēsque ipsas ardentes extin-
xerit, dissidentēsque animos composuerit, firmōque
necessitudinis vinculo copulauerit, dum Musis sua fe-
renitas & tranquillitas reddita fuerit, optimo freti otio
maiora praestantioraque praestituros nos pollicemur.
Vale octauo Calend. Nouemb. 1575.

AD LECTOREM.

ADMONITIO.



VI libris conscribendis operam dare solent, dum varium hominum iudicium subeunt, sæpe nonnihil de fama detrahi sentiunt, sæpe falsò accersuntur. Et sic cum variè quosdam distrahi videant, malunt otio & literis abuti cum Græcè Latineque docti aliquid præclari edere possint, quàm nomine periclitando, ingenii specimen efferre. Alij in eo laborant quidem, sed timidiusculè, dum opinionum fluctus pertimescunt. Aliis plus animi superesse videmus, sed cum præfractius audaciùsque aliquid moliantur, supercilium nimis attollunt, & nimio sui amore capti, dum inani gloriolæ vento feruntur, ridendi sui occasionem porrigunt. At placet magis eorum consilium, qui timidiùs aliquid aggredi solent. Qui enim libros scribit, siue parietum angustiis coërcitos, siue aliquando prodituros, in eadem est ipse fortuna, in qua is qui spectante Roscio in scenam prodierit, siquidem non rarò hominum fallit expectationem. Quanquam audendum aliquid, præsertim cum nò mordeantur scripta ab iis quibus natura meliorem quandam indolem indulxit. Quis porrò dubitat non esse propensionem ad maledicendum homini ignorantiam & infantiam, quàm paucorum coctam prudentiam? Quid porrò ignaro, cum homine polito & sapiente? Nec enim licet cum eo iusto sacramento contendere. Nisi nos magis mouet

AD LECTOREM.

quorundam improbitas & vafrities, qui ambitiosè tristes in alienis aestimandis omnia suspendunt, quò plus aliis sapere videantur. Edant tandem aliquid ut ambitioni suæ faciant satis: nam dum eorum aestimabitur labor, habebunt fortè quo suam tristitiam leniant. Alij minimè boni sunt, qui in alieno opere nimium ingeniosi esse solent. Nec mirum, herclè, si ut quisque est indoctissimus & insulsißimus, ita doctissimū quemque & politicissimū petit, & traducit. Id verò maiore licentiâ fit, quoniam nulla lex constituta est in eos qui falsò aliis contradicunt: maximè cum id de instituto fit, ut intelligentiores (sic enim dicam) plebeiis & mulierculis esse videantur. At lex sanxit ut qui falsò aliquem accusarit, eadè pœna multaretur, qua & reus, si de crimine convictus esset: cur nò eodem fine contendere licet cum iis qui aliorum scripta iniquiùs traducunt. Quod si statuta lex esset hominum improborum temeritas sic cohiberetur, & doctis via ad agendum audendumque securior aperiretur. Lutetiæ Parisiorum Idib. Nouembris 1575.



G V L I E L M I
B A L L O N I I

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,
CONSILIORVM MEDICINALIVM
LIBER SECVNDVS.

HISTORIA PRIMA.



I OANNES TASSINVS
calidus temperie & siccus, veneri
indulgens (vt ferebatur) vertigi-
ne oppressus, linguaue minimè
continens repente concidit. Obmu-
tuit. Paulo antè graui metu per-
cussus fuerat. Fandi impotens quidem, alloquenti-
bus annuebat. Designabat locum dolentem ad dextras
lateris dextri partes, quâ septum alluit. Frontem ac
tempora contingentì, adurens flammeûsque calor per-
cipiebatur. Paroxysmo solutus intolerabili capitis
dolore captum se narrabat. Ex interuallis exiliebat,

Tomus II.

A

2 CONSILIORVM MEDICINALIVM
insultabátque phreniticorum more, non conuelleba-
tur. Deinde obtumescebat, & velut sopore vigilanti
occupatus delirioque iacebat. Dein rursus exiliebat.
indecore se componens, omniaque proiciens. Ad se
rediit multis ultrò, citrò tentatis. Dextrum latus do-
lere narrabat, & sinistrum antè doluisse. Olim san-
guinem ore reiectauerat affatim. Venam secumimus.
A secta vena repetit malum: cœpitque statâ periodo
reuertere idque noctu. Restitutus tandem dereliquis
doloris in latere & capite querebatur, febre carebat
urina non illaudabiles. Nisi sedula custodia impedi-
tus, horrenda fecisset. Spiratio frequens, parua, non
magna rara, licet delirus. Aliquando parum elato
pectore spirabat frequens & humile, Ilia ducendo
Hypochondriacum aliquid congenitum erat. Pulmo-
nicum quid putabant: aut à pure vaporem, aut tu-
berculum, aut conuulsionem articulorum pulmonis
aut adhesum, sectio, vstio, aut maturatio flagita-
batur. Omnia in ancipitierant. Alij Ephialtem, aut
Hypochondriacum suspicabantur. Post magnam
purgationem conualuit. Eruperant paulò antè am-
biustis similes pustula? an quia splenicus? ultima de-
iectiones albicabant: An quia abscessus ruptus est?
Præter spem salus.

COMMENTARIVS.



DMIRABILE aliquid atque stupendum hæc habuit historia, quod ferè & inuasionis modus, & progressus, & euentus nescio quid habuerit communem aliorum morborum sortem superans. Sannus erat & integrâ fruens valetudine, nisi quod aliquando de latere dextro quereretur, aliquando de Hypochondrio sinistro. At id quod in vtrâque parte sentiebatur, non credebatur tanti esse, vt propterea medicorum aduocato consilio, eius ratio & cura haberetur. In progressu & euentu non minimùm quoque admirationis fuit. Hærebamus in eo vt causa quæreretur huius mali, nec tantùm hoc, sed cur certa statâque periodo rediret. Quanquã non dubitamus nil in natura fieri, siue ad valetudinem, siue ad morbũ, siue ad cibum & potũ siue ad humores, siue ad actiones muniãque naturæ pertineat, sine periodo & certa circuitione. Immò dum loquitur Hipp. de oculorum firmitate, quæ cùm adest, longioris vitæ nota est, sin minus, breuioris, vult impari anno hominẽ mori, si impari anno oculorũ vis pereat. Et in eodẽ loco idem Hipp. Dierum imparitatem in magnis temporis & ætatis puerorum mutationibus obseruat. Euentus verò valdè fefellit, quod mortis potius quã vllius melioris fati spes foret aliqua. Quod tam repenti infortunius hoc malum inuaserit, id primus obseruat Hippo. qui generaliter de omnibus morbis pronuncians ita scribit, *ἡ ἐνθάδε αἰτία τῶν πῶς ἀνθρώποις προσγίνῃ, ἀλλὰ καὶ μικρὸν συλλεγόμενα, ἀπὸ τοῦ ἐμφανέος, signum* non derrepente morbi hominibus accedũt, sed quæ sensim collecta sunt, affatim magnòque insultu sese produnt ac proferunt. Nec enim tam subita est ad opprimendum generatio, quã ipsius adorsio & insultus. Sed cùm corpus iam semen morbi in se conceptum fouet & alit, minima etiam occasione detegitur ac elucescit. Quod omnium apertissimè Galenus explicat his verbis, in comment. in quartum τὸ ἐξέον: *Corpore nostro ad morbosam dispositionem parato, ita vt propè completa iam sit, quippiam obueniens eam manifestat. Nam vel febrem accendit, vel catarrhum prouocat, vel capitis dolorem excitat. Deinde ex eo continenter ad morbosæ dispositionis affectionem & preparationem non sine periculo lan-*

Dolores fugaces non sunt negligendi.

Periodus in omnibus rebus.

Impari anno mors. Quomodo docule- rum firmitas dicitur. nioris vite signum.

Par. 125. lib. 4. acutioris.

4. CONSILIORVM MEDICINALIVM

guent. Pluráque eo loci ea de re conscripta sunt, quibus de-
 monstratur quanta sit vis causarum *περὶ τὰ πικρὰ*, in morbis exci-
 tandis, non generandis. Aliud enim est *παροξύνει*, aliud *γενέσθαι*.
 Causa externa morbum quidem, aut dispositionem aliquam
 sui generis excitat, vt insolatio dolorem capitis à simplici in-
 temperie, sed propriè dictos morbos non generat, sed ad exci-
 tandum, irritandumque aliquid confert. Quod à me in libro
 consiliorum pluribus dictum est ad evertendam eorum opinio-
 nem, qui causas procatareticas in morborum diagnosi pro ni-
 hilo ducendas putant. Duo hoc loco disputare non erit præter
 rem, prius cum tantus calor fuerit in capite quomodo non fe-
 bricitarit? Et an tantus morbus sine febre esse potuerit, accedit
 & illud, quod ista additio in ægris, *sine febre erat*, ἀπὸ τοῦ ἐν, vel
 ἀπὸ τοῦ, non temerè ab Hippocrate ad rerum distinctionem vsur-
 patur. Non potuisse esse sine febre ex eo contendere posset
 quis primùm quòd omnis penè morbus febris sit, quòd nullus
 sine febre sit, quòd nullus sine febre moriatur. Sed hæc à Noëstis
 non sunt audienda. Omnis morbus febris dicitur, quòd nul-
 lus ferè sit æquè communis ac febris, & qui facilius occurrat, &
 quòd ferè omni morbo comitatum præbeat. Quod Hippoc.
 distinctè pronuntiat, *Communissimus morbus febrilis est, siue febris*
ipsa, & omnium morborum comes est, præsertim tamen ex inflammatio-
ne, & tensione abscessuum: quod non abs re adiectum est, vt exclu-
 dantur morbi aliquot frigidissimi quorum febres comites non
 sunt. Id plenius Gal. explicauit his verbis: *Omnino in acutis mor-*
bis febres sunt continuæ: Rari enim sunt ex ipsis quibus febres non ad-
sunt continuæ ut apoplexia, & in septimo Aphor. lib. 1. febres con-
tinuæ sunt inseparabiles à morbis acutis: quod bifariam audiendum,
 vel quòd nullus sit morbus acutus, cui non annexa sit febris,
 vel quòd quæ febres continuæ morbis acutis annectuntur, hæc
 simul & incipiunt, & desinunt cum morbo acuto. Et id est
 ἀρξέσθαι & γένεσθαι. Non placet prior explicatio, posterior probabi-
 lis est. Cum nemo dicitur sine febre mori, id de febre mara-
 mode audiendum est. Sed ad hæc omnia illud adiici potest,
 quod latissimè patet. Ex morbis quidam sunt febres ipsæ,
 quidam febres comites habent, atque eæ comites febres ali-
 quando nihil habent ἀξίολογον, vt dicatur æger febrere nec ne, nil in-
 terfit: aliquando sunt magni momenti. Aliàs mites sunt ad-
 modum, aut saltem tales apparent, cum in recessu perniciem

Externa
 causa ut
 morbum
 generet.

Calor
 sumus in
 capite an
 cum fe-
 bre.

Quibus
 in mor-
 bis sit
 febris.

Quid sit
 febrem à
 morbo
 acuto
 non se-
 parari.

LIBER SECVNDVS.

5

moliantur³, vt febres hæ quæ partis alicuius principis *σαστορεν* ^{s. de morbis mulierum} sequuntur, ægri enim sine sensu, & nil tale cogitantibus medicis moriuntur. Et hoc bonorum omnium autor Hippo. obseruat qui dum loquitur de febre quæ vitium in vtero & perniciem iam perfectam consequitur, ait *πύς*, esse *βληχέον*, id est febrem esse mitem & mansuetam, vt videtur. Et hac nostra memoria à corruptione vteri obseruatum est primates mulieres interiisse, febre latente & blandè agras tractante, quod expectationem spemque medicorum non sine infamiæ nota & ignorantia suspitione decepit. Præter istas differentias febris nunquam à quoquam obseruatas, est & aliquid peculiare in febribus obseruandum. Aliquando enim vis ipsius febris in partem aliquam sæuit, vt æger tantum vel se capite dolere dicat, vel renes, vel aliquam afficiat partem, vt febris aliquo modo *νεφελικὴ* dicatur. De quo plenius in alia historia dicturos pollicemur. ^{Hoc a perissimis vult Gal. comm. in part. 18. lib. 1. Protrh.} Quod euenire puto, vel cum peculiaris in parte aliqua infirmitas est & vitium, vel cum febris ipsius subiectum est potius teter quidam vapor, qui prout, vel in illas parteis, vel in illas repit, ita quoque sui notas & signa exhibet. Quod & exemplis illustrandum est, & auctoritate, quoniam ad id quod hoc loco tractatur, maximè pertinet. Audiuius obseruatum esse ab Hippocrate in Coacis (quoniam nondum locum legisse contigit) rigores aut horrores inanes in febrium paroxysmis translationem in caput afferre symptomaticam, id est, dum effertur vapor febrilis à foco, aut tenuis ichor qui naturam perturbans, & calorem afficiens, eundem foris intrò reuocat, vnde aut rigor, aut frigus insequitur periodicum. Quod si hoc frustra fiat, & potius rectà caput vapor appetat, ac si constituatur firmeturque sedes in capite, dolor oboritur sæuissimus, & adurentis in toto capite coloris sensus excitatur: in cæteris partibus nil simile percipitur. Et vulgus se febrem in capite habere narrat. Item in passim vagantibus febribus periodicis, cum semen morbi extinctum videretur, certis quibusdam diebus, ac si nouus paroxysmus suscitandus foret, calor aut in capite summus, aut in alia parte, & dolor excitatur: quod fit aut ob paucitatem materiæ, aut quia ea nondum satis apta est ad putrendum & motum. Denique in febrium ineuntibus paroxysmis præter consuetudinem quædam symptomata apparent, aut ingens capitis solius dolor, aut brachij, aut cruris, aut velut incubus,

A iij

CONSILIORVM MEDICINALIVM

Descriptio
bas. c. 9.
lib. 3.
 aut suffocatio, nonnullis quædam contractiunculæ conuulsio-
 nibus similes non autem manifestus quidam calor apparet in
 in toto corpore, à quo febris suam essentiã nanciscitur. Quod
 fit, meo iudicio, propter aliquam separationem & secretionem
 materiei, quæ non per venas, sed per arterias aut nervos, aut
 inanes quosdam meandros irrepens insolentia quædam sym-
 ptomata procreat ac progignit. Quod & confirmant ea quæ
 scripsit Gal. dum rationem reddit cur in principiis febrium ali-
 quando delirent ægri, aut strangulentur, aut suffocentur, aut ter-
 rificum aliquid patiantur, aut etiam sæpè moriantur. Et Hipp.
 de iis scripsit, in principiis febrium siue delirium accesserit, siue
 alicuius membri sideratio, periturum hominem sciendum est,
 si non optimum aliquod signum apparuerit. Ex quibus om-
 nibus apparet contingere sæpè vt moueatur materia tum suo
 ipsius nutu atque sponte, vtpotè animata & excitata suo spiritu
 & ichore (nullus enim humor sine aut flatu aut ichore citò im-
 pellitur) tum naturæ vi pellente, & tum in partem aliquam vis
 atque impetus iste & impressio redundat. Quod huic ægro
 nostro contigisse certum est. Vnde quæri posset, an satius sit
 in vnam tantum partem viam istius tempestatis febrilis redun-
 dasse, an in totum corpus. Nam si in totum corpus malum
 æquabiliter repat, plures & partes & facultates læduntur. Con-
 tra melius esset diffundi hoc totum virus, & in multas corporis
 partes dissipari, quam ita confertim & gregatim in vnam prin-
 cipem partem insultasse atque impetu ruisse. Finem facturus,
 commemorabilem locum, & ad rem maximè pertinentem ad-
 ducam, vt appareat, quomodo humor in corpore diu stabulatus
 & suppressus, visus sit tandem, quâ data porta, irruisse in par-
 tem aliquam, & grauissimè illam labefecisse. Hippocratis hæc
 verba sunt. Quibus lumborum tenues & diurni dolores, &
Part. 8.
lib. 3.
Præf.
 ad Hypochondrium reducti reuocatique, & ciborum auersio
 cum febre, dolor is valens intentusque ad caput perueniens ci-
 tò cum quadam conuulsione interint. Id est, sæpè circum Hy-
 pochondria latet humor, qui diuturnitate malitiã acquisitã dum
 sequit, furit ac virus exerit, dum caput appetit horrenda sympto-
 mata inuehit, fusio-rem explanationem adduximus in nostris
 Consiliis, & in libro Definitionum nostrarum. Tertiã partem
 ex tribus propositis, nimirum cur Hippo. sæpè addat, ἀνέμενε
 ἀνέμενε, aut ἀνέμενε, paulò post explicabimus, vt rerum vite-
 tur confusio.

*Calidus succus.*TEX.
TVS.

Hoc additur ad explicationem eorum quæ postea dicentur. Nam paulò post dicitur linguæ incontinens factus fuisse, quod affectionis melancholicæ index est ex Gal. vt postea, apparebit. Item cum ex inspectione faciei, capilli, oculorum & habitus, aliquid fouere Hypochondriacum suspicio fuit. Et non abs re. Nam euentus docuit latitasse nescio quid iam diu in utròque Hypochondrio præsertim in sinistro, quod tam diri morbi occasio ac parens fuerit. Cæterùm duo melancholicorū genera, reperio vnū per se, alterum per accidens. Per se quidem vt qui calido & sicco sunt temperamento, hirsuti & squallidi sunt, præsertim si angustiores venas habent. Nam ex gracilibus quidam sunt *ἐμπροσθεν*, vt 6. Epid. alij sunt *λεπτοσθενες*. Quibus angustia vasorum est, iis maior est in Hypochondriacam affectionem propensio¹⁰. Per accidens verò vt sanguinei temperamento. Nam dum corpus *δυσδιαφορτικόν* redditur, aut aliqua alia causa inciderit faciliè massam sanguinis alterans, faciliè sanguis denigrescit. Et in eiusmodi sanguineis est quædam *ὀργή*, sed est cum toruitare quadam & mæsto vultu. Quod Hippoc. *Part. 17. lib. 2.* animaduertit paucis verbis explicans posterius genus melancholicorum: & amplissimè Galenus in Commentario explicat *Protr. lib. 2. Epid. 2.* & alio in loco. Et prout est dispositio & inclinatio ad melancholicum temperamentum, ita & ad *τὸ ὑποχονδριακόν*. Vide plura initio Tomi primi Consiliorum.

*Veneri indulgens.*¹¹

Hæc causa esse potest fortè cur cerebrum infirmius redditum sit, & ideo ad vim morbi excipiendam opportunius. Nam vt Hipp. docet, *Semen robustissimum est quid, quoniam à veneris usu etiam minime excreta, imbecilles efficiuntur.* Venus digerit, deficit & dissipat: non tam quia (vt ait Gal.) corpus virosum excernitur, quam quia multi coeffunduntur spiritus, & ipsa voluntas per se etiam resoluit. Hippo. verò vsum veneris calfacere, nedum refrigerare ait, non solum propter motum ipsum qui calfacit, sed ob frigiditatis excretionem. *Costus*, ait, *humectat, calfacit*¹². *Calfacit ob laborem & frigiditatis excretionem: At- de Diag. tenuat ob euacuationem: humectat ob colligationis reliquias in corpore*¹³.

8 CONSILIORVM MEDICINALIVM

factas. Sed cur semen ipsum excretum frigiditatem vocat? Bifariam hoc debet intelligi, vel quia semen cum sit quid defectum è parte spermatica, quæ natura frigida est, frigidum sit ex se, calidum ob spirituum perfusionem. Item omne aqueum ratione sui frigidum est. Quomodo sanguis natura frigidus ab eodem Hippocrate statuitur. Vel excerni frigiditas dicitur, quoniam diffunditur per coitum pituita & serosum pituitosumque excrementum, cuius excretio iuuat. Quomodo Hippo. voluit veneris vsum frigidis, & à pituita natis morbis conducere. Quod Aristoteles amplius explicauit.

*Aristoteles 1.
Proble-
matum.
Par. 42.
lib. 4.
acuto.*

Vertigine oppressus, linguaque minimè continens concidit.

Ob inordinatum spirituum motum vertigines fieri, ac præsertim animalium illud iam testatum est. Et non mirum si elati infernè vapores præsertim maligni dum percellunt spiritus animales & perturbant, vertiginem inducunt. In iis enim potius spectatur qualitas cerebrò infensa quam quantitas. Alioqui à cibo dum blandus somnus nos capit vertiginosi redderemur. Eam vertiginem quæ egrum nostrum præhedit, calorem capitis summum & arteriarum pulsum Hippo. quasi hanc historiam describens, & Galenus in Commento ad viuum expressit: *Quibus in febribus vertigines à principio & capitis pulsus sunt, his ad iudicationem usque febris accessio fit, si delirent, nil mirum. Gal. in com. ait contingere, ut ab initio febres moderata sint, sed symptomata caput infestent, ob exustionem, vel exhalationem humorum in ventriculi corpore contentorum. Et paulò antè, cum caput circum agi videtur dicitur, cum tenebricosum quid obuersatur, Quotidius appellatur. Fit ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel localem in cerebro generationem habet, vel sursum ex infernis fertur partibus. Et quod notandum est, scribit omnes has tenebricosas dispositiones medium quoddam tenere inter id quod periculo vacat, & periculosum. Nam cum natura, siue caliditas natiua conatur humores fundere ac dissoluere, in hoc vis eius quidem apparet, quia si extremè languida foret, quod apparet vocat Hippo. ne aggrediretur quidem, sed quia omnino extenuare ipsos vapores, & per insensiles meatus excernere non potest, in hoc languere dicitur ad aliquid, non omnino. Sic languor iste non est periculosus facta comparatione ad*

*Part. 23.
sect. 5.
lib. 6.
Epid.*

LIBER SECVNDVS. 9

τῷ ἀφροδίτῳ. Et in eo sensu sudor dicitur signum esse & naturæ validæ & imbecillæ. Validæ quidem, quia conatus iste & vis in excernendo robur aliquod designat: imbecillæ autem, quia si naturalis calor omnino validus esset, non in sudorem, sed in quid tenuius & fuliginem reliquias istas conuerteret ac comminueret. Quod non intellexit Diocles. Atque inter ea quæ ex Commentario prædicto excerpti possunt notare maximè oportet initio febrium, siue febris manifesta sit, siue principium tantum sit febris, siue conatus tantum naturæ, cum alioqui omnia mitia sint satis, caput aliquando inuadi solere à vapore maligno qui caput percellens & replens, & velut localem in cerebro febrem pariens pulsum in temporibus, & capite afferat, vertigines & deliria, ob cerebri quandam alterationem, id est, præsertim si cerebrum imbecillius naturâ sit, & eò inclinet humor.

Lingua incontinens.

Apud Hippocratem reperio, τῆς γλώσσης ἀκράτεια, & τῶν χειρῶν ἀκράτεια. In Aphorismis, Si lingua derepentè incontinens fuerit, aut pars aliqua clangueat, id melancholicum est. In Epid. οἱ παραλύοντες χειρῶν μὴ ἀκράτεις εἰσιν. Qui lingua offendunt, verba repetentes subindè, & labiis moderari nequeunt. Malè enim pro χειρῶν, legunt γλῶσσης. Nisi fortè tolerabilis dicatur lectio vt consonet cum illa particula superioris Aphorismi, Si pars aliqua velut attonita clangueat, quod τῶν χειρῶν ἀκράτεια, apoplecticum aliquid habeat. Tamen nullo modo probatur posterior lectio. Porro lingua ἀκράτεια, dicitur quæ ita infirma est vt non integrè vocem dearticulet, vel quæ immota sit ac velut exoluta. Sed quid hoc significat? Melancholicam affectionem. Galenus hoc probare non potest. τὸ μελαγχολικόν, non humorem melancholicum, aut atrabilarium significat, sed affectum melancholicum à tali humore natum. Vnde cum dixit, verè τὰ μελαγχολικά, id est, affectus melancholici à Dominatu atræ bilis. Sed paulò altiùs ascendamus. Loci sunt apud Hippocratem ex quibus fortè demonstrationem horum eruemus. In 2. Epid. βλάσι, calui, lingua hæsitantes morbos valdè melancholicos patiuntur, & hirsuti quoque, τὰ γαστήρια τῶν ἰσχυρῶς μελαγχολικῶν. Et alio loco βλάσι & qui celeri lingua sunt, melancholici sunt. Sed in

Tomus II.

Apho.
40. lib.
7.

sectio 5.
lib. 2.
Epid.

3. Apho-
rismi.

sect. 5.

B

10 CONSILIORVM MEDICINALIVM

hoc differant omnes loci isti adducti quod cum dicit in Aphorismis, Si lingua repente incontinens fiat, de morbosa affectione sermo est. Cum verò dicit hirsutos, caluos, & blasos melancholicis morbis obnoxios, de sanis sermo est. Nunc ad rem reuerſi videamus an incontinentia linguæ, & ſi cui pars ſtatim elanguet, melancholicæ affectionis ſignum ſit. Metum & mœſtitiam melancholicum quid eſſe aſſeuerat Gal. item Elephantum & cancos, at non poteſt ſibi perſuadere humoris melancholici effectus eſſe, linguæ incontinentiam, & ἀποπληξιν quid. Tamen quid Galenus reſponderet Hippo. in libris de morbis (quos Galenus Hippocrati adſcribit) vbi Hippo. aphoniam ſubitam, & incontinentiam lingue, membrorumque impotentiam atræ bili aſcribit? Verba ſunt hæc, repente dolor caput occupat, & vox deficit. Intra dies ſeptem perit, niſi febris ſuperuenerit. Si adſuerit, euadit. Hæc patitur cum atrabilis, Græcè μέλαινα χολή, In capite commota fuerit, maximè verò qua parte multæ venæ fuerint, vt in collo & pectore. Hic viſes à melâcholico humore hæc ſymptomata naſci quod Galenus nō vult. Ac primū credo atrabilarium humorem verè mœrorem & mœſtitiam, & pauores parere, & deliria melancholica, at ſuccus melancholicus apoplexias, ſiderationes, attonitū morbum, quæſus, & reſolutiones membrorum afferre poteſt. Itaq; in illo loco lib. 2. de morbis, μέλαινα χολή, malè vertitur, atra bilis, potiùs ſuccus melancholicus verti debet. Sic conciliare locos autorum oportet. Quod placet Galeno in comm. Apho. qui fatetur quidem ſuccum melancholicum apoplexias, & conſimiles affectus parere poſſe, quatenus ratione craſſitiei communicat cum pituita, non autem quatenus ad atram bilem vergit. Id eſt, in ſucco melancholico vel qualitas, vel ſubſtantia ſpectatur, ſi ſubſtantia, paralyſis, impotentia, obſtructio inde gigni poteſt, ſi qualitas, vt quæ ob empyreuma, & aſſationem acquiritur, ea atrabilarium quid habet potiùs. Et ex hiftoria de Pythione apparet, humoris quantitatem comatoſas potiùs affectiones & oppreſſionem afferre, qualitatem verò deliria. Quod valdè notandum eſt. Et id duobus ex locis Galeni apparebit. Prior eſt in 4. Aphoriſmorum, ſi multitudo humorum magis ad atræ bilis naturam vergat, pauores ſiunt & timores, ſimius, id eſt, ſi reſipiat naturā pituitæ aut alius humoris, labores & conuulſiones oboriuntur. Alius locus eſt quo docet mor-

Lib. 2.
de mor-
bis non
longè ab
apoplexia.

Aph. 40.
lib. 7.

Hift. 1.
lib. 3.
Epid.

Aph. 67.
lib. 4.

Aph. 55.
lib. 6.

LIBER SECVNDVS.

11

bos hyemales potius ob materie quantitatē fieri, autumnales ob qualitatem. Ista porro est qualitas quæ atrabilarios affectus parit, quantitas verò, siue sit humoris pituitosi verè dicti, siue melancholici affinitate pituitosum attingentis, oppressiones & obstructiones parit potius. Accedit & ad hos locos illud Hippoc. supra adductum, cum ait & blæfos, & hirsutos melancholicis morbis implicari illud quod dicitur, multum habet energiae, & fortè nunquam obseruatum. Nomine blæforū intelligit morbos melancholicos improprie dictos, qui à pituita verè nascuntur, quæ ob similitudinem tantum quandam succus melancholicus dicitur, nomine hirsutorum quos *δυσίσι* vocat, eos intelligit qui proprie melancholico succo abundant. Et blæsi, resolutiones patiuntur attonitosque morbos, hirsuti, atrabilarios, qui à qualitate potius quàm à quantitate nascuntur. Docuimus enim paulò ante hirsutos proprie melancholicos effici. Vnum adiiciam (quod scio ridiculum fore quibusdam, tamen habet aliquid acutum) cum quis derepente linguæ incontinens fit & mutus, *μελαγχολικόν*: id est, vulgus putat à perturbatione animi & mœrore, per contractionem viscerum & animi angustias id esse. Est enim politicus loquendi modus: & qui à graui animi pathemate in morbum incidunt, ij sepè obmutescunt in accessionibus.

Sectione
5. lib. 2.
Epid.

Quando
aqua
plenum
est cere-
brum.

Obmutuit.

Aliud est obmutescere ægrum, aliud voce defici atque destitui. Hoc enim maius est. Et vtrumque quidam confundunt, & male quidem. Erroris fortè occasio fuit, quòd aliquando apud Hippo. *φωνή & αὐδή*, idem sint: vt cum in Epid. scribit, *φωνῆς λυομένης πάντα λέγεται*. Nomen *φωνῆς αὐτῇ τῆς αὐδῆς* sumitur. Pueri enim non sunt *ἄφωνοι*, sed *ἄναυδοι*: quia vocem articulare nequeunt, vt potè voci seruientibus vinculis nondum expeditis. Et muti *ἄλλα* dicuntur, non quod sonum edant & vocem, sed quia articulare nequeunt. Caterum vera & germana distinctio inter *ἄναυδοι* & *ἄφωνοι*, petenda ex historia de Pythione, non ea quæ prima est in tertio Epid. vbi grauius multò esse apparet *ἄφωνοι* esse quàm *ἄναυδοι*, cū vocis priuatio, sub qua & sibilus, & fletus, & risus continetur, quid sit deterius quàm orationis & sermonis quem *αὐδή* Græci vocant. Et ex Homero citat Achil-
lis equum humana voce loquutum quem *ἀνδρὲντα ἵππον* vocat, non

Histo. 3.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

B ij

12. CONSILIORVM MEDICINALIVM

erat autem ἀσθενος, sed αἰσίδης. Extremæ enim aut imbecillitatis, aut oppressionis cerebri, aut extinctionis caloris naturalis αἰσίδης est argumentum. Itaque & syncopas cardiacas, & apoplexias, & caros & catalepseis τῆς ἀσθενίας, nomine & ambitu concludit, quod à communi tanquam symptomate, nempe vocis ademptione (id enim vox hæc sonat) καὶ ἡσυχία intelligit, aut offensionem, aut abolitionem omnium actionum voluntatis nostræ arbitrio susceptarum, & ex aphonis quidam sentiunt, alij non. Cum vnà cum motu sensus aboletur, tunc propriè aponia dicitur, & eo modo tum ἀπὸ πλῆντος, tum καὶ ἐν μέρει ἀπὸ πλῆντος. Quod in Prorrhethico abundè docet Galenus his verbis: *Quin in morbis acutis ἀπὸ πλῆντος sunt quidam horum non sentiunt ob principij affectionem, virisque ipsos sequentibus symptomatis, alij dumtaxat voce priuantur, atque horum quidam læsis etiam omnibus quæ ex voluntate dependent actionibus, alij sola voce oblata. Si igitur tum vocis, tum aliarum functionum oblatio est, principij nervorum affectio est, si solius vocis, solum voci seruientium organorum.* At in acutis morbis ἀπὸ πλῆντος deterius quid est, quàm si quis de repente voce deficiatur. In acutis enim extremæ imbecillitatis, & extinctionis caloris signum est, in sanis aut longis morbis oppressionem significat. Nam si febris succedat, sæpè talis aphonie occasio tollitur, ut passim Hippocrates annotauit. Cæterum ne rerum confusio sequatur ex verbis, placet eorum interpretatio qui αἰσίδης, mutos vocant, ut pote sermonem proferre nequeunt, ἀσθενος, non mutos, sed voce priuatos, & defectos, ut nil planè obaudiatur, nec articulatum, nec alio modo sonans.

Comm.
ad par-
ticulam
23. ii. 4
acutiorii

Com. ad
Aph. 5.
lib. 6.

Com. in
part. 17.
lib. 1
Prorrh.

2. de
morbo. 4
Aphor.
5. 6.
5. 5.

Gravi metu percussus fuerat.

Metus grauis præsertim magnas habet vires ad habitum corporis immutandum, & totā naturæ œconomiam euertendam aut dissipandam. Inimò nos fatemur vidisse quendam cui metus mortis à grassatoribus incussus fuerat, qui inde in febrem continuam incidit, cum alui & omniū penè partium corporis magna perturbatione: sed inter cætera magna in systole & diastole pulsus erat inæqualitas, immò terna quaque pulsatione aliquid erat insolens & anomalon, qualiter in moribundis solet euenire. Et nisi de illa externa occasione constitisset, certè potiùs mortis opinio erat, quàm vlla salutis spes. Itaque ex

ternæ occasiones, quas passim Hippo. *αἰτίας* vocat, & *καὶ τὰς αἰτίας* *causas* valde sunt considerandæ, præsertim cum *causa* quid inopinatò accedit: vt constet an intrinsecus lateat causa, *causa ex* an forinsecus aduentarit. Nec abs re meminimus de metu in- *termis* cussio huic agro nostro, cum, paulò antè quàm decumberet, in- *co fide-* *ratio.* manus quorundam gladiatorum fortè incidisset. Nam cum illi, vxori, cui comes aderat, vim afferre conarentur, putauit vel vxoris pudicitiam certo subeundo periculo regendam, vel desperatione abiicienda esse arma. In quo pèrplexo negotio non potuit non magna animi iuxtà ac corporis concussio pèrturbatióque euenire. Sed si eo die *ἀπὸ τοῦ* cecidisset, ad fortunatum istum casum causa referri poterat, at tribus aut quatuor post diebus morbus contigit: Iuuare tamen potuit plurimùm ad tam infœlicis morbi generationem. Locus est insignis apud Hippo. quo facillè apparet aphonias eiusmodi occasione inueniri posse. Et idem locus ad disputationem & examen *μετὰ ἀφονίας*, *Part. 23.* conferet plurimùm, Verba sunt, Quod quis repente *ἀπὸ τοῦ* fiat *lib. 4.* id faciunt venarum *ἀπὸ τοῦ*, si sano absque occasione, vel forti *αἰτίᾳ* *causa* contigerit. Tria in com. ex hac sententia venari possumus: Primum quod sententia Galeni communi *ἀφονίας* nomi- ne contineri possunt Epilep. Apoplex. & syncopæ cardiacæ. Secundum vocat fortem aliquam occasionem aphoniasque causam, vel timorem, vel maximùm animi mœrorem. Tertium de causis aphonias in genere. Aponia, ait, fit vel læsis duntaxat iis quæ voci formandæ seruiunt instrumentis, vel iis quæ respirationi natura attribuit. Vel ob recentem exolutionem & afflictionem virtutis. Venarum interceptio & oppressio maximè causa est præsertim in sanis.

Designabat.

Obstupefactus erat, & eo modo pressus impeditusque maligno vapore infernè elato, vt tametsi fandi impotens esset, tamen doloris locum designaret. Aliquid enim erat quod sensus ligabat, & cerebrum afficiebat tanquam partem organicam, nō autem vt similem: in quo cerebro vt simili parte resider mens, & ratiocinandi libertas, vis & energia consistit¹⁵. Quid enim vult illud Hippo. cum ait nobis dormientibus actiones animi liberiores esse & perfectiores, quàm vigilantibus, quod

14 CONSILIORVM MEDICINALIVM

testantur præclari & illustres discursus *ἡ δὲ Σαρδία*, cum obstupē-
factis sensibus, & præeunte moderato victu cultūque, animo
veracia insomnia obliuuntur ac occurrunt? In cerebro vis du-
plex spectatur, vna animalis quæ ipsa morbo, vino, obstructio-
ne aut aliqua alia ratione impeditur, aut oblæditur, aut abole-
tur, alia ratiocinans, quæ ipsa per cerebrum fusa quidem esse
dicitur, & quæ in morbo impeditis etiamnum erecta ac expe-
dita sæpè apparet. Cū enim Hippo. scribit Epilepticos eorū-
dem & melancholicos fieri prout *τὸ ἀπώσθημα*, id est, causa morbi,
vel in *τῷ σώματι*, vel *ἐν τῷ νοῦ*: in cerebri corpus, vel in mentem, id
est, Galeno interprete, in temperamentum ipsius cerebri incli-
nauerit, nil aliud significat quàm aliter atque aliter lædi cere-
brum, vt quædam actiones obstupescant, aut imminuantur, aut
omnino obliterentur, aliis incolumibus. Admirabilis enim
successus & morborum mutatio in alios. Vnde Hipp. anno-
tat Epilepticos manicacos factos esse, & sic Epilepsia esse libera-
tos: Item maniam, summa mentis alienatione, & exitu è pote-
state ipsius mentis cessauisse, quod *ἐκπτώσις* vocant. Præterea ob-
seruati sunt quidam ægri qui delirarent, non meminissent, in
summa potus necessitate se non sitire pronuntiarent, vnguibus
in alios inuolarent, quod phreniticorum est, & tamen si quid
de Deo rebusque diuinis audirent, præclare philosopharentur,
in cæteris delirarent, quid hoc est, nisi quod aliàs vt animalis
pars cerebrum laborat, aliàs vis ratiocinandi (quæ in eo est
quid *ἡγεμονικόν*) erecta atque sana existit *καὶ ἡ φύσις ἡ καλλὸν*, ne quis
nos in verbo reprehendat? De his pluribus diceremus nisi rem
istam in opusculis nostris ampliùs tractauissemus. Æger noster
ita erat affectus, nam indecorè corpus componebat, sui diffi-
milis erat, infiliebat, iactabatur, inuitis omnibus euadere vole-
bat, quasi premeretur & vrgeretur re aliqua quam natura excu-
tere voluit, ideo violentos istos motus delirans suscipiebat, &
tamen locum designabat, cauebátque ne sibi vena aperiretur,
quod id sibi periculosum fore antè dixisset.

Flammeus adurénisque calor in fronte.

4. libro apho. Vbi calor, ibi morbus, vbi frigus, ibi morbus, quod præsertim
de locali affectione audiendum. Nam cū inflammatio in-
terna est, quæ reuocato ad se calore reddit extima frigida, mor-

bus tamen in extremis algentibus esse non dicitur. Et quod nunc adicitur de adurentis caloris perceptione, id declarat mali originem, aut potius sedem, nam origo à partibus imis erat, vt postea docebitur. Paulò autem demonstrauimus febrem quodammodo peculiarem esse in capite, facta ad illud translatione symptomatica: vnde ob venenatæ auræ appulsum quæ sacram cerebri sedem tetigit & perculit, alienus calor statim conceptus est. Quicquid enim in partem irruit, aliquid alienum excitans, illud refert ac resipit naturam causæ. Sæpè verò in arte nostra statutum est, humores diu suppressos & morâ, & si iam à primâ generatione mali erant, eò sæpè malignitatis & virulentia procedere, vt venenum adæquent. Caterùm in capite summi calor sensus erat, vt propterea vaporem calidum fuisse excitatum probabile fuerit, reliquum corpus calore quidem erat perfusum, sed eo mediocri. Reperio autem in plenitudine & caco chymia cum corpus, vel attonitum, vel Epilepticum, & simili affectu, vt vertigine tentatur, aliàs frigidius reddi, veluti interceptis à plenitudine viis, & liberè aditu egredi. Alique spiritibus denegato, vt ij figi stareque videantur. Aliquando corpus non refrigeratur, sed aliàs suo moderato calore perfunditur, aliàs minùs calefcit quàm antè, aliàs febrili calore incalescit, sed maximè in parte aliqua præsertim, vel quia infirmitas est quæ propensionem ad excipiendum attulit, vel quia inclinatur humor eò quodam motu temerario & fortuito, vt cum in vapore & exhalatione effera (quæ partes potius superiores appetit) res tota consistit. Quot enim sunt qui quocunque febris genere teneantur, caput nullo modo doleant, aliis, cum primum sese vel diaria febris offert, dolor penè incredibilis caput obsidet? Sic aliis aliæ partes citius tardius, promptius vel minùs promptè læduntur & impetuntur. Nunc audiamus quid de his senserint Hipp. & Galenus: Cum vitiosis succis corpus refertum fuerit, ait Galenus, bilis atra cæterorumque acrim humorum influxiones exoriantur, ob quas dolet eger magis, mordentur interna, & morse grauantur ab his humoribus quæ in partibus sunt, venæ. Et id causa contraria redditur rei alterius. Nam repleta ab his fluxibus quæ afficitur particula, corrumpitur primum sanguis ipse, vasa implentur, & id vias spirituum obstruit. Ideò naturales meatus nequeunt transire (ait Hipp. in textu) & propriè ἀποκλεισθέντες dicitur οκροτάσεις. Cum sanguis steterit, & vix ob spiritus refrigerationes fiunt, vertigines.

Comm.
ad part.
17. li. 2.
Prorrh.
& in
historia
de Phre-
nitico
lib. 3.
Epidæ-
miarum.

Locus
hic præ-
clarus.

aphonia, capitis gravitates, conuulsiones, quibus succedunt paraplexia
 (id est partis resolutiones, cum indissolubiliter materia parti impacta
 fuerit) Epilepsia, cum fluxus defecerint in locos venas oppletas conui-
 nentes. Loci sunt cor, hepar, vena cava. Sic cum ista est repletio venarum,
 spiritus non penetrant, sed sanguis concreuit ac coalescit. Interdum
 toto corpore conuulsiones fiunt, eaeque aliquando salubres sunt & commo-
 dae. Nempe totum corpus quatientes vniuersas partes adeo calfaciunt,
 ut multitudo partim percutim digeratur, partim ad aliquam non prin-
 cipem partem pellatur, & tunc paraplexia aliquando contingit. Ex hoc
 loco apparet quomodo & vertigines, & apoplex. & epilep. &
 apho. & conuulsiones & capitis dolores ob venarum interce-
 ptiones, & locorum (id est partium praecipuarum in quibus aut
 stabulantur, aut generantur spiritus aut ad quas & importantur
 & exportantur). Et illud est quod vulgo dicitur morbos istos
 fieri aut animali spiritu descensu prohibito, & tunc cerebrum
 per se & primo afficitur, aut vitali aditu intercluso, & per con-
 sensum fit affectus. Sed est alius locus in quo Hippocrates me-
 minit quidem cuiusdam liquationis, sed potius est diffusio,
 Graecis διαρρηξις, non autem liquatio est, quanquam vtitur voce
 ἀνομήσις, cum ait Epilepsiam fieri per *ἀνομήσις*, sed *ἀνομήσις* *διαρρηξις* su-
 mitur. Cum autem ista diffusio fit, & epilepsia, & vertigines
 fiunt & confimiles affectus, sed non coalescit & restagnat san-
 guis sistiturque, nec venarum proprie fit *ἀνομήσις* & maxime in
 locis, (id est praecipuis partibus corporis, ita enim *ἀνομήσις* no-
 men *ἀνομήσις* sumitur) ideo non refrigerationes contingunt,
 immo corpus apparet floridius & turgidulum magis. Quae no-
 tanda sunt ad prudenter medendum. Nam in apoplexiis &
 aphoniis alias video Hippo. mittere sanguinem statim sine
 praemeditatione & praeparatione aliqua, alias video desiderare
ἀνομήσις, quandam antequam in iisdem morbis dematur san-
 guis. Loci illi leguntur apud Hippocratem & Galenum in
 Aphorismis. Verba eius sunt: Cum pituita ad carnes conuertitur,
 homo ab hac crassus esse videtur. Nam carnes cum irrigata fuerint, &
 eleuata & rarefacta, sanguinem ex venis trahunt, sic bene colorati esse
 videntur. Sic ne quis decipiatur rubor & corpora, non ob pitui-
 tam fit, sed vi diffusionis & liquationis. Vnde Catarrhos à
 quibus manat à capite sub biliosus ichor bene coloratos vide-
 mus, & bonitas suauitasque coloris est, ut vulgus putat, medi-
 cus autem ista bona suspecta habet, & morbi praenuntia putat.

Notas

Hipp. 2.
 de mor-
 bis.
 Hipp.
 lib. de
 sacro
 morbo.

Initio
 lib. 2. de
 morbis.

Notas autem assignat aliquas quibus colligas in malis ponendam esse istam coloris bonitatem, & potius à causa morbifica pendere; Hæc verò sunt, si cum isto rubore non acutè audiat, item si cum benè videatur habere paucis cibis repleti contentumque se esse dicat. Diffusio enim replet, eo modo quo verè scripsit fieri Galenus, qui dum rationem cibandi vere assignat, ait subtrahendum esse cibum metu ruptionis vasorum à plethora ob diffusionem humorum. Ergo diffusio replet. Verba hæc sunt Galeni, *Vere medio existente, & ætati etiam proximo paucis & ex longo intervallo cibis nutriemus. Tempus enim id periclitatur, ne proximè accedamus ad plethoricam dispositionem, propter humorum qui hyberno temporis frigore concreuerant fusionem.* Rursus & eam humorum diffusionem, & quæ inde sequantur incommoda recenset alio in loco. *Verno tempore id contingit quod & in exercitationibus, licet hæc sint saluberrimæ. Nā si hominem pituita plenū, vel flauabile, vel atra, vel sanguine ipso exercueris, aut Apoplex. aut Epilepsiam exercitatione induces, aut metus est ne rupto in pulmone vase aliquo malum adsit insanabile.* Multi cum febricitare cepissent, ob exercitationem (supp. nec loco, nec iure, nec commode susceptam) acutissimè laborarunt. Quibus verò vicem purgationis eorum humorum qui in profundo erant, ipsa exercitatio suppleuerit, euocatà humorum copiā ad curim vlcera, & scabies erumpit. Quo ex loco patet diffusionem replere, dum id quod concreuerat, funditur & liquatur: Nam tunc in partes nobiles, quas τὸ τίς, antea vocauit, humor irrepit, & stationem facit, hinc vertiginum & aphonia-ram Ilias, quibus succedunt Epilep. & Apoplexiæ: In Græco est ἡ πόντος, quod bifariam potest intelligi, vel vt mutatio vertiginis fiat & ἀφονία in apoplexiam & epilep. ea enim successio morborum fit, vel vt dicantur ἐμπύρετος, per causæ morbificæ augmentum: ea enim propria vis est τῆς ἐμπύρετου: vel vt ἡ πόντος, id est sequi & adiungi ad priores morbos dicantur. In quo vnum monere oportet, nam in Aphorismis in ipso fusionis tempore, dum repletio fit, dum impetus, ἡ πόντος, inclinatio, ὁ πρῶτος, vult fieri ista, id est, epileps. apoplexiam, & consimiles sequi affectus: nō requirit humorum illorum στάσις, id est, moram, stationem vt interceptis spiritibus & calore obruto μετέωρος sequatur partiū, quod tamen requirit in quarto aetorum, ac si morbi isti tūm demūm oriantur, non cum mouentur humores, & corpus aut æquè calidum est, aut seipso calidius redditur, sed cum fit ipsa

Lib. 2.
de mor-
bis cap.
de mor-
bis à
capite
orienti-
bus.

Com. ad
Apho.
20 li. 3.

18 CONSILIORVM MEDICINALI VM

Galenus
Et Hip.
videntur
contra
distione
laborare.
Et tamen diximus ante vertiginis essentiam esse in motu inordinato spirituum, vel dum vapor inoffensum spirituum cursum interuertit. Contra requirit humorum stationem & pigritiem & moram, ut tum demum morbi ipsi oriantur cum obrutis, conculcatis, & oppressis spiritibus & humoribus viarum omnis adimitur libertas. Et ideo ante dicebat etiam conuulsiones quæ inde consequuntur aliquando utiles esse, quod quæ tientes corpus pigritiem & restagnationem ipsam, ut sic dicam, humoribus adimant, & sic primæ eos meatuum libertati restituant. Quod dicitur de apoplexia verum esse potest, sed de epilepsia & *καρυσία*, & vertigine minus, quoniam in istis affectibus etiamnum calor moderatus corporis adest. Quæ omnia quoniam obscura sunt, & lectorem in legendis veterum scriptis morari possent, breui rem totam aperiemus. Diximus antè aliquando spiritum animale descendu prohiberi, aliquando vitalem ascensu ad veram morborum attonitorum *ἐνταλιν*. Si in cerebro sola est obstructio & oppressio, & dum humor mouetur, aut in substantiam cerebri, aut in meandros & ventriculos, aut vertigo, aut quid simile oritur, non est necesse refrigerari corpus, nec humorum *στασις* fieri: nisi fortè dicas nomine isto *στασις* duo intelligi, & egressum è propriis vasis, & firmitatem contumaciæque, ut humor non amplius resiliat in propria vasa, nisi valdè attenuatus, & ideo non habeat fluxum & refluxum: Nam reuera duo ista maximè ad morbos istos magnos generandos valent. Nil enim tam valet ad morbi magnitudinem, quàm cum humor in proprio vase non regitur, sed in insolentem locum regeritur, in quo turgescit & tumultuatur. Quid enim facit delirium in phrenitide perseverans nisi quia egreditur humor è proprio conceptaculo, in febribus autem continetur adhuc, & inæqualiter turbatur sanguis? Quid in arthritide & nervosi generis morbis firmitatem constantiamque morbi facit, in venosi generis affectibus inconstantiam, & facilem solutionem, nisi quod in nervis impactio & *στασις* spectatur, in venis fluxilitas, ut præclare docet Hippocrates? Quid sanguis in capacitatem vase proprio egressus tantum molestiarum affert: idem suam venam coercitis non facit, nisi quod grumofus sanguis facit *στασις*? Itaque egressio ista ad pertinaciam morbi facit, ut mirum non sit si in Epilepsia

Phreni-
tis unde.

Lib. de
locis in
homine.

quia ventriculo insolenter continetur humor aut crassus, aut sua qualitate molestans, tantæ turbæ & motus inordinati concitantur. Ergo est vbi cum humores funduntur capitis grauitates, ἀπορίαις, vertigines & similia reddere possunt cum perfrigeratione & veluti congelatione, concretione & σπασμῳ, est vbi cum mouentur, & eadem committunt, non adest ea concussio, congelatio & σπασμῳ. Ideo vt ante monui, aliàs in iis malis repente fecat venâ Hippo. sine fomento vlllo, aliàs in iisdem fecat venam quidem, sed præparatione præmissa: quia in his refrigeratio est, in illis non est. Quod tribus de causis puto euenire. Primum si vir & mulier ob ἀσθηνίαν, aut iram, aut insolationem, aut plenitudinem citò laxatam aut vertigine, aut consimili affectu repente corripiantur, eueniet, vt malum adoriatur mulierem potius cum partium algore, quia humorū σπασμῳ fit potius, quia mulier frigidior, quia ob angustiam viarum oppressio potius euenit, quia ob desidiam crudis abundat humoribus, quia hepar & mesenterium facilè obstruuntur in his: At vir qui calidior, vasa habet ampliora, non frigidis scatet adeo excrementis, & humores habet fluidiores, & ideo magis & promptius ἀσθηνίαν (vt verbo Hippocr. vtat) si fortè apoplect. aut Epil. aut vertiginosus fiat, aut ἀσθηνίαν, non ea congelatio & refrigeratio fiet, quia non ea est, σπασμῳ, & ἐμπνέσις, quæ in naturâ frigidioribus apparet. Secundò, si ventres inferiores mali sint auctores, & in cerebro tantum morbos excitent ἡ ἀσθηνίαν, ob reuocationem subitam caloris ad centrum, refrigeratio potius eueniet & congelatio, quam si in capite malum sit. Quod declarat idem Hipp. nam cum loco prædicto de iis affectibus discutat requirit σπασμῳ humorum fieri in locis, id est, vena caua, corde & hepate. Non meminit cerebri. Reuera enim agit de affectibus iis quatenus localem in cerebro non habent generationem, sed per prohibitionem ascensus spiritui vitali ad cerebrum. Tertiò, est vbi humores in quibusdam tenuiores sunt & calidiores, & qui tales aphonias facere possunt qualitate potius quàm quantitate, est vbi frigidiores sunt. Et si ab eodem iisdem affectus specie induci possunt, non iisdem numero existunt. Quanquam & calidus & frigidus humor frigiditatis sensum inducere possunt diuersa quidem ratione. Declarant rigores & horrores sæpè à calidis & humoribus & ichoribus nati, vt passim Hippocrates demonstrat. Quartò aliud est cum oppressio

4. Acu-
torum.

In apo-
plexia
curanda
aliquan-
do vena
secunda,
aliquando
non, sed
fortuisse-
dum.

1. de
morb.
mulie-
rum.

Calidus
humor
refrige-
ratione
potest
induce-
re.

fit, & materiae opprimentis copia adest, aliud cum ea abest. Nam in historia de Pythione commemorabile est quod scribit

Hippo. 1.
lib. 3.
Epid.

Galenus, ut scias quomodo copia humorum lethargicas, torpidas, & comatosas affectiones potius inducat, delirabat Pythion, veteres delirium hoc referebant ad abstinentiam veneris, quam Graecè *τὸ ἀποχρῆν* dicunt, quasi verò suppressio seminis in cerebro dum sua quantitate opprimeret delirandi occasionem dedisset. Ex eo autem colligebant multum seminis suppressum quod multum & variè spueret (at hoc risu potius excepit Galenus, quam graui aliqua contentione oppugnavit.) Contra exemplo eorum quibus os terebra aperitur, docet copia & oppressione, & humoris congestione induci non delirium, sed potius caron, & comatosum aliquid. Quod notandum est.

Vnde so-
peruigi-
lans.

Omnino enim id verum non videtur, quod plerique delirent ob praesentiam humorum biliosorum eorumque multorum. Nisi fortè dicas delirium induci non ratione quantitatis, sed qualitatis. Testatur *κῶμα ἀγρυπνόν*, in quo biliosus humor quidem est, qui quia vel pituitescit, vel fortè magna copia obruit, ideomistum affectum ex vigiliis & somno inducit. Testatur quoque & eruptio parotidon. Quis enim dubitat materiam parotidon eam esse quae febrem continuam committebat, quae quia magna copia est, & à natura sua ob constitutionem cerebri frigidam quodammodo mutata, inducit caron, qui saepè parotidon eruptionem praecedat? Et in phrenitide delirioque tametsi qualitate humor peccat, nec tam quantitas materiae spectatur quam eiusdem qualitas, tamen est certa quaedam quantitas materiae, ut crises quae inde sequuntur testatum relinquunt. Nam

3. Epid.

parotides oborirentur materia regeſta à cerebro, nec gibbositas phrenitin sequeretur. Quod Hippo. in Epid. meminit: *Coco, ait, in spina gibbositas facta est in spina ex phrenitide, huic nulla medicamenti potio conferebat, &c.* Quae gibbositas ob translationem materiei non fieret, nisi quaedam moles esset, & non qualitas potius in phrenitide dominaretur. Et in Aphorismis dy-

Apho. 5.
lib. 7.

sententia soluit furorem & hydrops (quanquam quidam non legunt *ὁ δὲ ψωλ*, sed *ὁ δὲ ψωλ*) ob translatam à cerebro ad partes inferiores materiam: At furorem, Graecis, *εὐαίσθη*, & exitum è potestate mentis, Graecè *ἐκ σπουδῆς*, committit humor paucus quantitate, sed qualitate, ut ita dicam, multus.

Ad eas rationes quas supra attulimus cum explicaremur cur

humoribus aut commotis, aut transumptis, aut aliter affectis quidam ἀρῶναι & ἀπῶναι reddantur, & ex iis alij incalescant, alij toto corpore refrigerentur, potest & adduci quinta ratio, quam non solum confinximus, vt id explicaret, sed vt obscuritatem vocis, ἁρῶναι, qua vsus est Hippocrates in sententia prius adducta, euolueret: Item vt omnibus notum esset de vniuersali morborum generatione per humorum confusionem, & sanguinis perturbationem. Cum humores commouentur, & sanguis qui ad prudentiam facit perturbatur alteraturque, aliquis ἀρῶναι, aut vertiginosus, aut aliquo simili affectu præditus esse potest. Idem & calidas omnes partes habet, si humores sibi vias mutuo non obstruant, si sese non obtrudant simul & obruant. Sin autem veluti è proprio conceptaculo educti affatim in inanitates, aut cauitates quasdam publicas irruerint, ibi sese obtrudentes, conculcantes ac opprimentes, tunc humorum ἁρῶναι fit, vt illo loco loquitur Hippo. & illam humorum ἁρῶναι algore, & per caloris oppressionem, viarumque interceptionem, partium refrigeratio consequitur. Sic cum commotis, aut confusis, aut aliter affectis humoribus & sanguine ἀρῶναι contingunt, aut cum calore, aut tepore, aut humiditate, aut sudore, aut algore, prout hæc aut illa offerunt sese, ita medendi consilium variabit: Totam verò rationem generandæ phrenitidis & affectuum melancholicorum tradit in libris de morbis his verbis: *Sub finem lib. 1.*
*Cam bilis commota fuerit in venas, & ad sanguinem ingressa fuerit tunc sanguinem dimouet ex propria motione & solita compage, item serosum facit & calfacit. Calfactus autem corpus recalfacit, & febril homo & desipit. In Græco est, καὶ κινῶντα διεκίνησεν, & διεκίνησεν τὸ αἷμα ἐν τῇ σφαιρῇ συστάσας τὰς κινήσεις. Vbi dubium est num Hippo. retulerit, συστάσας & κινήσας, ad verbum διεκίνησεν, an verò nomen κινήσας, ad verbum διεκίνησεν retulerit, & ad τὸ διεκίνησεν, dictionem συστάσας. Vt hic sit sensus, Bilis dimouet sanguinem ex propria motione & naturali, item διεκίνησεν ἐν τῇ συστάσει, conuertit in ichorem & serum tanquam ex propria natura, consistentiâque emouēs. Nisi quis dicat verbum διεκίνησεν esse absolutum, & nullam motionem significare. Et sub finem libri eiusdem ita scribit, *Lib. 2. de morbis.*
*homines sanguine corrupto, & ex consueta motione emoto. Et alio in loco. Dolor caput repente dolet, & ager impotens fit cum arrabiles in capite commota fluxerit, maximè in partem in qua plurimæ sunt venæ, in sellum, inquam, & pectus. Sic in 4. acutorum vt antè dictum est**

Explicatur quomodo affectus cum aphonia continentur.

Sub finem lib. 1.

Lib. 2. de morbis.

22 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ad generationē istorum grauium morborum τὰς ἐμπροσθεν fieri ait, hoc loco *ἡμῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ σώματος*²³. Quæ omnia cum obscura sint ita accipienda sunt: Sanguis ad sapientiam facit, vt ipse ait, alio loco de aëre & spiritu idem dicit, id est, dum sanguis complectens reliquos humores naturales, suas habet inclinationes, momenta, & motus, necnon propriam suam compagem consistentiamque retinet, tunc homo mente constat, & deliramēti nihil in se habet: sed cum cōmotis humoribus tum iis qui extra venas sunt, tum iis qui in venis sunt, sanguini & sua motio deest & cōpages, necnon acquisita feri & ichoris natura, alteratio cōtingit, necesse est tunc alienationem quandam induci, vtpote alterato eo quod in primis, ad sapientiam facit. Sed querat quis, an cum phrenitis sit & calidus affectus, necnon vertigo, aut Epilep. aut Caros, aut Apoplex, nunquid humorum & cōmotus sit, quod in quarto acutorum vult, & declinatio sit à propria motione & systasi? Ita sanè. Nam vt postea docebimus, delirium à phrenitide distinguitur, quod in delirio humor perfluat venas, in phrenitide è vasis aut egressus videatur, aut saltem impactus, id quod *ἐπὶ τῇ ἐξελίξει* propriè dici potest. Vt tamen ingenuè dicam in vtrisque affectibus idem & eodem modo fieri existimo. Cæterum ambiguum latet in vocibus *ἐπὶ τῇ ἐξελίξει* & *ἐπὶ τῇ συστάσει*. Nam aliquando idem sonant, vt apud Gal. τὸ παρὰ τὴν συστάσιν, pro *ἐπὶ τῇ συστάσει* sumitur *ἐπὶ τῇ συστάσει* crassitudinem, coagmentationem, substantiam, corpus & concretionem significat, Cornarius vertit compagem. *ἐπὶ τῇ συστάσει* duo contraria significat apud classicos, dirēptum, seditionem, discordiam, controuersiam, item stationem, stabilitatem, constantiam vt τῇ συνήσει opponatur, & *ἐπὶ τῇ ἐξελίξει*, opponatur τῇ συνήσει. Sic, vt verbo absoluiam, vt cataphoræ fiant, hemiplegiæ, apoplex. vertigines, humor primum è proprio motu dimouetur, & compage; deinde cum dimotus est, rursus *ἐπὶ τῇ συστάσει*, id est, *ἐπὶ τῇ συστάσει* habet. Sed hoc quid sibi vult? Duplex est *ἐπὶ τῇ συστάσει* & *ἐπὶ τῇ συστάσει*, vna naturalis & vernacula, & antè morbi generationem viget, altera contra naturam & morbosa, & ea ad inductionem morbi eiúsque accretionem facit. Id est, humores priùs suam habent quietem, quæ si interruptitur, tum virus suum exercent, cum agitantur suam & *ἐπὶ τῇ συστάσει*, & propriam *ἐπὶ τῇ συστάσει* amittunt, alienum verò accipiunt motum, & dum sese in locum alienum affatim turmatimque coniciunt ac proripiunt, conculcati quodāmodo & oppressi suam habent quandam *ἐπὶ τῇ συστάσει*, sed alienam & contra naturam.

Lib. 1.
de mor-
bis.
Lib. de
sacro
morbo.

Phreni-
tidis &
delirii
simpli-
cis di-
stinctio.

Duplex
ἐπὶ τῇ
ἐξελίξει.

Paroxysmo liberatus narrabat se incredibili capitis dolore diuexatum. ²⁴

Cum paroxysmus aderat, & erat *ἀναδύς*, non *ἀφωός*, nec *ἀπύος* ²⁵,
 ut antè demonstrauius, ea faciebat quæ delirantium sunt, ut
 potè cerebro affectio. Sed non omnino perierat iudicium, at
 ligati erant sensus quodammodo: sed sensus communis vis ali-
 qua supererat. Et ut antea docuimus, aliàs in cerebro facultas
 animalis læditur, aliàs ratiocinatrix ipsa. Sic absolutus paroxys-
 mo meminerat ferè omnium quæ antea acta fuerant, immo &
 dolorum. Hoc quod dicitur fidem accipit ex Aphorismo Hip-
 po. Qui parte aliqua corporis laborant, ij, si mens ægrotat, <sup>2. Apho-
 rismo-
 rum.</sup> magna ex parte dolorem non sentiunt. Et is quidem præsentē
 paroxysmo locum dolentem aliquatenus designabat, sed effari
 non poterat. Simile quid legere in est Epidemiis. ^{1. Epid.} Polemarchi
uxori in morbo articulari coxa dolor ²⁶. Causa erat quod menses non pro-
 dierent. Vox interceptiebatur per totam noctem ad meridiem. Audie-
 bat & sapiebat, & per manum significabat quod circa coxam esset dolor.
 Id quod ægro nostro contigit. Fiebat autem id quia tantum
 affectum erat cerebrum ex euentu, non per se & primò. Alio-
 qui non ita saperet, & meminisset eorum quæ acta sunt, & lo-
 cum designaret. Potius enim spiritus ascensu prohibebantur, ^{4. Epid.}
 quam descensu. Dubiūque esse possit num *ἡ ἀνέσσω*, ut
 loquitur Hipp. laboraret, ut materiæ virulentæ suppressio, cuius
 pars tenuior *ὑπὲρ* diaphragmati proxima, & notam quandam
 ei inurens, ipsum affecerit, & communicatione affectus ce-
 rebri quoque laborarit. Nemo enim dubitat quin affectio <sup>Affectio
 dia-
 phrag-
 matis
 quid fa-
 ciat.</sup> diaphragmatis faciliè cerebro communicetur, immò ob phlo-
 gosin eius deliria contingant. Quod præter ea quæ in libris
 de locis affect. à Galeno scribuntur, patet, eius quoque fidem ^{5. Epid.}
 facit historia de Tychone, qui cum in pectore percussus esset,
 affectumque diaphragma, statim delirauit & excitatus est risus
 tumultuosus, relicta enim pars spiculi in diaphragma-
 te erat. Ideo enim *φρένες* dicuntur, quod *πρὸς τὸν φρένα* conferant, <sup>Gal c. 4.
 lib. 5.
 locorum
 aff.</sup> non quod sapientiæ sedes sit, sed quoniam *τῶν φρενῶν* affectio,
 τῶν φρένα ἢ φρένων labefactet. Quanquam ista *τῶν φρενῶν* appellatio
 non placet Hippocrati, sēque non videre ait cur ita vocentur, sed
 nec quam vim ad sapiendum intelligendumque habeant. Sed
 nil hic de nominibus moror.

Phreniticorum more exiliebat ex intervallis.

4. Epid. Videor videre illud quod in Epid. scribitur de quodam adolefcente Phrenitico: *Huic* (ait Hippo.) *febris erat adurens, insomnis, mente motus est* τὸ πνεῦμα ἀκόλαστον, *proteruo & insolente quodam modo,* ἀνίσταται, μάχεσθαι, ἀγχομυδῆσαι: *crebrò desurgere, pugnare, turpia obloqui: idem in Cononis famula: Ex dolore capitis incipiente,* ait Hippo. ἐκ τοῦ πονέειν, *exiit extra se & abalienata est, clamor, quærela multa, rarò quies.* Quæ omnia phreniticorum seu propriè, seu impropriè dictorum propria sunt. Quo loco notandum valdè vnum est, quomodo nimirum dolor capitis repente oboriscas varias morborum ideas pariat. Nam in ista famula phreniticum quid attulit, in aliis aliquid Epilepticum & Apoplecticum, ut patet ex Aphor. *Quicumque sani repente dolore capitis capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris præbenderit* ²⁸. Quo loco typum apoplexiæ exprimit, ait Galenus. Sed hæc duo, muti fiunt, stertunt, characteristica sunt morbi attoniti: Et cum ait, nisi febris: Declarat aut à pituita-
lib. 6. *lib. 2.* *de mor- bis.* *malum esse, aut à succo melancholico. At si humor est tenuis, effusus, calidus, & calorem inducens in partem quam occupat, alia doloris species, & diuersis comitata symptomatis exoritur? Præterea cum exiliisset, absurda aliquando dixisset, impetum in assidentes fecisset, inuolasset in omnes, stragulas abiecisset, indecorè corpus composuisset, dixi id fecisse phreniticorum more, ac si propriè hæc conueniant delirantibus valdè, & phreniticis, & fanaticis. Galenus Com. in Prorrheticum videtur euertere opinionem eorum qui ex eo phreniticos iudicènt quod eiulent, vociferentur & exilient. At id verum non est. Verè phrenitidis proprium quidem, si nil sit quod impediatur, sed in doctrina Hippocratis triplex phrenitis reperiri potest, una vera in inflammatione & alteratione cerebri posita, altera impropria quæ obscura dicitur & ἀνοήτης, quæ in alienatione temperamentii cerebri, non solum in alteratione consistit. Et ea eo modo se habet ad cerebrum, quo febris hectica ad corpus febrile & hecticum. De qua audiendus est Aphorismus Prorrh. *Tremula blanda, obscura & contrectantes desipientiæ valdè sunt phrenitica. Tertia etiam impropria est, ut cum quis phreniticus quidem est, sed non valdè insanit, nec ea facit quæ verè phreniticus* Id porro*

però fit quoniam præter humorem biliosum desipientiam facientem, est crassus alius & frigidus qui inducit aliquid comatodes & *καταρροειδών*. Quo modo audiendum esse vult Galenus illud lib. 3. Epid. *Nec phreniticorum insaniuit quisquam, quod aliis* Par. 45.
vsusent, sed alia quapiam cataphora segni grauitè peribant. Illa sect. 3.
 enim tempestate & febres, & phrenitides mixtos per quandam lib. 3.
ἐξολή, & dominatum habebant humores. Nam ægri initio fe- Epid.
 brium omnes soporosi fiebant, & non valdè sitiebant: & quod
 febrientibus in suo genere cōuenit, idem & phreniticis, illi non
 valdè sitiebant, & non insaniebant multum. Vacuitatem sitis
 Galenus refert ad id quoniam phrenitici ratione perturbatio-
 nis mentis non sentiunt se sitire, vnde alio loco *ἐξολή* dicun-
 tur, item & ad extinctionem quandam facultatis appetentis.
 Prior ratio non placet. Nam cum, vt dixi, omnes delirantes
 etiam dum æstus adest, & indigentia potus, id non sentiunt ta-
 men, nil nouum dixit Hipp. cum ait istos phreniticos nō sitiisse.
 Non sitiebant potius ratione mixtæ affectionis. Quod Gale-
 num non vidisse miror. Sed audiamus Galenum de ista segni Com. in
 cataphora & phrenitide, *Non est mirum collectis crudis succis in cor-* particul.
pore soporosos simul & dementes fieri. Soporosos ex multitudine & pradi-
frigore succorum, dementes quod humores putrescentes acrimoniam pa- ctam.
riunt & calorem. Non enim audiendum est eos periisse phreniti-
 cos *καταρροειδών*, quod lethargus successisset phrenitidi, sed quia
 phrenitidi iuncta foret *καταρροειδών*. Ego verò non alienum scri- Lib. de
 bere videbor si istam affectionem *πρεμαγίας* appello. Ea enim Comase.
 est phreniticorum affectio cum in somniculosum coma incide-
 runt, ita vt oculos tollere non possina, sed lethargicorum more
 eodem loco permaneant. Reuera autem *πρεμαγίας*, nomen verè
 exprimit *πρεμαγίας* *καταρροειδών* *καταρροειδών*: vnde Cornarius apud Hippo. 4. Epi-
πρεμαγίας affectum vertit, stupida insania ex phrenitide, & lethar- demon-
 go mixta apprehensum. Nil autem hoc loco interest si dicas, rum.
 ex phrenitide & lethargo, an ex phrenitide & cataphora. Quā-
 quam eorum essentia differt. Et quoniam in mentionem *πρεμαγίας*
πρεμαγίας, incidimus, rerum series & ordo postulat vt affines di-
 ctiones explicemus: hæ autem sunt *πρεμαγίας*, siue *πρεμαγίας*, & *πρεμαγίας*.
 Apud Hippocratem multiplex *πρεμαγίας* legitur (fortè legendum
πρεμαγίας, vt distinguatur à nomine *πρεμαγίας*, quod insolentiam & inanem
 latitiam significat.) Nomine autem *πρεμαγίας* comprehendit febres
 quasdam ardentes in quibus multa est humiditas iuncta, vt etiā

initio febrium fracti, debilitatiq[ue] & dissoluti ægri videantur:
 Quas adumbravit loco prius adducto ex tertio Epid. febres ar-
 dentes, & initio erant καυμάτωδες, non καυμάτωδες, vt malè qui-
 dam tempore Gal. legebant. Et libro aduersus Lycum πυρετών, è genere humidarum febrium censuit, quod in paroxys-
 mis multo humore totum corpus mader ac tepet, vt mirum non
 fit si dissipatum & dissolutum langueat. Quod etiam ipse Hip-
 pocrates demonstrat cum explicat quinque aut sex τύποι. Τύποι,
 inquit, nominatur, primum febres fortes tenent, calor acutus, & à gra-
 uitate debilitas, crurum & manuum impotentia, inutilia membra sunt
 Si quis erigere velit, non erigitur, si quis interrogat, præ dolore non po-
 test respondere. Denique τὸν πυρετὸν καὶ τὸν πυρετὸν essentia in hoc exi-
 stit, vt præsentē calore multo, prauo, acri, dissolvente, & multa
 materia faciliè dissipabili & corporis natura effœminata & vie-
 ta, impotētia sit multa, dissolutio, viriū casus aut iactura, & ner-
 uorū effœminatio, vt semisiderati, & semimortui iaceant ægri.
 Vnde non abs re fortè τὸν πυρετὸν vertit Cornarius, Stuporem atto-
 nitum, quod in febre πυρετῶδε, resoluti ac languidi decumbant
 ægri. Quanquam πυρετός nomen inuenerit ab incendio, dicitur
 enim ἀπὸ τοῦ πυρετός, id est incendere, ardere, comburere, non au-
 tem ἀπὸ τοῦ πυρετός, id est, inaniter efferri & insolescere. Quod
 mirum est. Si enim ab igne & incendio nomen meruit, cur pa-
 raphrasi, & circumlocutione vertimus, & explicamus τὸν πυρετὸν, &
 τὸν πυρετὸν per stuporem, impotentiam, viriū fractionem, immo-
 bilitatem, & ignauiam. Hæc enim pugnant cum ignis agili-
 tate. Sed calor febrilis præsertim multo obrutus humido, vt
 suam non habeat ἐκλαμψιν, & in corpore delicato segnitiam, &
 stupiditatem faciliè accersit: vt ex eo euentu, & casu nunc apud
 veteres πυρετός significet ἀσθενίαν, πρὸς τὸν πυρετὸν, & Gal. ἐν τῇ θεωρίᾳ
 τῶν πυρετῶν, siue εἰδὸν, vtrōque enim accentu pingitur, καὶ τὸν πυρετὸν, id est,
 bardum, mutum, surdum, desidem. Et quoniam πυρετός εἰδὸν si-
 gnificat, id est mutum, stultum, tum vocis similitudine, tum si-
 gnificationis proximitate addita litera λ, non legunt πυρετός, sed
 πυρετός. Et sic in Epid. πυρετός legitur: τὸν πυρετὸν enim cæcum signi-
 ficat, item & εἰδὸν, id est surdum, & mutum, quod qui natura
 surdisunt, & muti existunt. Item πυρετός, pro obscuro, ignaro
 & inepto sumitur, vt cum τὸ μέλλοντος πυρετός dicitur, rerum futura-
 rum inscius, Quod si legendum esset πυρετός, cæteris omnibus
 litera λ, esset addenda, legendūque πυρετός, καὶ τὸν πυρετὸν, pro πυρετός

Probabilis
 causa cur
 ora Cor-
 narius
 vertit.
 Gal. in
 linguis.

4. Epid.

μανία, & τύφος³¹. At hoc alienum est. Et in Epidemiis cum τὸν τυ-
φώδεα opponit ἐξυθύμιον, μανικόν, nomine τὸ τυφώδες, intelligit irasci-
nescium, socordem, veterinosum, ignauum & lentum: vt non
tam spectanda sit vocis deriuatio ἀπὸ τοῦ τυφώδεος, nobilitas enim &
agilitas, & expeditus motus potius designaretur, quàm casus
iste de quo dictum est, quod τυφός, significet febrem cum stupore
quodam & ignauia iunctam, dominante humore, & virtute
fracta. Quanquam κατ' ἁλοχίω, febris τυφώδης dicitur, cum hepatis
est inflammatio, quemadmodum πυρετώδης, cum pulmo inflam-
matus est, & ἐρυσιπελωτώδης, & λευκυέλα, cum ventriculus est affectus.
Quo in sensu audiendum illud Hippo. *Leipyrrie febres non solū-
tur, nisi cholera morbo superueniente*; id est, Erysipelas in ventricu-
lo ob inflammata in eo bilem & æstuantem non soluitur, nisi
euacuatione bilis sursum deorsum, in modum τῶν χολερικῶν, vt lo-
quitur in Epid. id est, cholerae morbi.

Aetius
cap. 891
sermo 4.
Tetrab.
1.
in Com-
cis.

5. Epid.

Sed vt ad finem res perducatur, reuera τυφώδης, & τυφώδης, legi
potest, quod πυρετός, non dissimilem, τῇ τυφώδεος significationē nan-
ciscatur. Quanquam retinenda potius vox τυφώδης, quam alia, vt
litera λ, non cogamur ceteris vocibus quæ inde deriuantur, ad-
dere.

Pergamus ad explicandum quomodo æger noster haberet
aliquid phreniticum. Tria sunt quæ phrenitin exprimunt ab-
surditas verborum, Indecora corporis compositio, doloris va-
cuitas, & additur morum dissimilitudo: quæ tamē delirantium
sunt etiā propria: sed delirium est perpetuum, & febris affidua:
de quibus plenius paulò dicemus in Comment. in sequentem
particulam.

Phreni-
tidis si-
gna.

Ex interuallis.

Qui delirant, si delirandi finem non faciunt & febriunt, phre-
nitidis magna est suspicio, si ex interuallis delirent non φρενίτις,
sed cum febre παραφροσύνη, sine febre μανία, aut μελαγχολία dicitur.
Ita enim Gal. Cum phrenitis & mania mentis noxa sit, propriū
est mania febre carere, vt phrenitidis febrem adesse. Sed nunc
explicemus differentiam phrenitidis, & τῆς παραφροσύνης & παραφροσύνης, Epid.
quæ in febres continuas cadit: quæramusque an in phrenitide
delirandi sit aliqua intermissio, quoniam vox illa, τὰ πολλὰ in
Aphorismis cum ait, qui parte aliqua corporis laborant, ma-

Com. ad
Apho.
45. sect.
3. lib. 3.
Epid.

gna ex parte dolorem non sentientes, iis mens ægrotat: exem-
 pli gratia, phreniticus doleat partem aliquam, cum mens ei
 ægrotat sit an dolorem non sentit τὰ πολλὰ, id est, per vices & in-
 terualla aliqua? Nam si delirium est perpetuum, consentaneum
 est vt perpetuò dolorem non sentiat, & non sitiat, siquidem non
 sentit se potu indigere. Bifariam hoc debet intelligi, velenim
 Hipp. dixit, dolorē non sentiunt τὰ πολλὰ, tametsi mēs ægrotet, vt
 moneat nos attēdere diligēter ad delirantes, qui tametsi aliquā-
 do sapiant, sentiāntq; dolorem, & de eo aliquid cōmententur,
 tamen dicentur delirare tametsi aliquando doloris se sensum
 habere dicant. Satis est si τὰ πολλὰ, id est, magna ex parte dolo-
 rem non sentiant. Vel ita audiendū est, vt per vocem τὰ πολλὰ,
 crebras in delirantibus mutationes intelligat, vt delirent mo-
 dō audiendo, modo videndo, aut simili aliqua alia ratione: nec
 est idem delirij typus, nec in eodem se subiecto, sensūque exer-
 cet mens delira. Itaque phrenitici non delirabunt τὰ πολλὰ, sed
 semper, cū foueatur malum in cerebro eo modo quem Gale-
 nus exprimit, & in libris de locis patientibus, & in Epidemiis
 vt paulò antè adumbrauimus: *Ardentium febrium & phrenitidis*
idem autor est: Sed cum in vasorum capedinibus vnā cum sanguine con-
tingitur flaua bilis, vt cūque accendatur, febres ardentes fiunt, præse-
rim³² si in pulmonis venis, aut iecoris, aut ventris (maximè verò cir-
cum os eius, vt Com. in part. 33. sect. 3. lib. 3. Epid. notat, & part. 9.
sect. 1. lib. 1. Epid.) bilis effervescent. Si quando ad solidas partes per-
uenierit, & permeauerit, rigorem efficiet. Sin ad cerebrum eiusque mem-
branas sit impacta, phrenitides inducit. Verū priusquam inhaerescat
perfluens venas in his sitas, non phrenitides, verum ea que in vigori-
bus adsunt febrium deliria excitat. Sit bilis in isto statu austro ad
caput sublata, & in cerebro defixa eiusque membranis, phrenitides ge-
nerant³³. Ergo in μαλακότητι adhuc vagatur humor perfluit-
que, & permeat venas, in phrenitide ē conceptaculis egressus
est, & contumaciter ad partes adhærescit. Et Gal. apertè ex-
plicat illud quod obscurè dictum est ante ab Hippocrate cum
scripsit, Cum verò humor in locos fluxerit, stationēque ha-
buerit. Superest vt nodum dissoluamus de febre in qua quis
delirat. Nam si phrenitis est, necessariò febris magnarum in-
flammationum comes est, sed est phrenitidis tantū sympto-
ma, vt contra febrium propriè dictarum, in quibus certa pars
affecteda non est, delirium symptoma existit. De iis autem ita

Acuta
 & sub-
 tilis in-
 terpre-
 tatio
 vocis,
 τὰ
 πολλὰ.

Rigor
 unde.

De phre-
 nitide
 abunde.

sentit Galenus: Delirare solent aliqui ob vitium quod in ore ventriculi existit, & in febribus ardentibus, & in peripneumonia, & in pleuride³⁴. Sed deliria ob affectum diaphragmatis non multum distant à phrenitide. Quippè per cæterarum partium affectus, atque per febres ardentes à lirium mitigatur, quoties morbus, id est, aut peripneumonia, aut pleuritis, aut raucos declinat: At phrenitidis propria nota est, ut ne in declinatione quidem febrium quiescat delirium. Cum enim propria cerebri sit affectio, paulatim accedit, sed quiescere subito atque affatim non solet. Cæterum dubitet quis si phrenitidis febris symptomatice est³⁵, & febris, quæ symptomata est, & phrenitis, quæ morbus est simul incipiant & desinant, quæ sit ut cum febris declinat, ipsa phrenitis non quiescat. Nam non videtur ipsa febris, quæ ab inflammatione cerebri pendet declinare, aut remittere, aut cessare posse, nisi vnà pariterque ipsa inflammatio declinet atque concedat. Quemadmodum deliria quæ febrium continuarum sunt symptomata febribus declinantibus ea quoque declinant atque remittunt. Sed meo quidem iudicio hæc per comparisonem audienda sunt. Nam cum phrenitis localem inflammationem significet in cerebro, delirium perseverat etiamnum febre declinante, quod audiendum facta comparisonem cum aliis deliriis aliarum febrium, siquidem in cerebro manet impressio. Quamquam verè non declinat febris quin declinet quoque phrenitis, & ex aduersum, sed delirium omnino non quiescit. Cæterum hoc addemus de phrenitide, quoniam controuertitur inter classicos an sit inflammatio cerebri, an meningon. Tenuis membrana variè ac multiplici plexu cerebro implicatur atque inuoluitur, quò fit ut vix inflammetur ea membrana, quin & inflammatio parenchymati ipsius cerebri communicetur. Sic phrenitis est definienda per inflammationem membranarum & ipsius cerebri. Nisi quis dicat lædi potius cerebrum, & phrenitin huius morbum esse, non meningon, quoniam actionum functionumque integritas à recta cerebri, non autem à meningon temperie dependet: quod si verum est, earundem læsio ab offensa temperie cerebri emanabit. Tamen quia eadem semper est medendi ipsi phrenitidi ratio, siue primario, siue secundo afficiantur, aut membranae aut cerebrum: Ideo parum refert curiosè hanc quæstionem proponere ac conari dissolvere.

Cur etiam deliria in phrenitide perseveret licet febris declinet.

Explicatio quæstionis.

7. de usu partium.

2. Locorum affectus.

Non conuullebatur.

In cerebro variæ mansiones sunt. Aliquando vt pars organica afficitur, aliquando vt similis, & tunc *ſeuſa* affici dicitur. Aliàs partes anteriores læduntur, aliàs poſteriores, membrana aliàs, aliàs ſubſtantia, & *ſeuſa* ipſius partis. Aliquando nerui, & ex iis aliàs qui ad auditum faciunt, aliàs qui alium ad ſenſum conferunt. Sic tametſi cerebrum vnum quid ex ſe ſit, tamen prout in has aut illas partes & mansiones reſcit humor, ita variæ morborum ideæ excitantur. Quod Galenus in libris de loc. affectis explicauit: Et præſertim in *Priorrhethico*, febris ardens tum ob alias cauſas, tum ob cerebri inflammationem a quæ ſit. Et tunc ex propriis phrenitidis ſignis continua eſt deſipientia. Ex ea verò humiditate quæ in cerebro redundat ſpiritus flatuoſus procreatur, vnde aurium tinnitus ſunt¹⁶. Pari modo excæcatio caligòque, cum craſſus humor vel ſpiritus oculos inuadit. Naribus verò ingruens humorum copia ſenſum grauitatis in ipſis facit. Et hæc fiunt concluſa in capite materia, quemadmodum & eadem ſymptomata ſuſcitantur per febres eſſentiales quarum ſedes eſt aut in pulmonibus, (vt antè ex Galeno demonſtratum eſt, aut in aluo. Atque ex priore loco docetur eundem humorem in eadem parte varias excitare ſymptomaton ſpecies, prout variæ particulæ occupantur. Vt mirum non ſit ſi æger noſter conuulſus non ſit, vel quod nondum eam quietatem humor acquiſiuerat quæ ad excitandas conuulſiones requiritur, vel quia in locis nondum conſtitit in quibus eſſe debuiffet ad conuulſionum generationem. Non enim quiuis humor quouis loco contentus id facit. Habebat quidem quafdam *συναγωγας*, ſed non *σπασμους*, id eſt quafdam contractionunculas patiebatur, ſed non conuulſiones. Alibi autem docuimus quid differat *συναλην ἀπὸ τῶ σπασμῶ*. Et mirum fuit cur non Epilepticus, aut Apoplecticus factus fuerit: nam locus eſt in Coacis in quo Hippo. In dolore capitis *ἀφαιαν* ſuſpectam habet quod habeat aliquid aut Epilepticum, aut Apoplecticum. Sed hic noſter æger non erat verè *ἀφαιαν*, ſed *αἰσχυρος*.

Et veluti ſopore vigilantibus occupatus delirioque iacebat.

Horum demonſtratio ferè ex ſuperioribus pendet cum diſpu-

LIBER SECVNDVS.

31

taimus *περὶ πυφομανίας*. Nam vt ante docuimus, delirium erat, & phreniticum quid cum *ἡσυχία*, quam lentam & stupidam dixit. *Coma vigilans vnde.* Atque reuera cum cerebrum naturâ suâ sit frigidum, accedentibus vaporibus aliunde, aut in eodem ob contentam bilem accensis, facillè *ἡσυχία ἀρρηγνύου* excitatur. Immo & in multis febribus continuis, in quibus somnus nocet, somnolenti sunt ægri cum vigiliis quibusdam, præsertim si cerebrum plethoricis symptomatis auctum sit, ac multa acrium vaporum copia cerebrum feriuerit. *Com. ad Aph. 67. lib. 4.* Nam dum Galenus explicat qua ratione in febribus somnus timores & conuulsiones inducat, non aliam rationem reddit quam quia prauis humores cum incocti permaneant. dominante calore febrili exhalationibus prauis cerebrum oppleant, quas si vincere nequit obruitur, vnde occasio somni profundioris, & ipsarum quoque parotidon, immo & conuulsionum & timorum: Contra bonæ coctiones vtileis somnos inducunt. *Morbi cerebri difficiles cognoscere.* Caterum nescio qui fiat, vt morborum cerebri & notitia, & curatio difficillima sit. Notitia quidem, quoniam multi conuulsi sunt, paucioribus consternati, phrenitide, Apoplex Epilep. sublatis, lethargicis affectibus oppressi, fideratque in quibus nullum ferè vestigiū mali, aperto cranio inuentum est, nec sanguis, nec ichor, quanquam Medici qui historiam morbi vidissent, & terrificis symptomata obseruassent, certò affirmarent, sibi que persuaderet se aut inter membranas, aut in cauitatibus, aut alia in parte, aut abscessum, aut sanguinis aut aquæ copiam deprehensos. Et dum euentus eorum spes falleret, stuporque & admiratio eorum mentem percelleret, conabantur aut aliquid confingere quo mortis inopinatæ prætextum obtenderent, aut occasionem causamque arte quadam prætexerent, vt prætexendis confingendisque occasionibus istis honesta excusatione, culpâ & vituperatione sese assererent ac liberarent. Et nos sæpè in ista alea versati sumus, primariosque medicos versari vidimus, quasi cum spiritu ipso animabili, & anima spirante mortis occasio euolaret. Vt tantò cautiorem prudentioremque medicum esse oporteat, & in inuestigandis rerum causis diligentem, quantò res sunt abditiores occultioresque, & sapius de spe sua deciderit. *Difficiles curantur sunt morbi cerebri.* Adeo obscura est morborum capitalium ratio, & euolutio difficilis. Curatio quoque non minore difficultate est inuoluta, quoniam nec topica vires suas integras in cerebrum exerunt, nec assumpta innoce-

32 CONSILIORVM MEDICINALIVM

propter contrarias quæ sese offerunt indicationes, à capite cau-
sam mali amoliri possunt, præsertim si ea penitus cerebro hæ-
ret, & si ipsum τῇ πρώτῃ παθείᾳ laboret. Si enim τυμπαδεῖα, non tan-
tis difficultatibus res implicatur. Et data opera, si otium est,
quanquam ἐν τῷ τῆς ἰδέᾳ, morbos ad cerebrum pertinentes breui-
ter expediemus, & præsertim affectus soporosos. Apud Hip-
pocr. passim reperitur λίθαρρος, κῶμα κῶμα ἀγρυπνον, κίερος, κατὰ δόξαν, κατὰ
κατάληψιν, παρὰ κοτὴν, παρὰ φροσύνην, παρὰ κρείσιν, μανία, ἄνιστοις, & quæ ab his de-
riuantur, vt κατὰ νύκτα, κατὰ λαμβάνομεναι, κατὰ μέντοι, κατὰ δόξαν, & confi-
milia: horum ideas & differentias recensere non alienum. Vt
scias an ex humorum varietate desumenda sit varietas rerum, &
an prout nomina ipsa differunt, ita rerum distinctiones, formæ
& ideas differre videantur.

Omnis morbus aut intemperies est, aut solutio continui: in-
temperies aut simplex, aut cum humore, humor aut biliosus, aut
melanchol. aut pitui. aut sanguis ipse. Intemperies simplex,
aut cum frigidityte, aut cum calore, aut à siccitate. Mixta ve-
rò si partim sit intemperies simplex, partim humor aliquis. Ac-
cedit & varietas partium in cerebro affectarum. Nam aliud
est caput affici, aliud cerebrum: Cum enim cerebrum affici di-
citur, vel eius partes anteriores, vel posteriores, & quæ cum
spinali medulla communicant, vel ventriculi, iisque aut ante-
riores, aut posteriores aut medij afficiuntur. Rursum vel cum
febre, vel sine febre affectus est. Sic pro ista humorum, par-
tium, & ventriculorum varietate, pro præsentia absentiaque
febris res euariant. Quanquam sæpè nomina confunduntur,
vt sit potius de rebus, quàm de verbis laborandum. ^{κῶμα &}
^{κίερος} ferè pro eodem sumi videntur: sed tamen alia est idea τῶν
κατὰ πικρὴν ἢ κατὰ τὸ σπέν. ^{κίερος} vertunt soporem: & definiunt per re-
solutionem imaginatricis facultatis, sensum motumque omnē
adimentem excepta respiratione. ^{κῶμα} Causa est crassus & visci-
dus humor qui ventrem præsertim anteriorem occupat. Sic est
symptoma facultatis imaginatricis. Clausi omnino sunt oculi,
& priuatio motus sensûque, superest respiratio. In apoplexia
substantia cerebri potius afficitur, & eius pars anterior poste-
riorque, perit respiratio. In caro ventriculus potius anterior
occupatur, nec omnino perit sensus, & eo sopore discusso bo-
na valetudo consequitur. At apoplexiam, aut paraly. aut he-
miplegia excipit. Ab Epilepsia differt conuulsione, & quod in
Epilep.

Epilep. & anterior & posterior, Gal. vltima particul. lib. 6. Epid. pars occupetur. Et oculi sunt aperti aliquando, in catalepsi & catoche partes posteriores occupantur potius, attollunturque palpebrae. A lethargo differt, quod febris caron praecedat (quanquam omnino carus sine febre esse potest) lethargum febris consequatur. Et carus saepe aliorum morborum symptoma est, vt initia vigor (que febrium comitatur, praesertim cum vaporum crassitudo cerebrum offendit obruitque (vt in Prorrhethico docet Hippocratis interpres) vt in febribus pituitosis, & iis quarum sedes est circum ventriculum à collecta illuue. Et febris quae adest excitans *καρ*, tanquam symptoma maior est & apparentior quam quae in lethargo est. Quo modo forte audiendum illud Hippo. qui morbos vocat *ληθαργους*, quorum ratio ferè eadem est ac peripneumoniae. Fit autem cum focus febris continuæ est in pulmonibus (nam ante ex Gal. docuimus febrium focum in pulmone quoque consistere) & ij obstructi sunt valdè, & humore crasso, putrique pleni: qui enim ab ea materia fumi excitantur, dum obruunt anteriores cerebri partes *ληθαργικὰ* inferunt, & *καρ* ses, & *καρματ* ses. Et ab eo accidente quoniam aegri obliuiosi, socordes, veternosiqueiacent, affectus *ληθαργος* dicitur. Quanquam propriè magis *καρ* ses dici debuerat, siquidem omnis soporosa dispositio dimissis palpebris, libera existente *καρ* πη respiratione, praesertim cum symptomaticè succedit *καρ* ses dici potest. Sed lethargus generali nomine dicitur, quoniam *ληθαργος*, τὸ *ληθαργος* ignauum, desidem & obliuiosum significat, vt in arte parua Gal. legere est. At lethargus propriè dictus affectio cerebri est. Et definitur affectio cerebri à repentina obliuione nomen habens, vel delirium intermissionis expers cum febre, sopore, & celeri obliuione iunctum. Celeritas autem obliuionis significat inaequalitatem motus materiae in cerebro. Delirium ratione febris est, sopor ratione materiae quae generatione frigida est, corruptione vero calida.

Κῶμα videtur confundi cum caro, sed propter suas differentias debet distingui. Si enim carus inexpugnabile dormiendi desiderium cum immobilitate significat, *τὸ τὸ καματος*, differt quod pro specie habet *κῶμα ἀχρηπν*. Dicitur autem veternus, & marcor. Definitur deficiens & imbecillus motus facultatis imaginantis, à frigido & humido magnam somni cupidita-

tem inducens. Duplex est coma, somnolentum, & vigilans: illud lethargicis proprium, hoc phreniticis: in somnolento demittuntur palpebrae, sed excitati aegri sapiunt & respondent, mox desipiunt, quod variae imagines τὸ φανταστικόν represententur. Sic Coma somnulosum longè etiam differt ἀπὸ τοῦ κώματος. Galenus

Com. ad
part. 1.
lib. 1.
Prorrh.

in Prorrhethico ex quorundam, & sua opinione dicit omnem κατὰ τοῦ ἐν κώματι significare apud Hippoc. asseueratque hoc verum esse. Et sic κατὰ τοῦ ἐν significat propensionem ad somnum delationemque, quanquam sunt & qui κατὰ τοῦ ἐν duplicè faciunt, vñā somnolentā, aliā non somnolentam. Proprie tamē τῆς κατὰ τοῦ ἐν, nomine appetitus summi dormiendi, & summa inclinatio designatur. Et hæc de Comate & Caro dicta sint. Nūc de Catocho & Catalepsi, qui affectus sunt soporosi, & idem significant. Catoche & catalepsi à cataphora caro, & comate differunt in hoc quod in catalepsi, & catochō fit summa in somnum propensio oculis apertis, in Comate, Caro, & Cataphora committuntur oculi & palpebrae 40. Et hoc plurimū interesse dicunt ad causæ diagnosis. Etenim κατὰ τοῦ ἐν κατὰ τοῦ ἐν ab humore frigidiorē & sicciore originē habere dicunt, cuius sedes est in posticis cerebri partibus & ventriculis. In comate & caro anteriores occupantur,

Com. in
particul.
55. lib. 2.
Prorrh.

estque humor frigidus, pituitosus, crassus. Galenus Catochon ab exhausto spirituum inducta refrigeratione quadam & siccitate in cerebrum oriri scribit, exemplo adducto de eo qui cum impensius operam literis nauasset, ac elucubrauiſſet factus est κατὰ τοῦ ἐν. Κατὰ τοῦ ἐν enim dicitur ἀπὸ τοῦ κατὰ τοῦ ἐν, & τὰ κατὰ τοῦ ἐν dicuntur, ea quæ morbum κατὰ τοῦ ἐν inferunt, vel significant morbos fixos stablesque. Sunt qui κατὰ τοῦ ἐν κατὰ τοῦ ἐν idem esse putant, asseruntque quidam proceres Medici κατὰ τοῦ ἐν, κατὰ τοῦ ἐν κατὰ τοῦ ἐν

Catoche
& coma
vigilans
quid.

repperisse se in eadem significatione apud Hippocratem. Quanquam reuera differunt. Nam κατὰ τοῦ ἐν simplex intemperies frigida & sicca committit, κατὰ τοῦ ἐν pituitosus & biliosus humor committit: ideo inter phrenitin proprie dictam & lethargum ambigit. Quod si & catochē & coma vigilans bilem & pituitam causas sui agnoscunt, idem planè significant, debent tamen distingui. Fernelius idem esse contendit. Nunc rem absoluamus. In caro, cataphora, & comate multa est humiditas cum refrigeratione nervos imbuens atque dissolvens, vnde immoti & stupidi commissis palpebris manent: In catochō & catalepsi siccitas est potius quædam cum quadam per-

frigeratione, & veluti euacuatio dissipatioque spirituum. Et quoniam de catalepsi & Catocho nil adhuc inter autores, nec de causa, nec de sede, nec quem locum habeat inter alios affectus soporiferos constare video, in his vocibus explicandis paulo accuratior ero. Primum dubitant à qua causa, nam alij à frigidityte & siccitate esse dicunt, vt Gal. Vnde differens de pulsu ^{τὸν κατὰ φύσιν}, ait in illis priuationis motus causam frigiditati & siccitati tribuendam esse. Alij à succo melancholico esse aiunt, & verè affectum esse melancholicum. Alij à sanguine esse cōque multo, vt & comia vigilans quod Galeno scribit aliquando causam agnoscere sanguinem multum & bilem. Nam quatenus multus sua copia premens, soporem inducit, quatenus remissa est bilis, vigiliarum occasio adest. Et quatenus & vigilat & dormiunt ^{καταλεπτικοί}, & cataleptici, medium quid esse putant inter phrenitin & lethargum. Et reuera confundunt catalepsin cum typhomania, quam quid mixtum diximus ante ex Gal. ex phrenitide & lethargo. Atque in primis audiamus Aetium, deinde ceteros adducemus. Nam & Aetius, & Fernelius & Gal. & Rondeletius suas habent historias de catalepsi, quibus colligas modo ab his, modo ab illis causis pendere. Vt tandem nil de catocho & catalepsi definitum existat. Media est ^{Aetius cap. 4. sermo 2. Tetrab. 2.} affectio inter phrenit. & lethargum, species delirij medicis catoche & catalepsis dicitur, ex humore atra bilis magis contingens. Periculosior est quam lethargus, Verum in febribus lethargo similibus consistit. Aliquando dormiunt, aliquando palpebras apertas habent, aut nictant, aut intentos oculos habent. Immo immobiles habent, vt neque si quis oculis manum obtendat, claudant, voce & sensu priuantur, nec audientes, nec respondentes. Et cum vellicantur admonent aliquando manū ad naves & os, & tamen non sentiunt. Spiritus densus, aliquando rarus. Pulsus parvus & debilis. Per interualla magnus spiritus. Alius ob stupiditatem astringitur. Nec omnino phreniticis similes sunt nec lethargicis. Quandoque ob sanguinis multitudinem caput occupant & implentis malum fit. Ita sanguine abundanti adolescenti contingit. Factus enim verè catalepticus quarto die euacuato multo sanguine liberatus est. Ex hoc loco patet tum à sanguine catalepsin oriri, tum à quapiam alia causa: ideo dixit in febribus lethargo similibus euenire. Ac si dicat febrem in lethargo essentialē esse, in catalepsi symptomatica non est febris, nec essentialis cum catalepsi vt est cum lethargo, sed catalepsis ipsa sympto-

36 CONSILIORVM MEDICINALIVM
maticè in febrem incidit.

Historia Aetij de adolescente declarat à sanguinis copia esse catochon: supra demonstrauius *ἀπορία*, à repletionem esse. Catochus autem sine febre *ἀπορία* est. Historia Gal. superius adducta ex Prorrh. de condiscipulo qui inuigilauerat chartis, declarat catalepsin esse per quandam refrigerationem & squalorem *ἡ ἀπορία ἀδύναμις*: in vero somno refrigeratio quidem est, sed humectatio mediocris non reddit animantem inexcitabilem. At in catalepsi siccitas & marcor quidam reddit inexcitabilem. Historiæ sunt aliæ apud Rondeletium quibus colligas à succo esse melancholico catalepsin, aut veluti à melancholia morbo. Narrat de Puella quæ cum eum cui nupserat parum amaret, eo affectu correpta est præ moerore⁴³. Cum absens erat maritus aut de eo nil audiebat, restituebatur, audito eius nomine, corripiebatur. Et cum ferret hydriam recordans mariti in via sedebat, oculos apertos habebat, laruam, aut arte statuam effictam dixisses. Non mouebatur, non quicquā interrogata compulsæque respōdebat. Verè erat morbus iste quem Hippo. *φρονίσις* vocat, Latinè, cura & anxietas siue ægritudo animi dicitur. Ut quemadmodum *ἀσθένεια* est corporis, sic *φρονίσις* est animi: & *ἀλγύνη* vtriusque est. *φρονίσις* autem affectus verè est melancholicus. De eo nos dicturos amplius pollicemur.

At contra ea quæ dicta sunt occurritur bifariam: prius quod nec frigiditas & siccitas catalepsin inducat, vt nec melancholicus succus: posterius nec item sanguis. De frigiditate & siccitate ea est ratio: Catalepsis citò hominem occupat, item & citò aliquando soluitur. At frigiditas & siccitas non citò inducitur, ergo nec affectus eis cōgener citò inducetur. Nam quod à Gal. dictum est de Epilep. Idem & de catalepsi dici potest: verba hæc sunt, *Verum non ab ariditate & vacuatione Epilepsiam generari, sed à succo crasso vias spiritui obstruente, hoc est argumentum quod & citò fiat & soluatur.* Quomodo ergo inanitis per vigilias spiritibus, refrigerato & euacuato cerebro marcescentēque catochē subito inducetur? Reuera illo loco Gal. agit in eos qui Epilepsiam nasci putabant ab ariditate, squalore, & veluti hectica intemperie cerebri ipsius. Galenus verò instat, quoniam hoc repugnaret facili Epilepsiae generationi inuasionique, & facili solutioni. Ergo est potius ab obstructione in ventre aliquo, non

Rondel.
cap. 20.
lib. Me-
thodi
medicini
Historia
mirabili-
lis.
2. de
morbis.

Cap. 7.
lib. 3.
loco aff.

ab intemperie cerebri. Tamen idem de catochō videtur dici posse præsertim quod spectat ad exhaustum spirituum & refrigerationem siccitatēque cerebri. Nam de humore melancholico aliud est. Quis enim dubitat quin humor melancholicus possit catochon inducere, eo modo quo melancholiam morbum? Et cum epileptici fiunt melancholici per diffusionem materiæ in corpus ipsius cerebri, non in ventres, an vt melancholici fiant multum temporis requiritur? Nequaquam. Ratio verò eorū qui Actium arguunt quod statuatur catochon à melancho. succo esse, est, quod non omnes melancholici fiunt cataleptici, friuola est, irrita & inanis. Nam quemadmodum non omnes qui impensius vigilant, nec qui multo sanguine abundant cataleptici fiunt, sic nec omnes melancholico succo abundantes in catochon proni labuntur. Nunc expediamus quomodo catochos de repente oriatur, tametsi causa esse videatur refrigeratio, marcor & siccitas cerebri, vt historiæ vigilantium immodicè detexerunt.

*Qui epileptici
fiunt
melancholici.*

Ego vero sic sentio: Catoche quadrifariam potest occupare cerebrum, & actiones quæ à cerebro sunt labefactare. Primum per præsentiam humoris; secundò per intemperiem; tertio per resolutionem & primigenij humoris, & spirituum primigeniorum cerebri absumptionem, vt quid hæticum in cerebro esse videatur. Id est, Secundus modus fit per alterationem, Tertius per alienationem, vt exemplis patebit. Quartò fortem aliquam imaginationem rei tristic, vt spirituum animalium vel fiat conculcatio oppressioque vel dissipatio. Quomodo tunc melancholia dicitur, & cum affectibus melancholicis congruit: Eo modo quo prius citauimus ex historia puellæ maritum odio habentis: & ex Hippo. cum disputat *melancholicos*. Quæ omnia nisi ad vnguem tenueris, de catalepsi nil vnquam certum habueris. Maximè verò ad veram essentiam catalepticos non tam præsentia humoris requiritur, quam ea intemperies, & anxietates solitudinisque animi de quibus diximus, concurrente maximè corporis & cerebri temperamento, vt corpus sit siccius, strigosiusque. Præsentia humoris est vel vt sit sanguis, vel vt sit succus melancholicus. Sanguis bifariam, vel sua quantitate premens, vel qualitate, id est, vt mora in cerebro per vigiliis, aut mæores melancholici humoris naturā acquirat, florem enim facile suum & nitorem sanguis amittit. Sua quan-

*4 Modi
catoche
fieri possunt.*

titate dum sanguis præhendit premitque cerebrum, præsertim si libera est respiratio, vt pote partibus obfessis posterioribus, & si iuuenis est, qui cum non faciliè obruatur & stupidus iaceat, à copia sanguine pressus, veluti vigilans manet: tunc catalepsis sanguinea dicitur, & ad *καταληψίαν* proximitate accedit.

Si qualitate potius sanguis peccat, tametsi prius esset laudabilis, melancholica catalepsis dicitur. Fit autem cum plenitudo est aliqua in cerebro ad vires, quam cum natura non regit dum moram trahit ibi sanguis facile immutatur, præsertim si quis calor alienus adueniat, vt tota affectio *καταληψίαν* esse dicatur.

Et quemadmodum corpora sanguinea si effluuium nō habent, melancholica redduntur: quod in toto corpore fit, id in capite fieri potest: vt particularis *καταληψία* sit suppressio & ob congenerem suppressionem, morbi congeneris generatio, quo in sensu Hippo. dicebat: *Facies color bonus, & mæstitia multa, malum.* Quo

Part. 14
lib. 2.
Prorrh.
Gal. c. 7
lib. 3.
lor. aff.

loco Gal. demonstrat quomodo *καταληψία* melancholici fiant, cum facile sanguis aduratur, & succi melancholicæ naturam acquirat. Quæ in eo Com. scribuntur huc maximè pertinent. Maximè

verò sanguis in capite immutatur, si quis aut natura sit melancholicus, aut ex euentu, & non *καταληψία* *καταληψία*. Nam cum melancholici, vtrouis modo sint, perpetuò aliquid animo versent atque voluant, faciliè ea cura, agitatioque sanguini mutationem conciliat. Atque eo modo tales in catalepsi proni sunt, præsertim verò si qua causa extrinsecus aduentarit, quæ semen morbi ipsius sepulchrum excitauerit. Et tales Catalepses repente possunt incidere, quemadmodum & epilepsia, & apoplexia. At non sic quæ ab intemperie frigida & sicca, aut quæ à resolutione, aut à morore, quas explicare consilium est. Si

Quæ ca-
talepsis
repente
non in-
cidit.

quis auidius & diutius incumbit chartis, præsertim si noctes in-
somnes ducit dissipatione spirituum & siccitate præsertim hu-
morum fluentium & spirituum, rigidus potest manere & catale-
pticus, quasi in cœlam raptus. Sic non est quod ij argutuli
requirant longum valde tempus ad inducendā istam intempe-
riē frigidam & siccam, & præsertim quod pertinet ad alteratio-
nē, & fluētes tum spiritus & humores. Quid enim tā facile diffi-
patur instauratur quā spiritus. Testatur ij qui natura famelici
sunt, qui statim expallescent & dissoluuntur, guttula verò vini
refurgunt & ad se redeunt. Et dum quis ita exhaurit labore ce-
rebrū, iam rudimenta futuræ catalepticos habebat, prout per-

feuerabat effluuium spirituum, sed malum non apparuit, quan-
 diu iam partes solidæ inuadi cœperunt. Sunt enim quidam
 morbi qui non prius apparent quàm iam tacitè clâmque ali-
 quot tempora percurrerint, & cum nos præhendunt, iam penè
 in vigore sunt. Quod de diplaco elegantissimè & subtilissimè *Cap. 3.
lib. 6.
locutus in
male
affectu
pena.*
 Gal. docet, ait enim diabetem qui affectus est renum non protin-
 nus dignosci: sed quoniam renum naturale est desiderium, &
 ab eo sensus nostri non afficiuntur, etiam cum ad statum venit,
 ne percipitur quidem. Quod caninæ appetentiæ (quæ analogiâ
 respondet diabeta) non accidit, quia enim ventriculus ani-
 mali desiderio tenetur, protinus eius affectiones deteguntur &
 apparent. Itaque quod de diplaco diximus, idem de catalepsi,
 ea præsertim quæ intemperiem frigidam siccâque cerebri se-
 quitur, dicemus. Cùm enim se profert, iam principium mor-
 bi videtur elapsum, & vigor adest, in perpetuo enim tenore
 malum perseuerat. Est & alia catalepsis à quadam resolutione
 per alienationem cerebri, & ea repente incidit, sed non solui-
 tur facile, immo lethalis est. Quod repentinè incidat, id audien-
 dum est quoad sensum, non quoad generationem. Nam oc-
 casio causâq; fouebatur sensum, sed affatim malum sese repræ-
 sentat: Vnde cum nos alloquimur agros, videmus eos statim
 mutos, & oculis apertis catalepticos fieri, dispositione hæctica
 iam contracta, & vitio impresso partibus sese statim proferen-
 te. Ante docuimus duplicem esse phrenitin, vnam manifestam
 in alteratione cerebri, alteram occultam in alienatione. Et hæc
 deterior est. Idem de catalepsi dici potest. Propriè autem *Vera ca-
talepticos
essentia.*
 catalepsis, quatenus speciè morbi efficit propter alienationem
 contingit, vt non solum spiritus & humores fluentes vim passi
 sint, sed & in partibus solidis ipsius cerebri nota inuratur. Talis
 catalepsis in morbos longos, & febres incidit, cum dissipatio fa-
 cta est animalium spirituum, calor naturalis imbecillior factus,
 & hæctica dispositio inducta in cerebrum. Dicam quod nobis
 videre contigit. Seruus equitis torquati totam hyemem quar-
 tana duplici, cum febre lenta laborarat. Exhaustus & marci-
 dus penè erat. Repentinè catalepticus factus est squalidis &
 siccis redditus spiritibus: sic generatio longa fuerat, sed inua-
 sionis modus subitus fuit, sed non est solutus morbus nisi
 cum morte. Sic cum requirunt argutuli ad generationem
 catalepticos nescio quid vt cito fiat & solvatur: reuera quæ per

40 CONSILIORVM MEDICINALIVM

resolutionem fit, non soluitur citò quia ab exhausto est, sed lō-
gam habuit generationem. Et eo modo docuimus ante Gal.
quodam in loco ad phrenitidis generationem longum quod-
dam tempus requirere, in alio docet etiam subito fieri. Sed no-
dus hic soluendus est priore modo explicato Filius Domini
Pouart, Consulis Regij, Catalepticus interiit cum duos men-
ses tertiana laborasset, & penè extabuisset. Et reuera, vt planè
fatear, vt repente adoriatur catalepsis, non tam facit sicca in-
temperies, & squalor (nam potius ad tarditatem inuasionis fa-
ceret) quam motus quidam symptomaticus qui quodammodo
suscitat, impellit, & animat malum hoc quod in visceribus &
medullis latebat. Vnde iste puer catalepticus capite dolebat
ante, & in ipso morbo catochus tantus ardor percipiebatur, vt
manum vreret. Sic dispositio ad catalepsin in capite fora ali-
tāque sese protulit per translationem symptomaticam cuiusdā
venenati vaporis, aut natura sese in cerebrum exonerante, &
morbi sarcinam deponere volente. Et tales catalepses sunt ab
exhausto. De iis audiendus Apho. Hipp. ⁴⁶ *que cum exaltatione fiunt*
Et catochæ & aphoniæ, perniciose. Sequuntur enim summam pau-
pertatem caloris naturalis, & naturæ imbecillitatem, sūntque
mortis paranympii. Quarta species catalepticos sequitur for-
tem imaginationem rei alicuius præsertim tristici, & animi con-
cussionem ægritudinēque, vt viduis accidit aut mœrore cō-
fectis, aut pauentibus & metu consternatis: siemifideratæ
manent, oculis apertis, & corpore immobili: ideo pace Ronde-
letij dicam, id quod puellæ acciderat congressum mariti repu-
dianti fuit quidem catalepticum: sed non tam humorale fuit,
quam vt sic dicam, mentale & spirituale. Putat id fieri à san-
guine qui in succum melanchol. conuersus fuerat: ego verò po-
tius animi *in uia*, fuisse iudico per vim fortem imaginationis
quæ efficit vt nobis quodam modo abripiamur, & extra nos si-
mus, quod non animaduertere eos qui Aerium repræhendūt
miror. Quanquam fieri quidem potest vt humorum & natu-
ra. & propensitas corporis ad id concurret. Et in eo sensu au-
diri potest quod Hippoc. in Aphor. dixit vt antè enarrauimus:
*Si quis de repente obmutescat, & lingue incontinens fiat, id melanco-
licum est.* Rondeletius contra eos egit qui à sanguine esse ne-
gant.

Huic disputationi finem colophonēque addituri pauca ad-
iiciemus

*Qui fiat
Catal-
psis sub
finem
morbo-
rum.*

*Per. 4.
lib. 3.
Prorrh.*

licemus ad ea quæ dicta sunt. In caro læduntur actiones quæ sunt in cerebro, in apoplexia eæ quæ sunt à cerebro. De Coma hoc quoque sciendum ex sententia Aetij, ^{Cap. 6. Terrab. 2. serm.} quod nascatur sæpissimè ex calidis & humidis vaporibus qui à cerebro efferuntur. Cur autem Linacer Coma verterit marcorem non video nisi quod marcere significet torpere, item languore atque inertia teneri. Celsus cum de Lethargo loquitur ait, in hoc marcor est, & inexpugnabilis dormiendi necessitas. Nomen ^{καματος ἀπὸ τῆς καμάζης} derivant, quod est crapula & comestationibus indulgere. Fortè quod ^{καμάζοντες} facile in talem morbum incurrant. Vnde nescio quid in mentem venerit Suidæ, vt non ^{κάμα}, sed ^{κῆρυ} definiuerit ex vino ebrietatem, & grauem cum mentis impotentia soporem Græcè ^{κακία}. Nisi quod ^{κῆρυ}, dicatur ^{ἀπὸ τῆς κῆρυς}, id est à capite, quod ^{κατὰ τὴν ἀντιπροσίαν} læditur atque offenditur. De Catalepsi quoque hoc sciendum. Non omnes Cataleptici eodem modo habent: vna enim est absoluta, in qua torpidum & marcidum omnino corpus manet, altera non absoluta in qua partes etiam aliquæ sua munia obeunt. ^{Dinosa catalepticon ldea.}

Dexteras partes dolere narrabat.

Locus est satis insignis apud Hippo. qui difficultate non caret: Disputans enim de Empyicis ait, optandum potius esse vt ^{3. de morbis cap. de pleuritide de ex dorso.} sectio fiat in sinistris partibus quam in dextris. Nam dexteras vrere aut secare lethalius est. Quantò enim robustiores sunt partes dextræ, tantò fortiores in ipsis morbi fiunt. Quæ an vera sint, quoniam hoc longius patet, ipse videris.

Olim sanguinem ore reiecitauerat.

Ex ore sanguis multis modis reiicitur, vel quia è gingiuis, vel quia ab aspera arteria, vel à capite fluit, vel quia è corpore pulmonis, vel è ventriculo excernitur. In libris de loc. aff. notas dat quibus scias vel hinc, vel illinc fluere. Quod nobis metum attulit, fuit illa vetus reiectio sanguinis è pulmone cum iam diu laborauisset. Et ideo cum phthoe, aut vlcus sæpè consequatur hæmoptoicos, latentis abscessus in pulmone erat suspicio. Ita enim Hippo. omnem excretionem sanguinis è pulmone suspectam habet, ob ea quæ consequi solent. Quanquam

42 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Apb. 37.
lib. 7.*

Hippo. diorismo vtitur, Qui sanguinem euomunt si sine febre, salutare, si cum febre malum. Nomen *συνεχὲς τὸ δυνάμει* v. *συνεχὲς* significat. Galenus in com. non vult verbum *εὐεχὲς* significare excretionem è pulmone, sed vomitionem propriè sanguinis audiri, tum quod sanguinè vomere minus malū sit quā è pulmone educere, tū quod omnis è pulmoneeductio, ait, mala sit. Nam si febris non adsit, etiam periculū est ne non citò curetur, si malum durauerit, breui febris aderit. Tamen in Coacis non vtitur verbo *εὐεχὲς*, sed *συνεχὲς*. Sanguinem spuentibus, ait, confert, vt sint sine febre, leniter doleant, sputum tenue sit ad dies bis septem, febrile, iussire contumaciter, & recentem semper sanguinem excernere malum. Quanquam propriè de pulmonibus loquens vtitur etiam in Coacis verbo *εὐεχὲς*. Reiectio è pulmone si sit tantum per anastomosin aut diapedesin, non ita mala est, si per *διὰ τῆς*, omnino suspecta esse debet. Et nos bifariam dicemus è pulmone sanguinem reici posse, vno modo loco hæmorrhagiæ, altero ad exonerationem partis alicuius in qua graue aliquod periculum crearetur. Inueniuntur quibus occluduntur viæ ad nares. Si sanguis non absimitur in incrementum loco hæmorrhagiæ è pulmone educitur sanguis innocuè, item & in quibusdam sanguineis, aut in mutilis hæmorrhoidon loco. Et in eo sensu Celsus reiectionem sanguinis ex asperis arteriis, immò & per penem non omnino damnat, præsertim si febris non adsit, aut per commodum alium locum fluere desit. Locus Celsi præclarus est valdè. Altero modo sanguis expectoratur in hepaticis & lienosis, Lienosis per cœliacā, vt contigit filio ⁴³ Præsidis Parisiensis. Is sanguinem affatim expectorabat: omnia penè pulmonum vasa rupta putabantur, & periculum tabis adesse putabant. Tandem dum fortè contingitur hypochondrium sinistrum, percipitur pulsus in ea parte, & palpitatio. Tunc hic latere fontem mali putant: & tractum ductumque sanguinis manu percipiunt. Consultum est lieni. Multum & validè repurgatus, cessauit palpitatio & pulsus, item sanguinis reiectio. Ceterum credibile sanguinem & spiritum ibi compressum & conculcatum fuisse, & propter cruditates cacochymiamque veluti obsessum, vnde successisset necessario aneurysma. Accedit quod nondum ex ephebis excesserat, & cum lautè viveret, multus erat sanguis qui cum per nares non euacuaretur, aliam rapuit viam. Ita legimus à suppressione mensium pulsam

*Cap. de
Tussi
lib. 4.
sed hoc
desum-
ptum ex
lib. 2.
Prorrh.*

ad partes vteri paruisse: vt in vxore Gorgia. Et in vxore Phili-
 lini pulsus in Hypochondriis aderant ob cruditates, ait Galen. 5. Epid.
C. 1.
 In hoc & erat suppressio sanguinis, & cruditas: Quod de filio
 illo consulis dictum est, idem nostro agro euenire potuit, vt illa
 sanguinis reiectio non tam vitium pulmonum sequeretur, quam
 copiam & orgasmum sanguinis in præcordiis, & propter affec-
 ctiones melancholicas ⁴⁹.

Venam secumimus à secta vena repetit malum.

In *ἀσθύνει* dubitant valdè medici an sectioni venæ locus sit.
 Hippoc. non omisit sæpè. Immo eam aduocat in eis affectibus.
 Et Gal. non abs re Hippocratem phlebotomiam amasse ac fre-
 quenter celebrasse autor est. Sed vt summus & prudentiss. fuit, Parr. 3.
sectio. 1.
lib. 3.
Epid.
 non nisi tempore, iure, & loco id fecit. Si quæ antè dicta sunt
 animo comprehensa fuerint, iam aliqua ex parte tibi hac in re
 satis erit factum: Docuimus enim inter *ἀσθύνει*, quosdam omni-
 no refrigerari, quosdam calferi, alios omnino immobiles esse,
 alios aliquatenus mobiles: Rursum quosdam fieri per venarum
 interceptiones, aliàs per oppressionem magnam, aliàs per sum-
 mam debilitatem & quandam caloris naturalis oppressionem,
 & velut extinctionem, in quibusdā dominari crudos valdè suc-
 cos, in aliis non. Itaque vt non est eadem idea morborum qui
ἰσχυρὰ, nomine continetur, ita non iisdem idē remedium, &
 præsertim venæ sectio congruit. Præterea eodē in loco docui-
 mus Hippo. in iis morbis *μεγὰρ οὐκ ἔστιν* desiderare, aliàs non. Im-
 mo & in morbis istis frigidis conuulsiones corpus quatientes Com. in
part. 27.
lib. 4.
Mento.
 commodè eueniunt, vt antè adduximus. Hippocrates lib. 4.
 acutorum scribit: *Cum quis repente obmutescit, id venarum interce-
 ptiones faciunt, si sano absque forti occasione contigerit: Venam igitur
 internam brachij secabis.* Nam in sequenti Aphorismo docet no-
 tas abundantis sanguinis, & tunc audacius venam reserabis. Sed
 paulò post, quod valdè notandum est, dum meminit epilepsiæ,
 apoplexiæ, paraplexiæ, per commotionem humorum factæ;
 deinde *ἢ αὐτὸν αὐτὸν*, id est stationem ob egressum humorum à pro-
 priis vasis scribit ⁵⁰. Talibus prius adhibitis fomentis venam
 statim aperies, cum nondum fixa sint omnia, quæ contristant,
 tum spiritus, tum fluxiones. Facilius enim remediis patent.
 Sic in duobus istis locis non longè à se distitis *ἐν ἀσθύνει*, primo
 quoque tempore venam secas, nulla præparatione præmissa, in

44 CONSILIORVM MEDICINALIVM

2. de
morbis.

sect. 5.

In libris
de mor-
bis me-
dicis.

aliis vtitur præparatione. Reuera summus vir nullas rerum distinctiones omittit. Et in lib. de morbis dum loquitur de morbo attonito ait: *Hunc attonitum si sic habuerit lauare oportet multa calida, & quam maximè calfacere & aquam mulsam tepidam in os insillare. Hoc autem maximè faciendum cum humorum congelatio ac concretio est.* Quanquam Galenus videtur contentus sola frictione, non fomento, quoniam non ita semper concreuit sanguis vt effluere non possit. Sic post frictionem phlebotomiæ locus esse potest. Et in Epid. *Quicumque de repente voce destituantur, si sine febre fuerint, is statim venam secato.* Quæ omnia conueniunt cum iis quæ dicta sunt ex lib. 4. acutorum. Et mirum est cur voce destitutis venam aperit, si sine febre sint, cum potius febris ipsa ad phlebotomiam hortari debeat. In quo tacitè reprehendit medicos qui cum febrem percipiunt, statim dicunt se saltem ratione febris secare venam. At errant valdè, quia Hippocrates vim remediūque ponit in febre, præsertim si sit analoga morbo. Mirorque aliud omnino sentire Hippo. aliud nostros homines agere. Sed de ea re fortè dicturi sumus. In eodem lib. 2. Epid. phlebotomiam in Epilepsia celebrat, eius verba sunt, *τάχυν τὰς εἰς τὸ πρὸς τὸν κρανίον τὰς μεγάλας ἐν τῇ στήνι γινώμενα.* Secabis venas interiores, si magnus morbus in intentione est. Illud est obscurum, *ἐν τῇ στήνι.* Epilepsia videtur inter morbos numerari quos ἐξέδιδας Hippo. vocat, quòd redeant periodo. Sed vt rem breui finiam reuocaturus Lectorem ad Com. Fœsij in lib. 2. ἐμὸν. Epilepsiam morbus acutus est, & chronicus. Acutus bifariam tum ratione paroxysmi præsentis in quo conuelluntur ægri, & si nunquam adorsus est. Nam vt Celsus annotat, cum nunquam solitus est quenquam præhendere, sæpè hominem consumit. Quod ex Hipp. desumpsit, qui ait senes maximè Epilepsia perire si nunquam correpti fuerint. Adeo vehemens hic morbus est, maxime si quis, eius insolens fuerit. Chronicus est quia sæpè redux est, & homini *συμπαρονοήσις*, vt loquitur Hippo. Cum ergo dixit Hipp. secandam venam in Epilep. dum in intentione est, credo Hippocratem non tam de morbi ipsius curatione agere vt cum phlebotomia tollere velimus, quàm vt occurramus periculo quod nunc adurget. Ac si dicat, dum vexata accessio ipsa & premit rediens morbus, venam secare bonū ad amotionem præsentis periculi. Quod Aretæus præstat in curatione Epilep. Nemo enim dubitat Gal. & Hippocratem

In Epilepsia secare venam ad anteuertendum paroxysmum: sed modo ex Gal. colligas secari debere malleolum, modo brachium. Et ita sibi parum constat. Sed eam difficultatem diremimus in primo libro Consiliorū capite de Epileptica muliere. hoc valdè animaduertendum est. Atque ita *ἐν τοῖς γινόμενοις* interpretamur, ceteri suo vtantur iudicio. Et vt ad rem redeamus. In hoc nostro agro venam aperuimus iuxta doctrinam Hippocratis, quod translatio esset symptomatica. Aetius in Catocho & Catalepsi, de quibus dictum est paulò ante, præsertim cum affectus sunt à sanguine statim venam secat: sed cum ab alio humore sunt, videtur eandem sectionem auersare¹¹. Quod autem paroxysmus redierit statim vena secta, non existimo sectionem venæ id per se effecisse, sed cum morbus valdè premeret, omnia confusè & tumultuariè acta sunt. Et tunc secta vena est, cum paroxysmus redire deberet. At nondum de circuitionis tempore nobis certum erat.

Cap. 4.
Terrab.
2. serm.
2.

Cæpit statâ periodo reuerti, idque noctu.

Longum arduumque esset de periodis morborum disputare¹². Nec enim id hoc loco tractandum est: ne omnia vno loco simul explicentur. Solùm duo nobis sunt explicanda an quod periodo malum rediret, aut dispositionem partis, aut humoris proprietatem sequeretur. Cum malum in cerebro sedem habet causamque fixam, ferè non intermittit, vt quidam putant. In eoque distinguunt cerebri affectionem per protopathiam, ab ea quæ sit per sympathiam, quod illa stabilis sit, hæc instabilis & fugax: sic distinguunt deliria phreniticorum, vt antè dictum est, ab iis quæ in febres continuas symptomaticè contingunt, quod hæc fugacia sint, hæc autemque minimè, illa verò stent permancantque. Quanquam nec hoc verum est, nisi fortè in acutis¹³. Nam cum febris vrget, aut dolor capitis, si causa hæret cerebro fixaque est, ea habet fixa symptomata, facta comparatione cum iis quæ à causa pendent extra cerebrum posita. Sed in Chronicis, quoniam cuique humori sua est periodus & *ῥοπή*, non est necesse perpetuo malum sæuire, licet in cerebro diathesis sit, aut humor. Sic dolores dentium exercebantur hac aut illa hora, tametsi causa in cerebro loco proximo denti affecto lateat. Et ophthalmia certo quodam tempore exasperatur, licet causa in procinctu fuerit. Vnde quæstio est subardua an

46 CONSILIORVM MEDICINALIVM

intermissio in agro demonstrarit aut in cerebro dispositionem esse, causamque latere, an aliunde manare. Nam est quibus actu mens agrotat, ij non perpetuò delirant, sed *τα πολλά*. Quod si vt plurimum fiat, non necessario in cerebro causa posita esse videtur. Nisi fortè aliud esse dicas intermissionem, aliud remissionem. In morbis quorum aut causa, aut *διὰ τῶν* in cerebro locatur est potius *ἐκ τῶν*, remissio, in morbis quorum causa longius posita est, intermissio esse videtur? Et quocumque in loco humor positus fuerit, certas tamen habet inclinationes, cum antea docuerimus nil in natura sine ordine & circuitu fieri. Unde alij morbi nocturni, alij diurni, alij matutini, alij vespertini existunt. Et quod huic nostro agro maximè media nocte malum exacerbaretur, & iam in suspicionem malè affecti pulmonis venisset, illud suppurati nobis opinionem fecit: Si id verum quod scribit Hippo. *Προσέτο*, ait, *in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculum sunt, dolores sunt ad noctem.*

5. Epid.
Histo. de
Trinome
Damo-
nis filio.

Restitutus narrabat.

Com. ad
part. 55.
sectio. 2.
lib. prior
Prorrh.

Verè hoc totum quod huic agro contigit catalepticum & catochon esse videtur. Nam *οἱ ἀγρυπνοῦντες*, vt Galenus docet, cum soluti sunt paroxysmo meminerunt eorum quæ acta sunt, quodammodo audiunt, & actionum quorundam recordantur.

Febre carebat.

Polliciti sumus antè dicturos nos cur Hippoc. sæpè dicat, absque febre, *ἀπὸ πυρετοῦ*, *ἀπὸ πυρετοῦ ὅτι* ⁵⁴. Quoniam indicationes sumuntur ex eo quod febris adsit, vel non adsit. Et vt prius annotauimus ex secundo Epid. secat venam in aphonia si sine febre sit. Quasi velit in aphonia febrem quodammodo dehortari phlebotomiam. Id autem propterea fit, quòd si febris adsit ea cruditatem succi possit dissolvere atque quodammodo coquere. Ita Epilepsiam quartana soluit. & Tetanum febris, & febris item commodè aliquando conuulsioni superuenit. Et Hipp. scribit: Subitaneis apoplexiis, si febris mediocris adsit (quod Græcè *λεηλυμένως ἐπιπυρετικαί* vocat) perniciosum, vt Numenij filio. Acuit enim potius humorem, & deteriotem facit, naturamque debilitat, non autem dissipat, & frigus corrigit. *Accet*

dit quod cum parua est febris & multus humor crudus, plus fu-
mi excitatur & minùs discutitur. Et alibi passim calor febrilis
dolores Hypochondr. ab obstructione, aut frigida materia na-
tos soluit. Quod est audiendum cum febris est potius sym-
ptomática, quam essentialis, & cum in caloris potius non pu-
trentis excessu, quam in putrente, vt sic dicam, calore consi-
stir. Nam cum in putri materia accenditur, quoniã putredo
inimica est naturæ, maior noxa naturæ infertur. Et miror, vt an-
te dictum est, medicos adeo ignaros vt in Apoplex. Epilep. ver-
tigine, parapleg. cum vident percipiunturque febrem, iustè
venam secari oportere putant. Et in suis deliberationibus à fe-
bre ipsa secandæ venæ indicationem sumunt. Immo quia adest
febris, à phlebotomia est temperandum. Ac me herclè vi-
dendum, cur in quibusdam affectibus absentiam febris com-
mendet, vt cum loquitur de sanguinem ex ore reiicientibus, in
aliis verò eiusdem præsentiam febris laudet. Nisi fortè quis
dicat, Hippocrates cum dixit: Si quis fit aphonos sine febre,
venam secato, vocem & diorismum istum, Absque febre, non
tam addi vt eius præsentia phlebotomiam dehortetur, quàm
vt nobis tacitè aliquid demonstret, nimirũ si febris ipsius apho-
niæ causa est, non secabis venam, non quod fortasse non locus
eo in casu phlebotomiæ sit^{ss}, sed quod indicatio curandi non
ab aphonía, sed à febre capienda sit. Febris enim fortè phlebo-
tomiam, fortè aliud remedium indicat. Sed aphonía ipsa per
se, quatenus talis, sine febre, vt febris ipsa nil indicet, phlebo-
tomiam postulat. Exempli causa sputum sanguinis postulat se-
ctionem venæ, nisi sit pleuritis, nam pleuritis dissuadet. Quasi
verò in pleuritide non sit secanda vena? Immo tunc secandi
capitur occasio, cum sputum cruentatur. Cur ergo ait pleuri-
tin indicare ne secetur vena in sputo sanguineo, hoc non vult
Hipp. Quanquam litera id videtur indicare. Sed considerat
sputum cruentum, vel vt morbum, vel vt symptoma. Vt mor-
bum cum est proprio vitio pulmonis, & tunc *αἱμορροϊκὸν ἢ ἀπὸ*
ἐξοι dicuntur^{ss}, vt symptoma cum sit ob pleuritin. Cum enim sit
ob pleuritin, nõ ex se postulat, phlebotomiã, est enim ipsa pleu-
ritis quæ fortè postulat, aut non. Nam cum medendi pleuri-
tidi alia ratio sit quàm per phlebotomiam, fieri potest vt spu-
tum sanguinis nullo modo phlebotomiam indicet, quatenus
symptoma est, Quatenus morbus, omne sputũ cruentum phle-
botomiam insinuat.

Errat
Medico-
rum.

Aph. 37.
lib. 7.

Par. 44.
sectio. 3.
lib. 6.
Ep. vide
Com. ad
Aph. 16.
lib. 1.
Apho.

Spiratio frequens, non magna, rara, licet deliraret?

Actius cum disputat de Catocho varias spirandi difficultates explicauit. Ait enim, spiritus densus, aliquando rarus, ex interuallis magnus. Quod in hoc ægro contigit. Ac primum quod magna difficultas esse debeat in affectibus partiū in ventre contentarum, non solum in thoracis partibus (quod malè quidam autumant) primum ex Gal. patet: *Perſpicuum eſt quod ventriculus, peritoneon, ſplen, hepar, aluus, ſuperiora tenuia inteſtina, & muſculi præcordiorum in magnis thoracis motibus dolore vexantur, minus in paruis. Ob id paruus & denſus non ſolum in pleuriticis, ſed in ventriculi doloribus & totius ventris, ſpiritus erit. Minus verò prout eis ſenſus minor eſt.*⁵⁷ *Conſimiliter reſpirabunt qui hepar, aut ſplenem, aut aliquod ex eis membrum effectum habebunt: Omnia enim talia partim appenſa, partim agnata reſpiratoriis instrumentis, ad horum motum commouentur. Omnino autem denſus & paruus ſpiritus ſignum eſt doloris omnium animalis particularum quæ iuxta reſpirationem commouentur.*

Cap. 12.
lib. 1.
de diff.
reſp.

Quæ hoc loco dicuntur à Galeno valdè sunt notanda ferè enim omnes cum difficilem respirationem vident, accusant pulmones. Et ex iis quæ dicta sunt duo valdè notanda erunt: prius est quod propter difficilem respirationem, causâ ipsa thoracem non egrediente, sæpè dolor oboritur in partibus ventris aut in ventriculo ipso.⁵⁸ Et tunc malè Medici partibus dolentibus in anum applicant, cum dolor oriatur ex euentu, quia nimirum pendentes aut agnatæ partes ventris inferioris, instrumentis respiratoriis, trahuntur in consortium partium superiorum. Sic in validis tussibus, præsertim cum inanes sunt dolorè audiuius tantum in ventriculo natum, vt necessariò opitulandum ventriculo ipsi fuerit.

Posterius quod notandum est, quemadmodum difficultas respirationis facit vt vi sympathiæ dolores in partibus ventris inferioris oriantur, sic difficultas aliqua spirandi oritur ob lésionem dolorè que partium in ventre contentarum. Et tunc est adminiculandum partibus ventris inferioris, relicto thorace, & partibus eius. Quod maximè in ægro nostro contigit, nam summa difficultas erat respirationis, & causam affectis pulmonibus aut thoraci assignabamus, sed malè: Erat enim latens in hypochondriis.

Quæstio

Quæstio alia, cur cum deliraret aliqua ex parte magnum & rarum, sed frequentem sæpè spiraret. Magna & rara enim spiratio delirantium est. Etenim, vt præclare demonstrat Galenus: *Immoderatam facere spiritus attractionem, quod est magnum spirare, & rursus immoderatam quietem (quod est rarum spirare) eius est qui neque quando desinere ab actione oporteat, nec quando incipere ob ignorantiam nesciat.* Et quoniã de iis abundè Gal. libro adducto, & ne fortè omnia hic cõfundam⁹, hoc diorismo rē definiemus. Non quoties quis delirat, magnum & rarum spirat, sed quoties magnū & rarū spirat, mente motus est; nisi occurras de mœstis & sollicitis qui dum anguntur magnū & rarū spirant. Sed non tã propriè est magna & rara respiratio, quã suspitiosa, & velut dupla intro reuocatio, vt loquitur Hipp. De distinctione causarū respirationis in mœstis & in deliris, quanquam analogã esse videtur, Gal. cap. 6. lib. 2. de diff. resp. Sic magna & rara spiratio est propria delirij, non tamen inseparabilis. Præterea omnibus deliriis potest comes adiungi rara magnaque spiratio, non omnibus deliris: quia contingit hunc aut illum delirantem, & habere aliquam affectionem quæ necessariò alteret illam respirationem, quæ ex se quidem phreniticorum propria est, sed ex euentu immutata; vt si quis delirat & phreniticus est, vnâque costa, aut inflammatur, aut hepar præsertim ad gibbas, aut lienis pars superior, aut osculum ventriculi, aut tenue intestinum, aut musculi thoracis, non hic expectanda est etiam præsentè delirio magna rarâque spiratio, sed densa, & parua. Et vt ait Gal. *Si à solo delirio respirationis integritas confunditur, magnus & rarus spiritus erit perpetuò: si à solo dolore paruus & densus, si delirium & dolor concurrat, & dolor superet, obscura ex delirio alteratio erit.* Nam si dolor fortis est, perfectè euincit respirationis difficultatem, quæ ex delirio inducitur, vt non amplius magna & rara sit. Maximè verò dolor immutat si ab inflammatione non ea quæ phlogosis dicitur, sed phlegmone, vt placet Galeno eodem in loco. Ceterum præter cætera, valdè est commemorabile quod Galenus docet cur nimirum Dealcis vxor delira per totum morbum, & magnum rarumque per tempus spirauerit, quod delirij propriū fuit, & rursus breui spira (Græcè *εὐχρηστος*) cum tamen deliraret. Sed notandum quod dixit, hinc magnus & rarus spiritus per tempus, in quo dubitatur an per omne, an per aliquod tantum tempus: sed audiendum est per omne tempus. Nam sub finem

Tomus II.

G

50 CONSILIORVM MEDICINALIVM

historiæ ait, perpetuò erat magnus, & rarus spiritus, sed vtrumque cohæret. Cum dixit per tempus, voluit indicare exiguum quoddam intervallum in quo brevispira esset, sed illud intervallum non fuit tanti, vt propterea in toto morbo non diceretur magnum & rarus spiritum habuisse. Nam quod rarò incidit, non pervertit continuitatem. Et ad hunc locum demonstrandum Gal. citat alium in quo Hippo. vult docere totum annum vacauisse flatibus, quamuis adiecerit, Et etiâ parui sparsim spirauerunt. Hoc enim continuitatem *τῆς ἀερίας*, absentis non interturbat. Et ob eas à nobis allatas causas æger non magnum & rarus spirabat, tum quod delirus planè non esset, tum quod dolor aderat de quo quereretur, qui etiam si delirasset magnitudinem & raritatem respirationis interuertisset.

Ilia ducendo.

Varia & multiplex fuit respiratio. Et ductio ipsa elatioque laboriosa hypochondriorum magnum aliquid subesse indicabat quod naturam ad agendum aliquid incitaret. Quemadmodum enim antea docuimus, si quid est præter naturam contentum in ventre inferiore, maximè circa ventriculi os, illud ratione continuitatis difficultatem respirationis afferre potest. Vt etiam pondus & oppressio ventriculi homines *ἡσέλει μύθος* reddere potest, id est, quasi ex ventre loquentes, quia libertas sermonis ob oppressionem erepta est. Quod Polemarchi vxori contigit: *Circa cor*, ait, aliquid colligi videbatur, respirabat more submerisorum, ex pectore substrepebat, veluti qui clauo ore loquuntur, *ἡσέλει μύθος* vocant. Et qui spirant Ilia ducendo, aut propriam in pulmonibus latere affectionem indicant, aut in ventre inferiore. Vt mulieres dum hystericae fiunt, antequam omnino *ἄννοι* fiant, spiritum ex Ilibus ducere videntur, diaphragmatis, quod liberæ respirationis instrumentum est, oppressione.

Aliquid Hypochondriacum erat congenitum.

Hoc non absque ratione additum est, vt latentis mali & Medicorum captum superantis probabilis aliqua ratio reddatur. Nemo ferè erat qui inspectis oculis, colore, gestu, actionibus,

capillo, & reliquis id genus: item more morbi, non dixisset id esse melancholicum.

Actiones quodammodo phreniticæ erant, propterea diximus antè, *more phreniticorum insiliebat*: aut vt veriùs dicam, aliquid erat *μενιγόν*. Taciturnus valdè erat: & vt, inquit Gal. perpetuò loqui phreniticum est, sic tacere melancholicum. Sic ad melancholiam affectum erat corpus, vt ante diximus, cum eius temperamentum explicaremus, duòque Hypochondriacorum melancholicorù genera proponeremus: accedebat & illa causa procatartica, metus, & mœror de quibus antè quoque explanatum est. Quod autem hic dicitur de congenito habitu hypochondriaco illud sicco pede non praterendum, nec aure supina audiendum. Hippo. in Historia de filia Euryanactidis postquam eas destillationes explicauit quibus erat obnoxia, & quæ mortem accelerare potuerunt, sub finem ait, *ἢ ἢ π* *κοιμή- νων φθινώδες*: tabidum erat congenitum ⁶⁰, Gal. in Com. ait: *Μεμν- νισse autem, oportet cur Hipp. dicat ingenitum esse tabidum propter Sophistas qui nullum affectum innatum esse asserunt. Caterum illa innata tabes & dispositio tam repente illam filiam non sustulisset, sed quia cum eo affectu natiuo erat quoque extinctio facultatis naturalis, id repentinæ mortis causa exiitit.* Circa ea quæ de filia ista tabida à prima origine, tria obseruanda sunt, primum est quod natura gentilitij sunt morbi & innati: secundum quòd ij per se non tollunt perimuntque nisi aliquid aliud concurrerit. Tertium & maximè præcipuum est, quod sub finem Com. Gal. addit: nimirum cur parù sollicitè & artificiosè Hipp. Dies criticos annumerauerit in tractanda ista Historia. Quod in ceteris tã negligenter non fecit. *Nil est, ait, cur tam curiosè de diebus criticis queramus, cum illi in ista historia nullum habeant ordinem, quia mortem à capite destillatio attulit, & natiuum tabidum.* Quasi verò non fuit natura ordinata in morbis, tamen si occasio & à naturali constitutione fuerit, & à capite? Nunquid morbi capitis periodon suam habent? Immo ante docuimus nil in natura fieri, sine periodo & ordine. Id quòd hoc loco à Galeno dicitur, habet me-hercules aliquid stupendum & notandum cum ait: Nullum ordinem dierum, in ea historia seruat Hippo. quoniam mortem & destillatio à capite attulit, & natiuum tabidum. Quod vt illustremus, hoc vnum dicemus. Morbi *ἀντιστοιχοί*, & *συγγενικοί*, sequuntur vitium totius substantiæ, & *ἐκ τῆς οὐσίας* consistunt. Sic produ-

Com. ad
histo. 15.
sect. 2.
lib. 3.
Epid.

Hist. 6.
sect. 2.
lib. 3.
Epid.

52 CONSILIORVM MEDICINALIVM

cuntur, aut repente interimunt prout latens in eis malignitas, se prodit ac profert. Vnde videmus eos qui stirpe tabida sati sunt, aut latens à natura vitium contraxere minimè opinantibus nobis eripi, quod morbi eorum non habeant aliquid ordinatum & periodicum, vt qui in humoribus consistunt. Humores enim habent fluxum & refluxum, momenta & inclinationes, quò fit vt sese nobis facile prodant. At id quod connotum est, & in interiore partiù natura immersum ac implicitum, cum nostros sensus lateat, sæpè incerti sumus de iis quæ circa ea geruntur, & quæ ab eis pendent.

Aliquid pulmonicum putabant, aut à pure vaporem, aut tuberculum.

Qui pulmonicum quempiam dicit, nil certi designat, & erratur hic maximè. Tamen politico loquendi modo pulmonicum aliquem dicimus cum vel satum parentibus pulmonicis videmus, vel certa sese nobis offerunt signa quibus labem aliquam in pulmone latere colligamus. Cum tussiculofus est, cum stridulam habet vocem, dum impeditam, dum propter rationem emaciari videmus, dum genæ rubicundum floridumque aliquid habent, & in cæteris pendulæ videntur. Quam loquendi formam secutus Hippo. aliquem *πλευμῶν*, id est, pulmonicum esse dicit, quem nos tabidum vocamus. Et ideo Cornarius vertit, *ἢ πρὸς πλευμῶν*, Cum quis ex pulmonis affectu tabescit, postea enim hoc explicando aperit omnia signa quæ adesse solent in phthisico. Cæterum ideo suspicabantur aliquid esse pulmonicum, quod olim sanguinem reiectauisset ore. At nos docuimus antè hoc fuisse potius hypochondriacum quàm pulmonicum.

Lib. de morbis.

Lib. 2. Præf.

Dolor iste, & calor repentinus à tetro vapore efferri putabatur, ob collectam circum pulmones materiam. Nam cum insolentia ista viderentur symptomata, omnes causas confingebamus, & vndique eruebamus. Et in tam ancipiti negotio ignorabatur à qua parte id manaret, & cui auxiliandum foret. Quo loco possumus recensere illud quod de Epilepsia, dixit Hippoc. nam & ad alios morbos cōverti potest. Grauius habent ab Epilep. quibus hic morbus adest nullam significationem præbens ex qua corporis parte initium sumat. Nam quibus ex capite initium capit, aut latere, aut manu, aut pede facilius curatur. Et

LIBER SECVNDVS.

53

rursus differunt hæc genera, nam quæ à capite sunt, grauissima sunt, deinde quæ à latere: quæ à manibus & pedibus, facillimè curantur. Quomodo dicimus eos citò mori qui fortiter, sæpè, & sine causa manifesta exoluuntur: quasi verò si exoluantur à tuberculo in corde (est enim causa quædam manifesta præsertim cum suis se signis exhibuit) illud minùs malum sit: sed hæc per comparationem audienda sunt. Nam id fit ob curationem. Si enim certo scias à capite malum esse, aut à brachio, aut alia parte, illud est quodammodo numerandum inter τὰ φανερά, præsertim si compares cum latente sede, & latente causa. At medicus in eo maxime debet laborare vt τῇ διαρίᾳ, συζασιῶ, aut αἰαλο-
γιαῶ, aut τοῖς τεκμηρίοις, venetur & exploret sedes affectas. Non aliena erat suspicio è tuberculo vaporem efferri horum autorem. Nam cum diuturnus aliquis lateris dolor est qui ordinariis remediis non cedit, is in suppuratum abit, ait Hippo. Et lib. de morbis adhæsum pituitæ ad costas, inflammationem inducere ait, & dolorem pleuritidi similem: Ac si ea pituita valdè puri analogâ inflammetur, quis dubitat quin non efferri possit teter vapor cerebrum feriens? Ita enim scribit, *Si pus in ventre morietur, totum corpus ab eo calefcit, maxime partes vicinæ. Calefciente corpore humiditas eliquatur, &c.* Quomodo autem caput facillè incalefcit ob affectos pulmones, Gal. explicat in acutis.

In Com-
cis.
lib. 1.

Com. in
part. 17.
lib. 4.
Acuto.

Aut articulorum pulmonis conuulsionem.

Quia despiebat, & ita torquebatur quasi pungens & stimulan aliquid circum pectus eum sollicitaret, ideo veniebamus in opinionem illius morbi quem Hippo. ἀσπληνὸν τῶν ἀρθρῶν τὸ πλεόμωρον Lib. 2
vocat. Huius vide descriptionem in lib. de morbis.

Lib. 2
de mor-
bis.

Vstio, sectio, maturatio flagitabatur.

Ferè de crudo tuberculo laborabamus omnes: ac tum quærebamus num maturandum esset, quod à maturatione fortè plus periculi. At Hipp. loquens de pleuritide in qua crudum est tuberculum ait: *Melius est suppuratum fieri etiam si dolorosum fuerit. Minus enim lethale est.* Et eodem lib. cum loquitur de iis qui iam suppurati erant, sed translatum est pus à loco in locum ita dicit, oportet autem rursus pus maturari: Nam ex eo quod

G iij

*Alij Ephialtem & Hypochondriacum suspica-
 bantur.*

Com. in Cum morbi tam insolenter inuadunt, se nisi suis pathogno-
part. 2. monicis signis aperiant, difficile est de iis statuere. Nam multa
lib. 1 sunt signa *ἐμφασις καὶ ὁμογενὴς*, quę multis conueniunt morbis. Incubo
Errrh. laborantes, & hypochondriaca passione multa habent signa si-
 milia. Ceterum cum olim tantum sanguinis reiecisset, & ta-
 men calido & sicco esset temperamento, illud humores synce-
 riores reddere potuit, id est, sero suo natuo (quod humores
Part. 6. mansuefacit) destitutos. Et Gal. docet siccos non ferre eua-
lib. 2. cuationem sanguinis, id est, quibus aluus sicca, & qui squalidi
Errrh. sunt ⁶¹hemorrhagia etiam critica eis mala est. Multo magis si
 critica non fuerit ⁶². Ceterum non abs re de Hypochondriaca
 affectione dubitabamus, non omnes serē hypochondriaci per
 sympathiam quandam occultam thoracem dolent. Et Medici
 existimant in pulmonibus latere malum, aut costis, cum id fiat
 tantum ratione dispositionis Hypochondriacę, in qua flatus
 excitantur pessimi qui oberrantes dolorem pectori inferunt, &
 difficultatem spirandi afferunt. Vnde etiam ante diximus
ἐν σπύραις, contingere posse propter affectum & mesenterij, &
 ventris inferioris. Incredibile enim quanta patientur hypo-
 chondriaci melancholici. De quibus extant hist. apud Hipp.
 De Nicanore, Damocle, Phœnice, qui cum essent melanco-
 lici varios dolores in spina, collo, capite, tendinibus pertule-
 runt. Itaque Medici debent maximē ad corporis naturā atten-
 dere, vt non temerē affectus vnus pro altero supponatur. Nam
 noui plerisque hypochondriacis sectam esse venam ob dolo-
 rem lateris, cum is tantum esset ratione cuiusdam flatus ab Hy-
aph. 4. pochondrio surgentis. Quanquam Hippo. ventositatem fla-
 tuosam phlebotomia soluit, sed de ea audit quę cum phlogosi
 est, vt in hydrope sicco ob inflammationem lactium, vt phlo-
 gosis sufficiat ad flatum generandum, non ad dissipandum.

Post purgationem conualuit.

Illud usurpauimus, melancholicos infra purgato ad eundem

LIBER SECVNDVS.

55

Tentauius vomitoria Hippocratem secuti, qui obiter præclarum præceptum proponit. *In purgationibus instituendis, ventres subpurgabis in morbis, cum matura fuerint, infra, ubi confidisse videris. Signum habes, si nec anxij, aut capite grauati fuerint, aut cum post exacerbationes cessarint. Sursum verò in exacerbationibus.* 5. Epid.
 Tunc enim sua sponte eleuantur, cum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Hic Canones explicantur adhibendæ purgationis sursum aut deorsum cum casus isti præcipientes existunt.

Eruperant pustulæ ambustis similes, an quia splenicus?

Nemo intelliget illud cur adiectum fuerit, *An quia splenicus* nisi res Commentario illustretur. Tuberculorum & efflorescentiarum quædam malignum quid habent, & cælo tribuendum, quædâ à corpore sunt ⁶⁴. Quæ à corpore, aliàs Cacochymiam sequuntur, aliàs aliquod peculiare habent, & certam partis aliquius dispositionem sequuntur. Vt qui sunt melancholici, aut hepatici, aut aliter affecti, aliquando aut tuberculis, aut maculis inficiuntur, quæ sunt notæ peculiare affectionis partis, aut temperamenti corporis. Sic in pulmonicis suffusio genarum, in hepaticis frontis & faciei florescentiæ quædam, in conuulsione articulorum pulmonis circulares notæ in tibiis apparent, in quodam fluore albo mulierum, & in morbo pituitoso appellato eminentiæ quædam cutis apparent subtumidæ quas Hippo. *ποικίλ* appellat: Ita & lienosi habent maculas quasdam nigricantes, aut affecto lieni, aut toti corpori congeneres. 2. de morbis. c. 2. de morbis mulierum.
 Quod Hippo. annotauit de fratre Aristei vxoris, hinc tubercula parua Therminthi vocata apparuerunt *αισινέας*, & subdit, *ὁ πόνος αὐτῆς*. Ac si reddat rationem, cur talis eruptio contigerit, vt dispositio in splene talis eruptionis causa fuerit. Ideo quærimus de agro, an quia splenicus erat? Ideo medici cum aliquid foras vident insolenter erumpere, non statim malum quid ominari debent.

Tandem multis euacuatis valido medicamento restitutus perfectè fuit. Vt ex curationis euentu qui multis vltro citrò tentatis rerum fidem fecit, tandem collegerimus à suppressione peculiaris cuiusdam excrementi in prima regione corporis tantum morbum, tantis comitatum symptomatis obtrigisse. Sed

36 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ad ideam tanti morbi & causæ procatarcticæ, & n̄ idcirco sup̄iora con-
currerunt.

Porro plura multò in historiam morbi traducenda erant, nisi
nos consuetudo Hippo. quem vnum vt ducem optimum imi-
tari consilium est, ab ea re reuocasset. Non enim ille, vt Thu-
cydides, omnia narrauit, quod historici proprium est, non me-
dici præsertim compendium confectantis. *Thucydides*, ait Gale-
nus, omnia scripsit, etiam idiotis nota, Hippocrates verò pauca ex iis
qua ad affectionem pertinent, circa qua agrotus est periclitatus: multa
verò alia scripsit idiotis neglecta, artificiosam tamen & exactam cogni-
tionem exhibentia, & qua etiam optimos medicos latere possunt. Et
multa alia eo loco scripsit de distinctione modi scribendi Thu-
cydidis & Hippocratis.

Cap. 7.
l. b. 2.
de diff.
reft.

Si nos longiores fuimus in scribendo, quàm ratio postulauit,
& ab Hippo. via, quam tamen nos velle sequi vt optimam pro-
fessi sumus, desistere videamur: id nos duabus de causis fe-
cisse intelligat quisque velimus. Partim vt multa suppetant ad
alias, quas deinceps scripturi sumus, historias. Ex his enim quæ
in vnius hominis paulò fortè ampliùs abundantiusque historia
conscripsimus, multa eruemus eliciemusque quæ tanquam
professione aliqua probata certaque ad aliorum fidem demon-
strationemque pertinebunt. Partim quoniam vidimus aliud
esse interpretis fungi officio, aliud scriptoris. Dum enim mo-
menta rerum omniù inquirimus, cur fiant, quorsum pertineant,
si id verbo, concisèque docere volumus, intra breuitatis angu-
stos parietes legentium animos cogemus. Quod vitio repræ-
hensionèque cariturum non est.

ANNOTATIONES.

1. Quod omnis morbus febris dicatur isque communissimus ex eo pa-
tet quòd frequentissimus, & sæpè acutissimus, aut acutis propè omni-
bus connexus sit. Vere enim synochus, æstate continua, ardens, tertiana,
vt plurimū sæuit, Autumno quartana vel erratica, Hyeme quotidiana
Calo sicco acuta, pluuio diuturna. Podagra mulieribus, pueris, eunuchis
parcit, febris nulli ætati & sexui; Morborum plurimi tantum anima-
lem, aut vitalem, aut naturalem actionem laedunt, febris omnes actiones
labefactat. Quam ob causam fortè Romani febrem ne noceret coluisse
dicuntur, vt sanissimam & malignissimam luem.

2. Vt

2. Vel quia nullum ferè malum, nullus morbus adoritur quengquam quin febris non statim consequatur.
3. Hoc notandum est. Et nuper in D. Comite apparuit qui vitio iecoris interijt. Febris enim non satis videbatur ad eam necandum.
4. Febris capitalis, & particularis quid sit. Gal. com. ad Apho. 42. l. 7. istas appellationes reijcit, febris lienosa, hepatica aut capitalis.
5. Hipp. Initio lib. 7. Epid. narrat de quibusdam febribus Epidemijs quæ erant valde mites & inuicæ, id est lenes, ut non viderentur febrile egrotantes nisi in temporibus, sic febris capitalis erat.
6. Rigor inanis in paroxysmis dolorem capitis accersit, & sæpè rigores in dolorem terminari videmus: & (quod mirum) in sorore domine Ganguier, idem rigor dolorem lateris iam presentem sine sudore, sine vlla excretionem sedauit.
7. Vnde Arculanus cap. 15. De Incubo loquens ait, id fieri propter pororum oppilationes, per quos poros spirituum lationes & metus fiunt: Et ut fiunt per istam oppilationem, ita egrè solvuntur sæpè, & Hipp. lib. de Iudicationibus, ait initio febrium hepar intumescere & expandi. Hinc Gal. in Proorrh. explicans eum locum, refrigeratio cum duritie Græcè *παρὰ τὸν αἵμα* signum malum, si in solis accessionibus febrium id fiat, id est durities ea contingat cum quadam perfrigeratione, malum moderatius indicat: si diutius permanet, maius, si verò perpetuo, mors vicina est. Sic apparet duritiem apparere in paroxysmis eamque non esse valde malam.
8. Inter ceteros locos vnus est commemorabilis ad part. 45. sect. 2. acut. Vbi docet Gal. Deliria initio morborum esse contra naturam & indicatoria, vique tantum morbi fieri.
9. Incredibilia sunt symptomata quæ eueniunt in principijs accessionum. Hinc Hieronymus Gabucinijs narrat quendam iuuenem vidisse se febre quotidiana laborantem, qui simul ac accessio prehenderet, syncopizaret, deinde epileptico modo conuelleretur. Eodem pertinet Histo. Domine Vieillard, & eius quæ ad mortarium aureum habitabat. Et id multis contingit similiter.
10. Aliquando, nam Gal. 3. locorum affect. docet eos quibus latissimæ sunt venæ aptos esse ut humorem melancholicum congerant.
11. Venus & Bacchus dicuntur non quædæ, & nervi fragi, quæ ob causam pueri & eunuchi podagra non laborant cuius duas potissimum causas statuit Galen. Com. ad Aph. 28. lib. 6. partium nervosarum imbecillitatem & humorum prouentum.
12. Coitus calefacit. an quod semen frigidum? Reuerà semen non est

58 CONSILIORVM MEDICINALIVM

frigidum nisi improprie ut & sanguis qui frigidus dicitur Hipp. lib. de carnibus, & sub finem libri de corde. porro cum dicit per coitum excerni è corpore frigiditatem, ex hoc loco intelligere possis textum Hipp. 6. Epid. Ad incrementos morbos mixtio. I. Coitus.

13. Sanguis cum dicitur frigidus, id per comparationem cum sanguine arterioso intelligendum est, aut quia aqueam consistentiam habet & non suum calorem retinet diu, ut ceteri humores.

14. Tamen Com. in part. 27. lib. 4. Acutorum vertigines & apoplexias ob stationem, suppl. humorum fieri putat. Cum vertigo medium quid esse dicitur de vertiginis vera generatione, in qua tum vis natura, tum infirmitas apparet. Sed est alia vertigo quæ fit per commisionem alieni spiritus à partibus imis elati, & ista non eodem modo dicitur media, quo prior illa. Caterum Gal. libris de locis affect. vertiginem ab inequali intemperie cerebri nasci scribit. Si quando de vertigine disputandum erit legendus est locus iste ad part. 42. lib. 4. Acutorum ubi ex professo agit de vertigine. Et inter cetera docet an sit utendum balneo & quando. Qui locus est notandus, quoniam de eare sæpe controuersa est. Id uxoris D. de la Grossetiere historia docuit.

15. Lib. de insomniis statim initio: sed melius sect. 8. 6. Epid. ait Hippo. Mentis σύννοια, id est intelligentia ipsa per se agit & negotiatur citra instrumenta, sperat, dolet, tristatur: Exemplo docet cuiusdam seruae quæ omnium meminerat quæ in morbo euenerant.

16. Huc pertinet illud Arist. In Physiognom. ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι συμπαράσκει τοῖς αἰσθητοῖς, ἢ τῆς ψυχῆς ἐξὶς ἀλλοιούμενη ἀλλοιοῖ τὸ σώματι τοῖς μελεσίν.

17. Hinc patet Epilep. apoplex. vertig. fieri aliquando per ἀπόληψιν φλεβῶν, aliquando per τὴν χύμαν διάχυσιν. Duplex ἀπόληψις, & σύντηξις, una proprie dicta quæ fit per quandam ἀσσειχέωσιν ἢ ἀδύσιν, & ea proprie calori tribuitur πυρκαϊκῶ, ut est calor partes solidas κακοῦθως depascens: altera est ἀπότηξις, quæ aut sequitur plenitudinem, aut relaxationem, aut diffusionem præsertim à calore extraneo moderato.

18. Στάσις humorum quæ, & an sit cum apoplexia epilep. vertigo oritur. Est ubi humores mouentur & opprimunt, est ubi stant, & obstruunt. Et id diuersa ratione fit ut hic explicatur.

19. Conuelli corpus aliquando bonum est, ait Galenus hoc in loco. Sed plenius hoc Gal. demonstrat ad part. 26. sect. 3. lib. 1. Prorrh. Quomodo paraplexiam conuulsio minnerit. Conuulsiones in frigidis affectibus utiles sunt.

20. Apud Hippo. notanter legitur τὰ αἵματος φλεβῶν αἵματι, id est, sanguinis venarum suppressiones, quas ait leiporhymiam inducere sectio. 7. lib. 6. Epidemiorum.

21. Inter ceteros locos est praeclarus, lib. de diebus Decretoriis apud Hipp. ubi rursum explicat istam ἐμπρόσω, & εἰσόν, lib. Acutorum, & propterea rationem reddit tantarum vomitionum, anxietatum, & cardialgiarum quae in principiis morborum fiunt: Acutus morbus fit cum bilis in hepar ἐμπρόσω ἔς κερὰν καὶ τὴν. Hepar enim intumescit, & αὐξάνεται, & ἐξέπνυς expanditur ad septum, & multa alia ibi commemora-
bilis.

22. In libro à me conscripto de urinarum hypostasi vocem istam ἐμπρόσω explicauimus.

23. Διυγῆν, vertimus in serum verti, vel sanguinem serosorem, & saniosum fieri, quod in corporibus humidioribus fit facile praesertim si perflatum non habeant, si adsit febris, & humores putreant. Hinc Aristotel. 3. de Hist. animal. cap. 19. ait, si sanguis immodicè tumescit, morbus infestat. Sic in speciem saniei diluitur (quod διυγῆν dicitur) & adeo ferescit, id est, serosus fit ut iam nonnulli sudore cruento exudarent. Et Parrhisiensium corporum sanguis omnium facillimè ob humiditatem διυγῆν. Hipp. lib. de dentitione διυγῆν, serum multum reddere dixit. Unde in morbis videmus cum sanguinem qui initio laudabilis erat suamque οὐρεσιν habebat, διυγῆν serosum reddi, & multorum eam ob causam malorum autorem. Multa urinatione aut sudore defaecatur, & suū denuò statum retinet. Et fortè illud est quod Hipp. scripsit in causo ichores biliosos in venulas arefactas attrahi. Magna enim vis est ichorum, & seri ad orgasmum humorum, id quod dysenteriae docent: & facilis per sudores criticos illud serum emolientes, solutio. Et videmus in morbis nisi tempore secta fuerit vena, & calor corrumpens adsit cachecticum habitum induci, & serosum sanguinem reddi multis de causis: Quod dum fit morbi soluti sunt difficiles, & frustratum sapius sanguis mittitur.

24. Gal. Com. ad Apho. 51. lib. 6. Narrat causam doloris capitis repente oborti homini sano à spiritu flatulento maximè esse.

25. In sequentibus docuimus, an quis ἁγέτορος, & ἀναυδός esse queat, & tamen deliret.

26. Et multis concusso cerebro vox intercepta fuit recreati ac reuelati à morbo meminere eorum penè omnium quae acta erant.

27. Immo vidimus quosdam quibus, cum diu sine capitis dolore laborassent, repente ortus est capitis dolor insignis, & paulò post mortui sunt.

28. Medici diligenter debent animadvertere, an aliquid debeant moliri cum hominem attonitum febrisprehendit. Nam talis febris potius apoplexiam tolleret quàm eandem foveret. Et tamen cum febre

Hij

60 CONSILIORVM MEDICINALIVM

abortam vident, tunc legitimam phlebotomiae celebranda occasionem porrectam putant.

29. Secunda hac species phrenitidis tacita, obscura deterrima est, ut & loco allegato Prorrhethici apparuit, & in historia de uxore Dealcis sect. 3. lib. 3. Epid.

30. Sect. 3. lib. 3. Epid. Dealcis uxor erat phrenitica, & tamen febris ad manum lenis videbatur, & extrema partes frigebant. Id fiebat ob mixtionem humoris melancholici: Hippocrates enim subdit, aut multa loquebatur, aut tacebat perpetuo. Taciturnitas melancholicum humorem designabat. Et Gal. cap. 1. lib. de succi bonitate, ait in pestilente constitutione inuasisse simul altum soporem & vigilias ob diuisam victus rationem quam in calamitoso caeli statu transegerant. Ista enim pituita quae cerebrum copia obruit praesertim si salsa aut acida fuerit, cum inflammatur, ardorem incredibilem excitat. Id quod in articulorum doloribus ab ea pituita natis obseruamus.

31. Τὸ ὡς τις, & τὸ ὡς, gallicè dices, vn seu couert, quod ad homines stupidos referunt in quibus subest quedam agilitas.

32. Hæc sunt in Com. ad part. 73. sect. 2. lib. 1. Epid. Pulmo focus febrium est ardentium.

33. Non ita haeret quin perturbetur, & agitetur quodammodo, sed impressit suam vim ipsi cerebro. Ita enim ad par. 26. lib. 1. pag. in phreniticis vult varia spectra adesse, διὰ τὸ διαλυθῆναι τοὺς χυμοὺς, id est turbari. Vide ante cum diximus & humorem in partem fluxisse etiamnum moueri, si tumor phrenitidem faciens egressus est, quomodo mouetur & διαλύεται.

34. Cum deliria sunt phrenitica, iunctum est τὸ ὅραον: cum sunt symptomata febrium continuarum τὸ ὅραον, non adest.

35. Tamen in histo. de phrenitico, & aliis multis in locis statim phrenitis orta est.

36. Nec rationes sufficiunt hoc in Commentario adductæ ad intelligendum de quo queritur, sed scire quoque oportet eundem etiam humorem varia posse morborum genera efficere. Nam vel per venas fertur, aut iis figitur, vel per nervos, rursum vel eorum capita, vel medium, vel corpus internum, vel medullam, vel membranam occupat: Item per innumeros poros, aut meandros fertur, quas inanitates vocamus: ut mirum non sit, si prout vel hoc modo, vel illo fertur humor, vel has vel illas partes, aut vias occupat: Itaque morbi enarient.

37. Caueant Medici prædicere se depræhensuros aliquid in capite eorum qui morbo cerebri interierint.

38. *Affectus cerebri, aut sunt παρορκοί, καταρκοί, aut κεφαλαί-
μοι, aut καταρκοί.*
39. *Hæc opinio est Gorrhai: & ea non est probabilis, potius enim induce-
retur Epilepsia, sed verum est partem capitis anteriorem occupari, non
ventriculos, præsertim solos.*
40. *Sedes & causa τῆς κατὰ τοῦς, hæc autem à sicciore humore nasci
dicitur.*
41. *Rondeletius vult non esse καὶ μὴ ἀρχεῖνον, sed κατὰ τὴν ψυχὴν, quæ inter le-
thargum, & phrenitin ambigat, quod ea à copia magis sanguinis fit:
hic est autem magis frigidus quam qui phrenitin facit, magis calidus
quam qui facit lethargum.*
42. *Catalepsis à copia sanguinis quanquam in præcedente pagina à
siccitate oriri dicta est. Notanda hæc decisio, est autem ubi catalepsis
in febres longas incidit, (ut nos vidimus) & à siccitate & refrigera-
tione oriri dicitur, est ubi in initium febrium incidit corpore iuuenili, &
tunc à sanguine esse potest.*
43. *Et reuera cum vulgus catalepticos, aut κατὰ τοῦς videt, melancholi-
cos vocat, & id affectionis genus à mærore oriri putat.*
44. *Ita enim Gal. in Prorrhético, ait, quo modo totum corpus per in-
temperaturas afficitur, ita & caput.*
45. *Videmus enim in paucorum dierum febre corpus ita sæpè resiccare,
ut marasmodos penè reddatur. Id quod maximè biliosis accidere solet.*
46. *Nam in quibusdam morbis est τὸ κατὰ τοῦς, in aliis τὸ κατὰ τοῦς. In quibus
est τὸ κατὰ τοῦς, Deterior est natura, deterius ingenium, in apoplecticis veris in
quibus est τὸ κατὰ τοῦς, vera τὸ κατὰ τοῦς cernitur.*
47. *Reiectio sanguinis per os formidabilis putatur. Hoc in capite si-
gna diagnostica attulimus quibus faciliè discernas ubi illa excretio me-
tuenda sit, & ubi non. Ceterum vide locum præclarum apud Plin. ca-
pit. lib. II. de Maximo Visco, & Volusio, qui hæmoptoici forent.*
48. *Et tandem ille extabuit, & post istas reiectiones sanguinis
minus prospera valetudine est fretus fluebat affatim sanguis, & τὸ κατὰ τοῦς
αἵματι, ut in 4. Aphor. loquitur.*
49. *Inter locos, quos vnumquam legi, celeberrimus est lib. 2. Prorrheti-
con, cum loquitur περὶ τῶν ἀπὸ τῆς αἵματος, id est, de excretionē sanguinis
per os atque ait Hipp. inter hæmoptoicos euadunt quicunque dolores ha-
bent melancholicos, & in dorso, & in pectore. Quasi hi minus laborent
& periclitentur quàm alij. Accedit, & id quod notauimus de Latonio
Crespiensi Valeſio in vico des Nonnains d' Hierre, qui excreuit ingen-
tem copiam sanguinis nigri, ἀπὸ τοῦς, & habitu valde melancholico est.*

62 CONSILIORVM MEDICINALIVM

E regione lienis in ventriculum eructabatur, & miraculo euasit.

Porro quod ad melancholicos pertinet, ij sepe sunt flatuosi: status autem maxime facit ad ruptionem venarum, & proinde ad sanguinis reiectionem. Id quod Gal. Com. ad part. 13. sect. 3. lib. 6. ep. annotat dum rationem reddit, cur μεγίστοις δὲς hæmoptoici fiant, flatum enim id adiuuare auctor est.

50. In omnibus enim istis doloribus τὰ πεπραγμένα spectantur. Porro duplex est ἡ νόσος, ἡ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἡ ἐν τῇ σπλῆνι.

51. Lib. 7. Epist. Historia est de Halicarnassensi, cui cum auris, & caput doluisset sectione venæ læsus est, quoniam (ait Hippocr.) suppuratio facta non est forte idem contigit agro nostro.

52. Locus est præclarus apud Gal. Com. ad Aphorismum 63. lib. 4. ubi vult diathesin ipsam, non autem humorem noui paroxysmi causam. In quibus, inquit, febres soluuntur ac rursus redeunt remanet quædam dispositio præter naturam in corpore à qua secundum circuitum febres, & alij casus generantur. Vnde D. Sylvius annotauit febrium quartanarum fomitem dispositionem cancrasam in liene esse. Et hoc vocat Hippo. cum dicit, Autumno splenes. Sed inter ceteros est vnus valde memorabilis ubi loquens de vitilagine docet morbos & dispositiones manere, facta etiamnum euacuatione: vnde mirum non est si ex hominibus tertianariis quidam intra 4. aut 7. circuitus sanentur, alij verò non nisi intra annum. Et iste locus ad multa vtilis est, & vt medicus sese calumnia liberet. Vide Com. ad part. 17. lib. 2. Prorrh.

53. Annotandum est quod scripsit Plinius cap. 51. lib. 7. C. Mecænatē perpetua fuit febris. Antipater Sidonius Poëta, vno tantum die natali singulis annis corripiebatur febris: & eo die consumptus est satis longa senectū.

54. Gal. in Com. in part. 4. lib. 1. Prognost. ait calorem febrilem tenues humores consumere, & crassiores attenuare. Attenuare autem, est, excitare à crassis humoribus, ὁρμῇ καὶ ἰσχυρῇ: vnde tam repente dolores excitantur in febribus.

54. Idem enim hoc est ac cum dixit ad sputum cruentum dissuadere phlebotomiam, sed hoc vult, si sputum cruentum est occasione pleuritidis ne sumas indicationem secandi ex sputo, quoniam forte ipsa pleuritidis non petit phlebotomiam.

56. Ἀναρροεῖται δὲ τὸ αἷμα, quanquam τὸ ἀναρροεῖται, iis attribuitur qui suspirant, & supergemunt, quasi spiritu interciso interruptoque.

57. Hac omnia exemplis apparent, & plenissime cap. 7. lib. 2. de diff.

resp. si forte de iis sit dicendum. Conformiter iis quæ hoc loco dicuntur Gal. ad part. 28. lib. 1. *σπυγώσι*, ait difficilem esse respirationem, *σπυγώσι* aut ventriculum, aut hepar, aut lienem tenet.

58. Et in primo Tomo Consiliorum annotauimus à contento in renibus calculo difficilem inferri respirationem. pag. 81. 82. & sequent.

59. Dicebantur *ἐνσπυγώσι*, illi qui vel pythionem, vel demonem quendam in ventre habere dicebantur qui clauso hominū ore responsa darent.

60. Hippo. lib. 2. Prorrhet. loquens de tabe, hydrope, & reliquis morbis, ait *τὸ ἐνσπυγώσι νοσήσαντων δύσ ἀπλάκτον εἶναι*, quæ locutio Græca notanda: sensus est, Quibus morbi sunt congeniti, ij haud facile ab iis exoluuntur.

61. Hipp. lib. de internis affectionibus loquens de hydrope à liene docet dolores in mammis & scapulis oboriri: an propterea ad phlebotomiam recurrendum?

62. Qui Hypochondriaci sunt & flatibus abundant, & cruditatibus, utrumque imaginationem pleuritidis asferre potest, quia & in cruditate ipsa & flatuum copia facile thoracis dolor excitatur. Quod Aërius amplissimè tractauit, cap. 68. sermon. 4. Tetrab. 2. & cap. de inflammatione stomachi, cap. 27. sermo. 1. Tetrab. 3. & Fernelius cap. 11. lib. 5. Pathol. & reuera melancholicus hic fuit morbus. Et omnino similis est histo. 7. Epid. de quodam qui in olyntho iacebat.

63. Tamen hic dubitabis, an cum manet anxietas, & grauitas capitis num potius per aluum reuellendum sit quàm per vomitionem vacuandum contra id quod sentit Hippoc. Nam omnis vomitus caput replet?

64. In febribus sæpè exanthemata quadam circum labia apparent, & tunc vulgus credit febre exiuisse. Sed id falsò. Pulmonicis (id quod hoc loco annotauit) efflorescunt nonnulla incute circum pectus aut scapulas, & talia sunt signa contentæ materiei in pulmone, cum apparent pustule in aliquo, videndum num id sequatur vitium quoddam particulare partium internarum.



HISTORIA SECVNDA



LLVSTRIS Domina corpore
 satis laxo, fluido, pituitoso, capite
 porriginoso, dysenterius valde obnoxia,
 ad mensē Nouembrem repente sen-
 sit ab utero fluere aliquid acre, mordax,
 & constrictionis angustiaque sensum inferens. Nil
 unquam tale senserat. Id tum euēnit cum a viro su-
 bacta compressaque fuit recens è Curia reduce. Is
 cetera sanus erat, naturā salax, & uxorius: sed
 sex ante annis, quod aliò diuertisset, virore vene-
 reo infectus litum, ceteraque eam in rem usurpari
 solita, sustinuerat. Nec tamen vetere tabo malō-
 que territus à pellicibus abstinet. Certa de eius, diuer-
 tendi aliò consuetudine, opinio, & repentina insolē-
 tis mali eruptio contagionis fidem facit. Sed ob di-
 gnitatem hominis authoritatēque, is non accersitur
 in opinionem suspicionēque deserti Thalami. Aliis
 id venereum videtur, siue veteris mali reliquias cau-
 sari oporteat, siue recens, flagrānsque libido in alieno
 loco exercita id attulerit. Nonnulli fluoris mulie-
 bris contagionem aliundē in pudicitiam uxoris ad-
 scitam contractāque accusant. Honestius tempe-
 ramento

ramento innocentis matrona pudicaque tribuitur, ne diligentiore rei indagatione latens malum detectum contumeliosarum rixarum fomes ac semen existeret. Tandem cum curiosius inquiri vetitum esset, quid remedij sit, queritur, an tutò id sisti possit, an totius corporis, aut vnius uteri vitio id fiat. Tandem legitima ratio medendi administrata est. Sed mulier parum medicis obsecuta, parum quoque leuaminis sensit. ¹

COMMENTARIVS.

DVBIVM valdè est quid sit illud de quo tractandum, cum in historiae descriptione nullius morbi, aut symptomatis certum nomen assignauerimus. Narramus enim de excretionē quadam per uterum, quæ quoniam insolens erat, necnon insolenter ægram inuasit (si modo ægra dicenda sit, cum integra sanitate frueretur) dubium valdè est an sit *verruca*, qui frequenter in mulieres incidit, an virulenta gonorrhœa, an gonorrhœa simpliciter, an vitio totius corporis, an peculiari ipsius uteri vitio id contigerit. Maximè verò id difficile fuit, quoniam hinc & illinc multum adesset difficultatis. Illinc quidem, quoniam parui non refert in æstimandis rebus istis præiudicata vti sententia, vnde si in luis venereæ suspicionem alterutrum vocaueris, veritatis odio aut tibi confles inimicitias, aut si non ritè pensitatis rebus quicquam absolutè pronunties, querelis, criminationibus, ac iurgiis domum impleas: aut si securus nimium, morbum minuas opinionēque minorem dicas, dum adblandiri malo volumus, ægrorumque leuando opinionem tacitæ existimationi speciosum aliquid prætexere, periculum vitæ creemus, aut vitam infœlicem, & calamitosam reddamus: tandem coacti usurpare illud quod iam iudicio, & veritatis studio anticipandum & anteuertendum erat. Sæpè enim priua-

66 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tis de rebus rogamur sententiam, vt cum nescio quo pacto, aut viro, aut mulieri aliquid alienius effluerit, quærant num purus alium inficiat, num cum olim lue infecti fuerint, vxorẽ castam, quæ de re simili cunctanter conqueritur, contaminare poterint, an non potius (vt omnes sunt quadam in sese indulgentia propensi, & facili suspiciosi, præsertim, si vel minimus zcloty- piæ aculeus eos pupugerit) mulier sui oblita muneris aliorum consuetudine id contraxerit. In quo quemadmodum hominum catorum prudentiũque suspenduntur, nutant, ambi- guntque iudicia, ne si illum deserant, vitæ eius metuendum sit, sin opitulentur, minas illius metuant, sic leuium hominũ inge- niola facile definiunt, determinant, præscribunt, imò & voce, & opinione prudentibus præcundum putant. At res istas ex- pendere, & ad Momi lucernam obseruare operæ pretium est, maximèque ad Medici & auctoritatem, & iudicium examen hoc & censura pertinet, vt ne quid præcipitanter pronuntiet, nil sta- tuat de quo iam exploratum diligentèrque quæsitum non sit. Sic conseruanda retinendæque auctoritate, famæ & existimatio- ni eorum consulendo qui nostrum ea in re aduocant consiliũ, & aut præiudicata opinione, aut rebus extenuandis saluti non insidiando, medicus gloriam æternam est consecuturus, & in- uidia aut maleuolentiæ tempestatem, leuitatĩque aleam est euitaturus.

Scopus noster est duplex, vnus vt examen statuatur quo di- stinguas, si fieri possit, gonorrhæam virulentam, & fluorem mu- liebrem, siue is vitij vterini consequens sit, siue toti corpori ac- ceptus ferendus sit, siue capiti, quod in morbo isto primarius author existit. Posterior est vt de fluore muliebri dicamus ex instituto. Quanquam autem iam duobus in locis in nostris Commentariis de eo dictum est, dicendũque est fortè ple- nius in ea *πραγματι*, quam inchoatam habemus de mulierum morbis, tamen iis relictis, & quæ nos iam expressimus, & quæ quis ex Rondeletio qui omnium amplissimè materiem istam pertractauit, venari possit, vela ventis dare, & longius pau- lo soluere volumus, quoniam res hæc & plurimum voluptatis, & vtilitatis est allatura.

*Corpore laxo, molli, pituitoso, capite porriginoso², Ter-
dysenteris obnoxia, repente sensit ab utero fluere ali-
quid, acre, mordax, angustia sensum inferens, &c.*

Dum vox illa, repente, adiicitur, vim aliquid affert, ut dubitemus de eo fluore qui euenit. Nam cum repente euenit post compressum, credibile est ex viri contagione potius malum ortum esse, siue reses aliquod semen veteris luis venerea, siue furtiuo concubitu hoc tabum expressisset, siue ea mulier cum qua consuevit, fluore muliebri laborasset, est enim de genere morborum qui contagio ad alios serpunt. Fluor porro muliebris praesertim tam foedus, tam malus & efferus non tam repente adurit. Sed vulgo quae mulieres *ῥοιῶν*, istum patiuntur, primum aliquas sentiunt in sinu pudoris humiditates, quae dum tempore augeantur, laeuore quodam in utero contracto, tandem verum *ῥοιῶν γυναικῶν* inferunt. Nec obest obicere illud quod ante docuimus ex Hippo. lib. *πρὸς δούλους* primo, nimirum morbos sensim gigni & colligi, sed repente & affatim insurgere & irrumper. Fluor iste symptoma est consequens morbum aliquem aut corporis totius, aut partis, at cum ea integra esset sanitatis, & nil unquam tale sensisset, id sine manifesta causa non euenit. Viri autem aut infectio, aut tabes quam veluti interuentius & medius transfudit, & transmisit in suam coniugem, è censu est, *τῶν ἀρσενικῶν*. Ceterum quod diximus fluorem symptoma esse, illud ex Decretis Gal. eruendum est. Ille tractans causas symptomaton in iis quae excernuntur, in quibus *Cap. 4. lib. 3. de sym- pro cas- sis.* qualitas, quantitas, & excernendi modus consideratur. Deinde subdit, omnia symptomata ex similiarum partium intemperie, & instrumentariarum morbis, praeterea ex materiae tum quantitate, tum qualitate procedunt. Ut Coryzae, catarrhi qui in excretionem essentiam habent, sequuntur, aut intemperiem, aut obstructionem aliquam. Item suppressio mensium, aut immodica euacuatio sequitur, aut totius corporis, aut vteri vitium, siue intemperies sit, siue in conformatione existat. Subdit, sed & mala expurgabuntur propter vteri *ῥοιῶν*: id symptoma vocatur *ῥοιῶν γυναικῶν*, expurgato scilicet per eam partem tota corpore. Item contigit alia mala euacuatio propter affectum

68 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ipsius vteri proprium. Et ex eo loco fluore muliebrem duplicem
statues particularem, & vniuersalem. Sed non satis explicat
Gale. an fluor iste qui vteri dicitur sit ex parte materiæ, vel ex
parte ipsius vteri, quia ait mala expurgari ob vteri ^{peruersionem} quasi
dispositio ^{peruersionis}, id est, quæ promptitudo, procliuitasque est ad
fluendum, insit ipsi vtero. Ego verò credo symptoma id vteri dici,
& ab Auicenna Cursum matricis dici, & vteri ^{peruersionem}, non
quod in ipso vtero vitium adsit, sed quia materia qualitate, aut
quantitate peccat, quæ si non fluat per vterum, aliam viam ra-
piat, nempe aut aluum, aut venarum meatus: sic eo modo fluor
muliebris ad vterum se habet, quo & diarrhoea ad aluum. Inte-
stina sæpè integra sunt, sed materia restagnans, aut habens per-
petuam generationem, aut suppressa tantum, aluum perficat,
per se incolumem & integram. Quanquã fieri potest, vt & vte-
rus & intestina tandem lubricitatem habeant, & ^{dispositio peruersionis},
vt loquitur Gal. lib. de loc. aff. qua diathesi idonea & procliuia
redduntur ad recipienda excrementa aliarum partium. Vterus
enim & ratione situs, & conformationis perpetuo madescit, &
facile aliarum partium redundantes superfluitates excipit: quæ
aliàs malæ sunt in sua generatione, aliàs non illaudabiles, sed in
transitu, & mora malignum quid acquirunt. Quod pater ex
Galeno, & locus valde commemorabilis est, explicat cur mul-
tis tussientibus testiculus intumuerit, aitque id fieri quia à capi-
te in thoracem fluere materia, à thorace in testes, & in his ali-
quid peius commisit quam in pulmonibus ipsis, textus is est, pars
humoris qui à capite in thoracem descenderat, quia pulmo
& testes consentiunt, ad eos defluxit. Sed quod in testiculos
fluxit erat malignius eo quod primò in pulmones descendit, vt
pote quod in pulmone computruisset. Sic in pulmone materia
iam aliquid mali nacta est, sed ad testes illabens iam pessima
erat. Ex illo loco duo venari possumus ad eam, quam de fluore
muliebri suscipimus tractationem, maximè pertinentia: prius
est quod cum genitalibus membris thoraci magnum est com-
mercium: vnde Catarrhosas mulieres, & pituita in pulmone
abundantes opportunas fluori muliebri videmus, transfuso à
thorace in vterum humore: Posterius, quod humor dulcis,
aut insipidus tractu ductuque aliquid deterius seipso acquirit.
Et hoc loco quæri potest, an ^{per uerum} sit ^{verum}, an ^{verum}.
Si à capite humor stillat is sæpè malus, & graueolens non est, si

Com. ad
part. 12.
sectio. 1.
lib. 1.
Epid.

ergo per vterum fluit, cur dicetur *καταρρεῖ*? Nisi fortè aliquid mali acquisiuerit. Reuera est vbi id quod euacuatur per vterum insipidum est & inodorum, vt cum mulier tantum aquea est, aut nimio potu vititur. Immo Hippo. si credibile est quod afferit, scribit de excretionibus ab utero, si vteri pituita pleni fuerint (Græcè *ὅταν αὐτὰς ἐκχυμέναισι πληθύνῃσι* (vt nouo quodam modo *ἐκχυμέναισι*, pro pituitosum esse sumatur) flatus oboritur, & menses albi pituitosi sunt, Græcè *τὰ ἐπιμύδια λευκὰ ἐπιγίνονται*), aliquando sanguis pelliculis plenus, & præ humiditate cum viro coire non vult, pauida & tenuis fit. Rogabis an si quod fluit mordeat & viceret, si non mordeat pronuntiabis à cerebro fluxum esse, si mordeat, à ventre. Quod omnino verum esse nequit. Nam si à cerebro est, trifariam potest esse acris & salum: primum si sua generatione pituita est, aut falsa, aut acida. Credibile enim est eam pituitam, quæ à capite manans tot tantasque vias peragrat, antequam ad vnum vterum perueniat donatam aliqua qualitate qua sibi viam secet atque faciat: alioquin si pituita fatua esset, & *ὑπο* facile subsisteret, & sua mole loco remoraretur. Secundo modo dum pertransit, & aliàs moram aliquam trahit, seipsa deterior fit, acquisita nimirum qualitate & stimulo, vnde antea docuimus idem phlegma à capite labens dum moratum in pulmone, & ad testes profluxit, deterius multò esse, quam esset cum in cerebro foret, aut à cerebro proximè emanaret. Tertiò *Hippoc.* dum statuit discrimen inter humorem dolores in *lib. de locis in homin.* oculis facientem qui vel ab interno capite manat, vel à superficiali sub pericranio, ait, si ab interno capite est, humor acris & mordax est, si ab externo, non est. Itaque si in vterum ab interno capite humor irrepit, ex illa Hippo. opinione dolorem acrimonia sua est illaturus.

Absoluamus nunc illud an sit *κρίσις*, an *κατάρρεσις*. Lochia, menses, & fluores albi, seu fluores muliebres, generaliter *καταρρεῖ* & *καταρρεῖ* nomine continentur, item & illa quæ ab Hippoc. vt postea dicemus, *καταρρεῖ* dicuntur, quæ meo iudicio aliud significant quam cum addit, *καταρρεῖ* λέγουσιν. Omne autem *καταρρεῖ* videtur non modo esse *κρίσις*, sed *κατάρρεσις*. Nam tametsi initio quantitate tantum peccabat, facile accersit qualitatem ratione *ἢ ἐκ τῆς ποσότητος*, & tunc non dicitur solum euacuatio, & *ἐκκρίσις*, sed *κατάρρεσις*. Primum enim omnis suppressio aliquid alienius rei suppressæ acquirit, vt de suppressa in pulmone pituita dictum est.

ante, præsertim si qua mala dispositio aut intemperies sit circa partes, aut in partibus in quibus suppressio fit⁵. Nec enim ubi-uis, & secundum idem, & eodem modo suppressio paria affert accidentia. Vnde pleræque mulieres mensium suppressionem semestrem sine noxa patiuntur, aliæ non patiuntur bimestrem sine grauiore damno: præsertim si vel faciliè corruptibilis sit sanguis, vt quibusdam euenit, aut si iam à primo ortu aliquid malæ indolis habuerit, aut si raptus fiet ad nobiles partes. Est enim valdè notandum illud Galeni, sanguinem supprimi in muliere aliquando non propter paucitatem, aut vitium aliquod conformationis in utero, aut aliquid simile, sed quia sanguis præ suo robore ad alias partes deferretur⁷, in quibus herclè damnum aliquod excitare potest. Quæstio hæc valdè exercuit veteres, an menstrua purgatione excerni solitus sanguis qualitate peccet. Hac de re digladiantur omnes. Plinius malignitatem omni menstruo attribuit, & mea quidem opinione temerè ac immerito: alioqui foetus refœdissima frueretur. Galenus in ungradiorem foetum impura etiam parte sanguinis menstrui vti fate-
 tur: sic in menstruo benignum & alibile aliquid subindicat, ali-
 quid malignum. Plenius in Epid. docet *ἡ μήνη* purgationis
 nomine donandâ esse euacuationem à partu, tum quia moram
 longâ trahit, tū quia à massa sanguinis menstrui à foetu id quod
 benignius erat depastum & defectū est. *Μηνστρουα*, ait, *suppressio*
offendit, non perinde vt ea quæ à partu est, quod hæc non solū copiam, sed
etiam insignem pariat humorū prauitatem. Est etiam menstrua purgatio,
non solū euacuatio, sed & purgatio. Sed non est equalis copia vitio-
forum humorum ei quæ gestationis tempore congeritur, quam à partu
euacuari oportet. Et hic ex Gal. patet & solitam menstruorum
euacuationē & lochiorum, ἡ μήνη nomine coërceri. Quan-
 quam per se, & ratione sui sanguis qui singulis mensibus, præ-
 sertim silente Luna, vt omnium doctissime explicat Aristote-
 les, effunditur, potius quantitate peccat. In morbosa muliere
 qualitate faciliè peccat, vt & in viro morbofo. In morbosa
 muliere, siue toto corpore sit talis, siue præsertim utero, cui
 magna vis inest ad totum corpus⁸ immutandum; nam & ex
 Gal. uterus ferè toti corpori consimilis est. Is porrò si à suo
 temperamento discesserit, si biliosos humores, aut in acetabu-
 lis, aut in cornibus, aut inter tunicas, aut suo sinu collegerit,
 tunc sanguinem menstruum, eiusque maximè partem quæ pri-

Cap. 4.
lib. 3.
de sym-
ptom.
causis.

Cap. 7.
lib. 1.
de sym-
ptom.
causis.

Epid. 2.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

Cap. 4.
lib. 2.
de gene-
ratione.

8. Aph.

mum ad eum peruenerit, inque eo rursus refederit, donec menstrui excernendi tempus aduenerit, eodem vitio inficit atque deprauat, vnde fortè ea maleficia, quæ Plinius menstruo attribuit, consequuntur, & menses erumpunt albicantiores, & minimè florescentes. Hoc Galenus expressit, ob vteri proprios morbos, tum qui in processibus supernis, & cornibus, tum qui in collo, tum qui in toto eius tergo consistunt, menstrua aliquando plura, aliquando pauciora eueniunt, aliquando non prodeunt, vel mala prodeunt.

Cap. 4.
lib. 3. de
sympt.
causis.

Ergo ex præcedentibus patet, & menstruam euacuationem & lochiorum, purgationem esse Nec ad id omittendum illud Galeni, *λογικὰ καὶ βαρύνει*. Est enim purgatio vitiosorum quæ gestationis tempore accruata sunt. Absumptum enim vtilius est à foetu, remansit vitiosius quod ante singulis mensibus euacuabatur. Ergo notabis euacuari aliquid vitiosum singulo quoque mense.

Com. ad
pat. 47.
sect. 2.
lib. 1.
Vrarrh.

De fluore albo nunc restat agendum. Si superiores euacuationes, præsertim menstrua & naturalis, purgationes sunt, multo magis & *ἡς γυναικείας*. Nam siue saniosus sit, siue albus, siue alius generis aut vitium in vtero designat, aut in toto corpore. Nec solum suppressionem aliquam humoris & coacervationem sequitur, sed & perennem generationem. Alioqui facilè exhauriretur. Sed & dispositio *ὑπερμαρτυρία* in vtero, & partium à quibus manat malitia, istam perennitatem affert. Si sola cerebralis dispositio catarrhosa in causa esset, non tam operosa esset curatio. Quicquid itaque ab iis partibus effluit præter menses ordinarios statòque illud symptomaticum est, & malum. Nam aut vteri vitium, aut totius corporis tanquam causam consequitur. Et enim quibus mulieribus viscera refrigerata sunt, vel obstructa, vel dura, vel cruditates cachexiam induxerunt, corruptus humor in varias partes effusus, in vterum sæpè procumbit, & illac decurrens corpus totum expurgat, quod aliis perrenes, aliis per aluum fieri solet. Immo in vtero tandem idem fit quod & in aluo. Nam vt diuturnitate profluuii aluus ipsa laxatur magis læuisq; fit, ita cursus perennitate vterus læuior fit. Et vt *λαγνὴ πτεία*, vocare possis *μυτρηλαία*. Bifariam enim læuitas, Græcè *λεώδης*, vteris adesse potest, vno modo cum perennitate fluendi corpus vteri lubricum magis fit, quo in sensu accipimus paulò antè: posteriore modo vt corpus ipsum aut naturā

72 CONSILIORVM MEDICINALIVM

sua, aut vlcerebus innatis λεῖον fiat: Hæ difficilius retinent foetum. De leuitate vteri Hippo. Porro aliud est corpus vteri esse leue, Græcè λεῖον, & leue id est κενόν, leues enim vteri sunt, cum aut euacuati, aut reficcati sunt, Græcè αἱ μήτηρ αὐανδύται dicuntur: & vt leuitas causa est corruptionis foetus, ita ista leuitas subitæ suffocationis hystericae causa existit Hippocrati.

2 de
morbis

2 de
morbis
mulie-
ribus

Eluor iste vterinus, fluor albus dicitur politico loquendi modo, quanquam sapissimè alienioris est coloris. Sed lenitate verbi tristitiam & foeditatē morbi mitigare volunt. Cum apud Hippocratem λευκὰ leguntur, dubitari potest an intelligatur iste fluor muliebris de quo agitur. Nam & absolutè τὰ λευκὰ leguntur, & τὰ κατὰ μήτρα λευκὰ, vt ante citauimus ex Com. de natura muliebri. Et diximus nomine τῶν κατὰ μήτρα λευκῶν, verè fluorem vterinum intelligi, præsertim pituitosum, sed nomine τῶν λευκῶν, videtur aliud audiendum. Hippo. primum ita scribit: Si mulieri à partu cum febre alba retineantur, pessimum. Gal. mi-

Par. 47
lib. 1
Protr. 16.
sectio. 2.

ratur cur Hippo. nō dixerit absolutè retentionem & sanguinis, & biliosi excrementi malam esse, sed solum alborum meminit: sed vno dicto cætera audiuntur. Ac videtur nomine λευκῶν purgationis, τὰ λευκὰ audire. Et peculiariter non significat vterinum fluorem, sed meo iudicio excretionem cuiusdam mucoris, aut lacteæ substantiæ quæ post partum exigi foras commodo enixarum solet. Quod autem peculiariter significet λευκῶν purgationem à partu patet ex Epid. Mulier, ait, in larissa pregnantis erat, decimo mense sanguis multus fluxit, 14. exiit puer mortuus, tertia die nocte eadem hora qua produit puer secunda excreta est, & τὰ λευκὰ, id est, purgamenta alba. Aristoteles verò τὰ λευκὰ, propriè in puellis considerat, quibus loco mensium aquositates

1. Cap.
lib. 7.
de histo-
ria animal.

& superfluitates excernuntur. Verba eius sunt: Fæminis eodem tempore exurgunt vbera (quod fratrare dicitur) & menstrua erumpunt. τὰ δὲ λευκὰ, admodum puellis eueniunt, & magis si cibo vitantur humidiori. Hæc incrementa corpus prohibent, & illud valde extenuant. Idem τὰ λευκὰ, vult venire iisdem puellis loco menstruorum cum sanguis incoctus & crudus est. Postquam enim de eruptione mensium egit, subdit, cum excrementum mutatum est in sanguinem, tunc menstrua erumpunt, si coctum non est, paulatim subinde aliquid seceratur, ideo τὰ λευκὰ κατὰ μήτρα paruis ad huc & puellis & eueniunt. Fernèlius puellis præsertim cachecticis, & defœdatis πρὸ γυναικείων obuenire narrat septennibus, & idem est ac ista τὰ Aristotelis λευκὰ.

Nos

Nos septennem vidimus puellam valdè sanam quæ crederetur laborare τοῖς λευκοῖς, quod cum serua fluorem vterinum patiente concubisset.

Ergo omnes istæ excretiones, & καταμύνητα, & κόχρα, & πᾶς γυναι-
κεῖος, & λευκὴ, & verè καθαύσεις sunt: Galenus autem καθαύσιν, verè de-
finit eius quod qualitate molestum est euacuationem. Et tunc
generaliter sumitur, siue à medicamento fiat, siue à natura, siue
etiam symptomaticè fiat vt Thucydides annotauit. Idem hac
de re ita sentit, vacuatio est propriæ materiæ, vbi quantitate
exuperat, purgatio est alienæ quæ affligit per qualitatem. Et no-
tanda est hæc vox, *Propria materia*, quia essentiam vacuatio-
nis statuit, & illa, *Aliena materia*, quæ purgationis naturam ex-
plicat. Siquidem non solum quantitas, & qualitas veram essen-
tiam & differentiam horum constituunt. Ferè fit enim vt cum
qualitate peccet quantitas, & tunc non κένωσις, sed καθαύσις dicitur:
vt cum de purganda pituita agit Gal. dixit, si superabundet pi-
tuita & molesta sit, phlegmagogo vteris. Verbum καθαύσιν, co-
piam docet, τὸ δὲ ἐνοχλοῦν, qualitatem significet. Et idem cum
loquitur de commodo fluxus hæmorrhoidalis ait eum conferre
non solum ratione euacuationis, sed & qualitatis humoris ratio-
ne: Sed quis dubitat quin & plenitudo, & cacochymia esse
possit: vt cacochymia spectet qualitatem, plenitudo copiam.
Nam materia propria multa & superabundans, quæ propriè
euacuari dicitur, dum morâ corruptionem acquirat, aliena tunc
materia dicitur, & quali & quanto peccat. Sic concilian-
dus Fuchsius cum aliis. Galenus aliud statuit discrimen inter
κένωσιν & καθαύσιν, *Cum excernuntur quæ corrupta sunt, purgatio corporis*
dicitur, cum excernuntur quæ vi morbi fiunt, vacuatio. Quasi verò
symptomaticè id est vi morbi praua non possint euacuari, vt in
pestilenti constitutione vi morbi deiectiones variæ excreta
sunt, & purgatio erat. Sed hoc vult author vi morbi propriam
materiam, & vitium facientem minime, aliquando excerni, at
hoc κένωσις, est non καθαύσις: Sed si corrupta sit, quouis modo id
fiat, siue arte, siue natura, siue symptomaticè, per quencunque
locum, & à quocunque loco, generaliter τῇ καθαύσει continetur.
Et ita Thucydidem accepisse docuimus. Vt cum praua
excernuntur languidè & tardè, & vi morbi ob iecur malè affe-
ctum perpetuò tale quid generans, nunquid καθαύσις dicitur. Po-
liticus modus vocat κενώδης.

Tomus II.

K

Com. ad
Aph. 3.
lib. 1.

ad par.
18. sect. 3
lib. 1.
Prorrh.
Aph. 21.
lib. 4.

¹⁰ *Corpore laxo, molli, capite porriginoso, dysenterijs obnoxia.*

Hec adduntur vt prætexatur aliqua occasio istius fluoris, & vt ratio habeatur corporis ipsius ad medendum. Considerandæ sunt enim mulierum naturæ, ait Hippoc. quoniam aliæ sunt albidiores & fluidiores, aliæ ficciores & nigriores. Illæ flori muliebri sunt obnoxia?

¹¹ Caput *invelidus* est cum,

--- *Immensâ pexum porrigine ningit,*

<sup>5073-
5074</sup> & provenit à vitioso corporis humore salsaue pituita, vel à vitiosis serosis humoribus.

Aliis id venereum videtur, siue veteres morbi reliquias causari oporteat, siue recens flagransq; libido, &c.

Suspicionem & coniecturas multas attulit tam inauditus & repentinus huius mali ortus. Videtur enim nonnullis fieri posse, vt longa equitatione incalfactus quis iniens mulierem ob virosū semen, & serosum, incalfactum & *καυρόεις*, quid habens *διὰ τὴν δύσκολαν*, ardorem mulieri iniiciat talem, qualis gonorrhœa laborantibus euenit. Item cur non fiat, vt si quis naturâ præsertim falax, & coire solitus, diu venere prohibeatur, quin eius semen corrumpatur, tantò facilius, quantò & difficilius quis à venere abstinet, & semen turgentius habet? Semen enim, vt res benignissima, suppressum, dum nanciscitur aliquid cacoethiæ, inficere potest ac contaminare. Sed credibilius malum aliundè accersitum esse.

Alij contagionem fluoris muliebris adscitam putant.

Quæritur inter medicos an si quis coeat cum muliere alba patiente, deinde suam adeat, eam inficere possit aliena fœditate. Si, vt verisimile est, fluor muliebris, præsertim qui aliquid malignum habet, vt non solum sit superflua quædam humiditas

quam natura euacuat, sed virulenta excretio qua natura corpus eluit & expurgat, contagiosus est, & concubitu, & congressu, & consuetudine præsertim familiariore potest ad alias serpere. Immo & vir potest infici. Sed quia mulier mulieri proximior est & affinior, ut oculus lippus afficit non nares sed oculum, & phthisicus solum pulmones alius inficit, ita à viro cum impura congresso, impuritas in aliam traduci potest. Sed hæc subtilius examen exquirere.

Honestius temperamento mulieris tribuitur.

Quicquid sit aquea, mollis, & effœminata corporis huius dispositio, magnam propensitatem attulit ad subito labem hanc suscipiendam. Et iniusta vtero labes esse visa est, quod tantus doloris sensus aliquando, & angustia præsertim in dextris foret. Fieri enim potest ut intactis sinistris dextra laborant. Vterus enim geminus est.

In reliqua Commentarius.

Siue aliquid foret venereum, siue quid foris adscitum esset, siue domesticum foret, iidem ferè scopi sunt curationis. Neque enim cum id effluxum habeat, inficietur lue mulier. Itaque cauendum ne statim supprimatur. Restant itaque hæc dicenda. Primum de speciebus fluoris uterini ex Hippocrate breuiter dicetur, Secundo an eius sit aliquis vsus, & quatenus. An tuto sisti queat. Item notæ quædam & distinctiores quibus aut à capite esse colligas, aut à toto corpore, aut ab vtero: quamquam satis hac in parte factum iam putamus. Denique curationis capita perstringentur. Sed antequam omnia sigillatim explicemus videndum an per easdem venas illuies ista fluat, & sanguis menstruus, nam ab interna capacitate videtur quoque manare iste. Cum benè ordinata sunt omnia menses sua periodo fluunt, deinde fluor muliebris cessat, menstruus cessante redit aliquando sine ordine, aliquando cum ordine quodam fluor muliebris. Aliis & album & rubrum confundi videtur, & excernunt subalba & subrubra, aliis menses dicuntur decolores ut cacochymis, & tamen propriè *ῥέον* non dicitur, sed decolores isti menses *ῥέον* ferè præcedunt. Decolo-

76 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Præfer-
tim hoc
fit cum
morbo-
sus est
uterus.*

res autem fiunt aut vitio totius corporis, vt cum in massa san-
guinis cruditas est magna, aut cacochymia, aliquando vitio
quodam vteri. Vnde ante notauimus fieri posse vt in acetabu-
lis, aut cornibus, aut vasis vteri peculiari vitio accumuletur sa-
nities quædam & quoddam *πῶδες*, quod menses inficit licet san-
guis qui affluit ad vterum menstruum purgationem facturus
floridus sit & laudabilis. Etenim sensim ad partes vteri af-
fluit, & hinc moratur donec menstrua periodus aduentarit, &
ista quam fecit mora inficitur menstruum & exalbescit. Immo
Duretus annotauit euenire posse, & sine febre, & cum fe-
bre, siue vlcere vlllo vteri, vt circum venas vteri, præsertim
fundum eius, purulentum quid & albicans accretur (quod for-
tè sit aut quia sanguis diutius moram in venis faciens albescit,
aut quia est pituitosior, aut veluti quadam imbecillitate vteri)
quod dum euacuatur *ῥῶ* facit, sed id pauca quantitate excerni-
tur. Nec credere oportet tunc vlcus in vtero esse. Credo yxo-
rem Sellatoris id pati. Et fortè ista sunt *αἰμα*, quæ à partu con-
sequuntur, diuturnitate temporis sanguine alborem acquiren-
te. Galenus enim passim ait, si sanguis tantam in venis moram
& arteriis traheret, quantam semen in vasis spermaticis, semi-
nis more albèret: vt non amplius mirum sit si in corpore ipsius
vteri exalbescat humor, & præsertim sanguis.

*Cap. 10.
lib. 4.
de v. m.
parit. u.*

Atque vltimam loco quæstionem explicemus. Vterus pars est
valde nobilis & momentanea, maximè quod ad propagatio-
nem generis humani conferat. Et vt tali dignitate pars prædita
est, ita admirabiles habet *ῥοπῆς*, motus, & *ἐπιθυμίας*, vt ea ratione
Platoni *ῥῶ* dicatur. Quod amplius diximus in nostro libro
μυαυῆτον. Ratione istius muneris multa vasa ad eum pertinent,
venæ, arteriæ, nerui, & vasa spermatica. Ratione situs, & quia
illac sese natura repurgat quodam excremento, & quia capaci-
tas est, facilè illuuiem aliarum partium excipit, præsertim à par-
tibus situm superiorem tenentibus. Quid si corpus cacochy-
mum sit, uterus vt pars abdita & peruia, facilè excrementis sca-
tet. Immo tametsi ex proprio instituto illae sanguinem excer-
nit eumque purum natura, tamen ob vasorum multitudinem,
situm, consensum partium cum partibus, & vt clarius dicam, ob
fluxilitatem, pars ipsa secundariò, & veluti secunda intentione
alias sordes excipit, à quibus facilè obruitur, & inquinatur.
Deniq; acquirit dispositionem *ῥευματικὴν* excipiendo, & oppor-

tunitate recipiendi. Per vterum fuit naturali instituto sanguis isque menstruo circuitu. Si mulier è natura habet iusta quantitate effluit, & talis est qualis è recens victima iugulata fuit. Sin habet contra naturam pallidior est excretio, aut pituitosior, vel quod talis in venis sit, vel ob alienæ materiæ admixtionem. Et tunc *καταμηνίον*, dicitur *κατὰ δὲ*. Fit autem id vel vitio vnius vteri, vel totius corporis, vt sanguis laudabilis sit qui ad vterum fluat, sed contagione inficiatur. Item per vterum fluunt *κόχλα*, quæ pertinent ad menses propriè dictos, item excernitur humor albus secretus & separatus à sanguine, & dicitur *σπέρματος ἀνθρώπου*, siue *σπέρμα*, siue *πύμα*, barbaris, matricis cursus: Vltimo virulenta fit quoque excretio quæ gonorrhœa *βρωχίς* dicitur, vt distinguatur à muliebri gonorrhœa in qua mulieri crudum quoddam & aqueum semen excernitur, tum ob imbecillitatem vasorum spermaticorum, tum ratione ipsius materiæ quæ parum compacta coactaque consistit. *βρωχίς* δὲ *ποδὶ-φοῖον* infligit impurus concubitus. Hæc tametsi communia multa habent, tamen vt curationis scopi euariant, omnium notas atque distinctiones nosse oportet. Ac primum, vt ingenuè dicam, tametsi praua & morbosa menstrua à fluore vterino non visi simus separare, tamen longè differunt. Quod autem differant, vel ex ipso Hippocrate notum est. Nam lib. 1. de mor-
bis mulierum innumeras species morbosorum *καταμηνίων* expli-
cauit, nomine *καταμηνίον* v propriè usurpato, vt morbosum men-
struum sano opponatur. Sed lib. 2. non vtitur nomine *καταμηνί-
ον*, sed *τὸ πόν*, & eius varias species enarrat. Sic quemadmo-
dum tractationes horum differunt, sic & nomina, & idæ mor-
borum affectionumque, vt iam hoc loco aliud sit, *πόν* & *καταμηνίον*
ποδὶ δὲ.

Menses per venas internas vteri fluunt ab hypogastria de-
pendentes, item per externas quasdam ad ceruicem pertinen-
tes. Et magna quæstio est quomodo mulieribus grauidis, &
virginibus illibatis & integris menses fluant. Nam si mulieri-
bus ab interno vteri corpore mensis fluit, in grauiditate ipsa
oportet aperiri vterum, vt obuius fiat sanguini menstruo tra-
mes. Quod est absurdum. Itaque Columbus & grauidæ; &
non grauidæ vult menses fluere per hypogastriam cuius pars in
ceruicem vteri definit, & illac fluit sanguis non per internam
capacitatem vteri. Quod valdè ambiguum est. Porro à trunco

78 CONSILIORVM MEDICINALIVM

venæ cauæ inferioris in lumbis oriuntur venæ, adiposa, renalis, spermatica. Hæc vtrique vna viris in testium tunicam Epididymidem dictam, & substantiam absumitur & obliteratur, furculis aliquot tenuibus in suam peritonæi apophysin sparsis, in mulieribus dimidio sui in testes inferitur, altero dimidio vterilatera & fundum nutriendum, & per hunc ramulum menses expurgantur, tuncque ab interno vteri corpore manant. Quamquam de hoc digladiantur autores. Nam Gal. à testibus in cornua iter esse vult in interiorem vteri sinum per quod semen intrudatur. Alij herophilum secuti è testium inuolucro iter esse voluerunt in neruofam vteri ceruicem, non autem in interius vteri corpus, iuxta osculum interius. Alij tum in ceruicem, tum in capacitatem vteri è testibus vias duci volunt, quarum ortus ab iis venæ & arteriæ maioris ramis trahitur, qui vtrique ad coxas & crura contendunt. Et cum vterus clauditur, non affectat sanguis per capacitatem viam, sed resiliens resiliensque per ceruicis vias elabitur. Ergo per spermaticam ipsam menses fluunt. Item & per ramum hypogastricæ. Nam vt spermatica à trunco venæ cauæ inferioris exit, ita à ramis duobus illis hypogastricæ ducta in partes omnes hypogastricæ protenditur ac proiicitur, in vesicam virilem minore ramo sese insinuat, in vesicæ collum & penem maiori, item in muliebrem vesicam & vterum maiore, in ceruicem verò vesicæ & vteri minore inferitur: Cuius minoris obsequio & ductu interdum grauidis, sano foetu, sæpè virginibus menses repurgantur. Sic ars secandorum corporum docet abundè excretionem siue sanguinis, siue cuiuspiam rei alienæ, quæcunque & ab vtero, & per vterum fluit, bifariam fieri posse, & per internum corpus, & per externum vteri corpus. Per internum vt per spermaticam, & per maiorem ramum hypogastricæ, cuius minor ramus inferitur in collum vteri: Per interiores verò sinus eo modo: per externum corpus beneficio eius ramuli qui in collum vteri implantatur, quam solam viam menstruis siue virginum, siue mulierum, siue prægnantium attribuit Columbus vt dictum est, neglecta omni speculatione eorum quæ in interiores sinus vteri iniiciuntur. Immo negat consensum mammarum cum vtero fieri ob Epigastricæ ramos obuios mammariis & rectos abdominis musculos, sed id fieri per hypogastricæ furculos istos qui ceruicibus vterorum applicantur & implantantur. Probabilior

verò ratio eorum est qui à testibus vias tum in collum, tum in capacitatem vteri inuestigant.

Ergo cum vterus tanto vsu & dignitate præstet, vt cum tanquam communis propagationis natureque agrum seminariûm-que Deus constituerit, si qua eluuiæ sese illac vtrò proripiat, id non naturæ præscripto, sed velut quodam interdicto fieri putandum est. Immo, quod notandû valdè est, natura quoad potest eum sartum tectum retinet, & ab omni vi impetûque ^{2. Prorr.} aßerit. Declarat id quod primus & solus Hippocrates animaduertit, nimirum, si solûm in sinistra parte vteri vlcus fiat, & mulier in vtero concipiat, siue etiam habet vlcus, siue sanata est, masculinum enixuram spes est. Si in dextra parte vlcus fiat, & concipiat, foemineum foetum enixura est. Adeo satagit natura in vterorum incolumitate retinenda vnius sobolis ergò.

¹³ Nunc institutum absoluamus, an sè. *γυναικείας* & menses, & gonorrhœa siue fœda, siue naturalis per easdem vias fiat. Menses omnes, siue sani, siue morbofi sint, per idem iter fieri probabile est. At maior dubitatio de cæteris, maximè de fluore muliebri. Nam gonorrhœan vtramque à spermaticis vasis fieri certum est. Et cum impurus cum muliere pura consuecit semen occasionemque gonorrhœæ *βεσπιδίας* iniiciens, ob affinitatem & societatem seminis cum semine, potius inficit vasa spermatica quam venas alias: Quanquam & postea per continuitatem cætera venæ contaminantur. Fernelius *βεσπιδίας*, ^{Cap. 16. lib. Pa- tholo.} à virulenta gonorrhœa distinguit, non ex materiei qualitate, nam sæpe floris materia externas qualitates omnino similes habet humori virulentam gonorrh. committenti (de internis non loquor) sed ex excretionis fluendique modo. Nam, ait, hinc maximè *βεσπιδίας* excretio à vulgari fluore distinguitur, quod ille à spermaticis vasis prodeat, hic ab vtero, & quod ille prorumpentibus mensibus non desinat, vterinus verò fluor cesset in menstrua eruptione, & aliquanto post tempore. Deinde luis venereæ signa se produnt quædam pathognomonica. Duas priores differentiarum rationes non valdè probo. Quid enim est dicere virulentam gonorrhœan à spermaticis esse, fluorem vteri ab vtero? si enim vteri nomine solam capacitatem audit, errat, si à toto corpore manat humor proreptans vterum, oportet eum præterfluere quædam vasa, & sic ab vtero esse non potest, quin à vasis vteri, quod si verum est, etiam po-

quid hoc significat? an non ab iisdem vasis, & ab eodem fonte
vtrumque manat. Cur ergo non illaudabilis conspicitur qui ab
vtero, quemadmodum & qui è brachio detrahitur? Sed meo
iudicio id fit, quoniam cum demitur è brachio sanguis, si vires
præsertim valent, dum facultas excretrix & totius corporis, &
partis laborantis, suo fungitur officio, per modum quendam
defecationis, & expurgationis, expellit id quod molestum est
quâ data porta: Argumento est, quoniam si vis est infirma re-
manet & subsistit deterrimum, effluit laudabilis sanguis. At cū
per vterum menstrua fit excretio, nō tanta vis facultatis excre-
tricis patet, quippe sanguis nō peccat qualitate, sed quantitate:
Et tamen si neque vtrōque peccet, arcano & admirabili quo-
dam consilio naturæ, aut Dei potius, menstrua ista excretio à
natura tentatur, ad futuram procreationem, humectatur enim
vterus, & vt natura doceat se adhuc habere reliquum sangui-
nem quo semen conceptum foueatur & alatur, si forè concipi-
piatur. Vulgo enim flores dicuntur, quod fructum præcedant,
& sint certa signa futuræ conceptionis & generationis, & Hip-
poc. politico verbo dixit τὰ γυναικεία αἷμα δεινόν. Vt inde colligere &
concludere liceat contra eos qui tantam maleficientiam sangui-
ni menstruo attribuunt. Præterea per vterum, credo, talenti
natura sanguinem suū instituto proprio excludit, qualem asser-
uauit ad nutritionem fœtus. Sed per apertam venam expel-
lentis robore quodammodo defecatur, fecernitur, & velut à
massa sanguinis eximitur id quod nocet qualitate, & huius iudi-
cium est maximum in excreto sanguine. Accedit quod si de-
mitur sanguis, non nisi ægro corpore fit, ægrâque parte (alio-
qui excerneretur floridus) si ea ratione fit, præsertim si inflam-
matio est aliqua aut putredo in parte, necessario putris effluit.
Et etiam si in vtero inflammatio est, qui ab eo inflammato edu-
cetur, illaudabilis foret. Quanquam hic falli non oportet. Nā
fieri potest vt etiam per vterum menstruum effluat, quod ta-
men si floridum sit, tamen internam malam qualitatem habeat,
& si fieri posset vt reponeretur in vas, quomodo in phleboto-
miis fit, necnon vi facultatis in sanguine etiam detractio residē-
tis secretio fieret humorum, vt illaudabilis in vase appareret,
cum in syndone laudabilis & floridus cernatur. Sed reuera, nisi
ingens in tota massa corruptio sit, aut facultatis excreticis sum-
ma vis appareat, aut confusio fiat laudabilis humoris cum il-

82 CONSILIORVM MEDICINALIVM

laudabili, menstruum sæpè apparet laudabile, etiam in mulieribus ^p laborantibus: Id quod arguit, necessario per alias vias excerni menstruum, & per alias fluorem fieri muliebrem. Nisi fortè id eueniat quod ante diximus, vt generatione & substantia, & qualitate laudabilis sanguis ad vterum alluat, sua periodo effluxurus, qui per contagionem ipsius vteri humentioris, & collectionem seminali humoris in suis vasis continentis, defœdetur ac contaminetur, & tunc Medici iudicium fallitur, ignorantis, an talis à corpore manauerit, an non.

Tandem aliquando concludendum videtur, vt non per easdem vias omnino fluat menstruum naturale & ^p. Non naturale menstruum, quod proximum est ^p, & naturale, quæ toto genere differunt ob materiæ varietatem, consentiunt in hoc quod per easdem vias ferantur. Sauaronola vir diligentissimus & prudentissimus. Ita de fluore muliebri, & menstruo sentit. fluxus quidam humiditatum quarundam in mulieribus fit à menstruo alienus, & hic ab Auicenna Curfus matricis vocatur. Hoc autem differt à menstruo, quoniam hoc à venis matricis venit, illæ aquositates à superioribus sunt vasis quæ deferuntur ad matricem, tanquam ad sentinam.

*Auicenna
lib. 3.
fem. 22.
tract. 3.
cap. 23.*

Quicquid sit aut à corpore ipsius vteri, pote humidiores id manat, aut est ^p à superioribus partibus. Et cum vterus ratione situs faciliè recipiat excrementa aliunde allabentia, potest ea ratione humentior fieri, vt idem vtero contingat, quod & ori eorum qui cerebrum humidius habent. Tanta enim in os salua occurrit, vt cogantur ^p, id est, loquendo balbutire, & expassant, id est, dum loquuntur præ nimia humiditate, & copia humoris bullas circum dentes excitant, vi spiritus è pulmone exsufflati ad vocem edendam. Et fortè curiosius fuit quod inquisiuimus per quas venas, & an per easdem venas menstruum & ^p effluat. Nil enim interest quod ad communem medendi rationem.

Restant hæc explicanda, vt quædam species ^p explicentur ex Hipp. vt quæramus an fluor muliebris sistendus, an eius aliquis vsus: Item vt notas assignemus quibus colligas vel hinc, vel illinc aduenire. Quartò vt curationem instituamus nisi fortè hoc referendum putamus ad nostrum librum de morbis mulierum.

De primo dicamus ducti consilio Hippo. qui in Epid. ita ait:

84 CONSILIORVM MEDICINALIVM

præclarus, vt floris vterini, & menstrui distinctio teneatur. Et alio loco ait, si fluxus, ῥόος Græcè, nimius fuerit, nullo fomento vtere, sed subditio astringente Fluxiones porro, si repente aduenerit purgatio, fiunt ὑδαίμνες, id est, subcruentæ, si tardius, purulentæ. Iunioribus subcruenta magis, senioribus μυξώδης, id est, magis menstrua mucosa apparent. Græcè κατὰ μὲν γὰρ ἡλικίαν. Ac si dicat Hippo. Menfes sunt morbofi, & improprie dicuntur menses, sed potius ῥόος ἢ ῥοὶ dicentur. Illo enim loco adumbrat veram naturam τῶν ῥοῶν. Siquidem ipsissima verba initio lib. 2. de morb. mul. usurpat, dum instituit docere περὶ τῶν ῥοῶν. Verba hæc sunt, fluxus albus in senioribus magis fit, fluxus ruber in iunioribus. Et illo loco verè τῶν γυναικείων explicat. Ac reuera ex his omnibus locis apparet menstruum morbosum affine valdè esse ῥόῳ, immo menstruum morbosum εἰς τὸ ῥοὺν proximè degenerare. Ergo quoniam species mensium explicuimus nunc ad fluores muliebres conuertamur. Quidam λευκὸς πυρρὸς aluus, flauus, κίτρινος, ἑρυθρὸς, λευκὸς ὑπόχλωρος, χλωρὸς ὑποδυσκοί, ἑρυθρὸς, & variæ aliæ species quas libro illo 2. γυναικείων Hippo. abundè explicauit. Inter cæteras species vnus est fluor mihi valdè incognitus vocat autem ῥοὺν αἱματος ἐν τῷ ἄρθρῳ. Est autem quidam fluor glutinosus, & sanguineus à colliquatione partium spermaticarum, & qui tabem dorsalem tandem inferat.

Nunc alia persequamur. An sit aliquis vsus eiusmodi floris. Aristoteles, vt antè docuimus, disputans περὶ τῶν λευκῶν, ait ea in puellis apparere, & alicuius esse vsus. In quo quæsiuimus an ista excretio albicantis rei esset ῥέε. Aristoteles crudioris sanguinis sobolem hoc esse credit, vt nōn tam ῥέε, significet quam κατὰ μὲν γὰρ. De eoque ita sentit, excretio τῶν λευκῶν, seruat corpora integra; item & menstrua purgatio, præsertim cum ab excrementis vindicentur. Sed si utrâque euacuatio vel non fit, vel immodicè fit, damnum euenit. Aut enim morbi oriuntur, aut corpus marcescit. Itaque illa τὰ λευκὰ, cum superant corporis prohibent incrementum, hæc autem ita fiunt. Cum natura coquere nequit, excrementum fit non solum alimenti inutilis, sed etiam in venis, vt per tenuissimas venas exundando superet. Atque illo loco τὰ λευκὰ significant κατὰ μὲν γὰρ ὁμῶς, ὑφαίμα, ob cruditatem & quandam cacochymiam quæ puellis inest. Nam si verus esset ῥόος non potest non esse malus, & vt signum, & vt causa vt signum, quia declaret aut abundantiam excrementi, aut affluxum, aut generationem perennem. Si caput humidius

Sub-
fi-
nem
lib. 2.
de mor-
bis mul-
ierum.

Lib. 2.
de mor-
bis mul-
ierum.

Cap. 4.
lib. 2.
de ge-
nerat.

adeſt, item ſi hepar prauos humores generat, aut ſi ſplen generat prauos humores. Omnium deterrimus eſt ^{gros} qui & qualitatem malam habet, & perpetuam habet generationem, ſiue ea ſit in toto corpore, ſiue in vna parte vt cauſa, quoniam partes afficit per quas & in quas fluit. Tamen ſi adeſt, non continuo ſupprimendum, ſiue fiat ob ſolam congeriem (ita enim facile definit) ſiue ob generationem. Tunc enim praua diſpoſitio ſignificatur, quam priuſ tollere oportet, quam excrementum quod inde immediatè manat. Teſtis dyſenteria, quæ repente ſuppreſſa grauiffimos morbos accerſit. Eſt ergo vbi fluôr vterinus ad tempus iuuat. At ſi humiditas tantum quædam ſimplex circum pudenda appareat, & certò colligas aut ob humiditatem corporis multam, aut ipſius vteri id euenire, aut quandam vteri leuitatem eſſe, vt ante docuimus, ſiue metu vllò ad ſupprimendas eas ſuperfluitates accedere poſſumus. Quod notandum ad legitimè adhibenda remedia.

Apud Hippo. locus eſt valdè commemorabilis: docet mulieres bilioſas non impunè euacuationem ſanguinis per vterum *Lib. 1 de morbis mulierum* ferre. Quia, credo, Arabum opinione bilem ſanguis frænât. A tali euacuatione incidunt in *ἐκταχυχάαν*, cibi faſtidio, anxietate & vigiliis occupantur: At ſi alius turbetur bonum: Item & ^{gros} per vterum confert, ſed non per multos dies fieri vult (alioqui vlcerationis vterorum metus eſſet) nec magna copia. Tria ex hoc loco colliges, primùm temerè non moliendam ſanguinis euacuationem in muliere bilioſa, & ſi immodicè feratur, ſtatim eum debere ſupprimi: Item alui ſubductionem & vomitiones impenſè bilioſis cōferre mulieribus, non ſanguinis euacuationem. Tertiò fluorem muliebrè bilioſum in muliere bilioſa (idè de aliis in ſuo genere audiendū) aliquatenus iuuare. Vnde colliges nō ſtatim reprimi debere, alioqui grauioris mali metus adeſt. Verendum ne ſi ſtatim ſupprimatur, reſluxus ad partes nobiles ſuffocationem afferat. At vterus non eſt via conueniens? Fateor, nec aures etiam, nec cor, at natura ſapè tamen iis viis abutitur, vt ſe onere eximat & liberet. Sed videndum ne vterus, pars nobilis, diu vexatus iſta fluxione grauiter afficiatur. Eſſi enim bonum eſt partes ſuperiores & ſitum & dignitate in inferiores ſeſe exonerare, videndum tamen ne dum hoc molitur natura, non minore detrimento nobiſcum paciſcatur. Quod eueniet, ſi pars quæ excipit ita grauiter affi-

86 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ciatur, vt eius morbus magnitudine longè superet commodum quod exoneratio partium attulit. Ergo fluor mulieris potest aliquando iuuare, eo modo quo hydrops maniam soluit, & item hydrops dolores capitis tollit, & cum partes superiores turgent, quod verbo antiquo vocat *αυρη*.

Apho. 5.
lib. 7.
Epid.
finem
lib. 2.

Vltimum ex iis quæ proposita sunt, erat, vt notas assignaremus obiter quibus colligas vel à toto corpore, vel ab vtero manare fluorem, vel affectionem in parte aliqua latentem consequi. Nec enim iis contenti sumus quæ ex Hippo. adduximus, vt sciatur, an à capite fluor sit, an à ventre: Rursum vel ab interno capite, vel ab externo. Sunt enim obscuriora, nec rem satis explicant. Cæterum docuimus iam ante quasdam vterino fluore mulieres laborare quibus tantum post menstruam purgationem serosa illa excretio contingat¹⁷. Aliis inter duas purgationes menstruas euenit: aliis indefinenter, nisi cum ita menstrua purgatio. Deterrima hæc postrema, tum quia assiduitate fluendi naturæ vires atteruntur, tum ob insolentiam floris, sic enim per contagionem bonum alimentum corrumpitur, & vna cum pessima materia laudabiles spiritus effluere possunt, hinc à *ψυχα*. Ergo aut ab vtero, aut aliunde primario (nam omnis per vterum fit, ideo symptomatibus vteri annumeratur) aliunde, aut cum mollius, & mucosum effœminatūque est, aut *ὑδρωμεν*: potè cum pituita multa abundat, aut ferro multo. Vnius verò partis, vt cum aut cerebrum humidius est, aut à pulmonibus serosum quid, aut ab alia parte, immo ab vtero ipso esse potest¹⁸. Ab vtero, vel quod sit humidior, vel quod in venis quæ sunt ad fundum eius collectio fiat materiæ albicantis, quæ diu suppressa deterior fit, & tamen vlcus adesse non est necesse. Item ratione vlceris. At si adest facile se signis profert, tum ex qualitate materiæ fluentis, tum eius quæ processit, tum à dolore petitis. Accedit congressus difficultas ob dolorē qui excitatur, maxime si circum collum vlcus lateat¹⁹. Maxime vero ab vtero esse colliges, si circum os pectinis, aut in partibus internis ad vterum dolor quidam profundus sit, si menses suppressi sint; Credibile enim circum vterum stabulatum esse humorem, qui morā vitiat vterum. Quod Hippoc. in Apho. declarat, si menses non fluunt in vtero morbi eueniunt, quod interpretantur de erysipellate, scirrhus, aut alio simili tumore in vtero nascenti. Si corpus benè habitum sit & floridus.

Apho. 56.
lib. 5.
Gal. in
Com.

lum, credibile est ab vtero potius esse. Sin corpus pallidum, aut biliosum, aut melancholicum, vel in toto, vel in parte, illinc pendere *ῥουῦ*, probabile est. Ita enim de iis in Com. Aphor. *Gal. Com. ad Aph. 36. lib. 5.* Cacochymis mulieribus non modo purgationes menstruæ, Græcè *καθάρσεις ἐμηνιαίας* decolores fiunt, (decoloratio enim non solum ob pituitam, sed ob melanco. & biliosum humorem fit, sed etiam menstruam periodum non seruant. Nam si crassiores fuerint humores, difficilius fluunt quàm ij qui secundum naturam sunt, longiusque tempus expectant, sin humidiores fuerint & tenuiores, consuetum tempus antieipant, vel diutius fluunt, quoniam aqua intercute laborantibus muliebria diutius perseuerant. Quo loco notandum Hippoc. non loqui *περὶ τῶν γυναικείων*, quia vsurpat vocem *κατομηνιαία ἄχρσα* (*ἄχρσα* idest, decolores menses, vel *πολύχρσα*, vt placet Philotheo:) & cum dicit non per idem tempus venientes, id est, periodum consuetam non seruantes, tacitè declarat causam subesse, aut crassitudinem humores, aut viarum infarctum, vnde fluor impediatur. Nisi quis includere voluerit *ἐν γυναικείῳ*, quod fluor sit *ἀχρσος*, quod non per idem tempus veniat. Tamen verè de mensibus audiendum Aphorismum putauit Galenus.

Reuera, vt liberè dicam, ob vitæ institutum nostrarum mulierum, ob cruditates & intemperantem vitam, præsertim iis in regionibus, in quibus corpora sunt molliora & humidiora faciliè vterus pars declinet, & ad sentinam corporis collocata potest *ῥευματι* excipere & *ῥιπ* tentari. Et innumerae sunt mulieres apud nos quibus familiaris hic morbus. Quinetiam pleraque pulmonum morbis à defluxione corripuntur, vt mirum non sit si eodem & modo istis *ῥευματισμοῖς* corripiantur. Descensu illius materiae, vt antè docuimus de consensu partium thoracicarum cum genitalibus. Tamen meo iudicio videtur potius à cacochymia corporis totius, & præsertim ventris inferioris *ῥε* esse: vt idem eueniat quod in fluore alui. Sed fluoris alui sistendi facilius est ratio, quàm *ῥε*, quia & assumptorum, & ad motorum vis in sistendo alui fluore percipitur. Porro aliis varia accidentia eueniunt *ἀτὸ ῥε*. Aliis nulla aut pauca: inter cætera Hippo. obseruat nonnullis pituitam acrem à capite delabi præsertim grauidis, & tunc facit *πάλμης ὑπεραινόμενης*, palpitationes sub exolutas vertit interpres, & malè. Melius palpitationes sub exoluentes verterem. Alia multa in libris de morb.

90 CONSILIORVM MEDICINALIVM
mulierum inuenientur.

Ultimam nunc partem instituti per sequamur, quæ in cura-
tione consumitur. Ac primum tum ratione partis ipsius, nem-
pe uteri, tum naturæ mulierum difficilis curatio. Partis quidem
quoniam nec vis medicamentorum præsertim admotorum in-
tro subit, tum quia facillè patet excrementis. Naturæ mulie-
rum, quia non facillè suos morbos medicis detegunt, & cum
sciant se ægrotare, quoniam vim momentaque morbi non in-
telligunt, tum demum de iis aperiunt, cum iam progressi vi-
curationem admittunt, nec obsequuntur medicorum placitis.
Ac primum generalius rem tractabimus, præsertim quod ad
eam mulierem pertinet quæ se laborabat, cuius maxime origi-
nem à capite repetiuimus, quod corpus mollius & humidius, &
caput porriginosum haberet. Omnino autem corpora humi-
diora natura sunt morbosiora, si verum illud: Quæ natura na-
res humidiores, & genitura humidior, nimis integra sanitate
fruiuntur: quibus contraria, salubrius degunt. Aliter in Epid.
Quibus naturâ nares humidiores, genitura humidior & copio-
sior, hi morbosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex mor-
bo (suppl. naturâ humidiores) nares, vice versa, id est, sani
etiānum degunt: sed sani *κατά τι*. Vbi notare oportet Hippo.
opponere humidiorē *τῇ φύσει*, humidiori *τῇ ἐν νόσῳ*. Quid hoc
significat? An qui ex morbo humidior est, sanius degit, quàm
qui naturâ talis est. Immo quo naturalia instrumenta sunt hu-
midiora, eo melius omnia in corpore administrantur? Secre-
tum aliquid hîc latet. Duplex est humiditas, vna naturalis, al-
tera contra naturam. Rursum naturalis bifariam, vna humidi
primigenij vbertate, & hæc omnino bona est, quanquam om-
nino in natura excessus malus: vnde prisco quodam modo phi-
losophans Hippo. de mixtione aquæ & ignis, docet eos mor-
bosiores fore quibus plurimum est aquæ. Altera naturalis hu-
miditas, est excessus cuiusdam excrementitiæ aquositatis, & vt
sic loquar pituitositatis à primis parentibus orta, & diæta non
correcta, sed potius fota & alita. Cuiusmodi plurimas Scytharū
mulieres Hippo. demonstrauit ob naturalem humiditatem in-
fecundas esse. Et de hac humiditate Hipp. hoc Aphorism.
intelligit. Ideo minimè sani sunt. Altera humiditas vel præ-
ter naturam hoc in loco) est vel ex morbo, vel ex diæta. Nunc
intelligamus cur anteferat humiditatem *ἐν νόσῳ* humiditati *κατὰ φύσιν*.

Ap. 10.
lib. 6.
Sect. 6.
lib. 6.
Epid.

Eph. 8.
de Dia-
ta.

Lib. de
æc.

quasi sanius degat humidus ex morbo, quàm qui naturā talis est. Ita sanè. Sed absolutè pronuntiat & generaliter omnes morbosiores esse quibus natura nares humidiores, cum de humiditate ex morbo ait, scribit, Plurimis humidis ex morbo non tanta valitudinis imbecillitas. Itaque non absolutè pronuntiat. Quod sic intelligo fieri potest, ut quis propter causas aliquas morbificas, & semen & nares, & cerebrum humidiora habeat, sed dum natura eam humiditatem euincet, & ars corrigit, etsi aliquo tempore valetudinarij existant, tamè non tandiu tales existent, quandiu ij qui iam à paruo puero istam humiditatē in toto corpore contraxerunt²¹. Item cum naturalis est humiditas, ferè totius corporis est; cum morbo fit, sæpè vnus tantum partis est. Accedit & quod commodo corporis fit, ut corporis excrementa euacuentur, quod dum fit, corpus morbo, siue ex morbo humescere dicitur, atque sic mea de iis ratio est. Alij suo iudicio vtuntur.

Ergo qui humidiores sunt vel natura, vel vitæ instituto, præsertim si excessus & nimietas sit, iis minùs integra sanitas conceditur. Siccioribus contra. Quod sine Diorismo non audendum, alioqui locus lubricus est. Primum audiatur Gal. Sic-
Com. ad Apho. 2, lib. 6.
*cioribus naturis nulla est superfluitas, humidioribus contra. Nam humidioribus siue toto corpore siue cerebro tantum, continuo destillationes ex parua occasione oboriuntur, angine & consimilia²². Contra tamen ea quæ dicuntur à Galeno de natura siccioribus, quòd nulla omnino superfluitas manifesta & sensibilis nec per cutim, nec ex cerebro effluat, obici potest illud quod vulgò obseruatur, natura biliosiores & sicciores ob calorem acré adurentem sæpè cruditatibus abundare, inmo & passim destillationibus ferinistentari. At dicemus id non fieri per se, sed ex euentu: vel potiùs cum humidum dicimus, manifestum excessum humiditatis audimus, ut quantitate peccet, sed cum meminimus humiditatum *σειμέων, & πυκνῶν, & πυκροχέλων & χολώδεων*, quas in siccioribus abundare videmus; eæ potiùs qualitate peccant, ut in humidorum censu non habeantur.*

Ita pro ea muliere consultum est.

Cum caput plenum est aut dolorifica inuehuntur, aut *κεφαλή* aut *κεφαλαίον*, siue *κεφαλαίον*. Ergo si *κεφαλαίον*, siue *κεφαλαίον*, siue *κεφαλαίον* sequitur à defluxione capitis, non autem à congestione in vtero hic præcautioni & curationi locus esse de-

90 CONSILIORVM MEDICINALIVM

bet. Præcautione eorum quæ consequi possunt, curationi eorum quæ iam adsunt. Primum generationem impediemus, id fiet, tum parti consulendo ei quæ mittit, tum toti corpori, si fortè totius vitio id sit vt pote mollioris & nimium mucosi. Et bifariam fiet, tum ratione victus, tum purgatione. Auersione à parte in partem contrariam, vt pro vteri fluore alui fluore consequatur. Corroboracione, Mitigatione. Corroboracione partis recipientis, & generantis. Mitigatione, non solius humoris transeuntis, sed aut in tota massa sanguinis, aut quacunque parte latitarit. Generatio prohibebitur, tum hauriendo corpus, tum partem à qua fluxio manat. Nam etsi vini parti vitium ascribitur, tamen totum corpus aliquando mollitie diffuit. Euacuatio fiet vel corporis totius, vel partis, manifestè aut occultè. Corroborabitur tum externis, tum internis. Ac primum consuletur toti corpori victus ratione, abstinentia rerum liquidarum, vini albi, parcioris cœna, abstinentia horariorum, salforum, piperatorum, item victu vniuersi modi. Purgationes erunt ex rheo, syrupo ros. solutio puluere hieræ, syrup. de cichorio composito cum rheo. Valet & syrupus montagnæ ex aquis artemisiæ, matricariæ in quibus agaricus infundetur, & saccharum candum ad lib. j. dissoluetur vt fiat syrupus coctus. Ventriculo studendum blandioribus fomentis, & puluere cui digerendi & confirmandi vis insit. Capiti verò per frictiones ex sacculis milio, fursure cum foliis sampsuchi & consimilibus paratis. Macerata salvia in vino albo ore continetur ad promouendam saluam. Lixiuum quoque solenne accommodatum erit. Vtero verò præsertim dum transitu acrimonia lædit humor conferet applicatio sacculorum, tapso plenorum, qui madebunt lacte, aut aqua & vino, vel fursur excipietur sacculo & applicabitur. Magma rosarum confert. Item chamæmelum, & melilotus. Utetur puluere ordinato ex Eleæ. Diatragacanth. frigid. puluere ireos, puluere gly & saccharo cando, vel accipientur sæpè tabellæ eleæ. diatragacanth. frigid. vel dissoluentur iusculo & accipientur. Litus fiet ad spinam ex oleo mastich. myrtino addito benoing. Tandem applicabitur Empl. contra rupturam, aut similia parabuntur. Sub finem vtetur syrupo ex rosis transmarinis. Ad extremum valebit sudatorium.

Nunc autem sigillatim magis de curatione ista agemus sum-

pto exordio ab iis quæ ante dicta sunt. Nam docuimus alium fluxû biliosum esse, alium pituitosum, alium melancholicum: Item aliàs totius corporis mollietem laxitatẽque in causa esse, ac præsertim pituitosi aquosique floris, alias hepatis prauitatem, præsertim eius qui biliosus & subuiridis est, aut alius deterioris coloris. Et in hoc morbi idea agnoscitur, cuius notitia apprimè ad medendum confert. Quis enim dubitat quin aliter selegere oporteat toto corpore affecto, quàm si vel pars vna, vel vterus ipse laboret? Quinetiam dispositionis varietas, rem quoque variat. Nam in quibusdam est frigiditas & humiditas multa calorem natium obruens causa huius rei, in aliis vitium ventriculi, & primæ regionis, vt in iis quæ fædos quoque colores patiuntur, & in talibus fœtet anhelitus, ructus adfunt, cachexiæ signa, luridi sunt dentes, grauedo, tumor pedum aut corporis. Est enim praua chylosis, seu prauitas, vt loquuntur præctici, digestionis. Item quemadmodum ventriculus & lactes malè suo funguntur officio, ita & hepar, & eius venæ: sic vt cum fiet mala hæmatosis, necnon ob prauam eius diathesin, extraneumve calorem, aut refrigerationem quandam, chylus in mesaraicis, & simis hepatis corrumpatur, vnde occasio facillè nascitur aut floris alui, aut vteri, prout vel alui, vel vterus prius istam *καταρσιν* suscipit. Nec enim necesse est prauum fieri sanguinem, sed sæpè mediis viis impressione ipsius hepatis chylus inficitur, & maleficam accersit qualitatem, vnde corpus nihilum proficit. Euenit etiam vt in ipso vtero infirma sit facultas concoctrix, vnde vterus humentior frigidiorque factus dum aquosa superfluitate proluitur flori vterino occasiõnem dat & principium. Quis itaque iisdem agat remediis si hepatis vitio id eueniat, & si ventriculi vitio? Item si excessus sit caloris corruptentis in hepate, vnde *κακοπαρα* consequitur, aut excessus humiditatis, vnde debilitas consequitur?

Ac primum quod ad totum corpus pertinet, hoc in loco breuiter perstringenda est curatio fluxus muliebris, quam Gal. proposuit in vxore Boethi eo fluxu laborante ob nimiam & humiditatem & refrigerationem. Galenus & humiditatem morbi *ὑγρὰν* & refrigerationem *ψυχρὰν*, qui humidus erat, vt humor esset instar coaguli (Interpres enim has voces *ὑγρὰν* & *ψυχρὰν* omisit) & refrigerationem correxit: ventriculi rationem habuit, ab astringentibus primo quoque tempore abstinuit, quoniam ea nocuerant. Per

Cap. 4.
d. Prae-
cog. 11.
ad Pom-
phum.

92 CONSILIORVM MEDICINALIVM

aluum humorem deriuauit, diuretica exhibuit. Item & sudorifica. Aluum quidem hydragogo subduxit, & ad proliciendam vrinam decoctum azari & apij propinauit. Frictiones adhibuit, litum ex melle ad prolestationem sudoris. Auibus montanis & siccante diarta vsus est, & non solum effecit, vt quod redundaret euacuaretur, sed vt generatio quoque prohiberetur. Hæc sunt curationis capita illius quam Galenus instituit, quæ sicco pede prætereunda non sunt.

Atque primum ab astringentibus abstinuit, quoniam vsu medicamentorum astringentium ventris tumor secutus est, vt falsò eam concepisse existimarent. At collectio erat suppressæ humiditatis. Declarauit euentus, excreuit enim ingentem aque copiam non sine magnis deliquiis, vt ea animam agere videatur. Vbi primum animaduertere oportet interpretis lapsum dum loquitur de applicatis astringentibus, ait enim, vnguenta insuper admota sunt, quæ muliebres locos supprimerent: Græcè, *οὐκ ἀπέβητε τὰ μὲν αὐτῶν συστάντων τῶν ἐν γυναικείῳ τόπῳ*. Ad mouere consilium fuit ad muliebres locos ea quæ vim haberent astringendi compescendique suppl. muliebrem fluorem. Ergo patet non minimum periculi adesse si fluor iste statim reprimatur. Nam hydrops particularis repente est obortus. Quod antè explicuimus docentes illius euacuationis aliquem esse vsu. Immo & in biliosis aliquatenus iuuare ex doctrina Hippocratis. Annotat autem Abaltomari ex Aetio, mulieres nonnullas hoc represso fluxu in hydropem incidisse, alias in neruorum affectiones, aut capitis dolorem.

Cap.
109. m.
sbo. m. c.
dendi.

Secundo rationem ventriculi habuit. Nec enim est quod quis obiiciat Galenum in hac muliere nardino vsu oleo ad ventriculum ratione præsentis leipothymiae cum algore partium externarum (quod certè commodè fit, & fortè à nullo vnquam obseruatum) sed satis patet illius rationem habuisse cū videret hypochondriorum summam laxitatem, nec non ab humiditate & refrigeratione istum pendere. Itaque, vt postea aperiemus, si suspicio est, ab imbecillitate primæ coctionis malum oriri, in curam ventriculi incumbemus.

Tertio diuretica instituit, de quibus plerique ambigunt, vt & de iis quæ vim habent aperiendi vt pilulæ de aloë, & consilia. Quem nodum soluere operæ pretium erit, vt quando & quomodo se in iis gerere oporteat, omnes intelligant. Eandem

orbitam triuit Manardus & alij, sed nihil tandem definiuerunt. Abaltomari à quacunque causa fuerit, & ad normam & exemplum Galeni diuretica instituit. At errat. Siquidem summa erat in vxore Boethi humiditas & frigiditas, sic ab vsu diureticorum, quæ calore suo fundunt, & tenuitate summa partium sunt prædita, nullum incommodum est insecutum. At si ventriculus imbecillior est, si biliosus, & ichorosus & malignus est fluor, si impensè calidum hepar & calore acri præsertim præditum, nunquid dictamni casia, carpobal. semen balsam apij, petro, maced. phu. Valeriana nocebunt? Ita hercules. Quorum enim diuretica, cum humor nimium sit tenuis & subtilis, & ut sanies ichorque? Verendum enim ne in diabeten conicias. Præterea quid est necesse vsu diureticorum incidentium, attenuantium, & fundentium, primum sanguinem fundere & liquare, deinde secernere per vias vrinarias, cum fluor muliebris sæpè à venis non sit vt ante docuimus? in summa sanguinis humectatione ob ichoris admixtionem, hoc quidem conferet, sed si fluor muliebris fiat ab humore secreto à massa sanguinis, vt omnis ferè sit, superuacua est sanguinis colliquatio à diureticis, & eorum vsu intrudetur humor in vterum ipsum iam apertum, immo & is magis aperietur: immo verendum ne diuretica remisceant separatum humorem, & autorem ipsi massæ sanguinis. Denique læsio sequi possit vsu impensè calidorum & colliquantium. Est ergò vbi diuretica conferunt, est vbi non. Paulus dum de curatione agit, ita scribit: Quoniam hæc passio *lib. 3.* est humida, subueniendum toti corpori illis quæ sine manifesto calore exiccant. Item frictione corporis, vnctione ex melle cocto, danda diuretica, vt decoctum apij & azari, & peruentrem totum corpus purgandum. Hæc quidem ex Gal. *lib. ad Pauli error.* Posth. surripuit, sed in duobus errauit. Primum vult ea vsurpanda quæ sine manifesto calore exiccant, & tamen paulò post *Epist. 5. lib. 11.* diuretica eaque valdè calida & siccantia dat, vt azarum. Immo omnia diuretica exiccant, vt paulò post docebitur. Deinde in hoc errat, quod sua remedia sine iudicio præscribit, non distinguens an humor sit frigidus, an verò sit calidus. At distinctionem tenenda est. Manardus verò istam nostram questionem dirimit de diureticis, an quod vrinam prouocat, menstruum prouocat: & si ita est, cur azarum & apium quæ mouent menses & vrinam dantur ad. Incitabunt enim eum potius. De diu.

94 CONSILIORVM MEDICINALIVM

reticis præsertim calidis, (nam sunt quædam frigida & contem-
perantia urinas promouentia, & ea potius *επιτριβ.* quam *διυρητικά*
dicentur, vt in voce *διὰ* vis aliqua insit) ita ex Gal paucis, quo-
Cap. 22.
lib. 5.
d. simpl.
niam magna est controuersia, quæ non desiccant, & modicè
excalfaciunt, lac generant, quæ plus calfaciunt non tamen valen-
ter siccant, menses mouent, vtrâque urinas prouocant (suppl.
cōmuni quadā facultate) sed propriè quæ calfaciunt & desiccant,
diuretica vocentur, nō quia sola moueāt urinas, sed quia solas.
Cap. 23.
Solas autē dicentur mouere quia non prouocant lac & menses
quemadmodū vice versa quæ lac & menses ciēt, urinas proliciūt.
Et alio loco, cū urinā prolicere voles acrioribus & calidioribus,
quæ quæ sunt *εκφρετικὰ*, vteris, nimirū fundentibus, liquantibus,
& seccernentibus. Plura in primo Consiliorū Tomo. Hinc col-
liges & mēstruum prouocantia & diuretica esse calida & sicca,
sed diuretica esse sicciora, immo & acriora. Nā & costus, & ca-
sia & cinnam. mēstrua prouocant Galeno, cum tamen multum
sicca sint actu: id est siccandi potestatem habent. Quanquam
quædam valdè exiccantia, menses mouent aliquando, vt Ga-
leno Sabina id præstat, cum eodem authore summè siccet. Sed
omnia audienda *καθ' ἑαυτὰ καὶ μᾶλλον*. Ad rem redeamus, & has diffi-
cultates omittamus, vix eueniet vt aliquid verè diureticon sit,
quin idem & menses cieat, vt concludere oporteat an tuto diu-
retico vti liceat *ἐν τῷ ῥῆτι* an non, siue per se omnino urinam mo-
ueat, siue vnā mensem iritet, & proinde fluoris muliebris ma-
teriam propellat. Manardus post istud examen, quoniam videt
& casiam & apium, & azarum quæ dantur ad prouocandas uri-
nas *ἐν τῷ ῥῆτι*, posse incitare quoque materiam in vterum, quod
malum videretur, quoniam per partem lætam non conueniens
videtur purgatio, ait tandem maius sequi commodum ex præ-
lectis tali diureticorum vsu urinis, quàm sit incommodum si
vna & eadem opera ad vterum propulsio sit. Aut nullum enim
aut exiguum incommodum vult sequi. Non enim fieri potest
quin in viis ipsis ad vterum, & in vtero hæreat illa proluiiei ma-
teria, quæ, dum pellitur urinae vno impulsu, dum particula
medicamenti aliò traducitur, commodè detrudi & detergeri
possit per vias vteri. Quod si diutius vteremur illis vreticis, re-
uera noxa afferretur, sed postea ita temperamus remedia, vt eo-
rum vis retundatur. Deinde ad supprimentia, corroborantia
& astringentia gradimur. Plura vide apud Manard. loco cit.

Concludemus paulò post de iis.

Nunc de vsu catapotiorum ex hieris, an conueniant, vti & ea quæ tenuitate partium prædita sunt. Rondeletius bonus medendi magister in curando præ abstinere præsertim à pilulis officinarum quod constent ex calidioribus, & iis quæ tenuitatem partium maiorem habent. Sed non omnino prohibet eadem remedia cum fluor à pituita est. Itaque secum conciliandus est hoc modo. Quod attinet ad pilulas ex aloë & hieris, in materia tenui, ichore & bile venas matricis ad faciendum appetente, temperandum est à pilulis, quod metus esset primum ne moueatur magis. Et cum non facile auertatur ab utero licet omnia ex arte egeris, periculum est ne si incitaueris materiam, & vteri vasa reseraueris, facile non reprimas. Item efferatur & acuitur magis materia vsu rerum acrium & tenuitate partium præditarum. Tertio verendum ne si ad aloem & hieras concurras menstruam periodon legitimæ purgationis perturbes, vt & vna præ, & τὸ ἴδιον τῆς μήνης confundantur. Quod notandum est. At si materia crassior est & pituitosior, non tantus adest metus. Ideo in bilioso præ interdicit, in pituitoso pilulas istas amplexatur. Nos postea legitima dabimus remedia. Hoc addemus si consilium est represso aliqua ex parte cursu ac impetu purgare venas ad vterum pertinentes, ad aliquod tempus ea remedia possumus vsurpare.

Quod ad diuretica pertinet, eodem quoque modo conciliare licet. Docuimus ex Manardo sequi commodum magnum ex vrinarum irritatione, & sudorum, quoniam mollities & humiditas tollitur. Ita enim Hippo. requirit corporis quandam contractionem quandam & compactionem, fugatâ videlicet mollitie & effcæ natione. Sic τὸ σπῆγμα τῆς σαρκὸς τῆς μήνης significet. Ad quam rem humiditatis excretio, & per vrinam, & per sudores requiritur. Sed quid attinet sanguinem fundere ad proliciendas vrinam vsu diureticorum, cum præ, non sit ex venis, sed ex aliis quibusdam vasis, & præ non fiat per separationem materiei aquosæ è venis? Nam bonum quidem est diuerrere ad renes serum in morbosis menstruis & aquosis, sed non in præ. Sed reuera hoc facit ad materiam & causam antecedentem. Nam totum corpus confluit. Et ita in iis moderatè agendum est, vt habita & corporum ratione, & materiei, præ committentis distinctione,

36 CONSILIORVM MEDICINALIVM

modò diureticis vtamur, modo pilulis & confimilibus vias re-
ferantibus. Quis enim adeo ieiunus vt eunte per vterum mate-
ria & calidissima, & hepate siccissimo calidissimo que existente
ad catapotia concurrat? Quis eadem vsurparet, si ventriculi
œconomia præ imbecillitate labefactetur: nisi fortè solo hic-
rarum puluere vtatur? Rondeletius verò tum demum aperien-
tia diuretica vsuuenire putat cum malum declinat, & corpus re-
purgatum est. Ac si dicat, cum magno impetu humor non fluit,
ad vias vrinarias humorè deriuato, ne si dum in motu est id fiat,
& vterum moueas, & fluxum magis incites. Præterea requirit
vt corpus benè purgatum sit, ne diureticorum vsu obuias mate-
rias in renes intrudas. Et hæc sunt quæ generaliter de his dici
possunt.

Primum hi frequentes clysteres conuenient, ne si fortè me-
dicamenta des, idem fiat quod & in arthritide. Sæpè enim vi
medicamenti solutiui ob *κατάρρομα* irritatur fluxus humorum in
subiectas partes. At enemata conueniunt.

℞. ²⁴ *Betonica* (nā hac vtero valdè confert purgando) melisse agri-
palma, matricaria, artemisia. an. m. j. cyperi, schœnuanthi. an. ʒ iij.
seminis feniculi. sefeleos. an. ʒ ss. seminis poœniæ rubentis ʒ ss. seminis
lini ʒ i. s. florum chamæmel. meliloti. an. m. j. fiat decoctio in col. dis-
solu. terebinthinæ. ʒ iij. cathol. ʒ j. diaphœnici. ʒ iij. mellis rosari, sacch.
rub. an. ʒ j. fiat clyst.

Inter cætera dissoluetur in clysmatis mel mercuriale.

Mercurialis enim magnas habet vires ad proliciēdes humo-
res serofos quos authores *πύον πυρρὰν* statuimus.

Conueniet quoque in iisdem enematis dissoluere confes-
sionem hieræ, si eluere velis istas sordes, & magnæ in venis
vteri obstructionis subest suspicio. Item valet aliquando con-
fectionis hamech portio dissoluta.

Loco mellis mercurialis succus betæ, præsertim rubræ valet,
item si ditior sit laborans mulier, dissoluetur syrupus rosarum
solutius.

Valet & hoc enema superiori respondens præsertim si pitui-
tosa valdè sit mulier, & *ούρρητος*.

℞. Rosarum pallidarum. m. j. furfuris macri. p. ij. hordei. m. s.
fumariæ, mercurial. parietariæ, & tapsi barb. an. m. s. absinth. centau-
rij minoris. an. m. s. costi. p. s. betæ rub. m. j. vitice mollis (de cuius
vi multa authores asseruerunt) m. s. rosarum transmarinarum. m. s.
betonica

betonica & Parthenij. an. m. f. chamemeli (nam hoc omitti nunquam debet) p. f. fiat decoctio ad quart. ij. dissol. vini optimi quart. unum. Agaricus in nodulo positus infundetur in decocto clysteris, & mirificam habet vim. Aliquando serum lactis, aut decoctum caulium rubrorum, aut hydromeli conuenient loco alterius decocti, & in rem presentem.

Cauendum ab iis quæ calidiora sunt, & quæ humidiora. Illa enim aperient plus æquo, & fluorem incitabunt: hæc verò locos humectando morbum fouebunt. Atque superiora enmata in corporibus humidioribus & frigidioribus conuenient.

Hoc solum addere opportunum erit non esse alienum in decoctione ipsa clysterum ad ^{per} pertinentium iniicere fasciculum radicis sarseparellæ, aut ramenta aliquot ligni indici, vt desiccationi omnino studeatur. Cauendum ab omnibus oleis, præter nardinum, cedrinum, de terebinthina, & alia id genus. Sunt qui decoctiones per os sumendas transcolant per cineres sarmentorum, vt maior desiccandi vis adsit, cur non & decocta Enematon eodem modo parare non licebit?

Quod si corpus calidius sit, & siccus, vt ^{per} ab humore contingat acri, mordaci, vnde dolores circum lumbos oriri solent vehementes, & metus exulcerationis est, ista clysmata superiora omittentur, & alia vsurpabuntur.

℞. Nymphaeæ m. j. acizoi utriusque, portul. polygoni, tapsi. an. m. j. fursurum m. f. hordei. p. j. foliorum intybi syluestris. p. j. semin. frigida. aut minorum. an. ℥ iij. seminis cytoniorum. ℥ s. mercurial. betonice (nam hæc duo nunquam omittenda) Parthenij & urticae mollis. an. m. f. chamemeli. m. j. fiat clyster. dissol. electuarij de succo rosarum ℥ iij. catholici ℥ s. mellis anthosati, aut mercurial. ℥ s. sacch. rab. m. j. feri lactis. quart. j. Succus beta, aut serum lactis, aut aqua decoctionis absinthij, & hordei conuenient.

Chamamelum vt verè hystericum non omittetur, betonica verò & mercurialis maximè confert, quoniam albam sordidamque eluuiem maximè eluit.

Æstate incoquantur rosæ pallidæ, & cum tutius astringere voles magna earundem rosarum macerabitur in aqua, & erit pro clysteris decocto.

Maiore sumptu dissoluetur in enemate succus florum persicorum (si facile educetur) aut rosarum pallidarum dissoluetur. Præterea talis clyster. exquisitius componetur.

98 CONSILIORVM MEDICINALIVM

¶ Hydromelitis bene coctilib. s. succi artemisie, nepetæ, caulium rubrorum. an. ℥ ij. vel in calidioribus, succi plantag. lanceolatæ, aut emperuini tantundem, in clysmatis compositionem insumetur, dissoluiturque laxantia pro re nata.

Ergo statuatur corpus mulieris cacochymum, cui tamen ventriculus sat legitime officium facit, sed viscerum impuritas fovet, & ex consequenti ipsius vteri humiditas cum squalore quodam, primum à valdè calfacientibus abstinendum, nec statim sistendus, sed admiscenda contemperantia astringentibus, & soluentibus, alioqui cauendum erit, ne omnia peruertantur. Primum utemur hoc decocto.

℥. Vrtice mollis, scariolæ, endiuia, lanceolatæ, pilosella, & bipinnella. an. m. j. plantag. & berberorum. an. p. j. agripal. betonica, mercurial. an. m. j. semin. frigidorum maiorum & minorum. an. ℥ ij. seminis bardanæ & seseleos. an. ℥ j. passul. corinthiacarum ℥ s. rad. pereryngiorum & brusci. an. ℥ j. rad. ireos. ℥ s. fiat decoctio ad lib. j. in col. dissolue syrup. capil. syrup. de endiuia, & de althea. an. ℥ j. coaguli leporis ℥ ij. fiat apozem. aromatizatum electuario diatrachanthi frigidi, vel diarrhodonis abb. vel arom. rosati. Bonum erit post dosin unam sumere tabellam diacanth. aut diareos, utrumque enim renes purgare potest, vel,

℥. Mercurial. m. j. seminis carthami ℥ s. rad. ireos florentia ℥ j. florum persica arboris & rosarum pallidarum. an. m. j. buglossi, boragin. scariol. scabiosa, betonica, & melissophylli. an. m. j. ciccerum rubrorum. p. j. vrtice mollis m. j. iuiub. sebesth. & pruna an. m. xx. plantaginis, & semperviui an. m. s. rosarum transmarinarum. m. s. seminis citry cardui & melonum. an. ℥ s. fiat decoct. addendo sub finem conferua violarum & rosarum. an. ℥ s. necnon seminis pæonia maris. ℥ s. in colat. dissol. mellis rosati colati & diligenter asseruati & sacchari buglossati, aut candi an. ℥ ij. fiat apoz. in tres doses.

Sed in materia hac calida & effera possumus vti puluere leniente, renum obstructionem tollente:

¶ Pulueris electuarij diatrachanth. frigidi. ℥ ij. pulueris gly. ℥ s. pulueris ireos ℥ s. sacch. candi ℥ i. s. fiat puluis, additis seminibus frigidis maioribus, quæ puluerem electuarij diatrachanthi frigidi ingrediuntur, sed tamen non nisi vsus tempore adduntur, quia facillè ranciscent, vel, hic puluis instituetur,

℥. Cinnamon gr. 4. pulueris nucleorum mespilorum ℥ j. sem. lar. d. m. ℥ j. pulueris electuarij diareos simpl. & diatrachan. frigidi. an. ℥ j.

pulueris glycyrr. ʒij. sacchari candi ʒi. s. fiat puluis accipiendus ex ouiluteo, vel ex cochleari superbibendo parum vini albi decocto radicis graminis diluti.

Hinc patet nos moderatiores fuisse in vsu diureticorum, & potius constituisse in his quæ leniendo vrinas & serum per renes deducerent. At si corpus duriusculum sit, & præpingue, ea quæ calidiora sunt & tenuium partium, cum siccandi vi vsurpabuntur. Ad prædicta remedia accedent emulsiones solennes vi leniendi & mitigandi præditæ. Pauperibus ad tempus hydromeli conueniet. Nunc ad purgantia remedia festinandum in quibus eadem generalis methodus tenenda, quæ & in clysmatis. Nam aliàs pilularum vsus confert: aliàs non. Si materia accris, mordax, si corpus *περὶ ὅσον αἰὼν*, si cacochymia leniter & *ἐμμενῶν* emendanda. Utendum medicamentis leniter purgantibus. Inter cætera laudant trypheram perficam, quod & *Rondeletius.* corroborando, & leniter euacuando mirificas vires habeat. At placet quibusdam, idque non sine ratione, malè & propter rationem istam Trypheram præparari. Quinetiam non longè à *Andrieus Falsius.* nostro diacatholico differt. Nos in vtriusque formam opiata tam delicatam, & magni vsus componemus:

℞ Radicis salsæparillæ ʒij. macerentur in aqua fluuiialis, aut cysterna lib. iij. donec. redeant ad lib. iij. addendo vini albi quartar. j.

℞ Rosarum pallidarum. m. j. florum persicorum, seminis poenici. ʒij. spica nardi. ʒij. cichori totius, scariol. endiuie, borag. plantag. an. m. j. rad. bistortæ, florum & foliorum dictam. an. ʒss. mercurialis. m. j. betonicæ. m. ij. passularum corinthiacarum & granorum Kermes. an. ʒss. corticis myrobalanorum citrinorum ʒij. been albi. ʒij. rad. petr. asparagi, eryngiorum. an. ʒj. calend. m. j. urtica mollis m. ij. semin. frigidorum maiorum, semin. coriandri, & seseleos. an. ʒij. foliorum senæ mundatorum. ʒi. s. aut ʒij. fiat decoctio addendo cinnamomi, & nucis moschate. an. ʒij. colaturæ, adde rhabarbari puluerisati. ʒ. s. express. ʒij. eiusdem rhab. infusi in vino albo cum cinnam. Cassia ʒ. j. pul. pe passul. & sebesthen. an. ʒss. confectionis Alkermes. ʒij. conserua buglossi, & syrup. conseruationis citri. an. ʒj. siue citri minutim incisi. ʒi. s. & cum sacch. fiat opiata vtenda, vel in decocto calendulæ & gly. vel in forma boli.

Potest addi puluis foliorum senæ ad ʒss. vel ʒ6. vt efficacior sit opiata.

100 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Ex iisdem materialibus potest parari syrupus solennis.

Si paretur syrupus solennis, ex vsu erit syrupus rosarum solutius in eodem dissolutus, vel succi mercurialis, endiuix, pomorum etiam de curtispiculo.

Eodem pertinet syrupus Regis Saboris ex folliculis solutius. Substituentur pilulæ istæ, quæ deuorabuntur.

℞. Ambra grisea ℥j. rasura eb. gran. 8. cinnam. gran. 5. radicis i eos & spica nardi. an. gran. 4. rhabarb. electi ʒij. mast. ℥j. pil. rufi. ℥ss. cum syrup. Regis Saboris, vel cum succo pomorum, fiat massa pilul. vel,

℞. Ambra grisea ℥ss. caryophyl. gran. 4. rad. ireos & bislo. an. ℥j. mastich. ℥ss. rhabarb. ʒij. s. confectio Alkermes. ℥j. iheriaces. ℥ss. excipiantur syrup. conseruation. myrobal. aut cort. citrij conditi. vel si sicciore esse videatur massa excipitur in aqua macerationis rosarum pallid. & florum viol.

Et quoniam antè in omnibus ferè apozematum aut medicamentorum decoctis succum aut mercurial. aut syrupum rosarum solutium dissoluimus, hic vnum admonere non est inutile ad legitimè medendum. Quæcumque medicamenta aquas educunt, ea faciliè exoluunt corpus humiditate educta qua partes erant quodammodo delibutæ. Et quod experientia docuit, ventriculus faciliè offenditur. Ideo in medicamentorum serum & aquas educentium moderatiores nos esse oportet.

Quod si pituita magis in vitio est, & corpus mucosum magis, non erit alienum vti pilulis officinarum. Nam mucago & illuies corporis impedit quominus noceant.

℞. Spica nardi ℥j. caryophyllorum ℥j. diambra & diamoschi dulcis. an. gran. 8. agarici non trochiscati, aut trochiscati. ʒij. puluis hieræ dupl. aloë. ʒiij. rhab. ʒi. s. iheriaces & conserue anihos an. quantum suff. fiat massa pilularum vtenda sepe.

Inter cetera addetur castoreum & turbiti. Sed vt ea magis soluat possunt addi particul. aliquot massæ pilul. sine quibus, aut aurearum, aut consimilium.

Pilulæ communes admixto rhabarb. ad leniter purgandum cibo præsumi possunt. Item pilul. ex rheo & terebinthina. Vide ad finem capitis.

Inter cetera confectio hieræ valet, si palato mulierum non valdè displicuerit. Hic syrupus ad coquendum & purgandum valet.

℞. Betonice m. ij. agripalmæ, nepet. Galiiopseos, parthenij, filipend.
an. m. j. calaminthes hyssopi puleg. cynocranbæ, id est mercurialis syl-
uestris. an. m. j. urticae mortuæ, mercurial. hordei. an. p. j. fructuum
halicacabi, fragorū chamæbati, an. ʒ ij personatæ, siue bardanæ m. j. semi-
nis eiusdem, seminis poeniciæ, seselcos, granorum iuniperi, lithospermatis.
an. ʒ ij. Crithmi, id est, cretæ marinæ, argentinæ, omnium capil. an. m. j.
rosarum pallid. m. ij. passul. integrarum nucleorum mespyli. an. ʒ. s. fiat
decoct. in aqua, in qua incocti fuerint fasciculi duo rad. sarsaparil. per
horas duodecim, addito nodulo ʒ ij. cinnam. adde foliorum senæ ʒ ij.
seminis fœnicul. dulcis. ʒ ij. violarum & florum stœchados. an. m. j.
Adde expressionem ʒ 6. agar. infusi in succo melissæ & vino albo, aut
succo mercurial. cum ʒ j. radicis bist. & nodulo cariophyl. aut nucis
moscata: Item addi potest expressum rhabarb. adde syrup. ros. pallid.
ʒ ij. sacchari buglossati. lib. j. fiat syrupus. vel,

℞. Aquarum betonice, aut potius succorum betonice, melissæ,
urticæ mollis, plantag. mercurial. an. ʒ iiij. succi lupul. ʒ ij. macera agari.
alb. ʒ ij. cinnam & nucis moscata. an. ʒ i s. spica nardi ʒ ij. Adde ex-
pressionem ʒ j. rhabarb. infusi in vino albo, & aqua cardui dissolue sy-
rup. ros. solutini. ʒ ij. oxymel. simpl. ʒ ij. aliquando tantundem mellis
rosati optimi, & cum sacch. fiat syrup.

Valent diacarth. de succo ros. & similia, Nunquam omit-
tentur cardiaea. Quoniam in ista humorum eluue facilè va-
pores summittuntur qui feriunt cor, & inquinant spiritus.

A conditis, opiat, pulueribus non abstinendum.

Maximè verò pulueres valent, & tabellæ.

℞. Pulueris coriandri & fœnicul. dulcis conditi. an. ʒ j pulu. diam-
bræ & letitiæ. an. ʒ j. pulu. ros. cinnam gran. 8. diamarg. frigid. ʒ s.
rasura eb. cornu cerui, & corniculorum cerui an. ʒ j. margar. & frag-
ment. smarag. ʒ j. pulueris lapillorum in capite cancerorum reperiri soli-
torum gran. 8. pulu. rad. angel. & bistorta. an. gran. 12. cum lib. j. sac-
ch. fiat puluis addito puluere lumbricor. terre.

℞. Pulu. radicis dictam. & spica nardi. an. gran. ʒ. diamarg. fri-
gid. diambr. & arom. ros. maioris. an. ʒ s. rad. tormentil. & angeli-
cæ. an. ʒ j. rasurarum solemniū. an. ʒ j. pulu. lumbr. terra præpara-
torum. ʒ s. sacchari dissoluti in aqua cardui infus. cinnam. sufficientem
quantitatem fiant tabellæ. Potest addi corallium utrunque, amtra, mos-
chus, lapis hematites, sphragis, & electa bolus armena. Item rose &
santala.

102 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Si à capite malum est, pilulæ fortiores imperabuntur, & vtetur ea methodo quæ obseruata est in curatione illius mulieris de qua egimus. Capiti enim omnino consultum est ²⁷.

Sed & quod diligenter obseruandum est, alui quædam laxitas & cruditas, immo & imbecillitas longioris illius floris causa est. Itaque & prouidendum maxime, immo à quacunque causa ortum malum, quoniam vel primariò vel secundariò læditur ventriculus, perpetuo prospiciendum ei hac cautione, vt si hepar ineumbens, & viscera calidiora videbuntur, à calidioribus abstineamus.

Itaque litus conuenient ex oleo nardino, mastichino, de spica, de nucemofchata, & consimilia. Item & solennes fots.

Litus autem non solum fiet in parte antica ad sternon, sed in postica ad duodecimam dorsi vertebra, aut circum circa.

His supersedebimus, quoniam vsu nimium teruntur.

Multa ex aliis capitibus de diarrhoea, de fluxu immodico mensium, de imbecillitate ventriculi, & iecoris venari possumus. Reliqua tantum ad rem pertinentia persequemur.

Ergo cum corpus legitimè erit repurgatum, tum ad astringendum concurremus tum sumptis, tum ad motis. ²⁸

℞. Rosarum transmarinarum. m. iij. rad. consolid. maioris. ℥ ij. rad. bistortæ. ℥ j. vrticæ mollis. m. j. pinpinellæ. m. f. Teleph. polygoni, Equiseti. an. m. j. rosarum siccarum m. ij. foliorum salicis, plantag. nymph. an. m. j. lanuginis & florum salicis. an. m. j. pentaphylli rad. cum, foliorum, & florum. an. p. j. balaustiorum, cupulorum gland. sumach. an. ℥ ij. rad. sana munda regal. ℥ f. berberorum. ℥ ij. mumiæ & conseruæ symphyti. an. ℥ f. fiat decoct. ad lib. j. f. dissol. sacch. rosati lib. j. madeat nodulus ex santalis, aut Karabe, aut bolo armena.

Radix bistortæ additur, quia vterum valde roborat. Quædam calida adhibentur, quæ aut facultate occulta sistunt, aut sistetium vires deuehant.

℞. Fumiasinini m. 4. macerentur aqua rosacea, magma rejiciatur, & cum saccharo. fiat syrupus. Cuius admirabilis vis est.

Item syrupus parabitur ex succo rosarum transmarinarum, si potest elici, ex succo vrticæ mollis. succo polygoni, plantag. centinodiæ, & consimilium herbarum cum saccharo rosato.

Item conseruæ symphyti, rosarum addita particula conseruæ rad. acori valent ad idem.

Infinitus numerus est rerum astringentium.

Interea decoctum rad. scynæ, aut sarfepariliæ, vel in pastu, vel extra conueniet. Bonum est prolicere sudores. Stuuæ siue sudatoria sicca quadrabunt: & in eam rem coquentur chamæ. melilo maiorana, pollium mont. chamæd. chamæpith. artemis. betonica, melissa, laurus, ebulus, flores stæchados, & alia id genus.

Postea inungetur corpus inelle eo modo quo & Boethi vxo. rem inunxit. Gal. lib. ad Posthum.

Encathismata, suffitus primum aperientes, deinde astringentes conuenient. Encathisma tale fiet.

℞. Radicis bistortæ, lib. j. rad. symphyti. ʒij. rhois balaust. psidia. an. ʒj. s. florum & foliorum salicis, plantag. an. m. ij. coquantur omnia addendo semina astringentia, vel in aqu. fabrorum, vel ag. extinctionis calculorum, vel potius in lixiuio communi, vel in lixiuio sarmentorum salicis, quercus, aut ficus, addes rosarum magmata, & rad. lapath. acuti. & lib. ij. vini styptici: insidebit in eo decocto non calido.

Conferre plurimum aiunt excipere fumū lixiuij communis etiam vetustioris.

Item conchæ & ostreorum testæ possunt coqui & in cinerem verti, & ita parabitur lixiuium.

Rondeletius hoc probat ad iniiciendum. Tamen non probodaphnoidem seu laureolam, quod ea acrior sit & calidior.

℞. Foliorum clematidis & daphnoid. an. m. j. hederæ. m. ij. fabas integ. m. xx hordei torrefact. leuiter. p. j. ros. rub. p. j. fiat decoct. in vino rub. aqua artemisiæ, & aqu. cisternæ pro iniectione in vterum. Deinde vteritur suffitu.

Placet experientissimis chirurgis inanem esse operam eorum qui per metrenchytem in vterum infundere aliquid conantur. Quod nil subeat corpus ipsius. Tamen quoniam per externas ad collum vteri pertinentes venas humorem fluere demonstrauimus, nos profectum aliquem ab usu iniectionum astringentium expectamus. Valet hic suffitus.

℞. Ladani & carbonis salicis. an. ʒij. electri. ʒij. olibani mastichis. an. ʒj. caryophyll. nucis moschate an. ʒij. benjoin. & stirac. an. gran. s. pulu. rad. bistortæ. & spica. an. ʒj. pul. aliptæ moscate. ʒij. pulueris rosarum, & nucum cypressi. an. ʒss. cum gummi tragacanth. ext. acto in vino albo. aut pauca terebinth. fiant formulæ in carbones iniiciendæ.

℞. Thuris ʒj. carabes ʒij. pulueris nucum cupress. & cubebæ. an. ʒij. crachisc. algal. mosch. ʒij. Zedoar. calam. aromati. an. ʒi. s. pro suffitu ad vterum.

104 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Opiata hæc interea confert.

℞. Conseruæ symph. & ros. an. ℥j. carnem duarum myrob. nucis mosch. condita & cort. an. ℥j. Rob. de rib. ℥ij. pulu. rosarum ℥j. cytoniati ex succo parati. ℥ss. lapid. hemat. aqua ros. lauri, boli arm. terræ sigill. an. ℥ss. pulu. cupul. gland. santalorum & pulueris ossium myrob. lautorum vino albo, & in sartag. siccorum. an. ℥j. spodij ℥j. cum syrup. conf. myrob. fiat opiat.

Pro suffitu plurimum commendant rasuram eboris carbonibus iniectam.

Ad nimias humiditates matricis, & lubricitatem vteri, hæc quoque possunt conferre: ³⁰

℞. Menth. calaminth. nepet. an. m. s. artemis. agripal. an. m. j. piloselle. omnia capill. an. p. i. scariol. cupul. an. p. i. s. seminis pæonie. ℥ss. been alb. ℥i. cort. myrob. citrinarum ℥ij. foliorum scab. p. s. fiat decoct. ad lib. j. dissolue sacch. candi, & rosati. an. quantum suff. fiet syrupus coctus, adde ℥ij. seta in Kermes tincta.

Ad eundem affectum potest & hoc pertinere:

℞. Seminis agnicasti. ℥ij. florum & folior. di. tam. an. p. s. anthos ℥i. quatuor semin. frigida. maiorum. an. ℥i. s. seminis papau. albi. ℥ss. bulliant simul lento igni in aq. hordei contusis seminibus. In Colatura ad lib. j. quæ fiet rursus per cineres sarmentorum dissolu. syrup. de alib. & rosarum siccarum. an. ℥ij. vtatur.

Hæc potio valet initio præsertim si acrimonia sit circum renes & sensus caloris. Et post vsum eius rei dant pilulas ex rheo & terebinthina Veneta ad renes repurgandos. Idem remedium extinguit libidinis ardores.

Cap. 63
lib. 3.

Paulus ~~marcus~~ ^{marcus} ~~apertus~~ ^{apertus} dat, vt dropaces, sinapismos, psilothra, smegmata, & breuiter curationis omnia capita recenset. Emplastrata solennia & vnguenta, vt de pelle arietina, Comitidis, & innumera quæ commodè ad eandem rem concinnari possunt, ex capitibus de immodico fluore menstruorum, de dysenter. & prolapsu intestini venanda.

Item hoc poculum conferet. ℞. plantaginis, portulacæ, berberorum. an. m. i. mumia. ℥ij. rosarum rub. p. j. radicis consolide ℥ij. fiat decoctio in posca dissolue coaguli leporis gram. xxx. saccha. rosati. ℥ss. fiat potus. Repetat sæpè.

Cap. 68
lib. 2.

Dioscorides ad muliebrem profluuium ex aceto valdè commendat, omne coagululum, præsertim leporinum, quod mirum, cum omne coagululum acris & digerentis potentie sit, & desiccatorie.

Gal. 10.
simpl.

catoria. Mirum quomodo acre medicamentum & calidum conferat ad affectum astringi poscentem? De coagulo fortè idem dici potest quod & de vrtica antè demonstratum. Nam facultate quadam recondita hoc contingit.

Pari quoque ratione tartarum ex vino albo quod acre est & detergens præscribitur in eundem scopum: & non abs re fortasse. Vnde primates medici hunc puluerem *ῥῶν* sedare autumarunt.

℞. Lapidis hematitis, boli armene. an. ℥j. carabes, corallij vtriūſque. an. ʒss seminis agni casti. ℥j. anthera. ℥ss. tartari, vini albi præparati. ℥ss. faucium lutei ʒj. terra sigil. ʒss. ambre grisee gran. 12. radicis bistorte. ℥j. cum ʒij. sacch. r. sat. & ʒi. s. diatrag. frig. fiat pulvis.

Anthera compositio est in puluerem redacta & sicca, quæ potius in admouendis esse debet, quàm in assumendis. Constat enim metallicis, quorum vsus tutus non est. Nisi fortè corpora sint duriora, *μεταλλικὰ*: vide apud Gorræum.

In hunc puluerem coniici aptarique potest pulvis coaguli leporis ficcati.

Alia quoque in eam rem institui possunt, sed ea prout occurrent, vel artificio, vel ingenio comparabuntur, ita suo quæque ordine præscribentur¹².

Manardus tractat de tumore vteri, sed nescio quo modo taciè delabitur ad curationem legitimam *ῥῶν γυναικείν*. Fortè illa *Epist. 5. lib. 10.* mulier ita laborabat, sed ob mali fœditatem non exprimit. Ex eo loco præclara multa deriuabuntur.

In iis qui haud magna cum re sunt, neque sumptus superiorum ferre possunt, facilè conuenient post purgationem cum electuario diacarthami, aut de succo, aut alio simili, decocta foliorum mespili in aqua ferrata, additis rosis, & pauco melle¹³.

Ex recentioribus Matthiolus ex Dioscoride colligit nonnulla valdè conferentia ad fluorem muliebrem: inter quæ nonnulla excepta sunt, quorum hic faciunda copia est.

Oleum hyoscyami renibus & pubi illitum confert, præsertim si quis adsit ardor. Eodem pertinet & camphora & succinū vsurpatum in litu cum materia conueniente.

In rosa flos est luteus, hic accipiendus cum extremo illo foliorum quod concolor est quodammodo, pulvis faciendus & potui dandus.

106 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Flores mali punici condiendi sunt: & eorum conditum ieiunæ datur, idque magno profectu. Nuclei dactylorum puluerati potui dabuntur.

Item macerabitur lactuca semen in aqua ferrata, & in aqua illa dissoluetur ebur vstum, propinandum.

Radix caryophyllata in puluerem comminuta potabitur.

Item potentilla puluerata potui dabitur cum corallio, ambra & puluere eboris.

Inter cætera vtrunque corallum siue potu, siue bolo cum cōserua sumptum mirum in modum conferet.

Flores vulgò dictæ herbæ *Passe-velous*, conferunt plurimum.

Item vinum granatorum.

Musculus arborum ventri applicatus dicitur eò conferre.

Exprimeretur succus ex oliua syluestri, & pudendo illinetur.

Grana sumach. pota proficient, & nucleis granatorum puluerisati. Poma cytonia incoquantur in vino styptico, & eo decocto partes fouebuntur.

Folia caudæ equinæ aqua incoques, & propinabis.

Mentha supposita conferre narratur.

Inter cætera anisum bibitum plurimum prodest, & decoctum symphyti petræi. Aliorum remediorum in idem congruentium sylua est apud Matthiolum in syntaxi in Dioscoridem.

Quæstio esse possit an non cauteria brachiis adhibita conferre possint. Nam ea commodè adhiberi posse videntur.

Pauperioribus syrupus magistralis parari potest, ex agar. folliculis addito succo mercurialis: & loco sacchari misceri potest mel rosatum si modo ingratus nimium syrup. non sit.

Inter cætera remedia commendant istud facile paratu. Accipitur ebur, puluerisatur tenuissimè in lapide porphyreo, propinatur ex aqua chalybeata in qua semen lactucæ maceratum fuerit donec relinquat mucorem quendam: & iste mucor vnà ebibitur.

Apud Hippocratem summum remedium celebratur ad ^{τὸν ἰσθμὸν} ~~τὸν ἰσθμὸν~~ ebur vstum magna quantitate datum. Potest addi saccharum rosatum. Siccat impensè.

Et quoniam impuritas magna venosi generis & mesenterij, præsertim verò hepatis venarum fouet ^{ἴσθμῳ} ~~ἴσθμῳ~~ muliebrem, postquā colluies expurgata erit ad robur partibus conciliandum, ad ge-

nus venosum purgandum conferet decoctum sequens.

℞. Radicis cichoreæ benè mundatæ, ℥ iij. rad. enulæ³⁷ campanæ ℥ j. pimpinellæ p. j. maccrentur & bulliant in lib. iv. aquæ adden. sub finem absinthij romani p. ij. aromatizetur totum paruo cinnamomo & dulcoretur: capiat quotidie mane ℥ 6. in aurora. addi potest parum vini albi in singulas doses. Item lignum sanctum.

℞. Mastiches emplastr. contraruptur. & vnguen. comitissæ, an. ℥ iij. rosarum puluer. & pulueris majoranæ an. ℥ i s. trochiscorum de gallia moschata ℥ s. cum ladano soluto in vino albo, & terebinthina; fiat magdaleon extendendum super alutam & applicandum regioni lumborum.

ANNOTATIONES.

1. Hipp. lib. 1. de mul. morbis docet cur mulierum morbi ferè immedi-
cabiles existant. Verentur, ait, narrare morbos etiam si sciant: & pre
imperitia ac ignorantia turpe id sibi esse putant. Sed & medici simul
peccant nō exactè causam morbi percunctantes, sed velut viriles morbos
sanantes. Multum enim differt morborum muliebrium ac viriliū curatio.
2. Tamen capillo est valde nigro. An propterea calidior est tem-
peries nequaquam.
3. Ad tractatum de fœ id pertinet ex 2. Epid. Abscessus aut per ve-
nas, per aluum, neruos & spinalem medullam, per ossa fiunt.
ἢ καὶ τὰς ἀλλὰς ἐκ τοῦ αἵματος, ut uterum, os, pudendum, nares, aures.
4. Sunt quibus non probatur ut menses seu laudabiles, seu illaudabiles
flores dicantur, sed potius fluores. Tamen Hipp. politico loquendi mo-
do lib. 2. de morb. mulierum vocat τὰ κατὰ φύσιν ἀδελφὰν florere.
5. Narrat Fernelius cap. 16. lib. 6. παθολογ. de muliere qua licet men-
struam purgationem nunquam esset experta, incolumis vixit.
6. Sunt enim corpora quibus etiam sanis sanguis aliquo qualitatis se-
cundæ excessu vitiosus est, unde acrior, aut nitrosior est.
7. Sic istum sanguinem effæminare quodammodo oporteret, ut κατὰ φύ-
σιν fieret. Vnde quibusdam mulieribus appetit potius partes superiores,
& rubent valde genæ, & peripneumoniis sunt obnoxie. Et miran-
tur medici cur tales menstrua non fiant.
8. Paulo antè docuimus innocuè suppressi aliquando sanguinem men-
struum. Hipp. narrat de muliere cui per annos quatuor suppresserant
menses, & peperit filiam, partu vitali, eamque nono mense, sed vnum
notandum. Nam puella vulcus habebat in coxa, longior suppressio mensis
huius rei causa fuit.

9. Probabiliorē meī τὴν ἀπορίαν, opinionem & veriorē adduximus in sequentibus paginis.

10. Fluor multetris λευκῆς, nomine potius quam λευκός donandus est. Multas his in regionibus mulieres affligit, potissimūque albæ, & quibus laevis admodum, æqualis & visu iucunda superficies inest, cuius rei ratio hæc est, quod iis cutis sit adstricta, excrementisque fuliginosis minimè peruia: tū quod delicatioris molliorisque sint habitudinis, eoque in morbosas affectiones proclivioris. Accedit quod sint aqueosæ magis & effeminate quas ὁδὸν ταύρος vocat Hipp. Vnde excrementorum molestam vim non facile depellunt, fluxionibus sunt obnoxie partēq; principes quodammodo aqueas, laxas, vliginosas putredinēque minimè obstantes habent.

11. Locus est præclarus apud Gal. Com. in eum Aphorif. in quo disputat de alatis ubi docet pityriam in vitio ipsius capitis contingere.

12. Apud Hipp. sect. 2. lib. 2. Ep. est historia memorabilis cuiusdam mulieris, quæ cum duas filias peperisset idque agere & non benè purgata esset, toto corpore intumuit, deinde profluviū sanguinis semestri fuit, ab eo secuta est toto reliquo tempore albicans excretio. Quomodo id contigit. Stæua reuocat id ad vlcus aliquod in utero conceptum ut facta fuerit suppuratio. Aliquando tamen rubra fuit excretio. An id sit verum vide.

13. Videmus multas mulieres excernere urinas in quarum fundo verè est materia p̄s πυαυρία, sed tamen non per uterum talis materia fluit, sed per vesicam ut uxori viri nobilis cuiusdam contigit.

14. Nisi dicamus apparente menstruo venas, immo & uterū turgescere, & sic ista aggressione natura quæ aliquid criticam est naturale, cessat, aut saltem inducias dat fluor muliebris qui symptomaticus est toto genere. Deinde cum illa motio & inclinatio naturalis cessauit statotempore, tunc symptomatica excretio repetit. Ut facultatis expultricis & secreticis vis appareat. Argumento, id est, quod mulieribus ob id intercurrentibus post longam corporis extenuationem, mixtim promiscuèq; & ea illauis, & sanguis excernatur, natura iam euersa, & facultatibus eius dissipatis ac profligatis.

15. Quemadmodum plerique etiam satis sicci, sunt catarrhosi, & iis multanat pituita, ventriculus, & os humescit, quoniam eliquescit cerebrum, & facultate retinendi non pollet, ita pleræque mulieres sunt iocundæ, quia habitus corporis, & cerebrum ipsum liquefit. Vnde macrescunt atque contabescunt. Credo quod in iis naturam corroborare, est τῷ πρὸς πυαυρίαν occasionem proripere.

16. Notandum valde quod ait senioribus fluor est albicantior, iunioribus *ἡ ἰσχυρὸς*, & *ὑψηλὸς*. Quia reuera quidā *ἰσχυρὸς* est sanguineus: & cauendū ne decipiamur existimemusque idem esse cum menstruo. Nā nec per easdem venas fit, nec eodē modo. Vnde Rondeletius cap. de fluore muliebri annotat *ἡ ἰσχυρὸς* sanguineum fluore & *ἡ ἰσχυρὸς* videri in grauidis mulieribus aliquādo, & iis quibus suppressi sunt menses. Nam pro legitimis mensibus iste fluor sanguineus serosus supponitur. Qui verē fluor est, non menstruum.
17. Hinc Hippo. ait lib. 1. *γυναι.* Cum acetabula sunt plena pituita menses sunt pauciores, quod defluit mucosum & viscosum est, & in mē- sibus cum purgari desierit per duos aut tres dies muci ex uteris prodeunt, & horror tenet, &c.
18. Quibus renes sunt purulenti per inassuetas vias in uterinas partes humor fluit *ἢ* prouocaturus.
19. Prasertim si vlcus: nam si sola acetabula plena sunt, muco non est necesse.
20. Prasertim si humiditas sit cum frigiditate nam si cum calore, fluxu temporis facile dissiparetur aut saltem corrigeretur.
21. Ex morbo humidior, dicitur ut cum quis insolatur, & liquefcit corpus unde coryza & similia. Tandem enim id corrigitur, & non in tam multos producit dies ut humiditas à natura.
22. In eo numero senes esse possunt. Iis corpus siccum esse dicitur. Et tamen quanta excrementi & muci, & pituitae copia? Sic aliud est excrementis siccum, aliud ipso habitu. Est ubi facultas partium re- tentrix imbecilla est, vel expultrix qualitate & acrimonia humorum iri- tata. Sic fluctio multiplex. Gal. Com. ad Aphor. 13. lib. 3. tusses, dolores capitis, grauedines & similes affectiones repleti capitis sympto- mata esse ait: ubi male legitur nomen, *ὑσώματα* pro *συμπύματα*.
23. Omittitur pars vna. Symptoma enim omne capitis aut est, *παραρ- ρεῖον*, *καταρρεῖον*, *καταρροϊκόν*, aut *καταληκτικόν*.
24. Litus ventriculi ex ol. nardino in leipothymis bonus.
25. Vires habet opinione maiores betonica, unde natum Italorum pro- uerbum, Tu plus potes quam ipsa betonica, ad nullum non usum potest apiari, uterum purgat, corroborat, conceptum retinet, utilis est pragnan- tibus quibus alba sordidaque illunies ex utero manat, menses ciet, iecur & cerebrum expurgat pulm. onicis & calculosis utilis est, podagricos do- lores leuat, dolorēque dentium demulcet aduersus toxica & morsus ve- nenatos valet, simul abluit maligna vlcera & curat, ad pestem mirifica est, huius flores & betonica attilis (vtrumque idem est) condiuntur, fit conserua utilissima contra pestem.

26.

27.

28.

20.

31.

32

33.

6666

9410
22

HISTORIA TERTIA.

NOBILI Viro vulnus infligitur transuersim paulo supra articulum manus. Tendines desecantur. Vulnus magnum, propterea suturis indigebat sed hiantibus, quò puri ac saniei via pateret. Nullum commemorabile accidens, ut narrant chirurgi, visum est. Sanescebat in dies: aut nulla aut perexigua febris. Audio tamen eum perpetuò sitiisse. Cacochymus erat valde, calido & sicco hepate, vino deditissimus. Citricem contrahit malum ad diem x. Nocte sequente febris insignis, ἀλυσμοί, proiectiones membrorum, deliria, insomnia, oculis apertis dormiebat, tertio post die delirus, palpsans, tremulus, ac parum conuulsus moritur.

COMMENTARIVS.

HÆC nos Historia accuratos & sedulos esse iubet, ut in omnibus vulneribus, sed in neruorum partium, & articulorum, & articulis propinquare præsertim omnia tutissimeamus. Quinetiam sanitas & curatio repentina omnis suspecta esse debet, ut magis vereri debeamus si vulnus expers & tumoris, & puris sit, quam si particeps.

112 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Et non tam citò ad inducendam cicatricem adduci debemus, vt ichor & virus latens exitum habeat. Ac primùm Hippo. docet *Li. 2. de* homines ab omnis generis vulneribus interire, quo magis nos *Protrb.* gnauos esse oportet, vt vulnera partium momentaneorum omnia suspecta habeamus: vt licet specie ipsa & primo obtutu exigua videantur, tamen in recessu aliquid magnum & suspiciendum habeant.

TEX-
TVS. *Suturis indigebat.*

Sutura fortè suspecta esse potuerunt, quod si pars hiauisset, nec tam citò, nec tam periculosè cicatrix contracta fuisset. Propterea aliquando satius est cum deformitatis metu aliquo, relicto vulnere aperto & hianteliberum egressum saniei relinquere, & sic securitatem parti conciliare. Propterea in paribus casibus rem diligentius pensitabimus.

Nullum accidens commemorabile, vt narrabant, nulla aut exigua febris, eum sitiisse dicebant.

Ad var. Galenus prudens medicus, nec more quorundam, qui vt *17. feb.* amicis & ægris gratulentur, morbos minuere solent, rem parui *2. lib. 1.* faciens, narrat latere in nobis humores æquantes sua cacoethia *Protrb.* quoduis venenum. Et citat historiam cuiusdam qui cum quarto die febricitans leuiter urinam tenuem, sed nigram reddidisset, reliquos dies edens & lauans præteriiisset sanus, septimo verò die cum vespere febrile cœpisset, tabefactus interiit. Sic non facile credo istis chirurgis qui cum febrile non asseuerarent. Latebat enim fortè febris, nec eo modo sese efferebat, quo & æstate. Autumni enim erat finis. At quæ febres tunc vagabantur eiusmodi erant, vt ferè in solo capite calor esset, in extremis partibus calor mediocris percipiebatur. Per sex menses integros tempus seu constitutio fuerat *Initio* *lib. 7.* *Epist.* *αὐχμὸς ἴσος.* Et tales erant febres quales descripsit Hippo. cum ait, febres erant *in mai.* & in temporibus ferè solùm calor percipiebatur, vt febris quodammodo esset capitalis, tamen in toto imo corpore empyreumate remanente. Itaque sitis quæ aderat, satis demonstrabat incendium latens. Quanquam verum illud Hippo. Interdum nec febricitat, nec inflammatur fauciat; aliquando citra causam febrile.

febricitat, & aliqua corporis pars inflamatur. Sic in agro ^{αγρο} *αγρο*, nō est obseruatū, sed ^{απενεμενον} *απενεμενον* repentinam mortē intulit.

Rursum quod nullum commemorabile accidens adesset, id est, nec inflammatio, nec tumor, nec quid simile, immō nec dolor, id imperitus chirurgus in bonis ducit. Attalia bona suspecta sunt, & quæ sine ratione alleuant, sæpè tandem terrere solent. Ideo quæstio esse potest, an tutò hodie, vt aliquid semper præstare videantur, tumorem qui adest citò discutiunt chirurgi. Videtur id non tutò fieri, intercipere quidem cursum affluentis humoris, ne pars quidem læsa fauciaque affligatur magis optimum quidem est: omni ratione circumscriptum tumorem, quem parit sanies & virus ab vlcere manans, conari digerere & resoluerē, non ita tutum est. In Aphorismis enim Hippocrates. *Quibus tumores in vlceribus apparent, non conuelluntur maxime neque insanunt. His euanescentibus de repente, quibusdam conuulsiones & distensiones à tergo fiunt, quibusdam autē inania, vel dolor lateris acutus, &c.* Et notanda loquendi forma, quibus tumores ^{φαίνονται} *φαίνονται*: deinde, his euanescentibus de repente: nam quis dicat, an necesse est adesse tumores ad securitatem? Reuera si fortè adsunt, tutior res est. Sed adesse possunt ob affluxum materiei antecedentis, quæ per se & generatione bona est, quod si illa materia tumorem faciat, & statim resuat, non ita metus mali est. Sed si tumor fit ob materiam coniunctam, potè corrupto ob vlcus alimento partis, aut veluti quodam statu orgasmum faciente, maligno quidem, & partem tumefaciente, non est dubium qui ^{παλινδερμι} *παλινδερμι*, & euanescentia subita illius tumoris exitialis sit. Quod enim ibi continetur ^{κακόνδεσ} *κακόνδεσ* est. Itaque cum dicit, ^{αφανίζονται καί φησι} *αφανίζονται καί φησι*, hoc cum habet sensum: Si ita eueniat vt tumor affit, natura à centro vlcis ad circumferētiā venenum pellente vt incumbat in curationem, fatius est enim tumorem ad tempus quoddam manere, quàm ^{αφανίζονται καί φησι} *αφανίζονται καί φησι*. Vbi vis statuetur in dictione *καί φησι*, orgasmum enim significat. Omnis autem malus, quia partes sæpè nobiles infestantur. Sic audire oportet tumorem non tam ob aliquam laudabilem materiā quæ affluit, quam ob reiectum quoddam virus à parte faucia in partes vicinas. Quanquam fit vt exiguo tempore allatus sanguis ad partem fauciam, auxiliij ergò, etiam laudabilis inquinetur & corrumpatur, contagione ipsius fauciatæ partis. Galenus in Comm. clariùs docet dum

114 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ait: Quibus tumores vlceribus *ἐμπίπτει*, superueniunt, per augmentum causæ morbificæ, ita enim τὸ ἐμπίπτειν³ sumitur, non conuelluntur: vt earatione bonum sit tumorem apparere, & non venenum in alias parteis irreperē. Cæterum ait tumorem euanescentem id non afferre, nisi aut insignis sit magnitudo, aut Cacoethia. Tandem concludo, quemadmodum è re ægrorum est, si tumores adsunt, non statim euanescere, ita quoque confert aliquando tumores apparere, vt conuulsioni præcipiatur occasio, veneno subtus cuniculos agente, præsertim si quid in vlcere, aut circum illud est quod foras exitum petat. Accredo huic iuueni è re fuisse si tumor satis insignis apparuisset venenum vlceris concludens.

2. *Prærr.*

Sed & huc pertinet dictum Hipp. *Commodat corruptio nervi, aut ossis, aut amborum, tum in profundis, tum in nigris putredinibus.* Nam in putredinibus pus multum fluit, & putredines soluit. Et paulò post, *Conducit in doloribus etiam inflammationes ex vlceribus accedere, in sanguinis eruptionibus pus in ventis apparere*⁴. Quasi dicat Hippo. tumorem, aut inflammationes circum partes affectas enascentes signum esse virtutis validæ, & naturæ sedementis & quodammodo defœcantis. Sic maior inde securitas. Notanter autem adiecit, in doloribus. Nam paulò ante loquens de capitis vulneribus ait bonum esse si nec febris adsit, nec dolor, nec inflammatio. Si autem adsint, ait bonum esse si adsint initio, & pauco tempore. Initio dixit, vt morus aliquis naturæ significetur quem statim ipsa comprimat. Nam ait malum esse si 4. die aut 7. accesserit. Cætera persequamur.

Cacochymus erat.

Corporis præparatio plurimum attulit ad generationem tam subitorum symptomatum. Minimis enim momentis excitantur morbi etiam cum lethalibus signis statim initio. Quod & in prima huius libri historia demonstratum est.

Nocte sequente, &c.

Tria hoc loco annotanda sunt: primum quod tum demum paruit febris cum vulnus sanescebat, immo cum nil curandum restabat, quod denotat nō tam à corpore lethalem hunc casum.

aduenisse, quàm à clauso vulnere, & omnis symptomatis ex-
 perte. Secundo mentio fit febris ad diem vndecimum quæ pri-
 mo quoque tempore tam sæuis comitata erat symptomatis.
 Tertio mentio fit non solum alterationis in cerebro, sed & alie-
 nationis: vt paulò post docebitur. Quod ad primùm & secun-
 dum attinet, id quod tam subiti erat causa interitus fuit vene-
 num tum prius in corpore latens, tum à vulnere. Hippocrates
 in explicandis vulneribus capitis videtur id expressisse dum ait,
In vulneribus capitis confert non adesse febrem, nisi initio & modico Lib. 2.
tempore: At incipere 4 aut sept. aut vndecima valde lethale. Caterum Prorrh.
si in principis febrium, seu delirium accesserit, seu alicuius membri si-
deratio, periturum hominem sciendum est, si non omnino ex optimis
signis aliquod adsit, aut vires absint. Quæ propositio tum vniuer-
 saliter de omnibus morbis audiri potest, tum de vulneribus par-
 ticulariter. Et Hipp. illo loco ad vulnera capitis accommodat.
 Reuera omnino hoc suspectum est. Vnde Gal. miratur valde 3. Epid.
 cur quidam factus sit phreniticus primo quoque teinpore.

Tertium restat. Iactabatur, delirabat, tremebat, deinde ta-
 citurnus palpabat. Reuera pathognomonica erant phrenitidis
 multa, febris vehementissima, delirium assiduum, indecora cor-
 poris compositio, custodibus perpetuò egebat, insultabat, &
 multa erant confimilia. Galen. omnia signa propria accuratè
 describit, *περὶ ἀλυσ* alio loco dicitur. Tremoris causas aut infir-
 mitatem magnam assignat Galen. aut affectum animi, aut co-
 piam & onus, vide absolutissimam disputationem in historia de
 Pythione. Caterum cum tam vehementes motus habebat
 laterabatur cerebrum, cum factus est tremulus, & conuulsio-
 culas habebat: item erat *ληλαφός*, iam alienatio erat in cerebro,
 & velut hectica diathesis, vt plenius intelligere licet ex Comm.
 Prorrh.



HISTORIA QVARTA.

NOBILIS virgo Delphinus annos nata
 18. ferè hirsuta, μελανοτριξ καὶ μελανοφθαλ-
 μος, habitu & gestu satis melancholico,
 utròque sata parente magnis & calidis
 visceribus pradito, mense Martio corripitur febre con-
 tinua. Noctu & vesperi exacerbabatur. Interdum
 ἀπύρετος ferè erat. Paroxysmum medicus non ani-
 maduertebat, sic intempestivè cœnata est, & pota.
 Progresso morbo naturâ sanguinem defœcare conanti,
 aut crisi in aggressura, è naribus sanguis prodit, & ad
 id temporis menses qui illi non benè respondebant, sese
 aperiunt. Male consultus medicus, & falsò hemor-
 rhagia inductus venam in gibbero ferit. Menstruum
 resistit. Caput tum dolet magis: perturbatur, rapitur
 materia sursum, aut in cerebro commouetur. Dubi-
 tabamus an à liene suscitaretur. Sed, quod iniquius
 multò fuit, dum somnum arte conciliant, papave-
 rum capita aqua incoquunt. Decocto vinum dilui-
 tur. Datur potui in cœna. Dum placidus somnus
 expectatur, perturbatur, desipit, lecto exilit & me-
 dia area salit, sibi lesum caput ac quodammodo per-
 versum queritur, ad æquitatem non adducitur, quic-

quam non veretur, absurda & loquitur & facit. Aliis hoc phreniticon videtur, aliis potius melancholicum, alij furorem utri id resipere autumant, alij ^{oportida} morbum Hippo. alij veterum Catubuth esse sibi persuadent. Aliquando ad se redibat: nunquam placide dormiebat, refractaria omnino erat, cum tamen ea bonis & moderatis moribus imbuta foret. Cum quiescere malum videretur, æstus in capite percipiebatur, venæ in temporibus pulsabant, febris solum caput adoriri videbatur, nil tale in cætero corpore apparebat: Pulsus tardus, aliquando frequens, sed qualis in melancholicis est. Paroxysmus redibat. Aculeis sibi pungi caput & corpus narrabat: iactabatur, Perseuerabat ad tres menses malum. Tandem cum ex alto cecidisset, & in pedis articulo lesa fuisset, leuius malum visum est. Tamen non nisi longo post tempore planè est restituta. Malum omnem auxiliorum applicationem eludebat. Relicta sine remediis promptius conualuit. Satis lubrica sanitate fuerat. Duobus antè annis dysenteria crudelissima fuerat occupata. Verebatur de sphacelismo cerebri. Nil tamen tale euenit. Audio illud totum familie.

Σοφρενός.

COMMENTARIVS.

NEMO vnquam credidisset tantas ab eo morbo exci-
tari posse tragœdias, nec infœlicem adeo euentum
fore, cum nil in fronte promitteret quod tanti esse de-
beret. Ac reuera idẽ morbis euenit, quod & nascenti-
bus herbis. Hæ enim non nisi à peritissimo rei herbariæ
agnoscuntur orientes, florentes & adultas quiuus idiota inter-
noscit. Morborum mores, ingenium, vim & momenta, præ-
sertim dum nascuntur, non nisi medendi peritus animaduertit,
natos vero & progressos omnes penè nouere. Atque in huius
virginis historia pertractāda, primũ ac præcipuum caput est
de ea τῆς διαβολῆς alienatione, nimirum in specie morbi inquiren-
da, causis, an suppressio mensium id fecerit, an papaueris hau-
stus, an vi febris alicuius, an alia ratione, quoniam id tam re-
pentẽ, & præter omnium opinionem euenit.

TEX-
TVS.

Hirsuta, μελανότριξ, μελανόφθαλμος.

Cum vtroque nata sit parente viscera præcalida habente, &
præsertim patre squalido, piloso, hirsuto, mirũ ne sit si corpus ad
succum melancholicum generandum idoneum nacta fuerit. Et
cum mulier sit, ideoque corpus habeat ἄπνῃ, & δυσδιαφορίῃ, sup-
pressio excrementi non ἀτμώδης, sed fuliginosi & nebulosi non
potest non eam in aduersam valetudinem faciliẽ adducere. Por-
rò nigrities capilli & oculi an temperamentum melancholicũ,
& corpus calidius indicat? nequaquam. Ita enim Gal. *Glabros*
& qui cute sunt albida, qui capillis rectis & nigris, item nigris oculis,
& qui otio degunt, ἢ minus digerunt quod frigidiore sunt temperamento.
Contra tamen alio loco, *Calidior & siccior hispidior est.* Ni-
grum quoque capillum habet. Et vt paraphrastes annotat, niger
capillus fit cum deũsto vi caloris vapore, excrementum in ex-
quisitam fuliginem mutatur. Quod maximè in calido & sicco
temperamento contingit, vt in quo sanguis vritur. Et vt res
breui explicetur, dicimus nigritiẽ capillis comparari bifariam,
per adustionem, & per ὑπόχρῃν, id est suffusionem. Adustio in

calidis & siccis visitur, & propriè qui nigro sunt capillo, calidiores temperamento dicuntur: suffusio verò fit in iis quibus densa est cutis. Excrementum enim in spiraculis morans tingit & inficit. Et eo modo quidam glabri & frigido temperamento præditi nigro esse capillo possunt, non vi adustionis, sed ob suffusionem vi suppressionis commissam. Quo in sensu in illa constitutione quam describit Hippoc. duo genera corporum maximè & febre ardente sunt implicita, & phrenitide, nempe adulescentum, iuuenum & adutorum, vt qui calidissimi sint, & facile ad eos morbos propendeant. Item corpora mulierum & glabra, & nigro oculo, nigroque capillo prædita. Hoc autem fit ob spiraculorum obstructionem. Sic priora corpora per se, & propria generatione in tales morbos incidebant, posteriora, ex euentu, nimirum ob obturationem meatuum. Quæ omnia ad virginis, de qua hoc loco, historiam pertinent. Nam vt absoluiam, quantum obseruare potuimus ex vrinis & deiectionibus, internum corpus abundat calore acri & squalido, & cum mulier sit tum peculiari natura, tum vniuersali mulierum conditione, cutim astrictam habet: vt non mirum sit, si facile de sanitatis statione deiiciatur, & si crudelissimis morbis afflicta fuerit, vt sub finem historię scriptum est.

Mense Martio corripitur febre continua.

Antequam de prima aggressione morbi dicimus, ad disputationem de hirsutis hoc addemus, Balbus, caluus, gracili voce præditus, hirsutus patiuntur ταυρασχηλια: quod absurdum videtur. Sed hoc non eodem modo in omnibus audiendum. Nam hirsuti atrabiliarios morbos propriè experiuntur τὴν γενέσιν, tum quod atram bilem generent, tum quod bilis facile conuertatur in atrabiliarium succum: Calui, blæsi, ἰχθυόσσωροι, vel tantum ob suppressionem, vel ob pituitæ tantum excessum. In his abundat enim pituita, vel dicemus in hirsutis ταυρασχηλια vigere ob impressionem malæ qualitatis, in balbis verò ob crassamentum cuiusdam materiæ quæ nata est, linguæ ἀνδροπικίαν inducere opinione Hippo. Cæterum meminimus mensis Marti quo tempore sunt humorum fusiones, & tunc morbi à repletionem nascuntur per humorum liquationem quandam. Quod Gal. amplissimè demonstrauit Com. in Apho. & nos ipsi demon-

Seet. 5.
lib. 2.
Epid.

Aph. 40.
lib. 7.

113 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Com. ad strauimus in prima quæ hic tractata est historia. Sed quod
 Aph. 15. veriparens morborum dicatur, id sit ex euentu. Veri enim non
 lib. 1. tribuitur, vt tempori salubri morborum *χέρει*, sed *παρ' ἐξουσίας*.
 8. Ap.
 17. eius
 lib.

Nocte & vespere exacerbabatur.

Part. 6. Maior pars febrium *πυρεθῶν* quasdam habet exacerbationes, &
 sect. 3. ingrauescentias certis quibusdam temporibus. Aliæ noctu, aliæ
 lib. 1. interdiu exasperantur & ingrauescunt. Et hoc loco non alie-
 Epid. num erit tractare comparationem quam statuit Hippo. Inter
 febrem diurnam & nocturnam. Ita scribit: *Nocturna non ad-*

modum lethalis, longa tamen est, diurna longior. Sunt quibus ad talem,
 Illò verò loco non tam de continuis, quàm de iis quæ aut re-
 missionem, aut intermissionem habent, loquitur Hippo-
 crates. Ante enim dixerat quasdam febres diu inter-
 mittere, quasdam noctu, & quæ ad integritatem diu non

Part. 2. desinunt *πυρετοὶ*, dicuntur *μεινυμέναι*, siue *καθ' ἡμέρας*: quæ desinunt
 sect. 3. *ἀμεινυμέναι*. Dicuntur arguta potius quàm vera appellatione.
 lib. 1. Gal. in Com. docet febrem quæ interdiu intermittit, noctu ve-
 Epid. rò viget minùs malam esse ea quæ diu viget. Quod tamen fal-

Noctur-
na febris
diurna
febre
melior.
 sum videtur. Nam, ait, ea quæ diu affligit, duabus de causis de-
 terior est, tum quod malum sit cutim constringi eo tempore
 quo laxari debet. At si viget interdiu, eo tempore cutis densa-
 tur: Secundum naturam tamen corpora apertiora sunt die quàm
 nocte. Secunda ratio: Cum affligit diu, & intermittit noctu,
 incommodum tempus ad curandum, nam cogimur noctu dare
 medicamenta ægris & sic prohibentur somno. Itaque Vesper-
 tilionum vitam agunt ægri: defectuque somni quem ducere
 commodè nequeunt nec diu, nec noctu, contabescunt[†]. Ta-
 men cum nocturnæ febres à pituita potius esse videantur, lon-
 giores sunt meo iudicio. Sic controuersum est valdè vtra sit
 deterior an nocturna, an diurna.

Intempestiuè cœnata est, & pota.

Non abs re toties decantat illud Hippoc. in paroxysmis nil
 dare oportet. Ideo paroxysmos cuiusque morbi tenendos mo-
 net, vt cibationis occasio anteuertatur. Et sufficet tantum hoc
 loco ea adducere quæ Hippo. tam diligenter inculcauit: *Noctes*
quibus

quibus in morbis sorbitiones non conferunt. Nam si dantur, nec lo-
co, exacerbantur febres & dolores, & patet quod sumptum alimentum
morbo dat incrementum, corpori verò tabes & infirmitas existit: Et paulò
post, Sanorum dieta (supple non legitime instituta) aegris est nocen-
tior quam sit ferarum dieta sanis. Porro duo sunt loci val-
dè notandi apud Hippocratem ex quibus cognoscas quan-
tùm afferat detrimenti intempestiuus cibus & potus in mor-
bis: Prior est hic cum loquitur de mulieribus implicitis fe-
bre continua ob suppressionem, virginibus menses euenerunt,
& nulla mortua est. Nam Philonis filia, cum ei sanguis copiosè
è naribus effluxisset, septimo die intempestiuus cœnata defun-
cta est. Si ergo intempestiua cœna, etiam iam morbo crisi
minuto, vt par erat, per hæmorrhagiam, tam nocuit, vide quid
aliis sit allatura. Alter locus est de quodam qui cum incalcesce-
ret tantum, intempestiuè cœnatus est, vt morbus qui leuis sua
natura foret, eo errore commissio lethalis extiterit, vt in Com.
Galen. demonstrat.

Par. 79.
sect. 2.
lib. 1.
Epid.

Historia
antepe-
nultima
lib. 2.
Epid.
sect. 3.

*Sanguis è naribus, & menses non benè respon-
dentes apparere incipiebant.*

Hæmorrhagiæ, *ἡμωρραγία*, vrinæ & alui fluores, *ἀποσκήματα*, pa-
rotides inter ea quæ indicant censerì solent à Gal. & Hippo.
Galenus quidem hoc docuit in Prorrh. & Hippoc. in Epid. do-
cet salubriter & menses erupisse, & sanguinem è naribus ad de-
pellendas ardentes febres. Et alio loco contra quorundam neo-
tericorum opinionem qui in ardentibus febribus hæmorrha-
gias vituperant, docet synceris febribus ardētibus si quid aliud,
hæmorrhagias per nares ad depulsionem morbi quadrare. Cur
autem id fiat aperiit. Ideo cum huic puellæ natura vt pote san-
guinem repurgatura vellet aliquid & per vterum, & per nares
moliri, non erat temerè ab instituto reuocanda. Nam cum
semel instituit aliquid excludere, maximè qualitate si peccaue-
rit, id facere prohibita, magnopere læditur. Declarant absces-
sus illi nocui & partes corrumpentes. Si enim per vnā par-
tem excernere prohibetur, aliam molitur. Caterum abs re
foret hic recensere ea incōmoda quæ vna mensium suppressio
inuchit, cum & alio opere seorsim de his egerimus, & Hippo.
librum integrum ea de re conscripserit, in quo singula verba

Par. 24.
sect. 2.
lib. 1.
Par. 79.
sect. 2.
lib. 1.
Epid.

Ad part.
9 sect. 1.
lib. 1.
Epid.

Lib. de
virginū
morbis.

Tomus II.

Q

Hæmorrhagia inductus medicus venam ferit.

Magno errore tenetur maior Medicorum pars, quæ vt nil non agere videatur, existimat se parum proficere ægris, si non quicquam præscripserit, aut propinarit, aut secuerit. Et tum temeraria hæc medendi methodus per manus tradita ad iuniores transfertur, magna ægrotantium clade medicina administratur. Et in hoc errant grauiter. Nam si induxerint in annum venam referare, & id cunctanter faciunt, si guttula sanguinis enare fluat, tunc quasi trophæum reportantes clamant oblatam legitimæ phlebotomiæ occasionem.⁶ Si luculenta sit hæmorrhagia, audacius secant, quia naturam copia grauari asserunt: si infra modum & pigro lapsu sanguis fluat, compensandum istū defectum a pertione venæ contendunt. Iam paulò ante docuimus inscianter eos agere qui hæmorrhagias criticas quamprimū sistunt. At nos contra fluente sanguine nil agendum contendimus: quandoquidem veterum decreto statutum est hæmorrhagiis solui febres ardentes. Et quod de excretionepernares dicimus, idem de vterina purgatione audiendum. Quò pertinebit historia de vxore Cleomenis, hæc pleuritica erat, quarto die copiosi menses fluxerunt, dolor lateris, & sputa omnia cessauerunt. Sed tanta fuit vis *καταρροίας*, vt de repente manante per vterum sanguine pleuritis cessauerit, numquid commoda est ea euacuatio in febribus? Quod si minor sit quam par sit, arte iuuetur ac incitetur. Et Hipp. in febribus horrores, labores, dolores, colli molestiæ mensis proritant. Sic tametsi ea vrgeant symptomata, si eruptionis menstruæ spes est aliqua, in illa consistet salus. Itaque omnium imperitissimè fecit medicus qui hæmorrhagiam repressit, vt non mirum sit, si tam dirocorum malorum generationi occasionem dederit.

Perturbatur, rapitur, commonetur.

Adpari. Aliud est apud Hippo. *περὶ τὴν ψυχὴν*, aliud *περὶ τὴν σφύρα*. Nam *περὶ τὴν ψυχὴν* dicuntur qui non insigniter turbantur, quod menteleuiter offensa euenit. Adaucta verò læsione, non iam *περὶ τὴν ψυχὴν*, sed *περὶ τὴν σφύρα* dicuntur⁷. Sic *περὶ τὴν σφύρα* via est, & præmunio ad

μεγέθυνσις 8. Rápitur, supple, humor à partibus inferis ad superas, & ibi tumultuatur, & mutationem quandam recipit. Idem enim humor in cerebro coercitus dum ibi moram trahit, alius humoris aliam naturam adsciscit. Nequit enim diu immutabilis in cerebro manere. Quod autem diximus commoueri in cerebro humorem ad illius perturbationis generationem, id ex Hippoc. patet, qui ad generationem morborum capitis vult vt commoueatur humor: Immo alio loco ait, Desipit homo cum bilis in capite commota fluxerit. In alio loco dixerat, cum bilis commota fuerit, suppl. in corpore, *καὶ ἐπερὶ καὶ ἐς κεφαλὴν κατὰς ἡ.* Sed libro de morbis *κίνησις*, in capitis & cerebri corpore animaduertit. Quod bifariam humor moueatur, vel infernè sursum, vel in capite ipso. Et stabilior est morbus vt paulò post docebitur. Vnde Galen. vtitur verbis *καταρρεῖν καὶ μεταρρεῖν* in ipso cerebro, cum transfluit, dimouetur, & decedit ab vna parte cerebri in aliam eiusdem cerebri partem propensiolem, aut imbecilliolem humorum tumultuans. Verba Galeni sunt: *si aliàs ex alia cerebri parte in aliam humor noxius defluens, Græcè κατὰρρεῖν, ab omnibus reijciatur, vt tandem in nervos irrepens conuulsionem efficiat, est necesse.* Sic in corpore ipsius cerebri cum mansiones multæ sunt ab vna parte in aliam sit *ἐπιρρεῖν, μεταρρεῖν, κατὰρρεῖν*, vt nomen τὸ κατὰρρεῖν, non sumatur tantum pro defluxione à capite in subiectas partes, vt quibusdam veterum lectionis, & præsertim Græcè ignaris videtur. Sed nos nolumus otium terere in explicatione motus & transfluxus humorum in capite ad generationem morborum capitalium, cum plenissimè ante de his dictum sit.

Ad finē
lib. de
morbis.

Lib. de
Indica-
tionibus

Ad par.
27. (68.
1. lib.
prioris
Prorrh.

Dubitabamus an à liene foret.

Hippocr. ad instituendam *πρόγνωση* solet considerare τὰς φανεράς *παραδείσεις*. Vt cum partis à qua malum primùm originem ducit notitia habetur: id inter τὰ φανερά censetur, vt τὸ φανερόν nomine nō intelligantur tantum τὰ ἐξω quæ inter ἀπορρητά habentur. Sic nimirum de sacro morbo loquens ad prædictionem rem præclaram docet. Et quod de Epilep. dicit, idem de quouis morbo effatu digno, & præsertim qui sacram mentis arcem obsidet intelligi potest. Difficillimè sacer morbus curatur, qui à primo puero præhendit. Secundo loco quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens ex qua corporis parte initium cæperit. Qui à capite ini-

Lib. 2.
Prorrh.

Qij

rium simul grauissimus est, deinde qui à latere. Qui à pedibus aut manibus, sanatur. Medicus curam aggreditur, si homo iuuenis fuerit & *εὐδότης*, nisi mens aliquid mali habeat, aut stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæ *ἐκείναις μελαγχολικαί*, non sunt conducibiles. Quid hoc sibi vult, nam *ἐκείναις μελαγχολικαί*, tantum abest ut mala sit, ut sæpè *ὅτι ἐπιληψία* sit *διὰ τοὺς*. Vnde melancholici fiunt Epileptici. Sed illo loco Hippo. nomine *τῶν ἐκείνων* duo significat, & humoris prauitatem, & dispositionem iam in cerebro contractam, ut ea naturam impediat quò minùs citò morbum curet. Prauitas humoris est ea quam Gal. describit: Flaua bilis assata & sanguis niger atram bilem generat, flaua hæc bilis cum assatur primùm in humorem æruginosum abit, deinde in nigrum. Assatur autem ob febris magnitudinem. Et cum in phrenitide flaua bilis cerebrum præhenderit, & febris vehementia assatum hunc succum melancholicum reddiderit, ob atræ bilis *ἡλικίαν*, vehementes fiunt infante, quas Hippo. in Epid. *μαῖός τις* vocat. Et paulo post in eodem Comm. videtur velle docere cerebrum phreniticū, id est calida & sicca intemperie laborans humorem æruginosum, deinde atrabilem generare. Ad rem redeamus. Si quis sideratus fuerit & *ἐκείναις* fuerit *μελαγχολικός*, non facile est curare epilepsiam eius. Ergo patet ex illo libro Prorrheticon primùm animaduertere oportere, an quædam sit pars à qua conspicuè morbus foueatur, an cerebrum primò affectum sit, an non. Ideo dubitabamus an à liene morbus tam repentinus foret, maximè quod melancholica esset naturâ virgo. Sed reuera non tam diligenter ad lienem attendere oportuit, si quidem conatus naturæ per vterum, & per nares, ut antè docuimus, satis indicabat onus quo natura premeretur, & quod, nisi impedita, excussisset. Quis enim dubitat quominùs in illa virgine orgasmus & impetus fuisset eo modo quo in maribus, in quibus *τὸ τεργῆν* dicitur? Et quod in mariū testibus *τεργῆν* & *τεργίεν* dicitur, in māmīs *σπειρῆν* dici potest. Quanquam propriè *σπειρῆν* volunt intelligi vbera lacte distendi: quomodo *σπαιρῆν* (quod idem cū *σπειρῆν* significat) partes dicuntur ab Hippo. id est, intumescere, & turgescere. At apud eundem Hippo. *σπειρῆν* non significat lacte plenum esse vber, sed turgescere, est autem id quod *ἐργῆν* Græcis dicitur verba Hippo. hæc sunt: Cum mola in vtero est, nil mouetur, nec in mammis lac gignitur, sed *σπειρῆν* id est, nullo presentelacte ipsa turgescit. At iste orgasmus rerum admirabilem author existit. Quid ergo impediabat

Ad
Part. 10.
sc. 1.
lib. 1.
Prorrh.

3. 2. v.
1. 1. 1.
2. Epid.
Lib. de
Berili-
bus.

Sub finē

lib. 2.

Epid.

Aph. 40.

Papaverum decoctum, &c.

Page
28.

Qij

rebro fugaces, & concedentes, prout concesserit febris vigor,
 requiritur tantum translatio vaporis sursum, & eiusdem veluti
 μεταρρύσις, transfluxus & transfusio per venas, non est dubium
 quin τὸ πρῶτον vsus sæpè officiat. Sistitur enim in cerebro hic
 humor, qui tumultuans, & huc & illuc peruadens simplicem de-
 sipientiam faciebat: & dum figit pedem inuritur & imprimi-
 tur ipsi cerebro, vnde læsio mentis firmior existit. Porro quan-
 tum detrimenti apporet temerarius hypnoticorum vsus, in
 primo libro Consiliorum aperuimus, & illinc ducenda sunt quæ
 huc pertinent. Tantum videre oportet an papauerum deco-
 ctum tantopere lædat. Dioscorides de multis speciebus papa-
 uerum disputat, & in iis capita, folia, semina, & succum consi-
 derari vult interpretes. Capita & folia tunduntur, & succus prælo
 exprimitur, id expressum siccatur, & in pastillos aptatur. Dio-
 scorides id meconium vocauit, quod ipso opio inefficacius est.
 Tunsio capite & inciso succus, & liquor effluit, id ἀπὸ τοῦ ὀπίου
 καὶ ἰσχυρὸν vocatur. Quarto gradu refrigerat: Quanquam à quali-
 tatibus quibusdam manifestis interpretes Dioscoridis vim quan-
 dam calfaciendi impertit præter vulgarem Doctorum opinio-
 nem, sed tandem grauitate veterum sententiarum territus, fa-
 tetur à mixtione Glaucij herbæ id contingere posse, vt ementi-
 tium sit hoc & adulterinum. Semen papauerum in cibos ex-
 peti, minusque esse formidabile, longa oratione confecit. Le-
 gimus & opinionē Dioscorid. & Theophrast. & Interpretum,
 sed papaueribus vim tantum refrigerandi, & somni conciliandi
 inesse comperimus. Quid ergo est quod vulgo credatur præscri-
 tuare? Et non nisi cum metu aliquo papauerum capita præscri-
 bant? Credo ipse papauer tribus de causis πάρεσσι, & ἀγνῶν indu-
 cere posse, qui affectus aliquid affine habent Gal. item & quan-
 dam παραλογίαν, id est alienationem mentis: Primum dum refri-
 gerat & spiritus incrassat, Secundo tetros vapores, & calidos in
 substantiam cerebri impingendo. Nonne enim videmus initio
 paroxysmorum ab extimis ad penetralia cordis calorem refu-
 gere, & vnà capitis dolorem incredibilem sæpè excitari, aut
 καύμα, aut aliquid simile, contra calore febris sese frangente (li-
 cèt sit tantum remissio, non autem intermissio) quiescere capi-
 tis dolorem, & ad pedes calorem recurrere? Immo in lib. 7. τὸ πρῶτον
 quodam in loco tum demum exhibet aquæ, aut cibi occasio-
 nem adesse putat, cum pedes plus reliquo corpore cōcaluerint:

Pa. 172.
 & se-
 quent.

Cap. 60.
 & 61.
 lib. 4.

Ad
 59. sect.
 2. lib. 1.
 Prorrh.

potè *κατὰ φύσιν* facto calore & spiritu qui prius erat *ἀδιάφορος*. Hinc liquet caloris spiritus, ichoris effluxum & refluxum, nec non quandam *διαστροφήν*, vt ea ratione hypnotica, & impensè refrigerantia noceant, egressum maligni spiritus & caloris à capite impediencia, & diffusum perspiratumque prohibentia. Quod audiendum est, nisi corpus sit legitimè repurgatum. Nam tunc, quoniam non tanta est tetrorum vaporum concursio & sursum inclinatio, & tantum alterandi sese offert occasio, tutior est refrigerantium vsus. Quod ne cui mirum videatur, etiam ex ipsa methodo medendi patet, in qua Gal. vetuit ne in febrib. à putredine ortis frigida exhibeatur affatim nisi pepasim signis *καρπώδεις* apparentibus. Quod si tanta cautio in vsu aquæ est, multò maior adhibenda in vsu *τῶν τροποτικῶν καὶ ναρκωτικῶν*. Vnde non mirum si somniferis initio morborum datis & comata, & carotica affectiones insequantur. Sistitur enim in cerebro humor, infligitur, imprimitur, quæ suam morà & suppressione, cum venenum aliqua ex parte resipiat, non potest non impensè cerebrum lædere. Præter duos illos modos tertius adiciendus est. Credo ipse papauerum & consimilium vsus aliquid habere *κακοῦ*, & malignum, & si non omnium, at saltem quorundam cerebrum inde tantopere læditur, vt ei labes sapè, quæ elui non possit, inuratur. Quid enim cum omne solanum frigidum sit, tamen *το μαυικόν*, parua quantitate datum præsertim pulvis radicis eius cum vino facit species vanas, & imaginationes obseruari, sed duplicatus hic modus ad tres vsque dies mentis alienationem affert. Vt iam illud solanum non tam manifestis qualitatibus agat, quam occulta quadam vi ad perturbandam percellendamque mentis arcem. Sic tertia species solatri *τροπικῆ* dicitur, quarta *μαυικῆ*. Et non tam æstimare oportet *τὴν μαυικὰν* generari ab vsu solatri ob humorum eam qualitatem quam ad generandam maniam & *ἰκταίν* Galen. multis in locis Prorrh. requirit, quàm à vi quadam quæ ipsius solani furiosi *τῇ ἑστῇ* inheret. Quid non etiam quemadmodum vanæ imaginationes, spectra, deliramenta, furor denique ipse solatri vsu inducitur, papaueribus vis occulta mentem moueat & perturbet? Quis tamen dicat Si papauer refrigerat, & somnum facit, cur nō potius, si fortè ineptè vsurpatur, aut in tempore, aut in loco, aut corpore, Caron & similem affectum inducit, & non deliria, nugas, falsas imaginationes, & vanas. Ita enim vult Gal. humo-

Cap. 69.
lib. 4.
Dioscorid.

rum calidorum proprium esse turbulētos somnos afferre, mouere, deliria inducere, frigidorū contra, comata, κατὰ ποσὶς ^{κατὰ ποσὶς} cadū, lentorem, & stuporem. Quid ergo quod vim habet refrigerandi mentem mouebit, vigilias inducendo, aut efficiendo vt æger capite doleat, saliat, moueatur, ferocem oculum habeat, & læsionem, aut in actionibus quæ sunt in sensu, aut ab arbitrio pendet: quæ omnia, aut maior eorum pars τῆς παραφροσύνης à Gal. argumenta statuuntur. Responderelicet. Primum si memineris eorum quæ de solano dicta sunt, quod nimirum mentem lædat, non tam manifestis qualitatibus quàm occulta cæque infesta vi, idem fortè dices de papauere. Vt in quibusdam turbulenta insomnia, & deliramenta excitet. Præterea dum & obstruit, & spiritus premit, & fuliginem vaporum cerebro ipsi apprimat, & sonum potest inducere, & mentem mouere. Hic enim somnus est τῆς ἐγχεύσεως tanquam comes & assecla τῆς ἀνοίας ἐκείνης. Qualem sonum copia vini accersit. Etsi enim vapor excitatus à vino calidus sit, tamen somnū conciliat, & malignitate suam τῆς ἐγχεύσεως afferre solet. Sic papauer suapte natura dicamus conciliare somnū, sed ob conculcationem multorum vaporum excitatorum vi caloris febrilis, conflictus fit ob diuersas vires papaueris ipsius, & vaporis aut exhalationis infernè excitatæ. Nisi dicas, quod ante demonstratū, & papau. & solatro inditam esse maleficam vim. Quod credibile omnino est. Et quemadmodū καὶ μὴ ἀγνοεῖν à confusione humorum natura diuersorum exitatur: Ita quoque hausto papaueris decocto, & elatis multis fuliginosis fursum excrementis, conflictus & pugna quædam ob vires contrarias excitatur. Hinc in somnū propensio, & nugæ. Nunquam enim maleficus magis est somnus, & turbulentus, quam cum aliquid est quod cerebrum refrigeret, & propterea ad somnum adducat, & aliquid quod id ipsum cerebrum moueat, & excitet. Ne sit mirum ergo si & quis quodammodo sit caroticus, & deliret. Immo & ἀφρονες delirant. Quanquā hoc cuidam mirum esse possit, cum vix fieri posse videatur, vt depræhendamus aliquem delirare, qui aut veterinosus sit, aut caroticus, aut ἰσχυρός. Quam quæstionem Gal. mouit, & in eius explicatione dissimilis & immemor sui extitit. Nam ita de ea re sentit: Nulla sanè quæstio est quomodo quis ἀφρονος mente moueri dicatur. Ridicula enim est interrogatio quærere, quomodo quis sciat alium delirare qui mutus sit. Nam quod motus ostendat à ratione alienos, quod exiliat & inor-

Ad
part. 6.
sect. 3.
lib. 1.
paraph.

ad
part. 55.
li. eiusd.

Ad par-
ticul. 9.
sect. 2.
lib. prio-
ris. Pref.

Tomus II.

R

128 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Ad par.
10. f. 1.
1. lib. 1.
Prorb.
Et ad
pars. 2.
eiusdem
lib.
nitis cum febre assidua est, mania & melancholia absque febre. Rursum cum duplex sit humor melancholicus vtriusque affectus author, vnus ab assato sanguine, alter ab assata bile flaua. Ille melancholiam propriè dictam generat: hic ob bilis malignitatem, ait Galen. vehementem insaniam affert, quam Hippocr. *μανία* vocat.

Magna herclè hoc loco quæstio oriri possit, an quis maniacus & melancholicus (præsertim in cerebro morbo fixo) sine febre sit. Si enim diutius humor cunctatur, cur nō putrescit, si putrescit, cur non febrem in capite accersit, aut potius in cerebro. Nam paulò post conabimur docere aliud esse morbum capitis, aliud cerebri. Maximè verò tum cum bilis flaua in atram, bilem fit *ὀδυμνεία*, vt Galen. passim loquitur. Vt ingenuè dicam cum communis animantium morbus & hostis febris sit, & nulum ferè expertem sui habeat, præsertim si quo alio morbo teneatur, vix tantus in cerebro parte principe morbus foueri potest, quin febris oriatur. Sed non tam morbus est vniuersalis, quàm, vt iā sæpius docuimus, capitalis & particularis febris. Diximus enim in prima huius lib. historia pulsum in temporibus vehementem esse posse, dolorem capitis insignem, perceptionem caloris in fronte, vt iam in capite foueri febris videatur, cum tamen nil tale in toto corpore appareat. Aut saltem non est *αἰνόνοσος*. Id Hippocr. primus obseruauit. Polycrati febris, sed adeo lenis facta est, Gracè *ἡμια*, vt obscura consisteret, præterquam in temporibus. Et paulò post: Pythodoro febris continua ad decimam quartam obscura erat. In temporibus autem apparebat. Ipse sibi ipsi sanus videbatur. Corpus totum à sudoribus perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Item, Erotolai filio dysenteria fuit & febris, febricula nec agro ipsi nec multis omnino adesse videbatur, adeo obscura erat: iuxta tempera pulsus erat, lingua præ siccitate subalba moderatè siticulosus, & sine somno erat. Denique eo loco innumeros commemorat in quibus febris tantum in capite esse videretur. Quod nos in 2. lib. nostrorum Epid. annotauimus describentes constitutionem æstatis & principij Autumnij anni 1575. quæ planè sicca & squalida fuit, vt per sex ferè menses pluuia non fuerit. Similem affectum in puerorum capitibus vocamus *σείασον*, per τὸ, vel *σείασον ἀπὸ τοῦ σείειν*, id est, inflammari, & siccari, vt vult Langius, est autem inflammatoria dispositio in cerebro, vt febris si qua adsit, non sit ei analoga.

Lang.
Ep. 54.
lib. 1.

Alioqui verè phrenitis esset. Sic in capite ipso malum cōsistit, ^{probl.} & tandem ait Aphrod. per arterias communicatur incendium ^{96. li. 1.} cordi, hinc sine putredine febris suscitatur. Plura in lib. 2. nostrorum Epid.¹¹. Ergo tandem doceamus an in melancholia morbo & mania febris sit. Cerebrum natura frigidum est, & agrè admodum inflammatur. Sed si in meningibus ipsis aliquid esset inflammatorium, derepente febris oriretur. At in cerebro ipso potest contineri humor, qui licet vim imprefferit, & calorem conceperit, quia in substantiam cerebri hæret separatus, & nō in arteriis ipsius venisque, ideo obscura febris in toto corpore potest esse aut nulla, cum tamen cerebrum ardeat, & febriliter, vt ita loquar affectum sit. Declarant lethargicorum febres: licet in cerebro ipso humor falsus sit nitrosus & putris. Sed quia pituita est, ideo non est manifesta ^{ἐμφανής}. Declarat ^{Ad} & apoplexiarum causa cum Gal. dicat eas aliquando generari, ^{aph. 42} quod bifariam potest intelligi, ^{lib. 2.} vel vt reipsa inflammatoria sit dispositio in ipso cerebro, vt in plethora, & cum sanguis multus est coercitus in cerebro, calfactus, & propterea parenchyma ipsius cerebri inflammans, hinc attonitus homo redditur. Quod in ebriis vsu venire potest. Vel inflammatoria dispositio dicitur per similitudinem quandam, non quod sit reipsa inflammatio, alioqui phrenitis esset, & motus quidam (nam ait Gal. in Prorrh. caloris est mouere, frigoris attonitum & ignauum reddere) sed est dyscrasia quædam in cerebro & diffusio quædā humoris eo modo cerebrum imbuentis, quo & in inflammationibus humor partes inflammatus diluit. Quanquam prior interpretatio magis placet: in Hypochondriaca melancholia est diathesis inflammatoria pylori & partium vicinarum, tamen non est febris, aut ea obscura est admodum, vt Actio placere videtur. Atque propterea Ronde- ^{3. locor.} letius agit Gal. dicentem verum esse quod scribit Diocles de ^{affect.} inflammatione pylori, quod si hoc esset, necessario febris sequeretur¹⁴. At ex Galen. non est necesse acutas febres sequi ad inflammationem diaphrag. & hepatis, & similium partium: Id est, ^{Ad} insignem oportet esse phlegmonem in iis partibus quæ possit ^{part. 28.} inferre acutam febrem. At si latens sit ^{lib. 2.} ^{Prorrh.} ^{ἐπιλόγισμα}, orietur quidem febris, sed ea lenta & ^{ἡμέα}, id est, lenis. Quanquam in parte ipsa si humor secretus sit, & si pars ipsa sua natura frigida sit, febris quædam conclusa & particularis esse queat. Vt tandem conclu-

130 CONSILIORVM MEDICINALIVM

damus, & fanaticus & melancholicus potest in cerebro febrem habere. Declarauit pulsus temporum in ea nostra puella de qua hîc agitur, & perceptio caloris in frôte. Vt totum venenum humoris, vel à corpore fursum rapi videretur, vel in cerebro contineri, sed nequiescens dissipari & edomari, affectum produceret. Etenim duo sunt commemorabiles loci apud Galenum qui huc maximè pertinent. Prior est in primo Prorrh. *Totius corporis δυσπραγία, sequitur mentis læsio, non aliter nimirum affecto cerebro, quam ipsum totum corpus afficiatur.* Id est, Cum totum corpus malè affectum est, cerebrum quoque malè afficitur: hinc mentis læsio. Et hæc non solum cerebri τῆς δυσπραγίας debetur, sed etiam totius corporis. Et ex hoc loco possumus colligere scâpè ad cerebrum non esse attendendū, sed ad totum simul corpus. Quod huic nostræ virgini conueniebat. Nam totum corpus melancholicum pœnè est. Locus alter est, *Copia i venis acervata tenet quoddam serum in ventrem confluit* (Græcè serum ὀππός dicitur) & cardialgias parit in os ipsius ascendens, quod omnium partium maximè facultate sentiendi datum est. Bona autem abundantia portio ad inferum repens locum, in quem primum deferri consueuerat, lumborum dolores efficit. Qui locus adnotandus est maximè. Hinc enim scies eundem humorē varia edere in variis partibus symptomata. Nam idem humor duas habet substantias, vnâ tenuem, alteram crassiorem. Tenuis ἰχὼρ, & ὀππός, & λεπτὸν, aliquid dicitur: Vnde in febribus, manēte causa mali in visceribus ipsis, tamen ὀππός, & ipsius spiritus, & ichor veluti animatus & furibundus in longinquis partibus impetum facit.

Sed quoniam incidimus in eam distinctionem, vt diceremus aliud esse membranas cerebri affici, aliud substantiam cerebri aliud caput, aliud cerebrum affici (quod vtrunque eodem pertinet) an id verum sit ex veterum opinione, expendamus. Sed hîc auctoritates veterum non tam sunt numerandæ, quàm expendendæ. Gal. ita loquitur in Prorrh. *Capitis dolor, id est, Græcè κεφαλαλγία, caput ipsum affectum docet, Catoche autem cerebrum ipsum.* Et alio loco. *Dictum est antè τὸ νόσος, affectum solum ipsius cerebri esse τῆς νόσου contrarium.* Et alio loco clariùs. *Cephalalgia caput affici docet, veluti & sensus auditorij læsio cerebrum ipsum. Colli dolor, & manus tremule nervorū principium affici demonstrant.* Celsus disputans de affectionibus capitis ita ait, *Nomine capitis nunc significam eam partem qua capillo tegitur. Nam oculorum, aurium & dentium.*

Par. 34.
lib. 1.

Par. 38.
sect. 3.
lib. 1.
Prorrh.

Ad
part. 55.
sect. 2.
lib. 1.
Prorrh.

Ad
part. 5.
sect. 3.
lib. 1.
Prorrh.

dolor, aliàs erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem κεφαλαία vocant. At dicet quis, Cephalæa estne morbus eius partis quæ capillo tegitur? falsum id esse videtur, nam membranarū est. Sed illo loco Celsus non intelligit eam distinctionē quam nuper elicuimus ex Gal de morbo capitis & cerebri, sed nomine capitis & pericraniū, & meninges, & fortè cerebrū audit. Tantum nomine capitis nō intelligit conspicuas partes nares, aures, dentes, & similia. Ergo aliud est statuere morbū τὸ κεφαλαίον, aliud τὸ ἐν κεφαλῇ. Quanquā alius locus apud Galen. quo destruas istum diorismum. Interpretans enim ^{Ad part. 2. sect. 3. Protrih.} illud: Ex Cephalalgia aponia, ait, ideo hoc dicit Hipp. quod Cephalalgiam velit esse signum affecti neruorum principij, non autem localem ipsius aponia affectionem esse in eo: Hæc enim aponia fit sæpè ob tensionem vehementem, vel ob musculorum & neruorum voci inseruientium exolutionem & laxamentum. Quanquam aponia sæpè localem habet in ipso cerebro causam. Ex his apparet neruorum principij morbum esse Cephalalg. neruorum autem principium cerebrum est. Valere ergo iubeamus distinctionem illam superius adductam. Nisi dicamus contra mentem Galen. vt seruetur ipsa distinctio. Cephalalgia est capitis affectio, membranæ enim læduntur, quæ nomine cerebri non continentur. Aponia autem, est ipsius cerebri affectio. Sic enim à membranis, ad cerebrum ipsum, quod non tam promptè afficitur atque illæ, repit affectio. Iuuat quoque istam distinctionem, id quod Gal. constituit, dum ait: Dolor colli fit vel ob affectum ipsum cerebrū, vel meninges, vel spinæ medullam. ^{Ad part. 40. lib. 2. Protrih.} Ac si dicat affectum ipsarum meningon, & ipsius cerebri aliud omnino esse, vt illarum affectio numero morborum capitis, huius autem morbus, numero morborum cerebri accenseatur. Sed hæc dicta sint, vt doceamus nos nil hic obscurum velle scribere, quod legentium animos suspensos tenere possit.

Alij furorem vteri.

Virgines viro maturæ ob quandam vteri ipsius ἐπιθυμίαν, & σαρκωδὲν, varias incurrunt affectiones. Quis non eidem vtero accidere eadem dicat, quæ & peni virili, quem videmus sæpè turgescere, & inflari, vt quædam inde κατὰ φύσιν insequatur fortè de furore vteri audiendum illud Hippocr. Leonidæ filia. ^{Ad finē lib. 7. Ep.}

R iij

132 CONSILIORVM MEDICINALIVM

natura concitata, auersa est. Auersa in iram excanduit. Vbi ira
 excanduit reconciliata est ¹⁶. Medicus non intellexit. Puella
 mortua est. τῆς φύσεως, nomine vterum intelligit, politico loquen-
 di modo. De causis furoris vteri, & quomodo mentem pertur-
 bet, plenissimè dictum est in lib. nostro de morb. mulierum.

Alij φροντίδα.

Paulò post dicemus, caput totum & corpus totum veluti
 quibusdam aculeis sibi pungi narrabat. Et tamen eam extra se
 fuisse ante diximus. Vnum autem ex signis desipientiæ, quem-
 admodum ex Gal. patet, est cum ægri falsas quasdam dolorum
 imaginationes habent, qui non adsunt tamen. Sic in hac puel-
 la hoc videtur fortè inane quod punctiones se sentire narraret.
 Tamen cum ad se redierat, in eodem stabat dicto. Tamen lo-
 cus est commemorabilis, πειρὸς φροντίδος apud Hippocr. ¹⁶ In visce-
 ribus veluti spina esse videtur, ait Hippocr. anxietas corripit, lu-
 cem & homines fugit. Timor inuadit, septum transuersum fo-
 ris tumet, morbus vere corripit. Affectus est verè melanco-
 licus. Et quæ eo loco scribuntur, ea omnia puellæ tribui posse
 videntur. Cæterum meo iudicio, quod in corpore est ἀσθενία, &
 ἀλγύνη, id in animo φροντίς esse potest. Est autem quædam anxie-
 tas mentis ad rem aliquam nimium attentæ. Vt in amasiis eue-
 nire potest. Quanquam ἀλγύνη, & ad animum referri potest, nam
 Aph. 56. ἀλγύνη Galen. interpretatur, cum non quiescimus, sed nos ab vno
 negotio continuò ad aliud traducimur. Atque vt expediāmus
 illam particulam de pruritu: hic adesse potest in mensium sup-
 pressionem & orgasmo, vt omnino fecerit ineptè medicus qui
 territus quibusdam symptomatis sanguinem miserit. Illa enim
 quæ & in non menstruīs mulieribus, & virginibus ad sunt sym-
 ptomata perturbationem à motu naturæ, aut potius conatu, in
 ciendis mensibus significant. Vnde Hippocr. ita scripsit: Qui-
 bus ex rigore febres laboriosæ, muliebria his decurrunt. Et ceruix dolens
 hæmorrhag. significat. Et paulò post, Quibus per nares spes est vt per
 caput quætiētia, & sonitus sanguinem profundant, profundunt hi, &
 muliebria deducuntur, maximè si circa spinas æstus fuerit. Fortè & id
 dysenterias facit. Sic cum febriunt mulieres, & metus aliquis
 aut opinio eruptionis est, caue ne quid temerè tentes. Immo &
 in plerisque post ista symptomata eruptionem mensiu tempus

LIBER SECVNDVS.

133

præstitutum anteuenisse vidimus. Nunc audiamus Hippocr. Lib. 2.
Prorrh.
In quem
Gal. nom
scripsit.
qui affectionem huius puellæ videtur depinxisse: Morbi circa
caput & viris & mulieribus vehementissimi sunt & diuturni sunt &
adolescentibus & virginibus, in tempore pubertatis, maxime cum men-
ses appetunt. Mulieribus in capitis dolore eadem omnino sunt, quæ &
viris. Verum punctura illa pruriginosa, & affectiones atrabilaria, his
minus quam viris, nisi menses omnino aboleantur.

Alij Catubuth veterum. 17

Arculanus de ea affectione ex Mesuci opinione abundè e- Cap. 16.
de me-
lanch.
differuit. Et non est sicco pede prætereundum id quod de ea
affectione dictum est: Melancholia duas famosas species habet, una
Catubut dicitur, altera Eros. Catubut nomen inuenit à quadam specie
arraneæ quæ mouetur super aqua diuersis moribus, & sine ordine. Catu-
but est species melancholia plurimum euasiens mense Februario non ex-
pectans ad ver usque ob subtilitatem humoris melancholici. Nam ge-
neratur à melancholia genita per adustionem cholera, aut melancholia,
in qua fortè caliditas non multum adurens remansit. Et sic licet sit cū
mora plurimo, non est tamen cum rixa, immo cum timore. Signa
& causæ ampliùs explicantur, vt ad librum recurrere eum oport-
teat qui plura desideret. Hic sanè affectus quadrare nostræ
virgini potuit in multis signis ipsius morbi descriptionis. Eo
tempore morbus apparuit quod ab Arculano descriptum est, &
cum in ea mensium esset suppressio, quæ quidem vt lib. de vir-
ginibus edisserit Hippoc. horrendorum symptomaton causa
esse solet, non formidauimus iteratam venæ sectionem. Quod
nunc dico valdè notandum est. Etenim cum in omni morbo
melancholico luculenta venæ sectio suspecta sit, in hoc solo ca-
tubut, specie melancholiæ eximia ad syncopin sanguis mitti-
tur. Quod arguit aliquid esse in eo morbo quod in cæteris me-
lancholiæ morbi formis nō animaduertitur. Si enim suppressio
aliqua solennis sit, præsertim sanguinis aut per mariscas, aut na-
res, aut vterum, quæ hunc morbum inuexerit, nō erit extra rem
copiosè sanguinem demere. Quis est enim qui tam audacter Arcul.
Cap. de
cura
Catub-
uth.
sanguinem mittat si eius propria generatio spectetur, ex atro
videlicet succo per adustionem bilis generato? Plura vide apud
Arculanum cap. de Cathubuth.

Aliquando ad se redibat.

Præclara est quæstio, cum ex antedictis constet & diathesi, & causam in cerebro esse, cur nō malum perseverabat? cur non semper delirabat? Cur quies aliqua concessa est? Et quod mirum est, etiam flagrante malo cum moueretur de quibusdam amicis qui eam deberent inuisere, quibus ista oculenda erat infirmitas, virgo illa cogebat sese, & quod nos obseruauimus, demordere videbatur labium, quasi vellet vocem continere ne quid insolens effutiret. Egressis illis amicis, quorum præsentia verecundebatur, paulò post more isto gariebat & iactabatur. Ante quæsitum est, an cum in parte aliqua dispositio, aliqua est, & impressa infirmitas, nec non materia adest, malum & dolorem perpetuum esse necesse sit? Hoc enim distinguuntur vertigines per protopathiam natæ, ab his quæ compatiendi lege eueniunt, quod illæ diu perseverant, hæ fugaces sint. Sed illud verbum, perseverare, & fugax esse magnam habet latitudinem. Nam cum dicitur malum perseverare, non ita dicitur, vt quādiu *Adversus* adsit, malum quoque vrgeat, sed per comparisonem cum eo dolore, vel eo malo quod vi sympathiæ sit, dicitur diuturnius esse, quam id quod ex euentu accidit. Item si vis ipsius diatheseos spectetur, cum in parte aliqua est, minima occasione malum accersit. Et in eo spectatur perseverantia ista. Accedit quod dolorum & morborum alij sunt acuti, chronici alij: quoniam acutorum breue est tempus, ideo si causa in parte fixa est, malum quoque figitur & perseverat: Si chronicus, figitur quidem, sed tamen non semper affligit. Vt in febre continua essentiali quoniā causa delirii certo tempore furit, & nondum parenchymati ipsius cerebri inuritur, ideo fugax est delirium, sed in febre symptomatica phrenitis ipsa delirium habet assiduum, quoniam assidue causa fouetur, & vt loquitur Gal. in cerebro *καὶ ὁρμητικὸν ἀδύνατον ἀφαιρεῖται*. Cum autem causa diu fixa est, & morbus perse chronicus est, quoniam habet quædam momenta & inclinationes, non perpetuo affligit. Nunc sententiam Gal. audiamus de distinctione affectionum fugacium causam, & fomitem in parte non habentium, & earum quæ perseverant.

Cum videris quempiam, ait, cum ferocitate desipientem, & si paulo post, sedetur, cognosce mentem non febris ratione lesam, sed phreniticam subaudi

*Ad par-
ticul. 25.
sectio. 1.
lib. prio-
ris Pror.*

Ibid.

subaudi affectionē, quæ post adaucta, ferina tibi videbitur. Vis ponēda in verbis. Et si paulò post, vt contra aduersarius dicat non continuam esse desipientiam quæ paulò post fedetur. Et reuera obiectio habet aliquid probabile. Sed verba Græca & literæ sensus aliud sonant. Legitur enim καὶ ὁλὶ γινώσκον παύσῃται: Id est, etiam si postea paulum cessauerit, & cessare visa desipientia fuerit: Id est, vt sit remissio aliqua (quod aliò τὰ πολλὰ dolorem non sentire dicit) sed non intermissio. Nam si absoluta intermissio esset, aliunde malum esset repetendum, & non in parte ipsa causa firmaretur. Et ad eandem sententiam paulo post dicit: *Ad partem 27. sect. 1. lib. 1. Proreth.*
Migrations symptomatum. Græcè μεταπτόσις, ex migrantibus sunt humores. Nam firmatos stabilitosque una in parte humores, species una symptomatis, tum nature partis, tum humoris virtuti peculiari, consequitur. Et quod phrenitis in ipsis duret, ex eo firmatum in capite eum qui affectionem parit, suspicio est. Atque reperio humorem tribus modis morbum parere posse, per sympathiam, vt cum à parte longinqua transfertur, siue eius ὁρῶς, tantum transferratur (quod ferè fit) siue μετὰ τὸ ὁρῶς ἔχῃ, crassior quædam pars. Et translatio verè dicitur: vel cum in parte est. Idque trifariam dicitur fieri: si perfluit tantum venas, vt in febrium deliriis, si transgressis traiectisque vasis iam in parte ipsa impressionem fecit, vt in lethargo, phrenitide, catotocho. Tertiò, si sit etiam in eadem parte, sed latius sumpta μετάρρους ἢ κατάρρους. Ita enim quodam in loco μετάρρους ἢ κατάρρους, pro eodem sumitur, vt κατάρρους. *Ad partem 27. lib. 1. Proreth. sect. 1.*
 nomine intelligatur transfluxio de loco ad locum. Exempli causa, cum humor occupat ventriculos cerebri, peculiarem quandam inuehit affectionem; si substantiam, nouum genus morbi; si in nervos auditorios, aliud; si in opticos, nouum quodque parit. Et hoc in eodem cerebro fit, & propriè μετερρεῖν dicitur. Itaque humor contentus in parte aliqua, & fixus firmatusque continuam quandam affectionem facit, facta comparatione cum causa fluente, & non fixa: non quod semper dolor adsit: nam omnis humor certo quodam tempore, certos habet ratosque motus & inclinationes. Si in cerebro quidem humor sit, sed deerret, varias affectiones parit, prout in hanc, aut illam partem repit. Atque eo modo hunc scrupulum eximere oportet.

Pulsus tardus, aliquando frequens.

Si quæ materia tantas in cerebro perturbationes afferebat, in vasis maioribus inter alas & inguina interiectis coercita putrisset, alius pulsus fuisset. At congener erat corpori, morbo congener. Nam melancholicorum talis pulsus esse solet. Et quoniam de eo pulsu in priore Consiliorum nostrorum Tomo diximus, hac superfluum sumus ampliore explicatione.

Aculeis pungi corpus narrabat.

De punitionis sensu diximus ante in explicatione vocis *εγγυιδος*. Et cum curatio illius morbi præpostera fuisset, nullâq; crisis insecuta fuisset, nisi quod ea quandam excretionem, & potius secretionem in caput fecisset, ac si *καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ* crisis moliretur, non mirum si materia quæ crisi *ἐστὶν ἐν κοίτῃ*, aut per sudores, aut alio modo excerni debuisset, recruduerit, & suppressa seipsa deterior facta fuerit, unde punitiones & lincinationes.

Tandem cum ex alto cecidisset, leuius malum esse visum est.

Ad
part. 16
lib. 3.
Proorrh.

Anno
1575.

Fortè cum tumultuaretur ex alto cecidit, & offensus est pedis articulus. Illâque laborem sensit & dolorem, & tranquillore cœpit animo esse. An casus iste nouam mutationem afferre potuit? Galen. est locus valdè præclarus, vbi docet morborum quandam fieri *μεταβολήν*, id est permutationem, vt mutuo sese excipiant morbi & symptomata. Narrat enim se vidisse quendam qui paraplecticus foret, obortis quibusdâ lumborum doloribus conuellebatur. Deinde desinebat conuulsio, deinde redibat paraplegia, & sic deinceps. Id quod cum raro fiat, mirandum fuit. Sed id quod hoc loco dicimus magis mirum esse debet. Nam nostris temporibus visus est phreniticus qui per nouem dies insigniter & febrierat & delirauerat. Cum nouo die omnia recruduissent, nocte è lecto desurgens manum violentam decumbenti Medico afferre voluit, à ministris deinde coercetur. Fingit somnium, inopinatò exilit è lecto, & fenestram appetens, eamque persiliens, in arcam locum altum

valdè decedit. Fortè aderant quidam colloquentes, qui decidētis corpus sustinere. A casu isto cum alioqui ferè illæsus esset, delirio est absolutus. Sic discussa est miraculo materia morbum faciens. Et apud Hippoc. Cuidam aderat crurum ^{s. Epid.} rigor diuturnus. Fortè in lapidem cecidit, læsum caput est, vertigo oboritur. Desiit malum vetus. Sic credibile huic virgini euenisse, vt casum ob istum paulum resipuerit.

Malum auxilia eludebat. Relicta sine remediis conualuit potius.

Melancholici vulgò Medicomastiges, & flagella Medicorū dicuntur: Est enim is humor indomitus & efferus. Sed dicat quis, an qui suppressus humor menstruus fuerat tam sæua inducere potuit symptomata? Ita herclè: quanquam id non videtur ^{Part. 31.} Galeno. Contra Hippoc. hic enim ita scripsit: *Quæ cum tantula* ^{lib. 3.} *ferocitate* (Græcè τὸ ἐπ' ἐκίον, cuius vim paulo ante exposuimus) in desipientiam pellunt, melancholica, si vero ἀπὸ τῆς γυναικείας fuerint, ferina. ^{Protrh.} Quo modo coriary filia euenit. Galen. in Com. ita ait: Cum autem qui melancholicè delirant prepti sum ad inferendum propinquis malum (quod χαλκίον vocat) si χαλκίος μολύβδος ποικίλῃ, id est, si malefici magis fuerint, πνευματικὸς διεκιδῶν vocitantur. Sed quòd talis desipientia ferina oriatur ex suppressione purgationis menstrua, nec prorsus verum, nec magna ex parte. Nam si melancholicus fuerit sanguis, & in cerebrum ierit, talem affert πνευματικὸν: & sic in cæteris. Sic non negat quidem deliria, & alienationes mentis ob vnā mensium suppressionem euenire posse, sed illas negat esse ferinas & maniacas. Quod fortè probabile est. Nunc audiendum cur dixerimus tam effræne malum remediis recruidisse, iisdem sublatis cessauisse. Id ipsum multarum rerum gnara antiquitas obseruauit. Ita enim Aëtius scripsit. *Operæpretium est nosse multos* ^{Cap. 10.} *melancholicos agrotantes in tempore curationis nil commodi sensisse. Dimissa verò curatione restituti sunt, natura ante curationem prævalente contra morbos debiles ex medela factos. Sic remissionem natura dare oportet. Nam vnā cum curationibus videtur affligi. In quiete vero inualefcere, & superare morbos iam antea attenuatos.*

Ante dysenteria crudelis eam afflixerat.

Tenasmus & dysenteria eam valdè duobus ante annis affli-

S ij

138 CONSILIORVM MEDICINALIVM

xerat. Et in recto intestino vlcus depascens obortum fuerat, quod ferè *διὰ τὸν* erat. Credibile est in illa restagnare & succrescere humorem indomitum, siue pituita falsa fuerit, siue succus melancholicus ad atram bilem accedens. Et si quis non credat pituitam falsam posse tantos morbos accersere, audiat Hippocratem de secunda specie causi à pituita falsa disputantem. In causo non legitimo pudendi liuor superuenit, & testiculus intensus iudicatorius est. Et Galen. ait igneam caliditatem & vrentem excitari ob fumosam substantiam à pituita falsa excitatam. Et Hipp. Tenasmos & inflammationes sedis ab ea pituita falsa excitari fatetur.

Part. 13.
lib. 4.
Acut.

Verebatur de sphacelo cerebri.

Hippoc.
lib. de
Fistula.

Quid sit cerebrum *σφαλερὴν*, diximus in nostris definitionibus medicis. Cæterum obseruarunt primarij Medici post diuturnos capitis dolores syderationem meningon ipsius cerebri euenisse.

Id congenitum.

Rescui enim ex parte patris multos fuisse qui stulti fuerint, & ad deliria, melancholicasque perturbationes proclives¹⁸. An autem morbi sint congeniti, in prima huius libri historia amplè disputatum est.

Multa remedia vltro tentata sunt: quorum capita strictim percurreremus, & eorum formulas aliquas perscribemus? Sapius secta vena: data pharmaca & enemata cum melle mercuriali & confectione hamech. Galli exenterati capiti sunt admoti: Cucurbitulæ scapulis. Zibetum cum cottone pudendo applicitum, betonica capiti, præsertim fronti, cucurbitulæ in femoribus. Item & hæc.

℞. Fibrarum ellebori albi. ʒj. seminis seselcos & pæonia. an. ʒi. radice azari. ʒij. buglossi, scolopend. melissa, an. m. j. florum cord. p. j. fiat decoct. in colatura dissolu. Elect. diacarth. & de succo rosarum. an. ʒij. fiat potus.

℞. Massa pilul. sine quibus, cocciarum, & foetid. an. ʒi. pulueris hieræ diacolocynth. ʒss. cum syrupo viol. fiant pilula deaurata.

℞. Florum nenuph. lactuc. portul. & florum violarum. an. p. j. fiat

decoct. ad ℥ iij. & cū ℥ i. s. syrupi de nenuph. fiat potus cap. hora somni.

℥ Decoctionis salvia, maiorana menta, meliss. stach. chama. meliti lib iij. coquantur per cineres sarmentorum: adde express. ℥ iij. foliorum sene mundatorum & bullitorum in vino albo pro embroche totius capitis, & assusione ex alto.

Ad ea omnia quæ de eo morbo tractata sunt, duo adicere oportet: Pri^o est, quod vulgò omnes medici calidos foras & embrochas ad dolores capitis instituunt. At cū superius paulò demonstrauerimus maximā partem dolorum capitis esse ab humore, aut per se calido, aut à vapore, aut ab adusto, concluso, & ob difflationem prohibitam, quadamtenus putrescente, frustratolixiua ex calidis Cephalicis instituunt. Itaque hoc monitionis loco, mihi & aliis scriptum sit.

Posterius est quod omissum balneū vniuersale fuerit, quod tamen hic primas tenet, tum ad temperandos humores, tū ad corporis perspiratum, tum ad restinguendum incendium. Et maximè in Melancholia morbo cōuenit, præsertim cum est per adustionem humoris, siue affectum sit cerebrum, siue in mesenterio malum consistat. Reuera si non ita alienato fuisset animo, id tentauissemus: Sed in tanta rerum confusione valdè de remediis est dubitatum.

Accommodatè ad id quod nunc diximus, Galenus de usu balnei in dolore capitis ita statuit: *Interdum ab initio morbi febres sunt mites, sed ab initio tamen symptomata grania caput infestant, verigines, pulsationes temporum, & alia, ob exustionem, vel exhalationem humorum in ventriculi corpore contentorum. Sanè, capitis solius quouis aliter modo habentis caliditatem balneum iuuat. Et prissana cremor pro sorbitione satis est. Verum cum spiritus calidus & flatuosus ob humorum prauitatem ad caput fertur, lauare hos non confert.*

Ad par.
42. li. 4.
Acut.

Calamitosum huius virginis fatum.

Circa finem mensis Sextilis anno 1576. cum molestias tulisset, & propter assiduum capitis dolorem insomnis diu fuisset, cardiogmo se tentari dixit. Tandem in febrem incidit. Eius febres non erant vehementes, sed lentæ erant & malæ. Et earū vis & venenū in cerebrum ipsum impressionem quādam faciebat. Caloris sensus erat maximus in fronte & tēporibus. Et tumor erat *μυζώδης*, ad ossa bregmatis parte sinistra, die Martis hor-

S iij

140 CONSILIORVM MEDICINALIVM
 ruit. Nocturna febris. secta vena. Die Mercurij eadem: de nocte nugata est & *παραλυσος*. Mane perseverabant nugæ, nec ad medicamentum capiendum adduci potuit. Tandem precibus victa sumpsit. Visa est resipere. Ad nonam vespertinam eadem manebat. Tamen identidem capitis dolorem querebatur. Media nocte custodibus obdormientibus è lecto surrexit, cubiculum exiit, aut è fenestra cecidit, aut caput ad lapidem prædurum & obtusum, aut ad mensam plumbo obductam quæ propter culinam est, offendit. Attonita ex ictu casuue facta est, vomuit. Nil in cute apparebat. Sex horis post interiit. Ossibregmatis effracta erant, & intro detrusa, reliquum os ad futuram à litera, nomen sortitam fissum erat. Musculus temporalis planè contusus. Non narrabant cadendi modum, immo subce-labant matrem. Atque hoc valdè calamitosum fuit. Fortè duobus ante diebus deprehensus erat tumor ea parte sinistra præ capitis dolore obortus. Et is fefellit nos. Nam non eminebat à calu isto. Ignoratus cadendi modus fraudi fuit, & tam repentini fati causa. Nam aliqua arte prouisum fuisset; quanquam casus iste lethalis omnino erat, nec vnquã restitui potuisset. Suspicabatur mater violentum aliquem casum, nos verò celere hoc euentum tribuebamus vi doloris ipsius capitis. Et qui designabatur locus à matre, ex quo cecidisset, non faciebat opinionem tantæ rei quanta latitabat. At magni refert in morbis similitudine rerum nō falli, nec præiudicatæ opinioni nimium insistere. Cum enim multis id calamitosum fuit, tum huic virgini infestum, saltem enim omnes nos suo functi fuissimus officio.

ANNOTATIONES.

1. *Pilositas in brunis præsertim est melancholia signum. Quod Articulanus. cap. de melancholia annotauit.*
2. *Nigrities capilli calidum temperamentum non indicat.*
3. *Galen. in commento dicit Hipp. duo obseruasse, etatem, & naturam. Etatem, ut qui calidiores ratione ætatis essent, ægotarent: naturam ut in frigidioribus natura, quibus cutis densa foret, excrementum facile subsisteret, & ob eam causam malum afferret.*
4. *Quoniam noctis humiditas calorem quodammodo temperat, dici autem calor & siccitas febrilem calorem auget, videtur non absque ratione dicere Hippoc. febrem diurnam ad tabem ducere: impensè enim*

siccatur corpus ac tabescit. Vidimus tamen omnes nocturnas febres malas esse, & magnam virium iacturam attulisse.

5. Galen. ad partical. 71. lib. 3. Prorrh. docet febrium ardentium esse hemorrhagias mouere, quia & sanguinem fundunt, & ἡς τὴν κεραιὰν αὐτῶν. Huc pertinet illud 2. Epid. sect. 1. sanguinis è naribus largus fluor liberat sæpè ut Hæmorrhagie contigit, cuius Medici non erāt gnari. Hic taxat Medicos diebus criticis manantem sanguinem supprimentes.

6. Hinc cap. 4. lib. 2. Meth. med. Fernel. arguit Medicos qui ex stillicidio sanguinis è naribus, vel urinis rubris captant occasionem secandæ venæ.

7. Et ad part. 32. lib. 3. Prorrh. vocat quandam alienati iudicij & mentis speciem μετέπειθα τῆς γνώμης, politico loquendi modo, il est esgaré & fouruoyé de son entendement.

8. Tamen miror cur Galen. loquens μετέπειθα τῆς γνώμης, in pulsu Hypochondrij, non dicat ἡ δὲ φύσις esse prodromon delirij. Sed in contrario accipit sensu.

9. In Picardia vtuntur etiam in placentulis semine papaueris albi sine noxa vlla.

10. Ad hunc locum pertinet problema Aphrodisæi. Cur tam vinum quam aqua delirium & maniam inferat? Aqua id facit obtrudendo, &c. Legatur locus Problem. 94. lib. j.

11. Hippoc. ferè initio lib. de morbo sacro verè melancholicorum signa exhibet, & quomodo statim respiciant, rursus perturbentur. Et Arculanus docet mulierum melancholiam deteriorem esse, sed rariorem.

12. Arculanus docet viros potius melancholicos fieri, quam mulieres: sed deteriorem in mulieribus esse affectum, quod à fortiori sit causa.

13. Melancholici vocantur non solum ij qui nigram excernunt bilem; sed & ij qui iam habent in solidis partibus talis constitutionis structuram. Ideoque qui sunt corpore squallido, sicco, macro, quique curis, vigiliis, egritudinibus, perturbationibusque animi concutiuntur ij melancholie sunt obnoxij.

14. In Historia prima iam annotauimus sæpè efferri tetrum vaporem & inflammabilem in plerisque, qui spiritus capitis incendens intemperie incalidam, & valde molestant infert cerebro. Quod & huic enenit & plerisque, ut alibi annotauimus. Et puella hæc nobis narravit affirmavitque cum Poisiaci degeret, monialium imprudentium consilio affusam esse fronti calcem viuam ad capillos exurendos. Nec enim est quod quis dicat aliud esse τὸ καλὸν, aliud κακὸν τὸν δάκτυλον. Si quidem pro eodem sumuntur à Gal. Etenim Com. ad part. 13. lib. 1. Prognost. ait

142 CONSILIORVM MEDICINALIVM

rubere oculos aliquando ob phlegmonem cerebri: lib. verò 7. Aphor. de eadem causa loquens ait, rubere oculos ob diathesin phlegmonodem. sic confundit.

15. Mania tribus modis sumitur. Primo modo pro ingenti delirio, ut Hippo. par. 32. lib. 1. Progn. docuit loquens de pulsu Hypochondrij. Secundo modo pro delirio siue febre à calido humore, aut calida dispositione cerebri. Tertio modo pro quadam mania à frigido humore. Quod autem à calido humore sit etiam sine febre, & discrasia cerebri, ita Galen. qui locus huc valde pertinet cap. ultimo lib. 2. de causis sympt. Reliqua quidem omnia deliria ex mordentibus & calidis oriuntur succis, qualis maximè flaua bilis. Sæpè etiam ex calidiore cerebri intemperie, sola illa quæ melancholica vocantur frigidum succum pro causa habent. Sic propter melancholiam propriè dictam, & phreniticum delirium, & maniacum, & paracopticum in febrium viciis, à calido vapore, & intemperie nascitur.

16. Non est quod quis subterfugiat, dicendum & membranas cerebri posse principia nervorum dici. Nam in prognosticorum Com. apud 7. vel 8. cerebrum dicitur.

17. Inter locos ceteros est quidam commemorabilis lib. 2. de morbis mulierum ubi disputat de quodam affectu què vocat, atram bilem in utero. Et eius edit signa.

18. Punctionem istam melancholicis propriam veluti esse Aristoteles cap. ult. lib. 7. Ethici proponit: Qui natura atrabilarij sunt, ij semper requirunt desiderantque medicinam quod eorum corpus continenter pungatur, & vehementes semper habent appetitiones. Aristo. illo loco docet semper nos dolori contrariam appetere, cisi illud difficile sit.

19. Scribitur vel Catubut sine h aspirante, vel Cathubuth.

20. Quomodo semen vitiatum parentum, id est, labe aut epileptica, aut arthritica, aut consimili infectum, istam imbecillitatem ad posteros transferat, ad finem Comm. in Apho. 28. lib. 6.

21. Fundum ventriculi deprehendimus subrubrum; & maculis rubris perspersum, ac si ictum aliquem vimque passus fuisset. Admirationi nobis id fuit. Accredo à casu fuisse.

HISTORIA



HISTORIA QVINTA.



XOR Consul^{is} Regij morbo febrēque populariter grassante occupatur. Febris ^{κοπιδης, ασπιδης, ηλαφιδης.} Incendium summum in partibus imis erat: iactatio ^{διεμετος.} Alius liquidis excrementis ferebatur, foetidis. Ne minimum manus appulsus ferebat. Nocte exacerbationes. Circa auroram diebus criticis indicantibus ^{ασφισσος} pene erat, corpus sudoribus frigidis, modo uniuerso in corpore apparentibus, modo in ceruice & clauiculis diffuebat. Ad nonum diem corpus puncticulis pulicum morsus referentibus maculatum erat. Vires admodum effactae. Tandem serosis multis euacuatis sine manifesta crisi est iudicata.

COMMENTARIVS.



VM mentio iniicitur morbi populariter grassanti. citē mos morbi & ingenium explicatur. Nec enim abs re Hippocrates in quouis morbo ^{το δε} ^{Lib. Progn.} spectandum putat, ^{η το διαγνωσις.} Illud vim acutiēque morborum significat ex peculiari corporum natura humorūque dominatu natorum: hoc verò insinuat illud quod ab eodem ^{το δε} ^{Lib. Progn.} nuncupatur. Sed has difficultates excutere nunc temporis spatium non est.

Tomus II.

T

PAR. 40.
lib. 3.

Hoc fuit
an. 1573.

Satis est hoc loco meminisse eius quod dictum est in Prognost. Oportet impetum morborum ἐπιδημίων considerare. Laurentianus vertit, morbos exuperantes; sed malè, cum ἐπιδημειν grassari scuire que in vulgus significet: Item temporis constitutionem tenere oportet. Nos pluribus explicaremus & morborum qui tunc temporis vagati sunt, & qualis fuerit temporis constitutio, nisi in lib. 1. Epidemiorum nostrorum res tota pateret. Tantum de duobus monere oportet; hyems præcesserat rigidissima, quæ partes internas labefactauerat, & reuocato, potiusque conculcato intrò calore eas adusserat, ut ferè ἐκρίστος metus foret. Secutum ver satis morbosum, æstas feruentissima, & feri acerrimi bilisque infestissimæ genitrix: ut mirum non sit si tanta morborum foetura fuerit. Immo adeo partes internæ, & præsertim nervosæ, affectæ fuerant cœli inclementia, ut quibus à lithotomis detractus è vesica incisione fuerit sanguis, eis suum diem obire necesse fuerit. Aphtharum & morbillorum magna fuit ilias. An non tum vitio cœli, tum eximia quadam putredinis qualitate, quam natura frangere ac domare non potuit?

TEX-
TVS.

Febris κοπιώδης, ἀσπώδης, ψηλαφώδης.

PAR. 16.
sect. 3.

Ad
PAR. 33.
lib. 1.

PAR. 2.
sect. 4.
L. 9. Epi.

In Prorrhethico ita Hippoc. fauces si parum exasperentur, frons dolet, contrectatæque fatigentur, atque in stragulis & vestimentis doleant, quæ ex his augentur difficilia existunt: In Græco legitur ψηλαφώδης, κοπιώδης, cum distinctione, non autem coniunctim, ut κόπος ad τὸ ψηλαφώδης referatur: τὸ δὲ ψηλαφώδης, non eum significat qui palpat & contrectatur, sed qui palpat & contrectat, ut ex alio loco patet. Et non diceret Hippoc. κοπιώδης, sed ὀδυνώδης: nec enim κόπος, sed ὀδύνη ad molestant actionem sequitur, id est, si quis ne blandæ manus appulsum ferat, quin doleat, quæ affectio hinc sequitur ὀδύνη propriè dicitur. Plura in nostris Definitionibus in voce παρὰ κρούσιν ἀσπώδης. Porro πεινίαν καὶ πυρετὸν κοπιώδης non dicam: sufficit tantum dicere febres laboriosas, & à tenuibus ichoribus nasci, & à crassis humoribus. A crassis, ut cum Hippo. ait, vrina crassa alba in quartanis laboriosis exit. In Com. Gal. Laboriosas febres nominat, non quas multa antegressa motio peperit, sed omnes in quibus aliquis laboris & lassitudinis sensus existit. Et nunc de laboriosis excitationis ex multitudine crassorum humoris. De ichore autem fe-

brem laboriosam pariente ita in lib. Aeut. Causus fit cum venulæ arefactæ ichores attrahunt, &c. Item, febris vehemens habet, & corpus veluti à lassitudine ossæaria (Græcè ὀσσοποιός) laborat dolétque. Et hæc de lassitudine spontanea. Gorraeus & ὀσσοποιός, & alias eiusmodi lassitudines ab immodico labore repetit, sed malè. Quanquam & motio vehemens id facit: sed sæpè & quies, & à quiete suppressio excrementi id committit. Itaque dicemus febrem laboriosam esse in qua lassitudinis sensio est maxima spontè excitatæ, vt æger ne minimum manuum appulsus, & motionem ferat: immo ne vestimentorum appositum & onus ferunt. Tali febre laborabat nostra ægra.

Part. 1.
§ 2.
sect. 4.
li. Acut.

Iactatio ἀνέμετος.

Iactatio Græcè ἄνους καὶ ἀλυσίς dicitur, de quarum vocum significatione paucis dicam, quoniam de iis copiosius in nostris Definitionibus Medicis. Apud Galen. duplex est ἄνους, siue ἀλυσίς vnicus παντός τις, alter ἀνέμετος. Ita enim scribit, bifariam ægri sunt ἀνέμετοι vno modo cum virtus à corpore grauatur, nullamque figuram retinent ægri, alio modo cum os ventriculi à prauis mordetur humoribus. Priores perniciosè afficiuntur, posteriores sunt nauseabundi. Et plenius in Progn. πειρασμοὶ καὶ ἄλυσος ἀνέμετος ægri id est, iactant sese & priorem corporis figuram non retinent, sed subinde immutāt, aut ob ventriculi κακώσιν, affectionem significat, aut ob virium debilitatem, vt corpus ipsum ægro & naturæ sit oneri. Quod est intelligendum, nisi æger mollior & delicatior sit, vt qui minima re offendatur, & doloris insolens iactetur. Ideo in fine dixit, vide an æger sit numerandus inter homines leues, qui facillè remittunt ac concedunt, & vinci se patiuntur etiam re leui. Leoniceus malè illum locum interpretatus est. Ad duas illas causas, aut signa τὸ ἄνους, nempe oris ventriculi ab acri humore demorssi, & ἀρρωστὴν malignam qualitatem accensebis. Immo, virium infirmitas istius ἄλυσος non videtur causa, cum sæpè post magnas euacuationes multos videas valde imbecillos, qui quiescant, nec subinde mutantur. Itaque aliqua latens causa, vt venenata qualitas esse videtur, quæ homines iactari, & conflictari (quod Græcè λυσομένη dicitur) faciat, & proinde infirmitatem afferat, vnde maior

Ad par.
43. li. 2.
Progn.

Ad par.
19. li. 1.

ocasio inquietudinis. Sed assignare iactationis causam infirmitatem virium (pace Hippocratis dicam) non est æquum. In pestilentibus febribus, & in grumo sanguinis *πυρεν* videmus, à maligna qualitate vires labefaciente, & spiritus dissipante. Sed de his alais.

ἀσφυγμῶς.

Mos & ingenium febrium id temporis vagantium erat admirabile & stupendum. Nam cùm febris exacerbationes in noctem inciderent, nec non vacuitas somni adesset, sub auroram, præsertim diebus contemplabilibus *ἀσφυγμῶς*, & veluti pulsus intercalaris, & qualis morientium esse solet, observabatur. Quod ego verum esse assero. Adeo ichor aut humor qui febrem faciebat erat effusus & *ἀπὸ τοῦ*, & quem natura ferè aggredi non audebat. Talis feri dominatū videtur expressisse initio lib. 2. Epid. Et historiam morborum eo tempore vagantium apertè in nostris Epid. explicuimus².

Ad nonum diem corpus veluti puncticulis pulicum morsus referentibus est maculatum.

Cæteris omnibus omisissis, quòd explicatio ex nostris Epidemiis eruenda sit, in explicatione istarum puncticularum operam impendemus. Video enim eruptionem istam sæpè Medicos terrere, ut nil audeant tentare, sæpè audaciùs aliquid facere, unde periculum ægris creatur. Itaque quantum ex veterum & recentiorum scriptis venari poterimus, in hunc locum concludemus.

In febribus totū corpus aliquando maculatur & inficitur, aliquando tantum pars vna: Itē quæ in cutim erumpunt aliquando ut abscessus sunt aliquando ut morbi. Quod valdè notādū est. In parte corporis erupūt pustulæ quædā ut Epinyctides, Therminthi, &c. id genus. Aliquando & in parte corporis maculas morbillos referentes efflorescere vidimus, prout vna pars magis laborat, quàm alia, in totum corpus emergunt pustulæ, aut papulæ (nunc enim nomina confundamus donec distinctionis locus erit) siue exanthemata: Item ecchymata, puncticulæ, morbil-
li, variolæ, rubiolæ, & id genus cætera de quibus hoc loco di-

III T

T iij

Obie-
ctio.Cap. 120
serm. 1.
Tetrab.

per vitium totius substantiæ, & per corruptionem proprii ali-
menti. Et foris applicanda sunt remedia, non sunt interna
valde fatiganda. Nam morbi ^{non} in partibus externis labefa-
ctis existit. Nisi fortè quis obiciat Elephantiasin morbum
esse, & tamen cum efflorescit in cute vitium, iam mali labem in
partibus internis confirmatam esse. Quod Aetius ex Archig.
confirmat. Nunc ad priora redeamus. Ergo si aliquid in cute
appareat & efflorescat (quod ^{ἡλιδεῖν} Græcis dicitur) idque cō-
festim, Græcè ^{ἀπὸ τοῦ καὶ ἰσχυρῶς}, non morbus cutis, sed abscessus di-
cetur: vt cum die critico, vel non critico aurigine & ictero cu-
tis defœdatur. Item cum vitio aliquo interno derepente abdo-
men intumescit, abscessus est. Sin sensim intumeat, vt in cu-
te & partibus proximis seminarium fomentumque morbi ap-
pareat, morbus abdominis dicetur. Quanquam fortè interna
culpa non vacent. Et dum quis concumbit cum impetiginoso,
& impetigo exarat & cutim exasperat, morbus est cutaceus.
Sed si derepente ab interno vitio latente emanet, id abscessus
erit, non morbus. Quanquam aliquando morbi rationem ob-
tinet. Quædam vetula assidebat agro pestifero: & dum fortè
iuseulum haustum reuomeret, guttulis aliquot aspersa est cutis.
Et (quod mirum) pro guttarum numero carbunculorum nu-
merus effloruit. Nunquid id morbus fuit?

7. Epi-
demior.

Itaque multa in cute apparent quæ an in morborum, an in
abscessuum cœsu numeranda sint, sæpè dubitamus. Vt cum Au-
strina cōstitutione & suffocante, ecchymata, aut morbilli emer-
gunt, siue in febre, siue ante febrem. Nam sæpè in febre syno-
cho pestilente vi morbi, quarto aut quinto die, & præsertim in
statu erumpunt, febre nihilo remissione aut fractione, nisi fœda
alui illuies sequatur, aliquando ante febrem (vt nos vidimus)
& tunc melius est cum ægris. Et dicendum, ne quis miretur,
an talibus papulis corpus sine febre inficiatur. Anno 1575. mul-
tas & mulieres, & pueros vidimus, quibus corpus veluti rubio-
la derepente infectum est, cum nulla adesset febris, nulla iacta-
tio, nullum malum symptoma. Sed cum hoc negligerent, non
impunè tulerunt. Nam non ita longè post febre correptæ sunt
mali moris. Si nobis fides derogatur, Hippoc. aduocandus est.
Hic enim meminit cuiusdam pueri cui sine febre exanthemata
paruerunt. Sed aliquo post tempore conuulsiones secutæ sunt,
& inde mors. Quod fieri videtur vi naturæ expellentis, quæ irri-

tata virulentæ materiæ qualitate, antequam febris excitetur, quouis modo sese liberans in cutim aliquid eructat. Et tamen abscessus id dicetur, licet non sequatur ad febrem: Quoniam quod pertinet ad virulentas & malignas eruptiones, non solet observari crisis, nec dies, nec tempus, nec signa. Quia quocunque modo id potest natura, id facit. Adeo ingens est vis venenatæ materiæ. Declarant magnæ perturbationes, & horrenda symptomata quæ & præcedunt ecchymaton eruptiones, & sequuntur. Iam concludamus aliquid, quod ad sententiam Hipp. supra adductâ pertineat. Vt cutaneum vitium dicatur & morbus, tria quærentur: primum vt iam à longo tempore primitiæ aliquæ illius affectionis apparuerint: Deinde vt eius incrementis notæ in conspectum se dent: denique vt progressu temporis suam absolutionem acquirat. Contrà vt abscessus id dicatur, tria omnino opposita quærentur, vt nil olim paruerit, vt repente oriatur, vt multum fiat. Sed si in phthoë, aut hypofarcidios, aut vitiligo appareat, dubium est an id sit abscessus, an morbus. Sed quæstio digna ponatur impetigo, aut papula (vulgo darta ἀπὸ τοῦ δάπερον) si morbus est cutaceus, vt cuius vitium tantum sit in cute, vnde ob malam dispositionem partis impetiginosæ in loco illo certo & circumscripto corrumpatur alimentum, licet illud quod affluit bonum sit & laudabile, quis metus est si topica curatione omnino tollatur? Si qui affluit humor fouens darten laudabilis erat, sed partis tabo infectus, quid inde incommodi sequetur, an quia dispositio impetiginosa de parte in partem migrabit? An quia impetigine externa extincta dabitur occasio impetigini internæ quæ multò deterior futura est? Et tamen Medici methodici cautione magna extinguunt illa vitia cutanea. Vnde Hippo. narrat de quodam Atheniensi quem *Hippoc. 1. Epid.* infestabat prurigo & species quædam lepræ: vsu aquarum αἰπῶν, liberatus est istis, sed non longè post factus est hydropicus & interiit. Credo quoniam illius prurigo & lepra erat velut abscessus vi naturæ tentatus, vt virus internum suppressum deteriorem multò affectum intulerit.

Nunc autem seriò ad illud accedamus quod nobis propositum est, nimirum vt de eruptione in totum corpus, & præsertim in febribus vel ante febres inquiramus. Primum nomina persequemur, differentias, essentiam, & vires, tum quid portentant, explanabimus. Nil est tam vulgare quam nomen ἐκδυσμα,

Celsus
cap. 28
lib 5.

Cap. 4
lib. 7.

Celsi interpretum opinione docuimus. Sic video ἀδυσήματα, nomen & papulæ & pustulæ tribui his affectionibus, vt minùs hîc hærendum videatur.

Nunc primùm quod attinet ad ἐκδύματα & καρθήματα, horum nominum exiguum aut nullum discrimen est. Et ἐκδύματα, papulas vertit Gorraeus ἀπὸ τοῦ ἐκδύειν dicta, id est, ἔκρηξιν, impetu foras prodire. His nominibus insigniuntur illæ pustulæ, quæ in febribus synochis, iisdemque pestilentibus erumpunt variolæ vulgò dictæ, & morbilli. Quod autem tum toto corpore, tum in partibus quibusdam papulæ modò vnius coloris, modò diuersi, modo liuidæ, modò nigre, aut purpuree, aut albescentes appareant, illud humorum dominatum sequitur. Et cum non in febribus intermittentibus (nisi rarò, nam & in tertianis quasdam eruptiones & pustulas toto corpore vidimus, sed erant ab incendio & feruore sanguinis potius) sed in continuis, non omnibus tamen, sed si quid aut cacoëthes sit, aut πυρετός, ideo suspectas habent febres quas comitantur tales pustulæ. Si in intermittentibus, aut in continuis non malignis apparent, illud ardorem æstûmque sequitur potius, aut prætermisam phlebotomiam præsertim in sanguineis. Vt de muliere quadam annotauimus in lib. 1. Epid. meorum. De nominibus hætenus.

Quod ad differentias tum communes, tum proprias attinet, albicant quædam exanthemata, vt quæ à pituita, alia rubent magis, vt quæ à copia sunt, & sanguinis ob dominatum fiunt; Morbilli eius ferè sunt generis: alia biliosa, vt variolæ, quæ & mixtionem bilis & pituitæ sequuntur, quædam liuent, alia nigricant, vt quæ ab incendio ortum ducunt, aut externa aliqua, eaque insigni putredine: & cacochymia accepta feruntur. Quædam ante febrem, vt ante monuimus, apparent, quædam in febre, eaque aut die critico, aut octauo, aliquando sub finem morbi, & post mortem. Vulgus purpuram vocat, quod & extinctionis caloris natiui, & extremæ corruptionis talis eruptio soboles existat. Omnino autem suspecta sunt in febribus continuis, cum cælum malignum est, aut processit diæta vitiosa, & cum eorum ilias est, tunc enim morbus est popularis, & is suspectus. Præterea signa adsunt pathognomonica, & assidentia, quæ haud bonis & eruditis Medicis imponunt. Quanquam omnium ferè morborum principia ferè ob similitudinem ex-

154 CONSILIORVM MEDICINALIVM
perientissimos Medicos fugiant.

Ac primum historiæ aliquæ ex Hippoc. afferendæ veniunt
vt quid de his sentiat audiamus. Hippoc. in Historia de Sile
no ita loquitur: Octauo, ait, papulæ cum sudore rubente, rotundæ
parvæ, varis similes (Græcè *ἀπὸ ἰσθμίου*.) permancbant, non abscessum fa-
ciebant, Græcè *ἐν ἀσθένει* ¹⁶. Mirum cur dicat, abscessum non fa-
ciebant. Sed Galen. ita interpretatur. Cum ager robore suo se-
ptimum diem superasset (nam vi morbi erat ei eo die occumbendum)
octauo papulas, Græcè *ἐκδύματα* habuit, rotundas, parvas, natura eius
morbo repugnante & pravorum humorum humorum superfluitatem ad-
cutim pellente, idque cause fuit cur non nono, sed undecimo obierit. Nam
si nil tale die octauo accidisset, nono interisset. Papulæ enim illæ
erant indicatoriæ non iudicantes. Et tertio Epid. Cum narrat
constitutionem anni qui totus austrinus fuerat, pluuius & lenis,
innumeros morbos recenset, immo & pestilentes, & innume-
ras in pudendis, & aliis partibus putredines, tandem ait, Car-
bunculi æstate multi, & alia quæ putredo vocatur, nam vt in
Comm. Galen. annotat, Etesię non perstabant, ideo erat velut
constitutio *τυρώδης*: Et addit, Papulæ item magnæ, Græcè *μεγάλα
ἐκδύματα*. Et Gal. ait, illa *ἐκδύματα* constant superfluis humoribus, at-
que qualitatem etiam non iniuria subsequuntur, cum tenues humores
exulcerationem potius quàm tumorem creent. Sed inter cætera locus
est commemorabilis apud Gal. de erutione exanthematon:
Cap. 4. Qui per calidam siccâque intemperiem fiunt morbi, atrum crassumque
de atra
bile. sanguinem reddunt. Simile iis effecit longiore ætate longa persistencia
orta, nec paucis eorum qui seruati sunt nigrorum excretio per ventrem
contigit, maximè nono, undecimo, & septimo die. Et deiectionum plures
fuerunt differentia. Quædam ad atram bilem accedebant, alia mordaci-
cia non erant, alia fædum odorem non habebant. Quædam media erant.
Et quibus hæc excretio per ventrem non fiebat, his totum corpus nigris
exanthematis scatebat. Aliis velut squamæ decidebant. Qui exa-
ctam atram bilem deiecerunt, omnes perierunt. Sed & alia quoque plu-
ribus non febrientibus per cutim crassescientem & siccescentem oriri vi-
dimus, utique natura melancholici humoris redundantiam extrudente,
cuius generis est & elephas. Vbi autem simul cum febre quicquam tale
fit, carbonem appellatum gignit melancholicus humor in cutim incum-
bens. Quod si citra febrem abscedat, cum sanguini admixtus est, elephan-
tem parit, cum solus impermixtusque, principio nigrum tumorem efficit,
dein in cancerum desinit: Plura addit Galenus eo loco hîc de inda-
stria omissa.

H. A. 1.
sect. 3.
lib. 1.
Epid.

Part. 50.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

Cap. 4.
de atra
bile.

Sed quoniam locus hic Galeni multa continet quorum explicatio plurimum lucis afferet iis quę hoc loco à nobis propo-
 sita sunt, epitome quadam nonnulla explicabimus. Primum
 est de excretionē nigrorum humorum per ventrem, & de eru-
 ptione exanthematon quę pro excretionē per aluum succeda-
 nea fuerunt. Id est, quibus venter non fluxit, iis paruerunt
 exanthemata: horum & demonstratio petenda ex Aphorismis
 cum ait Hippoc. *Deiectiones sponte venientes, qualis sanguis niger,* aph. 21.
lib. 4.
sive cum feb. e, sive sine febre, malum. In Comm. Gal. videtur ad-
 ducere exemplum illius pestiferę cōstitutionis, cuius lib. de atra-
 bile meminit: Ait enim: *Plurimas tales deiectiones vidimus in hoc*
morbo pestilenti & longo, non in iis solum qui exitio erant proximi,
quam in saluandis. Non tamen vel in principio, vel in augmento ap-
parebant. Tunc enim erant ruffa & fulua colliquamenta. Quę mox ap-
parebant, nigra erant, velut sanguinis fax, sive ipso superaffato genera-
tionem habuissent, sive extraneam corruptionem accepissent, ijs quę in
ventriculo sunt cruditatibus proportionabiliter, cum ad vitiosos humo-
res corruptio terminarit. Quare initio nunquam tales deiectiones bo-
num sunt magnam visceris lesionem indicantes, ad morbos verò consi-
stentes sequuntur sæpius, naturā superfluitates expurgante. Et paulò
post: Sponte venientes tales deiectiones multarum & malarum in cor-
pore dispositionum signa sunt. Propterea cum meminit hoc in lo-
co deiectionum nigrarum, ait eas apparuisse, nono, septimoue
dic. vt vis naturę crisin inolientis apparuerit, non perennis ge-
neratio. Quod declarat participium illud, τὸ ἐόν τῷ, vt in nostris
Definition. Medicis aperuimus. Ergo cum tempus valdē siccū
& squalens fuerit, non mirum si affati fuerint humores & deni-
grati. Quanquam talem nigritiem bifariām accidere in Com.
4. lib. Aphorism. per quandam nimirum affationem, & per
corruptionem proprię substantię. Quod notandum. Atque
mirum esse debet quomodo etiam febricitantes in pestilenti
statu & nigra deiectio, & exanthemata nigra suppletia deie-
ctionem multos à morte vindicauerint, cum alio in loco scri-
bat eos maximē in pestilenti constitutione interiisse quibus Parr. 55.
56. &
57. lib. 3.
Epid.
sect. 3.
alius fluida fuerit: Alius biliosa, pinguis, tenuis, aquosa, morbus
multis eò erupit & cum febre, & sine febre, tormina cum doloribus, mul-
torum quę in corpore supprimebantur, exitus, quę exhibant dolores non
soluebant, multę corporis partes erant affectę. Oblata egrē admittebant
purgationes multos offendeabant, quorum qui sic habebant, citò mul-

156 CONSILIORVM MEDICINALIVM

si peribant, multis malum producebatur. Deinde subiicit, unoque verbo, qui longis morbis vel acutis tenebantur, ventris vitio omnes precipue mortui sunt. Cunctos namque venter sustulit. Et Gal. idem ait: Et pestis hæc quæ nostra ætate longissima fuit, ex his quæ per aluum vacuabantur, omnes penè peremit. Hinc vides excretionem per alui in pestilentibus venenatisque febribus auxilio fuisse, aliàs lethalem fuisse. At dices, cum in illo statu alui laxitas omnes penè peremit, erat ob colliquationem, quæ omnis perniciofa est? Verum quidem illud, sed in citata ex 4. Aphor. sententia in iis qui etiam saluabantur primis diebus ruffa & flaua ab aluo colliquamenta fluebant. Solutio huius dubitationis duplex est. Prior est, omnium morborum pestilentium non est eadem idea, non eadem forma, non idem solutionis modus. Sic à nostris est obseruatum aliàs phlebotomiam profuisse, aliàs omnes periisse quibus secta fuerit vena. Quod & de alui fluxilitate dici potest; cum aliàs auxilio sit, aliàs perniciiei. Vel dicemus in peste eruptionem exanthematon, & nigras deiectiones profuisse tum lib. de atra bile, tum quarto Apho. quod vi naturæ fierent, & die critico, & non tam esset generatio perennis, quam quædam suppressio, sine insigni vitio partium principum & naturalium præsertim: Aderat tantum squalor & æstus multus qui extorret, & assat, sed aliquando non accersit putredinem insignem. Sed in tertio Epid. putredinum insignium multi insignes effectus narrantur. Item excretiones erant potius symptomaticæ. Præterea partes naturales valdè affectæ erant, & sic perennitas generationis erat. Propterea addit Hipp. quod valdè notandū, nā in hoc difficultas vertitur:

Multaque erant corporis partes affectæ.

Secundum illud quod in contextu lib. de atra bile notandum erat, est, quod exanthemata nigra dicat erupisse iis quibus aluus non fluxerit: quod herclè mirum est. Natura enim quouis sese modo liberat iis quæ ei molesta sunt. Sed cum varias differentias deiectionum statuât, cur non exanthematon tot facit? Sane credibile est adustionem omnibus eundem aërem calidum & squalidum spirantibus contigisse; at cum peculiaris putredo non est, sed pro corporum natura variat, alia longè ratio est. Et non omittam quod scribit Gal. *Cum aliis, in pesti-*

*Comm.
ad part.
35. sect. 3.
li. 3. Epi.*

leni eo statu alius abundaret succus, à statu aëris hunc auxit, tandem putredine excipiente, putrefactio pro humorum collectorum differentia variabat. Quo ex loco patet aëris statū augere humorem; quod non tam credibile, quam si dicamus aëris impuri statum proprietatem potius putredinis & qualitatem inducere, quàm augere⁷. Quod si auctio & cumulus humoris maior fiet, id ab aëre fit secundariò tantum, nempe quia per contagionem quidam humor infectus & alteratus alium affinem & contiguum afficit. Quanquam vt tempestas aliqua dicitur procreatrix, ita & conseruatrix esse solet.

Tertium notandum in textu lib. de atra bile. Non febricitantibus multis, ait, talia exanthemata apparebant, expurgantis naturæ vi: Id est, cœli, inclementia succreuerat talis humor, cuius natura cum non esset potens ad euincendum, ad excludendum valuit. Itaque in cutim refudit. Atque ex hoc loco vnam distinctionem exanthematon eliciemus. Alia cum febre apparent, alia sine febre; si cum febre, si die Critico, bonū, si modo abscessus sit par morbo: alia sine febre, illaque aut sequuntur peculiare temperamentum hominis, aut conditionem temporis. Temperamentum aut totius corporis, aut partis. Totius corporis, vt si totum corpus sit atrabilarium, dum enim defæcantur humores, terminthi, aut consimiles papulæ apparere possunt, aut partis, vt si quis sit splenicus. Quod pluribus demonstraremus nisi iam ante hoc in libro docuissimus quæ fiat vt in quibusdam eruptiones fiant in cutim aliæ atque aliæ pro natura aut partis alicuius in iis, aut totius corporis. Temperamentum explicauimus. Restat de natura temporis. Ergo si tempestas aliqua sit acervatrix alicuius humoris, mox febres ab eo humore deteriore facto & putrefacto, mox sine febribus eruptiones existunt. Sic cum talis eruptio apparet, non statim de malignitate vereri oportet, nisi assit febris & comitentur symptomata ἀερίοιοι. Tertia est quædam ratio eiusmodi eruptionis. Vidimus enim quasdam mulieres quibus stas temporibus papulæ veluti nigricantes apparent, mox in toto corpore, mox in parte aliqua. Et in nostra vicinia cui corpus squalido & sicco videtur esse temperamēto, quæ olim ab equo decussa pro mortua relicta est, & per os, nares, & similes partes sanguinem reiecit, huic ex papulæ cum pruritu apparent sine damno vlllo. Dubitamus an id peculiari temperamēto tribui debeat, an quod

iunior vidua facta sit, an decussus ab equo causa sit, vt interna quædam sugillationis relinquantur vestigia. Aliam vidimus cui cum vlcus in tibia olim fuerit, ab eo est liberata. Sed certis temporibus, in tibia olim affecta apparent ex anthemata pruriginosa, veteris vlceris memoriam renouantia. Idem in multis obseruauimus quibus vel fracta pars, vel vlcerata olim fuerit, vel contusa, vel similiter affecta. Huius rei rationem inquirendam relinquimus iis qui arcana naturæ maiore otio scrutantur. Multis item mulieribus non mensstruis erumpunt exanthemata, & *an vias* euanescent. Ita persequemur clarius sub finem huius tractatus.

Quartum notandum in textu libri de atra bile est de varietate affectuum à succo melancholico nascentium. Vbi duo aduerrenda: prius de carbunculo quem non sine febre nasci ait. Cui repugnant Celsus & Aegineta. Et herclè multis sine febre nascuntur carbunculi. Intelligi volunt cum febre nasci præsertim si occupent partes neruofas, præterea non statim dum apparet, mox febris adest, sed in incremento. Posterius est de mixtione humoris melancholici. Ait enim aut misceri cum sanguine, aut non misceri. Si cum sanguine miscetur, aut cum febre, aut sine. Si cum febre, pessimum morbum inducet, si sine febre elephantem. Si non miscetur, sed secernitur, tumores facit, qui scirrhi initio appellati, in caneros degenerant. Sic quæres hoc loco, an vt fiat elephas necesse sit sanguinē ab atrabilario humore mixto infici, cum elephas videatur esse morbus cutaceus, & multis elephâticis sanguis detrahatur sanguini ferè sanorum simillimus.

Sed hæc ad explicationem contextus Galeni adducta sint, nunc persequendo disputationis filum ex Galeno etiam adducere oportet, & ex Hippocrate alias historias si quæ restant. Hippoc. cum constitutionem temporis siccam & squalidam narrat, inter cætera scribit: *Fiebant autem in febribus æstatis circa* 7.8. *& non a diem in cute aspritudines miliacea, Græcè πριμα κίχιδες, cuticum moribus similes, non valdè pruriginose. Hæc perseuerabant ad indicationem. Nulli masculo tales erupisse vidi, nulla autem mulier mortua est cui hæc fiebant. Qui locus notandus est. Et herclè tales maculæ, & velut papulæ non declarabant malignitatem, sed feruentem quandam & veluti scintillantem sanguinē per squalorem æstatis. Et cum mulierum corpus densum sit,*

2. Epid.
sect. 3.

id quod per insensilem transpiratum effluere debebat, id manifesta sui vestigia in cute relinquebat. Sic temerè de huiusmodi efflorescentiis non est pronuntiandum. Nunc de puncticulis (quoniam ad *καὶ ἐπὶ τοῦ*, id est, cuticum morsus accedunt) disseramus. Langius accuratus scriptor ita de quadam febre, vulgò dicta lenticula scribit: *Tradit Fracastorius anno 1528. febrem contagiosam, malignam potius quàm pestiferam in Italia paruisse, quæ ex Cypro migrasset: hanc puncticulam & lenticulam appellabant, quod maculis, lenticulis aut pulicum puncturis similibus scateret. Ac verum quidem quosdam morbos exolescere, alios novari, idque ob varietatem locorum & temporum, sed negandum est novos oriri quorum vestigia nunquam apparuerint. Immo & ipsa febris lenticula dicta, id docet quod olim grassata est.* Declarat Aëtius dum ait: *Gignuntur exanthemata principio febrium non simplicium, sed malignarum, Græcè *κακογενήματα*, sparsim per totum corpus vibices, Græcè *κνέμεις*, aut macule pulicum morsibus similes. Valeant igitur qui innumera morborum multitudinem vallati novos excogitant morbos.* Sed Langio non erat exquirenda Aëtij autoritas quam Fracastorio opponeret, cum id ipsum ex antiquo magistro Hippocrate deprompsimus.

Quod postremo loco propositum erat persequamur, de viribus nimirum & signis eorum quæ in corpore efflorescunt, siue in vna tantum parte, siue in toto corpore fiat *ἐν ὅλῳ τῷ σώματι*. Quanquàm maxima ex parte dum promiscuè rem tractaremus satisfactum est, tamen peculiari magis tractatu id est discutiendum. Demonstravimus iam bis aliquid variè efflorescere, seu in parte aliqua, seu in toto corpore, aliquando ratione peculiaris affectionis corporis, aliquando peculiaris dispositionis, aut pulmonis, aut splenis, aut hepatis: siue macula sit simplex, siue papula, siue pustula, aut aliquid consimile. Pleròsque videas hepaticos exanthemata in facie manifesta habere, lienosos verò multiplici tuberculo infici, mox terminthis, mox aliis carbunculos referentibus. Pulmonicis & phthisicis rubor genarum cōtinuus, aliis *πυρεοί*, aliis circuli in tibiis, vt in iis quibus conuellantur pulmonis articuli. Atque idem est iudicium de puncticulis, *Hippoc. lib. 2. de morbis.* exanthematis, maculis pulicum morsibus similibus, aut miliaribus, siue cum febre, siue sine febre appareant, siue in tempore pluuio & austrino, siue in aquilonio appareant, siue morbus sit popularis siue non, aut *ἐνδημῶς*, ratione cœli, aut *ἐξδημῶς* ratione diætæ, aut soli ipsius vitio. Cum enim tenella corpora pueror-

rum & maiusculorū in febribus, rubiolis, aut variolis inficiuntur, proserpit ad alios malum, & simili tabo alij facile inficiuntur. Vt ea ratione non tam ad reliquias sanguinis materni impurioris hæc tabes sit referenda, quàm ad cœli & aëris morbum. Declarat facilis per contagionē ad alios traductio, & quod certis tātū tēporibus tanta exanthematon & ecchymaton ilias est præsertim in febribus continuis & malignis, quarū vrinæ sunt planè laudabiles, vt in certis vrbibus pauci huius morbi vim euadant. Quibus pauca apparuerunt, ij sæpè pereunt, recondito intus veneno: quibus plura, cum iis malè agitur. Et reliquæ horum sæpè sunt crudelissimæ; immo nos ipsi vidimus (quod in nostris Epidemiis obseruatum est) successisse vlcera telephia, & quæ non minora minúsque mala essent quàm quæ impuralues Venerea infligit. Quod & annotat Paræus. Mul-

i. Cap.
libelli
de puerorum
papulis.

Lib. 2.
de abdi-
tis rerū
causis.

In Coacis.

Lib. 2.
Prorrh.

4. Epid.

7. Epid.
demiorū

Hip. 7.
Epid.

tō plura liceret ex Fernelio desumere dum docet exanth. & ecchymata pestem sæpè tanquam præcedere, & in iis aliquid cœlitus impressum esse, nō ex reliquiis sanguinis menstrui esse: sed necessario à cœli morbo id pendere.

At si quibus ea ferè exanthemata apparent, quæ in aliis morbis malignis visuntur, non propterea terreri oportet: cum mille modis efflorescere possint: Hippoc. ita scribit: *Quibus saluagino/a sputa & tussis supprimitur, iis corpus à pustulis rubescit.* Et in Prorrhético. *Mulieribus quidem in capitis doloribus alia quidem sunt quæ & viris, verū punctura pruriginosa, & affectiones arrabularie mulieribus minus quàm viris, si non menses penitus aboliti fuerint.* Et alio loco. *Pustula ex lassitudinibus non valdè fortibus perueniunt ad septimam liuida, exantivias, vocat eas pustulas.* Et in Aphor. verè exanthemata vlcerosa ait in cute apparere. Et in Epid. Timonactis filio fermè bimestri exanthemata in cruribus, coxis & lumbis, & imo ventre, & tumores valdè rubicundi⁸. His sedatis conuulsiones & comitiales fiebant, sine febribus multis diebus, & mortuus est. Et inter cæteros locus est insignis apud eundem de quodam Andrea acutè febricitanti. Insignis ardor & adustio: circa 25 diem pustulæ per totum corpus pruriginosæ, calidæ, veluti igne ambustæ, Græcè *καυδίνουσα*, conualuit. Credibile est tales pustulas non fuisse malignas, sed sequi & humorum adustionem & febris incendium. Et in Coacis: Quibus in febribus continuis pustulæ per totum corpus erumpunt, lethale, si non purulentus abscessus fiat, maximè

ximè autè circa aurem his fieri solet. Et alio loco, Euphranoris filio pustulæ velut culicū morsus apparuerūt, verū modico tēpore, postridiè febricitauit. Et in Coacis: Pustulæ serpiginosæ ^{In Coacis.} supra inguina, ad laterū mollitudinem, & pubē orientes, aluum malè affectam significant. Et de tabidis: Pustularum eruptiones velut ferro lancinatæ, habitus tabem significant. Item, Circum oculos pustularum eruptiones in virium refectionibus, aluum humectant. Nos vidimus mulierem quæ ex eo certò colligit se concepisse cū exanthemata apparēt in corpore. Atque hæc exanthemata in toto corpore, aut maxima ex parte apparebant. Sed alij sunt loci in quibus Hipp. obseruat eruptionē pustularū. ^{Lib. de vuln. cap.} Vt in morientibus præ vulnere capitis pustulæ in lingua apparēt. Et mulieri anginosæ cū conuulsa interiisset, sexta die signū circa manum subliuidum apparuit. Denique si in febribus aut continuis, aut intermittentibus sectio venæ differatur, & serum re- ^{Ad finem s. Epid.} dundat, cum illud impensè calefactum est, & refrigerium deferat, tum in vasis feruens pustulas & exanthemata excitat.

Sed exanthemata, & rubiolæ, & morbilli præsertim cum sunt venenati, horrenda adsunt symptomata. Febris adest affi-
dua, nunc ad manum mitis, nunc acerrima & adurens, vocis
raucedo, oculorum aliquando caligines, & mox ardor eorum-
dem, corporis totius deflagratio, iactationes, lassitudo ^{ἰσχύος},
^{ἀνισμῶς} vterque, membrorum veluti quassatio & confractio; ali-
quando faucium exulcerationes, ac veluti anginae metus, pro-
pensio in somnum, sed cum turbulentum, oculi lacrymabundi
& lucem refugientes, inappetentia summa, multorum & vario-
rum vomitiones, alui astrictio aliquando, aliquando fœda illu-
uies, corporis pruritus, & veluti acicularum puncturæ, tussis:
& prout venenum magis has aut illas partes appetit, ita varia
excitat in variis partibus symptomata. Vidimus qui quere-
rentur de scapulis & dorso, ac si ruptio compagis ipsius spinæ
esset, & velut membranarum ^{ἀπόσπασμα}, & velut ^{ἀνεύρημα} mem-
branarum. Obseruarunt enim quidam eodem modo dilata-
tionem in membranis contingere, & tendinibus, quo in arte-
riis: vt in arteriis propriè aneurysma dicatur, in venis ^{σπασμὸν} &
^{κίρσιν} in membranis ^{ὕμενυσμα}, sic enim liceat verbum confinge-
re ^{ἀπὸ τοῦ εὐρέναι τὰς ὑμένας}. Nisi fortè veteres, qui asserunt membra-
narum & neruorum distensiones & diuulsiones esse aliquas,
& ^{ἀνεύρημα} nomine includi, deceperit vocum Græcarū igno-
rancia.

rantia. Vertunt enim nomen ἀνέρυσμα, enervationem, quod nomen ducatur ἀπὸ τοῦ νεύρι, cum contrā sumatur ἀπὸ τοῦ εὐρύγειν, id est, aperire, dilatare: Quod arteria dilatetur. Sed sit ita, relicto verborum aucupio, quemadmodum venæ, vel vi congestiois dilatantur, vnde κίρσις dicitur, quem κίρσι in venis pulmonum fieri Hipp. libris de morbis scribit, vel per venenati flatus repentinum affluxum, item arteriæ, vel congesto sanguine arterioso, vt imprudenter arteria aperta, ita membranæ & nervi possunt aliquid pati quod venarum & arteriarum ancuryfmati proportionē respondeat.

7. Epid. Ergo vt ad rem redeamus, exanthematon præsertim malignorum sua sunt pathognomonica. Ea paulò ante exposuimus. Nec alienum erit huc adducere iam commemoratam historiam cuiusdam nomine Andreae, cui 25. die morbi exanthemata πνεύματι apparuerunt: Et diebus præcedentibus hæc aderant: os reficcabatur, nullam potionem admittebat, multa iniucunditas circa os erat, lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat ἐχέλευκος: vigil, anxius, exolutus, κεκλόμενος quassatus & fractus, & infinita alia, post quæ tandem pustularum eruptio paruit. Et reuerà depingit verè ea omnia quæ erumpentibus pustulis malignis apparere solent.

Quod ad pulsum attinet, ille calori non est analogus: nam sæpè frequens, paruus, nonnunquam intercalare habet intermissionem. Atque hoc dicam. In rubiolis, & rubentibus pustulis vbi potius quantitate res peccat quàm qualitate, & sanguinis feruor est, pulsus altus, magnus, plenus & frequens est, & tunc phlebotomiæ locus est. Sed cum vitium potius est in qualitate, demissus, languidiusculus & frequentissimus est pulsus. Quod notandum.

¹⁰ Itaque in eiusmodi eruptionibus cautos esse oportet. Si ante febrem appareant, continere se lecto oportet, vt ἐν διαφύκῳ fiat corpus, & nil mouere, nisi fortè blandum enema subiiciatur. Interea si qua urgent symptomata, vt vomitiones, tussis, & oculorum dolores, calenienda sunt. Bonum est dare id quod sudores prouocet.

℞. Scabios. morsus. an. m. j. radices dictami, & foliorum eius. an. ℥j. lentium. p. j. ficus & passulas. an. ʒj. glycyrrh. ʒi. s. kermes xi. seminis citrij. ʒj. radices squinae aut sarsepar. ʒss. radices angelica ʒj. fiat decoctio in aqua melissæ, & sinuialis. an. (quantum suff. addes & i.

num album, si non adsit febris) in col. dissolue pulueris diamargar. frigid. gran. 4. iheriacis ʒss. sacch. parum, fiat potus.

Valdè conferet sudorem prouocare, vt malignæ qualitati humoris via pateat.

Si sub finem febristalia appareant, & satis legitima quantitate vt abscessum faciant, theriaculis aqua remista aliis aquis cardiacis conferet. Si in vigore febrili, à calidioribus cauendum, sed si infra subsistat ea excretio, non alienum quoque erit cardiaca temperata dare, addito decocto squinæ.

Epithemata regioni cordis applicari possunt; non probo ad regionem hepatis, quod impediatur motus naturæ, & excretio materiæ virulentæ.

Quod ad sectionem venæ pertinet, innocuè potest celebrari antè iam factam eruptionem. Nam cum apparent iam, nisi fortè videas tantam esse plenitudinem, vt ea sibi quasi viam obstruens, & naturam premens, liberum exitum præpediat, nō alienum erit venam tundere. Cum tamen malignitas summa est, & languida facultas vitalis, cum meditatione omnia agenda sunt. Annotauimus in nostris Epidemiis, in eadem familia liberos multos exanthemata passos, quibus cum nil tale expectaretur, data medicata potione ij melius habuere, & perfectius curati sunt, quàm quibus dare medicamentum, ne excretio impediretur, relligio fuit. Immo, dato medicamento (nisi fortè validius fuerit) & aperta vena, eruptio citatur, & accersitur. Quidam primarius Medicus affirmat se sine vlllo damno cuidā famulæ iam apparentibus pustulis larga copia, venam aperuisse, sanguinemque plena manu detraxisse, cum suffocationis esset periculum. Cur non idem in cæteris factitari poterit, præsertim si quid sit quod vrgeat? Pulsus id testabitur. Qui si paruus & frequens, cunctantius id fiet, si plenus, altus, & magnus, audacius. Nec imbecillitate pulsus terreri oportet, si ea ab oppressione sit. Sæpè enim tanta est oppressio, & ob plenitudinem conculcatio, vt sese pulsus non explicet. Sed an imbecillitas pulsus sit per se, an ex euentu, proprium est prudentis Medici diligenter inquirere.

ANNOTATIONES.

1. Tamen apud Hippocr. 1. Prognost. πόνος αὐτὴ τῷ ἀλγῆματι καὶ ὁδῶν συ-
mitur.
2. Apud Hipp. 2. Epid. sect. 3. ita legitur, fiebant in febribus circa
7. 8. & nonam περὶ ἡμέρας καὶ ἡμέρας culicum moribus maximè similes
hæc perseverabant ad crisin usque: Nulli masculo eruperunt: Nulla mul-
lier obiit cui id contigerit. Et gravi auditu prædita & soporose erant.
Legatur locus totus quia præclare facit ad tractatum de exanthematis.
3. Quis enim dubitat quòd non sit aliquis morbus ipsius habitus corpo-
ris, non repetita à corpore interno origine.
4. Ἰδὲ ἑστὶν Celsus pustularum nomine comprehendit. Plinius vocat pa-
pulas sudorum: Avicennas plantam noctis. Manard. Ep. 2. lib. 7.
5. Episto. 2. lib. 7. Manardus docet sub nomine impetiginis & pa-
pule tractari eum affectum quem lichenem vocant. Ita tamen ut papula
sit quid lenius quàm impetigo.
6. ἢ ἀπὸ τοῦ αἵματος, idem est quod alio loco, sect. 1. lib. 2. Epid. dicit abces-
sus fieri ὑπόπυον καὶ καὶ αὐτὸς τὸν μεμβρανῶν. Vide pag. 176. Interpres ver-
tit, non pro rationis excretionis morbi dignitate sit abscessus.
7. An aër potius qualitatem inuehat, quàm copiam augeat. Est enim
illud animaduertendum qua ratione tempestas, & aëris constitutio hu-
mores & spiritus afficiat. De spiritibus quidem nemo ambigit, sed de
humoribus maior dubitandi occasio. Tamen hoc existimo fieri bisariam,
aut potius tribus modis: primum à parte, quia aliquis, sed is paucus suc-
cus ratione tempestatis gigni potest, præsertim si corpus suscipiens aptum
sit, & paucus hic succus alium augeat, & veluti creat contagione quadam,
qua opinio Galeni est in hoc loco citato. Secundo modo afficiendo partes.
Nam Austrina tempestas nervos afficit & cerebrum, quæ affectio peculia-
rem succi generationem facit. Tertio, per modum impressionis. Nam fit
impressio caliginis, aut squaloris, aut ichoris, &c. Et id est aliquid diui-
num esse. Potulenta quidem & esculemæ afficiunt corpora ut & aër, sed
ea distinctio. Nam aër promptius & facilius, alimenta longiore tem-
pore, sed impressio etiam contumacior.
8. Notandum quòd talis eruptio fuerit sine febre, & quòd tam sanis
& pestiferi affectus suppressionem fuerint consecuti.
9. Sed & notandum quòd observamus in nostris Aduersariis, nimi-
rum puellis quibus ἀξιοδότης, non facta est excretio, dolores & tumores ar-
ticulorum contingere penè immedicabiles. Nam materia ista benigna



HISTORIA SEXTA.

AMORRHÆI Consulis pusto quadrimestris terminibus vexabatur, ut colligere erat. Non longè post aphonos, oculos intorquebat, conuellebatur. Mirum hoc, repentè facies mutabatur, tanquam conantis aliquid excutere: deinde velut comprimebatur, tuncque occurrebat in os spuma, & spiritu veluti compresso diu, quasi ad se rediens magnum spirabat, eorum more qui contentione animi aliquid intuentes spiritum cohibuere. Per totam noctem conuellebatur tantum brachio sinistro, & illud conuulsorio modo agitabatur. Deinde cessante hoc, idem brachium dextrum passum est. Et ex intervallis occurrebat spuma magna copia, & aphonos erat, & excreta spuma saluâque magna spiratio, tunc restituebatur. Epilepticum hoc fuit: prouisum ventri aliquid *ouyevēs*.

COMMENTARIVS.

QUO tempore puellus iste ea passus est, dolores capitis multi grassabantur, & crudeliss. hemicrania, & omne penè genus morbi partes capitis exercebat. Vt non sit mirum si in ista clade tenellum corpus pueri affectum fuerit. Aderant tormina, ut qui à ventre vapor

efferretur, dolorem excitaret, & inde alia quæ sunt consecuta¹. Sed cum cerebrum natura esset molle & delicatum, & ex euentu veluti cereum cranium molliculûmque, non mirum si minima occasione perculsum fuerit. Procatarticû potuit esse à partibus inferioribus, deinde obfirmata sedes in capite ipso. Nam si venenata materia in cerebro coercita fuisset, credibile fuisset grauiora symptomata sequi debuisse. Sed cum in ventre dolor ab humore acri, & æruginoso excitaretur, compatiendi lege facile cerebrum laborabat. Sic nos obseruauimus mollitudinem cranij & repletionem cerebri à multa aqua & humiditate excrementitia, maxima ex parte horum causam fuisse². Nam nerui erant veluti impotentes, aquei, madefacti & effœminati, adeo vt Epilepsia ista potius esset à copia humiditatis, quàm à mala qualitate. Quod autem mirum fuit, est quòd cum Epilepsia magna & multa forent argumenta, tamen alterutra tantum parte conuelleretur. Sic non erat simplex conuulsio, quod cerebrum obladeretur, quòd aphonia esset, quod spuma adesset, quod periodicum esset malum, nec omnino Epilepsia, quod totum corpus non conuelleretur, sed vna pars post alteram, cum tamen nulla paralysis secuta sit. Quamquam in primo Tomo Consiliorum nostrorum annotauimus ex Hippoc. Epilepsiam definiri posse conuulsionem à cerebro ortam, eamque circa tantum vnam partem. Quis enim dubitat quominus prout humor cõuulsionis autor potius irrepat in eam, aut illam partem, à qua nerui diuaricantur, ita in dextra aut in sinistra parte conuulsionem afferat? Sic istius puelli morbus velut ambigebat inter veram Epileps. & conuulsionem propriè dictam. Euasit tamen, quòd & alius sollicitata est blandis clysmalis, & dolores torminosi sedati, ne exacerbati cerebrum percellerent, data theriaca quæ scilicet prouocaret, suffitus ex mastiche & olibano ad cerebri mollitudinem corrigendam³. Radix pœoniæ appensa collo, quam fugare Epilepsiam autumant. Nec tantum tamen & credamus, quin ad alia remedia confugeremus. Nec enim facienda erat tanti eorum autoritas qui de reconditiore radicis pœoniæ vi aliquid dixerunt, quàm nouorum remediorum inuentione teneritudini ipsius pullionis prouidendum, quæ tanto morbo ferendo non esset.

ANNOTATIONES.

1. Error in hoc maximus committitur in pueris, quod statim ab usu pulvis & lactis nutrices eos dormire faciunt. Quid enim ad cruditatem generandam facilius? Hinc Epilepsia & consimilium morborum occasio.
2. Caput & mollius & iusto crassius habet: Vt mirum non sit si Epilepsia obnoxius valde sit etiam ante *ἡλικίαν*. In ea enim familia non dentunt ante decimum vel undecimum mensem. Ac verum illud Arist. li. de somno & vigilia: Cum supernarum partium magnitudo in prima ætate infernas excedat, non mirum si prima ætate Epilepsia obnoxia sit.
3. Circa silentium Luna February idem malum repetit ferè auctius: & nunquam tanta in pulsu mutatio observata est: Statim à paroxysmo difflebat multa salina ab ore vi excernentis natura. Aëtius in eiusmodi morbo pulverem ireos, aut cyperi capiti aspergit, caput aut irino, aut anethino illinit: melle quoque ad litum vitur. Nec non delingendum mel dat, præonia radicem appendit collo ut contingat stomachum.

HISTORIA



HISTORIA SEPTIMA.

ISSÆI Consulis uxor septimestrem
 fœtum gerens tenasmo tentatur, &
 fluxu velut dysenterico: non multò
 post febris continua. tricesies de nocte
 desidebat, sed inanis erat conatus. De
 abortu metus fuit. Malum fuit maximè à regione
 hepatis colluuiies humorum delabens. Rheobarbaro
 locus fuit: item & soli Cassiæ. Varia clysterum
 genera imperantur. Bis secatur vena, iniectiones sunt
 in rectum intestinum. Omni que modo noctu diuque
 dolores leniuntur abortionis metu. Conualuit.

COMMENTARIVS.

IN secundo libro nostrorum Epidemiorum ani-
 maduertimus circa mensem Ianuarium maximã
 mulierum partem morbis affectam esse, immo &
 per totam hyemem, cum tamè præcessisset Æstas
 & Autumnus ferè squalidus & siccus. Immo per
 sex ferè menses pluuiarum carentia fuit. Citauimus ex Hippo.
 existere aliquando tempora in quibus ferè mulieres laborant. sect. 9.
lib. 2.
 Nam loquens de pustularum eruptione in squaloribus ait: *Nulli Epid.*
masculo tales erupisse vidi. Et eo loco quæsitum, cur in squalori-
 bus, & post squalores tanta morborum ilias præsertim corpora

Tomus II.

Y

170 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ser. 2.
lib. 1.
Epid.
par. 78.

ad
par. 55.
ser. 3.
lib. 3.
Epid.

muliebria afficeret: Deinde cur non potius viri, cum mulierum corpus frigidum & humidum in squalente statu, tanquam gauisurum modico contrariorum vsu, melius habere posse videatur. Vbi notauimus ex sententia Hippo. existere posse tēpus in quo & mulieres, & iuniores viri simul laborent: quod absurdum videtur, cum contrariū vtrorumq; sit temperamentū. Sed Gal. docet aliud esse laborare per generationē proprii humoris, aliud per suppressionem. In siccitatibus corpora iuuenum propensiora sunt ad morbos quos serum malum parit, quia & ratione temporis, & sui proprii temperamenti talem humorum ichorem & serum generant: Sed mulieres tales morbos incurrunt, quia corpus habent minimè perspirans. Morbi autem occasionem dat non tam generatio ipsa, quam suppressio. Tempus enim ex se parens est sæpè maliferi. Quod dum supprimitur ob difflatum prohibitum, tunc dicitur morbus generari per suppressionem. Sed cum corpus est ipsum biliosum ad τὸ ποικιλικόν, accedit ἐπιδερμικόν. Vt corpus iuuenum laboret vtraqueratione, & ratione τὸ ποικιλικόν, & ἐπιδερμικόν: mulierum verò potius ratione τὸ ποικιλικόν. Huc enim pertinet locus præclarus, quem iam ante expendimus, vbi Galen. ait disputans de squalida & pestilenti constitutione: Cum aliis atque aliis in pestilenti statu alius atque alius abundaret succus, à statu aëris hunc, supple succum auxit. Id est, & qualitas noua inducebatur, & substantia ipsius succi augebatur, producta ac promanante longius putredine, ab ipsius aëris morbo & vitio. Quanquam illo loco diximus id fieri καὶ τὸ συμβεβηκός.

Ergo mirum fuit Medicis, cur eo statu potius mulierum genus morbis tentaretur. Sed vnum notandum est. Maximè eæ mulieres afficiebantur, quibus viscera calidiora sunt, vt eæ ratione ad masculorum iuniorum temperamentum accederent.

Quicunque tunc morbi vagabantur, à quodam indomito sero erant, vt iam dictum, derépète suum virus & ferociam exerente alias in caput, vnde incredibiles alterutrius partis dolores in capite vidimus cum lenta febre, & pulsu insigni in temporibus quem Hippocr. καὶ σιδή των ολεων ἐν τοις κροτάφοις vocat, in aliis ophthalmiæ ficcæ; in aliis prurigines in aurium profundo molestæ; in aliis ventris inferioris dispositiones inflammatoriæ falso colicum dolorem referentes. Et maximè corripiebantur.

tur corpora ἀσθενήματα. Quod autem malignum foret id serum, declarauit subita morbi adorsio. Nam citius dicto, & ita repente inuadebant. Itaque illa ἐπισημασμένη ἀθεΐα, virus & ferociam designabat: vt aliis ex locis explicatum est.

Tenasmo tentatur, & fluxu velut dysenterico.

TEX-
TVS.

De tenasmo pluribus non dicam. Solum afferam aliquam diuisionem. Alius dysenteriae comes est, alius antesignanus: alius hæres, alius nec sequitur, nec præcedit, sed sequitur. Qui hanc mulierem affligebat, erat comes fluxus dysenterici: cuius causa non tam erat vlcus intestini, quam cacochymia & feri malicopia, quæ dum pertransiret intestina, eorum membranas offenderet, & sua acrimonia deraderet. Accedebat irritatio sphincteris, & veluti ἐπιπορεύματα, vt minima occasione cogeretur ad desidendum. Locus est præclarus apud Galen. vbi explicat quomodo inappetentia dysentericiis est tanquam ἐμπύημα, aliquando comes, Ita autem scribit: *Dysenteria fiunt ex humoribus acerbis. Primum summa occupantur, deinde profundiora, & vlcera mala sunt. Quo maximè tempore ventriculus offensus lege symphæ cibum fastidit. Et tunc est velut ἐμπύημα, & malum est vt signum, & vt causa.* Deinde subdit, *Fiunt quidem ab initio dysenteriarum fastidientes agri ob malos ichores fluentes ab hepate, à quibus raduntur intestina, præsertim si amara bilis naturam habuerint. Nam superfluitas horum ad ventriculum defertur. Centies enim docuimus quemque humorem habere duas partes, tenuiorem, à qua in longinquiore partibus excitantur varia symptomata; crassiorem, à qua in parte cui inhæret surgunt alterius generis symptomata.*

ad
Apho. 3.
lib. 6.

Febris.

Galenus amplissimè loquens de hepate, & eius affectionibus, docet vitio hepatis multos laborare diuerso modo. Nam aliàs eius propria substantia afficitur, vt cum intemperies eam afficit, & proprium eius parenchyma, & ex Erasist. Gal. assumit, aliàs venæ ipsæ quæ à gibbis ad sima tendunt, aliàs materies, & colliues circum partes eas multa est, vnde morbi fouentur. Nam cum ea materia putrescit, tum febris accersitur putris. Et eodem

Cap. 7.
lib. 8.
de com-
positione
medica.
secundum
locos.

loco fusiùs explicat varietatem excrementorum, siue venæ ob-
 turatæ fuerint, siue hepar ipsum affectum sit, siue collectio sit
 humorum. Quæ omnia non explicabimus, quoniam in immen-
 sum oratio prouheretur. Sufficit locum designauisse: In no-
 stra muliere corruptorum humorum cumulus erat, vt iam de
 hepatis propria affectione dubitaremus. Ideo secta vena est bis.
 Mirum tamen quibusdam videtur quod fluente aluo vena ape-
 riatur. Nam vel id quod fuit symptomaticè fuit, nimirum ob
 perennem generationem, aut laxitatem partium, aut facultatis
 retentricis imbecillitatem; vel acervatio erat humorum corru-
 ptorum, quam natura amolitur per fluxum alui. Si prius, non
 est locus phlebotomiæ, ideo Hippoc. dicebat, Si sanguinem
 vis detrahare, ventrem confirma. Si posterius, naturæ totum
 munus sinatur. Nam sic euacuatur febris causa. At sæpè
 iam antequam natura spontè aluum sollicitet, aut copia ipsa ma-
 teriæ sibi viam fecerit, massa sanguinis infecta erat dissulo sero,
 & tenuiori materia à crassiori in imis corporum restagnante,
 desecta, vnde nisi perflaueris sanguinis massam, maior corru-
 ptio sequatur. Morbi non citò fiunt, sed sensim. Et cum sese
 proferunt, iam labes peruaserat multas partes. Vnde quibus
 primo morbi die sanguis à natura alienus detractus est, an cre-
 dibile eam corruptionem vno die contingere potuisse? Itaque
 ad euitandam febrem, aut si adsit, iugulandam, modò non sit
 symptomatica, solùm aperienda vena est. Dixi, modò non
 adsit symptomatica, quoniam ob vigilias, & inanes de surgendo
 conatus, & motum ipsius prauæ materiæ, sæpè incalescit cor-
 pus. At tali calori non debetur phlebotomia, sed quies, & sym-
 ptomaton remissio. Verum cum essentialis febris putredine
 diffusa ac communicata vasis, tam necessaria est phlebotomia,
 vt si ea prætermissa fuerit, graue sit peccatum. Nec argutulus
 dicat malè nos dixisse, non secandam venam si symptomatica
 febris. Nam, dicet, si inflammatio interna, quæ adest febris
 symptomatica est, nunquid omittes phlebotomiam? At hoc
 loco febres reuerà existentes, siue ob inflammationem, siue ob
 putredinem, in censu verarum febrium habentur. Sed & no-
 tare oportet ad tollendam febrem si ea aliquid commemorabi-
 le habeat, plurimum conferre phlebotomiam præcautionis er-
 go. Nam si insignis febris ob vigilias & motum tetraë mate-
 riæ surgat, quæ ad fluorem accesserit, metus est periculi. Adde

4. Acc-
 so.

quòd febris ipsa corpus infirmat, & alimentum corrumpit, unde cacoehymia accumulatur. Itaque cautos esse admodum Medicos oportet, ne temerè phlebotomiam celebrent, aut imprudenter omittant. Atque huic nostræ agræ plurimùm ea contulit.

Malum fouit illuuias humorum à cauis hepatis illabens.

Et allapsus affluxusque humorum, & colluuias mediis intestinis sparsa tandiu malum fouit. Nemo enim dubitat, quin dum repurgat naturâ mesenterium, & caua hepatis, quicquid capitur alimenti corrumpatur, naturâque solùm nescio qua benigniore aura fruatur. Contactu enim decurrentis à mesenterio materiei chylus à ventriculo defluens contaminatur. Sic nos credebamus non esse tam ipsa intestina læsa, quam partes superiores aut læsas, aut colluuias plenas ac infectas. Sæpè enim figuratum & satis laudabile *διαχόρμα*, id est quòd secedit, & tamen intestina ex se integra sunt. Sicut non est necesse ut in excremento color aliquis sit, ut inde significetur bona dispositio ventris inferioris. Verba Galeni hæc sunt: *Hippocrates ne meminit quidem coloris excrementi, quoniam non magnam vim habet ad inferioris ventris dispositionem benè indicandam. Nam quod id excrementum sit benè concoctum, sufficiunt hæc signa, molle, figuratum, &c. Fieri enim potest, ut venter circa proprium munus robustus sit, sed vel propter viciniam adiacentium partium caliditatem exugatur, atque exsicceat, quod benè coctum fuerit, aut propter distributionis imbecillitatem humidius quàm oporteat, egeratur: & cetera.* Quod autem dixit colorem excrementi magnam vim non habere ad ventris inferioris dispositionem significandam, id fortè mirum sit. At color bonum vel malum signum est ex euentu. Nam à cysti maximè hic color pendet. Si saturatus bile sit excrementicolor, eius nimietas pendet: sin decolor & albicans, obstructio significatur. Ergo ut ventris inferi bona œconomia significetur, nil color facit. Modo enim coctio bona sit, & substantiæ ratio qualis esse debet, adsit, satis est. Immo intestina, quæ inter partes ventris inferioris habentur, non coctionem iuuant, sed distributionem, si modo vera quæ in libris de usu partium demonstrantur.

Cap. II.
lib. I.
Criseon.

Rheobarbaro, Cassia, Clysteribus fuit locus.

Remediis multis tentata res est, & cum non viderentur proficere, secuti sumus consilium Celsi, *In acutis citò mutatur quod non prodest in longis quos tempus ut facit, sic soluit, non statim condemnatur, si quid non profuit.* Minus verò remoueat, si quid paulum inuit, nam profectus tempore expletur. Maximè verò in clysterum vsu morati sumus. Ac primùm iniecti sunt clysteres ex lacte incoctis ficibus, chamæmelo, tapso, rosis: dissoluti vitelli ouorum, non saccharum, ne irritaretur intestinum. Facile enim id eueniebat.

Alia instituuntur enemata coquuntur radices altheæ, ficus, rosæ tapso, dissoluitur puluis ouorum in furno induratorum.

Alia instituta ex decocto capitum papaueris albi.

Tandem acceptum est decoctum capitis veruecini ad obducenda intestina.

Frequentia apozemata.

Cassia exhibita est, & valdè profuit. Quod fortè mirum sit. Nam intestinis ita irritatis, bilioso ichore plenis, immo & veluti effœminatis, lenientium medicamentorum vsus non est tutus. Tamen plus visa est contulisse, quam quoduis aliud. Nam cum caloris ingentis opinio est, cum humor qui defertur est valdè acer & mordax, potius conferet cassia cum thamarindis, quam quoduis aliud medicamentum. Lenit, mitigat. Et si parum laxauerit intestina, facile postmodum robur eorum conciliabitur.

Sedi sæpè applicatum vnguentum populeonis, muccag. seminum psyl. cytoniorum. Facta iniectio ex aquis refrigerantibus, & colyrio albo Rhasis.

Abortionis metus.

Omnis enim vehemens conatus abortum minatur³. Quod cum mulieribus tenesmum patientibus eueniat, non mirum si metus sit ne fœtus elidatur. Quæ omnia facilius repetentur ex Aphorismis Hipp. Hæc sufficiant ad prædictam historiam. Idibus Aprilis 1576.

ANNOTATIONES.

1. Ad hanc historiam referenda est historia Florentij De Baillet, serui, dysenteria cum multa cacochymia & tenasmo laborantis. Nullum pene clysterem admisit. Ne quadrantem quidem hora in lecto continebatur. Nos usu castie, amygdalatorum, lactis vaccini & similium eum curauimus. Incredibile est quantum bolus castie frequenter repetitus profuit: Quod tamē est contra communem usum. Id Hollerius feliciter usurpauit, & nos sapē idem felici successu usurpauimus.
2. Atque urina ipse satis legitimam medendi offerunt occasionem. Nam si cruda fuerint & tenues nec tam secunda vena & purgandi; sed maximē purgandi occasio erit. Sed contra confusa, ac turbata & humoralis, ut ita dicam, audacius purgabis. Vide Hippocr. part. 43. lib. 4. Acutorum, & Historiam P. Toysonij.
3. Ideoque Hippoc. Aph. 30. lib. 4. ait, Mulierem capi ab acuto aliquo morbo lethale esse: & Aphorism. 31. Mulierem utero gerentem sanguine misso ex vena abortire & magis si fœtus sit maior: & Aphor. 34. Grauidam abortionis periculum incurere si alius plurimum profluat. Defraudatur enim fœtus genio & desidendi frequentia eliditur.



HISTORIA OCTAVA.



. MEMMÆI hortulanus paulo ante solstitium hybernū in febrem continuam incidit. Ea nil in fronte habebat, multa in recessu. Per totum morbum ferè deliramenta & manuum saltus, tremulus, balbutiebat. Terrificum omnibus hoc fuit. Ad clauiculas dolor subobscurus & levis. Morbus diu siccus mansit. Exacerbationes nocturnæ. Non meminerat eorum quæ fiebant. Urinæ crudæ, boni coloris, ad sanorum urinas accedebant: dato medicamento aliis ducta est illo minimè sentiente. Febris conclusa erat, nec ad manum mordax. Egrotare se nesciebat, sanguis detractus laudabilis, deinde aliquantum corruptus. Tandem euacuatis multis per alium, & expectoratione multa ad vicesimum quartum diem præter communem opinionem restitutus est ουι Θεω.

COMMEN-

Tomus II.

Z

178 CONSILIORVM MEDICINALIVM

dormiendi impotentia cōquererentur. Et tamen hyeme somni sunt longissimi. Quod fit aut quia peculiaris est temporis dispositio quæ id faciat, aut quia cum hyeme reuocetur calor intro, magna est calidarum exhalationum copia, hæ autem somnū prohibent. Accedit & noctium longitudo. Cum enim omnia quæta sint, & absint familiares, non ita facillè molestiæ nocturnæ falluntur ac leniuntur. Ac iam assero illis temporibus hybernīs obseruasse me maiorem dormiendi difficultatem quàm in plerisque morbis æstiuīs: in quibus tamen naturā, ob bilis dominatum maior est *ἡ ἀγρυπνία* occasio. Et vt libere dicam, in corporibus siccis & squalidis, & iā morbo attenuatis (Autumnales enim & Hyberni morbi maxima ex parte longissimi sunt) tanta est *ἀγρυπνία*, vt somnum conciliare difficile sit. Id facit siccitas, squalor partium, & seri maligni dominantis sub finem Autumnī & principium Hyemis dominatus. Quod diligenter notandum. Et si ad hypnotica paulò vehementiora confugeris, celeriter delirandi occasionem attuleris. Sic non nisi cautè illa præscribi oportet.

*Cur
Hyeme
in mor-
bis est
ἀγρυ-
πνία.*

Ea in fronte nil habebat, &c.

Id quod contingit in lignis viridibus, cum multa est cruda materia, nec calor analogus est, plus excitat vaporum quàm discutiat. Vnde quæstio esse posset an hyeme ita audacter ratione febris mittendus sanguis. Immo febrem augeri par esset, vt materia facilius discuteretur, & calor in crudo succo emicaret. Si quis attendat quoque calorem contra naturam omnia corrumpere, & plus obesse alimentum corrumpendo, & succos crudos malè alterando, quàm discutiendo, in alia fortè erit opinione. Per totum morbum saltus tremulus manuum: obscuris verbis id explicatum est, sed elucidabitur sequenti oratione symptoma hoc quod eum ferè per totum morbum comitabatur, terrori fuit. Verebatur ne ab infirmitate esset, & sic malum foret & vt signum, & vt causa. Sed quia penè ab initio morbi prehendit, non ita suspectum fuit. Hoc autem attendere oportet, ne falsò infirmitatis metu persuasi & inducti omittamus legitima remedia. Ac primum quid sit illud videndum. Hippocrates ita scripsit in Coacis, *οἱ ἀσθενεῖς χεῖρα ἀπὸ τοῦ στήθους ἔχουσιν*. Si ægri ad manum Medici subsultant, malum. Illud

*Hipp. in
Coacis.*

αἰετὶς χεῖρα bifariam interpretari possumus, vt & contrectante Medico subsistent, & videas manum ipsius ægri intremiscentem reuelli. Vnde dubitant an sit quid conuulsium, an aliquid tremulum, an aliquid mixtum. Tremor propriè est motus deprauatus facultatis animalis partim à voluntate, partim à grauitate partis editus. Argumento est quod nisi coneris mouere membrum, non tremat. Sed cum conaris dimouere, vicissim facultas & vincit & vincitur, & in ista contentione fit duorum contrariorum motuum perpetua quædam successio. At in ægro nostro motus perpetuo tremulus apparebat, & veluti palpitans. Galenus fusè de tremore disputans occurrit eorum obiectioni, qui tremorem à solo morbo esse contendunt, nec voluntatem concurrere. Quod vt probent, proponunt exemplum eorum Cap. 2.
lib. 2.
de sym-
pro. cau-
sis. quibus perpetuò caput tremulum est, & tamen nulla est mouendi voluntas. Respondet huic obiectioni bifariam. Primū quod in custodienda quauis particula recta etiam voluntas agat, & contentio sit musculorum, alioqui pars corrueret. Posterius si in culcitra molli reclinetur caput, non amplius tremet, quia ab actione facultas cessat. Itaque concursus est & morbi, & facultatis in tremore. Et tremorem non quid dissimile esse statuit pulsui formicanti. In hoc nulla sensibilis quies est inter duos motus contrarios. Et arteriæ motus in minima spatij intercapedine agitur, est enim facultas prostrata, & quæ tamen aliquid conatur ac molitur. Et cum non sit sensibilis quies inter duos motus (quod apparet in naturali motu cordis) est tamen quædam subsidencia fatiscente facultate, quæ subsidencia mediæ cuiusdam quietis rationem habet. Et quemadmodū in formicante pulsu vicissitudo motus non ab vna proficiscitur natura, sic fit ob pugnam virtutis & ponderis ipsius corporis in tremore motus quidam contra naturam partim à facultate & voluntate, partim à morbo. Nec hic distinctiones illas repetere conuenit quas Galen. assignat inter motum conuulsium, Cap. 4.
lib. 2.
de con-
uulsione
& rigore. concussium, & tremulum, item inter resolutionem & rigorem & tremorem & palpitationem. Sæpè enim confunduntur. Vnde initio huius tractationis motum illum contra naturam quem in ægro nostro obseruauimus non satis apertè nominauimus. Nam modò tremulus, modò palpitans, modò saltus quidam tremulus & iectigatio, modò quid mixtum dictus est iste motus. Quasi verò parum intersit inter hæc. Reuera motus erat

tremulus, & non à solo morbo erat, sed à facultate. Solum animaduertere illud oportet, quod contra Praxagoram & Herophilum Galenus constituit & concludit. Herophilus tremorem in neruoso semper genere constituebat, quod reprehendit Galenus, non quin ad neruosum genus pertineat, sed quod non solum neruus tremat, sed ea tota pars quæ ^{ad nervosum} mouetur: item quod facultatis ipsius non meminerit quæ maximè ad tremorem concurrat. Nam & sine ea contendente tremor omnino non fit, de tremore qui propriè dicitur, audiendum est. At Praxagoras tremorem ad arterias referebat. Vterque Galeni iudicio malè. Propositum erat de tremore multa dicere, sed quoniam qui Commentaria in librum Coacarum animaduersionum edidit, multis locis de eo abundè dixit, supersedendum est. Dicendum breuiter de isto tremore qui in principium morbi incidit, & qui non debuit à purgando & euacuando deterre. Omnis tremor continentem causam habet virium infirmitatem. Et cum ex tribus corpus constet, spiritu, humore, parte solida, spirituum dissipatio, aut collectio tremorem facit, vt in graui animi affectu contingit. Interdum eum accersit humorum & spirituum dissipatio, vt in fame, vigiliis, vsu veneris contingit. In acutis morbis aliquando fit copia humorum, vt Pythionis historia admonuit. Interdum qualitas humoris, licet is quantitate sit paucus, interdum partium solidarum siccitate & marasmo, vt cum phrenitin, au casson tremor excipit. Id etiam in morbis longis cernitur, facultate vieta ac languida reddita. Id quod beatus ille pater in monasterio S. Clare declarauit, post semestrem enim morbum tremulus interiit. Atque vt breui finiam, Pythionis historia reuocabit in memoriam illud totum quod in morbo ipsius hortulani euenit: *Pythioni primo die tremor à manibus, febris acuta, nugabatur.* Galen. explicans causam istius tremoris mihi videtur deceptus esse. Nam cum tremorem istum magni faciat, & quod primo die inciderit in ægrum, propterea credat à plenitudine esse (nil enim præcesserat quod vires conuulsisset, alioqui in narratione ipsa Hippocrates haud prætermisisset) miratur cur venæ sectionis non meminerit, cum necessaria hinc videatur. Morbum quippe plenitudo commisit, vt ex ipso etiam tremore collegit, qui plenitudinis signum est. Tamen paulò post dum explicat cur tremere manus ita scripsit: *Probabile est in primis thoracis regionibus, ubi est continens tho-*

Hæc ex
Com. in
particul.
2. et 1.
lib. 3.
Epid.

Histo.
prima
sect. 1.
lib. 3.
Epid.

tax ad ultimas cervicis vertebrae affluentiam humorum constitisse al-
 quando, non multum tamen ut quæ dyspnoea excitanda non esset satis. Com. in
part. 4.
eiusdem
lib.
 Nec enim valide refert ad respirationem primum intercostale (Græcè
 πρῶτον μεστωλεειον.) Sed cum esset vitium in nervorum radicibus qui ad
 manus pertinet nervique degravarentur, tremor manuum consecutus est.
 Nam ex primo intercostali & vertebrae ei superpositis nervi musculos
 manum moventes enascuntur. Huius rei hoc est argumentum, quod tre-
 mores una cum sputis quæ successerunt permanerent, & etiam quod,
 ubi aliquod signum in sputis coctionis apparuit, non amplius fierent
 tremores morbusque tolleretur cum iudicium consequeretur per sudores.
 Pythion duplici affectione laborabat, febre essentiali, & thora-
 cis affectione. Sic duplex crisis fuit, una thoracica affectionis
 per sputa varia & sanguinolenta, cum tamen nec esset pleuritis,
 nec dolor lateris, nec peripneumonia. Alioqui historiam ut fe-
 bris continua & essentialis non enarrasset. Et idem ipsum
 est ac quod scripsit in lib. 4. Aph. Excretiones in febribus, &c.
 Altera crisis fuit ipsius febris per sudores, & apostasin & stran-
 guriā. Febris quidem longius tardiusque post alteram affe-
 ctionem desit, nam urinae manebant cruda. Apostasis autem
 & stranguria consecuta sunt, quoniam diu mansit morbus cru-
 dus. Vnde in eam sententiam Galen. ex Hippocrate citat:
 Si quis diu urinas tenues & aquabiles reddat, & reliqua salubria sint
 signa, abscessus portenditur in locis septo transverso inferioribus. Porro
 materia in primo intercostali conclusa erat, propterea non de-
 terius habuit aeger licet primo die nil expectorauerit. Non vr-
 gebat enim malum. Aliter vero fit in vera pleuritide & peri-
 pneumonia. Augetur enim respirationis usus, maiorque diffi-
 cultas ducendi & educendi spiritus. Quod non contingit oc-
 cupato primo mesopleurio. Et hic præclara questio moveri po-
 test: si frustra in parte aliqua fit concoctio, si unius corporis
 manet cruditas, quid iuvit ista expectoratio, & tremoris solu-
 tio? Reuera si morbus unus est, & materia uniusmodi fusa per
 venosum genus, licet eius pars aliqua privato naturæ beneficio
 mitigetur & coquatur, hoc nil perinde facit ad solutionem, quam
 si naturæ nulla esset molitio. Sed si duplex est focus materiei
 morbificæ, si duplex affectio, è re naturæ & agrorum est, si sal-
 tem una materia naturæ gratiam recipiat. Id quod in Pythione
 accidit. Et in Hemitritæo, cum duplex focus, duplex materia,
 si biliosus humor mitescit, saltem commodo agrorum fit si ter-

182 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tiana intermittens quotidianæ coniuncta defæuit. Sic in mor-
bis complicatis vno manente, alterum commodè definere po-
teft. Ad rem redeamus. Quorsum Galen ad solutionem tre-
moris istius phlebotomiam defiderabat, cum particularis efferet
affectio, & à congestionem materiæ nullum dolorem excitantis
ad primum *μισοπλευρίαν*? Et tamen ita Galenus ea de re scripsit,
postquam tremorem istum à plenitudine esse statuit: Itaque po-
tuit auxilio missi sanguinis succis reuulsis qui hoc loco affue-
bant, affectio coctionis initium habuisse sexto die (eo enim die
procefferat *ἀναξιδάρον*;) Quomodo autem ita iuuerit sectio venæ,
ob tremorem cuius causa particularis erat, non video. Ratione
quidem febris iuuare plurimum potuit. At ratione istius mate-
rici prementis & obstruentis iuuare non potuit, cum nulla inflā-
matio esset vt colligere ex scriptis licet. Immo sola per os ex-
cretio, & coctio materiei iuuare potuit nulla sectione venæ ce-
lebrata. Atque cum ægro nostro secta vena bis aut ter esset,
laudabilis que effluxisset sanguis, nihilo penè minor factus est
tremor. At iuuit expectoratio lenientibus cibis & arteriacis
procurata. Doctiss. Hollerius explicans Aphorism. istum,
ὡς πρὸς χεῖρα ἀναισθητοῦ, veram effigiem istius morbi in Hortulano &
Pythione exprimit, & nō tam *τρέμον* vocat quam *σπασμώτερον*, no-
mine composito *ἐν τῷ σπασμῷ ἢ τρέμει*, quemadmodum affectio ista
non simplex est, sed aliquid habet promiscuum ex conuulsione
& tremore. Porro iste *σπασμώτερος* à simplici tremore differt,
quod tremor simplex cessat si pars resideat ac conquiescat. Sed
ἐν τῷ σπασμῷ τρέμων manu etiam subnixa ac quiescente, tremulum
quid & conuulsium apparet. Id quod in ægro nostro conti-
git. Et idem author subdit, Noui & quibus in longis febribus
& autumnalibus à copia crudi humoris non tam siccatis quàm
humore madentibus neruis, id, id est *σπασμώτερος, ἢ τρεμώδης π*, ci-
tra periculum acciderit. Plura legere possis de istis rebus loco
citato, si quando de iis deliberandum sit. At morbus ægri nostri
Autumnalis erat, & vt colligi potuit, multa cruditas fuit in vni-
uerso corpore. Et prout *τὴν ἀναξιδάρον* thoracem expurgauit,
minui cœpit illud symptoma.

Tandem siue ratione particularis in thorace congestionis,
siue etiamnum redundantie succorū in vniuerso corpore op-
pressio fuerit, ex superioribus colligere est tremorem esse à ple-
nitudine quod & Hippocrates cōfirmat qui *ἀφ' ἁπλῆς τρέμει* hæ-

Hollerius.

morrhagia etiam profusiore solui ait. Quod ad locum præsen- Part. 59.
tem pertinebit. Et eodem libro Galenus conuulsiones quoque lib. 3.
quæ statim ab initio oriuntur, à plenitudine esse contendit. Sed Prorrh.
& locus est valdè notandus apud Hippocratè ubi animadu- Com. ad
tit manuum torporem & segnitiam sequi ob venarum in thora- part. 68.
ce varicosam dispositionem, præsertim si malum ad humerum eiusdem
tandem peruenerit. Vt sæpè manui ipsi remedium applicandum lib. 1.
non sit licet pars ipsa laboret. de mor-
bis.

Cætera quæ in historia continentur narranda non sunt, per
se enim satis facillè intelligentur.

CONSILIVM PRIMVM.

De Melancholia. Ad D. Iaulnay Medicum.

Breuibus quidem verbis magnum morbum, quo iam dies
aliquot nob. mulier domesticæ calamitatis tædio affecta,
conflictatur, explicasti. In quo partim desiderio nostro satis
esse factum putamus, partim aliquid aliud expectamus, vt ordi-
ne & methodo meliore nostra hæc procedat commentatio.
Sed quoniam nobis cum artifice res est, minùs laborandum pu-
tamus, cum concepta in nobis de tua eruditione opinio satis
nostrum desiderium lenire possit ac eleuare. Melancholicam
affectionem esse bellè quidem definiuisti, ~~de hæc~~ explicasti,
sed cum mæror & ægritudo in censu externarum causarum po-
nenda sit, potuit explicari an corpus natura in talem affectionē
propendeat, an aliquid sit ~~causa~~, quod corporis character, mo-
les, color, pilus & anteaactæ vitæ ratio aperire potuerunt, vt mi-
nimo mæroris vento tanta impressio facta sit, vt aut externæ
causæ ratio ineunda solùm sit, aut iam cum ipsis naturæ princi-
piis, vt sic dicam, pugnandum foret. Omittis an sectio venæ
celebrata fuerit, an non, quod tamen hoc primastenet. Sed
quid nobis de morbo videatur, quoque præsidio oppugnetur,
si & morbi, & ægræ indoles ingeniumque patitur, paucis ape-
rimus.

Pathemata melancholica cùm aliàs ægrè cognoscantur, ma-

ximè in mulieribus id fit. Non quod non facilè se suis signis prodant ac promittant, sed primus morbi fons non facilè aperitur. Et in hoc Medicorum viget industria. Si Hippocrati vnius vterus morborum muliebrũ parens, quid est quod aliundè fontem & sedem inquiramus? Sæpè deliria melancholica vidimus quæ nos ad furorem vteri cum Aëtio reuocaremus. Et nuper occurrit Hippoc. locus quo adumbrat affectũ melanch. cuius causa in vtero existit, vocat autem; Bilis atra in vteris.

Sic tum est videre an menses respondeant, an cerebrum per *μεσσηριον* an per *συνεπαιδ* laboret. Si quid ingenio valemus, morbus illius mulieris videtur accedere ad eum quem Hippoc. *φρυγιδον* vocat. Cuius si ideam descriptam inspexeris, & method. mendi, & remedia in parato habebis. Quoniam enim anxietas ægritudóque hanc corporis affectionem agrotationemque induxit, quod *δυσθυμια* in corpore dicitur, idem *φρυγιδος* in animo existit.

Corpus purgabis, etiam liberaliore manu.

Si id agræ difficultas & pertinacia non permittit, fallēda est. Confectio hamech hñc primas tenet.

Aperietur vena brachij: si menses resistunt, ad maleolum descendes.

Diæta humectante & refrigerante vteretur: Applicentur cucurbit Hypochondrio sinistro, & femoribus.

Conciliabitur somnus. A narcoticis & meconio abstinendũ.

A syrupo rosarum pallidarum abstinendum, nisi magna dominantis ichoris argumenta adsint.

Cucuphas ex calidis non vsurpabis. Nam hi melancholici, præsertim si dominatur bilis, febre quadam capitali laborant.

Nec tandem ad festucas ellebori albi transgredi alienum erit.

Balneum loco & tempore conferet.

Cætera tibi tua singularis & eruditio & diligentia suppediabit.

CONSI-

CONSILIVM SECVNDVM.

De lue Venerea.

NOBILI viro vlcus erat in pene, maximè ea in parte qua situm est corpus velut neruosum & tubulosum. Primis diebus rati non esse à maligno, vulgaribus & blandioribus remediis curationem tentauimus. Nil profectum est. Tandem vicit ea opinio, vt crederemus Neapolitanum esse quid. Nam Dysepuloticum erat. Dato medicamentulo, repentè pustulæ apparuerunt, aliàs venerem resipientes, aliàs non. Nam quædam ex his suppurato aliquantùm laudabili desistebant. Aliæ crustosæ euaserunt. Paulatim creuerunt, & pullularunt. Et primū quærebatur, num pustulæ Neapolitanæ suppurent. Ne hoc fraudi sit, sciendum veras & luis Venereæ proprias pustulas suppurati & expurati expertes esse. Sed si confusus est humor pustulam committens, vt aliquid habeat benignioris humoris qualis communem (scabiem committit) fieri potest, vt suppuratum promoueatur. Vel, ne quis decipiatur, si quod pus apparet, illud non est verum & laudabile, sed sanies quædam quæ superficiem pustulæ tenet, non autem à profundo manat, vt in furunculis & pustulis malignis euenire solet. Præter pustulas istas aderat dolor ad sinistrum Hypochondrium, quod tandem occupauit nothas costas. Scapulæ dextræ quoque dolor aderat, vt breui partes solidas occupatum iri crederemus. Nam est vbi tantùm humores venenum occupauit, & tunc nil commemorabile est, est vbi carnem, & tunc pustulæ erumpunt: est quoque vbi partes solidas, vt neruos, tendines, ossa, denique partes quæ ex semine sunt. Vbi duo triaue sunt notanda. Cur ita in seminales partes agat. Cur potius ossa media intumescant quam eorum capita: Tertiò, an quid sit analogum inter articulares dolores & luem Veneream neruos occupantem. Sed hæc breuiter perstringo.

Quòd ad primum, Maior est analogia inter semen corruptum & semen laudabile & sanū, quàm inter semen, aut quid aliud.² Et cum semen sanum minimā etiam mole quid maximum sit, &

Tomus II.

A 2

186 CONSILIORVM MEDICINALIVM

vires multas magnasque contineat: Ita semen morbosum minima quantitate, facultates magnas, & ad corpus labefaciendum vires complectitur. Vnde hysterica à suppresso semine multò deterius habent, quàm quæ tales fiunt à menstruo suppresso. Quò enim quid benignius & præstantius, eò deteriore labem contrahit, & efficacior, quàm si corrumpatur aliud quod tantam præstantiam & bonitatem non habeat. Cùm quis congressus est cum impura, per communicationem tantum spiritus & auræ venenatæ ab ulcere in sinu pudoris cõcepto, quod prius semen corruptum infixit, elatæ, & aura ista maligna maleficæque, quam spermaticam seminalémque vocare possumus, postquam leuiter reliquos humores affecit, iam in proprium legitimumque partium alimentum, quod semen est, & seminis proxima materies, agit atque illud inficit, vnde tanta malorū ilias. Nam supponamus cancrū esse in partibus istis naturalibus mulierum, qui cancer alterius sit generis & moris ab eo cancro quem lues inducat, non ea surgent mala, quæ oriri solent à concubitu, & cõtactu cancri Venerei. Adeo analogissimus in iis malis excitandis magni est momenti. Si venereum venenum verè est venenum, cur more aliorum venenorum non afficit cor, & extinguit, aut saltem syncopas, aut alia id genus inuehit? Sed venena diuersorum sunt generū, quædā sunt magis humoralia, alia minùs. Quæ magis humoralia, etsi possint cor afficere ipsū, tamen in congeneres humores magis agunt, vt sanguineum venenum in sanguinem, venenum seminale in semen. Alia non ita sunt humoralia, vt quæ à venenatis animalibus manant: Ea enim spiritu potius agunt, & dū dissipant spiritus vitales, mortem accerfunt. Sic in pestilentibus morbis (quod fortè pauci notarunt) quidam alioqui valdè sani & hilares intra quadrantem horæ pereunt, alij peste correpti non nisi diuturniore tempore, immo alij euadunt. Vnde hoc? Quia venenorum pestilentium aliud magis humorale, & internum, aliud aëreum magis, spirituosum & externum. Aliud mixtum. Quod externum est in pestilenti exhalatione & expiratione consistens, quia spiritus est & aura, & nil ferè materiale habet; ideo agens primo quoque tempore in spiritus vitales, quibuscum aliquid habent *πνεύματι καὶ αἵματι*, mortem infert repentinam. Quod verò internum magis, & materiale, non tam necando est satis. Et tunc pustulæ, anthraces, tubercula in inguinibus progerminant: cor-

ruptus sanguis effluit. Et nisi iam à diebus aliquot mala ista impressio in humoribus fuisset, non tam cito attractus aër pestilens ea omnia corrupisset. Sic videmus aliàs puros magis à peste tolli, aliàs magis impuros: ideo ad præcautionem pestis Gal. iubebat præpurari corpora & ficcari. Quare id? Quoniam si ad aëris pestilentis contagionem accedat & magna humorum eluuiæ, omnia deteriora futura sint. Cùm enim non adest ista colluuiæ humorum, vnum nobis vincendum est tantum, nempe exspiratio terra & pestilens: sed si corpus impurum est quoque impressio in eos fit, vnde magna symptomatum fœtura surgit. Atque vt breui finiam. Luis Venereæ venenum materiale est magis, & non tam afficit cor quàm hepar & partes vicinas, præsertimque in spermate & materia pituitosa figit sedem.

De secundo dicamus ex quorundam opinione: cur tophosa potius ossa in medio fiant, non in suis capitibus. Quidam eam reddunt huius rei rationem. In medio ossium plus medullæ est quàm in partibus, aut superioribus, aut inferioribus. Immo ea medulla crescit decrescitque pro lunæ temporibus. Cùm enim ea plenior est, ossa medulla exuberant; cum vel noua exoritur, vel senescit, minus habent medullæ. Hæ autem mutationes vel augmenti, vel decretionis medullæ, magis in mediis ossium cauernis, quam in capitibus finibusque cernuntur. Et cum medulla, vel id quod ei analogum est, tanquam quippiam osse ipso mollius, idoneum magis sit subiectum quod admittat venenatam luis Venereæ qualitatem, & eandem aliis partibus communice: Qua parte plus illius mollioris substantiæ est, eadem & magis se venenum ipsum figit atque firmat. Integra autem plenaque luna, ossium inanitates replentur magis, vt mirum non sit, si in mediis ipsis ossibus sæpius tophi & durities tophaceæ appareant. Hæc inquirenda pluribus relinquimus aliis.

Tertium ex iis quæ proposita sunt est de analogia materiæ Venereæ, & eius quæ arthritin facit. Paulò antè diximus subiectum luis Venereæ esse tandem proprium partium ipsarum alimentum cuius reliquiæ sunt semen ipsum: vnde ea surgit proportio inter semen corruptum, & semen sanum. Item materies ipsa veluti mucaginosa, lenta & glutinosa constituta est, in quâ hydrargyrus ipse, tanquam verum alexiterium agit. Declarat summa digerendi vis vnguenti Neapolitani, item & prouocatio

A a ij

188 CONSILIORVM MEDICINALIVM

saluæ vberimæ: in qua vna luis venereæ fugatæ ac ad extremum versæ spes & fiducia posita est. Ecquod est ingenium & mos illius humoris qui arthritin committit? Efferus & implacabilis est, de nocte suas habet exacerbationes, omnium remedium vires ferè eludit, tophos & tubera in articulis excitat, immo & partes ad atrophiam ducit. Orgasum habet. De nulla parte securus homo esse potest. Furibundè inuolat modò in has, modò in illas partes. Nec tantùm hoc est acceptum ferendum diathesi partium ipsarum, id est, articulorum, quàm interna virulentia ipsius humoris. Scio quidem articulum, læsum, imbecillum ac infirmum suum alimentum corrumpere, eo modo quo & aliæ partes dolore tentari solitæ, sed id est tantùm causa adiuuans. Nam etsi humor ipse in articulum nondum infirmum intruerit, non desinit tamen ibi dolorem excitare: sed non tam contumaciter. Ergo siue periodorum vices, siue exacerbationum nocturnarum analogiam spectes, siue ingenium humoris, siue contumaciam & naturam humoris humana remedia respicientis (nam & calida & frigida non admittit, & quibus dolor arthriticus lenitur, iisdem mox exasperatur, & exaduersum) magna est proportio inter & affectum ipsum, & naturam humoris affectum parientis. Immo verò arthritidis sæpè lue Venereæ succedit. Paucosque videas qui lue Venerea exerciti fuerint, præsertim si inueterarit, qui non & articulares dolores tandem experiantur. Quod attribuunt quidam vsui hydrargiri & solennium remedium, quibus in ea curatione locus esse solet, sed malè id quidem. Nam id potius ab ipsius humoris venerei, & morbi natura & indole pendere censendum est.

Vnde & hoc loco querere non alienum videri possit, an non ad arthritin curandam eadem curandi ratio adhiberi possit tutò & iure, quæ & ad luem veneream. Si tanta affinitas vtriusque affectus & humoris, si ij maximè articulari morbo cruciantur, quibus corpus *μῆνεις, ἀλγύνει*, vt quodam loco loquitur Hipp. cur non illitâ hydrargyro prouocatio saluæ ab arthritide recidua afferat? Nam quod obici possit de articulorum imbecillitate, siue ea sit cōtracta à natura, siue acquisititia, & quæ potissima causa est, & morbi, vt sic dicam, dispositiua, postquâ colluies ea humorum euicta fuerit, quæ tandiu fouet morbum, robur articulis conciliari fortassis poterit. Sed hæc cursim dicta sint.

Restat vt breuiter minutulis velut interrogatiunculis & quaestiunculis de curatione luis Venereae dicamus. Primum, an non alia curandi methodus securior, & promptior esse possit. Secundum, an non plena periculi non praesentis, sed futuri, saluæ prouocatio. Tertiò, an non grauiter peccetur ab iis qui cum vident corpus pustulis Veneris efflorescere, saluam eliciunt & summa vi prouocant. Omnino enim tuta videtur curatio si motum naturæ sequamur, vt non tam addicamur trite cuidam imperitorum Chirurgorum methodo, quam rationi ipsi.

Ac dum tertiam hanc quaestionem persequimur, primæ quoque satisfacimus. Eodem enim pertinebunt. Ac primum perniciosus valde morbis liberantur plerique profusiore aluo, cum in colluue humorum restagnantiū in mesenterio primum mali semen poni videatur. Quod declarat Gonorrhœa. Non enim tam id fouet quod in longinquiore partibus redundat, quam quod in primis viis, in quibus corporis veluti sentina est. Accedit quod communis omnium ea sit assertio, quod in impuro concubitu, pernicies primum hepati communicatur, vt multis & rationibus, & experimentis roborare solent. Quæ autem commodior via ad expurgandum hepar quam renes, aluus, & habitus ipsius corporis nullo prouocato fidelissimo cū dispendio partium nobilium, cerebri, pulmonum, ventriculi & cordis? Gibbum hepatis prouocatione vrinæ repurgabitur, & sudoribus si ita res feret, sinum alui subductione commodissime vt omnium veterum autoritas confirmat: Ergo in hac vna aut triplici purgatione quæ eodem pertinet sine sputatione, consistendum videtur. Si in sero praesertim virus primum consistit, aut vt liberius dicamus, in proportionata & analoga semini tãquam corpori ad virulentiam eam magis idoneo materia, istis purgationibus habemus & consequimur quod optamus. Nam elicitis sudoribus per cutis spiracula facile id quod turget euacuabitur. Si in feminali quadam materia, si eo usque progrediatur purgatio donec habitus & moles corporis collabatur, ei materiei satis esse factum videbitur. Accedit, quod venenata vis suis alexipharmacis oppugnanda sit. Si enim inter omnes constat morbum istum in venenata vi & aura potius consistere, quam in alia vlla re manifesta; quaerendum suum remediū, nec tentanda ea euacuatio, quod plerique facere solent, ad extremum usque promota. Sed inter ceteras rationes, hæc maximè

A a iij

vna plurimum roboris habet quòd hic vt in aliis morbis motus naturæ sequendus videatur. At iam vsu probatum est naturam omni ratione conari hoc virus depellere in corporis superficiē, admoto duobus aut tribus locis pyrotico, si sinatur sanies quædam effluere, spes aliqua affulgeat sanitatis, quod audio factum esse felici successu.

Non tamen sudorifica & alexipharmaca omissa sunt. Immo cōmodior & tutior videretur via, si imperata diēta quadraginta dierum sensim procuraretur euacuatio illius materiæ, & domatio istius veneni repressioque, quàm ita fœda tristisque saluatione miserè æger fatigaretur? Et id quod me magis mouet est ista vlcerum fœtidorum & putrium ob vsu hydrargyri prouocatio & eruptio. Quid enim impedit quo minus aut in aspera arteria, aut in pulmonibus tale vlcus excitetur? Quod si eueniat id mihi videtur nulla penè arte curabile, quòd eo medicamentorū vis integra peruenire non possit. Nisi fortè obiciat quis, affatim prouocata saluatione nil penè subesse quod tetrum istud vlcus fouere possit, cum proprium eius curandi sit alexipharmacum hydrargyrus.

Sed & vt concedam experimento probari ea saluæ prouocatione relapsus magnam tolli occasionem, duo tamen sunt quæ me ab vsu hydrargyri reuocare possunt. Prius est vlcerum eruptio ita malignorum, & neruorum labefactatio. Nil enim æquè neruoso generi ac cerebro bellum indicit ac argentum viuum. Id declarant tremores qui ab eius exhalatione excitantur. Posterius est, si prolapsio materiei Venereæ magna vi liquefactæ ac excitatæ vsu argenti viui in intestina dysenterias crudelissimas & funestas excitat, quid non efficiet deterius multo in partibus superioribus, quæ vt situ, ita dignitate præcellunt aliis. Si hepar imbuitur primū, cur non id omni ratione repurgas aut per habitum, aut per secessum. Sic omnino *avançapans*, quæ per os fit prouocata salua placere non potest. Si ad pituitam quæ circū ventriculum latet, & quæ facillè & virulentiam concipit recurras, illa & vomitione, & subductione excerni & elui potest. Nec propterea prouocanda ista saluatio quæ tantis molestiis ægrum cumulat. Obiciet de capite in quo ferè pedem figere solet ea lues. Hoc verum quidem asserimus; & vt cerebrum maximè pars est spermatica, & ab eo tanquam à fonte prolificum semen multum profluit (vt Scytharū sterilitas fidem facit).

ita virus istud & facile & promptè in eo cerebro sese offirmat. Id *μακρόν* & *λαμπρύνει* facile confirmant. At, dicet, prouocatio saliuæ tutissimè cerebrum expurgat. At conferendum est vnum incommodum quod affert hydrargyrus cum ea commoditate quam procurat saluatio. Iam diximus inimicam esse cerebro & nervis hydrargyrosin. Et excitatis vlceribus fusisque magna vi humoribus non potest non in sympathiam trahi cerebrum. Sed tutò alia arte euacuari potest. Multa habet emissaria. Præterea, lethargici, & comatosi in quibus multa materia est frigida curantur sæpèalui profusione, item & ophtalmiæ, cur non & eadem commoditas cerebrum à virulentia asserere potest? Plura in eam rem afferri possent.

Secundo loco quærebamus, an non prouocatio saliuæ plena esset periculi non tam præsentis quàm futuri: Sed dum alia duo capita promiscuè tractauerimus, huius secundæ quæstionis definitionem quoque adduximus.

Restat tantum vt concludamus in vetere hoc morbo, & iam partes solidas obstinatè adorso, litui ex hydrargyro locum esse, nec tam contumax malum facile cessurum, nisi maioribus remediis tanquam vectibus quibusdam ad amoliendum conuellendumq; vtamur. Sed ita se in omnibus gerere, & ex eo quod aliquid effloruerit in cuti, linendi occasionem captare, illud capciosum est, & ignorantia plenum. Et ad Empyricos potius pertinet quàm ad Methodicos, & eos quos non tam lucri cupiditas mouet, quàm conseruandi sui innocentis officij studium & cura. Et cum ea curandi ratio tanti sit, non ita ex præiudicata quorundam opinione pendendum est, sed videndum quid, & quando, & quomodo agendum. Alioqui vix crudelitatis, inhumanitatis & inscitia crimen effugiemus?

Sed & ad superiorem de vsu hydrargyri in illinendo toto corpore disputationem pertinet hæc quæstio plurimum adiumenti allatura: an pusionibus lue infectis tutus litus hydrargyri vniuersalis? De particulari quidem facile admiserim, fortè pustularum ea sit peruicacia vt nulli alteri cedant remedio. Sed quorsum vniuersalis litus? vt prouocetur saliuæ? At expuere nequeunt, vt sudent? at prouocandi sudoris tutior alia est ratio. Sic dum corpore illito fusio & dilapsio humorum consequatur, si sursum repat humor, & per os expuendi impotentia & insolentia non excludatur, multum inde detrimenti eueniet.

192 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Satius est itaque foras venenum pellere, & quò natura vergit eò ducere. Immo & fortè hoc in aduolutoribus locum habebit. Verum antequàm huic Consilio finem imponamus, quæstionem lectoribus voluptatis simul ac vtilitatis plurimum allaturam mouere quoque non erit alienum, An non tutus sit vini vsus in lue Venerea, & in Gonorrhœa præsertim⁴. In hac quidè, quoniam cruditas tollenda est, quæ fouet & alit eum fluxum. Et cum venenum sibi sedem in humore pituitoso crudòq; deligat, quæ cruditatē oppugnant, quæ coquunt, alimentum distribuunt, & digerunt, ea mirificè conferunt ad præcautionem & curationem. Huiusmodi autem vinum est. At tollendus omnis excessus, mediocritas tenenda. Atque in lue Venerea, modò ne sit ingens capitis dolor, cur æger vino est abstinendus? vires retinet, quibus maximè opus est. Venenum oppugnat. Et cum opiatīs calidis, & acriusculis vtamur, cur tantopere vinū fugimus calidiusculum alimentum. Ne hic præuertat opinio præiudicata, hæ & similes rationes pondus aliquod ad id efficiendum quod volumus sunt habituræ 1576.

ANNOTATIONES.

1. *Virulentia, siue lues Venerea est virulentorum phymaton in corpore perennis propagatio ex conspurcatione sanguinis & humorum ex impuro concubitu: vel Virulentia est phymaton virulentorum perennis in corpore propagatio, quam affert sanguinis & humorum ex impuro congressu conspurcatio. Vel, Quam affert humorum & viscerum conspurcatio ex contagione ab impuro contracta concubitu.*
2. *Notare vnum oportet quod valet ad therapiam in hoc morbo, nempe non solum animaduerti debere naturam eius qui inficitur, sed eius etiam qua infecit. Nam quæ succulentiæ sunt & sanguineæ, hæ non fouent alinque tam acerbum & pertinax virus. Contra melancholica & quæ seroflore abundant sanguine, & quibus cutis expallescit, hæ terribilissimis scatent ulceribus & sanatu difficilibus. Sic oportet eos qui ab his virus contraxerunt, multo sedulius curare.*
3. *Absurdum est & à ratione alienum meo quidem iudicio, quòd viri quidam doctissimi etiam scriptis editis censuerunt, non posse fieri decocta ex vino aut saltem ex vino solo, sed infusionem fieri debere ex aqua, mox hanc diutius excoquendam esse addendumque in fine vinum quod hoc censeant ineptam esse materiam infusioni, quodque tandiu excoqui nequeat,*

nequeat, quandiu oporteret ad eliciendam virtutē medicamenti. Certum enim vinum esse optimum medicamenti cuiusvis vehiculum, & in Chymicis extractis experientia comprobatur, nihil esse aptius ad extrahendas medicamentorum facultates ipso vino, aqua vini, & aceto, quod igneis & calidis subtilibusque partibus penitiora quaque permeans intimam quaque facultatem eliciat, & in se concipiat. Verum quidem est non longam pati coctionem, sed aut longa infusione ligni sancti, radicis, scynæ aut sarseparrille in eo facta id compensari solet, aut in duplici vase debet excoqui. Hac arte parato decocto multi desperati perfectè curati sunt, noxamque partibus solidis ab argenti vini usu impressam emendare & tollere comprobatum est. Adde ad has vini dotes & hanc, quod vinum succos bonos ingeneret, ait Galenus Comm. in hunc Aphorism. *ἐν λ' α' α' &c.*

CONSILIVM TERTIVM.

Pro Thesaurario Arthritico.

QVONIAM dum disputaremus de Therapia Arthritidis pituitosæ necessariò incidimus in disputationem de doloribus noctu ingrauescentibus, non alienum ab instituto erit si nonnulla quæ animo concepta habemus super ea re eloquamur ac exprimamus, hæc enim intellecta descriptaque plus voluptatis afferent quam animo retenta. Deinde verò ad remedia quæ præscripta fuere nobili viro veniemus. Quæsitum est ergo cur dolores articulorum de nocte exacerbentur? quidam ad pituitæ motum confugiunt, qui noctu magis quàm interdiu cieri solet, ut enim secundum anni tempora humores generaliter mouentur, ita certis horis diei quadam ad tempora vniuersalia *ἀναλογία*, hic potius humor quàm alius mouetur ac se profert. Ac primum non omnino arthritis ab humore pituitoso est, quemadmodum in alio opere à nobis demonstratum est. Et licet concedamus hinc pendere arthritin, hæc fortassis ratio non sufficit. Hippo. Epid. quinto: Ita de motu materiei purulentæ. *Tempore nocturno, profecto in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculū sunt, dolores ad noctem.* Quod cur fiat alterius est instituti. Scimus enim quod quidam morbi & *ἡ νόσος ἡ παρὰ τὸν ὄφθαλμον*, aliis at-

que aliis temporibus. Vt ne euagetur oratio nostra, cuiusdam Medici primarij hæc ratio assignatur exacerbationis istius nocturnæ. In vnoquoque animante calor quidam fixus est, & calor fluens: fixus remanet donec aut *σπαλέλα*, aut *νεκρώσις* partis temperies depereat. At fixus alias paucior est alias plenior & vberior existit. Et talis calor affluens à corde in quo nectar est *ζωπλόνος σπέρμα*, vt loquitur Theophrastus, aliū calorem *ἐμψυκτον* excitat, iuuat, illustrat, & ad *τὴν ἐκείνου* inuitat. Quandiu calor ille in parte manet, nec imminuitur, nec alteratur, tandiu pars naturaliter sese habet. Contra se habet, si alio modo calor affectus est: vnde in febribus est partium quidam *νεπός* inexplicabilis, quoniam calor est alteratus aut aliter quàm è natura affectus. At in arthriticis paroxysmi causa refertur ad caloris illius influentis & vernaculi fugam & reuocationem ad suū fontē cor. Illud enim in confesso est noctu partes interiores calidiores esse, exteriores verò refrigerari, aut saltem minùs habere caloris natui, contrario autem modo interdiu affectas esse. Inter vigilandum enim, & præsertim die ipso calor natiuus ad habitum funditur, & occurrit lumini & calori diurno tanquam rei cognatæ. Calor enim noster ad calorem diurnum tanquam ad *τὸ ἐν πρῶτον* recurrit. Itaque cum extimæ partes deficientur ac destituantur isto calore per tenebras à circumferentia ad natui caloris *τὴν πύλιν* reuocato, facile humor tumultuatur vt potè nō rectus ac temperatus à calore isto natiuo omnia sub ditione sua renente. Atque hæc causa est cur de nocte arthritis potius exacerbetur quam tempore alio. Contra si interna phlegmone est, dum calor intro repit & accessionem calori natiuo adiungit, febris maior fit, & dolor à phlegmone excitatus inualescit. Tamen aduersum ea quæ à nobis dicta sunt aliquis obiciat, si alij dolores interdiu excitantur ab alijs humoribus pro dominatu cuiusque & *ἰδιούσῃ*, quæ cuiusdam motus interioris causa est, cur non eadem ratione humor arthritin committens qui vt plurimum pituita est tragædias turbasque excitet noctu peculiari suo motu, ad id nil penè cōferente isto aut accursu, aut recessu caloris? Suo enim natiuo calore illustrantur aliæ partes dum alij humores interdiu mouentur, & dolorem proritant. Quæ cum ita sint, tantum plausibilis videtur ratio superius allata, & quæ non ita firmis rationibus est stabilita, vt non eam vehementior quædā rationum philosophicarū aura percellat, atque conuellat.

Verum his omiſſis capita curationis perſtringamus.

Æſtate maximè à vino abſtineat, huius loco vtatur decocto betonicae radicis ſchinæ, farſeparil. aut aqua decoctionis ſeminis coriand. Quod ſi vrgeat neceſſitas, vtatur oligophoro, idque Hyeme. Elixis carnibus vtatur ſiue iuſculis: aut ſaltem vtatur re aliqua iurulenta⁺. Piſcium vſus non confert, niſi ſaxatiliũ & friabiliũ. Prandium liberalius eſto. Venere vtendum parciſſimè. Laconicum conferet ex herbis poſt ſcribendis. Fœmora & aliæ partes dolentes illinentur oleo catello- rum, deinde integentur pelle arietina recens detracta. Hora ſomni vtetur opiata ſequenti: Illinetur ſpina maſtichino & ol. myrtillo- rum. Caput lauabitur lixiuio parato ex cephalicis. Si dolor ad iſchion maneat veſicatorium applicabitur ex ſimo colubarum & pipionum cum grauellata ſimul mixtis cum iuſculo ranunculi: Aut cortex viburni applicabitur: Pyroticum adhibi- tum ad eam partemque Græcis *ivio*, vocatur conferet.

℞. Conſeruæ enul. campa. & acori. an. ʒ ij. conſeruæ ſorum beton. cichor. & anthos. an. ʒ j. carnis citr. condit. & myrob. emblic. an. ʒ ij. myrrh. maſtich. an. ʒ j. cum ſyrup. de ſtæchade fiat opiata, vtatur in introitu lecti.

℞. Seminum cytoniorum & pſyllij. an. ʒ ſs. radicis altheæ ʒ ij. ſeminis eiſdem ʒ ij. extrahantur mucag. in aqu. roſarum & plantag.

℞. Prædictarum mucaginum ʒ iiij. ſucci plantag. ʒ ij. butyri recentis vſtulati & vngu. populeon. an. ʒ j. ol. viol. & roſ. quantum ſufficit pro linimento.

Valet cataplaſma vulgare ex pane diſſoluto in lacte caprino, cum oleo roſato, & vitellis ouorum. Aut illud.

℞. Stercoris bouis gregarij lib. j. vini albi. ʒ ij. ol. chamemel. roſar. & violati. an. ʒ j. axungie cati. ʒ i ſs. miſce, fiat cataplaſma admo- uendum articulis calidè.

Sequuntur herbe ad hypocauston, ſeu laconicum.

℞. Alth. totius ebul. totius. an. m. ij. foliorum mal. violar. pariet. an. m. j. foliorum betonica maior. abſinth. conſolidæ ſaluie & calamenth. an. m. j. yua arthritice m. ij. ſorum chamem. melilo. aneth. & origani. an. p. ij. roſarum ſtæchad. ſquinuanti. an. p. j. ſemin. aniſi & lauri. an. ʒ ſs. coquantur in aqu. fluu. adiecta parte quarta vini albi. Immer- gantur lapides candentes.

℞. Caſſiæ liſt. ʒ ij. aquæ ſolatri, & plantag. an. ʒ j. aquæ ex radicis bryonia extractæ. ʒ ſs. ol. roſ. & viol. an. quantum ſuff. fiat linimentũ.

Bb ij

196 CONSILIORVM MEDICINALIVM

℞. Emplast. diachylon ireati & sypati philagry & cere noue. an. ℥ ij. puluer. thur. mastiches & myrrh. an. ℥ j. pulueris boli armena & lapidis calaminaris. an. ℥ ij. cum ol. rosato. fiat massa emplastri. ad roborandos articulos.⁶

℞. Salis torrefacti puluerisati lib. j. pulueris mastich. ℥ ij. pulueris rosarum beton. & yua arthritica. an. ℥ j: misce simul & incalescant in sartagine: fiat puluis quo blanda manu articuli contrectabuntur.

℞. Gummi pini, resina pini emplastri diachylon ireati, & de vigo sine mercurio. an. ℥ j. picis naualis. ℥ ij. sulph. viui. ℥ ss. cum ol. irino, fiat massa emplastri: Extendatur super alutam & admoveatur ossi sacro & ischio utrique.

℞. Succu saluie, vini alb. an. ℥ ij. gummi pini. ℥ ss. mastich. tenuiter puluerisate ℥ ij. cere noue. ℥ ij. ol. chamam. quod suff. misce omnia diligenter & coque ad consumptionē vini & succi saluie, & fiant magdaleones ad usum dictum.

Ad eundem scopum id quod sequitur est institutum.

℞. Succu granorum rhamni (burga spina vulgò dicitur) lib. j. sacchari. ℥ x ij. fiat syrupus coctus perfecte aromatizetur cinnam. & caryophyllis. Dosis sit. ℥ ij. cum ℥ i. s. rhubarb. puluerisati.

℞. Pilul. sine quibus ℥ i. (. cocciarum ℥ j. hermodactyl. & aggreg. an. ℥ ij. agar. recenter trochisc. ℥ ss. turbit. electi ℥ j. seminis ebuli. ℥ j. excipe cum syrupo de stæch. fiat massa vtenda præsertim Hyeme.

Sequuntur & aliæ vtendæ semel hebdomade paulò ante cœnam.

℞. Aloës ℥ i. s. rhub. ℥ i. agaric. trochisc. ℥ ss. pilul. aggreg. ℥ ij. omnia excipiantur sequenti decocto.

℞. Agarici femina. ℥ j. turbit. ℥ ij. foliorum saluie maiorana yua arthritica. an. ℥ ss. seminis coriandri (chænuanth. an. ℥ j. fiat omnium decoctio in duabus partibus aqua & vna vini albi quoad redeant ad ℥ ij. adde mastiches nucis moscate caryophyl. an. ℥ j. salis gemme grana 6. inspissentur super cineres calidos: Eo liquore loco syrups, inspissetur & formetur massa præcedens.

ANNOTATIONES.

i. Admirabilis est arthritidis ipsius generatio & morborum nervos & membranas partēque nervosas occupantium. Ad id enim maxime videtur facere ipsius nervi Cordis, & Cerebri, cum iis quæ sui sunt generis, & propter continuationē nervorum & eorum exquisitum sensum.

Accedit & quod nerui medulla longè sit alia temperamento à temperamento ipsarum membranarum neruos inuestientium. Sic quod remedium est ipsius medulla cerebri idem potest esse incommodum naturæ ipsarum membranarum. Id quod ipsi cerebro contingit. Nam ipsum naturam habet temperiem humidam non modo in pueris, sed etiam in perfectis. Id quod planè Gal. ad Aphor. 24. lib. 3. ubi locus malè est explicatus à Leonicensio.

2. Atque vnum notandum est quod pertinet ad cognitionem naturæ somni nocturni. Illud enim experimento constat eos qui cum suis vestimentis super lectum dormire volunt præsertim si nocte id fiat, rigescere, & nescio quam lassitudinem persentire cum molesto punitionis inexplicabili sensu: quod non ita euidenter interdum euenit: quod temporis nocturni natura & temperamento tribuendum videtur, una enim cum recessu, & inclinatione solis, sit nescio quæ mutatio in humoribus, recessus, & per quandam æmulationem, eorundem reciproca successio, quæ potissima videtur esse causa. Quid si dicamus arthritin quandam esse febrem articularum, & particularem esse febrem velut romæ dea? unde videmus eos qui horrent & rigent dolorem nescio quem inexplicabilem persentiscere in neruoso & musculofo genere. Sed notandum vnum de fuliginoso excremento quod Gal. Comm. ad Apho. 15. lib. 3. ait naturæ operationem subterfugere cum nec assimilari, nec agglutinari possit corpori quod nutritur. Et illud est forè excrementum fuliginosum quod suppressum dolores excitat & varia symptomata.

In articularibus morbis ab iis Diureticis est abstinendum quæ impensè calfaciunt, & sanguinem fundunt.

4. Forè incuria arthritidis vnum omittitur, quod tamen facile esset. Nam Plinius cap. 9. lib. 28. ait inter exempla extitisse quosdam qui lac asinum bibentes liberati sunt Podagra & Chiragra. Id quod non est præter rationem. Nam acrimonia seri tantorum dolorum causa esse solet. Quod si aut proba victus lege, aut asina lacte, aut alia arte corrigi emendarique potest, huic quedam à sauis iis doloribus, immunitas consequatur necesse est.

5. Notatu dignum pleròsque vertiginosos arthriticos & cephalalgicos à molestiis morbi saltem incrementis vindicari adhibito ad eam partem ruptorio quæ inuol dicitur, ac præsertim ad extremum eius quod est initium eius scrobiculi qui in fine occipitis est quæ multi nerui decurrunt. At reuera nulla pænè molestia nulloque incommodo id fieri potest, & hinc præfectus maximus consequitur.

398 CONSILIORVM MEDICINALIVM

6. *Notandum hoc quod sequitur ex Gal. ad part. 66. lib. 3. de artikul. Frequenter in ossibus, membranis aut nervis mucaginosus humor colligitur. Carnosa autem pars propria sui ratione mucosa non fit. Pilitosus & mucaginosus humor collectus egrè exinanitur, cum nec perfusione, nec Catap'as. nec medicamento attrahatur, aut discutatur, nisi prius attenuatus, & in vaporem resolutus. Et quoniam lentus humor egrè in vaporem discutitur, ideo egrè quoque euacuatur. Et hac illius humoris glutinosi contumacitas, dolorem semel obortum fouet diutius atque alit.*
 7. *Folia commendari solent ad sacros ignes, & totus rhamnus dicitur vim habere siccandi & digerendi. Forè in eum finem succus granorum eius datur ad serum corporis consumendum.*

CONSILIVM QVARTVM.

De Epilepsia.

AMORRHÆI Consulis filiulus iam ante morbi sui historia enarrata innotuit. Nunc auctarij vice capita aliquot deliberationis institutæ adiicientur. Horum enim intelligentia latiùs manans ad alios pertinere potest. Epilepsia mater puerorum vulgò dicitur quòd eius rudimenta quasi etiam à matre rubente ducta esse videantur. Et quod conuellantur sæpè & facile id non tam productiue fit quam susceptiue. Id est, non tam ob humoris ad id pariendi idonei copiam fit, quam ob neruosi generis imbecillitatem, quoties autem partes aliquæ aut natura, aut alia ratione sunt imbecillæ, minima occasione offenduntur. Accedunt & dentitionis molestiæ, & febres ardentes quæ humores irritant, animant atque acuunt. Annotauimus in historia de eodem puero, in ea familia dentitionem non nisi ad mensem vndecimum apparere quod cum *auspex* sit, tamen aut imbecillitatem summam declarat, aut insignem duritiem, aut mollitiem gingiuarum. Et cum ad mensem quintum eæ molestiæ conuulsionis apparuerint, id factum est bifariam, aut quod summa sit aptitudo ad Epilepsiam in eo puero, aut quod tamen in ea familia tarda sit dentium eruptio: tamen natura non desit aliquid aggredi, & cum materia indisposita

effet, & pars, inanis iste conatus molestias suas habuit. Nostre hæc fuit deliberatio.

Cuique ætati sua est sanitas, suus & morbus. Id summus Hippocr. abundè persecutus est. Sanitas cum omnium partium ea est conspiratio vt & humorum & spirituum & partium solidarum ratio probè sit constituta, morbus verò contra. Morbus aliquando ratione vnius partis euenit, aliquando totius corporis. Partis, cum pars aliqua momentanea laborat cui corpus consentit. Huiusmodi sunt cor, hepar & cerebrum. Hoc, ait, Hipp. maximè ad sapientiam facit, & omnis intelligentiæ internuntius esse dicitur. Afficitur aliquando per se, aliquando ex euentu, in pueris vtroque modo laborat. Per consensum ratione lactis acriusculi, vermium, & torminū. Per se ob molliem, & facultatis animalis imbecillitatē. Ideoque cum congener sit, minus formidandus Medicis videtur. Sed in hoc puero aliquid præter rationem apparet, quod aut peculiare vitium, aut cerebri, aut totius corporis, aut aliquid declarat cerebrum aut humidius, molliusve, aut affectum grauiditatis tempore. Mater enim metu sæpè consternata est, hoc autem valdè afficit. Accedit ad eam opportunitatem cæli inclementia. Si vnquam enim alias cerebrum in omnibus ferè epidemicè afficitur, & dormiendi impotentia est. Et vt malo occurratur hæc consulta sunt.

Nutrix repurgabitur semel mense: & si res tulerit vena aperiat. Temperandum à cibis qui crassum succum & flatū generabunt. Elixis vtetur. Insculorum vsus nō erit multus nisi lac deficiat. Abstinebit vino, vtetur aqua coriandri aut simili decocto. Fricabuntur membra pueri blanda manu, & à cunarum magna agitatione abstinendum.

Puer purgabitur diluto rhei infusi in decocto rad. pœoniæ, beton. buglos. florū cordialium addito semine citri. Non lababitur ita sæpè & sine ordine si patitur quies pueri. Pultis loco panata dabitur in qua dissoluentur aliquando grana aliquot rad. pœoniæ & corallij rubri. Fontinellæ capitis applicator pannus læuis & molliusculus, & in duplatura inspergetur puluis maioranæ cum semine nigellæ, aut suffietur pannus vernice & ligno aloes. Appendebit collo nodulus solemnis. Vtetur opiata ex conseruis cephalicis, addito mithridatio cum puluere pœoniæ.

ANNOTATIONES.

1. Duodecimo atatis mense interiit. Aperto cadavere ingens aqua copia in cerebro reperta est: nervi optici erant valde angusti, alij nervi erant duplo fere maiores.
2. Nosse autem oportet imbecillitatem partis non esse sufficientem ad generandam passionem in intermedio tempore paroxysmorum: id est, in tempore ipsius quietis. In quo nil infestatur, etiamsi nativa imbecillitas sit continua. Quod à Galeno hic dicitur ad omnes morbos redeuntes extendi potest.
3. Galen. Com. ad Aphor. 28. lib. 6. Necessè est cerebrum natura imbecillū si Epilepsia corripì debet. Et ad finem Cōmentarij: Multi habent parentes podagricos, aut aliis morbis obnoxios in quibus vitiatum semen erat, atque ideo natis vehementiorem fecerunt partium imbecillitatem.
4. Circa materiam de epilepsia hæc quæri iure possunt: Si materia epilepsia commistens ea est quam confinxit Galenus, cur innumeri catarrho- si, & quibus multa pituita plenum est cerebrum epileptici non fiunt? An quia est dispositio aliqua, an non? Et si est dispositio an prius inducta est, an simul cum materia inducitur? Si materia id facit, quare non omnes epileptici fiunt? An quia materia aliam acquirit qualitatem? Qui subtili sunt ingenio & delicato cerebro y facile in Epilepsiam cadunt, item qui crasso & obæso sunt corpore, & obtuso ingenio. An id eadem ratione? nequaquam exquisitus sensus id facere potest. Omnis pars delicata & exquisito sensu prædita non facile cumulum fert humorum, & tetra aduersaque enathymia si promptè feritur. Immo etiam solo ieiunio facile nervi laborant. Et melancholicis, quia assiduus agitati curis spiritus & sanguinem inflammant, cerebrum à sua mole facile obruitur.
5. Si enathymia, causa est cur iuvenes liberentur epilepsie molestiis, cur abstinentia vini confert? Cur phlebotomia confert? Nam illud ad coctionem & illustrandos spiritus facit: hæc refrigerat, & nervos debilitat, immo cerebrum debilius facit. Fateor quidem phlebotomiam conferre si certum sit à copia sanguinis, & nimio eius feruore malum repetere: sed si localis in cerebro sit dispositio, pace aliorum dicam conferre non videtur. Quod ad usum vini refert, non ita ledere videtur ut quidam putant. Nam alimentum est, & alimentum medicamento sum. Si ideo nocet quia vapore ledit cerebrum, innumera remedia calida dantur & cephalica que calore & tenuitate partium caput feriunt. Ideo quæ ratio vinum inter-

dicis

dicis, eadem & id genus remedia interdicare deberes. Hoc forsè negotium quibusdam daret. Item vinum mirificas dotes habet. A cruditatibus vindicat: hæ autem sæpè incubonis & epilepsia parentes esse solent. De vini dotibus hæc Galen. Calefacit vinum corpus totum, & citò mouetur ad partes omnes. Accedit quod χρὺς γένει ἐγγύς. Com. ad Aphor. 56. lib. 7. Sed est locus apud Galen. Com. ad Aphor. 5. lib. 5. Ex quo possis arguere epilepticis præsertim à materia frigida, & succo crudo, iuuantissimum esse vini usum. Loquitur de conuulsione, quam ut inducit vinum, ita eandem dissoluit. Verba hæc Galeni: Vinum copia substantiæ nervis conuulsionem affert: rursus autem qualitate sanat eam quam fecit dispositionem, nervos calefaciundo exiccandóque. Et si hoc aliquando non facit, mortem sequi necessarium est. Hæc ratio ad epilepsiam transferri quoque potest.

CONSILIVM QVINTVM.

*Ad Dominum Lescotium. De Melancholia
Hypochondriaca.*

VIVERE quidem magnum quid est, at bene vivere melius & optabilius est. Benè autem vivit qui integra sanitate fruitur. Et qui probè munia & corporis & animi exercet, nec facile de sanitatis statione depellitur, integrè sanus existit. Si æger animus est perturbationibusque facillè decutitur, sanitas corporis ferè lubrica est. Si laborat imbecillumque est corpus vix liberè suas functiones exercet animus. Quanquam sæpè valet ingenio, cui vis firmitasque à natura negata est. Quorum enim foelicitati ingenij natura prospexit, in iis ferè corporis firmitatem neglexit. Et,

*Baro utrunque Deus cuiquam largitur ut idem
Sit sapiens & sis robusto corpore pollens.*

Quòd si alterutrius optio fiat, malim tamen valere animo
quam corpore: Vtriúsque tamen summè & impendiò magis fa-
Tomus II.

C.

nitas optanda est. Ferè enim vtriusque est tantus consensus,
 vt vnus sanitas ad alterum ferè redundet. Id declarat inge-
 nium humoris melancholici. Etsi enim per se corpus afficit ei-
 que vim infert dum viriditatem decutit, tamen & animum fa-
 cilè attingit. Vnde cum melancholico humore corpus tenetur,
 animus inficitur ac fascinator. Et hinc non tam corpori, quàm
 ægro animo medicina quærenda est. Quanquam morbi perti-
 nacia sæpè remediorum vim eludit. Id verò crebrius fit in iis
 quibus corpus molliusculum datum est. Hi enim facilè à per-
 turbationibus se vinci sinunt. Eam non tuentur constantiam
 quæ homini verè *avdei* conuenit, vt in quadam æquabilitate
 vitam exigit. Inconcussus manet omnes perturbationum ra-
 dices elidens. Qui molles sunt & muliebres, minimo etiam
 vento rapiuntur, & coloris in facie magna & subita est mutatio.
 Si qua est coloris suauitas, hæc mox in auriginem, fœditatē-
 que commutatur. Contrà animi æquabilitatem coloris in facie
 viriditas (quod politico more Hippo. vocat *χλόρα καμπεύειν*)
 perpetuò consequi solet. Sed ne hinc Phormio Græcus coram
 Annibale dicat, capita aliquot conseruandæ sanitatis perstrin-
 gemus. Hæc non homini, sed Calliæ scribentur. Primum est
 vt intestino & gentilitio, vt opinor, lactium incendio occurra-
 tur. Id enim morborum iliadem afferre solet, quod pluribus nō
 explicandum. Nimieta omnis vitanda est. Et vt satietas frau-
 di est, ita quoque abstinentia & inedia impensè nocet: frugali-
 tas media esto. Illa morbos à repletionē parit, hæc humores
 adurit, & corpori squalorem inducit. Id autem naturæ tuæ ad-
 uersum est. De vino nil loquor, quòd te victus cultusque
 quotidianus moderatè eo vti docet. Omnino autem abstinen-
 dus non es, quoniam coctioni & humorum distributioni ope-
 ram dicat. Iucundiorē vitam facit sed breuiorē. Idem fa-
 cit quod calx arborum radicibus affusa, celerius maturescunt
 fructus, at arbor facilè tabescit. Frigidæ potus solus non con-
 uenit, vias enim obstruit, obstructio alimenti distributionem
 impedit. Hoc autem tabum ac marcorem corpori conciliat.
 Hinc videmus multos copiosiore alimonia vtentes etiamnum
 elanguescere ac extabescere. Alimenta humidiuscula conue-
 nient. Assa non ita erūt ex vsu, bilem quippe ingenerant. Mul-
 ta de industria prætermitto quæ etiam lippis patent. Aceta-
 ria omnia obsunt, etsi enim lentam cibi cupidinem acetum

ANNOTATIONES.

1. Melancholici (cuiusmodi erat is ager de quo hoc loco agitur) perpetuis querelis Medicorum aures verberant: sed cum assidue querela hunc finem habeant, ut tandem queri pudeat, hoc in melancholicis non est audiendum. Manard. Epist. 5. lib. 4. Epist.

2. Huc pertinet locus præclarus cap. 1. lib. 5. de locis affectis: Quibus vitale robur infirmum est, animi vero perturbationes ob id minus nocent fortius; iis facile animæ essentia dissolvitur. At vir magnanimus, nec ob tristitiam, nec ob perturbationem fortiozem succumbit, ut potè cui animæ robur validum, animi vero affectiones non ita sint vehementes. At præstaret Græcam literam asserre.

3. Cicero coloris suavitatem vocat in Oratore. Et opponi potest verbum ἀπαρτία, id est, vigorem amitto & defloresco. Vnde ad eum sensum Cicero dicit, forma dignitas aut morbo deflorescit, aut verstate.

CONSILIVM SEXTVM.

De Pulmonis vomica.

IO. TASSINI Historia prima narrata est, & ea aliquid commemorabile habuit. Non enim certò tam insolentis morbi & symptomaton causa teneri potuit. Sed exitus morbi qui cum vno post annoprehendit, & de medio sustulit, vnâ ex coniecturis veram esse comprobavit. Vomicam aliquam subesse coniecebamus à qua vapor teter efferretur, vehementium symptomaton author. Rationes quæ adducebant ut crederemus vomicam esse à qua vapor sursum eleuaretur, expositæ sunt. Nec ego vnquam putassem elatum à pure materiæ purulenta vaporem tanti esse. Ad mensem Augustum dolore capitis incredibiliter tentatur, febris assidua, iactationes, verebamur ne in ea incurreret in quæ prius ceciderat. Multum sanguinis è naribus fuderat antequam morbo prehenderetur. Statim iniectum enema, missus sanguis. Eodem die datum medicamentum. Aluus liquidissimis excrementis fluxit. Nec quicquam

compactum apparuit. Ingens erat incendium, & vires naturæ deiectæ erant. Dolorem lateris querebatur, & ad regionem hepatis. Iis locis pungentem se dolorem & lancinantem percipere ac sentire narrabat. De vomica coniectura augebatur. Sæpè vox deficiebat, ac si aut pulmo confossus, aut perforatus, aut adhærens esset. Nil purulentum expectorauit. Non poterat multum & affatim bibere, quia deficiebat spiritus. Et potus velut in cauum descendere videbatur. Septimo die tandem cum sudore pingui interiit. Aperto cadauere deprehensus est pulmo adhærens tum in parte dextra, tum sinistra costarum. Membranae vtrique subliebant. Circum gibbum diaphragmatis pars pulmonis tota in pus & saniem foetentem liquefacta erat. Magna quoque puris materia transfluxerat in hepatis regionem, & ibi conclusa erat. Noua ibi vomica conclusa videbatur. At non erat. Totum corpus internum foetens admodum erat, hepar sanum & lien. Intestina alieno maxime colore. Anno præterito quo grauissimè laborauerat, ut ante diximus purulentas habuerat deiectiones. Ac credo idem hoc posteriore morbo naturam moliri voluisse, sed vias non fuisse idoneas & faciles. Credo quod si vltus fuisset, aut sectus, magna salutis spes affuisset. Nec mirum si periclitatorum cæca medendi ratio, sæpè Methodicorum & Rationalium præceptis & ratiocinationi ante eat. Et cum summus Hippocrates passim hoc remedium in libris *mei iuniorum* vsurpet, nunquid satius est aliquo remedio cruento & ancipiti certissimam mortem, si aliter facias, & id remedij genus omittas, redimere, humanum est & officij plenum aliqua ratione ægrorum miserorum dolores eleuare, atque id magis si cum aliqua salutis spe.

ANNOTATIONES.

1. Verisimile est in febribus putridis à loco & foco ipso vaporem excitari ignitum cor appetentem & ferientem, qui donec discussa fuerit materia pars à qua est eleuatus, alit febrem. Ut enim in agro nostro deprehensum est à certo foco, nempe à vomica suscitabatur vapor qui & à quibus, & febrem excitabat, & veluti miraculo quodam paroxysmus soluebatur. Deinde redibat terrifico modo. Magna est vis vaporis maligni præsertim ubi est *ῥοπή τῆς οὐμῆτος*, ut aliquo loco loquitur Galenus.

Cc iij

206 CONSILIORVM MEDICINALIVM

In Coacis Hollerij multa continentur quæ ad demonstrationem huius difficultatis bibendi, nullo in faucibus tumore existente, pertinent.

2. Hinc putris erat palmo, imminutus, semilacer, & adhærescens: in tali casu oppugnare oportet putredinem per siccantia. Et tamen vulgus Medicorum ferè humectantia consulit, sic dum habet rationem cuiusdam extenuationis, liquida putrefactina præscribit. Galenus multo melius capite vltimo lib. 4. de locis affectis, cum in eo casu desiccantia, & aromatica præscripsit. Vide diligenter locum istum.

CONSILIVM SEPTIMVM.

De Tumore Hypogastrij.

IN tribus maximè rebus disputatio versata est: Primum ut tumoris ventrem occupantis & propria sedes & causa quaereretur: Deinde legitima medendi via consuleretur: Tertio, de futuro euentu, an nouum aliquem morbum minaretur, an supputato, alià ve ratione tumor solueretur. Difficultatis cardo in eo vertebatur, quòd cum decem ante mensibus & difficultas spirandi summa esset, & tumor in regione lienis perciperetur, nec non dolor ad mammam vsque sinistram exporrigeretur, nunc mutata fede ac folio sub vmbilicò tumor latet prementi manui sese offerens. Prius Hypochondrium sinistrum propriè dictum occupabat, nunc verò eam partem quam Hippoc. propriè ἡ ἡγαστρὶς, & Hypogastrium, nos abdomen & fumen appellamus, inuasit. Et quod mirum fuit, repentè deuolutum est id quod ad lienem manui durum occurrebat. Ut iam aliquis suspicari possit, aut lienis extremum obduruisse, aut corpus ipsius, si diis placet, laxatis veluti vinculis illuc prouolutū. Sed doloris vacuitas satis declarat nullam esse relaxationem, immo sunt argumenta lienis & benè habiti, & situm positumque suum retinentis. Cæterùm, cum durities, sublimitasque ventris (quæ μετὰ τοὺς ἡγαστρὶς Hippocrati dicitur) aut Hypochondriaca sit, aut Hypogastrica, aut Hysterica, nullo existente argumento, aut Hypochondriacæ, aut Hystericæ, reliquum est vt sit Hypogastrica, & propriè τὸ ἡγαστρὶς. Contrectanti Hypochondrium vtrunque molle satis, & æquale apparet. Sic & iecur & lien omni cul-

pa vacant. Menstrua purgatio conuenienter satis fit, sic vterus in vitio non est. Restat vt tumor in mesenterio ipso sit, aut in Epiploo. Si quis contingat, ferè sese prodit, vt credibilis sit ad Epilpoo quàm ad mesent. tumorem pertinere. Indolens est tumor, durus, digitis non cedens, inueteratus, sic scirrhi magna suspicio est. Quod pertinet ad repentinam eam à sinistro Hypoch. ad vmbilicum deuolutionem, id nouum non est, cum & Hipp. scribat: *Tumorem in Hypoch. affligentem si recens fuerit, & sine inflammatione soluit murmur circa Hypoch. Maximè verò si cum facibus & vrina excernitur. Si verò non transeat, inuat eum ad inferas partes deuolui.* Id quoque explicat Hippocrates: *Lien eleuatus & impletus distribuit id quod continebat per venas corpori, & maximè in omentum & locos circa ventrem & crura.* Et cum ægra nostra satis intemperanter aquam hauriat, & prauo vtatur victu, non mirū si splen facile colluuiem susceperit, cuius partem in omentum deposuerit. Et cum sæpius diarrhœa ac cholera morbo tentata sit, declarat id interceptionem aliquā chyli, qui moram trahens corrumpitur, & dum per id tempus id quod tenuius est excernitur, id quod remanet vel intextum partibus, indurefcit faciliè ac lapidescit. Vnde in iis partibus & steatomata, & scirrhi, & cancri denique ipsi sectione corporum deprehensi sunt. Nunc curationis capita perstringantur. Ex interuallis corpus repurgetur, præsertim sena, needucta tenuiori parte humorum, corpus illud indurefcit. Frequenti vsu enemat. ex capitibus veruecinis decoctis cum multa mercuriali & maluis. Vfus fotuum remolliet non ita frequenter cōuenit, ne scirrhus irritatus cancerum accersat. Spes nulla suppurati est. Ita enim tumor subter vmbilicum rarè in pus vertitur, contra in superioribus partibus ob loci calorem Gal. Et cum absit febris minor suppurati spes est vt ex loco Progn. patet. Quod si educi possit aut clyst. aut profusione vrinæ crassæ, & veluti *porcus* id moliendum. Ita enim Hippocrates obseruat in Pernitho excretam vrinam quæ contenta haberet genituræ similia, aliquando abdominis tumores soluisse. Quotidie mane illinetur pars butyr. recent. vino albo cloto, addita portione medull. cruris bubuli, aut vitulini. Quod ad præensionem attinet, nisi ægra moderato victu vtatur verendum est ne in Hydropem incidat. Facilis enim cumulus erit humorum, & carniū consumptio vnde Hydropis metus.

Part. 25.
lib. 2.
Progn.

1. de
morb.
mul.

Com. ad
part. 41.
lib. 1.

Progn.
Ad par-
ticularem
35. lib. 1.
Progn.

ANNOTATIONES.

1. Et quod mirum fuit id quod fiscum ipſus lienis adaugebat repenſe ad inferiores partes eſt denotum. Tunc maior extenuatio corporis erat iuxta illud Hippocr. Quis lien effloreſcit iis corpus minuitur. Nunc autē ipſa coloris ſuauiſas, & ipſa coctio reſtuiti incipit. Quintus Serenus capite de tumore Lienis hoc verſibus benè expreſſit. Legentur cū locus poſtulabit, Lien attrahit humiditatē ſua raritate, & ob carnem ſuam criſpam & ſortitiam, ut loquitur Aphrodiſai Interpres. Veteres aquam in liene poſuerunt per ſynecdochen, ab eo quod conſequitur: quia hydrops ſapē à liene eſt. Meſenterium à lumbis ducit originem: ſi ea parte fluxio ſit, hinc rudimentum Hydropis eſſe poſeſt.
2. Benè cum agra aſtum eſt, quòd tumoris materia relictis Hypochondriis in imum ventrem partem minus nobilem depoſita fuerit. Ut enim ex tumoribus is periculoſior qui Hypochond. dextrum occupat, indulgentior vero, Græcis ἐμμελῆς, qui ſiniſtrum opinione Gal. ſic qui relictō utròque inferiores partes laceſſit, minus formidabilis eſt.

CONSILIVM OCTAVVM.

De Febre lenta & Hydrope.

ÆGER iſte febre lenta tenebatur, cum lentitudine totius corporis, offenſio vocis, & veluti πρεδάζων erat, ſemiſopitus, aegrè mouebatur, inappetens omnium ciborum, leucophlegmaticus, quæ omnia facultatum omnium imbecillitatem ſignificare ſolent. Vixit ſemper valetudinarius, quod aut vitio diætæ factum eſt, aut gentilitium fuit. Eius ſorores & fratres ferè omnes antequam conſtantem ætatem attigiffent, perierunt. Facies etiam ſano peſſimi erat coloris, naſo erat velut gutta roſea latentis elephantiaſeos ſignum. Virium ita effoctarū cauſa erat obſtructio, aut partium corruptio, aut ſpirituum diſſipatio, aut cruditas ſumma, aut cacochymia, & penuria alimentī laudabilis quo ſpiritus illuſtrarentur ac recrearentur. Magna horum pars concurrerat. Reuera & intemperanter viuebat, & eodem modo ſeſe habebat quo & mulieres quæ malacia laborant

rant. Et cum cibum appetiisset, cum oblatum auersabatur. Id
fatiscantis facultatis naturalis appetentis signum est Galeno:
Et vt loquitur Hippocr. *ὑπονομεύμενος εἶχε πρὸς τὰ σίτια*. Sed & aliquid
gentilitium erat ex parte patris. Mater longæua viuit, & fieri
potuit, id quod ex parte matris viuacis in eo insitum fuit, cau-
sam fuisse cur ita à grauissimorum morborum periculis emerse-
rit. Eius enim morbi insolentes fuerunt, & Medicis penè admi-
rabiles ferunt visos esse eosque terruisse. Credidimus ab imbe-
cillitate cerebri facultate retentrice imbecilla factam fuisse
magnā pituitæ prolapsionē, quæ pulmones partim obstruxisset,
partim in ventriculum recepta *ἐκλύσις* quasdam & subuersiones
stomachi attulisset. Talis occurfus & *διάρρηξις* pituitæ & veluti
σύντηξις, eum reddidit velut *παράδοξον*. Huius vocis quæ sit ener-
gia libro 2. Epid. meorum annotaui. Videbatur esse lethar-
gus ex pulmone, de quo Hipp. Cuius essentia consistit in ana-
thymiali crassorum & malorum, vaporum à pulmone pituita *de morbis*
putri pleno eleuatorum. Tamen non fuit magna *δύσπνοια*, vnde
colligebant in pulmone vitium non esse.

Febris erat lenta symptomatrica, qualis in vitio partium ipsa-
rum hepatis præsertim solet esse. Vnde Hippoc. in vteri cor-
ruptione non requirit magnam febrem, *πῦρ*, inquit, *ἐλαττωδὲς* est. *de morbis*
Quod notandum ne febris simplicitate, & *ἐνθεν* quæ apparet,
decepti, aut in diagnosi, aut in prognosi labamur. Medicus pri-
marius requirebat febrem maiorem quæ soluendo, & coquen-
dæ cruditati satis esset. Quod Hippocrati apoplexiis febris suc-
cedens *ἀνάλογος* sæpè materiam coquendo conferat. An tamen
febris aliquid proficiat in morbis aliis iam locis explicatum est.

Cæterum cum noctes insomnes haberet, & iactationis ple-
nas, ausi sumus venam aperire: fluxit sanguis corruptus. Et quo-
niam videri potuit quibusdam in tanta cruditate & rudimentis
hydropis minus securam esse phlebotomiam. Defendimus *Trallia-
ni*
hoc nostrum factum auctoritate Tralliani quam expendit Lan-
gius. Trallianus in curando anasarca venam referat, non ratio-
ne quidem frigiditatis, sed quoniam detractio copię confert, *Langius
epistola
viii. 2.
pag. 170.*
vt cum ignis suffocatur à lignis viridibus, ligna detrahuntur. Sic
detractio sanguinis leuat naturam parte oneris detracta. *An in
Hydrope
secunda
venæ*
Tamen, vt ingenuè dicam, ista ratio Tralliani & similitudo, pace
eius dicam, inutilis est. Non enim animaduertit in cruditate
opus esse multo calore & spiritu. At per phlebotomiam eius

210 CONSILIORVM MEDICINALIVM

fit euacuatio. Vnde quibus in ista cruditate mittitur sanguis, omnibus corporis lentitudo & immobilitas quædam aduenit. Id quod experientia docet. Et in lib. 2. Epid. meorum annotauit de Domino de Cossigny, cui in consimili penè cruditate, & corporis catarrhosa dispositione secta est vena: ac statim immobilis & fandi impotens factus est. Salubre quidem & præclarum est remedium venæ sectio loco facta; at intempestiua homini necando, aut morbo protrahendo satis est. Et in nostro ægro pœnituit me facti, quod euentus aliter rem esse docuit quàm nos existimauissemus. Et reuera nos dehortabatur cruditas, sed caeochymia magna suspicio, & dolor nocturnus ad id incitabat. Ac mirum fuit quod statim à venæ sectione dolores quieuerunt, & fuit *ἀναισθησία*, & fandi impotentia, & *τὸ πᾶν ἡ ἀσθενία*, quod & ab infirmitate erat, & à copia pituitæ quæ à cerebro liquecente manans prolebat radicem linguæ & quodāmodo afferebat *παράλησιν*. Caput in superficie adeo erat siccum & squallidum vt exustum planè videretur & extabescens.

Istius lentitudinis causâ relata est maximè ad hepar & partes naturales in quibus cum plurima foret cruditas, & febris lenta, plus excitabatur crassorum vaporum quàm dissipari posset. Propterea si maior fuisset febris, spes esset aliqua dissipatum iri crassos istos vapores qui spiritibus viam obstruentes corpus ita ignauium & lentum reddebant. Videmus enim cum ligna viridia sunt, & ignis paucus, plus excitatur fumi quàm si res ita non esset. Quanquam & accusabatur & pulmo & caput.

Consultum est ventriculo fotibus ex nardino oleo. Nam Galen. syncope opitulari ait litum nardini olei & similia ad os ventriculi. Clysterum frequens iniectio ex cephalicis & detergentibus. Bolus ex conferuis anthos rosarum, buglossæ & theriaca. Purgatio ex rheo cum aloë. Decoctum origani, betonica cum semine, & radicibus pœoniæ sub forma oxymelitis. Duodecim post diebus interiit veluti paraplecticus.

ANNOTATIONES.

1. *Antequam sic affectus esset, pedes intumescabant & detumescabant: post remansit maior pars materia in ventre. Locus est præclarus lib. de affectionibus Hipp. dum rationem reddit cur initio detumescant & intumescant pedes, deinde non sit fugax tumor, quoniam initio vapor*

sanguineus est causa huius rei. Sed quia successu temporis pituitescit magis materia, ideo manet. Vide id quod Christoph. à Vega annotauit in lib. 2. Prognost.

2. De hoc Lethargo, vide lib. 2. Epid. meorum.
3. Febres quæ sequuntur vitium ^{τῆς ὀλῆς ὁρίας} partium, maxima ex parte sunt lente, symptomaticæ & periculose, & incautis Medicis egros necant.
4. Consimilis est morbus descriptus à Manardo Epist. 5. lib. 14.

CONSILIVM NONVM.

De Φιμόσει.

FILIO H. M. Consulis contigit affectus qui Græcis ^{φίμωσις} dicitur. A causa procatartica fuit. Nam cum pruritui satisfacere volens partem defricaret, vlcusculum contigit. Neglectum verò, diuturnitate cicatricem callumque contraxit. Hinc restricta coactaque cuti, glans detegi non potest. De ea affectione ita strictim dicendum, ^{φίμωσις ἢ περιφίμωσις} indifferenter & ad viros & ad mulieres pertinet. Id aut casu, aut natura contingit. Si in viris glans non detegitur, sed præputium vndique ferè coalescit, ^{φίμωσις} dicitur. Si ita glans denudata deducto retrorsum præputio vt tegi nequeat, ^{μεριφίμωσις} dicetur. Quamquam & ^{φίμωσις} Manardo vocatur. In mulieribus aliquando sinus pudoris ostiolum non est perforatum, & si id à natura est, ^{ἀπὸ τῆς φύσεως} dicitur. Imperforatas Auicennæ interpretæ vocat. Si verò casu euenerit, in muliere quoque ^{φίμωσις} appellatur. Barbari id vitij capistrationem vocant. Et cum naturalis est meatuum præclusio ^{φίμωσις} nomine donatur, quacunque id corporis parte eueniat. Sed ^{κατὰ λόγῳ} de præputio dicitur. Porro ^{ἀπὸ τοῦ φίμω} etymon est ^{φίμωσις}; ^{φίμωσις} autē significat nexum summi oris perarum & sacculorū, cum toto superiore eius ambitu in angustum collecto funiculo religantur. Guido Cauliacus præputij clausiōnem vocat. Paulus Aegineta omnium plenissimè egit. Atque ad ^{φίμωσις} in mulieribus laudat infessus emollientes ex hydrelæo, & decocto fœnig. item cataplasma instituit. In viris sæpè fit aut ob cicatricē quæ in præputio cōcreuit, aut ex carnis incremēto.

De ij

Cap. 15.
lib. 6.
pag. 35.

212 CONSILIORVM MEDICINALIVM

unde coalitus secutus fuerit. In hoc adolescente suspicio magna fuit vlceris, quanquam & à natura visa est hæc pars aliquantum imminuta. Ad finem glandis vlcus erat *ἡρόδωτος*. Deterfum est & curatum. Tandem spongiolæ sunt inditæ angustò meatui, vt is magis pateret. Parum profectum est. Cogitabatur de amputatione, aut incisione recta præputij flaccidioris & oblongioris. Res in aliud tempus dilata est. Nil molestiarum afferebat, at metus erat ne non corrumpere virginem posset. Nec id abs re, angustus enim valdè meatus est. Dum hæc agitentur, occurrerunt duo eandem *εἰμωον* gestantes qui in palæstra venerea se non minus strenuos & aptos, quam reliquos affirmarent. Et alter iam quinos liberos ex vxore suscepserat.

CONSILIVM DECIMVM.

De Catarrho.

NIL tam vulgo iactatur quàm catarrhi nomen. Nil cuius & cognitionem, & curationem nemo non profiteatur. Nil in quo magis peccetur, & imprudentius quisque labatur. Immo & imperita garrulæque quæque anus & periclitator quilibet in catarrhis sistendis magnum quid pollicetur: Et quò quis indoctior, eò curandi catarrhi peritior censetur. At hîc video passim vnumquemque turpiter labi & decipi: & miseros ægros, innocentes tamen, tantæ aliorum ignorantia pœnas luere. Nam cùm materia aliàs sit tenuis & effera, aliàs mitis & crassiuscula, non parum interest ad salutem quo quis remedio vtatur. Et turpius hîc peccatur, quoniam frigus omnis destillationis authorem statuit. Errandi hæc occasio inde nata est, quod tussim excitet frigida auræ aspiratio. At hæc ratio languidior est & eneruatior. Et dum falsò hoc vtuntur fundamento, quicquid superstruitur vacillat ac corrui; hinc manauit quorundam neotericorum error, qui à frigido destillationis causam arcessentes, vinum, idque generosum tussiculosis præscribunt. **At hic error, vt apud Homerum** *Ἰλιάδ. α.*

Ἰφιδίμω πολλῶν ψυχῶν αἰὶν ὀφείλεται.

Sed vt his prætermisiss sanitatis tuæ ratio ineatur, capita

hec breuiter perstringam.

Non solum præcautio, sed & curatio necessaria est. Præcautio quidem vt longè antè obuiam eamus iis quæ fera in pulmones destillatio afferre solet. Curatio, vt quod præsens est tollamus. Symptoma enim præsens est, tussis partim sicca, partim humida, cuius causa destillatio est. Destillationem autem fouet morbus quidam & diathesis morbosa in cerebro iam firmata. Id Galeno dicitur *διὰ τοῦ ἐν τῷ κρανίῳ*. Est enim perennis generatio humoris efferi in cerebro qui malus vt signum; & vt causa, vt signum, nam significat imbecillitatem quandam in cerebro; & latens vitium cuius occasione illud excrementum, & serum acre succrescit facultatem expultricem irritans: vt causa, quoniam non solum malè afficit partem à qua manat, sed eas per quas influit, in quas labitur. Vnde eiusmodi fluxionis comes est sæpè exulceratio faucium, gurgulionis marcor, pulmonum pruritus quidam, vt placet Hippo. vasorum erosio, aut apertio, hinc excreatio cruenta, aut varix in pulmone (ita enim Hippo. *καὶ δὲ τὸ ἐν τῷ πνεύμονι*) vocat hinc tabes. Nec tabis nomen ita turbare debet. Reperio enim apud Hippocratem eis tabem quandam esse familiarem quibus pulmones calidiores sunt. At talem tabem, præsertim si eius cura statim habeatur, annuam, sed curabilem statuit Hippoc. Nec enim ab vlcere est, nec à venenata aura. Omissis multis quæ hic narrari possunt id totum in quo laboratur, statuo esse ferinam destillationem à capite iam vetere infirmitate prædito. Nec solum hic accuso caput, sed & partium inferiorum cuidam intemperiei consulendum puto. Omitto multa quæ à primariis Medicis præscripta sunt; nonnulla tantum adiciam, vt multorum virorum de tua salute satagentium conspirationi tam efferus cedat morbus. A medicamentis validioribus abstinendum. Alioqui cursus materie tam efferæ citabitur magis. Nec si dolor capitis oboriatur, propterea ad pilulas veniendum. Has caue, & angue peiores vitabis, præsertim aloen ipsam quæ est *αἰσθησιμὴ*. Nec facit illud quod ex 5. Meth. med. ex Gal. quis obicere potest, qui catarrhosis colocynthiden præferibit. Agitur enim de euellenda materia contumaci. At hic potius temperandum est.

Vfus syrupi diacodyonis, & de papauere conferet.

In auctiore tussi pilulas de cynoglossò non formidarem.

Conserua rosarum, violarum, & caro cytoniorum, conser-

D d iij

214 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ua nenuph. sæpè ore teneatur.

Æstate vteris iulep. rosato in rem præsentem parato.

Valebit plurimum syrupus ex floribus & germinibus salicis, foliis vrticæ mortuæ, summitatibus viminis rubri, bursa pastoris, plantag. addito capite vnius papau. & rad. althææ.

De nocte hordeatis locus erit addito semin. lactucæ in decoctione.

Gargarismus ex plantag. ros. & additione foliorum hyos. ya. valebit. Immo inter cætera id mihi placet.

Balneum aquæ dulcis temperatum & egelidum vitando cernem exuperantiam.

Lac alinæ.

Parabuntur pilulæ albæ, hypoglottides dictæ, addito semine papauer.

Manè iuscula cum decocto pulli & pedum vitulinorum, aut capreolorum additis pass. gly. & hordeo mund.

Si cauteria brachio non iuuant, applicabitur in occip. c.

ANNOTATIONES.

1. Locus hic præclarus de Distillationibus, & sæpè memorandus, ad part. 18. sect. 3. lib. 6. Epid. Distillationes à capite in pulmen malignas puta, si subtiles & corrodescentes fuerint. Has nec in pulmone tandiu morari donec concocta crassescant, conuenit, ut sunt aliæ fluxiones à tenui quidem materia, sed non corrodescente & egrè maturesciente, nec rursus statim eas acres expelli necesse est. Intus morantes non faciliè coquantur, & pulmone lacerant. Si excernantur, etiam tussis molestas excitant, à quibus caput repletur, & hoc rursus deponit in pulmone, & à tussis vehementia vas rumpitur. Id fit in tenuibus humoribus qui spiritum excludentem eludunt. Sic morantes & dum excluduntur, nocent.

2. Ad finem capitis vndecimi lib. 5. pathologia Fernelius vnum commemorabile annotauit quod pertinet ad dignoscendum an aliquo tussiente affectus causa sit in pulmone, an in capite.

3. Catarrhus omnis aut ab externo est aëre, aut à nobis ipsis, ut cum meracum bibimus, aut ab intemperie partium. Is autem morbus non est, sed consequens morbum. Aut enim cerebrum laborat ut pars similis, vel ut pars organica: ut similis, ut cum calidius, frigidius: ut or-

ganica cum plenum est. Quo enim modo se habet diarrhœa ad ventrem, eodem & catarrhus ad caput cap. 4. lib. 3. de symptomatum causis. Hipp. lib. de loc. in homine catarrhum ait fieri à carnibus frigidis, & à calidis. A frigidis per compressionem: à calidis per colliuationem. Et Comm. ad Aphor. 13. lib. 3. Tusses & coryzas symptomata esse ait repleti multum capitis. Duretus interpretans Meth. medendi Hollerij de tussi multa eaque præclara dixit. Vnum est maximè difficile & quod Medicos torquet, quid sit ista tussis que vulgò Quinta dicitur. De hac a' undè in 2. lib. meorum Epidemiorum. Dubitatur enim an ista tussis sit à capite, an à pulmone, an à partibus vicinis veluti fufis & liquatis. Non quòd sit vera syntexis. Omnes enim vulgò ad caput ipsum recurrunt. Galen. Comm. quodam in Epidemia alias partes quam caput accusat. Sed id obscurè facit. De eare diximus lib. 2. meorum Ephemeridion. Reuera inexplicabilis est modus quo fit catarrhus. Nam quid est quod quis in cellam vinariam, aut locum similem descendens statim distillatione laborat? Vbi erat tam multus humor liquatus? Itaque querenda est huius rei causa subtilius.

4. Nam est ubi locus est validi medicamenti, est ubi non. Vnde Celsus cap. de phiciriasi palpebrarum ita scripsit lib. 6. Medicamenta intus lenia dantur, sunt ne quid acrioris prius concitent, &c. Et in Ophthalmiis & Capitis dolore sæpè nocent pilule. Quam ob causam iis qui distillationibus sunt obnoxij, & in meru tabis consilium est Hippocratis, vt incrassentur impinguentia que: Ita enim fiet vt cum hæmoptoici fiant benignitate frequentioris alimenti, sanguis biliosus contemperetur. Quod diligenter et notandum est. Nam in excretionem sanguinis per os plerique Medicorum exactam dietam præscribunt. Sed & annotauimus vnum valdè commemorabile ex cap. ultimo lib. 4. de locis affectis, lib. 2. meorum Epid. nempe perperam eos agere qui humectantia impendio magis vsurpant in morbis thoracis. Corruptionem ipsius pulmonis asferre videntur. Vnde nimius potus, & rerum liquidarum vsus implere pulmones videtur, & sanguinem serosiores reddere.

5. Tanquam à causa sit frigida omnis distillatio, calefacientibus remediis, & pilulis liquantibus omnes penè Medici vtuntur: Item agri ipsi perpetuò fouent caput linteis ad ignem admotis: contra aliquando caput refrigerare oportet, & humorem à capite stillantem incrassare. Quod Aëtius adscripsit, dum loquitur de oxyrhodini vsu in ferina distillatione, ait tenuitatem distillationis inspissat, exurentem & acrem quantitatem in capite refrigerat, tussim sedat, somnum inducit; hoc pauci Medici animaduertunt.

216 CONSILIORVM MEDICINALIVM

6. Postquam primarios Medicos consuluit, usque visum est ex usu esse lenientia, mitigantia, catarrhum compescantia, tandem nostro consilio syraporum incrassantium vsus visus est necessarius. Lutetiam venit iusticulosus, curis implicitus. Debebat enim sistere se coram Senatus examinis ergo. Et cum hinc illincque animus curis agigaretur, bene cœnatus meminit superioris istius Consilij. E. Pharmacopolio syrupum de papauere querit. Eo copioso vsus est, tum ad catarrhi leuationem, tum ad somni conciliationem. Sed sue imprudentie pœnas non longè post pependit. Obmutuit enim, & æquos mansit per duas horas integras. Etiam valdè agitatus vocem non recuperavit. Huic febris apparuit ingens (antè enim æquus non erat) sequentibus diebus veluti balbutiens, & parum attonitus redactus est. Multorum obliuiscatur. Καταπραϊνός interiit. An vsus istius syrupi tanopere obsuit? an materia suppressa quæ κατὰ φύσιν inuexerit? an bonum in catarrhis venenatis & subtilioribus dare narcotica? an non, dum symptomati occurrimus, causam morbi fomitem adaugemus? Etenim in talibus fluxionibus ferinis fit quedam διαχρῶσις, & retinens de Natura syntectica, & talis humoris suppressio cum aliquid venenati habeat, perniciosa est. Commodè per halitum & sudorem exhalaret & digereretur. Sed si hydroticis vitimur, metus est ne corpus caleseat, & humores commoueantur.

CONSILIVM VNDECIMVM.

Ad fœtorem oris.

IN fœtore oris curationis capita hæc sunt. Pars vnde prima mali labes diligenter repurganda. Toti consulendum. Gargarismis os colluendum. Manè præsertim sialismus prouocandus iis quæ temperata sunt. Salvia vino macerabitur. Aurum, id est, numus aureus ore continebitur. Theriaca aut mithridatium quotidie manè deuorabitur. Pilul. vsus ex rhab. frequentissimus. Tabellæ. Pimpinella macerata in vino. Eadem ore contenta. Frequens vsus syrup. rosarum pallid. vini absinthitis frequens vsus. Carnium vsus paucus. Vitanda allia, & quæ odore ingrata sunt. Granatorum, & limonum vsus iucundus. Pomorum aureorum cortex conditus. Vsus coriandri. Masticatio nucis moscatæ miro profectu indulgetur. Aqua cister-

cisternæ cum rosa ad collutionem oris.

℞. Rad. acori & coriandri preparati. an. ʒj. dictami. ʒj. absinth. pontici scorad. an. p. s. buglos. pinpinel. pilos. meliss. starchados. an. p. s. florum cord. p. s. fiat decoct. in qua infunde rhab. ʒij. s. cinnam & nucis moschat. an. ʒ. s. expressioni adde vini albi cochlear vnum syrup. ros. pallid. ʒx. fiat potus.

℞. Coriandri preparati ʒij. pulu. panis tost. ʒ6. fœnicul. dulcis conditi. ʒj. glycy. ʒss. fiat mixtio.

℞. Tabell. aromatizati & diarrh. abb. an. lib. s. utatur.

℞. Mithrid. ʒiij. conserua rosarum buglos. & violarum. an. ʒj. utatur mane, & hora somni.

℞. Rhab. ʒij. nucis mosch. grana 8. pulueris arom. rosati grana 6. agar. troch. & aloes lota. an. ʒj. cum vino albo infusionis zingib. & cinnam. fiat massa utenda ad 4. pilulas sæpè ante pastum.

Aquæ Imperialis vsus conuenientissimus, & vinum absinthites.

ANNO TATIO.

1. Cùm à toto corpore sudor graueolens manat, quod symptoma vè plurimum biliosis & ruffo capillitio cutèque subalbida præditis contingit, hac ratione corpus odorum & benè olens redditur, præsertim æstate, quo tempore cuius spiracula & pori patent propter ambientis aëris caliditatem, coquunt radicem cardui benedicti in vino albo, quotidie manè propinquant tres vel quatuor ʒ. statim à potu huius decoct. vrina crassa & fœtens redditur. Vel, accipitur terebinthina Veneta ad quantitatem oliuæ cum pari portione mellis, coquitur modicè, deglutitur, vinumque insuper bibitur. Alij magno profectu myrrha & serpylli pares portiones terunt, & ex iis pilulas formant, quarum duas manè deuorandas præbent, insuperque vinum bibendum exhibent. Hac præsidia non modo ad totius corporis fœtorem, sed etiam ad oris graueolentiam arcescendam valent.

CONSILIVM DVODECIMVM.

De febre continua cum grauibz symptomatibz.

VANDOLII Historia, & illius qui interiit, cuius mentio facta est in lib. 2. Epid. meorum, notanda est & aliquid affine habet cum iis quæ in Prorrhetico scripta sunt, cum docet Galenus quomodo multa etiamnum euacuatione facta morbi tamen remaneant. Verba autem sunt hæc, Nempe, cum affectio fit & nondum facta est, separata causa ipsam efficiente, sedatur, si verò completa ea fuerit, etiam si euacuata fuerint illa humida, Græcè τὴν ὑγρὴν, quæ affectionem procreauerint, nil in sanatione rationis amplius existit: Græca verba sic habent, quoniam interpres obscurus est, πάλιν ἐστὶν εἰς ὑγρὰς λόγον. Nihilo magis proficitur quod ad rationem ipsius sanationis pertinet. Quanquam nec nobis placet omnino nostra versio latina. Verba enim Græca maiorem habent εὐεργεσίαν. De Vandolio res ita habuit. In omni re erat nimius, indulgebat veneri etiam crudus. Curis & sollicitudinibus sese conficiebat, & ut tædia suscepta leniret aliquantum, cibis multis & meraco omnem molestiarum pressum eleuaturum sese credebat. Siccum valdè & ἀνυχόμενον caput habebat, & ab infirmitate ardoreque concepto per diffusionem quandam κατὰ τὸν ὅλον. Cruditas toto corpore multa erat, & partium latens vitium ob causas prædictas. Is febricitare coepit. Rem parui fecit, sibi ipse Medicus fuit, & incio Medico tabella magni scutiferi, diagredij quantitate euacuationem magnam vulgi opinione moliri solita, aluum subducere morbumque tollere studuit. Laxatur aluus intempestivè, irritatur destillatio, tussis assidua, febris continua, sudores ferè perpetui. Sudorum ista frequentia ab instituto Medicos reuocauit. Nil enim tentare audebant, cum copiosus esset sudor, & corpus valdè sudandi assiduitate debilitaretur. In multo hoc sudore spem salutis ponebant. Febris non frangebatur, aut id nos latebat. Secta vena, non abundè detractus sanguis. Septimo die restitutus videbatur. Octauo, febris magna non ad sensum quidem, sero deliria, iactationes, verborum absurditas, sudor nullus,

lingua sicca & τεραχῆα & fuliginosa. Sitis non erat ἀξιόλογος. Mente parum constabat, ad se aliquando redibat. Exacerbata omnia. Inflammationis, & in gibbo hepatis, & in cerebro magna argumenta. 14. die cum sudore diaphoretico interiit.

Nec enim credibile est tantam esse initio mutationem ut resolutione iam adsit. Et quæ per excretionem seu expressionem fit, aut natura, aut arte tentatur. Nec pluribus de eo modo dicendum. Vnum tantum obiter monendum: An presentibus sudoribus initio morborum cessandum, & non aut vena aperienda, aut corpus purgandum? Omnes enim ab opere cessant. Ego verò existimo etiam moliendum aliquid, quod inanis sit naturæ conatus causam morbi per cutim emoliri volentis. Nam sæpè ingens est intus æstus iuuans eam excretionem; interea natura fatiscit, & nil salutariter excernitur, quia nondum cocta ac mitigata est materia. Et cum principium morbi in isto prouocando sudore natura exigit, locus non est solennibus remediis, & ita omnia in peius ruunt, agrique malè res eunt. Hoc Vandolio cōtigit, satius enim fuisset naturam nihil moliri quàm frustra aliquid moliri. Et nos cum faceremus Medicinam cuidam mulieri regionem hepatis dolenti, nos non reuocauit ab vna, atque altera venæ sectione sudor. Immo inanis iste sudor cessauit refrigerato per phlebotomiam corpore, & leuata oneris parte natura, (quod obseruandum est in Medicina facienda attamen id cautè faciendum.) Incendium erat internum quod sudandi occasionem incitabat. Sed dicet quis, si initio morborum ars aluum etiam copiosè fluere facit, vomitiones excitat, & natura idem præstat, cur non & sudores proliciet? Eadem enim vtriusque rei ratio esse videtur.

ANNOTATIONES.

1. Sudor omnis aut sit per excretionis modum, aut resolutionis, aut oppressionis. Et hanc postremam explicant Gallicum dicunt, vne sueur d'ahan. In Vandolio erat potius sudor oppressionis. Notauimus lib. 2. Epidemiorum meorum, quid sit corpus esse, ἐν τῇ πίσει & τῇ λύσει: ut epilepsia & conuulsio omnis dicatur esse, ἐν τῇ πίσει, paralysis vero & paresis ἐν τῇ λύσει. Quod notandum est. Et nunquid id quod de iis affectibus dicitur, idem de sudoribus dici possit, ut sudores qui sunt diaphoretici & παθητικοί, dicantur esse, ἐν τῇ λύσει, siue per λύσιν τινα, qui verò

Ec ij

16 CONSILIORVM MEDICINALIVM

per excretionem sunt ἐν τῇ τὰς ἐνεί, sine ἡ τὰς τῆς. Quod ex Epid. Hippoc. colligi quodammodo potest.

2. Aphrodiseus prob. 122. lib. 2. Querit cur sudores ante paroxysmum sint graues & molesti, qui febrem sequuntur per relaxationem & remissionem effluunt. Quia qui antecedunt per violentam expressionem destringuntur. Ex Hipp. 4. de Morbis, aliquis probauerit in febribus esse inutiles, quia aqua sanguinis exhalat. Aqua autem repugnat febre ex Hippoc. Notandum autem, quod sudor omnis fit aut per excretionem, aut resolutionem, aut oppressionem. Hæc postrema ratio in agris sæpè obseruatur.

3. Circa sudores multa possent animaduerti. Sed duo obseruari debent, prius, quod sudor tempore erumpens maximè faciat ad morbos iudicandos & dolores sedandos. Posterius quod ubi cruditas est multa, sæpè sudores multi sunt. Circa prius peccari solet plurimum. Nam cum & apozematis & medicamentis purgantibus aluum sollicitamus, & urinas prouocamus, sudandi occasionem demimus. Quibus enim alius humida est, humorque ad vesicam affluit, sudant minimè. Ideo natura renouatur ab excretionem per sudores. De posteriore ita considerandum ex Aphorismo 41. lib. 4. Nam in morbos casuri longè ante sudant, & is sudor est prænuntius morbi quemadmodum, & ἡ ποτὶς αὐτὸς αὐτὸς. An non potius à cruditate est, & si est, num potius coquendum, quam vacuandum?

CONSILIVM XIII.

De Ptyalismo.

Capita hæc fuerunt deliberationis:

Cur cum macer sit, immo ad tabem vergat, tanta humiditate caput sit præditum vt ptyalismus finis non sit. Fortè partes siccae sunt humiditate natua, humidæ excrementitia vt in senibus contingit, vt iam senectutis ex morbo sit rudimentum. Et est summa naturæ infirmitas, & facultatis retentricis imbecillitas, vt iam sit πρὸς μακρὴν διάθεσις. An talibus vsus iusculorum conuenit? humidi sunt, dices, & catarrhosi, ergo siccandi. Item siccum sano propinquius, vt etiam ij qui corpus siccant diætā, aut alia ratione melius habeant quam alij. Et homines

squalidi, sicci & quasi strigosi longius sæpè viuunt quam contrarij. Et cum cerebrum sit metropolis humidi & glutinosi, an non seruandum similibus?

Hippocr.
lib. de
causis
bas.

Ptyalismus aderat. Vnde? Nam ptyalifant Hypochondriaci, quibus cerebrum inflammatum, quibus melancholia cerebralis est, quibus catarrhus perennis, aut ventriculus humiditate natat, aut corpus lienis aqua plenum est: Vel post morbos longos vt febres quartanas & quotidianas in quibus tandem superueniunt *ῥευματισμοί*, vt ait Galenus qui ptyalismus sunt causæ.

Lib. de
Typis.

Dictum an sputum omne sanguinis, præsertim si à pulmone esset *ῥεῖσιν*, vt videtur Gal. docere: an tutus validiorum medicamentorum vsus catarrhosis & pulmonicis, quod in primo Tomo Consiliorum dictum est.

G. Aphor.
rismorū.

Videbatur habere excretionem è pulmone & semiputrefactam, id est semicoctam (*ἡμισυμμένη* enim apud Hippocr. pro non absolutè cocto & mitificato sumitur) & effoeminatam, Græcè *ἐπιθροσύνη*, vt vocat Hippocr. id est dissipatam, diuulsam, nil compacti habentem, & abominatur sputum ipsum, Hippocr. vocat *μυρσὸν* τὸ σπῆγμα, quod aut malitiam, aut malignitatem sputi declarat, & rei quæ è pulmone excernitur. Ita enim Hippocrates loquitur lib. 2. de morbis.

Lib. de
morbis.
Ibid.

CONSILIUM XIV.

De febre quartana cum grauissimis symptomatis.

LVDOVICI DV BEX Historia commemorabilis. Cum febre quartana laborauisset diu, & ea quasi contabesceret, colicis doloribus crudeliter diuexatus & tandem collapsum propè abdomen est, & ita emarcuit vt sceleton esse dixisses. Inter alia symptomata quæ contigere, & quæ Medicis negotio fuere, difficultas quædam potandi fuit! Mirum hoc, appetebat cibos, & benè deglutiebat, sed cum bibebat, secundo aut tertio haustu tanta difficultas, & molesta tussis contingebat, vt ad nares resiliret potus. Causa cognitu difficilis. Nil enim in faucibus tumens apparebat, nullus aderat dolor. Ego id referebam

Ee iij

222 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ad ligulæ quandam contractionem, & asperæ arteriæ siccitatem, quæ efficeret, vt non satis obsequeretur hauriendo liquori, ita vt in asperam arteriam de potu aliqua pars defflueret. Id quod tussim & molestiam afferebat. Alius Medicus ad inflammationem id referebat. Decipiebatur meo iudicio. Et quoniam res ea est difficilis, legatur Commentar. Hollerij in Coaca aduersaria. Eò loci abundè de ea re scripsit. Nos ita ægro & admotis & assumptis occurrimus humectantibus & lenientibus. Et id profuit. Cum enim pinguior factus est, istud cessauit symptoma. Ita scriptum voluimus quoniam res ea contemplatione digna fuit.

CONSILIVM XV.

De ἀμβλωπία.

NE malum in oculo obfirmetur, primo quoque tempore danda est opera purgando capiti. Hoc enim mali fomes censetur, non pars alia.

Decimo quinto quoque die deglutientur pilulæ in eum vsu paratæ, quarum vis vt paulò maior erit, ita rariùs in vsu venient.

Interponentur pilulæ blandiores hora vna ante cenam leuiorem deuorandæ. Nec ab officij publici munere erit feriandum.

Parabitur conserua mane & hora somni vtenda vt robur cerebro addatur, & oculo vis vernacula restitatur.

Sed vitæ ratio prima hoc loco parteis sortitor, vel habeto. Prandium liberalius esto, cœna frugalior & parcior.

Vini præsertim, vt potè cerebro, neruis & oculis inimici moderatus vsus esto. Nec enim è re putatur esse si omnino circuncidatur.

Afforum quam elixorum vsus frequentior esto, non tamen omnino à iusculis temperandum.

A luculento igne fugiendum, vel saltem oculis obex aliquis opponatur, spiritus alioqui visum impertiens dissipatur vehementioris aeris calidi percussu.

Cibus simplex vsuuenito, varietas vitator donec lumini natius splendor restituatur.

A lucubrationibus quoad fieri potest, abstinendum, & lectione pertinaci. Vbi enim dolor est, quies & tranquillitas imperanda, nec è pedibus laboranti incedendum. Durum iis quibus carere libris vita carere est.

Magnarum cogitationum cursus reprimendus, magna enim cogitatio obcaecat, Plinio, abducto intus visu, propterea circuncidendam omnem negotiosam cogitationem vel actionem Celsus mouebat.

Qui crudus dormit, praesertim statim à cibo, destillationes excitat atque alit.

In conuiujs aliquando adesse, saepius ab iis sese retrahere oportet.

Sobrietas hinc primas tenet, sed inedia non toleranda, vt ij faciunt qui vt famem opsonent, pastum vnum praetermittunt. Sic enim natura offenditur.

Tranquillitas animi, & incitatoris cursuum animi sedatio in primis quaerenda.

Hæc facilius obseruaret qui suæ spontis est, & nullis obligatus est legibus, cui licet modò ruri esse, modò in vrbe, non exacta obseruatio, sed mediocris quaeritur. Verum oculorum dignitas satis exactam legem indicit.

Quod ad externa attinet, cucurbitularum applicatio frequens in humeris esto.

Clysterum magnus est vsus, ne ventriculi offensio vlla à medicamentis consequatur, quanquam in blandis consistendum.

Procurant semper veteres alui libertatem, quod ea vnica sit morborum ocularium medela, qui alioqui alia remedia eludunt: nialuus, aut sponte, aut arte soluatur.

Si malum contumacius erit, quod speramus non fore cum Deo, capietur occasio vsurpandi illius remedij solennis, quod vt ferius vsurpatur, ita manifestiorem cæteris præstat effectum.

Si Deus nostris votis annuat, breui oculi serenitas recuperabitur.

ANNOTATIONES.

Cum quis queritur de imbecillitate visus, non ita multos esse oportet.

224 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ret in purgando, nam aliquando potius est corpus reficiendum quam medicamentis agitando. Quis enim dubitat quod aut in cerebro sit infirmitas, aut cruditas. Si sit alterutrum, benignius est tractandus eger. Vnde Hippoc. Acut. 4. in catalogo eorum qui purgari non debent, censet eos quæ obscure vident. Quanquam mouere humorem, & non educere, sæpè magnorum symptomaton causa est. Alter error qui committitur est, quia nimis liberaliter utimur frigidis & repercutientibus in morbis oculorum. At vim, & id quod est æthereum extinguimus & membranas magis frigefacimus, &c. Etsi aër frigidus oculos laedit, cur non aqua frigida? Item notandum est humorem qui ophthalmiam facit, ratione quidè crassioris & humidioris partis frigidum esse, ratione verò partis tenuioris acrem esse & mordacem. Sic vnum & idem remedium non confert. Vnde vulgi remedia sæpè plus prosunt quam methodicorum conquesta præsidia.

2. Locus hic notandus, vide locum bellum de animo & oculis apud Plin. in Epist.

Plinius 3. Ad superiora suo loco, subque ordine adicies duo, vnum de decubitu, alterum de usu veneris. Decubitus supini conueniunt oculorum affectionibus: venus medetur lumborum dolori & oculorum hebetationi. Idem Cap. 6. Quanquam de Venere dubitatur. lib. 28.

CONSILIVM XVI.

De ἀνορία, Pro magnifico Sederino.

CVM ventriculus langueat per cibi quandam abstinentiam & ἀνορίαν, non mirum si in dies ista ἀνορία increseat, & corpus contabescat. Admirabile enim illud est quod scripsit Hippocrates lib. de Diata acutorum. Quibus in more positum est bis die cibum capere, si fortè illi non pranderint, infirmi fiunt, iacent & ad omne opus timidi, stomachi morfu tentantur: viscera suspendi videntur, meiunt urinam calidam & flauam, & ster-
cus peruritur. In Græco¹. κρεῖναι δὲ δοκεῖ τὰ σπλάγχνα αὐτέοισιν. Iste autem κρεῖναι σπλάγχνου & μετεωρισμοῦ, non aliundè est quam ob collapsum stomachi habitum, qui cum intumuit visceribus est cuiusdam fulcri loco; viscerum enim repletio est viscerum restitudo quæ-
dam

Part. 2.4.
lib. 2.
Acuto.

dam'. Vnde fit vt quidam squalido habitu & melancholico cum tulerunt abstinētiā vnius diei aut plurium dierum, existiment sua veluti viscera pendere, & mali Medici frustra eos medicamentis sollicitant, potius verò adiectioni studendū est, quam detractioni. Maximè verò peccant Medici si corporibus biliosis abstinētiā præscribunt. Nam efferatur magis bilis in illis, vrinæ redduntur tinctæ magis, augetur intemperies. Deiectionis exurit, habitus corporis, & præsertim extimæ partes refrigerantur. Nam in picrocholis vernaculus calor, ait Galen. *Com. ad part. 2. lib. 2. Acuto.* In id quod igneum est digreditur, propterea & temporum pulsus est manifestus: & extimæ partes refrigerantur quod venter humoribus, Græcè *ἰχθυήεις*, biliosis repleatur, quorum morfu atque contristatione affectus virtutem dissoluit, corporisque extrema refrigerat. Et cum solum enæorema sufficiat in corporibus valdè biliosis ad crisin, hoc docet quod tales morbi non tam in materia multa, quàm in pauca cāq; qualitate nescio qua affecta consistat.

ANNOTATIONES.

1. *Κρεῖναι*. Plin. cap. 5. lib. 28. videtur citare hunc locum, & ait non prarudentium extracelerius senescere, legendum pendere & succrescere.
2. Quo pertinet illud Hippocr. in lib. 3. de articulis cum loquitur de fractura costæ, Si febris continua non prahendit eum qui fracta est costæ satius est eum non inanire. Inanire enim est *ἰσχυρὸς καὶ στενός*, *πυρετός* *δυσχερὴς*, *βραχὺς* *δυσχερὴς*: moderata repletio ventris directio costarum est, euasatio autem *ὑπερπληρία* facit, & *ὑπερπληρία* dolorem. Vnde melancholici sæpè non possunt explicare quandam doloris speciem quæ non aliunde est quam propter istum *ὑπερπληρία*: moderata enim repletio *δυσχερὴς* quoddam visceribus affert. Hoc valdè explicat Hippocrat. lib. de veteri med.

CONSILIVM XVII.

*In quo continetur explicatio Aphorismi 34
lib. 6. Aphorismorum.*

Iis qui calui sunt varices magni non fiunt, quibus verò caluitio laborantibus varices superueniunt, rursus capillati fiunt.

DVO in Aphorismo explicando animaduerti debent, primum quidem dictio ipsa, deinde verborum sensus & res subiecta. Nam & Galenus optimus Hippocratis interpres omnino Aphorismum istum eiurare videtur. Tandem honorarij arbitri partibus functus, interpretationem verisimilem apponit. Atque inde totius Aphorismi fundamentum omnino vacillare ac nutare ait, quod Hippoc. supponat πῶς φαλάκρας, affectum esse sanabilem. Quod vt intelligatur verborum distinctio apponenda est, μαδάρωσις & φαλάκρας, affectus affines esse videntur. Vterque ad caput pertinet, nisi quis referat nomen μαδάρωσις ad palpebrarum morbos. Sed tum confunditur cum nomine μαδάρωσις, φαλάκρας caluitium seu caluities dicitur, μαδάρωσις defluuium capillorum. Caluities insanabilis est, madarosis sanari potest. Hanc enim humorum prauitas committit, quam si correxeris, generando capillo occasionem porrexeris. At caluitium ab exausto est potius & siccitate. Senibus familiare est, quia cerebrum consumitur, id est, vt Galenus explicat, imminuitur, præsertim parte capitis anteriore. Nec amplius cranium alluit, & propterea in syncipite potius caluities contingit, quàm in occipite. Siquidem dum cerebrum siccatur, & quodammodo minuitur, pars anterior capitis non tam sæpè, nec tam facillè irrigatur nescio quo rore, qui est velut capillandi occasio. Vnde qui calidiore & sicciore sunt temperamento caluescunt aliis celerius. Contra Eunuchos, mulieres & pueros caluos negat fieri Aristoteles, maximè ob humiditatem Eunuchos quidem quoniam effœminantur. Quanquam & in

Com. ad
part. 1.
sect. 3.
lib. 3.
Epid.

immodica humiditate, aut nulli, aut rari sunt capilli? Ex his itaque patet hoc loco improprie *καλακρὺς* vocari, sed eos intelligi vel quibus defluunt capilli, vel quorum habent capillū, quos Græci vocant *ἀραιότριχας*: & caluitium ita generaliter vsurpatur. Vnde Tullius in Tusculanis: Proinde stultissimum Regem in luctu sibi capillum euellere scripsit, quasi caluitio moror leua- *Tullius* retur, vbi nomen caluitiei generalius paulò sumi videtur. Nunc ad institutum de Aphorismi sensu nos conuertamus.

Varix & caluities affectus sunt longè diuersi & semoti⁴. Varix dilatatione venarum tiliarum aut crurum definitur. Caluitium capitis est affectus, est item & defluuium capillorum, nomine capitis sumpto paulò generalius, vt fecit Celsus. Sic sedibus affectis longè distinguuntur. At idem humor & defluuium capillorum parit, & varicem. Præuus enim cum existit, radices capillorum exedit, vnde defluunt facillè capilli, & glabrities contingit. Vnde admirabilis est humorum, aut *ἀνδροπία*, aut *κατὰρροπία*. Si enim viam sursum affectat humor, capillorum defluuij autor est, si deorsum; implens dilatansque vasa, varicem infert. Et quod in arteria aneurysma est, idem in vena est *σπινδὴν ἢ χίρσος*, varix Latinis. Ac de varice ita Galenus, dum explicat quomodo varix soluat insaniam, Græcè *μαρίαν*, varix ex crasso & melancholico humore fit, adeò quòd natura pellente ad partes ignobiles eos qui maniam efficiunt humores, præsertim cum crassi fuerint & melancholici, sequitur passionum prædictarum generatio, & maniae solutio; vbi duo notanda sunt, prius, quòd humor varicem generans sit crassus & melancholicus; posterius, quòd intelligatur de mania à succo melancholico simplici, non de furore qui à bile est⁵. Quanquam & meo iudicio soluere potest maniam à succo melancholico à bile assa- tagenerato. Sed tamen hîc nomine *τῆς μαρίας τῆς μελαγχολίας* intelligendam putat. Itaque magna vis est deriuationis humoris & reuulsionis à partibus in partes aliàs, vt mirum non sit si varix obortus defluuij capillorum occasionem tollat. Humor enim concluditur venis varicosis, qui si in caput transferatur, radices capillorum sua virulentia consumens, capillos defluere faciat. Vbi duo notanda sunt & quæstione digna: Prius an actu & sua mole humor crassus melancholicus varicem committens caput petat, & rursus à capite delabens ad tibiae & crura sese cursumque suum inflectat. Et quâ id ratione videatur fieri. Poste-

228 CONSILIORVM MEDICINALIVM

rius, an non defluuium capillorum peculiari capitis vitio contingere queat, vt quantus vis oriatur varix à tali morbo caput vindicare non possit. De posteriore dicemus primo loco. *Com. ad part. 13. sect. 3. lib. 6. Epid.* Galenus explicans part. quandam Epid. vbi Hipp. vult flatulentam dispositionem tanquam causam adiuuantem esse in propagando affectu in alatis quos *πτερυγίστας* Græci vocant, quod vbi est infirmior calor naturalis, flatuum sit prouentus, & vbi flatuum prouentus, maior occasio ruptionis vasorum ac proinde spuitionis sanguinis vnum affert commemorabile, & ad institutum pertinens. Ac primum reprehendit eos qui pro *πτερυγίστας*, legunt *πτερόστας*, id est furfurosos, vt sic hic eorum sensus, dispositio flatulenta, iuuat maximè ad generationem furfurum in capite. Nam si flatus est multitudo, declaratur flatulentus calidusque spiritus qui effert multos vapores sursum, hinc furfurum nata occasio. Tribus modis respondet, primum mille videri minimè flatulentos, quorum tamen in capite porrigo est multa. Secundò, quod omnibus calida excrementa contrahentibus furfures multi nascerentur, quod falsum. Tertiò, aliquando caput peculiari quodam vitio furfuraceum est, & porriginosum, cū alioqui humores naturaliter affecti sint. Tertia hæc ratio est notanda. Nam quod dicitur de porrigine, idem dicendum de capillorum defluuiio. Siquidem totius corporis humoribus benè alioqui temperatis, caput vnum ita potest esse affectum, vt in eo redundet prauis humores *καταρρέουσιν* authores. Quod etiam in reliquis affectibus corporis considerandum. Nam frustra toti corpori consuleretur, si in vna tantum parte dispositio, malumque inhærescat. At in eo casu qui dictus est, varix obortus nil ad defluuium capillorum tollendum conferret. Sic priori quæstioni factum satis.

De posteriore dicendum, videtur penè impossibilis ea humorum melancholicorum metastasis, & reuocatio ad inferiora, cum eorum motus piger sit, & crassitudo magna. Nam de humoribus melancholicis nos intelligere diximus. Ac Galenus in Commentario istam metastasin à capite ad crura fieri dixit. Et idem Hippocrates, quod mirum esse debet, vocis gracilitatem, id est, hæsitantiam, vt quidam interpretantur, varice oborto in testiculo alterutro tolli scribit: immo negat posse solui siue horum altero varicibus obortis tentato. Nam subiungit *balbos, caluos, gracili voce præditos pati fortiter, τὰ μὲν αὐτοῖς*

*Initio
sect. 5.
lib. 2.
Epid.*

quod si verum, minimè mirum esto si varicibus obnoxij esse debeant, & varix magnam ad firmitatem vocis oportunitatem afferat. Præterea eodem loco scripsit Hippoc. dolorem in locis infernis fortem surditas tollit, item hæmorrhagia. Et eodem loco, Quibus tussis sicca, his non soluitur nisi dolor fortis ad crura, aut testè, aut coxas irruat. Et rursus, Hydropici fiunt *gallæxpoi*, id est patiuntur *κατάπνοιν*, quod fit aut per translationem, aut cerebro ipso iam aquescente, & Hydropicam dispositionem suscipiente. Huc pertinet & Aphorism. solennis, *Quibus biliosæ deiectiones superueniente surditate cessant, & quibus surditas, si ille sup. ruenerint eandem tollunt*. Bilem enim ad cerebrū tolli in Comm. Galenus scribit, quod an verum, considerare oportet. In hoc enim disputationis cardo vertitur: In quolibet humore quadam est pars tenuior, crassior altera, Crassior non videtur ita facilè ferri, nec id quod varicem committit, aut quod deiectionem biliosam multam, ad cerebrum rapi videtur. Et vix aliquis translationem motūque sursum humoris præsertim pigri & crassi qualis committit varicem, fieri facilè credat. Ideo credibilis est ferri potius partem tenuiorem, & spirituosam, quæ ipsa orgasmum facere solet, & quæ præ se fert cacœthiam virulentiamque si qua sit. Vt si eam tenuiorem partem alterando domet, atque demulceat, plurimum adiuventi attulisse videatur. Et ne videar hanc interpretationem finxisse, ea Galeni est in Prothetico. Docēs enim cur iis quibus suppressæ sunt hæmorrhoides, & cor doleat, & lumbi. Non enim idem eodem in loco vtrunque dolorem excitare videtur: Galeni hæc verba sunt: *Copiā in renis acervatā tenue quoddam serum, ὀπίθ᾽ ὁσπῆς, in ventrem confluens cardialgias parit dum in os eius ascendit, quod maximè sentit. Bona autem abundantia portio ad inferum repens locum, in quem & primū deferri consueverat (nam de hæmorrhoidibus sermo est) lumborum dolores efficit*. Quod & humori capillorum defluuium parienti euenire potest. Nam tenuior & serosior eius pars ad caput repens facit, vt defluant capilli corruptis eorum radicibus, quæ pars si cum crassiori alia parte ad partes inferiores deuoluta fuerit varicosa corpora venarum reddere apta esset. Itaque ex hoc Commentario discere oportet, admirabilè esse humorum inclinationem per venas, arterias & cœcos aquæ ductus. Item vim stupendam naturæ, vt quæ sua facultate expultrice armata, de parte in partem humores pellens

Ff iij

230 CONSILIORVM MEDICINALIVM

etiam contra naturalem motum *ἐκ τῆς* eorum, modò generandi morbi, modò eiusdem tollendi occasionem afferat. Vt Medicus fatagere debeat num qui partem obsidet affectus, peculiarem imbecillitatem sequatur, an non in alia corporis parte sit scaturigo à qua humor emanet. Nam hæmorrhoids excitata, aut varix procuratus morborum terrificorum cerebrum appetentium soluendorum causa esse potest. Actum sexto Calen. Februarij anno 1578.

ANNOTATIONES.

1. Varices caluorum nisi magni fuerunt, furiosi fiunt *ἐκ τῆς* sectione. lib. 2. *ἐκ τῆς* De caluitio idem potest dici quod & de canitie Aristoteles, ubi vitiligo ibi capities, non contra: ubi cutis laborat, ibi capillus; sed non ubi capillus, ibi & cutis. Quod notandum est.
2. Plinius cap. 45. lib. 11. citat ex Oppio autore vetustissimo Varices in cruribus viris tantum, mulieribus raro euenire. lib. de atra bile nō fallor agit quoque Gal. de varicibus. Et Plinij eodem capite notanda historia de Caio Mario varices patiente cui vni viuo extracti sunt, & quomodo varices mulieribus non accidunt, ita nec hæmorrhoides. Tamen nostra ætate magna mulierum pars varicosa est.
3. Et sect. 5. lib. 2. Epid. ait Hydriopicos fieri *ἐκ τῆς*, nomine etiā improprie sumpto.
4. Locus est apud Hippoc. vocis grauitatem varix tollit. De quo loco abunde diximus. lib. 2. *ἐκ τῆς* nostrorum. Agitur enim abunde de vocis grauitate. Et lib. 1. meorum Epid. De vocis gracilitate quam varix tollat plenè.
5. Notandus locus apud Hipp. ad part. 34. sect. 1. Prorrh. Ad corporis totius intemperaturas sequitur mentis lesio, cerebrum enim non aliter afficitur quam totum corpus. Queri autem hic potest quomodo & bilis repat sursum, & succus ater, al. as in capite caluitium excitaturus, aliàs deorsum translatus, varices. Et distinctionem attulimus de humoris duplici substantia, una tenui, crassa altera. Et huc pertinet locus præclarus memoriæque dignissimus apud Aphrodisæum, cur atra bilis in crura decumbens, aut in mamma cancerum exciet, in cerebrum translata eadem non cancerum, sed maniam inducat? Vt non videatur ad cerebrum crassior pars materiæ repere, sed tenuior, Aphrodisæus. prob. 90. lib. 1.
6. Paulo ante diximus, quomodo atrabilis in mammis & cruribus can-

orum non excitet, sed maniam.

7. Id genus solutionum per apostasin, alium modum adumbrat Hippocrates. Solutio coxarum doloris, oculorum distortio, cecitas: testium tumoris mammarum eleuatio. sect. 5. lib. 2. Epid.

8. Melancholici maximè sunt flatuosi. Et cum flatus sese quoque versus facile in sinuet, non mirum si à capite ad tibias, & ab his ad illud malum repas. Maximè vero quod varices sæpè à flatu melancholicis oriuntur. Præterea melancholici sunt hæmoptici ratione istorum flatuum. Et ut alius locis annotauimus, minùs in melancholicis formidabilis est excretio sanguinis quam in aliis.

9. Huc pertinet locus 2. Epid. ubi scripsit, Varices caluorum si non magni fuerint, furiose fiunt.

10. Quod Heropyri historia demonstrauit. Huic febre continua laboranti coxendix dextra laborauit factò in eam partem abscessu. Deinde surditas & febris allenabatur, tum coxendix magis dolebat, & contra. Quod notandum est ut intelligatur quæ sit natura vis, & symptomaton successio.

11. Galen. cap. 4. lib. de atra bile, sanguinem nigrum & crassum natura in crurum venas deponit, à quo distente varicosæ redduntur, cutisq; venis obienta tractu temporis nigrescit. Verat autem sic affectas venas secare, ne quibus sectæ sunt, melancholia corripiantur. Si quando agendum erit de varicibus duas præclaras historias afferi ad rem maximè pertinentes.

CONSILIVM XVIII.

De Oculi albugine.

Filia Ioannis Iosserij, mercatoris Trecentis maculam in oculo habebat, & velut albuginem quandam quæ pupillam erat opertura: erat & præterea palpebra oculi vi ignis velut erosa, vulgò *l'œil éraillé*. Hæc sunt instituta.

Purgetur syrupo instituto ex agar. folliculis & rhabarbaro eū herbis Cephalicis & Ophthalmicis.

Vtatur decocto sarsapariliæ benè diluto.

Abradatur capillitium, & fricetur caput facculis ex furfure & milio, vtatur ailquando lixiuio sarment. vitis cum herbis

232 CONSILIORVM MEDICINALIVM

cephal. agar. & sena.

Item opiata ex conferua anthos, stœchados, rosarum addito mithrida.

Item elect. diatrag. frig.

Item fœniculo condito, & drageta communi à pastu. Excipiat vaporem fœniculi, dauci, carui, anisi, roris marini.

Admoueatur cauterium inter musculum bicipitem &c.

Oculus abluatur aqua detergente ex plantag. solano, rosis, eufragia, chelido, verbena, addita aqua aluminosa in parte erosa.

Paretur colyrium ex trochiscis albi Rhasis mucore seminis fœniculi: addita sarcocolla nutrita in lacte muliebri, lapide calaminari præparato, & aloelauta. Interdum sacch. candum pulverisatum.

Ad Epidermidis regenerationem admoueatur succus solani, plantag. semperuiui, centinodia.

Item mucago seminis psyl. medulla pomorum redolentium, mucago tragacanthi admisto vsto plumbo & loto lithargyro, antimonio præparato, & tuthia præparata. Item plumbi lamina.

ANNOTATIO.

1. In morbis oculorum & cerebri vulgo ad siccationem capitis vrimus frequentibus sacculis ex furs. mili. sale. forè non ita conferunt, ut creditur. Nam frictiones istæ pericranium tunicam, & membranas cerebri, forè nimium siccant: Item videntur poros obstruere. Frictio enim frequens, dura, & ex siccis tandem indurata & constringit.

CONSILIVM XIX.

Ad Tineam inneteratam.

Contemperetur sanguis & iecur Abstineat vino. Vfus lactis asinini. Balnea aquæ dulcis.

Decoctum frequens sene cum osculo prunorum, catholicoac, decoct. fumiterræ, lapath. cichorij.

Fe-

LIBER SECVNDVS.

233

Frequens abrasio capillorum. Ablutio capitis cum lixiuio ex decocto radicis cucum. asinini, dracontij, ireos florent. senæ & serpentis cum foliis senæ.

Scarificatus profundus post deterfionem capitis cum smegmate duro, spongia, lapide pumicis.

Cum plurimum manauerit ichoris & sanguinis post scarificatum vngetur caput liquamine lardi tosti in veru perfusi inter assandum auena donec lardum exiccetur: & totum quod liquatur excipiat succo fumiterræ.

Si malum ad hyemen prorogabitur, vtetur pilul. ex hiera diacolocynth. sine quibus, defumoterre, & huiusmodi.

Si ad frontem serpat, fiat leuis litus ex hydrargyro paratus, ex ʒ ij. mercurij, pro ʒ iiij. rosacei vnguenti mes.

Cataplasma valet ex farina fabacea, hord. cicerum, fœnigr. lupinorum coctis in oxymelite, addito puluere ireos purpureæ.

Oleum de frumento mirè conferet.

Hęc mulier post vsum istorum remediorum frequentemque capitis lotionē ex lixiuio parato ex fabarum tunicis conualuit.

CONSILIVM XX.

De Pleuritide.

Nobilis mulier Pleuritica prægnans habuit aliquid commemorabile. Doluit latus, febris continua erat. Vterum ferebat iam octo menses cum dimidio. Dubitabamus an partus accelerandus foret. Alij è maleolo tundendam venam putabant. Tamen ex brachio sanguinem detraximus. Planè corruptus erat. Tandem pariendi sese occasio obtulit. Vires erant infirmæ. Dolores suos & tormina (vt politico verbo vtar) deuorauerat. Dedimus decoctum folliculorum senæ. Folia erant pauca quantitate, vt non tam aluum subduceremus, quam cum leni alui subductione tormina excitaremus. Excitatis torminibus peperit feliciter. Mirum quod dolores pectoris in grauidis sunt valdè terrifici, & non facile sedantur nisi ferè vterus sese exoneret. Nam comprimuntur partes ventris, & veluti humores sursum ad lactis cursum, repunt. Vnde nisi aliò di-

Tomus II.

Gg

234 CONSILIORVM MEDICINALIVM
uertas vix dolor quiescit. Vix autem diuertuntur aliò nisi cum
partus periculo. De his plenius in lib. 2. nostrorum Epidemio-
rum.

ANNOTATIO.

I. Quoniam tormina iuvant partum si quod medicamentum tormina
excitans ex usu foret: Illud sumus experti absente febre.

℞. Matric. artemis. nepetæ. an. p. j. hyssopi p. i. s. Mercurialis, agri-
palm. an. p. s. semin. citr. pæon. an. 3 s. cinnam. & rad. bistort. an. 3j.
fiat decoct. in qua bull. folior. Oriental. ʒij. fiat fortis expressio, vt
terrestris pars remaneat, tormina excitet. Adde vini albi parum.

CONSILIUM XXI.

Ad fœtorem narium.

CVM fit fœtor narium antiquus, videndum num sit ob cō-
formationem, aut gentilitium: à vitio olfaciendi faculta-
tis, ossium vitio, aut viæ, aut generationis ipsius materiei.

Malum aliquando est in olfaciendi sensu ipso, aliquando in
ossibus. Quærendum an sit symptoma fœtor narium, an mor-
bus, & quis morbus, quod symptoma: cuius morbi. An sit
actionis læsio, an exiens mutatum, an vtrumque: An sit vlcus.
Namin ea virgine de qua consulebatur, solebat velut quoddam
crustosum ex ima nare deradi quod ἰλκωδὲς π, significare vi-
detur.

Sciendum præterea an vitio humoris quitalis generatur, id
fiat, an bonus quidem & ὑγιῆς humor sit excrementitius, sed
dum attingit ossa ethmoidea, aut alias partes vlceratas, ibi cor-
rumpitur, & ὑποσφῆαι acquirat. Sic diathesis tantum mala esset.
Et non tam vacuandum quam alterandum.

Est enim vbi diligentius purgandum, est vbi non, præfertim
cum agitur de fœtore oris. Immo licet totum corpus euacua-
remus ne hilum fortè proficeremus, Indelebilis enim est dia-
thesis.

Dubitari potest an humectantia conferant, an sicca & calida. Si enim tetra est sanies, si vlcerosum quid potius est siccandum & detergendum: Et quod in methodo medendi, aut potius in libris de locis affectis Galen. facit, qui pulmonicis præsertim si putredo est in pulmone sicca & calida dat, cōtra quam Medicorū vulgus facit præscribens multa iuscula) id herclè faciundū est. Contra quæ humectant iuuare videntur. Nam id quod è cerebro huic virgini fluunt, ea viridia sunt & tetri visus, quæ declarant æstum quendam in cerebro, aut corruptionem. Quibus enim corpus biliosum & æstuans, si tale caput est, iis mucus ferè viridis excernitur.

Sic ratione caloris valebit litus ex mucore psyllij extracto in aq. plantag. Addita pomata lauta in aqua odorifera, aut aqua rosacea: valebunt pilulæ etiam cum aromaticis. Gargariismi cum odoriferis: Balnea ad temperandum & squalorem tollendum. Cauterium occipitio addendum. Abstinendum à maioribus & calidioribus. Ptyalisimus prouocandus iis quæ sunt moderata. Tabellarum frequentissimus vsus. Cucurbitulæ. Si vlcus, curandum vt vlcus. Caput purgia valent.

℞. Foliorum maior. betæ. betonica. an. m. s. tundantur, affunde aq. beton. & vini albi. an. ℥ ij. fiat expressio. Adde aliquid ireos. Vel infunde in hydromelite: Adde tantillum piperis quia vis coctione euanescit.

ANNOTATIO.

i. Noduli non sunt omittendi. Fernel. probat expurgationem cerebri per gargar. si liquor haustus in nares ore resupino relabatur in fauces. Fiat decoctio in hydromelite maceretur iris, salvia, cyclamin. Vel in hydromelite dissoluitur mel anthosatum.

CONSILIVM XXII.

De Thoracis vulnere.

Dominus Des-Marests Andegauensis, & D. de Reilus Comes vulnerati sunt in Thorace. Sed loco dissimili vul-
Gg ij

nus inflatum erat. Priori parte sinistra ad secundam aut tertiam costam qua parte mammaria est, non ea quæ costis ipsis adheret, sed quæ interna dicitur, & ferè ad superiorem pulmonis partem inflectit. At comes vulneratus erat inter quartam & quintam costam, & pugio rectà quidem adactus erat, & mediastinum penetrauerat; deinde paulum inflectendo oppositam penè partem attigerat. Et minima etiam sectione sedes ipsius pugionis indagari potuerat, & fluenti sanguini deinde suppresso exitus esse potuerat, ac si contraria & opposita fuisset apertio. Sed ut sæpè summorum virorum & fiduciam rerum magnarum habentium cæcitas est maxima etiam in rebus minimis, quod ratio, quod tactus, quod tumor quidam eminens principio dictitabat, nimirum fieri debere eo loco apertionem, id differtur, negligitur, tandem necis occasionem allaturum. Ingens fuit hæmorrhagia, insignis alicuius rami venę æt̃, cęsę argumentum. Iussus omnino quiescere. Nulla tussis penè toto morbi tēpore. Difficultas respirandi exigua. Poterat in vtrunque latus dormire. Quidam ex Medicis volebat experiri num alacer esset æger in se erigendo, iubebat ut sese æger paulum erigeret, maximè ut detegeretur, num aliquid in capacitate esset, quod motu ipso deprehenderetur. Sed, ut inter pares inuidia facile se iactat, aliis id non visum faciundum: Maximè verò quod eius opinionis autores primi non essent. Et tamen id ad explorandum maximè fuerat opportunum. Post quartum diem initum consilium (quoniam ad cicatricem vulnus tendebat) super iis quæ ad vulnus attinent, num tutò sineretur claudi, an verò dilatandum foret, an omnino claudendum. Diuisæ fuerunt sententiæ. Alij omnino claudi debere censuerunt, quod multum sanguinis & spiritus effluxisset; quod nil alienum videretur in capacitate contentum; quod Guidonis & Galeni consilio vulnera thoracis primo quoque tēpore essent ad cicatricē ducenda, alioqui fistulæ metum esse, & sphaceli alicuius, aut syderationis in pulmone qui alioqui alieno aëri & externo non assuetus facile affici alterarique posset. Naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad yrinas aut intestina. Pleuritides beneficio naturę transumpta exuctaque materia curari. Alij contra nitebantur. Suspecta esse ista ægri bona & præter rationem allevationem. Insigne vas incisum, sic non esse probabile, ut intra quatrimum clauderetur. Formidabilem esse cicatricem ex-

ternam, quod, cum pars interna sit membranosa, propterea que
 amplius vulnere diducatur quam carnosam, & tardius coalescat
 quam ipsa carnosam, metus sit ne falsa opinione internam mem-
 branam ad cicatricem perductam, ne præter opinionem vulnus
 refricetur & refringatur. Ac tum fortè non amplius locus erit
 piulco, aut euacuationi suppressæ saniei. Dicebant nil referre si
 benè habere videretur primis diebus; sed expectandos alios
 dies criticos, & quid serus vesper veheret. In his vulneribus
 tuta omnia timenda esse. Non metum esse debere fistulæ nisi
 vulnus cõsenuisset. Non ita ab externo aëre metuendum esse,
 quod plus detrimenti esset affuturum à suppressa sanie, aut pu-
 re, quam ab externo ambiente. Et quod dictum est naturæ opus
 committi debere, & alias tutiores vias confinxisse naturam.
 Contra dictum nouercam & brutam esse naturam, & aliquando
 veluti consulto: pus & saniem ad tempus seruare, quod cum cõ-
 mode excerni non potest, repentina mors obtingit. Sic fatius
 esse cum vulnus hiet & pateat, si quid alienum sit, illac expur-
 gare, quam aut nouas vias comminisci, aut occlusum observa-
 tumque vulnus denuò aperire. Magna enim ignorantia esset
 suspicio, & iuncta crudelitatis opinio. Immo tutissimè & sectio-
 nem fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant, & locum esse
 idoneum sectioni in purulentis. Qui præerat omnia sic mode-
 rari voluit, vt utrique parti ad blandiretur. At istæ blanditiæ &
 temperamenta agrum perdiderunt. Desitum est vulnus cica-
 tricem contrahere. Triumphus ante victoriam canebatur. Iam
 sat agentium quorundam Chirurgorum auaritia, sibi loculos
 amplissimos acquirebat ad emunugendam regiam liberalitatẽ.
 Attentiores ad rem erant, non ægri rem, sed suam. Regis qui
 frequenter aderat (æger enim erat amicus Cæsaris) beneuolen-
 tiam aucupari volebant. Et in hoc omnis eorum ratio, animus,
 industria & negotium otiosum versabatur. Iam libellos vulgò,
Placets, supplices ad demerendam Regis liberalitatem porrige-
 bant. At Regis nimia diligentia, & amor ad præcipitandũ agrũ
 nimius fuit. Omnes enim id vnum studebant vt Regi place-
 rent, vt aliquid agere & dicere viderentur. Hic ægri salus ne-
 gligebatur. Et si quid aliàs malè gestum fuit, hinc malè gestum
 est. Itaque Regis spes fallitur, ægri salus deseritur, foro & scæ-
 nę feruitur, auaritię loculus quæritur, mons parturit, mus nasci-
 tur ridiculus, & his artibus in opprobrium & artis Medicæ, &

238 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Chirurgiæ omnia conuertuntur. Minus enim benè tractatur quam aliquis de plebe homuncio aut scrutorū venditor¹. Porro supprimitur sanies in thorace multa, febris perseverat, alui profluuium² macies, tandem derepentè difficultas spirandi, & inde mors, hæc contigit circa tricesimum tertium diem à vulnere. Apertum cadauer, tres aut 4. libræ sanguinis saniosi, corpus ipsius pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagionem erat velut tabo infectum, & membrana succingens erat syderata³. Mirum quod toto tempore morbi nulla penè tussis fuit. Si tantula pars humoris pleuritim facientis tussiculas affert, cur non tanta saniei pars in thorace & circū mediastinū suppressa? Nullus dolor lateris, nullum sputū cruentum. Idem contigit alteri agro Andegauensi. Licet enim ingens copia materici in capacitatem thoracis contineretur, nil ore reieciabatur, nulla molestia tenebat tussis. Quod mirum est, & fortè eius rei ratio difficilis est ad agnoscendum.

Licet quotidie per vulnus fluere ferè sanguis saniosus tantum quantum continere poterant decem vascula quibus tonsores in phlebotomiis vti solent. Incredibile dictu quantum intra die nouem sanguinis impuri per vulnus emanauerit. Insigne enim vas erat vulneratum. Id quod maximè operosum fuit. Dolor erat cruris & tibiæ implacabilis. In primis diebus reuocabamus ad fluxum sanguinis. At erat occasione læsi nerui insignis deriuati à spina dorsi (quo loco vulnus quoque inflictum fuit) propè apophyses vertebrarum dorsi, & sensum partibus inferioribus impertientis.

Sic credibile virus aliquod conceptum fuisse in parte cæsi nerui, quod tam immitis doloris causa esset.

Primis diebus ignorabatur & causa tanti doloris, & remedia. Ad paregorica, & narcotica concursus est⁴, sed frustra. Tandem ol. arte Chymica extractum calens infusum est, hinc alluatio doloris aliqua⁵. At quia commodè instillari non poterat, ideo dolores immedicabiles fuerunt.

Sic cum vulnus inflictum est, & dolor aliquis nulli cedens remedio obortus est, lustrandæ sunt diligenter partes⁶, vt videamus num insignis neruus in partem implantetur quæ per communicationem dolet.

Quo die datum medicamentum interiit⁷: Et id fuit calamitosum. Quamquam cum præfatione datum est, & sup-

pressio vrinae & dolor ad $\pi\theta\ \pi\theta\pi$, inuitabat ad id accelerandum remedium.

ANNOTATIONES.

1. Qui thorace vulnerantur exteriore parte sanescunt, interiore vero non, suppurati fiunt: & si interiore parte cicatrix infirma est, vulnus facile refricatur rupta cicatrice.
2. In Coacis pus per aluum secedere lethale ait, atque id per comparationem audiendum est.
3. In thorace & frequentius in pulmone arescit sanies, & calore in crustam versa cicatricis falso creditur imagine nobis imponit, donec ob thoracis motum & partis mollitiem leuissima occasione excussa crusta vulnus recrudescat. Si externa & interna pars simul sanescat, euadunt. Si simul externa & interna, & cicatrix debilis fuerit, vulnus iterum aperitur.
4. Thorax & ventriculus frigida leditur, & id mortem minatur, & tamen frigidissima aqua ventriculus delectatur. At aliud est considerare id per modum indigentia, aliud per excessum. Cum inuatur, indigentia est.
5. Pulmo ab Hippocrate dicitur attrahere contrarium alimentum corpori. Nam omne alimentum calefacit: alimentum autem à pulmone attractum refrigerat.
6. Galen. ait se vidisse vulnera in canum thoracis, illata tribus coagulata diebus priusquam inflammatio oriretur, largo sanguine effuso & per os reiecto.
7. In agro fortè summa imbecillitas repressit sanguinem ex euenta. Est enim ubi in leipothymia fluit magis sanguis veluti laxatis fibris, est ubi leipothymia sanguinem sistit, dum reuocatur calor & spiritus ad interiora.

CONSILIUM XXIII.

Pro Dysentericis.

ANNO D. 1578. Æstas fuit feruentissima, & siccissima. Etesia spirauerunt, ita vt morbi pauci fuerint iuxta Apho-

240 CONSILIORVM MEDICINALIVM

rissimum, *Siccitates imbris salubriores.* Obseruauimus tamen in secundo libro nostrorum Epidemiorum, Hyemen & Ver quod istam præcessit æstatem intempestiuū fuisse. Nam Hyems spirantem austrum habuit sub finem, & aliquantum suffocans fuit, vnde pituitæ salsæ fuit procreatrix. *Scriptit enim Galenus*
com. ad aph. 11. lib. 3. *co modo de pituitæ generatione: Quæ pituita à forti sit frigiditate, acida euadit; quæ à caliditate caput replente, salsæ; quæ à pauca sit frigiditate, vel exiguam habet dulcedinem, vel nullam manifestam qualitatem:*
 Deinde subdit dum loquitur de Hyeme australi pluuiosa & serena, quàm ver: Aquilonium secutum est, ergo ea quæ fit, *In ista australi constitutione pituita ob eam quæ in Hyeme fuit caliditatem, salsæ erit: propterea quæ dysenterias pariet quando longiori tempore mordens & radens intestina offenderit.* Vtpote quæ pituita ob suam visciditatem & lentorem dum exit & traducitur moretur & cōsistat; perpetuū autem ob suam qualitatem abradat, vnde dysenteriam necessario committit. Ex quibus patet quod prouentus pituitæ salsæ fit austrino statu, vt pote qui sit parens salsæ pituitæ, eandemque corrumpat. Et si accedat tempus aquilonium exprimitur iste humor salsus, & prout in parte infederit, ita varios affectus producit. Vnde annotauimus in secundo libro nostrorum Epidemiorum tussē admodum molestas (quintas vulgus vocat) grassatas fuisse virca Veris finem & mediæ Æstate, vnde ab ea tussi & febres & grauiā symptomata secuta fuerint, vt pueris multis aut intereundum, aut tabescendum fuerit.

Porro, non quoties genitus humor est, morbi inde proueniunt: differtur enim morborum eruptio in tempus aliud. Et ego credo eundem fortè humorem qui Hyeme genitus, Vere aquilonio expressus, in propinquioribus partibus symptomata, & morbos producebat, vt faucium dolores, ophthalmias, dolores laterum, tusses per molestas, Æstate aliquantum suppressum, sub finem Æstatis & initio Autumni profluuiū alui, & istas malignas dysenterias attulisse. Quod mirum non est. Nam idem *Const. 2. lib. 1.* Hippocrates accidisse docet, in primo Epid. Cum Hyems aquilonia fuisset, ver frigidum, aquilonium, pluuiosum, æstas, non admodum feruens, sub finē Æstatis & principio Autumni dysenteria vagatæ sunt, profluuiā, ventris, & *μελίσσοι* (offusiones vertit Interpres) melius, urinæ effusiones vertemus. Ex quibus patet alio tempore humores generari & colligi, alio mor-

morbos cōgeneres in hominum vitam inuadere. Caterū repletio capitis à sero maligno, & pituita falsa quæ ferè indomita est, cum in intestina humor descendit, dysenteriarum autor esse potuit. Accedit & quòd Æstas æstuantissima, feri & bilis acerrimæ procreatrix fuerit, vnde mirum non est si leui de causa intestina vitientur. Nec omittenda est ea adustio humorū quam Æstas attulit³: At cum humores adusti sunt, leui de causa irritantur, & irritati molesti sunt & partibus à quibus emanant, & iis per quas transmittunt.

At de dysenteriarū aliæ sunt populares, aliæ non. Populares aut sequuntur vim cœli, id est aëris, & efficientis vim sequuntur, aut vim ipsius corporis tanquam suscipientis causæ⁴. Quæ nō sunt populares, peculiare tantum vitium sequuntur & peculiaris excrementi suppressionem, aut vernaculam intestinorum imbecillitatem. Quæ sunt populares, aut sequuntur, vt dictū est, vim causæ efficientis, aut suscipientis, aut vtrumque. Ex eo autem populares & Epidemicæ colliguntur quod sub eadem specie morbi, multi aut intereant, aut grauiter laborent. Caterū aut sunt intestinales & mesentericæ, aut hepaticæ. Absurdum enim est omnem dysenteriam attribuere intestinis ex eo quod τῆς δυσεντερίαι, nomen ἀπὸ τῶν ἐντέρων deriuetur⁵. Malè enim difficultas intestinorū vertitur ἡ δυσεντερίαν. Tormina melius dixeris. Intestinales & mesentericæ fiunt ex eo quod illaeso hepate, & in intestinis, & in mesenterio prima mali labes, siue cœlitus impressa, siue à vitio ipsius excrementi manet. Hepaticæ aut sunt criticæ, aut fiunt κτ' πλὴν λύσει, aut, κτ' τῷ ἐκπιεσμοῦ. Si sunt criticæ, prohibendæ non sunt, sed humorum cursus frenandus est, & moderandus. Si fiunt κτ' ἡ λύσει, fatiscantis facultatis sunt signū, & hæc sunt lethales, nisi legitima remedia adhibeantur. Cum verò fiunt κτ' ἡ ἐκπιεσμοῦ, id est, per expressionem quandam, & excussionem, id eo modo contingit. Cava hepatis sæpè abundāt multo humore eoque ἐπερνεῖ, & dum natura id nititur excutere fiunt vomitiones, nausææ ἀλυσμοὶ, ῥυττισμοὶ, διάρραι, febres, & cachymia communicatur venis & partibus aliis. Ergo si vt sunt morborum idæ, ita & morborū remedia varia sunt, prout variæ sunt dysentericæ ita variare remedia oportet. Nec, quemadmodum multi faciunt, quasi eundem soccum & cothurnum omnibus aptantes, oportet eodem modo curare omnes dysenterias à quacunque causa ortæ sint, siue ad hepar, siue ad intesti-

Dysen-
terica
popula-
res.

Intesti-
nales
mesen-
terica
hepaticæ.

Nō vñ
est me-
dendi
ipsis dy-
senteria
ratio.

Tomus II.

Hh

num solū pertineat, animaduersio magna adhibēda est. Nam id præclarū est quod animaduertit Galen, cum loquitur de medicamentis quæ *ἐμμεγαστὰ* dicuntur. Hæc cum in ventrem infunduntur subius, ut in dysentericis, aliā demulcent, aliā irritant. Si valentiora sint humoribus acerbis, eorum humorum vim retundunt. Contra, si medicamenta contemperantia valentioribus facultatibus, aut multis pauca admista fuerint, unā & ipsa corrumpuntur, aluntque cacochymiam. Itaque eos vacuare statim oportet qui à mitigantibus & contemperantibus medicamentis irritantur, cum sint repleti multa, nec facili mobili corruptione. Vnde videmus plerōsque iniecto blando lacte grauius habuisse: Quod accidere videtur, vel quod lac superatum est ab humoribus acerbis & malignis, & sic natum est augere cacochymiam, vel quod iam vlcus conceptum est, quod dum perfundit subiectus clyster, irritat. Quod Galenus animaduertere debuit. Irritatio enim & exasperatio aliquando contingere potest ob superficiariam intestinorum exulcerationem^s.

Atque ex superioribus venari oportet medendi rationem. Si enim intestinalis dysenteria est, cum afflicto non sit danda afflictio, in vsu solo fortassis enematon & lactis per os sumpti consistendum est. Si hepar mali author est, & *ἰσχυρὸν*, sese in intestina exoneret, febrisque absit aut adsit, tunc alia captanda ineundaque est medendi ratio. De qua dictum est in historia Domini de Lyffy.

Sed & duo ad superiora addere oportet, vnum est de vsu astringentium initio: alterum de vsu diureticorum quæ dantur ad deriuationem. Hic enim non parum peccatur^o. Si magna est cacochymia, & certis colligas argumentis exonerari partes in ventrem, hic potius sensim atque sensim moliri debes euacuationem quam cogitare de astrictione. Alioquin æthiopē laueris. Et id causa est cur in multos dies morbus producat, & exulceratio sordidior reddatur. Nam tertia aut quarta purgatione multum educes bilis, & feri, & pituitæ, quam vix quindecim diebus natura deiciat dum sæpè & parum è ventre excernitur ut dysentericis in more est. Nec plenius tractanda est hæc quæstio, cū potius desideret præsens & accuratū medentis iudicium, quam verborum vbertatem.

De vsu diureticorum controuerti potest. Si serum malignū & indomitum & falsum, aut bilis tenuis dum proluit intestina

ulcerat, punit & stimulat, si aliò deriuauerit, fortè operam nō luseris. Contra magnum alleuamentum aderit. At exulcerationis sepè causa est humor lentus, tenax, mediis herens viis, qui dum per anfractus intestinorum pigro transmittit gressu, profundius exulcerat. Id quod ex contextu superius allegato colligere est: *Pituita*, ait, *ob suam visciditatem dum exit & transmittit, moram trahens & consistens, perpetuò autem ob suam qualitatem abradens, dysenteriam parit.* Quòd si hīc diuretica p̄scripseris, dum materia contumacior reddetur, maiores dolores excitatura est. At dices, tenuior est pars quæ id faciat, id est quæ pungat? Contrà hīc Galenus, *Ob suam, ait, qualitatem abradit.* Ergo tollenda est, aut mitiganda est ista qualitas, alioqui frustra laboraueris.

De remediis in curatione dysenteriae vsurpari solitis hīc nil dicam, satis erit indicare Consilium 53. lib. 1. ex quo omnis generis p̄sidia elicere possis huic instituto necessaria.

ANNOTATIONES.

1. Locus hic praeclarus. Ideo fit, ut in plerisque melancholicis atrabillariis & biliosis pituita à caliditate caput replente fiat, eaque salsa & mali sit moris: Cuius generis est ea pituita, quæ in Hispanis charadon prouentum affert.

2. Nota de visciditate & lentore. Ideo qui diuretica dant, partem humorum tenuiorem ad renes auertentes, illam visciditatem & lentorē videntur augere.

3. Vsti humores graues & periculosos morbos producant, vstione enim malignitatem acquirunt.

4. De Dysenteria ea praesertim quæ à nimia oritur repletione locus est notandus apud Hippocratem de generationis & curationis modo, Post nimiam repletionem (ait) alui fluor fit cum alimentum corrumpitur. Vide plura lib. 3. de Diata.

5. Quid enim hoc est vertere τὸν δυνάμιον, difficultatem intestinorum.

6. Vnde ἐν τῷ πρώτῳ, Gallis dicitur, expressio. Et ἐν τῷ ὀκτωγέτῳ, si materia mitiscata fuerit, exigui admodum sunt dolores, ad quos facit ambages & anfractus intestinorum.

7. Lac & alia id genus Dysentericos aliquando offendunt.

8. Hippoc. sect. ultima 2. Epid. In turbatione ventris fabas co-

H h ij

244 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Etas dato, si supernæ ventris partes valdè biliosæ non fuerint.

9. Galen. Ridet opinionem Herodoti, & Dioscoridis qui arbitantes quouis tempore Dysentericis astringentia ex usu esse, & nil nisi astringens dari aut subiici oportere, ideo adipem anserinum, & alia medicamenta contemperantia & consolidantia, astringentium ex numero esse dicerent ex eo quod viderent Dysentericis conferre.

10. Cum in dysenteria sit excretio parua & frequens, ideoque sit symptomatica, faciundum est, ut contra sit rara excretio & magna. Id quod medicamentum purgans rite institutum præstabit.

11. Galen. explicans cur mictio noctua plurima parua significet deiectionem, ait ex eo Aphorismo nos curationem petere posse alui humidioris & siccioris. Si humidior, exigua potio sit, & multa ad renes derivatio: si secca aluus, maior potio, & distributio ad renes prohibeatur. Si itaque ex eo aluum lubricum esse existimes quod quis dysentericus sit, fortasse falli possis. Nec propterea & à liquidis est abstinendum, nec derivandum ad renes. In hoc errant plerique. Immo si deiectionis materia potest reddi meabilior, & liquidior, non tot tormina excitarentur. Itaque quæ hoc loco dicuntur, valdè notari debent.

CONSILIVM XXIV.

De Voluulo.

IOANNES LE CHARRON, voluulosus factus à prolapsu intestinorum in scortum¹. Manus adhibita, reposta intestina: Restitutus. Sed postea excreta est à medicamento innumera humorum colluies prius mota, sed non promota. Et id in voluulosis notandum est, licet periculum præsens vitatum sit, metuendum nisi sequatur multa excretio, & reuocetur omnino motus humorum deorsum, qui sursum ferebantur motu peristaltico intestinorum vitiato aut impedito. Maximè verò dandum rhabarbarum ut os ventriculi prius læsum ac infectum roboretur.

Mesueus observavit multa symptomata comitari solita eos qui à voluulo liberati sunt, qui tamen à futuris malis omnino liberi non sunt.

Et quia totus venter inferior commotus est, non prius secu-

LIBER SECVNDVS.

245

ritas conciliata erit, quam sequatur alui profluuium aut sponte, aut arte procuratum.

Nec enim in isto morbo cani debet triumphus ante victoriam Vnde mortui sunt incuria ista, de quibus Medicus securus iam erat.

Nese exponat aëri, neue in victu peccet. Et in locum vacuum post vomitiones chylosas & stercoraceas subit ambiens torminum magnorum author. Voluulo defunctos & iam conualescentes, tanquam puerperas curabis post vitatum præsens periculum. In D. Du Peron erat lapis in intestinis perforatus vt liquidiori materiæ via pateret. Aër sese in vacuum locum insinuat. Dolores implacabiles oriuntur & antecedentibus sæuiores. Vide quantâ sit opus custodia.

Voluulosis à prolapsu intestini inutilia medicamenta laxatiua per os sumpta, augent potius malum & obstruunt.

Si humor sit obstruens, sique non sit inflammatio magna, hieræ primæ debentur aut in potu, aut in forma boli.

Induratae faeces hamo aliquando extrahendæ. Iniiciantur per longam fistulam olea chalaistica: imò iuuaret flatus excitare & immittere vt intestinum dilataretur, & ea dilatatione aliud ad se se retraheret. Fræquentes clysmi, & acres, & exigua quantitate.

Aqua Theriacalis & vinum conferet, quia inficiuntur spiritus, vnde animi defectiones & sudores exoluentes. Sed dices voluulus an est crassorum, an tenuium intestinorum tantum vt vult Galenus? nam ex Galeno elicere possis tenuium intestinorum inflammationem non posse viam præpedire. Nam corporis tenuis inflammatio non potest spatium effatu dignum replere.²

*vidē
Consi-
lium 31.
lib. 1.*

ANNOTATIONES.

1. Ad materiam de voluulis pertinet illud Hippocratis lib. 2. Epid. pectinum ruptiones quæ circa pubem sunt, vt plurimum statim innoxia. Quæ verò paulum supra umbilicum in dextra parte sunt, hæ sunt dolorosæ, anxiosæ, & notentur, id est stercoris vomitum inducentes. Quem locum volunt intelligi de cæci intestini interceptione circum umbilicum ob ruptionem peritonæi. Tumor est quidem exiguus,

H h iij

sed exitialis ut in ea muliere observatum quae incola domus erat ad insigne fontis.

2. Iste voluulosus Io. Le Charron, evasit quidem tunc. Ex actis aliquot post annis alio morbo interit. Aperto cadauere observatum est, mediam quandam partem intestinorum, & mesenterij rupto peritoneo in scortum amplissimum, & omni fide maius prolapsam, ut etiam inde retrahi nequiret. Et ista prolapsio erat illi naturalis, intestinâque tanquam in loco nativo & augebantur in scorto & nutriebantur. 1591.

CONSILIVM XXV.

Ad Ptyalismum pro Comite de Chaulne.

Asis quam elixis vtendum potius: Potulenta parca manu sumenda: vini albi, & vaporosi rarior vsus esto.

Vitanda quæ vapores multos summittunt, suffitus & odorata, caput parcius calfaciendum: à pastu moderatè corpus exercendum, cœna frugalior prandio. Crura & pedes fricari debent manè. Aliquando laconico prudenter vtendum est.

Corpus validis medicamentis non est agitandum, nec pilulis.

Conserua rosarum cum rhab. in vsu esto. Cucurbitulæ sæpè applicandæ.

Mane prolectâda pituita apophlegmatismis paratu facilibus Errhinis omnino abstinendum non est.

Tabellis vtendum. Conserua rosarum frequenter vtenda mane, & hora somni.

A pastu drageta communi vtendum, aut miua cytoniorum sensim liquefaciunda in ore.

Caput fricandum sacculis moderatè.

Suffienda capitis sunt ornamenta. Decoctum radices schynæ nonnunquam vsurpandum.

Exercitationes, cursus, saltus, equitationes, insolationes eiusmodi molestum ptyalismum proritant magis.

Ad eam rem valet Opiata sequens.

℞. Omnium rad. aperit. an. ℥ i. eryng. & enule camp. an. ℥ ss. beton. fræchad. melisse, mercurial. saluie vite, bipinelle, ungula caballina. an. m. j. hyssopi. p. j. iuiub. sebesth. pruna damasc. an. m. x. passul. corinth. glycy. an. ℥ j. seminis pæon. sefel. citr. an. ℥ i. cortic. citrij cond. & cort.

*serua acori. an. 3j. s. fiat decoctio in qua, bull. foliorum sena. 3ij. ad-
de extraignem cassiam & infusum 3vj. rhab.*

CONSILIVM XXVI.

Pro impotentia ad Venerem.

Ager arrigit, sed verpus mollior post manet sic non subit,
nec semen ciaculatur.

Id fit aut vitio instrumenti, aut totius corporis morbo, aut
feminis defectu, aut eius inefficacia, vt minus turgeat, & minus
spirituum contineat, ac minus penis in sua contentione & te-
nore maneat.

Videndum num olim aptior fuerit, an non proclius ad li-
bidinem, vt postea natura imbecilliore reddita, minus prom-
ptus fuerit.

An non doluerit aliquando partes istas, an non suffitum ex
cinnabrio, aut consimilibus passus fuerit.

An non vitio dietæ, vt si vinis tenuioribus vtatur, & rebus
liquidiusculis, & an non parcus edat, vt sufficiat ad alendum
tantum, non ad nutriendum.

Congredietur loco & tēpore, non crudus, alioqui ineptus erit.

Coeat post multam titillationem, & cum retenta vrina &
meiendi summo desiderio, illito prius pene medicamento or-
dinato.

Nimium bona habitudo efficit aliquando ineptitudinem
istam, vel quia corpus totum absorbit, & in alimentum conuer-
tit, vel quia vasa fiunt angustiora præ mole corporis & pingui-
tudine, vnde seminis quædam suppressio. Quemadmodum
Hippocr. animaduertit nutrices nimium obesas & succulentas
minus lacte abundare. Rationes alibi exposuimus.

Acetata, & olera multa fugitanda. Non ieiunet. Non seni-
mum impleat, tum ne inde cruditas eueniat, tum ne reuocatus
ad ventriculum & partes adiacentes calor, deferat testes & par-
tes semini mitificando destinatas.

Nimia cura & sollicitudo obest, auocantur enim spiritus. Ta-
les erigunt, sed cadit erectio.

Vsus pistaciarum frequens commendatur plurimum.
Puluis pudendi Tauri. Cerebrum passerum.

248 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Ad id conferet plurimum Opiata sequens.

℞. Diasatyr. ℥j. conserua eryng. ℥ss. ginzib. conditi. ℥j. s. rad. bulbi ascalonij. ℥ij. semin. eruca, pastin. & fraxin. an. ℥j. renum scin-
corum ℥ij. confectionis Alkerm. ℥iij. conserua anihos ℥ij. cum syrup.
conseruatio. citry: fiat opiata vtenda ad quantitatem zancis mosch. hora
somni.

℞. Aqu. vita ℥ij. macera seminis staphisagrie ℥j. foueatur ver-
pus & perineon.

CONSILIVM XXVII.

*Pro uxore D. Poille, in imbecillitate visus,
aut potius caligine.*

VSus frequens pilul. comm. aliquando paulo vehementio-
rum capitis frictiones. Puluis ex coriandro, fœniculo,
similibus.

Opiata ex mithridat. conserua summitatum fœniculi.

Aqua in qua maduerit cinnamomum. Vitanda aqua valdè
frigida, nam ledit spiritus & ventriculum.

Sanguis palumbis instillatus. Decoctum schinz. Pedum lo-
tio cum cephalicis.

Insuffletur cinnamomum & saccharum candum, aut fœni-
culum. decoctum fœniculi & ocularium ad fouendum oculum,
corpore mundo. Aqua ocularis distillata, addetur mel antho-
satum & commune. Masticatoria.

CONSILIVM XXVIII.

Pro herpete cum serpigine.

CVM dirus quidam herpes cum serpigne brachium fini-
strum, præsertim infra cubitum, & totam manum fœdaret,
iam annos multos sæuiens, vt etiam iam parti inducta diathesis
videre;

videretur, postquam concepit, hoc malo liberata pars visa est, immo suus nitor restitutus. Vnde hoc? Sed aquea quædam per vterum, aut per sinum pudoris excretio contigit, vnde tandem tertio aut quarto mense abortiit. Fœtus velut semisideratus videbatur humor qui olim in manum sauebat, vterum appetiuit, non tamen eum læsit, sed id quod in vtero erat afflixit. hinc abortus causa. Circa eum affectum hæc agitabantur.

Id quod in brachio isto efflorescebat, an per diadochen erat, an per apostasin. An morbus erat. Si erat vitium confirmatum & diathesis, cur nitidior cutis apparet, tanquam extincto malo. An humoralis in corpore gignitur? An eam malam qualitatem in manu pruriginosa acquirit? Si enim purus affluebat & reuocatur aliò, quid inde periculi?

Vt sit apostasis, fieri debet repente. Si sensim fiat & multo tempore, nec est exanthema, nec apostasis, sed morbus Hippocrati. Quod hic fit, remanet enim vetus fomes mali & in corpore & in parte.

Allata historia Atheniensis apud Hippoc. huic erat prurigo, & cutis leprosa: Vsu balnearum naturalium cutaneus affectus curatus est, hinc Hydropicus factus interiit.

*Malum
externum
cuius cau-
rare non
oportet.*

Allata historia mulieris cui caput dolebat cum vterum non ferret, &c. Causa hæc eius rei videbatur, quia fortè erat biliosa, & bilis in vtero aut circum vterum erat quæ summittens sursum vapores dolorem capiti inferret. Cum vtero gerebat: sanguis & spiritus reuocatus bilem temperabat. Hinc doloris capitis vacuitas.

Item notatus locus Hippo. quod cum mulieres puræ concipiunt videntur grauius affici quàm impuræ. Quod huic nostræ mulieri contigit. Nam cum habeat corpus penitus impurum, pro ratione impuritatis non habuit malè initio conceptus. Aliæ enim mulieres quæ sunt puræ habent grauiora symptomata. Verum tamen est quod etiam grauidæ perpetuò humidiores erant partes pudendæ ob speciem quandam *ρηναιστικὴν*.

Et malè ominabamur fœtui. quod contigit. Puer enim editus velut exustus erat & tabo infectus. Illud enim Hippoc. va-

*Lib. de
naturæ
puer.*

let. Qualia patitur mater vtero gerens, talia & puer. Immo apud Hippo. editus est puer vlcus habens in coxa, quoniam præter rationem suppressis mensibus, mater conceperat.

Tomus II.

I i

CONSILIVM XXIX.

Pro socero nostro velut semitertiana laborante.

Observatione dignum est quod quidam annotarunt hemitritæ non accidere Ecclesiasticis, quòd initio propter labores magnam bilis copiam congerant, deinde pituitam. Et ea pituita continuam quotidianam & tertianam intermittentem parit. Hoc dictum quadrat ægro nostro. Is enim, si quis alius vtrunque humorem gignit. Et is humor erat veluti segregatus à massa sanguinis, & aliquo loco stabulabatur fouebátq; febrem.

Si febris focus esset circum pancreas, & ventriculū aut vomitiones aut nausæ adessent. Hæc non adsunt. Ergo focus febris alio consistit loco.

Semitertiana, periculosa, quod non solum stomachum & partes nervosas attingat, verum veterinosos facit, & cum deliriis annexas habet vigilias, resolutiones & syncopas¹.

Si continua est quotidiana cum intermittente tertiana cur vno die sunt duæ accessiones? ² Nisi fortè ille paroxysmus, qui sine rigore est & frigore, sit tanquam quotidianæ indicium: nõ tamen est quid periodicum. Sed cū quotidiana remittat, deinde exacerbetur, illa exacerbatio est principium primi paroxysmi, & manifestus paroxysmus est tertianæ intermittens. Arculanus vocat paroxysmum secundum semitam introitus, quia paulò ante præcedit alterum paroxysmum tertianum.³

Ostendimus (ait Galenus) à bilioso & pituitoso succo febrem cum horrore venientem proficisci (id est semitertianam)

Ad part. 5. sect. 3. lib. 1. Epid. Hæc enim *ἡ ἡμίτριξ* dicitur *πικρὰ*. Eam verò quæ caret horrore, à bilioso quidem, sed eo lentiore & coctu difficiliore, quam ferunt principum partium esse inflammationem. Et hæc febris dicitur potius *πικρὰ*. Sic febres *πικρὰ*, à bile lentiore esse vult, statuit quæ vnum humorem, duplicem verò semitertianæ. *Ad part. 25. sect. 2. lib. 1. Epid.* Cōtra alio loco cum loquitur de febribus: Quæ *πικρὰ* dicuntur, ait, *Generantur istæ febres non ex succo vno, sed pluribus, quorum calidior febrem acutam succendit statimque discutitur. Quæ dum cor-*

pus tenet contingit frigidioribus corrumpi ac putrescere, iterumque ex illa remissione accenditur febris. Sic vno loco statuit vnum humorem febris *πρωτογενή* causam, in altero duos succos. At bifariam dubitationem istam eleuare oportet. Vno modo quod cum ait duos succos causam esse istius febris, maximè id intelligendum est cum sunt ex interuallis horrores, aut parui rigores, & manifestæ reduplicaciones. Cuius generis *πρωτογενή* febres explicauit in Epid. loco allegato, vel dicemus bilem quandam benigniorem esse causam febrium *πρωτογενή* maximè earum quæ potius accedunt ad eas de quibus Hippoc. in Aphor. Quæcunque febres non intermittentes tertia die fortiores fiunt, &c. in iis enim remissio est manifesta secundo die, altero paroxysmus manifestus.

Par. 25.
sect. 2.
li. 1. Epid.

Si in febribus horror est manifestus, an humor propterea est in venis? Credibile est humorem nempe bilem quæ facit intermittentem tertianam in hemitritæo ferri ad genus neruofum, & facere non rigorem, sed horrorem qui medius est inter frigus & rigorem, & qui per se non est proprius humoris biliofi. Sic Hippoc. obseruat febres continuas tertianarum more inuadentes in quibus sunt parui rigores inordinati (id est horrores) & tamen non erant intermittentes licet rigores essent. Sic horror iste potius videretur ob pugnam duplicis materiei contrariæ oriri, bilis & pituitæ, quam ob delationem in habitum corporis, vt fieri solet in reliquis febribus. Sed quomodo in continuis febribus contingant rigores ex interuallis alio loco explicauimus.

Lib. 7.
Consil.
meorum
ad Consil.
lib. CX.

Febres à forti obstructione sunt continuæ symptomaticæ, & à materia extra venas, vt patet ex Galeno in quarto Aphorismorum.

Parti. 5.
sect. 3.
lib. 1.
Epid.

Nescio cur Hippocrates animaduertit tabidos, & eos qui morbis longis detinentur præcipuè semitertianalaborare.

Sic cum morbus sit longus Medicus obseruet num quid sit semitertianum, vt mos, motus morbi, symptomata & periodi annotentur.

Nec obest obicere quod in morbis longis & tabescētibus horror non adfit, qui *κατ' ἄρχην*, facit febrem semitertianam horrificam, nam Galenustali obiectioni satis fecit: Si tabidis & aliter diu egrotantibus solet accidere hæc febris, forè licet horrore careat, semitertianam vocabimus, si die secundo iterum inuadat. Tamē

Com. ad
part. 5.
sect. 3.
li. 1. Epid.

252 CONSILIORVM MEDICINALIVM

id potius dubitanter dictum est, quàm absolute pronuntiatum, quanquam valde probabile est. Et ut res certissima sit satius est illud tenere quod ante assertum est, Quia febris ad integritatem non venit, sed horridas primo die facit repetitiones, altero simplicem unam accessionem, semiteritiana vocatur, si autem simpliciter tertio quoque die inuadat, dicitur proprie τετανοειδής.

Comm. in 6. Epid. includit nomine τριτανοειδής, & semiter-
Part. 23. tianas, & longas tertianas. Quod videtur falsum. Sic vox διήμε-
sect. 2. videtur aliter meo iudicio interpretanda.
lib. 6.

Epid. Eodem loco febres τετανοειδής, medias statuit inter semitertianas, & tertianas illas in quibus aliqua est intermissio.

Verum quod ad therapiam spectat quæstio nunc non minoris necessitatis quam voluptatis moueri potest.

An laborantibus semitertiana cōtinua habente paroxysmos tertio quoque die, aut tritæophyca ipso die tertio quo reduplicatio fit, aut vena secari, aut medicamentum dari tutò potest? Id enim in religione non est apud nostros. At fortassis malè. Si enim in afflictione ipsa, si in paroxysmo cibum dare nocet, cur non & purgare, & medicari? Immo Galen. explicans cur febris diurna sit longior quàm nocturna & deterior, ait ideo diurnam esse & deteriorem & longiorem quod cum diurna est, oportet de nocte medicari, quod incommodo non vacat. Item quod constringatur corpus cum digeri debet. At dum vrget morbus non diffatur corpus, sed inclinante accessione. Viget interdiu, de nocte digestio fieri debet. Non fit ob noctem. Contra in nocturna. Nam interdiu discutitur quod nocte coctum est. Tertia ratio, si cubant interdiu, nocte non dormiunt maximè verò ob curationem: si non cubant vespertionum vitam agunt. Nam nec nocte, nec die dormiunt. Sic temporis diuturnitate, & defectu somni, & defectu digestionis ob noctem quæ astringit, & ob intempestiuum curationi tempus tabescunt. Sed quærat quis cur de nocte non diffatur corpus? Id etiam ad arthriticos extendi potest. Vide quanta sit cautio Galeno in diurna febre aliquid moliri, ut etiam tempus ipsum nocturnum expectet ad medicandum.

ANNOTATIONES.

1. *Semitertiana funesta est Cacoëthia, inflammatione, symptomatum vehementia, difficultate curandi. Est duplex focus & inaequalitas tanta, ut Medicus non facile curandi occasionem capiat.*
2. *In semitertiana vno die est exacerbatio quidem cum horrore, sed is leuior est eo qui contingit altero die. Febres autem continua syncheis habent etiam paroxysmos. Et quod cum maiore quodam quotidiano repetat seu exacerbetur, illud est proprium quotidianarum.*
3. *Quid? nonne qui laborat tertiana febre etiam pituitam habet multam? Immo in omnibus est & bilis & pituita. Credo in semitertiana putrere duos humores equaliter ferè potentes & abundantes. Et id facit ad hemitritici generationem & malum morem. Vnde illud Galeni Com. in historiam de Philini uxore, Pessimi sunt morbi in quibus bilis & pituita redundant. Quibus succis redundantibus semitertiana succedit. lib. 1. Epid. Et ad hist. de Sileno, multo grauius simul morbi in quibus pituita, seu succi crudi magna copia, & simul bilis colligitur propter arduum in curatione.*
4. *Febres tertianae duorum sunt generum. Nec enim (ut vulgò creditur) omnes sunt male, quia continua: sed sunt quaedam quae quodammodo ad Tertianas accedunt.*
5. *Tabescentes febre hectica laborant continua. Et tamen Galen. obseruat quibusdam tabidis adiunctam febrem tertianam, Hippoc. quintanam. Forè quinta haec à materia esse videtur longè à venis semota, aut in pulmone coercita.*

CONSILIVM XXX.

De Febre continua.

Illustris Domina febricitauit assidua febre. Aluus erat liquidior. Febre carere visa est. Recruduit sequenti die febris. Iactationes, lingua tremula. Decimo quarto, mors dextrum Hypochondrium molliter tendebatur.

Relictis multis, quorum demonstratio ex superioribus duci etiam potest, in ea tantum parte laborabimus in qua quis du-

354 CONSILIORVM MEDICINALIVM

bitare potest qui fiat, vt qui febre affidua labore duobus
 sæpè tribusve diebus, fiat *ἀνέπετος*, & quodammodo resti-
 tutus, deinde denuo febricitet, & eodem modo die decimo
 quarto, citius tardiùsve iudicetur, ac si nulla interiecta *ἀντεπέλα*,
 febris interiecta interruptaque non foret. Vnde ista *ἀντεπέλα*? an
 reueratalis existit? an tantum apparet, & reuera non est? Si est,
 quomodo fit, & cur dierum criticorum certitudinem non tol-
 lit & infirmat. Si enim morbus iudicandus fuit die decimo
 quarto, & æger febre vacauerit duos tresve dies, an iudicium
 erit diei decimi quarti? Ista interiecta & interposita *ἀντεπέλα* cō-
 tinuitati & seriei dierum stato ordine progredientium officere
 videtur? Quoniam id ambiguum existit, hic veluti honorarius
 arbiter & interpret existam, vt quid ea in re sit sequendum, fa-
 cilè percipiatur. Ac primum historias recensere operæ pretium
 duco, in quibus febris aliquam vacuitatem in affiduo continuó-
 que causo, Hippocrates obseruarit. Deinde quid ea de re Ga-
 lenus statuendum putet, explicabo.

Philiscus continua febre afflictus die tertio mane & ad meri-
 diem febre visus est liber esse.

Clazomenius vicesimo iudicatus, non sudauit, à febre libe-
 ratur vicesimo septimo coxæ dolor. Non meminit dierum
 interiectionum.

Qui in dealcis horto habitabat, yndecimo die febre erat li-
 ber, sudauit, duos dies integros intermisit, febris die 14. rediit,
 Item die vicesimo liber à febre fuit, & tamen 40. die est iudi-
 catus.

Euryanaclidis filia sexto die liberata fuit febre, non sudauit,
 iudicata est. A iudicatione die 7. riguit. Decimo à sudore
 quem habuerat, delirauit, confestimque ad mentem rediit.
 Cum diem intermisisset duodecimo multum delirauit. Deni-
 que die septimo à quo ita multum delirauerat, interiit: id est,
 totius morbi die decimo nono.

Circa hanc historiam duo obseruanda, prius quod absoluta
 fuit intermissio, Posterius quod cum intermissio fuisset aliqua,
 & die duodecimo delirasset & febricitasset, septimo die ab isto
 duodecimo ad mortem iudicata fuerit. Et Galen. Comm. in
 istam Histo. ait, non est cur plenius quæramus de diebus criti-
 cis cum hi nullum habeant ordinem, quando quidem mortem
 attulit, & destillatio à capite, & innatum tabidum. Quasi

velit à duabus hisce causis, dierum *ἀναξίας*, & confusionem inductam esse.

Parius etiam die centesimo obiit, die 34. & 40. febre liber fuit.

Anaxion vicesimo sudauit, febre liberatus fuit, die 17. febris rediit, die 34. iudicatus.

Hermocratis verò historia non omittenda est, immo celebranda, quoniam ex eius Commentario deducetur ratio omnis quæ valebit ad id illustrandum de quo quæritur. Textus hic Hippocratis, die 7. grauitèr habuit, sub diem vndecimum omnia illi visa sunt remissa esse. Die 14. à febre erat liber, non sudauit, dormiuit, omnino mente constabat, vrinæ tenues. Dies 17. febris rediit, in sequentibus diebus incaluit, febris erat acuta. Die vicesimo est iudicatus, à febre liberatus non sudauit. Die 24. incaluit. Proximis diebus acuta febris, lingua combusta, die 27. mortuus est.

Ac primùm obijciamus Aphorismum istum, febres quouis modo intermiserint periculum abesse significant. Et tamen Hermocrates interiit, & alii plerique in Epidemiis, quibus tamen in febre continua fuit *ἀπρὸς ἐξίτην*. Et sic intermittit quouis modo. Immo Hippocrates vtitur verbo intermissionis. Cur ergo perniciosus illis fuit morbus? fortassis maiore id eget distinctione. Nunc audiamus Galenum de ista vacuitate febris in febre assidua, vt iis satisfiat quæ primo loco posita & quæ sita sunt. Aph. 43.
lib. 4.
Aph.

Primùm in Hist. de Hermocrate, cum dies septimus valdè molestus fuisset, vndecimo die omnia remissiora visa sint, ita Gal. Rectè Hippocrates adiecit, *visa sunt, nec dicit absolute, mitiora fuerunt. Nec enim potuit ex periculosissimis signis subito, cum eadem permaneret humorum cruditas, ad meliorem statum deuenire. Maxime cum nil eluxisset decretorij die vndecimo, quod tamen eo die sapè fit. Quod autem sit signum exitiosissimum, fuit sopor qui vel summam imbecillitatem significabat, vel refrigerationem summam, addo & *ἀναξίαν*, ob febrilem æstum id quod Galenus non animaduertit, Hippocrates verò obseruauit.*

Galenus abundè quæstionis scopum tetigit, Com. ad part. 8. de Hermocrate, nam cum Hipp. ait, die 14. non sudauit, febre liber fuit, idem est ac si dixisset, visa sunt omnia remissa, & tamen re ipsa talia non sunt, non sudauit, non fluxit sanguis,

256 CONSILIORVM MEDICINALIVM

non erupit parotis, infida est enim morbi intermissio, aut potius remissio, Græcè *παύσις*, quæ vox notanda est, vt eo loco vocat, quanquam Hippocrates manifestè dicat, febris intermisit. Est enim sine ratione alleuatio. Et Galen. in Comm. ait die 14. & 20. perfectè febre cessauisse. Et vulgus Medicorum gaudet si qua videatur alleuatio, tametsi ex symptomatis perniciosi proficiscatur, nesciens cum natura enecatur & extinguitur calor insitus, tales solere accidere affectiones, id est, febris intermissionem aut remissionem sine ratione. Eodem modo contingit in tumoribus. Nam cum pus fit dolor fit & febris inaugetur quod natius calor tumores immutat: Si à coctione reuocatur natura, aut ipsa propter imbecillitatem abstinet, nec laborant, nec febricitant nisi per paruū[†]. Et si pus fit & expurgatur præcedente & febre & dolore, pars fit salua: Si suppuratio, si febris, si dolor abest, pars aliquando putrescit. Idem contingit febricitantibus cum sine ratione alleuantur, & febre vacant cum tamen præcesserint signa pessima. Tandem concludit Galenus: Quò commodiùs ægri habere videntur cum alioqui signa præcesserint perniciofa, hoc morbus multò deterior est existimandus. Et Galen. citat Histo. De quibusdam qui cum pessimè haberent cū morbus defæuisset, & fractus fuisset, Medicis & vulgo restituti putati sunt, immo iam ad munia obeunda redibant: paulò post redeunte morbo sublati sunt. In quo falli non oportet, nec ita securos nos de morbis esse oportet. Sic quando die 20. cessauit febris id pessimum fuit signum, quia natura debebat potius nouo excitato paroxysmo aggredi coctionem.

Idem
Com. ad
par. 17.
sect. 2.
lib. 1.
protrh.

Et notandum id maximè quod scripsit dum reddit rationem cur die 17. febris inualuerit acutàque fuerit, id accessit (ait) non ratione caloris natiui, sed propter putredinem accensis *πυρετωδὴς* humoribus. Itaque vbi feruor discussus est, à febre homo vindicatus est die 20. sed sine lege ac ratione. Sic hoc suspectū fuit. At dices, quomodo sciam paroxysmum istum à natura vi caloris natiui intendi, non autem id totum à putredine sola esse, & quasi signum extincti caloris natiui (nam cum paucus est calor natius febres fortes non fiunt) id declarabit pulsus. Ideo quia Hipp. sphymicam contemplationem omisit, nobis difficile est ex scriptis eius ad cognoscendum, quibus id signis percipi possit⁷. Tandem concludere oportet & 20. die & vnde-

cimo

cimo istam alleuationem suspectam omnino esse, cōmodiusq; videri habere ægros cum tamen non ita sit, sed vulgus falsò decipiat, quod extincto calore natiuo febris deferat ægrum, & quod reaccendatur eadem, fiatque *νεωπνευσμός*, quidam (vt loquitur) non vi naturæ, sed motu ipsius humoris, vt id totum symptomaticum sit; Ac credibile est pulsus frequentes esse, sed admodum paruos & humiles. Contrà si natura valeret, & ipsa aggrederetur aliquid, pulsus alius foret. Item quòd malignus sit ad finem morbi paroxysmus, id ipsius naturæ postremum conatum indicat.

Eam ipsam rationem de aucta febre ob motum ipsius putredinis, & febris vacationem ob extinctionem caloris naturalis, Galen. explicat dum docet, cur Pythion, cum acuta febre laboraret *βραχύπνους*, factus fuerit: Quia, ait, primo die calor febrilis *Seff. 3. lib. 3. Epid.* per putrescentes humores accensus ipse quidem digestus est relicto natiuo ita infirmo, vt prius extingueretur, quam febrilis calor denuò accenderetur, velut feruetactis qui putrescebant succis.

Quid? vidimus aliquando febres quatuor aut 5. dierum vehementissimas cessauisse, sine sudore, aut manifesta excretionem, & tamen nil inde periculi secutum est. Fortè si repetiisset iste tam grauis paroxysmus, & nil commemorabile apparuisset, ægrum sustulisset. Vel id contigit, quia calor natiuus non est affectus, & debilis eo modo qui dictus est ante; præterea non adsunt alia pessima signa quæ aliis comitata mortem afferre solent.

Porro ex superioribus dictis patet bifariâ magnos esse paroxysmos, febrémque magnâ, vel sola humorum putredine & caloris febrilis auctione (id quod Galenus vocat humores accendi *πυρετωδώς*) vel propter vim naturæ & caloris natiui copiam. Priore modo vires sunt infirmæ, Posteriore sunt validæ & potentes. Priore modo aliquando febris exigua esse videtur, sed id est potius signum fractæ naturæ & exhausti caloris contra naturam. Vix enim febris est magna præsertim cum robusto pulsu quin aut sit naturæ lucta, aut caloris naturalis copia & vberitas: Et tamen incedit aliquando paroxysmus & auctior febris cum id sit potius motu morbi & humoris quàm naturæ. Et tunc post paroxysmum istum natura succumbit, & mors aduenat, decipiunturque Medici, Prius enim extinguitur calor naturalis

258 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quàm denuo febris accendi possit⁷. Quæstio nunc est, Si magnus pulsus, si febris insignis, si symptomata vigent, si æger æstuat insigniter, si sitit, an Medicus aliquid tentabit euacuando, aut purgando? Fortè morbus tunc consistit, in vigore est, pus fit (id est in pepasum incumbitur in toto genere venoso) oppugnatur qualitas materialis quæ tam vehementem paroxysmum intulit, sinendum id naturæ, non reuocanda, solus etiam emanās sudor plus proficiet quàm quiduis quod agitare queas. Si tu reuocas naturā ab instituto, criseis interturbabis si interturbas, secretio non continget bona post coctionē. Vt mirū non sit purgatione immodica & detractio sanguinis morbus imminui, ac hebescere videatur, sed postea nō ampli⁹ eluceat vis naturæ & ipsius aggressio in fultusve, vnde acutus morbus *ἐν μὲν πύσιν*, longus fit. At satius esset breuius & acutius ægrotare. Cum enim natura morborum sit Medicus, plus efficiet coquendo & secernendo intra paucos dies per modum *κρίσεως*, quam nos vacuando, purgando, & humores innoxios agitando, & quasi camarinam mouendo pro crisi & præcipiti iudicio inducere *πρὸ λύσιν*. Immo (magno Medicorū opprobrio) id obseruatur sæpè iis qui valida sunt natura, & quæ non faciliè quatitur, affligiturque, morbum febrēmque eodem fere tenore progredi & perseuerare, licet omni remediorum ope aduersus morbum pugnatum sit) & foeliciter crisin in 7. aut 11. aut 14. diem incidisse. Quod si natura sit debilior, & minimè medicationibus assueta, frangitur quidem medicando vis morbi, sed protrahitur quia naturæ demptum detractūque est calcar suum, detractus stimulus quo sollicitata beatas ac foelices crises miraculo quodam intentare solet. Sic non abs re Hippoc. toties celebravit, initio quidem agitandum aliquid, quiescendum vero cū omnia consistunt. Contra fit hoc tempore, nullo enim non tēpore aliquid agitur; etiam in vigore quidam phlebotomiam celebrant vehementia morbi adducti, minimè rati, augeri symptomata ad victoriam naturæ & aggressionem, non propter deteriore statum morbi, & causæ morbificæ potentiam. Et initio morbi natura opprimitur tantū à causis morbificis, in vigore à symptomatis. Symptomata enim sunt fortiora, dispositio morbi non est fortior, sed melior est quam in morbi initio præsertim si morbus salutaris fuerit. Id est, cum natura coquat humorem, & sit lucta inter morbum, & naturā, non mirum si v-

geant omnia, & augeantur symptomata, conditio tamen morbi & causæ morificæ est melior, quia natura est potentior & victrix futura est, & si tum ab opere naturam reuocas, quantum in comoda ægri pecces, ipse videris.

Nunc reuocemus ad hypothesein id quod dictum est, & quæramus de pleuritide an prout augetur & dolor & febris, confirmatum capiendum est detrahendi sanguinis. An non auctio & doloris & febris fit ob pepasum? At quis dubitat quominus in pleuritide sit expectandus pepasmus, & ei studendum. Cum autem augetur & febris, & dolor, fortassis natura aggreditur coctionem. Et detractione sanguinis à penso reuocatur. Vt mirum non sit si plerique intereant in quibus potius supersedendum fuerat tam frequenti venæ sectione.

ANNOTATIONES.

1. Cum in febribus Hypochondrium dextrum molliter tensum est, scias febrilis affectionis originem hinc existere, Galen. histo. de Hermocrate.

2. Vide num sit idem iudicium quod & de septimana, & nonana de quibus Hippocrates part. 7. sect. 3. lib. 1. Epid.

3. Vbi tertius & quartus dies paria habent symptomata, & signa in acuto morbo breui iudicium expectabis.

4. Hoc ex loco patet Medicos terreri non debere cum agram diuexari agitarique viderint augeri que symptomata. Hoc enim nature aggressionem significat. Quod dum fit, maior quædam vis fit nature, & sinendum donec virus, aut partem materie superarit. Id quod in omnibus morbis fieri credendum est.

5. Inter cetera patet aperire ex Galeno ad part. 10. & 12. De Hermocrate, qua ratione vulgus decipiatur ratum ἀποπέλαι istam, bonum esse signum: Item docet cur febris quæ euanuisse videtur, reuertatur.

6. Inter cetera hic locus annotandus. Vnde hoc anno 1587. Multi interierunt ferè nulla febre presente (quoad pulsum) quia calor febrilis digeritur, remanet naturalis ita infirmus, ut prius extinguatur, quàm febrilis calor denuo reaccendatur. Sed est falsa opinio ἀποπέλαι. Remanes enim squalor nescio quis & siccitas lingue. Et sensim ægri intereunt. Et Pellicarius Maclouius paulo post septimum visus est restitutus, deinde die undecimo extinctus est.

7. Vidimus enim plerisque à medio sublatis quibus Medici spem pollicerentur salutis, falso inducti febris lenitudine & paruitate. At parua

Kx ij

erat febris inopia caloris naturalis, & natura imbecillitate, non cause imminutione & caloris contra naturā victoria, in quo pulsus ad naturam rediisse videtur. Ideo fortasse doctrinam sphymicam neglexit. Item caloris acris sensus non erat qui prius.

CONSILIVM XXXI.

De Causo.

ÆGri tres simili penē febre laborauerunt. Causus erat nō verus qualem descripsit Hippo. Alius libera erat, sed nil proderat, aut parum ea excretio. Cruditas multa, tenuis & biliosi humoris aut feri potius vis interdum apparebat.

Primum de foco: De siti, alui libertate in febribus continuis, urinis aut tenuibus, aut crassis, de Phlebotomia & purgatione post phlebotomiam, & quod venæ sectio aliquando præferri debet, febrium ardentium focus est gibbum hepatis, ieiunū intestinum os ventriculi, venæ ventris, pulmo quoque & pulmonis venæ. Dubitant quidam an pulmo focus esse possit. Id expressit Galen. in Epid. Et idem Gal. docens quibus febribus continuis hæmorrhagia conuenit. Ita, ait, hæmorrhagia maximè iis febribus causodefi conuenit quarum sedes in pulmone est. Sed apertissimè alio loco explicat quibus notis distinguatur febris *καυσώδης*, cuius focus est in pulmone, ab ea cuius fomes est in hepate, aut ventre. Maximè verò ex difficultate spirandi distinguit. Et hic locus est diligenter notandus, vt cum ea de re dicendum fuerit, habeamus quod in præsens afferamus. Et Hippocrates ad talem crisin febrium ardentium quarum pulmo focus est, sputorum crassitudinem requirit. Quasi verò, dicat quispiam, si pulmo focus febris est, ea nō potius symptomatica dicatur quam essentialis. In vno loco ait ad *καύτην* istum bilem in venis pulmonis efferuescere, in altero, simpliciter pulmonis meminit.

Focus
febris
ardentis
pulmo.

Cur alius liquida sit in Causo, præsertim si focus in ventre sit, nō autem si in pulmone, inquirendum. Id terret Medicos sæpè. Et adumbravimus quodāmodo in libris nostris. Breuiter per-

Aringemus Nunc, & locos tanquā notas indicabimus. Primum ita Galen. in febribus alius liquida esse potest tum ob ventris phlegmonem, tum ob colliquantem febrem. Hinc patet ob phlegmonem alium liquidam esse posse. Item alio loco: Quibus venter afficitur & focus febris est, his corrupto cibo deiectiones liquidæ sunt. Quibus pulmo focus febris, contingit ut astringatur interdum aluus. Si iecur cauli fomes est, aliquando alius liquida, aliquādo spyrathodea excernit. Si solum phlegmonem patitur, dura aluus est: si cum phlegmone est imbecillitas, liquida deiciuntur, viscera ad se alimentum nequeunte allicere. Sed eiusmodi deiectiones ab iis quæ ventre affecto eueniunt, distinguntur τῶν κενώσεων, quod verbum elegantissimum.

De siti præclarum est quod scripsit idem Galen. Nam cum vident Medici plerisque febre satis insigni laborantes parum sitire, aut nullam probabilem rationem afferunt, aut distillationem à capite causantur. Melius Galenus: *Interdum causus in una parte, interdum in toto corpore gignitur. Si in toto corpore, sitis omnino perit. Cum in una parte, non necessario, nisi pars ipsa sitis afferat. Omnium autem primum id facit os ventriculi, deinde stomachus, post pulmo, subinde ieiunum intestinum.* Id quod notandum est. Obseruauimus enim ante Galen. velle os ventriculi, hepar, pulmonem, & ieiunum intestinum febris ardentis ἑστῶν esse. Vult & totum corpus. Quod notandum. Atque inde colligere possis attractionem ichorum in totum corpus, non tantum in maiores venas causam esse Cauli. Sic in habitu corporis accendentur ichores & febrem committent, & dolores ἰσχυρότεροι parient, & sudoribus soluentur. Et ab habitu maximè sudor manat. Si ergo ventriculus, hepar, os ventriculi, ieiunum intestinum, stomachus, & sitis & febris sunt foci quidam, item & corpus totum plenum ichoribus, quid est cur ad generationem febris continuæ recurramus ad venas internas maiores?

De purgatione & phlebotomia, vtrum præcedere debeat, sæpè dubitari solet. Hippoc. abundè ea de re dixit. Sed duas eius sententias cōmemorabiles hīc proponemus: ἡ φλεβοτομία ἢ γὰρ μονικὰ ὄντι, vt loquitur Hippocr. vbi inflammatio est, aut ποσὶ πολλή. Deinde dixit, μετὰ τὴν φλεβοτομίαν ἢ εὐμακρίαν δεῖ μετεϊσθῆναι καὶ ἀσφαλείαν: Id est, medicatio quæ post phlebotomiam administratur, omnis & mediocritatis moderationisquæ & securitatis seruantissima esse debet.

Lib. de
Indica-
tionibus

De Loysonio id notandum. Ictericus factus est post septimum diem. Ac de eo verum fuit quod scripsit Hipp. in ardentibus febribus si Icterus post 7. diem appareat, signum est sublati sudoris. Morbus non solet exudare, nec abscessum facere, sed homo sanus fit. Biliosa enim alui egestionem curatus est. Quod ad phlebotomiā pertinet quæ tunc in febribus synochis putribus celebratur, duo obseruanda sunt ex Galeni meth. med. Prius, quod synochus non cadit nisi in corpus bene habitum & succulentum, & in virtutem imbecillam non cadit. Accedit quod calentis ætatis esse oportet. Posterius est de sanguinis detractio. In febribus continuis synochis spectatur obstructio & putredo, multitudo, crassitudo & lentor humoris, retentio humoris & excrementi transpirabilis. Inter causas censetur multitudo, crassitudo, lentor; Retentio excrementi transpirabilis est causa & symptoma. Putredo est causa & affectus. Morbus erit febris & obstructio. At obstructio & putredo ipsa per se per detractioem sanguinis non possunt curari, alia enim remedia postulant. Si nutrimus febricitantes, augemus febrem, si non nutrimus, vires deicimus. At satius est aliquid sanguinis, quod proprium est partium nutrimentum relinquere, vt paucas exhibeamus sorbitiones, quibus tanquam medicamenti potius quam tanquam alimentis vtimur. Quid enim magis ridiculum quam non relinquere naturæ sanguinem iam factū & asseruatum, & necessitate cogi ad ægros nutriendos? Quod quotidie factitari solet. Nam postquam sanguinem abunde detraxerunt, tum expressum capi aut aliquid simile multi alimenti offerunt vt vires detractō sanguine imminutas instaurent.

Error
Medico-
rum in
secunda
vena.

Datum medicamentum sub diem criticum hypercatharsin excitauit. Sic natura ab operē fortē reuocata est. Sed si natura die critico alui profluuium proritat, cur & eius minister Medicus idem non faciat?

Sapē ex acuto morbo fit quodammodo Chronicus dum materiam in profundo corporis quietam tranquillamque, & quæ motu suo naturam non sit agitata, mouemus. An non melius esset naturæ crisin finire aut per sudorem, aut alio modo, quàm reuocando naturam ab instituto in morbi longitudinem ægrum conicere? Id quod adumbrat quodammodo Hippoc. 4. acut. Quæ initio vrinæ nebulosæ ac crassæ, hos, annuentibus cæteris purgare conuenit. Si vrinæ inter initia tenues fuerint, hos

non purgabis. Corpus quieti permittendum, yngendum, tenuiter nutriendum. Nam si ventrem moueris, vrina non maturabitur, febrisque citra sudorem ad iudicationem in longum tempus protrahetur. Galen. in Com. explicat quomodo exhibitio alimenti naturam à coctione humorum auocet, & medicamentum naturam conturbet, & propterea coctionem impediant. Sic febris non iudicatur vt iudicari debet, & in multos dies protrahitur.

Inquietudo erat maxima. Et quoniam de ea disputandi locus est amplissimus, ea re supersedendum est hoc loco. Egi-
mus enim in lib. à nobis scripto de definitionibus Medicis. Et habeo multa eaque præclara annotata ad part. 19. lib. 1. *πρωτον*, & in 2. Prorrheticon.

In vxore Pefmæi animaduertendus est quidam manuum tremor, aut potius subsultus quidam qui non tam erat ab infirmitate & exhausto, quàm à cacoëthia, aut humorum copia. Et cum recreatis viribus quæ initio valdè afflictæ videbantur, diligenter corpus expurgatum fuisset, cessauit illud terrificum symptoma. Consimile fuit illud quod accidit Hortulano Domini de Roissy de quo ante.

Atque ex ea historia doceri debemus prognoseos vim & rationem esse valdè ancipitem, nec deferendos esse à nobis agros cuiusdam infirmitatis ratione adductis. Sæpè enim humores crudi sunt, & tamen validis remediis naturam initio vexamus, & vires debilitamus, quas ad coctionem seruare oporteret, & naturam ab opere auertimus, & materiam crudam agitamur: quæ agitatio naturæ infesta est.

Porro, quod ad curationem febrium pertinet, caput vnum attingere pertinens ad victus rationem non erit alienum ab instituto. Et incipiendum erit ab Aphorismo Hippoc. Naturâ *15. part. sect. 4. lib. 6. Epid.* calido refrigeratio, potus aqua, quiescere: Somnus in frigore vestibis contesto: Et ex Com. Galen. in hunc locum sensum istum eliciuimus, inter dormiendum calor intus augetur, maximeque iis qui calore acri ac febrili abundant. Proptereaque in loco frigido dormire debent, & vestibis cooperiri. Dormire quidem in loco frigido, vt aërem frigidū inspiratu attrahant: vestibis verò & stragulis cooperiri vt caliditas quæ se intro intulit, ad habitum reuocetur. Sic corpus inspiratu aëris frigidi, dum in loco frigido dormit, & recalesfactione superficiiei vesti-

264 CONSILIORVM MEDICINALIVM
mentorū vi ad temperaturā quandam mediocritatem redi-
getur. Sed id non omnibus naturis conuenit. Quæ enim fri-
gidiora sunt temperamento, hac victus lege offenduntur. Mens
quidem fuit Hippoc. illo loco de naturis calidis id audire, non
autem de febricitantibus: sed meo iudicio bellè aptèque ad fe-
bricitantes accommodari potest.

CONSILIVM XXXII.

Ad dolores ab utero.

CVM vterinis molestiis sese valdè agitare, & vix loco cō-
quiesceret post vsum quorundam remediorum hac in re
partes D. Magni diligentiamque desiderauimus.

Balneo vtendum ad leuationem dolorum. Aperiunda vena
malleoli.

Vtendum suffitu ex tapso, dictamo, chamem, meliloto, semi-
ne fœniculi, anisi coctis in aqua, addita vini albi parte.

Ex iisdem impletus facculus qui continebitur circum ven-
trem.

Purgationi tunc incumbendum fuit. Lac asinæ propinandū.

Notanda historia cuiusdam mulieris quæ cum vterinis mo-
lestata fuisset post succussionem ab equo, post dolores longos
excreuit aliquid pici simillimum.

*Lib. 2.
Epidē-
miarum
miorum* Cum idem alteri mulieri contigisset, post diuturnos dolores,
tandem eruptio carbunculi circa os sacrum sanitatis illius pars
fuit.

CONSILIVM XXXIII.

*De Hypochondriaca affectione, catarrho dorsali,
& variis affectibus.*

CVM intersit plurimum ad morbi cognitionem quæ ætas,
quæ cœli constitutio præcesserit, quæ corporis constitu-
tio,

fio, in hac symptomaton syndrome & concursu de prima morbi origine aliquid statuere difficile est.

In certam enim ætatem certi incidunt morbi, vt in pueros lithiasis, ab anno 14. ad 40. in constantem ætatem catarrhus dorsalis, & hamorrhoidon molestiæ, autoritate Hipp.

Sic ex relatu ægri omnino pendere oportet, donec aliter res innotescat.

At tanta est symptomaton diuersi generis complicatio vt quò referenda sint, vix oculatus Medicus perspiciat.

Inter hæc interioris cruris dolores sed fugaces, deinde pedum imbecillitas, gressûsque impotētia, stupor dextrarum partium, gargareonis laxatio, vacuitas doloris aliquando, alui proluues, deinde longa astrictio. Vrinæ difficultas. Hæmorrhoids purulenta, deinde urinae incontinētia; denique ganglij, aut thymispecies, flatuum molesta seditio sursum deorsum, dolores vagabundi, & plena querimoniarum oratio cuiusmodi melancholicorum esse solet.

Ex his quædam Hypochondriacæ affectionis certa sunt indicia, quædam distillationis & catarrhi dorsalis, qui aut Plinij Scelotyriben, aut paraplegiam tandem esset allaturus.

Nec enim nouum est paralyseos & paraplegiæ rudimenta ab interno corpore & visceribus repetere, non à capite, vt vulgo fit, & in calculosis stupor femoris sine villo defluxu cōtingit, quanquam à capite frequentius hæc dependere solent.

Interea tamen periculo non vacat non intellecta mali origine remedia decernere. Nam si Hypochondriaca fouetur affectio, fortè tutus vsus non est decocti ligni indici: si catarrhus tantum est, & à capite per spinalem medullam in subiectas partes defluxio, vtile futurum est tale decoctum.

Accedit quod humor qui fluxit pituita est, aut eius serum. Non acer, serosus aut nitrosus humor, alioqui dolor implacabilis fuisset. Pituita autem & eius serum stuporē potius & lentorem parti afferre solet quam dolorem ait Galenus.

Vt mirum non sit si effœminatio, neruorum partium laxitas, & nonnulla resolutio sit secuta. Mucus enim iste laxat potius & resoluit, quam dolorem excitat.

Et si laxatio sphincteris ipsius vesicæ contigerit, vnde inuoluntariè vrina fluxerit, minus mirum fuerit.

Porro vix hæc secum consentiunt, ineunte Hyeme molestū

266 CONSILIORVM MEDICINALIVM

esse toto corpore caloris & æstus sensum, ceterum aliàs dimidia corporis parte, aliàs partibus inferioribus stuporem, gravitatem, imbecillitatem cum doloris quadam vacuitate contingere: Id quod diuersas symptomaton origines conuincit.

Nam molesta illa caloris sensio Hyeme præsertim, per suppressionem feri videtur euenire: Et id Hypochondriacam affectionem maximè significat. Flatuum enim istam copiam in Hypochondriacis ad phlogosin primarum mesenterij venarum Diocles referre videtur. Cui assentitur Galenus.

In quo ambigi potest de frequenti detractioe sanguinis quam æger passus est. Si enim pituita aut humor similis in partes subiectas influens neruorum vim dissoluit, quorsum hæc frequens detractio sanguinis? Calor enim & spiritus est dissipatus, cuius magnæ sunt in his affectionibus elidendis vires. Vt mirum non sit si nullam mali alleuationem ista euacuatio attulerit.

Vt concludam, nil certum elici potest, cum quædam sunt Hypochondriacæ affectionis soboles, alia & defluxionis, & catarrhi dorsalis indicia. Quod certo tenendum est, ne frustra decernatur remedium vni parti pro altera.

Vt autem ex diagnosi ad prognosin via muniatur, id verum quod Hippoc. scripsit, torpores & sensus stupores propter morem contingentes fiderationis signa sunt. Et idem Hippocr. Quibus senioribus torpores sunt vehementes, tum lumborum, tum crurum, quibus aluus non egerit nisi vi, his morbus diuturnus erit, prædicendumque annum, vt minimum duraturum.

Et cum duplex origo à nobis fuerit explorata, bifariam quoque remedia erunt vsurpanda. Conciliandum robur partibus suscipientibus, & quarum tandem morbi longitudine sunt conuulsæ. Ventri prospiciendum & visceribus à quibus pendent tot dolores fugaces, & impetus facientes modò in hanc, modò in illam partem. Id quod Hypochondriacis familiare esse solet.

ANNOTATIONES.

1. Pars eadem conuulsifico modo affici potest & paraplegico. Paraplegico quatenus nervosum genus magis afficitur, conuulsifico, quatenus nervosum genus magis afficitur, conuulsifico, quatenus genus musculosum.

2. Si dolores qui in superiores partes sauiunt minuerent eos qui in partibus sunt inferioribus, metastaseos alicuius argumentum esset. Sed id fit per quandam ἐμμενσησιν. Nulla autem ἐμμενσησιν, alienationem affert in prima parte in qua dolor est. Sed ut est propagatio cause morbificae, ita & dolores. At in metastasi contra fit. Lenatur enim prima pars afflicta dolore.

3. Vetusissimi morbi & pessimi & qui reuoluuntur grauissimè obediunt, itemque hi qui sunt in vetustissimis corporibus.

Hippoc.
lib. 2.
Prorrh.

CONSILIVM XXXIV.

De febre continua, cum dolore ad splenem.

MARG. DANIERES, febre continua laborauit circa mensem Augustum: Dolor ad splenem & latus sinistrum. Splenicum id esse credebatur, nec tamen febris redoluit naturam humoris in splene congeri soliti. Insignis febris erat, lassitudines, genarum rubor magnus. Sed ἐν μεταστροφῇ hæc febris. In quartanam diu longam degenerauit. Circa morbum huius hæc philosophabamur.

Rubicundi vulgo hepatici creduntur, & tamen hæc ægra splenica maximè patiebatur. Et à splene & febris biliosa, & rubores isti esse possunt. De primo extat locus apud Hipp. Quædam ex villa Bulegaræ cepit ex splene laborare: (Qui verò dextrum præcordium habent non quidem sublime, verum intantum, hi etiã magis sunt rubicundi (rubicunda cum esset.) Quamquam ex eo loco vix colligas an rubor iste splenicum quid, an hepaticum significaret.

De febre biliosa ex splene ita apud Hippoc. Lycino Gram-
Ll ij

268 CONSILIORVM MEDICINALIVM

matico ex febre biliosa ex splene, capitis grauitas, &c. Item alio loco: Post pleiadas biliosi, splenes magni, duri, dolorosi, sanguinis eruptiones (Græcè elegantissimè Αἱμορραγικὰ πλῆθνη: aliis sanguis biliosus ob splenes, Quod notandum, ne cum febre biliosam videas, & circuitus humoris biliosi, & motum, & sanguinis qualitatem malè accuses hepar, non autem splenem. Sic frustra medeberis.

*Sanguis
biliosus
ex splene.*

In ea muliere erat velut ζύμωσις πλῆθους, quemadmodum apud Hippocratem ζύμωσις ἥπατος legitur.

Aderat lassitudo ὀστικότης, fit autem ob tenuium humiditatum acrimoniam, & quandam διήχυν. Calor enim febrilis fundit & mouet, sed non digerit, nisi critico tempore excernendi occasio affuerit.

Lassitudo sanorum est symptoma ob vehementem exercitationem: sed quæ sine exercitatione fit, morbosorum est.

Hæc detractionem sanguinis ferre non potuit. Quam mox enim ab aperta vena animo defecit, donec consilio D. Magni haustu aquæ parum refrigeratus esset ventriculus, & spiritus incrassati, ac quodammodo repressi. Porro à detractione sanguinis facilè animo linquuntur quidam vel quod natura imbecilliores, vel quòd timore magno percellantur virè (que offundant omnes, vel quod os vetriculi amara bile perfundatur, aut quàm maximè acrisensu præditum ac infirmum sit. Vnum autem in operibus artis scire cõuenit, plerisque in detractione sanguinis deliquium contingit animæ, cum præsertim prima corporis regio non est purgata. Bile enim os vetriculi natat, quæ quia mouetur, & nō promouetur, deliquium animi afferre solet. Itaque (nisi quod valdè impediatur) cachecticis, cacochymis & biliosis ἀγχο, vix sanguinis detractio conuenit, nisi prius aut vomitu bilis exclusa fuerit, aut eadem deorsum medicamento cho- lagogo exclusa fuerit.

ANNOTATIO.

I. Diximus ex Hippocrate quasdam esse febres biliosas ex splene. Errant Medici qui ἀδολέως, ad Hypochond. sinistrum & regionem splenis olea calida, foras calidos semper adhibent. Apud Hippocratem locus est de Polycrate cui fomenta ad splenem calfacientia oberant, refrigerantia præsterant. Hic locus non est dissimilis priori iam allegato in

quo mentio fit de febris biliosis ex splene. Et lib. de internis affectionibus meminit Hippoc. morbi cuiusdam splenis à copia sanguinis orti. In eo secatur venam internam cubiti sinistri, alioqui in eos incidit excretio sanguinis faeculenti multi à qua intereunt, ut D. Baron contigit, & D. Pajot, & infinitis aliis.

CONSILIVM XXXV.

De Abortu, & fluore uterino.

Nobilis mulier trimestrem vtero foetum, aut paulo seniore ferebat. Magnū quoddam confecit iter. Ac tunc magna affecta est molestia. Abortiit. Ac primum foetulum exclusit, deinde falsum germen cum grumis sanguinis, ac si iam nigrefactus foret. Ab eo abortu dolores ad umbilicum, & τὸ ἄρσενον perseverarunt. Alba ab utero proluies, modo subrubra. Tandem alba continuo secedunt, & singulis mensibus menstrua apparent.

Mancus hic libellus & narratio in eo explicata. Multa enim alia sunt explicanda, alioqui frustranea erit omnis opera quae infumetur.

Inter deliberandum dictum de eo Aphorismo, Quae absque causa manifesta trimestres abortiunt, iis acetabula uteri mucosa plena sunt. Et in hac fortè abortionis causa hinc repetunda.

Item, quod mola aut falsum germen aliquod abortionem facit, dum id quod mortuum est excutit vivum foetum.

De ἀμάρωσι, sanguis est velut liuidus in utero remanens tempore gestationis quem foetus non capit: & hic aliquando per se committit.

Morbosi menses cum bono semine, & bonum menstruum cum illa laudabili semine molam facit.

Hip. Cum acetabula plena sunt pituita, menses sunt pauciores. Quod defluit mucosum & viscosum est. Et in mensibus cum purgari desierunt per duos aut tres dies muci ex utero prodeunt, horror tenet, febris parva. Suffitus ad id utilisissimus.

Mulieres biliosae æquè per laborant ac mulieres albae & quae vulgò per dicuntur.

176 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Initio
lib. 2.
de morb.
mulier.

Hippoc. senioribus fluxum album esse magis, iunioribus rubrum magis ex febribus & aborsu, & mensium interceptione. In quo parum distinctè inordinata menstrua cum ipso confundere videtur¹.

Compactæ mulieres non ita ipso laborant, non sunt bonæ nutrices, & quia ob soliditatem impeditur cursus lactis, & quia absument alimentum in molem corporis. Contra mulieres albæ sunt ipso & ipso obnoxia².

Quoniam nil de peculiari ægræ natura scripto significatum est, nil de ætate, victus ratione, & iis quæ præcesserint, difficile est aliquid statuere quod morbi causam proximè respiciat. Et tamen in re hac ancipiti decernendum est aliquid prudenter, ne si irrita medicatio fuerit, saltem nulla grauis iactura consequatur.

Hæc fuerunt capita deliberationis.

Victus ratio siccans ex usu est, nisi aliter suadeat peculiare corporis temperamentum & constitutio.

Si qua in venis cruditas fuerit, mitiganda est. Si à capite vel aliundè fluxio fit, repurgandum corpus. Reuulsione si opus fuerit vel ad cutim Hydroticorum usu fiet, vel vomitione, vel sputatione.

Clysmata cathartica pituitam circa locos oberrantem aut fixam prolestantia instituantur, non omittendo senam, agaricum in nodulo.

Si caput author mali statuetur, purgationes & remedia capiti consulent.

Si ventriculus imbecillior, humidior fuerit, solidioribus vtendum, à liquidiusculis & humectantibus nimium abstinendum erit.

Vt visceribus & mesenterio consulatur à quibus fortè fucus manare videtur, syrupus solennis ex rheo, agar. & sena valebit. Item syrupum ex aq. melonariæ, cum agar. vterum mirum in modum confert.

Hiera clementiore cœlo dabitur adeum finem.

Confirmato corporis habitu, vel hypocausto si cœlum ferat, vel siccatione per hydrotica emplastris vtendum corroborantibus.

Pulvis conferet ex puluere florum & foliorum rosæ transmarinæ, conferua rosarum siccarum, antheraspidio¹, puluere ossis sæpiæ, corallio vtróque cum tartaro vini, albi abluto in aqua rosarum, & multo saccharo.

Aque agrispadi conferent tanquam summum remedium. Nec omittenda phlebotomia si res postulauerit.

ANNOTATIONES.

1. Corpora seruorum non sunt ita flori muliebri obnoxia. Magna quoque vis est pathematon animi ad dissoluendam contentionem ipsius corporis, unde ad p̄i proclinitas. Laxantur enim carnes.
2. Cum disputatur mei p̄i, disputari potest de consuetudine mulierum. Hæ non detegunt morbos, unde aut sunt insanabiles per se, aut ex euentu: Item de earum morbis propriis, de natura, colore. Nam prout sunt albæ aut nigæ, ita sunt minus magisve opportuna. Aborsus etiam sunt sæpe causæ talis p̄i, ex euentu. Vis enim vtero quodammodo infertur.
3. Cornu cerui vsum & sæpe usurpatum aut potu, aut alio modo confert plurimum. Semen hedera albæ commendat plurimum Hippocrates & corticem pini. Hoc est vtrumque remedium parabile.

CONSILIVM XXXVI.

De Raucedine.

IN summa raucedine cum loquendi difficultate ita à nobis cuidam monacho consultum est. Cassia delincta cum iure caulium rub.

Vsus cassiæ frequens, aliquando cum decocto folliculorum.

Bolus exterebinthina cum conferua violacea¹.

Suffitus ex decocto vngulæ caballinæ. Decoctum caulium rubrorum, hydromeli, hyssopi coma adiecta. Pulvis glycy. ex ouo sumptus butyrum recens in pastillos confectum, vel cum melle delingatur. Pinæ & pistaciæ cum aqua rosarum, aut vino albo clotæ.

Masticare & delingere glycy. ac præsertim succum eius.

Vinum album dulce, gallis *vin bourru*. Litus pectoris.

272 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Extractio mucaginis feminis lini non veteris plurimum valere dicitur.

Decoctum ficuum, passularum cum saccharo rubro, aut cando.

Item Pendaleones ex puluere elect. diaireos conferua rosarum, aut vngulæ caballinæ cum sacch. aut melle benè cocto. Oleum sacchari. Succus amygdalorum amarorum.

CONSILIVM XXXVII.

De Causo. Pro D. de Torigny. Ad Dominum Dalibourg Medicum Senonensem.

H. D. DE TORIGNY febris assidua. Calor interdū paulum se frangebat. Exacerbationes nocturnæ, vigiliæ, dysuria, vrinæ turbata, pauca, sedimentum velut conglobatum, sed non verum habentes. Lingua nigricans, scabra. Sitis mediocris febrī non *ἀνδρογος*. Septimo die omnia acerbiora. Ischuria & suppressio absoluta vndecimo eadem. Non tanta tamen meiendi difficultas. Circa 14. sudor. Febris paulum defæuit, vrinæ perpetuò tales, sed copia maior.

Causus erat qui hominem occupabat, de secunda specie causi quam explicat Hipp. 4. Acut. Multa enim ex symptomatis quæ secundum hoc genus comitari solent, huic causo affuerunt. Præ ceteris vrinæ suppressio. Hæc autoritate Hippocratis adest aliquando in Causo, & tunc esse dicitur, vel cum parum meiitur, vel cum omnino vrina supprimitur, vt Gal. interpretatur.

Et in hoc ægro plurimū terruit nos ista pauca mictio, dixisses enim excerni mucaginem & capillamenta. Et quod Galen. in Aphor. ait accidisse nonnullis, vt quadam *την χόλον*, laborarent, quibus faba & orobus in vsu fuissent, id ægro nostro accidit. Id quod excernebatur, mucorem feminis alicuius succulenti referebat. Et cubitum magnitudine superabat. Velut suoptè pondere in fundum matulæ propendebat. Et istam mictionem *μυκρόν*, appellare possumus, & ad *την χόλον* quandam accedere dicimus. Et vt Hippoc. obseruat in mulieribus *τὰ ἡγυμνία ἢ μεσώδεια*

vt

Ut quibus multa pituita circa vteros restagnat, similis in ægro
 mictio fuit. Pituita enim aut cogitur aut ducitur. Si ducitur ca-
 pillamenta facit, aut aliquid simile. Et suppressio vrinæ in prin-
 cipium morbi incidens, indicabat istam ἀπείλητον, non esse à per-
 turbatione critica. Hippoc. obseruat in Aphor. in febribus ^{Aph. 69}
 aliquando paucas & grumosas esse vrinas, vnde aut suppressio ^{lib. 4.}
 aut pauca mictio. Conniuent enim vasa ab oppressione & co-
 pia. In quo Medici errant ad diuretica statim properantes, &
 comminiscētes falsò, aut esse lapidem, aut calculum aut aliquid
 simile. At humoris crassities est quæ id præstat. Vnde in fe-
 bribus ardentibus tales apparent aliquando vrinæ, & habent
 ὑπόστασιν ἀκριβέαν, de qua diximus Comm. in Aphor. 69. lib. 4.
 Nos aliam causam suspicabamur, vetus quoddā σάρκωμα, in vre-
 thra, aut ad parastatas. Explorantis catheter subire non potuit.
 Sic veteris cicatricis opinio fuit. Quod cum contingit, id quod
 tenuius & liquidius, effluit in mictu ipso, quod crassius est, reses
 in vesica manet. Et tandem quia id quod simile est, facilè sese
 simili associat & adiungit, pituita illa in vesica reses nouo cu-
 mulato humore accrescit tandem capacitas vesicæ occupatur,
 & micturiendi desiderium adest. Id quod multis opinionem
 fecit calculi, sed longè errauerunt³.

In hac cura nos gessimus eo modo quo in iis quibus pituita
 viscida & lenta est infarctus pulmo. Nam liquidiuscula ipsa
 per se effœminant sputū, & τὸ φλέγμα reddunt, ἐντεθλησμένον, id est
 effœminatum, vt ea ratione non facilè procedat. Sed contra
 potius agendum est per ὑποπνεύσιν. Reuocabamus materiam ante-
 cedentem ab vrinæ viis, ne illa sibi viam obstrueret.

Vt in posterum ita non afficiatur, si quid sit reliquum ex an-
 tiquo vlcere in vrethra illud per sanandum. Vesicæ & renibus
 consulendum. Syrupus Arnaldi Villonouau ad capillamen-
 ta in vrinis conferet. Aquæ ἀντιφνεύσιν. Aqua hordei cum melle,
 hydromeli, hyssopatum. Decoctum rad. enulæ campanæ. Lac
 asinæ⁴. Serum lactis. oxymeli. Cicera rubra. furfur. pariet.
 plantago. Puluis ossis sæpiæ cū electuario diaireos simpl. sacch.
 rosato puluere gly. ebore. Decoctum ficuum ex sententia
 Dioscoridis.

ANNOTATIONES.

1. Est urina suppressio febris *καυστικός*, proprium quoddam symptoma, & quod medentis consilium & prouisionem ad sese trahit. Fit autem multis de causis initio talium febrium. Principua tamen est copia humorum & pituitae praesertim, vias urinarias occupantis. Vel confluxus humorum ad easdem vias. Et Medici grauiter errarent si ad diuretica sese conuerterent. Deriuandum enim potius per aluum. Inuaret quoque elicere vomitum nisi re aliqua prohiberemur. Plerisque creatum est periculum, quibus praepropere diuretica sunt administrata hac sola ratione & consideratione quod urina non redderetur.
2. Nota & vide quid sit sedimentum *ἀναστρον*, & quod ante tempus est. Cui simile illud lib. 1. Aphor. cum disputat de urinis grumosis & paucis, ait, maxime quibus ab initio sedimentum inest. Tale enim sedimentum est, *καταγαστρικός* dictum.
3. Notandum quod quibus olim carnositas fuit in vtrethra iis in vesica non raro tanta crudi succi copia succrescit ut urina viam praepediat. Nec propterea coniectandum est calculum aut solidum aliquod corpus subesse. Et id nisi diligenter animaduerneris, egrum valde offendes.
4. Lac asina Gal. Comm. in 4. Acut. Statuit inter ea quae vim bu-
uectandi magnam habent.

CONSILIVM XXXVIII.

De Hepatis Marasmo.

CVM diu laborauisset, & omnium iudicio hepar in causa esset, & morbi fomes, tandem circa regionem hepatis tumor apparuit, cuius in apertione spem nonnullam collocauerunt. Coegerunt Medicos qui tandem putauerunt è re fore si ea parte pyroticum applicaretur. Non quod spes certa esset, sed quod certa desperatione incertum remedium multo satius foret. Aperta pars, sanies fluxit. Melius habere visus est. Tandem interiit. Hepar erat marasmo affectum & cancri modo affectum.

Nos in Consilium adhibiti ita ambiguè disputabamus. Quae

rebamus an esset inflammatio, an phlogosis. Si inflammatio, par erat pulsum diuisculum ferrantem & vibrantem esse. Nisi quis obiiciat id non esse necesse nisi membranæ, aut venæ, aut arteriæ afficiantur. Pulsus enim tunc talis est. Si inflammatur parenchyma idque leuiter, pulsus talis non est. Vt inflammato stomacho, aut vbi cruditas est, etiam præsentem inflammatione durus pulsus & vibrans non est. Generaliter, omnes qui febre diuturna laborant, vt iam marcescant pulsum habent paruum, æqualem, frequentem, celerem, vt idiotis febrile non videantur, quod arteria pulsam digitorum non feriat. Et in hepatis suppurato non est pulsus idem qui in aliarum partium suppurato cernitur, quia hepar arteriis penè caret.

Scirrhum fit hepar sæpius ex contumaci & inueterata partium obstructione, raro vel nunquam ex inflammatione, quod in viscere calido & humido omnis inflammatio in perniciosum abscessum degeneret. Hac est in opinione Fernellius. Quæ an vera sit vide.

Singultiebat sæpè. Querebatur an hic singultus à pressu esset, an à resudatione.

Causa apostematis hepatis per affectionem propriam est mala temperies ipsius hepatis quæ humores peiores reddit attrahitque, vt tamen non benè à natura partis regantur. Sic fit abscessus.

CONSILIVM XXXIX.

De purulentis urinis.

VXor D. Du Bourlabé, ab annis multis excernit vna cum urinis nescio quid quod cum meitur toti urinæ confunditur: vbi paulum resedit lacteum quid est & referens albore, æqualitate & læuitate verum pus. Quæstio an pus sit. Nephritin passa non est, nisi semel tantum quod ab annis decem viderimus, idque nuper. Et cum afflicta fuisset, doloresque cessauissent, quæsitum est an non in corpore ipsius renis lapis impactus foret, qui olim tales urinas promouisset, nunc verò apertam nephritin attulisset.

Mm ij

276 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Qui senior Medicus erat pus ex eo colligendum putauit quod foetorem haberet, si quidem pus esset. Contra hanc partem insistitur. Primum Celsus explicans illud Hippocrates *i. Prognost.* pus quam minimè sit foetidum, ita scripsit: Pus est melius quò minus, quò crassius, quò albidus. Item si læue est, si nil olet, si æquale est. (nisi locus hunc odorem excitet, addit Celsus cap. 26. lib. 5.) Credunt vix fieri posse vt non malè oleat, putruit enim materia. Putredo autem nullo signo cognosci potest quam odore. Sed cum exigua est putredo, & calor naturalis superior est, tum minimum olet. Sic particula illa *ὁς ἡνίκα*, non excludit omnem malū odorem, sed vt quam minimū oleat. Vix enim ab vlcere manat materia, præsertim à corpore interno, idque cum vrinis quin oleat malè. Quod autem grauis odor puris comes esse debeat, vt distinctio sit inter pus & succum crudum, qualem in vrinis cernimus, ita Galen. *Si quis utatur pane athletarum, in eo abundabit succus crassius & frigidus, qui propriè crudus appellatur. Est & pituita succus crudus & frigidus, non tamen crassius, vt qui humiditatem multam & spiritum multum habeat. Crudus autem succus tale propriè quid est quale est id quod in vrinis substat quòd puri aliquando est simile. Sed pus graueolens est & lentum: Crudus verò succus crassitie & colore duntaxat illi similis est, vt qui nec graueolens est, nec lentus. Sic difficile est statuere ad pus constituendum an necessarius sit odor grauis. Contra locum adductum facit alius in Aphor. cum Galen. explicat Aph. istum. Si quis sanguinem aut pus meiat, aut squamulas & grauis odor adsit vesicæ exulceratio significatur, ita Galen. Sanguinem & pus meiere omnium instrumentorum qua vrina inseruiunt signa sunt communia. Odor grauis & maximè squamula propria sunt vesicæ. Sic ex grauitate odoris colligit à vesica excretionem esse: quanquam obseruatum est excerni vrinas purulentas, & valdè fatentes vlceratis renibus.*

Unde aph. 81. & 75. b. 4.

Circa morbi huius inquisitionem hæc raptim sparsimque colligebamus: Cum à venis vrina fluat, per renes per coletur, & in vesica excipitur, necesse est vrinam affectionem horum trium indicare.

Vt ramentum vlceris signum est, sic arenula calculi, ait Galenus. Quanquam id minus verum est.

Notandum cum ait Hippoc. in Aphorismis, Si quis meiat grumos aut stillicidium vrinæ habeat, dolorq; ventrem imum

& pectinem occupet, circa vesicam labor est. Non dixit simpliciter, ait Galen. vesica laborat, quoniam communiter affectus pertinere potest ad vrinarios meatus, vesicam & renes, sed dixit Hippoc. Quæ circa vesicam sunt².

Fortè de agra hac hoc dici potest, quemadmodum obseruatum est vlcus, & abscessum renum fluoris muliebris causam esse, ita quis dubitat quominus aut latens mesenterij abscessus, aut alia in parte, eiusmodi vrinarum lactearum causa sit, & quod si ea materia vteri viam appeteret, vasâque subiret, *πῶς γυναικῶν* causaretur.

Apud Galen. Comm. in lib. 2. de Natur. human. Multa sunt de excretionem purulenta, quoniam autor libri secundi de Natura humana, putat id pus esse quod in vrinis hominum otiosorū subsidet: Galenus contra & succum crudum putat, & sputa cocta puri quodammodo similia credit. Immo certa circuitione talia excrementa pus falso referencia apparent. Nam succi crudi ac mucci maturitas pus quodammodo repræsentat. Erasistratus talē succum crudum pus reuera esse putabat, & ita Gal. Si quis pus in sputis, vel vrinis à succo crudo non distinguat, vel sciens per dogmatis consequentiâ dolosè aget, vt Erasistratus volens ab inflammatione oriri febres, vel est sophista nequaquam in artis operibus, versatus. Pus aliud enim est à succo crudo & colore, & consistentia, & odore.

Quæstio hoc loco moueri potest plurimū vtilitatis & voluptatis allatura, cur æqualitas in sedimento vrinarum tantopere commendatur, & in pure; eadem vero æqualitas in deiectionibus toto genere contra naturam est? Illud est enim Hippocr. *2. Prog. part. 21.* Mala est deiectio si fuerit parua, glutinosa, alba, subchlora ac lauis. Leuitas esse potest in laudabilibus excrementis, leuitas item potest esse in illaudabilibus³. Cū leuitas est laudabilis significatur materiæ æquabilitas quædam, quam cum calor naturalis æqualiter subit æquabilem magis reddit: sed in rebus illaudabilibus æqualitas, & leuitas in prauis ducuntur. Ita præclare Gal. Læue redditur quicquid è corpore excernitur, aut quod habeat æqualem coctionem, vt nulla eius pars effugerit naturæ alterationem: aut propter vehementem colliquationē, vt nulla materiæ pars imperpeffa supersit, vt quod salubre est, salubrius redditur cum æquale fuerit, ita id omne quod malū est, euadit deterius si æquale existat⁴. Vtrumque enim per omnem mate-

168 CONSILIORVM MEDICINALIVM

teriam apparet, quæ aut naturæ comptum recepit, aut turpitudinem prauitatis. De glutinosis porro id adiiciendum, aut sunt paucae, aut multæ. Si paucae colliquationem mediocrem significabunt. Si multæ, aut cum fœtore, aut sine. Si sine fœtore, ciborum naturam ostendunt quæ multum glutinosum humorem ac crudum acruatum significant. Si multæ cum fœtore, vehementem ostendent colliquationem.

Hæc egræ nostræ instituta sunt.

Purgetur clysteribus malacticis.

Vtatur cassia, ex rhab. & elect. diatrag. frig. Aut cum conserua rosarum.

Vfus frequens esto conseruæ rosarū & nenuph. Aqua amygdalar. dulcium, cum diatragacantho frigido.

℞. Electuarij diatragacanthi frigidi. ʒ 6. conserua violarum, & nenuph. an. ʒ ss. pinearum & amygdal. dulcium excorticatarum: deinde infusarum in aqua communi, & contusarum. an. ʒ ss. pulueris glycy. ʒj. cum syrupo violato. fiat opiata. Cap. ʒiij. pro dosi, superbibat hydromeli bene coctum.

ANNOTATIONES. I

1. Aphrodis. problem. 19. lib. 2. docens analogiam inter pus & hypostasin: docet cur pus in abscessibus fœteat, & hypostasis non fœteat. Supponit autem falsum. Quia pus sæpe non fœtet.
2. In hac muliere duo sunt quæ metum afferunt, vicissitudo caloris & frigoris, & lenta febris quadam. Et præsertim nocte exacerbatio contingit. Galen. ad Comm. ad part. 60. lib. 2. Prognost. explicat cur Empyici febre lenta teneantur & hectica, & cur noctu incalescant. Accidit omnibus hectica febre laborantibus, ut noctu intentionem calorem habeant, non quod nox augeat febrem ratione ipsius diatheseos morbose, sed ratione dati oblatique cibi: incalescunt enim à sumptio cibo & maxime dum distribuitur. Quare de nocte potius? Nam & cibus interdum datur? A Vega mihi videtur pueriliter hoc explicare, Quia (ait) tempore Hippocratis non prandebant, sed cœnabant: Galenus æquè malè. Nec enim omnino explicat illud Hippocratis: Noctu vehementior. Melius diceret, quoniam agitur de purulentis, in omnibus suppurationibus dolores ad noctem id quod non tantum audiendum dum pus sit, sed dum pus continetur aliqua parte fouens febrem lentam. Vel dicemus, cum hecticis partes solida ignita sint, non mirum si noctu calor in-

crescat, tum quia nox humectat, tum quia renocatur calor & spiritus intro. Sic calor crescit non ratione ipsius affectionis, sed ex euentu. Vel dicemus, nocte renocatur calor naturalis ad cœtrum qui calor quia igneus est, & non ætius, dum renocatur intro non nanciscitur aptum domicilium, & quo loco humectare debet, siccatur & squalorem auget. Et tunc non fiunt accessiones febriles, sed quædam exacerbationes. Præclara est hæc questio, & videtur contrarium contineri Com. ad particulam illam Nocturnalonga. 6. Epid.

3. Leuor est cum calor naturalis sese in omnes materie partes æquabiliter insinauerit.

4. Sic pus non dicitur è genere earum esse rerum quæ contra naturam sunt.

5. Quoniam vulgò ab usu cassiæ, & pilularum commun. statim sumitur cibus, id non placet Galenocap. 31. lib. 2. de alimentorum facultatibus.

CONSILIVM XL.

De Febre periodica, & tumore ventris.

Pro D. Isabella Vestali.

DE duobus agebatur, tumore ventris cum duritie summa, & de febre aliàs periodica, sed incerta & erronea, aliàs periodica & certa redeunte periodo. Tumor est tanquam symptoma: febris tanquam morbus, fortè & tanquam symptoma. Vtrumque enim suppressionis mensium est consecutarium. Si enim proliciantur menses spes est vtrumque cessare posse. Porro in tumore isto & duritie hæc spectanda. E genere symptomatum est quæ ad tactum referuntur. Id enim quod molle, & *κατὰ φύσιν* debet esse, intensum & durum percipitur. Durum autem tribus efficitur modis, congelatione, repletionem & siccitate. Videndum ad quod horum generum referri debeat. Tumor autem omnis aut est Hypochondriacus, aut Hypogastricus, aut Hystericus: & *κατὰ φύσιν*, tam partes quæ continent, quam quæ continentur audiri debent: ea de re amplum examen ante. Porro non idem durum & sic-

186 CONSILIORVM MEDICINALIVM

cum, vt nec humidum & molle. Siccitas ebibendo humorem, concretio inspissando & veluti congelando, repletio, renitendo duritiem ostendat & indurat. Sed duri causa præcipua est concretio & materiæ quedam congelatio. At repletio potius renitentiam affert. Et non quæcunque renixum afferunt ea dura sunt³.

De febribus quæ accidunt præsertim virginibus à suppressio menstruo Hipp. *Sunt, inquit, febres erroneæ, μετὰ παύσεως*: Et libro de superfætatione sunt Epialæ, legendus vterque locus. Et hic successus esse solet, si acuta inflammatio, insanit virgo, si putredo, clamat: si caliginositas, timet, si malitia sanguinis, animi moeror.

Lib. de superfætatione. Sanguis suppressus vel ad partes superiores refert se, vt cor & septum transversum, vel ad inferiores. Si in has, facile ad se redit, si in illas superiores ob ambages, & obliquitatem venarum non facile redit ad se. Et cum ad septum transversum rapitur, deliramenta excitat. Sed hæc ex interuallis cessant. Id quod nostræ virgini contigit.

De mensruis suppressis ita Galen. Si menstrua fluunt plus iusto, morbi contingunt, si non fiunt ab utero, & in utero morbi contingunt. In utero aut dispositio inflammationi similis, aut erysipelati, aut duro tumori, aut cancro, quibus denique compatitur totum corpus.

Clysteres parentur vterini cum carminatiuis & elicientibus sanguinem, hypericone, centauro minore & hiera: frequentissime subiiciantur⁴. Aperietur saphena pedis dextri, lotis prius pedibus, & fricatis. Exhibebitur medicamentum Hypochondriacum cum folliculis & confectione hamech. Repetitis iisdem clysmatis altera saphena aperiatur. Tabellæ concinnentur trium santalorum cum rhab. triplicato, & electuario diacubeb. & dialacca. Utetur cum dosi vna apozem. incidentis, attenuantis ex rad. rubiæ maioris, fœnicul. petro. cum maiorana, agripal. artemisia & capillaribus.

Interea tamen fots adhibeantur ventri ex malacicis, radic. cealth. liliorum cum chamæl. meliloto foliis maluarum violar. femin. lini altheæ omnibus incoctis in aqu. & pauco vino albo.

A fots superponatur scutum ex bombace carpinato maccrato in oleo keirino, chamæmelino, & liliorum.

Utetur his pilulis.

LIBER SECVNDVS.

281

℞. Castorei ʒj. myrrh. ʒj. pulueris hiera recentis dupla aloë ʒ ij. massa pilularum sine quibus ʒ iij. cum syrup. de hyssopo: fiat massa, de qua cap. ʒj. cum dosi apozematis instituti.

Fiant forus ad vterum ex calidis, attenuantibus & aperientibus in aqua & vino coctis.

Fiat suffitus ex trochiscis de myrrha per infundibulum.

ANNOTATIONES.

1. Cum omni ope adhibita tum ad motis, tum assumptis, tandem magna copia menses effluxissent, omnino sibi restitui visa est, & tumor iste resiliere ac minui putatus est.
2. Non est nouum Hypochondriacum eum esse tumorem, Hypochondriacum & situ, & natura rei. Immo plerisque Hypochondriacis venter tumet eo modo quo in Hydropicis. Immo pro Hydropicis curantur. Et cum instat tempus mortis, in ipso mortis articulo detumet omnino venter.
3. Si quando incidet occasio disputandi de siccitate, & duritie, & remediis eo pertinentibus legendus. Com. Rochonij cap. de scirrho.
4. Erat prae calidis satis visceribus: itaque non valde conferebant ea calida remedia: Vtendum erat potius contemperantibus.

CONSILIVM XLI.

Ad Melancholica pathemata.

DICTum est partim ægritudinē esse, partim ægrotationem. Hæc corpus attingit, illa animum. Quod animus afficiatur, declarant querelæ perpetuæ, metus, mœstitia quæ leuis perturbationis & deliramenti rationem habent: inquietudo, somni vacuitas, aut eius perturbatio.

Galenus duplicem statuit melancholiam, vnā cerebri, alteram totius corporis. Id est, aliquando cerebri venæ sanguine atro plenæ sunt, & tunc caput afficitur: aliquando totius corporis venæ eo turgent sanguine. Et tunc si cerebrum afficitur, per consensum afficitur.

Quæstio, an melancholia morbus est causa generationis succi melancholici, an succus melancholicus eius melancholiæ

Tomus II.

N n

Cap. 6.
lib. 3.
loco aff.

382 CONSILIORVM MEDICINALIVM

causa sit. Quidam dicunt melancholiam cum sit affectus animi qui *ἐν τῇ ἀπείρῳ τῆς* consistat, talis succi parentem esse. At est ubi id fiat, est ubi non fiat. Mœror & tristitia signa sunt pathognomonica, præsertim cum sunt sine causa manifesta, melancholiæ. Hinc reuocatio sanguinis & spiritus ad interiora. Si ergo melancholia id faciat, ex euentu causa est adustionis humorum, facitque ut sanguis & spiritus amittat suam viriditatem & lymphiditatem. Nam sanguis cum sit mobilis, suavis, & lucidus, hominem in spem erigit, lætitiā & comitatem inducit: Vnde sanguinei sunt venusti & hilares. At succus melancholicus colore atro timorem ac tristitiā affert: firmitate & crassitie, in opinione suscepta quantumuis ridicula, constantiam affert. Sic & morbus ipse immutare alium sanguinem potest, & sanguis etiam, ut cum est in toto corpore, à natura alienus melancholiam ex euentu inducit. Præclarum enim quod scripsit Galenus. *Constat autem quod totius corporis intemperaturas sequitur mentis læsio, quod non secus afficitur cerebrum quam totum corpus.* Quæstio hæc pluribus discuti posset.

*Ad
part. 34.
lib. 1.
Præf. 10.*

Nunc dicamus vno verbo de metu & mœstitia, quæ sunt ipsius passionis significatiua cum sunt sine causa manifesta. Sed ita tamen decidi hoc potest. Metus & mœstitia sine causa manifesta sunt melancholiæ pathognomonica, & metus, timor & mœstitia ipsa per se possunt esse ut causa melancholiæ. Sed id diuersa ratione audiendum est.

*Eodem
loco cap.
7. lib. 3.
de loc.
aff.*

Galen. abundè explicat quibus notis deprehendas aut in cerebro, aut in toto corpore redundare succum melancholicum illius affectionis autorem: Item quanam sint obnoxij isti morbo & generationitalis sanguinis. Molles, candidi & obcæsi, ait Galenus: Nequaquam habent humorem melancholicum, sed macri. Hirsuti, & quibus amplæ sunt venæ aptissimi sunt ut talis humor in his cumuletur. Eodem loco attingit curationis capita. Vbi vniuersum corpus succum sanguinemque melancholicum continet, à venæ sectione auspicanda curatio. Vbi verò solum cerebrum, infirmus (quod ad hanc dispositionem attinet) sanguinis detractione non eget, quamuis ob aliam causam egere queat.

Sic duo melancholiæ genera persecutus est Galenus, Tertium addit, Hypochondriacum, est tertium melancholiæ genus, ait Galenus, morbi comitialis exemplo, cum à ventriculo or-

tum habuerit⁴. Et de eo morbo sic Diocles. Est alius à ventriculo morbus, supple, melancholicus, ventriculi aliquando vehementes sunt dolores, qui nonnullis ad dorsum vsque procedunt, concoctis cibis quiescunt, mox aliis ingestis eadem accidentia reuertuntur. Est enim hoc maximè animaduertendum, quòd dolores dorsi eiusmodi affectu laborantibus sint familiares; & quòd modificato cibo quiescant, nouòque rursus ingesto ingrauescant. Hyparxin constituit Diocles etiam ex aliorum opinione in inflammatione primarum venarum quas lactes vocamus. Quanquam ipsi lactes propriè pro tenuibus & gracilibus intestinis capi soleant.

Et notandum est maximè, quòd Hypochondriacā melancholiam à ventriculo oriri dicat, & Epilepsiæ modo, eius præsertim quæ à ventriculo est. Quod possumus sic explicare. Quemadmodum in Epilepsia per consensum ventriculi, & in paucioribus puerorum, qui emittuntur vapores cerebrum ferunt, vt sit consensus inter ventriculum ob insignem neruorum texturam & cerebrum; ita in melancholia Hypochondriaca quæ elucet symptomata, ea maximè ratione ventriculi elucet, vt propterea à ventriculo malum oriri dicatur, licet fortassis ventriculus ipse non sit in causa, nec author mali.

Melancholia cerebri est affectus animi ἐν τῇ αἰδέσει, consistens: firmitatem enim & constantiam habet etiam in rebus friuolis, & quæcumque agunt tales melancholici, etiamsi per se significationem habēt alicuius iudicij, ea valetudinis vitio morboque fiunt.

In Hypochondriaca est inflammatio quædam συροφικὴ: & ad eius curam licet multa reclament, venæ sectio in primis est necessaria. Nam ἐν ταῖς συροφαῖς φλεβοτομίῃ ἡ χειμονικὸν ὄσθ. Gallicè, *c'est le conducteur de l'œuvre; il faut commencer par là.*

Melancholici patiuntur varia, variòque modo afficiuntur pro natura humoris, conditione animi, & moribus institutis & infitis. Quidam enim habent humores mites, non mores: alij mores, mites, sed non humores. Ad melancholicos facile pertinebit id quod scriptum est in lib. de humoribus, Ἐκάστῳ δὲ τὸ πρῶτον τὸ σῶμα τῇ πράξει ἐν τοῖς ἰσχυρίσιν ὑπακούει, id est, singulis animi affectionibus & causis quæ extrinsecus incidunt, quæ pars cuique corporis coctioni est consecrata, & officiales, & ministræ partes, his morem gerunt, vt cerebrum cogitationi, cor animositati, hepar cupiditati.

N n ij

284 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Melancholici non eodem omnes modo affecti sunt. Sed vt varias animi partes vnusquisque exercuit dum integra valetudine frueretur, nempè τὸ θυμοειδές, τὸ ἡγεμονικόν, & τὸ σπυγμωτικόν, ita dum in melancholiam incidit, ideam pristinae suae consuetudinis retinere cernitur. Vnde quidam dum melancholiaeprehenduntur de rebus venereis loquuntur & cogitant, alij eas voluptates sequuntur quae cibo potuque capiuntur. Et tandem consuetudine naturam quandam faciunt, in aliquamque rem defixi manent.

Quaestio est, cur definiatur melancholia. Delirium febris expers? & quomodo id intelligendum sit. Si de essentia quam *ἡ νόσος* vocant, id audiatur, reuera est vacuitas febris. Si vero generationem spectes, non semper est febris vacuitas. Nam cumulus & coaceruatio humoris melancholici naturalem oeconomiam labefactat, putredinem aliquam generat quae sit alterius generis quam aliorum humorum putredo; denique hepar tandem infestat. Alio loco quaesiuimus, an Hypochondriacos febris comitaretur.

*An fe-
bris Hy-
pochon-
driacis.*

Notandum quod scripsit Galenus, Molles, candidi, obaesi nequaquam habent humorem melancholicum. Macri verò, & nigri, & hirsuti, & quibus venae latissimae sunt, aptissimi sunt vt talis humor in his cumuletur. Et fit interdum vt prærubro colore homines affatim in melancholicam temperiem incidunt.

Quomodo autem οἱ ἡέρπιδες, fiant melancholici, & varia experiantur συμπτώματα; in fine sequentis paginae dictum est.

Cæterum in duobus errari videtur in cura melancholicorum; prius est dum in ediam famemque tolerare iubebuntur, alterum dum medicamentis valde calidis & siccantibus exercentur. Quod ad prius, abstinencia cibi humores in multis aciores redduntur. Hinc ferocitas maior. Vnde biliosis & quibus temperamentum calidius & siccus est, & sudor, & salua acrior redditur. Immo venenatam vim quandam adipiscitur. Et morsus hominis biliosi ieiuni venenum suae qualitatis ratione æquat. Cibus verò euchymus sua benignitate succos acres temperat.

Ad posterius, cum biliosi per δυσδιασέρεσιν, nigri, hirsuti, & prærubri, & melancholicam diathesin facile subeant, & succi melancholici γίνονται, facile habeant, ẽ re non videtur, si ad talia cor-

pora, & tales succos aciora medicamenta & calidiora adhibeamus. Immo omnia penè splenica, & succo melancholico dicata sunt eius generis. Et tamen ἡ ὑποχολία εἰς τὴν φλόγωσιν, ferè in illis esse solet. Et omnes practici decipiuntur nomine succi melancholici, qui suo ambitu sæpè continet eum succum qui χαλὴ μέλαινα dicitur. Itaque hæc remedia ἀποδείξαι non sunt vsurpanda.

ANNOTATIONES.

1. Cerebrum enim in ratiocinabilitate aliàs laborat, aliàs in animalitate: In animalitate, quatenus cerebrum ut pars organica laborat, in ratiocinabilitate, quatenus mens, id est, temperamentum cerebri laborat.
2. Qui sunt flavi, præsertim si vigiliis, curis, laboribus usi fuerint & tenui victu educati fuerint, melancholicum succum generant.
3. Melancholia est quædam à vitio ventriculi, quemadmodum Epilepsia à ventriculo, Galen. cap. 7. lib. 3. loc. affect.
4. Hypochondriaca melancholia ortum à ventriculo habet. Notandum est totus ille locus, lib. 3. de locis affectis qui verè exprimit naturam morbi melancholici.
5. Ista ἀλφειὸς, cadit in eam partem animi quæ mentis & consilij est: id autem Hippocrates vocat πέναντις τῷ γνώμῳ.
6. Melancholici sæpè surdescunt, non quod vitium sit in instrumento quod ἀκουστικὸν dicitur: sed ἐν τῇ ἀκοῇ, id est, in ea parte à qua audiendæ vis manat.
7. Hippocratis illud est, lumbis dolentibus stomachi dolores antecedentes signa eruptionis sanguinis puto. Galenus in Comm. docet eundem humorem causam esse doloris lumborum, & doloris ipsius ventriculi, sed diuersa ratione. Nam id quod crassius est, & suo pte pondere vel restagnat circa lumbos, vel deorsum repit, id ipsum graues reddit lumbos: id quod tenuius & ὀψιὸς ἀπὸ τοῦ Græcis dicitur, ventriculi partes appetit, dolorémque ibi excitat, & nonnunquam λιποθυμίας. Est enim credibile sanguinem istum crassefactum inducere quandam naturam grumosi sanguinis. Porro grumosis sanguis quot & qualia edat symptomata, non est necesse pluribus explicare. Vt non mirum sit eos quibus suppressa sunt hæmorrhoides, aut quibus mulieribus restitant menses, sæpè animo deficere ac linqui. Et præsertim quibus propter moram sanguis suo genuino ac naturali sero destituitur. Immo talibus post diuturnos dolores αἰσθητὰς immanes oboriuntur.

CONSILIVM XLII.

*Ad facilem uteri gestationem. Ad D. Sayueium
Melodunensem Medicum.*

ACcepi non ita pridem à nobili viro Vallentio literas, re-
media aliquot prophylactica complexas, quibus vestro cū
consilio charæ suæ coniugis grauiditatem securiorem alacrio-
rè mque redderet, & spe nonnulla probis suam solitudinem le-
uaret. Hæ periucundæ mihi fuerunt, & quod à tam benigno &
liberali homine venerunt, & quod tantum prolis desiderium
honesto aliquo officio lenire sit gloriosum. Sed eò iucundio-
res, quando tu in earum extremo cum tacita quadam commen-
datione, nobis, de nomine incognitis, tam amicè edito tuo
nomine salutem impertiueris. In hoc & benevolentia, & can-
doris tui significatio maxima apparuit. Id quod partim innata
tuæ virtutes, partim humaniores literæ quibus mirum in modū
relices, tibi pepererunt. Ac mihi vehementer gratulor, quod
ita contigerit, vt cum tali homine, id est fama & rebus in arte
Medicinæ præclarè gestis eximio, mihi fuerit cōmunicandum.
Si qua occasio nos Melodunum euocauerit, tunc abundè iu-
cunda tui præsentia satis nobis fiet. Cæterum istis literis D. Ali-
bosij Medici clariss. consilium aperuisti. Tanti verò illud fecisti
vt, quæ tua est humanitas, nephas esse duxeris, vel tantillum ab
eo dissentire. Nec committam quin omnia à me probentur.
Cum enim nostris nitantur legibus, plurimum opis sunt allatura.
Vt ne tamen officio meo desim, ac prægnantis ipsius expecta-
tioni, non nihil ad consilium vestrum adiiciam. Et si vereor ne
potius meo deesse videar officio, si hoc mihi arrogarim, vt no-
uo cogitando auxilio à vobis aliquid desiderem. Absit enim.
Ac arrogans, (ne dicam dissolutus) essem, si hac in me indul-
gentia, inani veluti gloriolæ vento merapi sinerem. Immo id
facio vt vestri consilij momenta & indagasse, & approbasse vi-
dear. Itaque omnis vestri cōsiliij ratio in hoc vertitur vt & fœ-
tus & fœtæ incolumitati seruiatur. In idque studiosius incum-

bendum, quò luctuosius fuerit tam illustrem virum dulci sobole, id est, tanquam altero se; & superflite vitæ pignore priuari. Ternos, vt audio, liberos vnus annus sustulit. Hoc temperamentum à vobis est adhibitum, vt dum matris salus procuratur, foetui ipsi consularur. Alioqui paulò vehementiore auxilio elideretur. Quod tam lubrica liberorum sit sanitas id fortassis *ἡ μήτηρ, ἡ μήτηρ*. Nec solum mater est accusanda. Vt restamen nunc sunt, huius demum ratio est habenda. Creditum fuit blando solum medicamento grauiditati auxiliū ac securitatem queri posse. Sed noua res noui consilij autor extitit. Pustulae in lingua, serpigines, & exanthemata certum *συμψύκτος* signum praeferebant. Narrat Hippoc. Cuidam grauidæ exanthemata in tibia erupisse; deinde in manu dextra: Cuius rei causa varia esse potest. Vel enim foetus imbecillitas significatur, alimentum satis non attrahentis: vel iccoris vitium notatur cuius soboles est tale exanthema. Aut quemadmodum pica, malacia, & id genus tædia imprægnationem comitatur, ita & pustulae supprefforum mensium comites esse possunt. Accedit temporis ratio. Nam Austrina tempestas quæ præcessit feri mali parēs est, quàm excipit pustularum, pruriginis, & mille aliarum molestiarum foetura. Vestrum est pro ratione causæ remedium præscripsisse. De quo si fusius dicerem, magistros artis non sine leuitatis suspitione docere viderer. Tandem è re videtur esse si eius quod præcessit, & quod praesens est, ratio habeatur. Nunc grauiditas est, in qua gerendi & nutriendi foetus opportunitas quaerenda est. Si humorum prauitati ipsius matris suum remedium decernitur, succo alimentoque legitimo foetus fruetur. Hinc abortionis occasio tolletur. At hinc etiam videndum ne matris corpus agitetur, id quod foetum saepe excutit. Praecessit peculiaris affectio ipsius grauidæ. *Ρευματισμός* enim vteri est illi molestus. Is acetabula mucro oblinat, facitque vt vtero præter rationem irriguo lubricus deciduusque sit foetus. At id nunc curare non licet. Satis est animaduertisse, vt maiore cum cautione singula administrentur. Hæc cum ita sint conferre videretur sacculus collo appensus ex karabe, lapide magnetis & aquilæ, additis foliis myrthi, Croco & nuce moschata. Grana Kermes ex oui luteo magno profectu ieiunæ exhiberentur, vel grana aliquot ambre eodem modo assumpta. Tabellarum frequens vsus esto, vel puluis moderatè exiccans & corroborans.

288 CONSILIORVM MEDICINALIVM

erit vtilis. Ita enim ista proluuius ꝑ̄ causa effœmationem quandam & vtero, & rei in eo contentę afferens, prohibebitur. Iuseulorum & rerum liquidarum copiosior vsus interdicitur. Mallem in vsu rhei barbarici, & santalorum loco cinnamomi consistere, quàm corrigendę cacochymię studio paulo vehementioribus vtinon sine elisionis fœtus metu. Phlebotomiam prudentia vestra & *airo-sia* decernet. Hęc ego cõlibentius scripsi, quò mihi dulcior est hæc cõmunicandi fortẽ oblata occasio. Ac velim scias, Sayuæ doct. diu satis me ancipiti animo fuisse, num hoc commentariolo paululũm luderem, an verò sine ampliore scriptione vestro consilio subscriberem. Illud hominis est candorem tuũ qui me ad scribendum prouocauit, probantis, hoc inhumanum & illiberale foret. Tandem in animum venit viros probos & literatos boni omnia consilere, si modo ab animo beneuolo & candido profecta videantur. Qui menorunt, ita iudicabunt. Etiam atque etiam vale. Et si quæ se offeret occasio ad nos scribe. Lutetię Parisiorum decimo Cal. Aprilis anno 1581.

CONSILIUM XLIII.

*De Polypo, Ad Carnutum Gerbautium Pontissar.
Medicum.*

Similitudines bonis & eruditis Medicis sæpẽ imponunt. Nẽdum nobis qui nec vsu, nec doctrinẽ ad priscos medendi Magistros accedimus. In explicando affectu qui extremas nares piæ & honestæ virginis occupat, non multũ es sedulus & accuratus. Fortẽ enim polypus non est: nectam diro hoste naris obsidetur. Aliud est Polypus, aliud *πικραμα*, aliud ozæna. Aliud morum quod & intimas nares & palpebras sæpẽ deturpat. Itaque ne eludat similitudo, symptomata verẽ sunt explicanda quibus tanquam signis affectus ab alio dignoscatur. Alioquin opera luditur, & perperam remedia administrantur. Itaque hoc desiderarem, quando in curam tam pertinacis, & obstinati affectus incumbimus, vt quibus signis adductus de

Po-

Polypo certior esses, ea nobis aperires. Decernere enim remedia morbo nondum patefacto, est scopum oculis clausis ferire velle. Subolfacio quidem aliquid malignum & latens: præterea iam inductam diathesin in partem & mittentem & recipientem. Vertigo enim molesta quæ reuiuiscit, iam cerebrum, ^{ad p. 14} malè habere, id nobis insinuat. Et malum per singulas hyemes renascens, & fontis perennitatem, & partis imbecillitatem significat. Vnde noxa esset singularis conari omnino elidere & tollere illud malum quod in nares sæuire solet. Est enim exoneratio naturæ in eam partem. Vnde non raro, aut suppressa nasi hæmorrhøis, aut vlcus percuratum vertigines, dolores capitis, aut his deteriorem maniam intulit. Itaque est ubi malum alere tutum sit, est ubi omnino elidere oporteat. Cautio hic summa adhibenda est: Vidi mulierem cui serpigo fœda manum sinistram occupabat. Hæc concepit. A conceptu manui suus nitor, exulante ista serpigine, est restitutus. Translatus est ichor malignus antiquus mali fautor ad partes vterinas: fœtus abortu quarto mense exclusus est velut tabo infectus ac sideratus. Narrat Hippocr. de quodam Atheniensi. Huic erat cutis p̄fora scabrior & exarata: vsu aquarum naturalium eo affectu liberatus est, sed Hydropicus factus suum diem obiuit. Adeo cautos & meditados esse oportet in externis affectibus curandis, quos tutius est sæpè alere quam omnino extirpare ac euincere. Velim nobis significes an decocto aliquo sudorifico vsa fuerit. Excutias formulas remediorum, & à Medicis, & à Chirurgis institutorum, vt ne identidem cum fastidio eadem vsurpemus. Significa illi per hæc meas literas tanquam beneuolentiæ, & officij obsides, me aliquid meditari velle, quod in eius commodum cedat. Quanquam post tot doctorum consilium quid ego aliquantò inferior meditor? Sed fortè me audiuisse non erit omnino pœnitendum. Nil certi statuo, donec id quod desidero nobis per te fecerit magis apertum ac explicatum. Interea vale. Lutetiæ 25. Aprilis, Anno 1581.

CONSILIVM XLIV.

De febre continua, cum grauibz symptomatis.

PHILIPPVS CASTALIO febricitacoe cepit, sumpto medicamento auctior facta febris, lingua aspera, & rigida. Frequens mictio, sed pauca. Assiduitas febris. Ardor vrinae. Credebatur natura velle omnia excrementa in vias vrinarias deponere. Immo & latens phlogosis in partibus ad vrinam pertinentibus, praesertim circum vesicam in suspicionem venerat. Per viginti dies penè exhibat vrina innumeris vicibus, sed pauca quantitate vna vice reddebatur. Diabetae metus erat maximus. Siccissima lingua. Corpus foris quidem satis temperatū percipiebatur, sed internum erat incendium. Ad renes sitibundos, & quandam *διήκον*, illud effluuium vrinae referebamus. Tamen vix constabat de sede & causa. Virium erat magna infirmitas, desperatio aliqua vitae & salutis.

Primo quoque tempore abundè sanguis detractus est, & penè eo modo iugulata est febris. Saltem ei sua vis & impetus detractus est vt quæ febris *ὑπὸν*, fortè fuisset habitura, solutionem tantum habuerit.

Vsus cassiae frequens fuit ob suum squalorem & corporis internisiccitatem. Catholicon cum folliculis profuit, frequentissimus vsus iusculorum ex carnibus vitulinis & pullis. Vsus cardiacorum, & frequens vsus rasurae vnicornis.

Paratus sacculus ex rosa, rad. iridis florent. santal. ligno aloës, floribus nymphaeae & cardiacis, exceptus aq. nenuphar. & rosarum.

Item extracta est pauca mucago ex semine psyllij, & gummi tragacanth. in aq. rosar. & nenuph. addito pauco succo citrij.

Iniectio succi amygd. dulcium cum aq. parietariae. Emulsionis loco apozematon. Hordeata. Litus frequens ex rosaceo Mesuati. Ad pubem vsus oxyrrhodini.

CONSILIVM XLV.

*Pro Angenosij Consulis filio tumorem in vtrâque
mamma habente.*

IN Mamma, præsertim sinistra tumor est & durties, mox maior, mox minor, aliquâdo firmior: dolor digitorum appressu.

De hoc tumore, quid sit quæritur, vnde sit, an vitium cuticum, an aliunde vt cutis tantum & mamma sit depositaria: vnde, an à liene, an à corde, an alio viscere, an ratione ætatis (id est) ob consensum partium genitalium & thoracis: Si aliunde est, & ratione ætatis euenit, cur non potius *ἀρρομή*, contingit ad nares, vt hæmorrhagicus fiat.

Primum tumor hic est morbus in solutione continui, & symptoma tactus dici potest, quia id quod tactui æquale apparere debet, tumens & inæquale percipitur.

Dolor aut à tensione, aut ab acrimonia contingit, & symptoma tactus est.

Tumor non ita perseuerans, sed sinistra mamma tumentior est, dextra minùs, & à sinistra parte videtur id accipere, vel mamarum diadoche est, vel per apothefin, vel per metastasin id contingit. Si diadoche, vel dolore, vel externa causa, vel ratione communicationis aliarum partium, vt pote generalium. *6. Epid.* Est enim *καταρσία γυνῆς, καὶ ανδρῶς*. Id quod testatur Galen. passim disputans *πεὶ τὸ τελευτεῖν*, in maribus. *πρὸς τὸν* in testibus marium. Et quo tempore tument lasciuuntque testes, vox grauior fit, marmæ turgent: in virgunculis *σπερματῶν*, sororiare dicuntur, in maribus *καταρσία*, fratrare, seu fatriare: vnde obseruatum lac in mammis masculis, materia per venas mammarias translata. Aliquando per thoracicas, vnde circum alas materia quædam lactea in quibusdam est deprehensa.

Si apothefis est aut apostasis, cur ita euenierit, videndum. Iustrandæ sunt enim singula partes ex quibus id dependere poterit. Videndus quis color corporis, quis character faciei, quæ symptomata, qui dolores. At spiritus fœtor, dentium prauus

O o ij

292 CONSILIORVM MEDICINALIVM

color, labiorum liuor quidam & defœdatio, corporis color ad iæterum quendam nigellulum tendēs, palpitationes cordis quæ sæpè sunt molestæ, aut lienis, aut mesenterij, aut vtriusque affectionem significant. Hæc in fœdis coloribus sunt solennia symptomata.

Itaque splenicus esse videtur. Splen autem etsi pars in corpore non est principalis, tamen magnum ad salutem momentum habet. Olim dictus est corporis fiscus, idque non inconcinne. Et Hippoc. lib. de locis in homine: Quibus lien efflorescit, iis corpus attenuatur. Id quod tanquam signum, & tanquam causa malum est. Tanquam signum, quoniam significat prouentum succi melancholici. Tanquam causa bifariam, tum quia extenuat corpus, tum quia iste affluxus succi melancholici obstruendo vias lienares, febres lentas, & id genus symptomata inducit. Id abundè explicauimus in nostro libro de morbis mulierum.

Cæterum: fiscus corporis lien dicitur, quod detrahit toti corpori, quod in sua commoda conferat.

Porrò dubitabatur an tumor iste mammarū ad puberes annos referri deberet, vt pro hæmorrhagia quæ istis annis cōuenit, in māmā tumor sit tāquam succedaneus. Nec abs re dubitatū est.

Item num vitium esset mammæ, aut ob iæctum, aut ob aliquid simile. Item an ob pinguedinem in panniculo carnofo id fieret, vnde mares, *ut vultus mares* dicuntur.

Si abscessus iste tumor rationem subit; Cur non deorsum fit, tum quia de natura est melancholica, tum quia ea est conditio abscessuum, vt tum meliores existant, cum ad partes fiunt inferiores. Si spectetur ætas, sursum abscessus fieri debet. Nam ad part. 21. lib. 1. Epid. Tumores ad aures contigerunt cum tamen materia esset frigidiuscula. Sed iuuenibus tantum & athleticis id contigit. Quoniam & ætas, & exercitatio tantum potuit, vt humorem alioqui ignauum, & deorsum natum ferri sursum rapuerit.

De abscessibus locus hic valde commemorabilis: abscessus, aut per venas, aut ossa, aut neruos, aut cutem, aut alias emotiones. Boni sunt qui infra morbum fiunt vt varices; lumborum grauitates ex supernis. Optimi potissimum sunt inferni, & longissimè infra ventrem, & remotissimi à morbo: & qui per efflu-

Sect. 1.
lib. 2.
Epid.

xionem fiunt, Græcè *κατ' ἐκρυ*, vt sanguis ē naribus, pus ex aure, sputum, vrina quæ *κατ' ἐκρυ* fiunt: Abscessus est, supramorbū esse videtur, ideo illaudabilis. Si impetus factus est naturalibus ipsis (vt verbo Pliniano vtar) ad mammas, quis consensus pectori cum naturalibus? Multis locis iste consensus à Galeno explicatur. Et ita Hippocrates. Neque tusses diurnæ², quoniam vbi testis intumuit cessant. Et testis tumor à tussi cessat & alleuatur. Quæ res commonefacit nos communionis pectorum, mammarum, genituræ, vocis. Id quod Galen. suffurans hæc ipsa verba, declarauit lib. 6. Epidem.

*sect. 1.
lib. 2.
Epid.*

Tandem cōclusum fuit id quicquid est partim ab ipsis visceribus, & forte etiam à motu isto, & inclinatione naturali humorum à partibus genitalibus ad mammas & pectus.

*Ad
part. 41.
sect. 3.
Et ad
part. 12.
sect. 1.
lib. 1.
Epid.*

Adductum illud. Vbi fauces ægrotāt, &c. Nimirū quoniam magni est momenti scire an vitium sit cutaneum, an verò scaturigo sit interna. Vnde extat histor. apud Hippoc. de quodam qui cum impetigine laboraret hausit aquas *αυτοθαλάσας*. A morbo liberatus Hydropicus factus interiit: Sic mutauit speciē morbi, sed non vitauit periculum.

Quamobrem cum ex palpitatione qua is aliquando affligitur, colore corporis malo, labiorum quodam liuore (qui comes est & conspectaneus malæ affecti splenis) constet id quicquid est malī à visceribus esse (quanquam & naturalem istum motum & inclinationem à partibus genitalibus ad thoracicas non negamus) in curam istarum partium visceralium, vt sic loquar, incumbendum esse videtur. Itaque singulis septimanis decoctum folicul. ex vsu esse videbitur cum floribus Calend. bugl. viol. & polypodio paratum. Addi potest, & ceterac. & scolopend. Syrup. Regis Saboris, cum foliculis cum granis kermes. In aqua, qua vtetur madebunt folia bugl. borag. aut bipinell. Frustra pomi de curtis pend. cortex tamaricis. Conserua bugl. borag. florum aurentiorum in vsu erit. Decoctum Galli veteris, cum buglos. borag. melissa. Anisum conditum, coriandrum conditum. Frictiones. Ouum eum seta in Kermes tincta.

Fotus ad lienem ex foliis lauri, absinth. scolopend. ros. spica nardi, santalis, cortice capparum, semine basiliconis & lini. Item litus ex medulla ceruina descriptus in praxi Hollerij.

294 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Parti tumenti hic fatus adhibitus:

℞. Radicis enul. camp. ℥j. rad. althea. ℥. s. foliorum calend. scabiosa, fumar. absinth. vulgaris, chamæpitys. an. p. j. florum genist. p. s. seminis lini. ℥j. seminis anisi, fœnicul. althea. an. ℥j. coque in oxymelite pro fœtu cum spongia.

Demum ad oppugnationem externi mali, fons internus est exhauriendus, & visceribus ipsis sua prima vis & vigor restituendus.

Ad id facit optima vitæ lex. Nec tamen seuerioribus legibus ætas adolefcentis est addicunda, obliganda.

Vitæ lex in cibo, potu, corporis exercitatione, animi studio, ac instituto vitæ consideratur.

In horum mediocritate, & morum & humorum ratio ac moderatio consistit.

Medicæ leges ad custodiam sanitatis prandium liberalius, frugaliorem cœnam indicunt.

Simplicior & melior cibus, sæpè non gravior, vsuuenito, & tantum capiatur, quantum sustentandis viribus, non obruendis videatur.

Vini & æque æqualis mixtio. Album in vsu aliquando esto: si grauitatem capiti afferat, interdicator.

Aquæ vsus liberalior, vt obstructionis & corruptionis viscerum parens deuitator.

Nec deliciarum suarum patrociniū, tanquam ipsius necessitatis, afferre oportet.

Si molestior sitis, non tam illius sedandæ quam leniendæ, aut fallendæ cura esto.

Corporis exercitatio, frictio deorsum, agitatio, cursus, lucta, ludus pilæ conferre creduntur.

Sed hæc statim à cibo, aut pertinaciore studio interdiciuntur.

Qui crudus ludit aut exercetur, cruditati fomitem suggerere creditor.

Vt cruditas, ita & inedia vitanda. Illa obruit spiritus, hæc exhaurit, consumit & impensè calfacit.

Ita ludere oportet, vt ludus nos non ludat.

Vt in cibo & potu moderatos esse oportet, ita in excolendo animo, & studiis prosequendis moderatio adhibeatur.

Animi relaxatio & remissio non languor & exolutio consiliator. Illis inualefcit ac roboratur, his emoritur ac elanguescit.

Dare se vitæ iocunditati pars sanitatis iudicator.

Omnia denique quoad licet, & fieri potest, mediocria adhibentor.

His modis, cum De o, prima sanitas restituetur, morbus ipse elidetur, qui plus ipsa fronte præ se fert metus, quam in recessu, mali. Idibus Quintilibus anno 1581.

ANNOTATIONES.

1. *Aphrodisæus probl. 95. lib. 1. explicat de spadonibus, mulieribus & pueris cur acutam vocem edant.*
2. *Hac vox, neque, pendet ex superioribus, ut non legas: Neque cessant. Contra enim rem habere sensus declarat.*
3. *Actius (ait) si post sum olerum quis aquam bibat capitis vlcuscula, scabies, lepræ, pustula, impetigines, & deteriora his erumpunt.*

CONSILIVM XLVI.

De Tumore inguinis. Pro D. Crozonio.

A Bundè hoc libro, & aliis locis diximus de consensu partium thoracicarum cum genitalibus. Et extrema hac historia de tumore ad mammam orto disputantes. Quod dictum volumus ne ad nauseam vsque & fastidium hoc repetatur. Ille de quo in ipso titulo dictum est querebatur de tumore paulò infra inguen oborto, & ad natem propinquam. Dolorificus erat, diuturnus, digitis cedens quidem aliquatenus, sed eorum non manebant pressa vestigia ut in phymatis phlegmaticis. Aliis visum est esse in ipsa præsertim nate meliceres, sed argumenta, & signa eius non relucebant.

Adducta sunt in deliberatione ea quæ & paulo supra de tumore. Præterea cum ille diutissima quadam tussi molestaretur, inde arrepta occasio fuit inquirendi in principium & fontem mali. Dictum enim est tussiculosos nonnunquam abscessu ad scrotum oborto capi ac detineri, id quod huic contigit. Et quæ materias & obsedit scrotum, & obsessum tenere potuit, maiore sui parte abscessit in inguem & propinquas contiguasque

296 CONSILIORVM MEDICINALIVM

partes. Et cum natura esset melancholicus, tumores isti ad varicosos potius accedebant, & nonnihil de natura lupiarum retinebant. Magna verò posita est vis in diuturnitate ista tussis, & natura temperamentóque ipsius ægri. Adductus est locus ex Epid. huc maximè pertinens: Nec repugnat rationi, ut tussis diuturnæ cessent, quoniam testis intumuit: Et testis tumor à tussi cessat ac alleuatur. Quod mirum esse debet. Et eodem loco; Indicationes fiunt ad testes quandoque ex tussi, & testes ipsi laborant à seipsis. Id quod lib. 1. meorum Epid. multis locis celebrius reddidi. Quemadmodum autem id fiat non est huius otij atque loci.

Sist. 1.
lib. 2.
Epid.

Posita hac tumoris natura, nutriendum potius malum, leniendúque potius dolor, quàm omnino elidendum ac euincendum.

Habendam rationem antiquæ tussis duximus: Corpori sua euexia, & euexia restituenda, si fieri potest.

℞. Rad. enul. camp. & altheæ. an. ℥j. rad. bryon. ℥s. absinth. vulg. major. mercur. violar. an. m. j. chamæd. chamæpyt. foliorum lauri; summitatum anethi. florum chamæm. an. m. j. truncorum caulium, & corticum fabar. an. p. j. semin. lini. ℥i. s. seminis altheæ ℥j. fiant duo sacculi. bulliant in aq. & vino albo: additis ℥j. aceti opti. fiat fotus cum spongiis.

℞. Mucag. seminis lini, sænig. rad. altheæ extract. in vino albo. an. ℥j. succi caul. rubrorum, ℥6. axung. an. s. gallinæ. an. ℥6. gummi ammoniaci, bdellij in aq. vite soluti. an. ℥j. castor. ℥s. pula. ircos. ℥s. fiat unctio pro parte.

℞. Caricas n. 15. coque in sapa, adde farina lini lolij, & lupinorum. an. ℥s. terebinth. ℥ij. fiat cataplasma.

Applicetur post usum istorum remediorum lamina plumbi mercurio uncta.

Item Emplastrum de Cerussa, cum mercurio.

Et quoniam caloris sensus erat, & dolor non mediocris, ne usu istorum maiusculorum remediorum aggrauesceret morbus, ad hæc leuiora itum est.

Litus ex mucagine seminis psyllij, & lini cum aq. solatri, & plantag. Sacculi ex contemperantibus. Vnguentum diapompholigos. Balneum. Lac asinæ. Aliquando ad partem litus ex populeone. Fotus ex herbis coctis in oxycrato, aut oxymelite. Cataplasma ex farina hordei coct. in iisdem.

Tan-

Tandem cum dolores multos sustinuisset, & ad diætam à Chirurgis malè reuocatus esset, temporis successu tumor qui summam natem occupabat in suppuratum versus est. Pus in profundissimo delitebat. Excreta tanta copia, vt omnem fidem & opinionem superaret. Tandem extabuit. Mortuus est. Pulmo inuentus est putris è regione ipsius mali.

CONSILIVM XLVII.

Pro Anglo Arthritico.

DOlor qui nobilem virum Anglum afficit, à fluxione pendere censetur. Occupat hic articulum, paulò se magis diffundit pro humoris quantitate. Fluxio etsi ab humore est, à partibus amandato, non tamen omnis dolorifica est. Quæ enim aut distendit partem materia, aut acrimoniam molestamve qualitatem habet, ea doloris in parte parens existit. Quanquam sine fluxione dolor excitari potest, vt cum pars imbecilla, aut malè affecta alimentum malè conficit, & à congestionem dolendi nascitur occasio. Articuli porrò dolent iis qui faba & orobo 6. Epid. vescuntur, in siccitatibus summis dolor ad articulos pertinet, in febribus laboriosis & lassitudine vlcerosa, non tamè id quicquid est arthritidis nomen demeretur. Quanquam & doloris par molestia, & æquæ sæua symptomata ac in arthritide gliscunt & apparent. Sed cum erroneo & vagabundo modo modo hic, modò ille articulus infestatur, cum aliquando certis tēporibus, cum incertis, tum ea fluxio arthriticam naturam & ingenium respicit atque induit. Maximè enim vis eius in impetu ipso & instabilitate cernitur. Porrò aliud est articulos verè laceffi, aliud impropriè ac leuiter tantum. In arthritide enim verè dicitur articulus occupari; articuli que nomine, non solū caput ossis quod inferitur, aut alteri⁹ ossis cotyle intelligitur, sed & ligamēta & tendines, & quidquid ad articuli firmitatē structuramque pertinet; ligamēta autē cum duorum sint generū, quæ à media ossis parte ducuntur, ea sensu vacant, quæ ab ipso perioestio, exquisitè sentiunt. Hinc doloris immanitas & sæuitia. His ita se habentibus cum & motu, & periodo, & doloris specie, & inuasionis modo morbus hic ægrū opprimat, de fluxione arthritica

Tomus II.

Pp

298 CONSILIORVM MEDICINALIVM

statuere non dubitandū. Vnde verò malum? an gentilitium, an patrum, an vitio ipsius peculiari corporis contigerit, non ita facile decernitur. Tamen quo statu res sunt cum magna sit in corpore ad morbum istum propensio, tum propter partium recipientium imbecillitatem, tum ob peculiarem vernaculamq; feri maligni naturæ gratiam vix recipientis generationem, vt ne morbus inualescat, videndum.

Occurrendum porrò in paroxysmis ipsis, qui acerbitate doloris ægrum domi morantur, occurrendum generationi istius humoris, exclusioni, partiumque imbecillitati. Videndum quoque ne quid in cura ipsa peccetur. Nam morbi sæuitia sæpè ad varia & ancipitia remedia recurrere cogit. At quæ vel sine methodo auxilia adhibentur, vel quæ passim ab arte Chymica (quæ imposturæ plena nullius non morbi curationem proficitur) vel ab Empiricis repetuntur, ea sæpè malum immedicabile reddiderunt, sæpè multos è medio sustulerunt. Hinc tophacea in articulis congeries, hinc eorum distortio, hinc marcor, hinc tabes, hinc denique cum dolorum iliade mors luctuosa. At præstat cum aliquo eoque leui dolore & tolerabili molestia, remedia ab arte & ratione instituta tutò vsurpare, quæ vana spe carendi omni dolore, à casu, à fortuna ignorantiaque profecta experiri, & in apertam vitæ perniciem incurrere.

In hoc præsertim morbo vitæ lex & ratio fanciatur. Et illud præclare dictum Galeni ob oculos obuersari debet quod scriptum in Aphor.²

Vini vsus aut nullus, aut exiguus esto.

Ceruisia simplex, aut decoctum glycyrrhizæ, locum vini habeto.

Vsus veneris præ cæteris moderatus esto.

Inedia longaque cibi abstinentia deuitator.

Potionum multo saccharo & cinnam. conditarum vsus rarus sit.

Cruditas ex copia & varietate ciborum nasci solita vitator.

Somnus meridianus & statim à cibo.

Labor vt immodicus corpus tabefacit, ignauia exoluit, ita moderatus labor articulos roborare cõditor.

Elixirs carnibus sine multis iusculis, item assis locus esto.

Non tamen planè iusculorum vsu interdiciamus.

Prandium liberalius, cœna parcior laudator.

Porro semel aut bis anno vena brachij dextri aperiunda, præfertim Vere & Autumno. Non tamen omnino id singulis annis vsurpandum nisi morbus sæuiat & inualeſcat. Syrupus erit paratus, quo semel mense vtetur. Tamen Hyeme pilulis locus erit, Ætate cassia vsurpabitur.

Placet decoctum sarſepariliæ, aut radicis chynæ, non ad magnam prouocationem sudorum. A ligno sancto abstinendum.

Pyrotica ad musculum deltoïdem brachiis applicabuntur. Formulæ remediorum ad articulos firmâdos repetentur ex superioribus.

Masticatoria & errhina aliquando conueniunt.

Vfus lactis asinæ, aut caprarum.

Et quoniam in neruis mucosus est humor, is est siccandus prudenter & digerendus.

ANNOTATIONES.

1. Vnde illud Sereni.

--- si articulos tabes inimica per omnes.

Hæserit.

2. Ita Celsus, Quibus articularum dolor certis temporibus reuertitur, hos ante & curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, &c. Cum ex morbo conualeſcit, leuiter manibus unctis corpus permulcendum. Delectationis causa ambulandum, circumsisa omni negotiosa cogitatione. Paulatim verò debet omiſſis his legibus, eò transire, vt arbitrio suo viuat.

CONSILIVM XLVIII.

De cerebri imbecillitate. Pro Consule Tholosano.

INter partes cæteras cerebrum mihi malè affectum videtur. Hoc afficitur vel per se, vel per consensum aliarum partium. Per se cum affectionis causam in se continet. Et tunc malum est contumacius & diuturnius.

Per consensum aliarum partium subiectarum, & causa fixa nec est, nec affectio ita firma.

¶ P p ij

300 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Initio scire an per se pars laboret an non, hîc opus, hîc labor, successu temporis facîle innotescit.

Sed euenit vt si viscera intemperanter affecta sint, si cerebrum imbecillius redditum siue ab externis causis, præsertim à studio pertinaciore, siue ab internis, ea sit conspiratio & consensus earum partium, vt vtræque accusandæ sint, nec minùs harum quàm illarum ratio habeatur.

Ac quod cerebrum vitium & imbecillitatem contraxerit, multis colligi potest argumentis: Item quòd intemperies viscerum subfit, sanguine potè acriusculo genito: vt & internarum causarum & externarum vis apparuerit.

Quæcunque pars vel ab internis causis, vel ab externis, vel ab ipsis naturæ principiis tanquam ab incunabilis imbecillitatē contraxit, ea facîle à quacunque paulò vehementiore causa afficitur, aliarum excrementa promptè recipit, immo ipsa per se minùs belle suum facit officium, non benè coquit. Hinc cruditas, hinc excrementorum prouentus, hinc maligna qualitas surgit. Vnde dolor, & dolendî promptitudo, vnde partis sepè quidam marcor.

Obstinata & pertinacia studia, lucubrationes, nocturnæque animi contentiones facîlè læserunt ac offenderunt. Nam spirituum dissipatio, consumptio & depastio consequitur, partiumque solidarum ægrè reparabile vitium & labes. Vt enim moderatus animi cultus & contentio modica cerebrum conseruat, ita immodicus labor idem extenuat, debilitat & exoluit, ac si quandam *ἡγρεσιαν* induceret.

Sanitatis hæc pars esto vt & cerebri, & totius corporis ratio habeatur.

Cerebri vt laborantis, corporis vt malum fouentis. Quamquam & externas causas impendiò magis affecisse iam planè constat.

Iraque ne quid tale deinceps contingat, animi exercitia moderata sunt, quæ licet iucunda & homini liberaliter educato & ingenuo necessaria, tamen ipsa dulcedine illectum animum lædunt & offendunt, & corpus ipsius animi instrumentum deterunt ac imminuunt. Hîc enim, vt & in cæteris rebus moderatio & temperamentum adhibendum est.

Cerebro aut sua vis restituenda est, aut, quæ adest, conseruanda. Qui prouentus excrementorum propria quadam infir-

LIBER SECVNDVS.

mitate successit, impediendus, hauriendus. Hic minor erit, si cerebro sua vis erit restituta.

Toti corpori consuletur, reductis ad temperamentum aliquod humoribus & intemperie viscerum aliqua ex parte emendata.

Corpus non videtur frequētibus & validis medicamentis fatigandum: nam & humorum obagitatio fiet, quorum quies, sedatio & silentium pluris sapē est faciundum. Præterea exhaustis à medicamento spiritibus, maior infirmitas conciliabitur.

Sanguis detrahendus non est, nisi aut eius redundantis signa affuerint, aut dolor aliquis vehemens, detrahendi necessitatem inducat.

Conseruarum Cephalicarum non calidarum frequens vsus esto.

Balnea aquarum dulcium consuluntur.

Contineantur ore quæ saliuam benignè eliciant.

Errhinis maxima cum cautione est vtendum.

Fugienda omnia quæ grauem spirant odorem, immo quæ suauem, nam hinc capitis repletio, hinc grauitas.

Vinum non bibatur nisi aut multo cibo præsumpto, aut iusculo præhausto.

CONSILIVM XLIX.

*De Symptomatis Hystericis, Hypochondriacis,
& Catarrhoicis. Ad Dominum Burgensem
Xantonum Medicum.*

NÆ egregiè candidus es, hocque temperamentum modestiæ tuæ indixisti, vt cum multa noris, aliqua didicisse non pigeat. Leue ingenium cum nil habeat, nil sibi detrahit. Egregium verò, ingens, & magnarum rerum habens fiduciam, præclaræ indolis edit argumentum, cum etiam in rebus perspicuis aliorum iudicium requirit.

Non quin rem benè norit, sed vt dubitando sum studium, &

302 CONSILIORVM MEDICINALIVM

plura discendi occultet desiderium, & occultando aperiat. Ea tamen res te eo fortè non adduxit. Nam partim rei difficultas, partim humanitas, & de ægra merendi desiderium te ad opem implorandam excitauit: humanitas quidè, quod nil sit prius in morbis obstinatis & melancholicis (quorum nomen omen quoddam sinistrum prætendit) quam ea quærere quæ morbi molestias eleuare; & querelas in iis morbis percrebras demulcere possint. Et licet malo ars victa fuerit, morbi que diuturnitas eam eluserit, tamen ab omni remedio temperare maligni & desperantis hominis est. Solæque desperatio pro omni superest solatio. Non artis vitium est si morbus incuratus manet, sed accusanda morbi pertinacia. Medicus se artis tuetur patrocinio: Et cum ad experimentum vsque proceditur, difficultas saltem morbi compescitur. Quanquam illud Aëtij commemorabile. Multi melancholici tum cum curarentur, partem præsidij ab arte perceperunt. Dimissa curatione sunt restituti: Naturâ ante curationem prævalente contra morbos ex medicatione imbecillos redditos. Quæ natura cum curatione affligitur, in quiete resurgit, & superat morbos aliquantum imminutos.

Nunc ad institutum veniamus.

Non tam de morbo, quam de Symptomatis inquiritur. Symptomata sunt non *ὁμοειδή*, nec *ὁμογενή*, sed à diuersis oriunda fontibus. Et cum causa sit fixa, symptomaton perpetua sit propagatio. Contra euenit in iis quorû causa fugax leuiterque pressa.

Non tam in humorum quantitate quam molesta qualitate causa consistit quam diathesis quædam fouet. Hæc longarum obstinatarumque affectionum & omnem Medicorum solertiâ superantium autor est & alumna. Hæc cum adest, non tam de euincendis morbis, quam de nutriendis laboratur. Huius quidem vestigia nouimus & effectus, sed ea obtutum oculorum effugit, quin & vix ab animo comprehendî potest. Hanc veteres adumbrarunt, hanc prosecuti sunt, sed non assecuti. De hac apud te plenius dicere, Magistrum artis docere velle est, & tantum quantum hic operis fiat, pœnitebit.

Symptomata partim sunt Hysterica, partim Hypochondriaca, partim Catarrhoica. Cum ex his quædam sunt propria, plura sunt communia, vt quò sunt referenda, ignoretur. Delinquentes, vertigines, oppressiones, dolores pectoris pleuritici, millæque alia tædia, & hypochondriaca sunt, &

malè euntibus mensibus apparere possunt. Possunt & suppressi feminis esse soboles. Possunt & eam affectionem sequi quæ ab Hippocrate atrabilis in vtero, dicitur. Cum scilicet in venis vteri reses est sanguis fæculentus, & tabum quoddam quod ab Hippocrate *αἷμα δὲ* vocatur, nomine ab oculorum affectionibus ad collectionē in vtero aptè translato; vnde obseruatū est apud nos extitisse mulieres quarū in vtero sanguis atrabilarius colligeretur, quæ perpetuis doloribus sunt diuexatæ. Tandē tumor *αἰσχροδὴς* miraculò ad lumbos erumpens, vt cōquerēdi, ita dolendi finem attulit. Idem contigit sæpè & Hypochondriacis.

Ergo diligenter incumbendum in inuestigationem primæ & dolorum causæ & foci. Similitudo sæpè peritissimis imponit. Aliter providendum si sit aliquid Hystericum, aliter si Hypochondriacum, aliter si promiscuum. Nam & ista deliquia (idem de cæteris sit iudicium) à paucioribus mensibus esse possunt, & à neglecto fundi cultu; possunt & Hypochondriacæ affectionis esse consecutaria. Præclarum illud Galen. in illud Hippoc. Lumbis dolentibus cardialgiæ accedentes, signa eruptionis sanguinis puto: Copia (ait Galen.) in venis acervata tenue quoddam serum in ventrem confluens cardialgias parit in os ipsius ascendens: portio autem abundantia ad inferiora deurgens, lumborum dolores excitat.

Cæterum licet Hypochondriaci de ipso conquerantur ventriculo, id per sympathiam sit viscerum, & Hypochondriorum vicinorum. Et in his chylus non modo adurit, sed corrumpitur ab externo calore, & propria putredinis specie terrificata symptomata edere consuevit. Recurrere ad solam intemperiem more vulgi, id minus cum Hippocrate cohæret, qui in veteribus reprehendit, quòd in morborum causis assignandis, primis qualitatibus nimium tribuissent. Nam ea intemperies facile corrigeretur, immo senectus temperamentum adhibens, remedio foret, vt de hemicraniis à causa calida obortis censet Galen. quas ipsa senectute sedari putauit.

Ergo abstrusior causa est & diathesis quæ in humores virulentam vim inducit.

Catarrhoica symptomata testatur brachij affectio paralyseos æmula, & destillatio in thoracem dolorem excitans, aut verè pleuriticum, aut pleuritim mentientem. Quanquam quotidie obseruamus harum partium dolores nō tam à distillatione pendere, quam à maligno melancholicòque flatu à visceribus sur-

Cur Hypochondriaci dorsum & pectus dolent.

304 CONSILIORVM MEDICINALIVM

gente: Testantur dolores omoplatarum Hypochondriacis familiarēs, & virginibus; quarum faciem fœdus deturpat color. & in his nō tam laxare venam quam ventrem conuenit, & flatui exitum dare. Immo à flatibus ipsis melancholia flatuosa & nomen & omen inuenit. Hanc flatuum copiam & imbecillitas caloris natiui & succi melancholici *χλωμης* inducit: Præsente quadam ipsorum lactium & pylori phlogosi ex Dioclis sententia quam Galen. amplexatur.

Paralyseos rudimenta à capite repetenda. Quanquā plerisq; & Hypochōdriacis & Hysteriis tormina diuturniora, in partiu quarundam paralyfin terminantur. Id quod Britonibus familiare, vt annotat Hollerius. Et est aliquid simile apud Hippoc.

Destillatio à capite in thoracem si ferina est, si tussendi inane desiderium, prudenter se gerere oportet. Laudo Galen. præceptū de distillationibus malignis. Non oportet, ait, tandiu in pulmone moram trahere donec crassescant: nec eas statim expelli necesse est. Nam in pulmone morantes non facile coquantur & eum lacerant. Si excernantur, citò molestias excitant tusses à quibus caput repletur.

Vt ad rem redeatur. Quoniam de Hyster. & Hypochondriacis facta est mentio, antequam de solenni remedio, nempe phlebotomia decernatur, vnum præmonere ab re non erit. Placet clarissimo Dureto in consilium vocato, spem salutis in frequenti phlebotomia partim è malleolo, partim è brachio consistere. Parum dissensimus. Ille suppressionis menstruæ, aut euacuationis paucioris rationem habet. Et maximè omnia ad vterū refert. Nos dispositionem Hypochondriacam maximè consideramus. Quæ sæpè aut in Hydropen siccum finitur per *μαερωδὴν περιφύην*, aut in Ascitem per caloris naturalis paupertatē, in qua si sæpius sanguis detrahatur, Hydrops accersitur, aut tumor, corporis insufflatio vulgò nuncupata. Hoc ipse videris, & singula momenta consideraris.

De Hypocaustris & sudorificis parum plausibilis ratio esse videtur, cum constet calido & sicco temperamento esse. Cum sitis assidua, intestinorū æstus significet, paulò alienior talium remediorū vsus esse videatur. Nec obest quod obicitur, pituitam abundare videri quod sæpè tussiat, & os saliuā proliciatur.

Nam ptyalismus non rarò dispositionis Hypochondriacæ est *πυρογενήσας*. Et vt concedam nescio quem succum crudum

re-

redundare, partes solidæ sunt siccæ & sudorificis magis exuccæ redduntur. Itaque paulò frigidior hæc ratio videretur.

Ad hos Canones deliberationis momenta reciderunt.

Cibus mediæ naturæ esto, qualitate humidus, substantia solidus. ⁴

Ab omnibus flatulentis abstineto.

Vinum lene, maturum multa aqua fractum, & parca manu bibito.

Ter mense purgationi operam dato ex opiata facta cum decoct. Hypochondr. foliis senæ, cassia, & passulis corinthiacis.

Detrahitor sanguis bis tēre anno, tum incisâ venâ brachij tum malleolorum. Idque iis conditionibus quæ superius dictæ sunt.

Admoueantur hynrudines ano.

Illinitor regio lumborū vnguento rosato Mesuæ frequēter.

Balnea aquæ egelidæ fumo & odore carentis salubritati corporis accommodata iudicantur. Decoctum Cephalic. additis ʒij. foliorum senæ, & agarico crudo, addendo quartam partem vini albi, ex vsu esto. Aptè id cum spongia fiet.

Ab Hypocaustis & sudorificis, nisi quæpiam res aliter suaserit, abstineto.

Hæc fortè paulò fusiùs disputata sunt, quam deceat apud artis & peritum & medendi magistrum. Sed quoniam significasti te tantopere cupere vt nos vnà communicaremus, occasionem virgere volui. Hanc non tam casus, quam ratio & consilium videtur attulisse. Puduit longa scriptio tuo otio abuti. Sed hoc laboris lubens suscepi in eo præsertim quod tibi voluptati, fore credidi, si qua vlla in re de temereri possem, tuum desiderium nouo officio facilè lenirem. Vale. 24. Augusti Anno 1582.

ANNOTATIONES.

I. *Mirum est quod melancholici perpetuò conquerantur, & medicamenta sæpè appetant. Præclarus est locus cap. ultimo, 7. Ethic. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τὸ φθόνον, αἱ δὲ δόξαι τῶν ἰατρῶν καὶ τὸ πλεονέκτημα διακρίνει διὰ τὸν κέρδιον, καὶ αἱ δὲ ἐν ὁρῇ καὶ ὁποῖον ἔστιν. Melancholici motus habent vehementes & frequentes. Ideo Arist. cap. ultimo lib. de Diuin. ex insomniis, melancholicos futura præsentire dicit; Melancholici, ait Aristoteles, ob*

Tomus II.

Qq

306 CONSILIORVM MEDICINALIVM

animi impetum vehementiorem, ut eminus iaculantes collimant, & quod facile ac citò animum mutant, id quod est consequens cernunt. Tamen paulò ante dixerat homines plebeios futura prænoscere sæpius, quod eorum mens minus sit referta curis. Si hoc verum est, melancholici minus sunt idonei ad præfagiendum. Animum enim distractum & curis plenum habent. Cicero. 1. de Divinatione locum Aristo. superiorem sugillat: Animi enim integri, ait, non vitiosi corporis est divinatio. Ideo in animis hominum qui valetudinis vitio furiant, nil divinum, nil præfagiens esse ait. Ceterum *μελαγχολία* furorem vocat.

2. Et non item pridem cum uxor Comitis de Chaulne, diu brachium doluisset, nec dolor remediis remississet, tandem obortus est tumor in summo humero anthracodes, dolorificus maxime. Hic suppuravit. A suppurato magna lenatio. Dolores autem in melancholicis vagi sunt, nec quiescunt sæpè donec se ipsi collegerint, & *συσπώβη* aliquam fecerint. Qui cum *συσπώβη* fecerint, tum in suppuratum est incumbendum nisi aliqua alia ratio ratio dissuadeat.

3. Avicenn. scripsit caput de iis quibus dolor & angustia stomachi accidit cum comedunt, & cum distribuitur alimentum cessat.

4. Oportet melancholicos bene comedere ut si fieri possit sibi *εὐσπώβη* concilient. Tum enim bene habent cum impinguantur. Et apud Hipp. Initio æstatis plurimum comedendum est ut faciamus idem quod arbores quæ ad futuros æstus facilius ferendos sibi umbram ex pampinis & foliis comparant. Idem homines sibi debent comparare. Locus est præclarus. lib. 2. aut 3. de Dieta.

CONSILIVM XLIX.

De Elephantiasi.

ARuernus quidam à nonnullis elephanticus iudicabatur. Ideo de eo à societate humana segregando cogitabant. Credo odio quodam litium fomite & feminario id totum exarsisse. Et occulti odij priuatarumque inimicitiarum magna extiterunt argumenta. Ad forum res delata. Primum apud patres iudices: deinde ad Senatum Parisiensem negotium est deuolutum. Statuit ut Medici & Chirurgi iudicarent. Illi initia quædam elephanti retulerunt. A uenis sub lingua paulum

tumentibus & supercilio rariore argumentum desumpserunt. Ad alios res relata. Illi aliter omnino iudicarunt, vacuum omnino & extra suspicionem retulerunt. Id paulò Senatui alienius visum est, præsertim eum alij in alia & omnino contraria irent. Denuò decreuit vt omnes vna conuenirèt, & inspecto homine communicarent. Sic aut diffiderent, aut rem omnino componerent. Decreto obtemperatur. Sistit se homo, nudus exploratur. Nil percipitur quod vel tantillam fidē faciat tam diri morbi Prioris & durioris sententiæ viros pudebat retractare sententiam. Rebus diligenter subductis relatum est nulla signa existentis mali apparere, nilque esse omnino propter quod humana societate priuari debeat.

Rogat Senatus, vt selecti viri iudicent, num Socrates sit elephanticus. Est enim Artificis absolutè respondere, vel elephanticum esse, vel non esse. Ratio non est reddenda, nisi sit necesse, nec reddenda nisi apud peritos artis qui rerum momenta æstimare possunt. Sed hinc nec præcipitanter timidos esse oportet, nec temerè securos. Ex æquo quippe & bono res est æstimanda, vt ne nimia facilitate res extenuetur & eleuetur, vel præiudicata opinione aliter ac est iudicetur. Subolfacio enim accusatores oblicere patrē illius ante annos 40. elephanticum interiisse. Immo, eius sororem de morbo suspectam esse. De patre nil constat. Et cauendum ne sit hoc præiudicium. Si enim ita rem esse animo concipimus, eum iam fortè elephanticum iudicamus antequam ita sit: aut leuiuscula signa, pro magnis & ponderosis (vt sic loquar) pensitamus. At in iudicio ferendo videndum ne quid tale committatur. Quod pater dicatur fuisse elephanticus, id quidem ad cautionem maiorem valet, non ad certum præiudicium. Ad cautionem quidem maiorem, vt nil negligatur, immò ne leuissima quidem indicia & argumenta. Vel, vt seriò magis dicatur, nil curemus quid ante, nec quid post, sed omnino ad hanc hypothesin veniatur: An hic qui nobis sistitur Socrates, sit elephanticus, quoniā de eo segregando disceptatur. Hoc vno iudicio tota hominis fortuna disceptat.

Ceterum fortè aliter se gerere oportet medicè agendò, aliter ex æquo & bono. Nam sunt signa Medica, & hæc altioris sunt contemplationis. Alia sunt signa vulgaria, vt quæ sub obtutum oculorum cadunt. Si Medicè, id est paulò seuerius aga-

308 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tur, quoniam antequam signa foris edantur, intus confirmatum & perfectum malum à Medicis credatur, potest elephantiscus ita iudicari nullis signis foras eminentibus. Maximè verò semen mali fouetur ac serpit intus, si à patre elephantico quis oriatur. Morbi enim quidam iure hæreditatis ad posteros deriuantur, maximè verò elephas, & qui morbi partes solidas, quarum vis natura esse dicitur, occupare solent. Semini enim nescio quæ vis impressa est, quæ ut valet ad speciem, ita latenter morbosam diathesin deuchit & transfundit. Eaque vis insita est tanquam tradux, ut ex macrocephalis macrocephali generentur. Et ita lustrare oportet intestinas partes.

Contrà si ex æquo & bono res æstimetur, relicto paulò exactiore internarum partium examine, ad signa externa tam vniuoca quam æquiuioca deueniendum, ut per hæc tanquam manifesta ad rei notitiam delabamur. Quanquam id nequit fieri quin & internæ partes explorentur. Nam difficilis respiratio, fœdus & grauis anhelitus, sitis, vrinæ confusæ, pulsus tardior, excrementorum fœtor, multaque alia, internarum sedium affectionem testantur. Cæterum signa vniuoca & æquiuioca, & apud Cauliacum, & Hollerium cap. de elephanto, edisseruntur. Nec hic omnia tractare consilium est. Sed ad autores, si quando seriò de morbo laboratur, est recurrendum. Inter cæteros & eleganter, & plenè ex Aretæo Gorraeus edisseruit. Nunc cursim tantum & raptim, & ἀποσπαστικῶς dicendum.

Elephas est extuberatio totius corporis inæqualis cum fœdo colore & characteris mutatione, non quòd statim appareat. Nec enim prius intumescit, quam longius progressa sit corruptio.

Extuberatio in tumore est, tumor in pustula, pustulæ materia succus melancho. bilis torrida, acida & salsa pituita.

Color varius est pro temperamento. Aliquando est roseus & phœniceus & rutilus qualis anagallidi alteri, & anemones flori, Vnde ab Hippocrate dicunt vocari φαινέμενον ὑπόχολον.

Videndum an sit vitio nutritionis, an assimilationis, an infectione consistat. An sit primæ coctionis, an vltimæ, an mediæ, & id breuiter.

Galen. ait, in tota animalis mole priuatio actionis in crudis succis consistit, functio tanquam deficiens in semicoctis, praua verò in vitiosis succis. Ex vitiosis succis erysipelata, gangrenæ,

caneri nascuntur. In nutriēdi actione priuatio actionis in atrophiam est. Deficiens in gracilitate morbosa praesertim, vitiosa in leucis & elephantiasis cernitur. Tamen si leuci & elephantiasis sunt symptomata facultatis nequeuntis sibi familiare alimentum conuertere, eatenus facultatis alteratricis deficientis esse videatur. Verum quia idoneam qualitatem non adipiscitur alimentum, idque propter malum partis habitum, leuce & elephas deprauate facultatis symptomata credentur. Et si facultas deficit, ex euentu tantum deficit, ut patet ex 6. Epid. explicat Gal. cur qui abundant acri calore carnes habeant frigidas, licet venae turgeant. Malunt enim partes suo genio & alimento fraudari, quam talem sanguinem & succum capeffere. Quod postea explicabimus. Iam duae aut tres quaestiones sunt explicatae. Nunc an sit vitium tertiae, an 2. coctionis. Si vitium in visceribus ipsis latuit, cuius ratione succus & sanguis praeue qualitatis est particeps, optimo iure ad secundam coctionem referetur. Et cum tertia coctio secundam non corrigat, nil perinde est si dicatur esse elephas, aut secundae, aut tertiae coctionis. Quanquam ipsius habitus morbus esse dicitur, & capillares venae vitium contraxerunt. Quod verum est ad perfectionem elephantis. Id quod nos abunde diximus in margine capitis de elephanto apud Aetium. Ibi enim repudiauimus opinionem eorum, qui tam frequenter sanguinem elephantice demunt. Errant enim, ut illo loci Fusius est disputatum. Accedit quod natura quam longissime potest amandat hoc virus. Ideo in capillares venas.

Quanquam foris in quibusdam tumores etiam aspectu horrendi apparent, quorum origo aut ab internis non est, si autem fuerit, contracta quadam mala diathesi in habitu ipso, talia in cute vitio vernaculo ipsius cutis erumpunt & efflorescunt. Ideo Hippocrates, ut multis locis annotauimus, ea quae in cutem erumpunt, alias ut morbos considerat vitio cutis orientes, alias ut exanthemata, & τὰ τῶν ἐντέρων ἐλασηματα. Et tunc ipsius tertiae coctionis & habitus morbus esse perhibetur.

Sed haec difficilioris sunt inquisitionis & contemplationis, magnūque iudicium requiritur ut distinguere possis an à partibus internis repetendum malum, an verò totum id quicquid est ipsi habitui eiusque labi acceptum sit ferendum.

Qq iij

310 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Multa sunt promissa, plura dici possunt. Tamen sine recto ordine quædam inculcabitur. Primum illud tenendum,

Elephas est extuberatio totius corporis inæqualis cum fœdo colore, characteris mutatione, non quod statim appareat. Nec enim prius intumescit, quam longius elephas progressus fuerit & corruptio. Essentia huius extuberationis consistit in tumore contra naturam. Tumor in pustula. Pustulæ causa materialis succus melancholicus, bilis retorrida, pituita salsa. Causa vniuersa est corruptio partium solidarum & assimilationis. Assimilatio corrumpitur Hippocr. cum quod ingeritur superat, nouam formam inducit, destruit priorem. Quod ingeritur superat, nō superatur, generatione, cōtagione & alterius morbi successione. Et his modis fit elephas. Generatio autem aut est primigenia, aut non. Primigenia cum sequitur naturam suscipientis & efficientis causæ. His quidem superioribus paulò verbis ἡ δὲ ὁμοιογενὴς τῇ ἐκείνῃ τῃ ἐκείνῃ consistit, quæ ex lib. Hippocratis de alimento ducuntur, & quæ paulò amplius sunt explicanda. Textus autem Hippocratis est eiusmodi, cuius tanta est & elegantia, & vis & autoritas vt ceteris sit præferendus:

Assimilat pro viribus natura, cum id quod superingeritur superat quidem, & illud quod prius inest præualeat, id est, alimentum dum patitur agit quidem, sed tandem superatur ab eo quod prius erat, id est, à corpore & eius forma. Vt lactuca consideratur & agens & patiens. Agens dum coquitur tantum & ipsa refrigerat: sed cum iam cocta est proximè assimilanda & calorem naturalem auctura vinci dicitur, & reuerà vincitur.

At adulterinum est alimentū tribus modis. Primo modo dum coquitur tantum alimentum, & ratione suarum qualitatum primarum afficit, vt lactuca, de quo priore modo paulò ante dictū est. Aut cum prauum est ipsum alimentum prauique succi, coquitur & nutrit, sed postquam nutrierit, habitum ipsius corporis peruertit. Tertiò, cum occulta & maligna qualitate agit. Nam totius substantiæ proprietate nocet. Ita tamen considerandum est, vt & tempus, & quantitas spectetur. Tempus vt multo, vel paucò agat tempore. Quantitas, vt ea sit sufficiens ad euerendum; Quod pauca tandem superetur, & à natura vincatur. Textus Græcus est is, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκείνῃ, suppl. τὸ ἐκείνῃ, ἐν ἡμέρᾳ, καὶ κατὰ χρόνον ἢ ποσὴν ἔχοντι πλεονεξίᾳ; καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον στερεωμένων πᾶσι τοῖς μέλεσι διατλάειν, καὶ τὴν μὲν ἰδίαν ἰδίᾳ ἐξελθόντα, τὴν δὲ περὶ τὴν, ἔστιν ὅτι καὶ τὰς περὶ τὴν δὲ.

μαίεσθαι, ita Latine verti potest.

Euerit autem & destruit vtrumque alimentum (quanquam in Græco est *ἀναστρέφειν*, suppl. *τροφᾷ*), & non video, cur bene dicamus, tertia ista species alimenti tota qualitate pugnans, euerit alias species alimenti, melius dicetur: (Obscurat alias species) & in tempore, & post tempus, id alimentum quod continenter foris superingeretur, firmiterque per multum tempus omnibus corporis partibus applicatum fuerit, & propriam quidem formam produxit, vel producere potuit, priorem autem, vel priores destruxit ac aboleuit. Hoc enim loco, postquam superius disputarat de incommodis ex alimento ob manifestam qualitatem, agit de eo alimento quod propter vim quandam occultam & vix explicabilem lædit, & ita in nos agit, vt nouam quandam formam inducat, priorem autem aboleat & perimat. Nec enim aliter suæ formæ proprietatem quæ antecedenti & priori formæ contraria est omnino, induceret, quam postquam aliam & meliorem & innatam corrumpit ac peremit. Plura de ista metamorphosi, & viribus extranei & deleterij alimenti legas in Commentario ad istum locum breuiter & doctè scripto. Cæterum, externum dicitur alimentum, siue foris adhibeatur, seu genitiuo & naturali quodam partium & viscerum vitio & tabo in nobis generetur & accumuletur. In nobis enim gigni solet humor qui nonnumquam venenatorum animalium virus sua malignitate æquat. Et iste locus ex Hippocrate citatus adumbrat & delineat vitiosum illud alimentum cuius vi in elephantiscis tam horrenda excitantur symptomata, & dira monstrosaq; quædam forma inducitur, oppressa ac perempta priore forma.

Plura habebam in animo quæ scriberem, sed retusus stylus meus tempestate bellorum quieuit. Tantum aduersaria quædā hîc adscribam super eadem quæstione mota de probandis iis quos iudex temerario iudicio pro elephantiscis iudicarat. Erant autem Aruerni.

1. Rotunditas oculorum & aurium. 2. Supercilij depilatio & extuberatio. 3. Narium foras extuberantia & contorsio, & interioris partis angustia. 4. Labiorum deformitas. 5. Vox rauca. 6. Fætor halitus & corporis.

1. Ab Elephantiscis natum esse. 2. Consuetudo cum elephantiscis. 3. Suppressio consuetarum excretionum. 4. Vñs ciborum prauorum, vini præsertim. 5. Vita ærumnosa in metu &

*Signa
vniuoca*
6.

8. *Alia
ex alio-
vñ opia.*

312 CONSILIORVM MEDICINALIVM

mœrore. 6. Extuberationes corporis, sed præsertim faciei. 7. Aures acuminatæ. Nasus simus. Labia crassa. Aspectus horridus. 8. Color faciei ex rubore liuens, vox rauca, oculi rotundi.

1. Extuberatio in extremis partibus. 2. Color vt in morphaea vt tenebrosus. 3. Defluuium capillorũ & tenuiũ regeneratio. 4. Musculorum quorundam extenuatio vt pollicis & trapezitæ vnde fiunt alati. 5. Stupor aut sensus amissio in extremis partibus siccatis & induratis. 6. Scabies, impetigo, gutta rosacea. 7. Extuberationes sub lingua: vnctiosa cutis aqua aspersa. 8. Cutis crispitudo instar anseris implumis. 9. Sanguis thrombosus. 10. Sensus punctionis in cute. 11. Rarò febri-
*Equino
as signa
12.* citant. Cauti sunt. Alia petuntur à somno & vrinis. Agnos-
cuntur autem inter cætera. Dispositio, actus. Dispositio ex
causis antecedentibus. Actus triplex, initium, incrementum,
vigor. Principium cum malum latet intus & signa minora for-
ris extant. Crementum cum se in externis prodit. Vigor, cum
partes vlcerantur. Declinatio, cum partes corrupte cadunt.

At verò tanti sunt signa huiusmodi vt iis quasi manibus duca-
mur ad latentes morbos, quæ cum ita se habeant, quæri meritò
nunc potest. An vt in aliis morbis si cui conualescendum
omnia bona signa adesse oportet, si moriundum, vnum malum
sufficit. Ita in iudicio elephantiorum vnum vniuocum satis sit
ad condemnandum, ad absoluendum omnia vniuoca abesse
conueniat. Nam iudicium facit Galenus, & per τὰ συµβελόντα, &
per τὰ ἀσυµβελόντα, vt hæc non adsunt aut illa, ergo, nequaquam
id faciendum, alioqui nõ differt iudicium Medici & vulgũ quod
in alienis miserijs procax est.

Hippoc. morbos distinguit ex sexu, ex ætate. Ætate, ante
14. annum leuce, seu lepra alba & cancer non affligit, nisi sit
congenitus affectus, ac si dicat, se prodit non merito ætatis, sed
alia ratione, hic morbus ætate nil impediens se prodit: A 14.
ad 42. omnes morbi se produnt, ait Hippoc. à 42. ad 63. (An-
nus autem 42. notat annum climactericum 2.) strumæ non ad-
sunt. At si quid elephanticum foret, & in matre & in filiis, se
prodidisset cum mater agat annum 63.

Quod ad sexum attinet Hipp. ait mulieres non laborare po-
dgaræ. Seneca addit defluuium capillorũ quo mulieres non la-
borant. (id tamen apud Hippocratem non legitur) quo fit vt
mi-

miremur in hac muliere naturalem *φαιδρωσιν ἢ μίλρωσιν*. Tamen Aristol. ait mulieres non fieri vitiliginosas, & ob menstrua, & cutis densitatem, tamen his omnibus morbis laborant mulieres non quòd mulierum natura mutata, sed vita.

Filij huius mulieris sunt depiles ab ipso ortus in quo duo notanda. Prius, quod ista depilatio est morbus particularis, non abscessus, iuxta Hippoc. sub finem 2. Prorrh. vt pityriasis est aliquando vitium particulare capitis, intactis aliis partibus. Et id vitium transfusum est in mares maximè, quia mares matrizant ratione Galen. Semen fœminæ initio vincitur à masculo, sed adsciscit menstruum vt fortius se reddat contra masculinū semen. An maior pars seminis à capite, vnde fabulæ de Minerva.

Inter filios susceptos de elephante, tamen non damnatos vnus est vietus, deformis, & huic detractus erat testiculus. Legatur locus, in Eunuchis, de ipso Enucho, ille vetus, yternosus, vietus, senex. Et Donatus pulchrè in Commentario. Eidem filio teter anhelitus, sed à malè conformato erat.

Quoniam autem fit maximè mentio de signis in facie, quæ signa sunt prerogatiua in elephante, bella est quæstio apud Gordonium de quodam elephantico, cui facies naturaliter erat affecta. Rationem reddit author cur ita contingere potuerit.

Familia est in qua pubes est depilis. Scytharum valet exemplum, quia ars naturam facit.

Quod attinet ad crispitudinem & depilationem quod pro crispo glabrum sumitur (quia pili regniti non sunt pili veri, sed anserini) locus est apud Terentium de facie cadauerorsa, in Hecyra.

Fortè mater habuit à propagine aliquid elephanticum, sed id in ea bonitate naturæ domitum aut extinctum est, & intemperies per traducem propagata, sopita est.

Mirum quod omnes filij matrizantes sunt depiles, vno excepto, & filij filiorum depilium, & filia sunt pilosæ.

Fortè habitus ipse fuit in muliere matre & filiis validus (qui natura tamen per Galen. est imbecillior partibus internis) & vicit malignitatem vt se non prodiderit. Vnde Auicennas facit morbos habitus. Cacochymia destruit *εὐχρίαν*, & *καχεξία*.

Hæc aduersaria *ἀντίκτος* ferè adscribere non piguit, quòd ali-

quando ea vsui esse possint si fortè quæstio & examen moueatur de elephante. Sic erit hic liber vt bonus promus condus desiderio aliquando satisfactorius. Lutetiae 21. August. 1596.

ANNOTATIONES.

1. *Ad Elephantiasin curandam quidam malo & inhumano exemplo balneum sanguinis humani præscripserunt. Sed hoc tam horrendum & impium inuentum cum ipsis inuentoribus extinctum est. Ita enim apud humanos homines (viscè dicam,) Miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit.*

Lib. 7. 2. *Quoniam diximus obiter de anno Climacterico, vnum & addam. cap. 19. Climactericus à Plinio annus scansilis dicitur, ab alijs gradarius: Rara aiunt (ait Plinius) longiora esse tempora quia momentis horarum insignibus lune ac dierum septem atque nouem ingens turba nascatur, scansili annorum lege occidua quam climacterem vocant. Annus sexagesimus tertius periculosissimus, quoniam uterque numerus septem & nouem, qui decretorij & malefici dicuntur, & ad succidendam vitam pollentes, in vnum quasi confluunt septies nouem, & nouies septem faciunt sexaginta tres: & gradarius scansilisque dicitur, quod à septimo incipiens, vitam hominis quasi per gradus quosdam agat & dirigat. Vnde apud Hippoc. adumbratur ea vis & potentia dierum quadragenariorum: Ita Hippoc. Mors etiam per fatum, uolèti Græcis, fortè designata, vt noscant omnes, quod omnia existentia quæ naturam ex iisdem habent transmutationes per tempora venientia habeant. Anno finiente, multi morbi, multæ fanitates, iuxta temporis rationem ad menses. Septenariis autem annorum cum multa alia insignia corporibus fiunt, tum dentes pueris excidunt & renascuntur.*

Et alio libro, ex multis coniectare licet vitam hominis septem dierum esse. Id quod multis postea rationibus illustrauit.

Denique tota Hippocratis doctrina nil aliud sonat quam dies pares, impares, menses, annos, & vim Climacterici anni, vt paulò antè notauimus ex libro Coacarum animaduersionum.

CONSILIVM L.

*De intestini vlcere & hæmorrhoidibus. Pro Comite
quodam Anglo.*

MOrbus qui non ita pridem illustrissimo Comiti molestus esse consuevit, & mali moris, & difficilis curatiouis nobis esse videtur. Ac mali moris, quoniam vlcus est quod altius egit, ac dysenterico modo depastum est, à margine intestini nō longè distās, & ab acri & salsuginoso humore succi melācholici naturam æmulante, natum. Fouetur perennitate affluxus illius humoris qui exulcerando & exasperando ipsi parti quā transit, molestus esse solet. Testatur menstrua hæmorrhoidon excretio, quæ & causā mala est, & noua irrigatione nouam irritationem affert. Vel credibile est successisse suppuratæ hæmorrhoidi. Huius rei fidem facit & fluxus, & dolor hæmorrhoidon qui sauo cum cruciatu illustriss. Dominum afflixit. Hic plenitudinem & cacochymiam autorem agnoscit, sed hanc potius. Difficilis curationis, non omnino desperatæ esse videtur, si dominus & vitæ legem seruarit, & consilio consulentium sanitati paruerit. At id facit diuturnitas mali quæ naturam partis fatigauit; eiusdem etiam pertinacia, & quod eò processit, vt depascendi assiduitate iam & caro intestinorum abradatur, & tunica ipsa atteratur. Vt enim nascens malum facilè opprimi potuit, sic inueteratum magis inualefcit ac roboratur. His artificialibus coniecturis, non certis omnino rationibus, rem licuit æstimare. Defuit enim Medici tanquam legitimi artificis narratio & descriptio, quæ certiore de re fidem fecisset, & quasi digito demonstrasset. Omnino enim à narrantis ore dependendum fuit, & eius quem non ars reinarum & disceptatorem, sed assidua, duntaxat penes ægrum diligentia & obsequium narratorem reddiderit.

Hæc sunt instituta.

Corpus purgetur cassia sine saccharo, & cap. cum syrupo violato. Clysteres ex decocto nerualium herbarum cum capite ver-

R r ij

316 CONSILIORVM MEDICINALIVM

uecino addita cassia. Aliàs anodynū ex decocto caricarum, feminis psyllij, plantag. cum vitellis ouorum. Abstineat vino. Vtatur decocto radicis scynæ. Detrahatur sanguis singulis ferè mensibus. Lac asinæ in vsu esto. Hordeata & balnea. Et eo tempore intromittentur balani ex metallicis, exceptis mucore feminis psyllij cum paucō opio. Pyrotica vtrique brachio. Portiones vulnerariæ & diuretice. Iniectiones ex plantag. veronica, solatro, centaurio minore, consolida minore, hordeo & similibus quæ leuiter detergent & retundent succi melancholici malignitatem.

Illinantur turundæ lenes & molles ex linimento confiato & vnguento diapompholig. acto in mortario cum ol. nenuph. & violato addendo spodij, Karabes, vtriūque corallij subtiliter puluerisati, & supra marmor ducti sufficientem quantitatem.

Addetur huic vnguento aliquid philonij romani prout necessitas requirer. Die 15. Iunij anno 1583.

CONSILIVM LI.

De Sanguinis sputo.

GODONIVS ad tabem propendebat, cruentum expectorabat, vt pessimo loco res eius constitutæ viderentur. Quando autem salus promitti non poterat, dulcedo tamen aliqua vitæ calamitosæ nonnulla poterat. In eum finem hæc quæ sequuntur instituta sunt: Dandum dilutum rhu. cum decocto scabio. vng. caball. passul. & glycy. dissoluto syrupo de vngul. caball. & violato; In vsu sit conferua rosarum & de vngul. caball.

Operiatur thorax hapso imbuto ol. viol. & de Keiri.

℞. Pulv. pulmo. vulp. preparati. ʒ iij. diatrag. frig. & sacch. pēdiati an. ʒ iij. saccha. ros. ʒ. iij. utatur sepe.

Paretur syrupus ex succo vngul. caballinæ, bipin. buglos. plantag. portul. maceat in eo nodulus gummi tragacanthi cum ʒss. feminis papau. albi. & cum infusione rosarum siccarum in aq. rosarum. Hora somni vtatur cremore hordei loco. cœnæ, cum semine papaueris albi.

Applicabuntur pyrotica vtrique brachio.

Balneum ex vsu foret, sed metu ruptionis subitæ vomitarum, in aliud tempus differendum.

ANNOTATIO.

I. Pauca quadam annotare nobis consilium est. Ea enim de catarrho materia & fructuosa est, & cum aliqui vulgaris sit, oppido pauci in ea versati sunt. Mirabar quid esset cur fluxionibus opportuni, ita morbis incertas periodos habentibus impediatur. Vnde febres quintana & septimana, quarum Hippocrates meminit, tabescentium ferè sunt. Est Hippoc. part. 7. enim materia longè à vasis semota qua id februm genus concitat. Si ʒ 9. enim ea vasa occuparet qua aliarum februm materia, non his internallis sect. 2. febres ista reduces forent. lib. 1. Epid.

Tria verò sunt quæ animaduertenda duximus. Primum est, quod Galenus annotauit in Epid. de filia Euryanactidis quæ fluxionibus acro-

Rr iij

ribus in febre fuit opportuna. Huic destillationes acres, tenues, multae, paruae, tussis, & nil coctum excreuit. Febris videbatur remittere, & tamen vera & salutaris remissio non erat. Die decimo nono interit. Galenus vnum notandum scripsit, & quod ad alios talibus fluxionibus obnoxios potest trans ferri: Nil est, inquit, cur in hac agra de diebus decretoriis quæramus. Illi enim nullum ordinem habuerunt, quando quidem destillatio à capite mortem attulerit, & tales innata. Hippocrates enim in fine historiae adiecit, ἢ δὲ οὐκ ἔστιν ὁρίσασθαι. Et 4. in Epid. in uxore Meandri Caci, in qua dierum criticorum observatio facta non est. Quid tum? à capite fluxio fuit, Cur propterea dies non observat. Nam & Hippocrates in ulceribus tibiæ observat dies criticos.

Quæstio hæc moveri potest, An propterea dierum criticorum confusio quedam fuerit & ordinis perturbatio, à qua possis dicere, quod destillatio à capite ferina & coctionis incapax mortem intentavit? Præclarum hoc, nec sicco pede prætereundum.

Secundum quod nota dignum nobis videtur est illud quod Galenus scripsit, Destillationes à capite in pulmonem malignas credenda tenues & corroderentes fuerint, has enim nec in pulmone tandiu morari convenit donec crassescant, ut alias fluxiones par est, quæ sunt quidem tenues, sed non corroderentes, nec æquum est statim eas excerni. Intus enim morantes nec facile concoquantur, & viscus ipsum lacerare deprehenduntur. Si excernantur autem, tussis violentas commouent, ob quas caput repletur, ipsumque rursus materias in pulmonem depellit, metusque est ne ob tussim vehementem vas aliquod rumpatur. Quæ tussis ijs accidit qui humores tenues & aqueæ substantiæ difficulter ex pulmone reiiciunt. Ascendunt enim isti humores à spiritu per tussim emissio sublatis. Quod si tenues & aquei sint, dissipantur, & contra ipsius spiritus motum prius delabuntur, quam totam asperam arteriam egrediantur. Et hic locus est notandus, & multi eum verissimum magno suo detrimento experiuntur.

Tertium est de febre & macie quæ tenues fluxiones consequitur. Id Galenus abundè explicavit dum extenuationem corporis sequi ait ex calidis destillationibus. Et tunc Medici non reformidant phlebotomiam. Mirum autem sit cur cum destillatio ferina & calida à capite labitur, febrem primo quoque tempore promoveat. Est enim calor quidam fundens & liquefaciens qui cum alijs in alijs partibus sit, maxime in capite est. Non quod forte non sit ea acris & calida destillatio quæ febrem ac-


Com. ad
parr. 18.
sect. 3.
lib. 6.
Epid.
Vide
parr. 12.
sect. 1.
lib. 1.
Epid.

sed est febris non ita apparens, & sepulta qua id faciat, id est, que distillationem moueat. Sed hanc totam questionem de fluxionibus in lib. 2. Epid. meorum diremimus.

Questioni huic ultimæ annectendum est & illud præclarum Hippocratis præceptum. Cum enim à fluxionibus extenuatum est corpus, prima cura esse debet ut corpus pinguescat. Pinguedo enim illa & consuetudo, declarat fractam esse vim fluxionum istarum acrium & calorem contra naturam superatum. Præceptum quidem Hippo. est de iis quibus aspera arteria exulcerata est, & valde tustierunt: Hos, inquit, quam maximè reficere oportet ut quam crassissimi fiant. Et tamen Hemoptoici sunt. Cum alioqui magna Medicorum pars hemoptoicis in ediam præscribat. Sed horum duo sunt genera. Nam si præ copia sanguinis hemoptoicus fiat, de cibo demendum est; si ob sanguinis acrimoniam & malam qualitatem, multi benigni alimenti usu acrimonia sanguinis temperabitur.

FINIS.







INDEX RERVM MEMORABILIVM ALPHABETICO ordine digestus.

A

Abscessus quinam boni,
quinam optimi. 292
Alimenti exhibitio
naturam à coctione

humorum auocat. 263

Aluo fluente an sit vena aperien-
da. 172

Aquorū & crassiorū, quomodo diffe-
rant. 11

Aphonia unde. 12. & 13

Apoplexia quomodo fit. 16. 18.

& 19

Apoplexia signa characteristica.

24

Apoplexia differentia à caro. 32

Apoplexia quomodo generatur. 129

Apoplexia quorundam unde. 254

Articulorum dolores cum nocte exa-
cerbantur. 193

Arthritis est quadam febris arti-
culorum. 197

B

Betonica vires maxima. 109
Bilis conuertit sanguinem in
ichorem & serum. 21

C

Caluitij natura & causa, 226.
& 227

Carbunculus an sine febre. 158

Caros ab aliis morbis cerebri quo-
modo differat. 32, & 33

Cassia bolus ad dysenteriae cura-
tionem. 175

Catalepsis & catocoe quomodo
differant ab aliis cerebri sympto-
matis. 34

Catalepticos natura. 36. 38. 39. 40

Catarrhorum difficilis curatio.

212

Tomus II.

S

INDEX:

Catarrhus quomodo fiat. 215

Catubuth veterum, melancholie species. 133

Causi an habent focum in pulmone. 260

in Causo cur alius liquida. ibid.

Causi causa multiplex. 261

Climactericus annus quid. 314

Cerebri morbi diffiiles cognitu. 31

eorundem curatio difficilis. ibid.

Cerebrum extenuat labor immodicus. 300

Cerebrum variis modis afficitur. 199

Coitus venerei variae qualitates. 7

Colora bonitas quando in malis ponenda. 17

Coma quid, & ut differt à comate. 33

Coma duplex. 34

Convulsiones in febris vnde. 31

D

Diectiones humoris nigri per ventrem pessima. 155

Diuretica omnia exsiccant. 93

Dysenteria quaedam populares, quaedam non. 241

Dysenteria vnde nam populares & Epidemica esse dicantur. ibid.

Dysenteria non omnis ab intestinis. ibid.

Dysenteria curande varij modi. 242

Dysenterie an conferant adstringentia & diuretica. ibid.

E

Elephantiasis quid, & eius signa. 308, 310. & seq.

Empyici cur noctu incalescant. 278

Epigeneseos & metastaseos contraria natura. 267

Epilepsia puerilis natura & curatio. 198, 199

de Epilepsia causa & curatione quaestiones. 200

Epilepsia morbus est modo acutus, modo chronicus. 44

an in Epilepsia mittendus sanguis. ibid.

Exanthemata & ecchymata quomodo differant. 153

de Exanthematon eruptione locus memorabilis. 154

Exanthemata quomodo fiant. 161

Exanthemata remanentium horrenda symptomata. ibid.

in Exanthematis quando mittendus sanguis. 163

F

Febri morbus communissimus. 4

Febres continua inseparabiles à morbis acutis. ibid.

sine Febre neminem mori an verum sit. ibid.

Febilis calor tenues humores consumit, crassos attenuat. 62

Februm ardentium proprium est hemorrhagias mouere. 141

INDEX.

Febris laboriosa quæ. 417

Febris continua cum grauib.
symptomatis. 218

Febris ardētis focus multiplex. 260

Febres quintanæ & septimana cur
ferè sunt tabescentium. 317

Fluor muliebris duplex. 68

Fluor albus an purgationis vicem
& nomen obtineat. 71

Floris eiusmodi an sit aliquis
usus. 84

H

Historia cuiusdam Athenien-
sis aquarum mineralium
usu impetigine liberati, sed qui
non longè post factus hydropi-
cus interiit. 151

Historia Comititis cuiusdam qui
obit ex vulnere thoracis. 237

Hydrargyri usus in lue venerea
aliquando periculosissimus. 191

Hydrops sæpè à liene. 208

in Hydropè an secanda vena. 209

Hypochondriaci affectus certa in-
dicia. 265

Hypochondriaci cur dorsum & pe-
ctus doleant. 303

I

Ætatio in agris quid. 147

eius cause. ibid.

Ingenio sæpè valet cui corpus in-
firmum est. 201

L

Lactis asinini usus in artabri-
ride. 197

Lethargus quid. 33

Lingue incontinentia unde &
quid indicet. 2

M

Mania tribus modis sumi-
tur. 144

Medicorum quorundā error repre-
henditur. 120. alter quoque. 206

alius in secanda vena. 262

Menstruus sanguis an sit mali-
gnus. 70

Melancholicorum duo genera. 7

Melancholici Medicomastiges &
flagella Medicorum dicti. 137

Melancholici quinā dicantur. 141

Melancholicorum querelæ perpe-
rue. 204

Melancholia morbus duplex. 281

in Melancholia Hypochondriaca
venæ sectio imprimis est ne-
cessaria. 283

Melancholici multi dimissa cura-
tione fuerunt restituti. 302

Melancholici perpetuò conquerun-
tur, & medicamenta sæpè ap-
petunt. 305

bene ha-
bent cum impinguntur. 306

Mulierum morbi cur ferè imme-
dicabiles. 107, & 271

Mulieres albæ uterino fluxui ob-
noxia. 271

N

Nigrities capillorum un-
de. 118

O

Oris fœtentis curatio. 217

Ossa cur tophosa fiant media
sui parte, in lue venerea. 187

P

Papaueris decoctum unde in-
fatuet. 124

Scij

INDEX.

Paroxysmi bifariam magni dicuntur. 257

Phrenitis triplex. 24

Phrenitidis à mania discrimen. 128

Phrenitis, apud Hippocratem quid. 132

Phymosis & periphymosis quomodo differunt. 211

Ptyalismus quibusnam familiaris. 221
potissimum hypochondriacis. 304

Purgatio & vacuatio quomodo differunt. 73

Puris an proprium sit fecere. 276

Pus non semper facit. 278

Purpura quid & unde. 153

Pustularum plura genera. 152

Pustula venerea an suppurent. 185

R

Repentina omnis sanitas & curatio suspecta esse debet. 111

Rigores in febribus unde & quomodo fiunt. 28

S

Sanguis ad sapientiam facit. 22

Sanguis ab ore multis modis reicitur. 41

Sanguinis missio an requiratur in aphonia. 43, 47

an in hydrope. 209

Sanguinis missionis intempestive celebrata incommoda. 210

à Sanguinis detractione unde fit ut quidam animo linquatur. 268

Semitertiana unde periculosa. 250

an Semitertiana laborantibus ipso reduplicationis die secunda ve-

na, aut exhibendum medicamentum. 252

Semitertiana multis nominibus funesta. 253

Senum corpus quomodo siccum esse dicatur. 109

Splen olim dictus fiscus corporis. 292

Sudor signum est naturae valide, atque imbecille. 9

Sudoris modus triplex. 219
circa Sudores animaduertienda. 220

T

Tena smi variae diuisiones. 371

Tremor quid, & eius natura. 179

Tritaeophyes febres duorum sunt generum. 253

V

Varix quid & unde. 227

Varices quibus accidunt. 230

Venerea luis curanda methodus. 189

Venerea virulentia quid. 192

Vertigines unde fiunt. 8

Vespertilionum vitam agere quid. 118

Vini dotes eximiae etiam in medicamentis. 193

in curanda epilepsia. 201

vitam facit incundiores, sed breuiorem. 202

Voluolosis dandū rhabarbarū. 244

Voluolosis à prolapsu intestini inutilia purgantia. 245

Vomica latentis in pulmone coniectur. 205

Vrina suppressio in febribus acutis unde. 274

Vteri gestationem facilem reddendi methodus. 286

FINIS.

GVILLIELMI
BALLONII
MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI,

**CONSILIORVM MEDICINALIVM,
LIBER III. ET POSTREMVS.**

I T E M,
PARADIGMATA ET HISTORIÆ
morborum ob raritatem obseruatione dignissimæ, quarum
lectio non minùs rei ipsius grauitate & admiratione,
quàm vtilitatis vbertate est ad medendum &
præsentendum profutura.

*Omnia studio & operâ M. IACOBI THEVART D. Medici
Parisiensis digesta, & multis hinc illinc obseruationibus, ad
obscuriorum locorum intelligentiam, illustrata.*

*Παθυμίας ἀπέχεσθαι, καὶ τὰ νοσῶν ἀσκεῖν
Ἡμερὲς γὰρ ἀσκησις πύτων ἐστὶ χρητὴς.*



PARISIIS,
Apud **IACOBVM QVESNEL**, viâ Iacobæâ,
sub signo Cochleæ, & Columbarum.

M. DC. XXXIX.
CVM PRIVILEGIO REGIS.

BALLONI
MEDICI PARISIENSIS
CONSILIORVM MEDICINALIVM
LIBER III ET POSTREMVS

PARADIGMATA ET HISTORIAE
lectio non minus rei ipsius gravitate & admiratione,
quam utilitate videri debet esse ad incedendum &
persequendum profutura.

Quamvis haec & opera Jacobi Theveti Medici
Parisiensis digesta & multis hinc observationibus ad
obscuriorum locorum intelligentiam illustrata.

Postquam enim haec, quae non solum de re
habent, sed etiam de rebus, quae non solum de re



PARISIENSIS
JACOBVM QVESNEL, via Jacobae,
sub signo Cochlear, & Columbarum.
MDCXXXIX
CVM PRIVILEGIO REGIS



Illustrissimo ac sapientissimo viro D. D.

FRANCISCO VAVTIER,

olim Reg. MARIE MEDICÆ Archiatro,

nunc REGI LVDOVICO XIV.

à sanctioribus Consilijs,

ET

ARCHIATRO RVM COMITI,

IACOBVS THEVART D. Medicus

Parisiensis. S. P. D.

QVÆ hætenus è musæi nostri latebris in
apertam lucem prodire Clarissimi Ballonij
opera (Illustrissime Valteri) ea tam gratiosè
ac comiter ab omnibus philiatris excepta
sunt, certò ut credam peccaturum me in Remp. iat-
tricam si reliqua, quæ adhuc latent, eiusdem authoris
monumenta diutius apud me retineam. Sed longè pro-
fectò gravius crimen ipse incurrerem, si paterer ea ad
aliorum manus ante peruenire, quàm auxiliares ac
salutiferas tuas essent exosculata, ab eisque missionem

ā ij

accepissent. Ecce igitur, (Archiatron comes dignissi-
me) utrôque eo reatu unâ me exoluo, ac medicinalium
consiliorum, paradigmatumque centurias aliquot ab
ipso Ballonio iam seniore conscriptas, mihi prae-
poti conceditis Illustri tuo nomini dico ac consecro. Id
a me nec invito exigebat dignitas illa tua, quam sum-
mam sperare medicus potest, & ad quam tu te virtus,
tua longo rerum usu firmata polymathia, nec non in
rebus medicis & toxica incredibilis evexerunt, atque id
tam felici rerum successu, ut boni omnes Galli palam
profiteantur ac praedicent suum se tibi debere Regem
charissimum, quem nempe malignis ac pestilentibus
variolis periculosissimè laborantem non cardiacis tan-
tùm praesidijs (ut medicastrosum *αἰσθητικὸν* vulgus so-
let) sed & ipsâ, quam in eiusmodi affectibus tantope-
re auersantur ac damnant, sanguinis missione ter, pro
symptomatum urgentium necessitate, repetitâ, saluum
& incolumem restituiisti, innumeris interim in hac ur-
be populosissimâ pueris hac epidemicâ lue à medio subla-
tis. Quod ob facinus tam egregium quæ non tibi lau-
des, Vir præstantissime, quæ non soteria debentur? Si
qui ciuem Romanum in prælio seruauerat, quercæ co-
ronâ dignus habitus est, Tu certe, qui Regem Christia-
nissimum ab hoste tam infenso liberaasti, auream, qua-
lis est ab Atheniensibus Hippocrati concessa, meruisti.
Nec dubito quin, si vixisses priscis illis temporibus,
quibus inter heroes referebantur quicumque insigni
aliquo facinore Rempublicam conseruassent adiunif-

sentue, quin, inquam, ipse heroum auxisses numerum,
honoresque propè diuinos accepisses. Tu (quod de Hippo-
crate Patrus ad Artaxerxem scribens aiebat) sanitatis
pateres, tu seruator, tu mitigator dolorum, tu diuina
scientia princeps. Plura ne dicam tua vetat modestia.
Iubet verò ratio & aequitas ut nullam unquam præ-
termittam occasionem celebranda tua erga me propen-
sionis ac beneuolentia, quam ipse semper ab annis fer-
mè viginti quatuor singularem expertus sum, quam-
que si nullo hætenus officio, nullo vel leui munusculo,
ob fundi proprij tenuitatem, compensare potui, velim
saltem operum auunculi mei nuncupationem hanc
perpetuum esse apud omnes memoris mei, gratique
erga te animi monumentum. Vale. Lutetia XIX.
Kalendas Ianuarii M. DC. XLIX.



INDEX
CONSILIORVM MEDICINALIVM,
IN TERTIO ET VLTIMO LIBRO
Ballonij contentorum.

Numerus prior Consilium, Posterior pagina
faciem designat.

- D**E Capitis dolore & vertigine conf. 1. fol. 1
Pro se ptenni puero molestiarandine laborante Conf. 2. fol. 13
De febre nocturna conf. 3. in quo queritur cur Empyici nocturnas potius quam diurnas habeant exacerbationes, fol. 21
De sanguinis missione in melancholicis, & data occasione explicatur illud Hipp. Cur sanguis faciat ad sapientiam, conf. 4. fol. 36
De Causo, conf. 5. fol. 63
De Impotentia coeundi, conf. 6. fol. 75
De fœdis coloribus, conf. 7. f. 78
De Scelo yrbis, conf. 8. fol. 81
De Elephante pedum, conf. 9 f. 82
De puella trienni nauseam patiente à nativitate, conf. 10 fol. 83
De falsa specie Ischiadis, conf. 11 fol. 85
Ad serpiginem in facie psoræ prænuntiam, conf. 12. fol. 86
De Oculorum morbis, maximè de macula ex morbillis reliqua, conf. 13. fol. 87
De Tumore Epigastrii, conf. 14 fol. 88
De dolore cruris post ictum ex globo missilli ex catapulta, conf. 15 fol. 89
De varicosa hernia & hæmorrhoidibus, conf. 16. fol. 90
De suppressione urinae, conf. 17 ibid.
De Catarrho & sputo sanguinis conf. 18 fol. 91
De Aure suppurata & manante sanie, conf. 19 fol. 92
De cōgressus impotētia, cōf. 20. f. 94
Pro quodam iuvene ad venerem inutili, conf. 21. fol. 96
De vetere Arthritide, conf. 22. fol. 97
De paraphimosis, conf. 23. fol. 98
Pro D. Villebois Seneschalio aliquid vertiginosum sentiente partim ab hypochondrijs partim à capite,

INDEX.

- conf. 24 fol. 99
Pro muliere stranguriam septen-
nem patiente, conf. 25. fol. 103
De tumore cancroso pro D. de
S. Jean, conf. 26 fol. 105
De hernia pro filia D. Margeret,
conf. 27 fol. 107
De sterilitate an ex parte viri,
an mulieris, conf. 28. fol. 108
De febre naucoſa pro D. Gobe-
lin Abbatiſſa, conf. 29 fol. 111
De sterilitate, conf. 30. fol. 113
Ad ſurditatis initia pro D. Ba-
xanier, conf. 31. fol. 116
De Lethargo ſyncope & Cardial-
gia, conf. 32. fol. 117
De puella quam ob terrifica ſym-
ptomata vel poſſeſſam vel obſeſſam
eſſe putabant quaſi de cenſu τῶν
ἐρεψυμένων & numero diceretur,
conf. 33. fol. 119
De Scrophulis pro D. L. M. cōf.
34. fol. 120
De fluore maliebri & muliere ca-
chectica, conf. 35. fol. 122
De Sputo cruento pro Theſau-
rario. Ad D. D. Andræam Lau-
rentiam Henrici IV. Gall. & Na-
uarræ Regis Archiatrum, conf. 36
fol. 126
De ulcere renis, conf. 37. fol. 127
De Abſceſſu renis & uteri pro-
lapſu, conf. 38 fol. 129
De hepatis intemperie, conf. 39.
fol. 130.
De Affectibus hystericis & hypo-
chondriacis, conf. 40. fol. 131
De dolore brachij, conf. 41. f. 134
De hepatis & partium aluina-
rum phlogoſi, conf. 42 fol. 135
De Epilepticis conuulſionibus &
rudimentis Apoplexiæ, conf. 43. ad
Remp. Veneram de Legati morbo
miſſum. ibid.
De latente pulmonis & hepatis
intemperie, & alijs affectibus,
conf. 44. fol. 138
De Iſchiade, conf. 45. fol. 140
De raucitate & affectu rheuma-
tico, conf. 46. fol. 141
De affectu oris qui τῶμαχις δι-
citur pro Oeconomo D. Britannici,
conf. 47. fol. 143
De Tuſſi permoleſta pro D. Flo-
rette Conſule, conf. 48. fol. 145
Pro iuvene melancholico cuius
mentem mæror percalit, & de ſuo
ſtatu dimouit, conf. 49 fol. 146
De incontinentia urinæ & ſtilli-
cidio inuoluntario poſt lithotomiā
pro filio D. Machau, conf. 50
fol. 148.
De Cachexia cum faciei pallore
& ſymptomatis hypochondriacis,
conf. 51. fol. 149
Ad mulierem recens nuptā Epi-
lepticis conuulſionibus afflicta,
& affectu qui σπαιμότρεμος vo-
catur, conf. 52. fol. 151
De urinæ incontinentia, conf. 53
fol. 153
De profluuiio veneris non vene-
reo, conf. 54. fol. 155
De febre aſſidua cum grauibus
ſymptomatis, conf. 55. fol. 158
De febre lenta, & tumoribus
glandularum gutturis ſtrumam
minitantibus, conf. 56. fol. 160

INDEX.

De contumacibus ruboribus post
exanthemata, conf. 57. fol. 162

De serpigine, specie tineæ & pi-
tyriasi, conf. 58. ibid.

Pro filia D. Habert cui tumores
in collo & ulcera in gingivis sobo-
les diatheeos strumose, conf. 59.
fol. 163.

Ad ardorem urinae, & reli-
quias antiquæ Gonorrhoeæ, conf.
60. fol. 165

De Satyriasi, conf. 61. fol. 167

De vertigine & symptomatis me-
lancholicis & hystericis, conf. 62.
fol. 168

De morfu canis rabidi, conf. 63
fol. 169.

De affectione hypochondriaca pro
Angenosij uxore, conf. 64. fol. 171

De cholera morbo, conf. 65. f. 173

De febribus diarijs hecticæ pro-
dromis, & rene purulento, conf. 66
fol. 175.

De rheumatismo, conf. 67. f. 177

Pro D. Monbeliart dysuriam &
stranguriâ patiente, cōf. 68. f. 179

Pro D. des Broses tussiculoso
phthifico, conf. 69. fol. 181

De Arthritide, lumborum dolo-
ribus, & alijs affectibus, conf. 70.
fol. 184.

De febre assidua cum sympto-
matis paraphoricis, catarrhoicis &
cataphoricis, conf. 71. fol. 186

Pro muliere sterili fluxu mulie-
bri laborante, conf. 72. fol. 189

De ruborenarium, cōf. 73. f. 190

De quodam vomitu patiente
cum ventris tormine, cōf. 74. f. 191

Pro fluxu dysenterico & mesente-
rico, conf. 75. fol. 192

De tumore hepatis seu fermenta-
tione, conf. 76. fol. 193

De Auditu imminuto qui Bæ-
xolæ & Avomolæ dicitur, conf. 77.
fol. 194

De Melancholia hypochondria-
ca pro muliere hystERICA, conf. 78.
fol. 195

De doloribus hystericis & hypo-
chondriacis, conf. 79. fol. 203

Pro Notario paralytico alii-
quid patiente aut potius laxatio-
nem, quandam articulorum ipsa-
rum omaplatarum, cōf. 80. f. 207

Pro Domina de Boissy ischiadi-
cos dolores patiente, conf. 81. f. 216

De Stranguria, Dysuria & Is-
churia, conf. 82. fol. 217

Ad fluores muliebres pro D.
Præposita, conf. 83. fol. 220

Pro Iacobo Mæmmico raucitatem
conquerente, conf. 84. fol. 221

Pro D. du Breuil Cephalalgiam
patiente, conf. 85. fol. 222

Pro muliere Carnotensi febre
lenta laborante, conf. 86. f. 223

De tinnitu aurium, conf. 87.
fol. 225

De Cachexia pro uxore Gaij,
conf. 88. fol. 226

De tussicula & spirandi diffi-
cultate cum suffocationis metu,
conf. 89. fol. 231

Pro muliere Issodunensi splenica
cum metu hydropis, conf. 90. f. 233

Pro uxore Consulis de Goussen-
court quæ à duobus annis ter aut
quater

INDEX.

- quater passa est effluuium sanguinis sursum deorsum, conf. 91. fol. 234
- De affectione quæ dicitur Ἰππός, conf. 92. fol. 236
- De dolore capitis & oculorum, conf. 93. fol. 238
- Ad Gonorrhœæ reliquias, conf. 94. fol. 239
- De fluxu sanguinis, & fluore muliebri cum suspitione cancrose in utero affectionis, conf. 95. fol. 240
- De voce penè deperdita, conf. 96. fol. 242
- De tussi molesta & spūto cruento, conf. 97. fol. 244
- De alui fluore hæmorrhoidibus, & alijs affectibus pro vxore Anglorum Legati, conf. 98. fol. 248
- De hepatis & pulmonum calida intemperie cum rotius corporis extenuatione pro D. Iudith Memmæa, conf. 99. fol. 253
- De Aphthis in ore & calida viscerum intemperie, conf. 100. fol. 256
- De vertigine, conf. 101. fol. 258
- Ad impediendum abortum pro filia D. Monglat, conf. 102. fol. 259
- Ad fluorem muliebrem, conf. 103. fol. 260
- ibid. fol. 260
- Ad molestos herpetas & serpiginem cum fursure & squammis, conf. 104. fol. 260
- Ad tumorem genæ lupiam minitantem, conf. 105. fol. 262
- De intemperie omnium viscerum calida ad elephantiasim accedere, conf. 106. fol. 263
- De hydropæ, conf. 107. fol. 265
- De fluoribus albis & alijs affectibus, conf. 108. fol. 267
- De doloribus capitis & ad hepar & ventrem, conf. 109. fol. 268
- Al luem veneream incipientem, conf. 110. fol. 269
- De vermibus, conf. 111. fol. 271
- De Arthritide, conf. 112. fol. 272
- De calculosa affectione, conf. 113. fol. 273
- De cachexia, ictero & alijs affectibus, conf. 114. fol. 275
- De pulmonis calida intemperie, conf. 115. fol. 276
- In hydropis metu, & pulmonis hepatisque latente vitio, c. 116. fol. 277
- De calculo renum, cōf. 117. fol. 278
- Pro muliere ad conuulsiones epilepticas prona, conf. 118. fol. 281
- De inordinatis mensibus & vterâ quodam rheumatismo & alijs affectibus, conf. 119. fol. 283
- Pro Consule iam rudimenta Apoplexiæ experto, conf. 120. fol. 285
- De ulcere inguinis & tumore, conf. 121. fol. 286
- De urinae incontinentia, conf. 122. fol. 287
- De dolore thoracis & cervicis, conf. 123. fol. 289

FINIS.

MARCO MYRONI

ARCHIATRO REGIO

GVL. DE BAILLOV. ED.

Hæc Episto-
la ex libro
Epistolarum
Medicina-
lium Ballony
notum edi-
to excerpia,
præfigi de-
bet libro de
Convulsioni-
bus. Anno
1640. edito.



VM circiter idus Octobris impetrata ab Rege
essent literæ, quibus ego in numerum medico-
rum Regiorum cooptarer, libellum de Convul-
sionibus conscribebam. Ita enim quod otii super-
est à publico munere, in honestum otium con-
fero. Magnam me hercè ex his in etis regie munificentie ob-
sidibus voluptatem cepi. Sic enim & facta est mihi adeundi
tui potestas, & ad maiora Regio munere stimulus est adi-
tus, cum hos ad egregia inuitamentum esse soleat. Nul-
lus enim adeo humanitatem exiit ut non sit mulo glorie in-
stigeretur. Quod fecit ut multi per se cogniti viri sua industria
alijs clariore loco natis præluxerint, eorumque luminibus ob-
struxerint. Quamquàm is non solum qui rumusculos inanes aucu-
per, cum id pertineat potius ad hominem malè feriatum,
sue leuitatis testimonium vndique colligentem. Et si is es qui
te multis præstes affabilem, tamen ab aditu nescio quid me
reuocauit. Humanitatis spes allaciebat, sed quædam grauitas
quæ præsidem sanitatis Regie decet, retardabat. Cum te se-
mel sum allocutus, sensi istam grauitatem ita conditam ac
temperatam, ut quantum grauitas detraxerit tantum huma-
nitas conueniendi tui desiderium iniecerit. Ac mihi persuadeo
hunc libellum ingenii mei tamquam sortum, gratum tibi fo-
re, quando te ita facilem mihi præbueris. Eoque libentius
obtuli, quod is tunc scriberetur, cum gratiosi quidam homi-
nes apud Regem, de Regie liberalitatis fonte hunc rinulum
in me deriuarunt. Tuum suffragium quærebatur, ne donum
hoc homini incognito conferretur. Nomen meum edidisti, &
fidem meo nomine datam liberaisti. Nam vir ingenuus es & pru-
dens. Nam æstimatoris commodis & incommodis aulicæ vitæ
generis, quod non est ita tranquillum ut nostrum, me regio

munere, tanquam aura benigniore excitatum repressisti, ita
tamen ut de spe non deijceres. Hæc ita temperasti, ne spe ina-
ni illectus, maiora mihi opinionis errore affingeres. Felici-
ter cœpta res est, sed ut perficiatur, te etiam rogo. De libro id
dicam. Non offero aliquid oculis tuis dignum tamen qui meus
in te sit animus, ex hoc munusculo colliges. Quaestionem tra-
ctamus quæ multos exercuit. Si lima non est adhibita nec ser-
uatus ordo, in causa est nostra scribendi diligentia intercisa
ac interrupta, ut sæpè media pagina reuocatus hæserim. Hic
tamen tibi multa in memoriam reuocabuntur quæ tempore
exciderunt. Sic in picturis quædam rudi carbone delineata re-
fricant memoriam eorum quæ in tabulis tersè ac artificiosè de-
picta sunt. Sic legendis nostris iucunda erit, tibi grauioribus oc-
cupato, olim & lectorum & obseruatorum recordatio. Habeo
multa opuscula quæ in nonum annum premo, quæ cum ma-
turerint in lucem succo prægnantia iucundo efferentur. Fa-
xit Deus ut diutissimè Rex suo Myrone utatur Medico &
Consiliario. Vale. Lutetiæ Parisiorum die 16. Octob. 1582.



APPROBATIO.

Ego subsignatus Doctor Medicus & Decanus saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis, testor Consilia hæc Medica, & paradigmata à Magistro GUILIELMO DE BAILLOV Doctore Medico Parisiensi & Decano celeberrimo, eruditâ oratione & summo iudicio conscripta, atque à M. IACOBO THEVART, Collega doctissimo digesta, & observationibus aucta digna esse quæ typis mandentur. Datum Parisijs Calendis Octobris Anno post Christum natum millesimo sexcentesimo, quadagesimo octauo.

PERREAU DECANVS.

AD CANDIDVM LECTOREM.

Nil opus Autoris laudare volumina nostri,
Hoc opus autorem laudat, hic autor opus.

I. THEVART, D. M. P.


GVIL



GVILLIELMI
BALLONII
MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI
CONSILIORVM MEDICINALIVM,
LIBER TERTIVS.

CONSILIVM PRIMVM.

De Capitis dolore, & Vertigine.



ANGLVS annos natus 46. dolore capitis periodico iampridem laborabat, aliàs hemicrania est, aliàs cephalalgia, & hæc frequentior: Ita morbus diù afflixit, vt inueterauerit ac confirmatus sit: quærit à nobis vt dolorem malùmque leniamus, quandoquidem radicitùs euellere potis non est, nec quisquam vllò remedio sublatum iri credit, nisi fortè ætas ipsa remedium fuerit. Biliosus enim valdè est, & æstuantia habet viscera, vnde euenire potest vt successu temporis bilis defferuescat, & non ita acris generetur. Ita enim Hipp. morbos *συνήκους* in senectâ desituros credidit. Id quod Gal. de affectionibus calidis intellexit.

*Gal. com. in
part 6. sect. 5.
lib. 6. Epid.*

A

2 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Antequam autem capita perstringamus quibus nos opitulari posse tam pertinaci & rebeli dolori credidimus, nonnihil de capitibus affectionibus paulò generalius præfabimur. Duo autem, aut tria perstringemus, quorum vnum ab instituto paulò erit alienius, sed tamen quasi ex euentu tractandum occurrit.

Partiū principum affectiones etiam leues non sunt negligendæ.

Primum est, quanti sit momenti affectio capitis etiam leuis, si spectetur pars laborans non causa doloris efficiens.

Secundum, an facultatis animalis consideratio sit in morbis necessaria, & quatenus.

Locus hic diligenter legendus quoniam & ad diagnosin, & ad prognosin maxime pertinebit.

Pro tertio, quoniam Galenus in morborum acutorum vigore tanti facit facultatem animalem, id quod tamen nonnullis parum probabilè videtur, videndum quatenus id verum esse possit: nam mentionem sumus facturi de quadam Galeni autoritate ex qua constare potest grauitatem affectionum æstimandam esse, aliàs ex dignitate & principatu partis, aliàs ex magnitudine causarum morbum efficientium. Vt si quod symptoma ἐπιγενόμενον contingat per augmentum causæ morbificæ, illud augmentum consideremus aliàs ex humorum vi & magnitudine, aliàs ex natura & conditione partis laborantis, vt quod magna aliqua causa in parte minùs præcipua facit, in principe parte minor causa par & idem committat, & eiusdem momenti. Totum autem hoc eruetur ex commento quodam in 1. prognosticon.

1

2

In phrenitide delirium malum vt essentialiale & pathogn. in aliis morbis vt ἐπιγενόμενον.

Postquam locutus est de iis qui in febribus falsis obiectis moti festucas colligunt, muscas venantur, gesticulantes manus ad os & oculos ferunt, vnum valdè commemorabile adstruit. Nam hæc aut in phrenitide, aut ardente febre, aut peripneumonia, aut capitis dolore contingere ait, sed alia atque alia horum ratio est. In phrenitide enim hæc sunt mala & essentialia & pathognomonica, & ideo sunt perniciofa, quia pars princeps laborat; in aliis autem affectibus sunt ἐπιγενόμενα & magnitudinem causæ morbificæ sequuntur. Nam symptoma superueniens non oritur nisi aucto malo, vt singultus non ex quauis inflammatione hepatis sequitur, sed ex ea magna & graui, & ita de cæteris. Sic in peripneumonia, dolore capitis, ardente febre non hæc eueniunt, nisi cum affectionis causa increuerit. Id quod Gal. his verbis explicauit, meritò igitur affectiones talia committentes, id est inducentes errorem mentis & partis imaginantis, vt inde gesticulatio manuum, muscarum venatio, & festucarum collectio consequatur, censentur difficiles, græcè χελεπαὶ quippe quæ febris acuta, aut

LIBER TERTIVS.

peripneumoniæ, aut doloris capitis sequantur magnitudinem, addit codex græcus τῶν χειρῶν ἐργαζομένων, id est humorum committentium eas. à phrenitide quidem, quia pars princeps est affecta, cuius vniuersum genus exitiale habetur, à febre verò dolore capitis & peripneumonia, ob magnitudinem (inquam) humorum committentium eas affectiones.

Sic in phrenitide habet rationem τῆς ὀπίσθητις, in dolore capitis, peripneumonia, febre acuta τῆς προίτις, id est in phrenitide, vt & in morbis partium principum dignitatem & principatum partis obseruat, in aliis morbis vim ac potentiam humorum: quamquam in phrenitide obseruatio humorum non est differenda, nec negligenda, sed in alijs morbis quid materiale cernitur, in partium principum morbis, quæ pars: nam exigua causa magnos quosdam affectus producit in parte principe, vt de vulneribus capitis statuit Hipp. cum nullū etiā nullū leue capitis vulnus negligi debere suadebat. Vnde illud est Hippocratis memorabile: *Parua causa medelis exoluitur nisi quid circa locum principalem affectum fuerit.* Nam vbi vitium est in parte præcipua, sæpè non est tam laborandum in euacuando, quàm tollendo partis vitio. Id & in morbis longis & acutis obseruari debet: de acutis hîc dicitur, de longis dicam: Tanti momenti est pars & vitium partis dominatum in corpore habētis, vt longitudo morbi sit ei accepta ferenda. Sunt enim morbi diuturni tribus modis, vitio partis, culpâ ægri, coctionis difficultate. Difficultas coctionis ob humoris copiam, naturæ imbecillitatem, & meatuum angustiam. Galenus de apoplexia loquens, quæ dies septem non præterit, ait, partes principes non diu ferunt fortes simul ac diuturnas passionēs, immò à paruis causis impendiò magis læduntur, nedum à grauibus, vnde non mirum est si vbi delirat quis & nimium cerebro perturbato afficitur, terreatur vulgus, Medici non ita terrentur, præsertim cum perturbationis mentis causas, alias ab alijs secernant: quanquam dicat quis quid attinet si quis benè aut malè in febre ratiocinetur? nihil enim ad curationem attinet quanquam in vniuersum ab Hipp. est pronuntiatum: In quouis morbo mente constare bonum, & benè se habere ad ea quæ offeruntur.

Nunc itaque alias quæstiones explicemus, quid & quatenus conferet facultatum animalium obseruatio in morbis. Apud Galenum locus est qui multos hactenus torsit, neque enim putant omnino verum esse morbo consistente nec purgationi, nec venæ

Lib. de præcept. sub nem.

Morbi longi vitio partis, culpa ægri, & coctionis difficultate.

Comm. ad aphor. 5. lib. 6.

4 CONSILIORVM MEDICINALIVM

sectioni intendendum esse, quia tunc maximè concoctio fit. Circa
 « initium melius est minuere materiam, quò natura cætera faciliùs
 « euincat. Cùm morbus consistit, nil opus est euacuare, dum natu-
 « ra iam concoquit, tum ob alia, tum quia vis animalis maxima ex
 « parte laborat, & fatigata est, græcè *κεννηκυία τῆς δυνάμεως*, li-
 « cet naturalis & vitalis fortis persistat.

*ut animal
 subsistat tria
 necessaria, vi-
 ta, nutritio,
 & respiratio.*

7. Meth.

*Bene valen-
 tibus cerebro
 opus ad actio-
 nes volunt.
 non ita cum
 egrotamus.*

*Ad part. 5.
 lib. 2. prorrh.*

*Germana ex-
 plicatio, loco-
 rum Gal.*

At quorsum mentio fit de facultate animali? quorsum sensus?
 ratiocinatio memoria, phantasia? motus? nam licet æger maneat
 immobilis, nil propterea deterius illi contingit. Est enim facultas
 naturalis morborum coëtrix & maturatrix: at ratiocinetur quis
 vel non, moueatur necne, nil attinet, at respiratio & sensus neces-
 sitatis sunt alicuius: respiratio vero ad vitalem facultatem quo-
 dammodo refertur, vt autem animal subsistat necessaria sunt hæc
 tria, vita, nutritus, respiratio. Ad vitam ipsam respiratio refer-
 ri debet, nec enim voluntaria omnino actio est, vt nec pulsus. Fit
 enim *καὶ ὁ ὄρμην* non omnino *καὶ ἀεγίσειν*. Cæterum Galenus
 parui facere videtur facultatem animalem. Cùm *valemus*, ait, *ce-
 rebro opus est ad actiones voluntarias non ita cum egrotamus. Ad
 vitam cor & cerebrum par momentum habent, sed non idem in
 morbis.*

Quò pertinet locus præclarus in prorrhethico. Cùm *virtus sine
 manifesta euacuatione imbecilla fuerit, duorum horum alterum esse
 oportet, vel enim grauius copia ostenditur, vel vnius principiorum
 intemperies ac naturalis & vitalis virtutis imbecillitas est deterri-
 ma, & citò hominem tollit: vna enim cum his animalis exoluitur, sed
 si quæ facultas in cerebro residet, afficitur, non protinus cor afficitur.*
 Quo ex loco demonstratio & illustratio eorum quæ hîc dicuntur
 erui elicique potest.

Cæterum vt tandem luce quadam allata aliquid concludatur,
 his nos cancellis orationem nostram coërcemus. In corpore no-
 stro est *πυρρίαις*, & *τόνους* quidam vt animal subsistat nec sua mo-
 le obrutum ruat, aut dissolutum cadat ac prolabatur. Est enim har-
 monia quadam & contentio omnium virium, vt chordarum in
 lyra: hæc si dissoluitur malè se res habet. In vigore morborum fa-
 cultas naturalis coëctioni dat operam, vitalis afficitur & laborat, &
 exsuscitat, opitulaturque naturali laboranti: restat animalis, huic si
 vis aliqua inferatur, aliquid deterius continget: nam duabus prio-
 ribus laborantibus, saltem animalis aliqua ex parte integra inco-
 lumisque maneat, licet autem quod pertinet ad ratiocinationem:

LIBER TERTIVS.

& motum progressiuum, nō ita necessaria sit animalis facultas, ad respirationem & sensum facit, & ad conseruationem istius *συ- τοιας* valet. Ideo Hipp. *In morbo mente constare bonum, ait*, licet nil sit necesse ratiocinari febricitatem. Bonum autē signum est & causa, quia cūm respiratio ab ea facultate pendeat, cūm libera est illa respiratio voluntatis, & instrumentorum integritatem significet cum mediocritate vsus coniunctam, vt causa autem valet, quia vsui & necessitati satisficiat: quanquam autē diximus respirationem cum vita coincidere, & ad nullam particularem actionem referri; sed ad vitam solam.

Hipp. in Aph.
Mente constare in omni morbo bonū.

Mentio quoque facta est de sensu. Hic in morbis est pernecessarius, nec enim sine irritatione quadam crisis fieri potest, si autem facultas sensifica laboret, natura non sentit punctiones & calcar ipsorum humorum, vnde frustrata crisi sæpè succumbit & opprimitur.

Facultatis sensifica lesio efficit vt natura frustra sita crisi sæpè succumbat.

Sunt qui ita conciliant locos istos contrarios, fatentur quidem verum illud esse Gal. in methodo medendi, ventriculi & iecoris, denique facultatis naturalis ita opus & munus esse necessarium vt, sine iis salutaris coctio esse nequeat sed in morbis thoracis vt in pleuritide, peripneumonia, & ceteris id genus, maiorem quandam esse necessitatem facultatis animalis quā naturalis, hīc tamen distinctione opus est. Nam etiamnum in istis morbis est quadam prerogatiua & efficientia facultatis naturalis, humor enim coqui & pręparari exclusioni debet, quod ab energia facultatis naturalis pendet. At vt foras coctus humor & quasi putrefactus excludatur, viribus & laterum firmitate opus est, id autem est ipsius facultatis animalis: sed talis functio cum ipsa respiratione coincidit vt semper sese eodem quæstionis solutio referat ac reuoluat: hæc autem paulò subtiliùs explicata sunt quā vt Medicum deceant, qui in artis operibus potiùs quā subtilibus disputationibus exactiorēque actionum examine suam industriam ostentare debet.

Lib ij. Meth.

Hæc autem de facultate animali obiter tractauimus, vt plus tamen temporis & operæ insumpserimus quam nec crederemus: eò autem lubentiùs fecimus, partim vt nostrum quoddam quantum est fallentes & lenientes otium, nobis ex aliqua parte faceremus satis, partim vt labore leuaremus eos quos hactenus ea quæstio exercuit de necessitate facultatis animalis in morbis. Nunc ad nostri agri dolorem capitis demulcendum veniamus. mauult enim sibi simpliciter prouideri ac consuli, quā rebus ad exactius

A iij

6 CONSILIORVM MEDICINALIVM

examen disputando reuocatis, interea nostram manum auxilia-
rem postulare.

§.
*Deliberatio-
nis & cura-
tionis Capita.*

Tria concurrere videntur quibus doloris tam frequenter re-
deuntis causa assignari potest, plethora particularis ipsius cerebri,
cui, assiduitate dolēdi iuncta est iam, ἡ διάθεσις κεφαλᾶς καὶ: visce-
rum intemperies, acerrimæ bilis & calidorum exhalationum pa-
rens: Tertium acuties ipsius sensus, potissima tantorum dolo-
rum (quod attinet ad naturam suscipientis partis) occasio.

*Com. ad part.
5. lib. de nat.
hum.*

Doloris assiduitas caput infirmius reddit minima occasione læ-
di facile, immò quia pars ægra & dolens suam quodammodo na-
turalem œconomiam peiorem habet & immutatam, proprium
alimentum est oneri. Vnde Galenus ait, eos qui capitis dolore
frequenti sunt obnoxij, capite infirmissimo esse, & eas partes
alioqui imbecillas repletio quaqua versum distendens dolorem
concitatur.

*Lib. de sacr.
morb.
Vide aliam
Hipp. ea dere
demonstra-
tionem cum
agit de 40.
num. 1.*

Hipp. hanc sensus acutiem, à prima origine repetit, dum etiam
in utero natura partes defæcat atque repurgat, vel supra modum,
vel infra, vel intra modum. quo autem purius cerebrum & defæca-
tum magis, eò hominem sapienterem reddit, sed tantum bonum
compensatur quodam malo. dùm hac ratione mutationes aëris fa-
cilè persentiscit. vnde illud Hippo. *Cerebrum plurimam vim habet
in homine, hoc enim eorum quæ ab aëre fiunt interpret est si sanum
existat.*

6.
*In pueris &
quid contin-
gat sub finem
lib. de sept.
partu. ἀν-
θρώπων ἐν
ταῖς μέλαις αἰ-
σθησίαις ad
part. 11. lib.
1. prorrh.
Gal. cap. 11.
lib. de ther.
ad Pif. idem
narrat de
quodam, so-
dali, qui etiā
in lecto aëris
mutationes
persentiebat.*

Et cùm cerebrum in homine inter cætera animantia insignem
magnitudinem habeat multas & varias neruorum propagines non
sæpè totum dolet, sed aliàs antica, aliàs postica parte; aliàs fini-
stra, aliàs dextra; prout pestifera vis morbi sese huc aut illuc incli-
nauerit.

Cæterum ad dolendi facilitatem facit assidua agitatio actioque
animi, quæ humores rapit sursum, inflammat. Quandoquidem as-
sidua cogitatio occæcat & corpus infirmum reddit, Celsò, vnde
magna pars vrbiorum, & studiosorum imbecillo est ventriculo.
*Ij quippe, ait, valetudinarij viuunt qui corporum suorum robora in-
quieta cogitatione, & assidua vigilia minuire cōsueuerunt.* Sequitur
enim illud quod eleganti verbo vocatur ab Hippocrate cerebri
ἀνάλωσις, id est consumptio, quæ iis maximè contingere potest
qui pertinaciùs res & cogitant & tractant.

Vt consulatur vtrique plethoræ, & particulari & vniuersali,
licet sæpiùs sanguis detractus, tamen circà ver & autumnum

LIBER TERTIVS.

7
potest detrahi, nisi fortè à detractione deterius habeat, vt cum purior & biliosior sanguis erit, sanguis enim bilem frænare ab Aui-
cenna creditur.

*Sanguis fræ-
num bilis.
Aui.*

Potest & obstinato magis malo arteriotomia decerni, & cum
redit dolor, est velut accessio febrilis maximè existente febre par-
ticulari & veluti capitali.

8.

Aluus sit mollior: quibus enim est eiusmodi, ij nec pleuritide,
nec magnis aliis morbis capiuntur, ait Hip. Concinnanda opiata
laxans vel cassia deglutiatur superbibito foliculorum decocto.

A validioribus est temperandum, quia corpus impendiò magis
incalcesceret & ageretur: at humorum tranquillitas & quies co-
rumdem perturbationi & seditioni est præferenda.

9.

Si hæmorrhagia, aut seta porcina aut myrefolio, aut alia arte
irritari posset, id porro optabile foret. Hirudines quoque ponè
aures applicabuntur & frequentes cucurbitulæ.

Ad sensus acutiem veteres non reformidant Sopientia & foris
admota & assumpta: Et foris conserua nenuph. & viol. cum se-
mine lactucæ, lintea in lacte repente macerata, & fronti sub inde
admota; immò cataplasma vulgare, & ex mica panis.

*De prudente
usu Narco-
ticorum Gal.
multa. comm.
ad part. 5.
sect. 6. lib. 6.
Epid. Et Bal-
lon. lib. 1. con-
sil. conf. 65.*

Dolor capitis incipiens emplastro astringente mitigabitur. Id
docet frontale puerorum capiti applicatum, quod strictius addi-
tum, dolorem repellendo compescit. Est enim frons pars maximè
excipiens, occiput mittens. Vsurpato ad tempus emplastro astring-
gente, digerente vtendum ex floribus viridibus chamæmeli, he-
deræ terrestres; vesica suilla lacte, vel aqua semiplena, vel pul-
lus per medium sectus admouebitur. Nares illinendæ oleo de se-
mine cucurbitæ, immo aliquid narcoticum in aurem immitten-
dum dolore sæuiente: intus syrupus nenuph. hordeata cum semi-
nibus stupefacientibus: Quæ temperant & pinguefaciunt sangui-
nem & crassiores reddunt, iuuant. Decoctum pedum & cru-
rum vituli, pisces, lactucæ. denique omni arte humectandum,
quia humiditas sensum ipsorum spirituum obtundit.

Inedia inutilis immo malefica est, ventriculus enim repletur
per ieiunia ichoribus, qui suffusiones & dolores capitis magnos
excitare solent. Iuuabit interdum frigidam sæpè ore continere,
immo omnia quæ assumpta sunt in pastu frigida aqua includere,
ait Celsus.

*Gal. ad fræn-
cap. 9. lib. 6.
de sanitate
tuenda.*

Vitare piperata, condita, odorata. Zithum, id autem maxi-
mè ad sanitatem facit non bibere vinum, nisi hausto in sculo,

*Vinum ieiun-
nos bibere
notitia in-*

8 CONSILIORVM MEDICINALIVM

uentio inuti-
lissimum.
Plin. cap. 1.
lib. 23.

aut cibis satis abunde præsumptis.

Haurire serum lactis æstate.

Frequens vsus conseruar. nen uph. cichor. violarum ros. ad-
dito papauere albo.

Vinum aqua hordei frangendum dum domi viuet.

Errhina vitentur nisi velit mane aquam repentem nare attra-
here.

Friçtio capitis est vbi iuuat, est vbi obest. Student omnes ca-
put siccare in biliosis, & iis quibus caput biliosius & æstuantius
est, nocet: non ex parte ipsius cerebri, sed ex parte membrana-
rum eius & pericranij, frequenti enim friçtione caput & siccus
& minus perspirans redditur.

Vitet odorata.

De lotionie capitis, de balneo, de pedum lotionie iudicium
porro adhibendum.

Lotio capitis ab antiquis vsurpata, à nostris intermissa, immo
omissa, quia facilè peccatur in lotionis vsu, si modò prudenter
administretur, plurimum auxilij est allatura.

Lexiuuium sit potius ex his quæ laxant & temperant.

Galenus locus
notandus. 4.
acut.

Hipp. 3. acut.
inter balnei
dotes ait
grauitatem
capitis bal-
nei vsu tolli
& inuari ad
part. 58. lib.
3. acuto.

Frequens balneorum vsus aquæ egelidæ odore & fumo ca-
rentis (quanquam ita Galenus canonem prudentiæ adhibet) ca-
pitis solius caliditate quouis alio modo habentis balneum iuuat:
cum vero spiritus flatulentus ob humorum prauitatem ad caput
fertur, hos lauare non conuenit, ac si dicat, si localis est affectus
in cerebro, iuuat lotio. si à toto corpore, disconuenit Pipionum
applicatio in partes diuisorum vrgente dolore confert. Vide an
hæc Galen. de balneo opinio vera sit. Sed quia æger quodam-
modo podagrisat, ut ita loquar, & imbecillitatem habet pedum,
cautiùs agendum, de istis malis ita videbitur.

Ligatio tibiæ astrictior omnino vitetur.

Spongiæ imbutæ decocto parato ex vino, addita rosa: sumach,
nuce cupressi applicentur pedibus.

Item facculi ficci. Emplastrum palmeum. tritico calefacto pe-
des imponuntur.

An vomitus conferat experiendum, nam caput replet.

Veneris sit vsus moderatior, & quem languor non excipiat,
nam venus maximè capiti & generi neruoso officit, corpus infir-
mius reddit, & ad resistendum morbis impotentius: ideo Hipp. à
coitu hominem imbecillimum reddi credidit quod ab homine
exeat

exeat fortissimum. semen autem est, deinde in coitu homo quasi ex homine exilit, ait Plin.

Pilularum communium frequens vsus esto.

Syrupus paratus ex succis oxalid. pomorum limonum malorum aureorum, bugloss, borag.

Vltimus hic sit conseruandæ tuendæque sanitatis canon quem Celsus eleganter descripsit.

Cum omnibus sit inutilis post cibum aut contentio, aut animi cogitatio, tum iis præcipuè qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueuerunt, vel quolibet oris affectus; vitari etiam grauedines distillationesque possunt, si quam minimè eum qui his est opportunus, aërem, loca, aquasque vitet, si caput in sole protegit ne incendatur neue subitum exrepentino nubilo frigus id moueat, si post concoctionem ieiunus caput radit. si post cibum neque legit neque scribit.

ANNOTATIONES.

1. Maxima pars anglorum rufi est capillo, vel quod artificio mangonioque id fiat, quod in naturam tandem mutatum est, fluxionibus calidis & biliosis in articulos obnoxia est, hæc autem calidioris temperamenti sunt argumenta: quod ad actiones attinet sunt prompti, agiles, acuti, superbi, elatique animo, & tamen regio illorum est valde frigida, credo id esse à diæta, nam multa carne vtuntur zytho fortiori, generosis vinis & piperatis, aut cinamomo conditis; hæc omnia bilem generant immo affectiones cholericas, unde apud Hipp. De Biantie pugile vorace, experiebatur affectiones cholericas bile sursum ac deorsum exeunte ex carnis esu, (ait Hipp.) maximè utebatur porcinis, crudis, vinis odoratis, dulciariis, polenta, ita viuunt Angli. Vnum autem notandum de Britannis, idest Anglis Apud Cæsarem in comm. Ii succo Erythrodani faciem & pilum insucabant, vt in bello essent horribiliores: hinc forte ruforum capillorum hæreditas ex instituto ad naturam conuersa est, vt de Macrocephalis notat Hipp. & Arist. prob. 2. lib. 38. quærit cur piscatores qui mare incolunt, & septentrionales plagas, rutili sint capillo. De iis autem idem dici potest quod de Scythiis dixit Hipp. quorum aër est frigidus valde, Scythæ fului sunt ob frigus ingens, non vehemens sol ad eos accedit, à frigore vero albedo exuritur & fit fulua.

7. Epid.

Cap. x. de aer.
loc. & aquis.

B

10 CONSILIORVM MEDICINALIVM

2. Inter eos qui ita delirant vt festucas colligant & muscas arceant abigantque, quidam aliter atque aliter affecti sunt: Nam quatenus falso sibi persuadent festucas & muscas adesse, quæ non adsunt, eatenus imaginatio laesa est, quatenus verò conantur aut colligere aut nocuias muscas abigere, vt quæ nocere possunt eatenus ratiocinationis vis nonnulla relucet, bene enim in eo ratiocinatur quod omne nocivum expelli debet.

3. Vnde in omni febre est videndum ac providendum ne vis febrilis cerebrum occupet, cum enim pars sit magni momenti vbi semel affecta est non nisi cum ægotantium dispendio est affecta.

4. Bonum est in quouis morbo ratiocinari, non quod proinde æger conualescat: sed ait Gal. in comm. illius aphorismi & bonum & malum intelligi debet quantum in ipso est hoc aliquid. Nam quod ad vitam aut mortem attinet oportet omnium signorum vires perpendere.

5. Locus est admirabilis lib. de carnibus Hippocratis, vbi agit de cerebro, atque pinguedinis parum habere multum glutinosi & ideo non facile exuri posse id ad morbos cerebri plurimum valet.

6. Contra locum istum de sacro morbo alius est contrarius plane lib. 1. de dicta vbi ait corpus maxime sanum esse & mutationibus non obnoxium, aëris & temporum, si habet suum temperamentum ex rarissima parte ignis & ex tenuissima parte aquæ. Eos sanissimos ad quadraginta annos viuere aiunt, & iis morbis tolli qui circa talem annu quadragesimum prehenderunt quomodo ex tenuissima parte aquæ & tenuissima ignis cum sit facilis effluxus, ita sanum corpus licet aestimare.

7. Verum quidè illud Galen. cap. trigesimo sept. lib. ad Trafsyb. quod cogitatio & vigilia magis quam somnus intellectum perspicacem reddat, vnde illud, Crassus venter mentis acutiem non facit sed omnia tanto mediocria, nam notandum illud Hipp. ad finem 2. de dicta. acut. pertinax vigilia cibos crudos & ἀπένδῃ reddit, Crudos qui coquantur quidem cum tempore, ἀπένδῃ verò qui vix nature gratiam recipiant, & inter cætera animaduerti debet quod sedula oculorum in rem aliquam attentio necnon ipsius animi vertiginosos homines reddit, vt ex Theophrasto, ferè sub finem libelli de vertigine apparet.

vide comm.
Ballonij in
lib. Theophrasti de
vertigine.

Sed si cui est animus inquiet, & qui opere pascebatur & delectabatur, is non statim ab opere summoneri debet, sed amica consolatione lenandus est & aliquid sufficiens quod in otio negotium solitum nullo egredi dispendio, suppleat, animum enim sedulum & actuosum

cessare morse est.

De labore mentis *Arist.* in posit. duo sunt genera laborum. unum violentum alterum naturale; naturale, visus labor, auditus, vocis, curarum. De visu ita anima in id quod videtur intenta mouetur & calefacit, calefacta humido euacuato siccatur per auditum allabente sono anima concutitur ac laborat laborans calefit & siccatur.

Sequitur post de cura locus perbellus 2. de diæta, unde illud *Plinij*, cogitatio assidua occæcat, abducto intus visu: hic locus erit pro vertiginibus.

8. Ad hunc scopum locus est *Galen.* observandus cap. 9. lib. 6. sanitatis tuendæ, sunt, ait, capita quædam quæ ob arteriarum temperamentum, in vertigines & capitis dolores incidunt. Nota, illud arteriarum temperamentum, his ait, arterias aperire conuenit: illo loco agit de inæquali intemperie; inæqualis enim intemperiei magna vis est ad morbos generandos & curandos: bisariam autem interpretari possit quis intemperiem inæqualem, vel quod sit calidi & frigidi quædam inæqualitas, ut quædam partes sint iusto calidiores, aliæ frigidiores, nam fateor cerebri parenchyma esse frigidum arterias plenas sanguine arterioso & feruentiore, unde cum temperamentum cerebri cum arteriarum & sanguinis, in iis & venis cõtenti temperamento benè congruit, tunc omnia ritè in cerebro administrantur, si aliter nequaquam ut cum ventriculus frigidiusculus est & hepar calidius, omnia malè geruntur tunc enim cum partes principes & officiales contrario modo, & temperie se se habent, cetera nomia malè administratur, vel inæqualem intemperiem interpretantur cum inducitur intemperies sed nondum introducta est, & quasi hecistica priorem interpretationem de inæquali intemperie fouet *Galen.* loco citato lib. de sanitate tuenda. Alio loco *Galenus* ob spiritus humidi crassique in cerebro agitationem fieri & apoplexiam sæpè præcedere. Sic hypochondriaci fiunt vertiginosi, & vapore flatuque ab intestinis surgente, & peculiari in cerebro generatione tali spiritus, maligni, & ad id maxime facit inæqualis intemperies cerebri flatum maxime & malorum symptomatum author, hanc in epid. bellè *Gal.* expressit cum ait, Calidis vaporibus sursum elatis repleti & inæqualiter affici cerebrum. Inæqualiter autem, ait, afficitur cerebrum cum quædam partes secundum naturam sunt aliæ non refrigeratæ ipsis secundum naturam habentibus proximæ sunt, hinc molesta fit distributio frigiditatis, à male habentibus, ad recte valentes. Sed inter cætera omnia quæ *Gal.* scripsit ad essentiam vertiginis pertinentia locus ille pertinet, in pul-

Inæqualis
intemperies
2. modis fit.

Commen. ad
apho. 17. lib. 3

ad p. 5. sec. 6.
lib. 6. epid.

12 CONSILIORVM MEDICINALIVM

mone iste spiritus cum materia dyspnæam facit, in ventre melancholiam hypochondriacam, flatuosam, in corde palpitationem in cerebro Echo, tinnitus, vertigines: Et quia cerebrum pars est magni momenti ideo ab eadem causa eximium illud symptoma existit. Nam in cerebro flatus circumaguntur & arterias venaque perturbant, in ventre tormina mouent, motum peristalticum impediunt, ventrem astringunt, choleram siccam excitant, in cerebro motum impediunt & spiritus animales perturbant motusque suos ratos, & statos retinere impediunt.

9 Illud Hippocratis est 2. Epid. Excādescētia valet ad bonos succos generandos & bonum habitum comparandum ut Gal. comm. in part. 11. sect. 3. lib. 6. Epid. notat quod illud dicitur de obæsis, pituitosis, segnibus & ignavis, non de biliosis, quibus quies & tranquillitas potius confert, aliis verò stupidis cogitatio valet, unde illud τὸ τῆς ψυχῆς αἰετὸς φρόνις ἀνθρώποις. Et quia elegans locus ille Hipp. 2. Epid. sect. 4. audienda sunt verba Hippocratis. plane aurea. αἰετὸς ἐν πᾶσι τοῖς ὅμοιοις χρώματι ἀνθρώπων ἐν ἑαυτοῖς ἐν χρώματι. lib. 6. Epid. sect. 5. dum Gal. citat Hipp. aliis verbis utitur ὁ ὁμοῖος χρώματος εἰς ἐν χρώματι & τῆς κατὰ φύσιν ἐξέως ἀνθρώπων. Id quod Hipp. lib. de ossium natura docet dicens, colorum mutationes sunt corde laxante, unde florentes & pellucidi, aut constingente, unde suburides aut prauī alius coloris, ceterum aliud est ἐν χρώματι aliud ἐν χρώματι Gorr. in voce. ἐν χρώματι & ἐν χρώματι.

Et Plin. cap.
1. lib. 23.
Et Aph. 18.
lib. 6.

10 Quomodo vinum ledat afferens conuulsiones, deliria ubi inaniter corpore sumitur, aut non præsumpto cibo Gal. explicat com. ad aph. 11. lib. 2. & ad aph. 36. lib. 7. qui loci sunt commemorabiles, tamen idem Galenus comment. ad apho. quintum sectio 6. lib. 6. Epid. in doloribus capitis & hemicraniis præbet, quo modo merum autem vinum iuuerit somno conciliato Gal. eo loco explicat, id quod est notandum, quoniam id communi omnium opinioni repugnat, etsi ad affectus nervorum & cerebri remedia calfacientia & siccantia conferunt cur vinum calfaciens & siccans non valet? An quia fundit vinum magis: an quia ut alimentum subit magis, & si quid nocere potest magis nocet? fundit enim & non discutit, quod autem vinum ieiuno non bibendum sit Plin. lib. 28. cap. 1. iam citato de medicis qui commendabant se nouitate placitorum & cibis præsumi præbique voluerunt.

11. Nota cur dicat arteriæ dolores, at id est consentaneum Galeno qui capite nono lib. 6. de sanitate tuenda, ait quosdam ob peculiare arteriarum temperamentum obnoxios esse vertiginibus, & doloribus ca-

pitis, quibus arteriotomia competere solet, quod notandum, nam illo loco agit, de inæquali intemperie, de qua abundè agit & comm. ad part. 5. sect. 6. lib. 6. Epid. 1.

CONSILIVM II.

Pro septenni puero molesta Raucedine laborante.

IN morbis nec præcipitanter timidos, nec temerè securos esse oportet, hinc enim & illinc non nisi, aut præ timore morborum derelictio, aut præ confidentiæ securitate temeraria remedium vsurpatio, & prognosis parum tuta. Ideo rem attollere malum, peius vero extenuare, si quid est quod sit alicuius momenti Rem attollere, vel quo plus profecisse videaris, vel quò ignaris & idiotis excellentior medicus existimeris non vacat, vel suspitione inanis gloriolæ, vel fortassis ignorantia aut auaritia.

Nunc de raucedine est, vbi raucedo floccipendi debet, & non attolli, est vbi magni fieri debet, vnde Galeno quæ distillationes hominibus primò ruffim concitant, deinde raucedinem neque consistunt, alteram tabis differentiam afferunt. sed alio loco facit plurimi ipsum vocis vitium cum multas ob causas tabes consequatur tum maximè ob distillationem fit, eam præcipue quam vitium vocis consequi solet. Adeo magni momenti est vocem vitari.

Raucedo symptoma est laborantium faucium, vel ob pulmonis asperæque arteriæ humidioris intemperiem, vel ob humorem superfluum à capite stillantem in fauces & vocis instrumenta plus æquo humectantem, vel non solum ob humorem à capite labentem sed ab aliis partibus vel inferioribus ad pulmonem missis vel attractis.

Ita enim Galenus tabem aduenire, ait, aut ob distillationes à capite, aut ob vitium ipsius pulmonis, aut affecto pulmone non ob distillationem à capite, sed ob affluxum ab aliis partibus: unde videre licet quam malè vulgus credat semper caput accusan-

B iij

*Gal in 1.
Epid. circa
initium.
Est autem
comm. ad
par. 17. sect. 2.
lib. 1. Epid. ad
part. 32. sect.
3 lib. 3. epid.*

*2
ad part. 17.
sect. 1. lib. 1.
epid.*

14 CONSILIORVM MEDICINALIVM

dum esse vt authorem distillationum & affluxus ad pulmonem; attamen.

Galenus hîc contrâ putat sæpè affluere humores ad corpus pulmonis aliunde quàm à capite.

Ergo humectatio instrumentorum voci deuotorum raucedinem parit, sicca enim magis corpora magis sonora sunt, quam moderata temperies facit vt clara & sonora sit vox.

Si id verum, corpora ergo calida & sicca sonoram magis rem aut sonum ederent, de siccis verum non de calidis, nam vehementi calefactione exasperatur magis arteria.

3. Ideo formidabilis est raucedo præsertim perseuerans & maxime quæ ab infantibus accidit & incipit. Iam enim non amplius symptoma est, sed morbus.

Hæc autem raucedo fit vel peculiari vitio Epiglottidis quæ est primum vocis instrumentum, ex Auicenna, vel ipsius arteriæ, idque ab externa vel interna causa, vel ipsius pulmonis vitio item quibus gargareon seu ligula exesa est, iis vox vitatur & tabidi fiunt, ait, Aphrodiseus.

4. Maxime autem vitiat vocem vehementior pulmonis calor, aut humiditas aut refrigeratio, cum à calore est, maior & grauior est vox cum frigiditas acutior, siccitas exasperat & vocem gruui voci similem mouet. Nimia humiditas veram raucedinem facit quanquam in quibusdam raucescit vox ingratiorque est non ob simplicem illam humiditatem; nam aliquando humor elueretur, sed ob vitium vel natium ipsius arteriæ & bronchiorum, vel ob vitium adscititium: ceterum tremula fit vox cum nimium humectatur vox, rauca cum pauca est humiditas, aliquando dilatatio maior raucitatem facit, & tunc quædam est lassitudo & loquendi difficultas. At quidam ex veteribus notauit, 5. à calore multo ipsius pulmonis & arteriæ vocem vitari, id quod sanguineis & iunioribus à sanguinis repletionem contingit, cogitur enim animans ob attractionem frequentiore aëris fuliginosi excrementi expulsionem quodammodo irraucescere.

In hoc puero tribus nitendum est coniecturis, vel enim raucescit quia thoracem & præcordia calidiora habet, Et cum sit natus utroque parente calidioribus partibus donato, non mirum si pulmo calidior plurimum frigidi attrahit, & aërem foris, vnde raucedinis maior occasio. Immo æque facile æstate irraucescit, ac hyeme præsertim, vesperi & in loco frigidior, & idem pulmo

*Omino tamē
siccitas lau-
dabilior est
in instrumen-
tis vocis mo-
do ne exce-
dat vide
paulo post.*

attrahit vndique sanguinem & spiritum, vnde plethoricis symptomatis facile grauat, id quod necessitatem spirandi auget. Immo & puer hic nocte hians ore dormit, & interdum illi ferè perpetuo os apertum est, quare? quia credo illi incumbit necessitas frequentioris inspirationis & expirationis, vnde raucedinis occasio. Id quod sæpè febrientibus accidit ob frequentiore aëris frigidi attractionem cuius causa est febris, maximè vero si focus in pulmone consistit, & hæc prima coniectura nostra est.

Secunda est, quòd sit *μεγαλόφωνος* præter ætatem.

Tertia, quòd natus sit ille *μυτρώδης* stirpe tabida.

De eo quod diximus præter rationem ætatis eum *μεγαλόφωνον* esse id contemni non debet. nam *μεγαλοφωνία* & *βαρυφωνία* caloris indicium est, calor autem cor auget, auget & pulmonem, accedit & ipsius arteriæ inæqualitas, nam id ipsi puero accidit quia est *μεγθυμός* vt verbo Hippocratico vtar, quod & iam grandioribus cum incipiunt hircire, Græcè *τεγχιζεν* id est hircorum more vocem reddere asperiorē: vocem enim grauiorem habet quam ætatulam deceat. Et in ista præmaturæ vocis grauitate dilatatio inæqualis ipsius arteriæ contingit, id quod ad inducendū raucedinem quandam facit. si itaque à calore grauior est vox & arteria vt tenerior, vim quandam patitur & inæqualior fit, vnde raucitatis occasio, ista autem raucitas minus formidabilis est. Est enim potius vt signum bonum, quandoquidem virilitatis & vis cuiusdam masculæ est argumentum, puer enim iste quia *μεγθυμός* est, ideòque abundat calore & pluri alimento fouendus est corpulentia, virilitate, viuiditate, vt sic dicam & quadam *ἀγχινοία* ætatem superauit.

Cæterum ipsa dilatatio ante ætatem nocere potest, ex sententia enim veterum dilatatio ista raucitatis vocis causis adnumeratur.

Ex dilatactione enim ista quædam lassitudo accedit, & difficultas in loquendo. Id quod ab hoc puero alienum non est, nam dum loquitur nisi quodam & contentione quadam vtitur & vasa iugularia, præsertim venæ dilatantur & intumescunt, id quod duarum causarum alteram agnoscit vel istam arteriæ dilatationem vel pulmonis repletionem, & reuera ipse puer narrat sibi inter loquendum & respirandum aliquid acidum in arteriam deerrare, acidum autem maximè voci afficit, & si quid incidit in fauces acidiusculum, non mirum si irraucescat: nunc ad cætera pergamus.

*Arist. prob.
22. lib. II. ca-
lori nimio fe-
brientes rau-
cescere autu-
mat.*

*In pueris ca-
loris & inæ-
qualitatis
arteriæ signū
μεγαλοφωνία.*

*De dilatat.
vocis legatur
id quod Gal.
scripsit lib. de
voce.*

*Vnde huius
demonstratio
peti potest.*

16 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*vt bonorum
hereditates,
ita & mor-
borum succes-
siones ad po-
steros perue-
niunt.*

Tertia coniectura erat, quòd ille μητροθεν stirpe pulmonica sa-
tus esset, nam à stirpe generis morbi in posteros deriuantur, & vt
bonorum hereditates ita morborum successiones ad posterita-
tem perueniunt. auus enim anno ætatis vigesimo octauo tabi-
dus ex pulmone interiit; matrem pueri sustulit pulmo & thorax
purulentus. Copia autem puris erat insignis, & omni superior fi-
de. Antequam ita purulenta diem suum obiisset per annum
vnum & dimidium antè querebatur de siccitate linguæ, siti, & ca-
lore incredibili Thoracis, omnia sicca erant, Nil expectorabat, ne
tussiebat quidem. Cum postea per dies viginti continuos de do-
lore sinistri lateris quæsta fuisset, & nouies φλεβοτομήσας cum
frequenti spiritu & inquietudine incredibili fato concessit.

*Morbi con-
geniti seu pa-
rentales Pl.n.
metuendi.*

Cum itaque puer tam parum sano vtroque parente à stirpe
materna satus sit, præsertim vero pulmonis propria ac gentilitia
affectione quæ ceteros ferè attingit, non mirum si quicquid par-
tibus thoracis acciderit quamuis τῇ φαιψιῇ exiguum negligi
non debeat.

*Gal. ad part.
24. sect. 4. lib.
6. Epid.*

Ego concursum, συνδρομή, Græci vocant causerum in hoc pue-
ro animaduertimus, caloris dominatum in pulmone & corde (est
enim biliosiore patre & matre genitus) vnde pulmo cogitur sæ-
piùs alas suas explicare, vt cordi refrigerium afferatur. Testatur
μεγαλοφωνία & βαρυφωνία. Hoc enim testimonio est, multum ca-
loris adesse & cum in corde sint focus, & lares caloris innati, cor
calidius, & maius magnum amplumque thoracem requirit. Ani-
maduertimus etiam irrigationem faucium etiam ab acidiuscula
pituita: humectatio autem arteriæ raucam vocem maximè fa-
cit, siccitas autem si paulò sit immoderatio vocis vitium affert:
tamen humectationi siccatio præferenda, vt enim sonora corpo-
ra, claraque fiunt, quæ sicca, ita præ humiditate flaccescunt so-
numque edunt obscurum; ideo natura vocalia organa, ficciora
effecit maximè asperam arteriam atque Epiglottida, quo clarior
vox efficeretur, sed siccitas modum excedens vocem quoque vi-
tiabit.

*Qui calidio-
re temper. &
pulmone ij
tabi & destil-
lationibus
abnoxij.*

His ita positis antequam ad remedia accedamus quorundam
animaduersio est ob oculos ponenda.

Primum quod distillationibus obnoxij sunt & pulmonum
morbis immo & tabi & præsertim quæ à pulmone est illi qui ca-
lidior sunt temperamen o, qui sanguinem calidiorem feruidio-
remque siue natura siue vitæ instituto habent. Et tamen quia tale
hominum

hominum, genus os pituita salivâque plenum habet, putat se frigidius & caput & cerebrum, & pulmones habere, contra fit, ut experientiâ deprehenditur.

Est enim quidam qualitate acri præditus calor, qui liquat, fundit & διαχων ἢ ἐκ τῆς ἡ facit, & in hoc multi falsa opinione catarrhi labuntur & decipiuntur. Plura in eam rem doceremus nisi id totum amplius fusiûsque edisseruissimus in nostris commentariis.

Ballonius de his in 1. & 2. l. Epid. & consil. lib. 1. & in opusc. de Gibbis & asthmate.

Secundum est, Galenus audacter iis sanguinem mitti iubet, quibus pars aliqua malè conformata, maximè verò ait, si Thorax: à maiori valet argumentum, ergò multò magis iis detrahendus, quibus corpus pulmonis calidius est, amplius, plenius, vitium enim thoracis aliquando est ab infirmiore natura, ut alatis contingit.

Liberaliter sanguis detrah in Thoracis mala conformatio- ne. Gal. de sang. miss. adu. Eras.

De ea re est etiam tractatio nostra copiosa in eo tractatu, quem de gibbositate scripsimus.

At ἐν ἐξ ἡ τὸ πρὸς τὸν. in hoc puero in laudabilibus duci debent, id enim bonum, & ut signum, & ut causa: ut signum, quoniam declarat legitimas esse naturæ ipsius functiones in hoc corpufculo nutriendo: ut causa, quoniam declarat calori etiam paulò maiori pabulum non deesse.

Ethic sese contrariæ indicationes offerunt, si, ut facilius sit respiratio, & pulmo non ita augeat, vel ob pleniorum ventriculorum ipsum diaphragma opprimentem, non stranguletur ut galeturque, ipsius pueri genius defraudetur, dum de demenso ciboque detrahetur, prohibebitur corpus incremento, pueri enim non faciliè ieiunium ferunt, ij maximè, qui inter eos sunt vegetiores, seu πρὸς τὸν. Et etiam si plenius alatur plus sanguinis generabitur, & occasio erit maior ipsi pulmoni sui implendi, & oppressionis occasio maior erit, tum ex multitudine sanguinis, tum ex ventriculi tumore, ventriculus enim ingesto alimento, ut pars membranacea faciliè dilatatur, & assiduitate capiendi multi alimenti dilatatur magis; unde siue plenus, siue vacuus, ut amplificari solitus, ipsi diaphragmati liberæ respirationis instrumento oneri est, diaphragma pressum thoracem angustum reddit parte inferiore, hinc pulmo angustia thoracis corde æstuante, maius refrigerium requirit & attrahit sanguinem, cum non sufficiat inspiratio expirationi, immo & cor dilatatur, id quod in multis observatum est. Cor enim calidius effectum, aut op-

Hipp. 13. Aph. lib. 1.

18 CONSILIORVM MEDICINALIVM

pressum multi aëris indigens, vehementer mouetur, & infernè aërem nequiens attrahere, sanguinem validè attrahit, sanguis vi attractus, & copiosior quàm par sit imò quodāmodo cumulatus, & conculcatus opprimit & vasa distendit, hanc affectionem veteres, medēdi magistri barbaro, sed apposito nomine sanguisugum vocauerunt, partes enim hirudinum modo alliciunt & attrahunt. Deinde cor vehementius & celerius mouetur maioris refrigerij ergò: & penè animans suffocari videtur & veluti, καρδιαγμοὶ ad- sunt attracto multo sanguine, & corde perspiratum non habente, quæ causa, ni fallor, impulit quosdam veteres vt velocem & crebrum cordis motum palpitationi similem καρδιαγμὸν nomine donauerint, idque ex consecutione quadam, quia homines vident in isto crebro, & veloci motu, & palpitatorio καρδιασσει, maximo enim incendio vis vitalis laborat, ait Gal. Ergo quod ad Therapiam spectat; Bona victus seruanda lex est, in cibo, potu, aëre, quiete & corporis exercitatione.

Comm. ad
ap. 6, lib. 4.

Exerceat vocem ieiunus, nam qui pleni loquuntur multum rauci fiunt, ait Aristoteles; sed maximè maior vitanda repletio, diæta potius refrigerans esse debet quàm calefaciens, veteres in affectibus thoracis nimij fuerunt in calefaciendo. Moderata potius in vsu sunt.

Melicratum in vsu esto aliquando, emollit pulmonem, videatur autem ne quid errati in calidiusculo hoc puero contingat, partes enim vsu rerum mellitarum & saccharatarum intumescunt, vnde apud Hippocratem οἶνος γλυκύς μετὰ δόσιν ἀγχιόσι, melicratum promouet expectoratum, quanquam glutinosius aliquando sputum reddit, non ex se, sed ex euentu, id quod ex Hippocrate & Galeno notandum est.

3. de diet.
acut. vinum
dulce μετὰ
δόσιν ἀγχιόν.
3. de diet.
acut.

Lenientia & temperantia valent. Tabellæ bechicæ, glycyrrhizæ, succus cum melle Narbonensi, aut melicrato, Amygdala, ficus, passulæ.

Cassia in linctu frequens, addita conferua violarum, aliàs in iusculo dissoluta: cassia condita nuper allata.

Intingere glycyrrhizam in ptissana, & lingere.

sectio venæ cum sit argumentum calidioris pulmonis & repletionis.

7.

Fernes lib. 2.
meth. ad fin.

De balneo videatur num conferat, quanquam est vbi balneum conferre potest, est vbi non potest, Galenus & Hipp. in affectionibus pulmonum balneum laudant. At dicet quis, si inflamma-

tio in pulmone est, oberit: si copia humorum liquando & fundendo suffocationis periculū afferet. Reuera Hipp. vult cocto morbo balneum conferre, peripneumonics, & pleuriticis (addit enim Galenus pleuriticos) balneum magis confert quàm feбри ardenti. Deinde verò etiam confert iis quibus nares sicca, id est, quæ nihil reddunt, cerebro nimium resiccato: confert & iis quibus æstuant præcordia, id quod Galenus expressè docuit.

Ad part. 58.
lib. 3. acut.

Actiones & motus sint moderati, vt ne agitato corpore nimium pulmones incalescant.

Est & commodum vt aliquis eius voci præsit vt nimio clamore arteriæ & pulmōni non vis aliqua inferatur.

8.

Lingere mel erit optimum, caules rubri valent, item syrupus de glycyrrhiza, cum capillis veneris, hyssopo, melle, saccharo, & sapa, in parua quantitate.

Amygdalarum conferet, lac asinæ, & alia arteriaca moderata. formulæ & hypoglottides exceptæ gummi tragacanthæ.

ANNOTATIONES.

i. De voce & eius differentiis multi multa. Cicero has differentias ponit, canorum, fuscum, acutum, graue, flexibile, durum, & hæc in voce. Clodius Nero fuscam vocem habebat, cuius corrigendæ ergo Muscam amauit, Suetonius Terpno musico canenti Nero post cœnam in multam noctem assidebat, paulatim ipse meditari & exerceri cœpit, nil eorum omisit quæ musici vel conseruandæ vocis causa, vel augendæ factitarent, sed & plumbeam chartam supinus pectore sustinebat, clystere vomitūque purgabatur, abstinebat pomis & cæteris officientibus: donec blandiente profectu (quamquam exiguæ vocis & fusca) prodire in scenam concupiuit subinde inter familiares græcum iactans prouerbium. Occultæ musicæ nullum esse respectum: Aneas Syluius qui postea Papa fuit, in magno hominum conuentu de voce & Musica cum aliis contendere solitus erat, & quum id quidam obiicerent vt aliquid audax nimis & temerarium, respondit, solus homo leuissimus est cantor.

Sed obseruatione est quoque dignum Elephanticos vitiosam habere vocem. Idem de hypochondriacis dicendum, in quibusdam non caput, non pulmo accusandus, sed lustranda sunt hypochondria & he-

C ij

par ipsum maximè.

2. Elephantici vocis vitium habent, quidam etiam à natura, & reuerà aut occulta est causa istius vitij vocalis, aut si percipitur, ægrè id fit.

Ex voce præferim, mala ducimur ad cognitionem eorum quæ intus latent Hippo. lib. de arte. Ex voce & urinis ait, nos doceri, per interpretationes peregrinas, ἀπορίας ἐπερεια,

4. Si humiditas nimia raucos facit, siccandum, contra fit. Huc pertinet locus Aristotelis paulò ante citatus, quod vehemētiore calefactione maximè exasperatur aspera arteria, prob. 12. lib. xi. problematum.

5. Dicant Agrippam annotasse solos Gallos muscos. Hispani ob siccitatem pulmonis vocem submissiorem habent: vasa enim & thorax non dilatantur, at Germani vocem grauem quasi boantem & fuscā habent, quia amplius thorax, calor multus, & excrementum fuliginosum multum, quod fuscā & minus canoram vocem facit.

6. Hipp. inter eos quibus purgationem interdicit, raucos memorat, quasi raucedo catharsi non egeat. Ita Galenus ad part. 115 lib.

4. acut. raucos non purgari vult Hipp. horum enim frigiditatem & humiditatem sanare consulit capite & reliquis membris quæ affecta sunt, exsiccatis topicorum usu.

7. De balneo vnum est notandum, quòd antè cibum alias dotes habeat quàm post cibum. Nam arte cibum extenuat corpus, macrumque reddit: post cibum pinguescit. Ideo Galenus docens quæ ratione quòrus præcisum est membrum dysenteria cruenta non laborent, suadet ut de cibo detrahant, balneo utantur ante cibum, non post cibum comm. ad part. 40. sect. 4. de art. deinde vero balneum ijs aduersum est qui graui morbo tenentur & quibus nobilioris visceris imbecillitas inest & quibus præcordiorum durus ac renitens tumor.

8. Sequendum illud quod est apud Sueton. in Nerone, tantum absuit à remittendo laxandoque studio, ut vocis conseruandæ gratia, milites non nisi alio pronuntiante appellaret. Nil seriò iocundè egerit nisi adstante phonasco & monente ut parceret arteriis & sudarium ad os applicaret, & de Augusto pronuntiabat dulci & proprio quodam oris sono, dabatque assiduam phonasco operam. Is vocem intorquere, remittere, lenire, exasperare docebat.



DE FEBRE NOCTVRNA.

CONSILIVM III.

*In quo queritur cur Empyici nocturnas potius
quàm diurnas habeant exacerbationes.*



XOR præsidis Carmelij annos nata viginti no-
uem, nata patre pulmonico qui tabidus interiit, eo
ferè anno extincta est, quo & pater, adeo magna
est vis morborum congenitorum. Id quod Hip-
pocrates passim, & Aphrodisæus, qui morbos hæ-
reditarios statuit, docens caluitium iis non contingere qui humo-
re abundant, qui capillo sunt promisso & simplici, nisi fortè vi-
tio stirpis, caluities contingat, vt contra humorum conditio-
nem & vim, vis congenita sese ostendet & proferat. Fuit tempus
cum suppressi fuissent menses ob causam manifestam (nam ægrè
mariti morbum ferebat) cœperunt fluere. Bellè satishabebat.
Tandem quæsta est de linguæ rubore, & siccitate iuncta siti insi-
gni. Pulmonum ardor erat & ἐρυσίπτελ. α. π. ἔδ. α. des aliquid. concepit,
peperit. A partu substiterunt lochia, febris. Dolores lateris
sinistri. Circa vespèrum febris recrudescēbat, iactabunda, ægrè
spirans, frequens spiritus. Animam actura videbatur. Febris
mane (vt in morbis ferè omnibus accidit, fauente quodammodo
Aurora) remittebatur. Inæqualitas erat caloris & frigoris. Iste sta-
tus dies penè triginta perstitit. Nullo iuuabatur remedio, licet
decies aperta vena fuerit. Tandem mors. Aperto cadauere om-
nia sana occurrerunt præter pulmonem. Pars sinistra pulmonis
ferè magna sui parte tabuerat & tabo infecta erat, sanâ reliquâ
substantiâ. Purulenta materia continebatur illa thoracis parte
æquans sua quantitate tantum, quantum duæ pintæ Parisienses

*Imo ex Hipp.
morbi conge-
niti & parē-
tales vix cu-
rantur.*

Prob. 1. lib. 1.

C iij

complecti & comprehendere possent. Tamen foetor non erat. Non erat grauis spiritus. Non multum tussiebat, & nihil istius materiae sputo excernebatur.

*Ad finem 2.
acutissimum.*

Facies eius ferè index erat affectionis pulmonicae. Nam tota penè facies saepè erat velut subalbida, & iis quos Hipp. ἐνήμερος vocat, latinè excoctos dices, non dissimilis. Galli vocant, *il a un visage de conin parboillu*. Et haec facies aliquando turgidula est & familiaris iis qui sunt aut suppurati, aut quibus pituita putri scarent pulmones. Sed & genarum aliàs erat rubor fugax: & saepissimè ignes sacri in faciem inuolabant. Ex doctrina autem Hippocr. & maculas, & πύρρς, & ignes sacros iis oriri quibus pulmonum corpus intemperie laborat, didicimus. Id quod notandum erat.

Haec capita fuerunt deliberationis antequam in grauissimum morbum incidisset. Laborandum fuit in corrigenda intemperie connata & genitiua. In febre tollenda nocturna (haec autem febris iam illam affligebat sex aut quinque mensibus antequam inciderit in morbum in quo ipsa periit) in foetu confirmando (grauida enim erat) cum suppar studium esse debeat conseruanda & foeta & foetus.

Et cum olim igni syluatico (qui herpes dicitur) partes faciei occupante laborarit, nunc velut febre non putri & erysipelatode laborat. Vt enim tumores contra naturam differunt, ita & febres: quarum quaedam sunt sanguineae, vt synochi imputres, aliae biliosae, in quibus potius alterationi, quàm vacuationi locus esse debet.

Nec mirum si tantopere laboret, tenetur enim dominatu caloris acris, mordacis, caliginosi. Eos autem qui eo sunt temperamento, pinguescere sanitatis terminus est; Biliosa est, itaque nocentissima inedia, Phlogosis est in pulmone. Non tamen ita oportet accuratos in Phlogosi pulmonum, vt in hepatis Phlogosi. Hepar enim officina est sanguinis. Et quod dedit negotium, fuit cognitio & ratio exacerbationum nocturnarum.

Et cum haec mulier (vt ante diximus) faciem aliter atque aliter haberet affectam, mox genis colore rubro & calore suffusis facie reliqua colore albicante qualem quoque descripsimus: Omissum est aliud quoque symptoma de quo grauiter querebatur. Hoc autem fuit ἀμβλυωπία seu hebetudo visus. Ideoque illa sibi sanguinem detrahi agrè ferebat. Hac enim ratione fore pu-

tauit visum imbecilliorē. Et tamen si cui vnquā mulieri salutaris fuit Phlebotomia, huic vni fuit. Hæc enim visus hebetudo nō ab obstructione, aut paupertate spirituum animalium, aut ab imbecillitate, aut denique à vicio instrumenti fuit, sed à sanguine feruidiore & copiosiore qui in illa infernè ferebatur sursum. Id illi contigerat quod & iis quibus è nare hæmorrhagia futura est. Obscurius enim vident donec largo sanguinis fluxu venæ depleantur. Atque huius rei causa solis medicis, quibus ipsa ratio suffragatur, cognita esse solet. Pulmonica erat à pulmonum feruore, huic menses non satis legitimè responderunt. Lacrymari erat facilis, quod ὀξύθυμος, & imo pectore angens sese animi, iram coquebat, & præ pudore foras exerere non audebat, huic lacrymæ pro omni refugio & solatio. Interea ad caput & pulmones calidiusculos raptus humorum fiebat.

Ac quod oculorum seu visus hebetudo ab ea quam diximus causa, dependeat, vel autoritate summi Hippocratis innotescet. Ita Hipp. Quibus nec febricitantibus, nec decoloribus caput & vertex dolet, &c. his hæmorrhagia futura est. Quibus sanguis fluit, hi sani videntur. His autem vel splen eleuatur, vel caput dolet, vel quippiam ob oculos obuersatur, (Græcè μαρμαρυγῶδες π) sic visus obtenebratio ista hæmorrhagia soluitur, ergo nec imbecillitatis, nec obstructionis index est.

2. Prorrh.

"

"

Et idem Hipp. loquens de specie quadam morbi podagræ & ischiadici in iis quibus magna sunt viscera, & olim sanguis è naribus fluxit, ait, interroga num fluxerit copiosè olim sanguis è naribus, item num hebetudine visus (Græcè ἀμβλυωγµόν vocat) laborauerit. Sic hæc hebetudo à sanguine & feruentiore & vberiore est. Vide & de nyctalopia apud eundem Hipp. quæ pueros, adolescentes & iuuenes tenet, & certis temporibus curatur per se. Huicque non sunt virgines & mulieres, si vtrisque menses proueniāt, obnoxia. Vnde hæc nyctalopia? non aliunde quàm à sanguine & copioso & feruente. Notandum id, vt ne cunctanter, venam aperiāmus in visus obscuritate, id quod vulgus falsò reformidat, persuasus ab imbecillitate esse id quid quid mali est.

Ibidem.

2. Prorrh.

Nyctalopia
nomine au-
ditur cum
ægrî nocte
vident. Con-
tra aliq. nomē
hoc accipiunt.

Sed quæstio oriri potest cur, cum tanta copia materiæ purulentæ in thoracis capacitate contineretur, non multum tuisset, & nihil materiæ istius πτωβιδῆς excreatione educebatur. Galenus tres omnino causas assignat propter quas pus in thorace conten-

Part. 60. lib.

2. proga.

tum non excernitur, puris lentorem & crassitudinem, membrana pulmonem ambientis densitatem, facultatis in ægrotante infirmitatem. Addendū vnum puto. Pars pulmonis sinistri exesa & corrupta erat, quare istud pus tanta collectum copia non sollicitabat facultatem ad excretionem sui. Facultas enim valida erat, membrana densitas non impediēbat (nulla enim ea in parte erat vt pote consumpta) pus non erat adeo spissum crassumque. Dicam meas conjecturas. Pulmo non sentit, habet enim corpus ἀναίσθητον, si aliquis sensus inest, ob membranam inest, at hæc tabuerat, ideo non poterat esse sensus instrumentum. Ideo vellicatio & punctio non sentiebatur, nisi in membrana costis subtenta & succincta, vnde dolor percipiebatur acutus, sed pulmoni non erat reciprocus. Pars enim pulmonis effœta pus in latere sinistro contentum non exugebat, ideo non expectorabatur, nec tussis erat quæ irritamenti & calcaris instar esse posset.

i. de morb. Alia conjectura, crassior pars istius puris, aut putris pituitæ, (de hoc autem paulo post ex Hippocrate) obducta erat parietibus & thoracis & pulmonis reliqui, & sic impediēbat quominus materia collecta in capacitate thoracis pungeret & irritaret, vt inde tussis moueretur. Quomodo vidimus plerosque cum tussi (quæ est calcaris instar ad repurgandum corpus pulmonis, quantitatem aut puris, aut pituitæ πτωιδίς, quantitatem (inquam) omni maiorem fide excreuisse, & postea sani satis vixerunt, & cum tabuissent penè, bonum corporis habitum & εὐστροφίαν recuperauerunt.

Dicet quis cur toties dictum est puris, aut pituitæ putris & πτωιδίς? Quid illud est pus, aut pituita πτωιδίς? An idem sunt, an longè distinguuntur? Dico ego pituitam putrem recoctam & præsertim admixto sero putri ac bilioso vt id quod excernitur virulentum quodammodo sit & subuiride) idem facere ferè quod & pus.

Sed hoc differunt, quod pus est malum vt signum & vt causa. Vt signum quoniam abscessum & inflammationem systrophicam processisse declarat, vnde consumptio partis pulmonis secuta est. Vt causa, quia nisi exeat febrem lentam fouet, rigores inæquales affert, & corrumpit partem & in qua manet, & contagio vicinam. Ista verò pituita putris & æqualitatem nata & leuiorem, mala est vt causa, quoniam afficit pulmonem ipsum morâ

morà nisi exitum habeat. Quomodo videmus quosdam mungere viride & æruginosum & πωδὲς ferè (vnde vulgus non ineptè dicit, *il mouche comme de la boüe de bosse*). Et in tussibus cum pituita excernitur & sputum album est semiputre, & ὁμοῖον τοῖς πωδῶν, sic loquitur Hippo. lib. 7. epid. circa medium. Os charite, ὑποχρεμῖς ὁμοῖν πωδῶν, cum cocta fuisset, & hæc materia initio bona erat, pituita enim & proprium erat capitis excrementum) sed per moram & putredinem quandam, & virorem acquisiuit dum cumulata, in parte non haberet suam εὐπνοίαν, contra erat quædam χαλάρυξις, vt loquitur Theophrastus, quæ putredinis & grauis odoris est causa.

Theoph. libro
de iud. r. bus.

Ac præter moram istam & χαλάρυξιν, & diffilationis carentiam obseruari debet quoque, esse quosdam quibus ob proprietatem quandam pituita omnis ferè quæ in eorū corpore gignitur, habet aliquid χερσόντης, vnde quancumque in partem incurrit, sæuitiam suam manifestat. Dentes rodit & è suis alueolis radicibus erosis, disturbat Chæradicos tumores mouet. Denique mille rædia milleque mala concitat. Eadem pituita si in pulmones irruit, exulcerat, afficit, denique in putredinem eosdem pulmones resoluit. Excreta è pulmone eadem materia aliquid habet insuaue, & aspectu horrendum. Vulgus putat esse pus, saltem penè eosdem habet effectus, quos & pus ipsum.

Dentes igni-
bus indomiti
cauantur ta-
be putris pi-
tuitæ. Plin.

In ista ægra tanta materia, quæ aperto cadauere inuenta est, pus non erat, meo iudicio, sed pituita πωειδής, quæ speciem abscessus præseferbat. Si enim pus verum fuisset, vnde tanta copia, cum argumenta apostematis non præcessissent. Sed vno ferè anno antequam excessisset erat illi ingens sitis, lingua sicca, febris nocturna, calor acer & mordax, in appetentia, facies colore subalbido (vulgo *de couleur comme vne pomme cuittè*) nisi quod malæ fugaci quodam rubore suffunderentur, ni faciè crebro ignes sacri & volatiles. Quæ omnia malè affectorum pulmonum signa erant. Sic à longo tempore fouebat illud malum & collectionem malignæ pituitæ, quam si tussi irritante, excreuisset, ab eo periculo fuisset asserta. At tussis non erat: causas autem veri-similes paulò ante recitauimus.

Sub finem
huius com-
m. narij ex-
plicabitur ex
Hippo. aliud
esse τὸ πύον,
aliud, τὸ
πωδὲς.

Et ne cui mirum videatur hoc de ista putri pituita commentum, adducendus est Hippocrates tanquam pro nobis fide-iussurus. Fiunt suppurati nonnulli si pituita de capite delapsa ad latus agglutinata fuerit & patruerit. Tunc enim latus vt plurimum in-

li. i. de morb.

26 CONSILIORVM MEDICINALIVM

flammatur, & patitur eadem quæ & ex pleuritide suppuratus. Id
 „ quod si aliàs alicui ægro accommodari potest, huic nostræ agræ
 „ aptandum est. Licet enim suppressa fuissent lochia, & dolor late-
 ris secutus fuisset, non tamen credo per ἀραδυσυλίο sanguinem id
 tanti mali peperisse. Sed data occasione & ob partum, & ob sup-
 pressum sanguinem, malum quod ante signa aliquot sui edide-
 rat, nunc fauit & fauendo seipso fit deterius. De his aliorum
 esto iudicium, nec enim mearum opinionum ita sum amans &
 assertor, ut non, si quis melius aliquid afferat, facili acquiescam.

Part. 60. lib.
 2. prog.

Vnum restat explicandum de exacerbatione nocturna in pu-
 rulentis. Et quanquam de periodis morborum & humorum, dis-
 putare velle, opus est arduum & difficile. Tamen quoniam de
 exacerbatione nocturna mentio aliqua facta est, sicco pede id
 præterire est alienum. Audiatur Hippocrates: his signis purulen-
 tos dignoscas. Si febris non dimittit, interdiu mitior, noctu ve-
 „ hementior. Si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas est, nec
 „ quicquam tamen dignum commentatione expuunt. Si oculi
 „ caui redduntur, maxillæ verò ruborem trahunt, & vngues ma-
 nuum curuantur, digiti verò potissimum summi calefcunt, atque
 in pedibus tumores consistunt, neque cibum appetunt, ac pustulæ
 circà corpus erumpunt.

6

ἀναδύσεως
 tempus.

Galenus probabilem rationem afferre visus est, interpretes verò
 A-vega frigidior paulò videtur in eius rei reddēda ratione. Acci-
 „ dit omnibus hæctica febre laborantibus ut noctu febris augea-
 „ tur; non quod ratione febris nox augeat febrem, sed per accidens
 „ quod quidem tale existit, per febres hæcticas, partes enim solidæ
 „ ignitiores euadunt. Ob id sui similis in se manet eodemque habi-
 „ tu febris caliditatem obtinens, ut calx, debilem contingentibus.
 „ Si edunt bibuntque accidit idem quod & calci aqua perflusa: quò
 „ fit ut contingentes exterius ægrum multò calidiorem sentiant.
 „ Sic ob alimentum id contingit, non ratione τῆς διαίτης. Nam
 „ cum alimento calor est febriculosior. Statim adhibito augetur
 „ cibo qui vehementissimus percipitur tempore τῆς ἀναδύσεως.

Hæc quidem verisimilia sunt quæ adducit Galenus, ut reddat
 rationem cur exhibitio alimento calor hæcticus augeatur: sed si
 ferò non exhibetur alimentum an increfcet noctu? hoc non dicit.
 Item non explicat, quòd pus habeat maximè suos paroxysmos
 nocturnos. Audiendum autem illud Hippocratis pronuntiatum
 in Epid. cum de multis locutus fuisset qui aut tetano, aut opistho-

tono correpti fuissent. Nam sanies quædam & ichor horum symptomatum terrificorum author erat. Tandem Hippocr. pronuntiat *κατὰ τὸ ὅτι φάνηται* τι (quanquam non video unde id dependeat, nec enim periodus de suppurationibus & doloribus ad noctem repetentibus, iis quæ prius dicta sunt, consentit & adhærescit.) Ita Hipp. *ἡρόγας ἐν πᾶσι ἐμπύμασι, καὶ τοῖσι πρὸς ὀφθαλμοῦν, μάλιστα ἐς ῥύκτα οἱ πόνοι*. Id est, ac certè in suppurationibus & iis quæ ad oculum pertinent, dolores in noctem incidunt: ergo & febres. Sic Hipp. docet cur suppuratis febris noctu augeatur, quia dolores & labores in suppuratione noctu irritantur. Sed tamē nondum ex Hippocrate constat cur proprium sit τῷ ἐμπύματι, ut de nocte suam habeat ἐπισημασίαν. Sic Galenus mancè explicat causam paroxysmi febrilis, & tantum ad generales hecticas febres recurrit: nec tamen adhuc ratione ipsius affectionis noctu febrem irritari ait, sed ex euentu, nempe dati alimenti. Quid si æger hecticus aut empyicus sumat cibum tantum circa meridiem? Av. ega ait tempore Hippo. solitos homines semel cibum capere, & id vesperi. Ita fiebat ut cum hectici forent circa tempus ἀναδύσεως τῆς πυρετοῦς; febris augetetur. Sed pace & Galeni & alterius interpretis Hispanidicæ, hæ rationes sunt paulò frigidiores. Explicandum erat cur empyici quatenus tales, magis noctu febricitent. Quod commodè fecissent si operam dedissent in explicanda sententia Hippo. ex quinto Epid. adducta de nocturno paroxysmo τῷ ἐμπύματι.

Epid. 5.

Morbi oculorum habent suas exacerbationes ad noctem.

Locus est apud Hippocratem de distinctione febris nocturnæ & diurnæ, qui aliqua ratione contrarius videtur esse huic loco, qui est de nocturno paroxysmo in suppuratis, ita Hippocrates, febris nocturna non admodum lethalis, longa tamen est: diurna longior. Sunt quibus *ῥέπει πρὸς τὸ φθινώδης*, ad tabem vergit. Ideo nocturna non admodum lethalis est, quod coctionis sit capax, & quod interdum excutitur quod nocte coctum fuerat, id quod in laudabili ducendum est. Dies enim & vigiliæ magis digerunt. Diurna longior dicitur, quia de nocte nil exodat, nec ex facili ægri somnum capiunt ob curationes. Nox enim in curationem impenditur. Ideo ex Hippocrate, Galenus colligit diurnæ conditionem esse deteriore, quod ad tabem ducat. Nam cum paroxysmus diurnus est, difflandæ materiei tempus in noctem incidit, at nocturnum tempus difflationi non est accommodatum, ut diurnum: ideo diurna est longior & ad tabem adducit, & ob cura-

Particul. 61
sect. 3. lib. 12
epid.

Gal. in com.
Difflatio in
febrem inci-
dens maxi-
mè est com-
mendabilis,
quod paro-
xysmus aut
lenet aut fe-
niat.

tionem. Nam nox quieti est propria & accommodata: at noctu & cibus datur, & medicamenta capiuntur, sic tabescunt diurnitate temporis; quia si cubent interdiu, somni defectu marcescunt, si non cubent, dum nec noctu nec diu dormiunt, vespertilionis & non hominis vitam agunt, hæc Galenus. Miror ego cum suppuratorum febres sint heclicæ, cum eorum conditio sit pessima, cur non diurnos potius habent paroxysmos, quàm nocturnos, si quidem deterior est nocturna febre, ipsa febris diurna? Motus autem puris & purulentæ materiei in noctem potius incidit, ex sententia Hippocratis. De his aliorum esto iudicium.

Hæc Hipp. 2. epidemiorum docet & tota antiquitas idem censuit.

Tempus matutinum benignum est fauetque naturæ, & morbos mansuefacit.

Hanc de vere questionem mouit & explicauit, non satis amplè tamen Fran. Vallesius in com. ad 2. epid. sect. 1.

7. Celsus etiam de vulneribus loquens ait, vulnera & nimis calor & fri-

De motu quidem humorum inter omnes constat, quodd sanguis manè, bilis circa meridiem, succus melancholicus vesperti, & pituita noctu moueatur, vnde est analogia inter tempora vniuersalia & vnius diei particularis. vtrumque tempus enim vna solis circuitione finitur: dies quidè circuitione totius cæli, annus verò propria ipsius solis. Sic morbi qui alioqui in aliqua anni parte fiunt, ea diei parte quæ illi respondet exacerbantur, vt æstiu in meridie, autumnales vesperti, quod vespertum respondet autumno. Quæstio autem orietur. Nunquid vernaes morbi mane irritantur, vt hyemales noctu? Tamen vere tot morbi pullulant: in aurora pauci admodum. Immo tempus matutinum morbis & ægris amicum videtur: rarè in auroram morbi incidunt. Et cum videmus in auroram morbos incidere, de iis malè ominamur. Vt in pestilenti statu, quidam qui somno indulserant noctu, si in aurora rigere cœperunt, opinionem fecerunt latentis veneni. A deo aurora fauet ægris. Nam licet ægrotent febre aut nocturna, aut continua, tamen circa crepusculum omnia ad naturalem statum creduntur venire. Itaque nulli morbo ferè contingit exacerbari mane in aurora. Respondent quidam de matutino tempore id quod de vere saluberrimo responderi solet, ver per se salubre est, nec morbos parit quoad τὸν γένεσιν pertinet, sed quod ad τὸ παροξυσμὸν. Aliud enim est τὸ γένεσθαι καὶ τὸ παροξυνεσθαι. Autumno autem, ratione ipsius, & quatenus talis est, morbi fiunt & magis quàm aliis temporibus, omnes autem fiunt deteriores illo in tempore, quia tempus est insalubre. Et vesperti ob horæ malignitatem exacerbantur morbi. Et quidam peculiari respectu & ratione, quia sunt autumnales. Sic & γίνονται & παροξύνονται. At in aurora possunt ratione præsentium humorum morbi παροξυνεσθαι, sed vix fiunt ratione ipsius temporis. Immo si qua in morbo tran-

quillitas obseruetur, maximè in aurora id fiet. Vnde etiam deter-
rimi morbi, cuiusmodi sunt pestilentes circa diluculum mites-
cunt suamque sæuitiam deponunt, immò videntur agri restituti
cum alioqui eodem ipso die peste iugulentur. Et tranquillitas
morbi, symptomatum mitificatio, pulsus æqualitas mane appa-
rens suspecta esse debet. Id quod multos sæpè fecellit.

Antequam scribendi finem faciam, dicam vnum de diffe-
rentia puris & purulenti, Græcè τὸ πύον καὶ πυῶδες. Diximus enim
ante tantam copiam materiei albidæ & puriformis, detractam esse
ex sinistra thoracis parte; quā nesciebamus an ea referri deberet
ad pus, an ad aliquid puri simile. Abscessus enim effatu dignus
non præcesserat, vt tanta purulentæ materiei copia congereretur.

At Hippocrates summus doctor eam distinctionem assignat.
πύον τὸ ἐκ σαρκὸς πυῶδες τὸ ἐξ αἵματος καὶ ἐξ ἄλλης ὑγρᾶς. Id est,
pus ex carne: purulentum & puri simile ex sanguine & alio ex
humido. Quasi verò omne pus non sit ex sanguine cum πύον di-
catur τὸ αἷμα σεσηπός. Ex carne autem pus fieri ait quòd suppuratio
non videatur fieri, sine erosione partium carnosarum capaci-
tatis in qua pus fit: vnde ex carne erosa pus fit. vnde in contusione
est procuranda suppuratio, quia nulla noua caro generari possit
antequam contusa caro in pus vertatur. Et Celsus ait pus exire ex
vulnere sanescente, quod corruptæ carnis in pus conuersionem
sequatur nouæ carnis generatio. Nisi quis ex loco Celsi inferat
non propterea ex carne pus fieri, sed ex sanguine. vbi enim seda-
ta est inflammatio, tunc sanguis non corrumpitur, & ita laudabi-
lis agglutinatur, vnde σάρκωσι. Argumento est quod ex vulnere
sanescente (quod tunc vlcus est) etiam sanguis fluit, ait Celsus: Et
eodem autore nondum soluta inflammatione plus puris effluere
debet: quare? Quoniam sanguis est illaudabilis & corruptus.
Idemque autor est concretum in vulnere sanguinem inflamma-
tionis causam esse, vulnus glutinari prohibere, & in pus conuerti.
Contra Hippocratem stare Galenus videtur ex sanguine pus fieri
ratus, quòd in phlegmone in abscessum abeunte, sanguis extra
vasa effusus in pus vertatur. At Hippo. ex carne pus verum ait
fieri, materiam verò puriformem, ex sanguine & alia quadam hu-
miditate ait fieri. Et vix in phlegmone suppuratio fit sine carnis
erosione, id sinus indicat post puris euacuationem. Et sanguis ex-
tra vasa fusus & calfactus, humidam & calidā carnem quam attin-
git, corrumpit, ex qua carne si natura robusta fuerit verum pus

gus instant,
maximè horū
varietas:
ideo est au-
tumnus per-
niciosus.
Etiam morbi
deterrimi
mane mites-
cunt, ideo n.
malis ducen-
dum cū morbi
circa aurorā
inualescunt.

Lib. de ali-
mento.
Cur non refe-
rat hypostasēs
in morbis sēp
excretiones
semiputres
ex pulmone
ad τὸ πυῶ-
δες.
Hipp. lib. de
ulceribus.
Pus ex carne,
purulentum
& puri simi-
le ex sangui-
ne & alia
humiditate.

Cap. 26. lib. 5

30 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Par. 22. lib. 3. epid. 1. ff. 3. nascitur: cui non rarò admiscetur aliquid πῶδες ex humoribus & sanguine extra vasa effuso. Vnde apud Hippocratem, abscessus in
» suppurationes multis conuertuntur, multum carnis ossiumque
» decedit.

Par. 24. sect. 3 lib. 3. epid. Notandum autem est etiam ex Hippocrate humores sapè κακῶν εἶναι esse, vt in pus non vertantur: vnde Hippocrates dicebat, fluxio non erat puri similis, sed alia putredo: id est, non verum pus fiebat nec ab humoribus, nec liquatis carnibus, nam corrumpebantur, ossa neruique decidebant. Et Gal. ait in comm. ob humiditatem & aëris tranquillitatem humores putrebant, sed pus non generabant, partes enim solidæ computrescebant διὰ τῶν χυμῶν ὑγρῶν μοχθηρῶν. Nota additionem vocum harum quæ videntur πλεονασμὸν redolere, χυμῶν ὑγρῶν. Atque vt Hippocratis opinionem de vero pure & eo quod πῶδες dicitur, vt vnum ex liquata carne veri puris nomine donetur, alterum verò non, concludamus, non alienum fuerit afferre breuem distinctionem inter pus verum & ichores, seu alias quasdam humiditates quæ ex vlceribus effluunt: Quam distinctionem Celsus breuiter explicat, Sanies est sanguine crassior, variè crassa, glutinosa, & colorata. Pus crassissimū albissimumque, glutinosius & sanie & sanguine. Sanguis exit ex vulnere aut recenti, aut sanescenti, sanies est inter
» vtrumque tempus: pus est ex vlcere iam ad sanitatem spectante.
» Vnde in eodem capite paulò post, peius est pus multum, tenue, dilutum, magisque si ab initio tale est. At (ante vt dictum est) pus non manat ab vlcere initio. Notatque Celsus, ex vlcere maiore plus puris exire debet, quàm ex minore: item plus puris exire debet nondum solutis inflammationibus: at sanescente vlcere inflammationes minuuntur, & tamen sanescente vlcere pus manare debet, ergo sedata inflammatione. Sed hæc ex comparatione sunt audienda.

Ergo Hippocratis distinctio, οὐκ ἔστι πῶδες ἢ πῶδες, de pure & purulento statui debet. Nos autem distinctionem à duobus fontibus deriuari docuimus. A priore quidem ex sententia Hippocr. qui pus à carne esse putat, purulentum seu, ἵκλον πῶς idest πῶδες & puri simile à sanguine & alia humiditate. A posteriore fonte, ex parte humorum. Nam quidam sunt qui facillè suppurant & à natura reguntur, alij non suppurant, sed aut in corruptū quid, aut ichorem, tabum & saniem conuertuntur. Nam cum sanguis laudabilis ad partem affluit tumoremque facit, suppara-

*Humores
maligni in
pus non ver-
tuntur.*

*Cap. 26. li. 5.
8.*

tum laudabile procuratur. Si humor malignus & κακός gr-
 tiam naturæ non admittit: sed ut humor est ἐλεφαντίνος, ita pus
 quoddam ἐλεφαντίνος & ὀπωρινός dictum, gignit. unde variolæ,
 exanthemata, carbones, ecthymata, herpes à maligno sunt hu-
 more. Unde in iis pus verum gigni non potest. Qui enim humo-
 res toto genere contrā naturam sunt, sunt coctionis incapaces.
 Corruptio enim in parte fit. Id quod Celsus elegantissimè scripsit:
 Genera tenenda sunt in quibus noxa corpori est. Ea quinque
 sunt. Cum quid extrinsecus lædit, ut in vulneribus. Cum quid in-
 tra se corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in
 vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena quæ intumescens in
 varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars est.

Ut ad ægram reditus fiat: ista eluuiæ & copia purulentæ mate-
 riæ, pus non erat, nec erat consumptio (saltem magna & æqualis
 copiæ humoris) corporis ipsius pulmonis, nam si pus fuisset ve-
 rum, & præcessisset vlus pulmonis, oportuisset præcessisse ma-
 gnum vlus, magnamque absorptionem corporis ipsius pulmo-
 nis. Ergo à sanguine erat & ἐξ αἵματος ὑγρὰς, ut Hippocrates lo-
 quitur. Unde videmus aliquando ex thorace vulnerato, aut non
 vulnerato (idque post cadaueris sectionem) ingentem copiam
 aliàs pituitæ purulentæ, aliàs saniei cruentæ, in conspectum veni-
 re, quæ materia propterea non est pus verum. Aliquando excer-
 nuntur quædam σαρκοπυώδεις, & id fit dum discerpitur & eliqua-
 tur caro ipsius pulmonis.

Sed tandem finiamus quæstionem de nocturna exacerbatio-
 ne in purulentis, siue pus fuerit legitimum, siue sanies, siue πύω-
 δής π. Nos enim in ægra nostra vidimus, & in Lucio equite (uter-
 que enim consimili morbo consumptus est, & cum iisdem sym-
 ptomatibus) exacerbationes maximè nocturnas, dyspnoeam, spiri-
 tum difficilem, metum præsentis suffocationis, denique despera-
 tionem: ut in singulis accessionibus nocturnis de funere & exe-
 quiis potius cogitaretur, quàm de exequendis medicorum præ-
 ceptis. Et tamen singulo quoque mane ubi materia deferbuerat,
 & calor remissus erat, penè uterque restitutus videbatur. Causa
 autem verisimilis istius perturbationis & exacerbationis noctur-
 næ esse videtur. In omnibus suppurationibus (agitur enim de
 empyicis) dolores ad noctem incidunt: id quod non tantum au-
 diendum dum pus fit, sed dum pus continetur aliqua parte fo-
 uens febrem lentam. Cum autem empyicis, & propterea hæctica

Ex distinctio
 pendet ex
 Gal. loco su-
 pra adducto
 com in part.
 24. sect 3. li. 3.
 epid.

Locus penè
 aureus.
 Cap. 26. lib. 5.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

32 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Calor noctu
increfcit ob
ignitam par-
tium solida-
rum substan-
tiam.*

*Calor natura-
lis verum fo-
lis heliotro-
pium eſt.*

*Com. in apho.
1. lib. 1.*

febre implicitis partes ſolidæ ignitæ ſint, non mirum ſi noctu calor increſcat (non ob alimentum, vt vult Gal.) ratione ipſius δια-
ῥέσεως, quod tamen non vult Galenus, & quia nox humectat (ideo calor hecticus calce non diſſimilis ſe prodit) reuocatur calor & ſpiritus intro: ſic calor increſcit non ſolùm qualitate, ſed & quantitate. Et ita dum reuocatur calor ad centrum, diſſlatio-
que prohibetur ob noctis dominatum, calor iſte maleficus eſt, malignus, ſquallidus, non *ἀτμώδης*, nec nanciſcitur *ἐς/αγ*, id eſt, focum, locum, domicilium aptum & conueniens, & calor fixus non accipit fluentem iſtum calorem febrilem tanquam amicum, & *ἐπικρατοῦντα*, contemperantem moderantemque, ſic non bene conuenit iſti calori fluenti cum fixo: licet vterque in ægrum conſpiret. Sic cum recurrit calor maleficus & nanciſcitur æquè malum & pernicioſum, dum augetur calor & dolor non fiunt acceſſiones nouæ febriles, ſed *αυξήσεις* caloris & exacerbationes quædam, non ob noui humoris motum, ſed ob ignitam naturam ſolidarum partium ſeiſa factam *πυρεῖωδες/εαγ*, id eſt, ignitiorem. Quomodo Galenus docet dictatque ſomnum aliquando obeſſe, vt cum humores, calor & ſpiritus reuocantur intro & augentur inflammationes & dolores: ita in empyicis fieri ſolet.

Quærat autem quis an pus ſuos motus habeat nocturnos potiùs quàm diurnos. Nam & in inflammationibus internis paroxyſmus eſt nocturnus. Et id non eſt proprium nec hecticis, nec empyicis vt nocturnas moleſtias potiùs experiantur, quàm qui aliis morbis implicantur. Vnde

Mirati ſumus cur antiquitas, peculiari quodam priuilegio & prærogatiua exacerbationem nocturnam puri & purulentiſſi affignauerit. Nec enim id nouum eſt. Nam & venerea lue affecti præſertim vbi ſolidas partes inuaſit & conſpurcauit, nocte dolent magis, & arthritici, & *ὀδονταλγέες*, & *κεφαλαλγικοί* & *κατάρρωδες*, denique multò maxima pars ægrotantium. Præter rationes à nobis adductas ſunt & hæ probabiles. Primò quia omnes fermè morbi ſub tempus noctis ingraueſcunt. Multis id quidem de cauſis. Partim quia ob adueniens tempus nocturnum fit admirabilis quidam motus & reuocatio intro, motus quidem planè contrariùs motui ipſarum vigiliarum. Deinde, coctio fit noctu. Coctio quidem non ſolum humorum naturalium, ſed & contrariorum & febrilium. At dum pus fit, febris augetur, & dolor. Quæ ratio & analogia de pure in abſceſſibus, in aliis morbis & febribus audiri poteſt.

potest. Maximè autem id apparet in empyicis. Dolent enim partes solida, & augetur calor febrilis qui interdium in partes omnes expansus erat. Accedat ad eas rationes, quod inter vigilandum animus occupatur & vigiliarum motus sequitur. Et mens ipsa sese noctu recolligens tota in morbi & doloris cogitationem incumbit. Admirabilis enim motus est intro inter dormiendum. Declarant dormientium phantasmata. Mirum enim est quod qui dormit, præsertim si paulum laborat, animo penè turbatur, somniisque exercetur permolestis. Vbi primum aperit oculos, omnia euolant, omnia fiunt composita & pacata & serena. Si rursum claudit oculos, eadem falsæ imagines sese menti offerunt ac obuersantur. Secundò si oculi aperiantur, ista effugiunt & præteruolant. Interdium sensus ab innumeris obiectis pelliciuntur: & ista irritamenta & illecebræ retinent animum. Præterea amici sua præsentia interdium dolores quodammodo deliniunt & demulcent, dum amica consolatione & alloquiis ægros prosequuntur. Et hæ rationes sunt fortassis cur in morborum futuris crisisbus nox quæ præcedit molestior sit, quia somno interrupto, clarior fiat grauitas & molestia, quàm interdium. Atque ex Galeno colligere possis noctem ipsam non esse causam cur potius malum ingrauescat tunc quàm interdium, sed quod cum aliàs, tum magis de nocte appareat. Has rationes nostro Marte & ingenio paraueramus, ita enim quisque suo sensu valet & abundat. Et tamen inter legendum occurrit locus Aphrodisæi in quo quæstio generalius disceptatur, cur dolores magis noctu augeantur. Et Aphrodisæus vir acutus & eruditus, commentus est rationes nostris non dissimiles, ut quis credat nos è penu illius eas desumpsisse, & illam palmam (si qua debetur inuentori) præripere voluisse. At nos non tantum arrogamus, ut non profiteamur per quem profecimus, quando plagij crimen planè vitandum putamus.

Hæc sunt quæ contractis orationis velis à me discussa sunt, amplioribus verbis excutienda. est autem opus oratione quæ commendetur lepore & vtilitate. Lepore grata futura est legentibus. Vtilitate quia ægris, disputatio erit salutaris.

com. Aphro. 13
li. 2. Aphorism.

Locus ille
Al. x. Aphro-
disæi est pro-
bl. 116. lib. 1.
problem.

Eandem quæ-
stionem de
dolorum cir-
ca noctem ir-
ritatione dis-
cussit Langius
42. epist. lib. 2.
epistol.

ANNOTATIONES.

1. Galenus enim comm. in particul. 62. lib. 2. prognost. ait dolorem tussim & ptyalismum in suppurato accidere cum corpus seu membrana, quæ pus obvoluit, eroditur: & quia tenuior sanies penetrat obvoluens corpus, fit tussis & ptyalismus.
2. Pus ipsum ut glutinosum aliquando impedit quominus & venæ & arteriæ hiantes, sanguinem effundant. Id quod Gal. explicat ad aphor. 27. lib. 6.
3. Pus enim bifariam in thorace reperitur, aut ob inflammationem præcedentem: aut tã pãyn a, quia ruptio facta est, & à parte in aliam pus deductum est com. ad par. 60. lib. 2. prog.
4. Gal. accommodatè ad locum præsertim querit an fieri possit ut quis pus excernat nulla febre præcedente? Auctor enim li. 2. de natura humana loquens de iis qui intermittunt labores pristinos, Quibus, ait, sine febre mustum puris expaunt. Et quicumque in lotiis multum habent quod subsideat puris dolore absente, Et quicumque deiniunt atque in dysenteriiis cruenta, ij quidem omnes annum agentes 35. & adhuc grandiores sponte morbis occupantur, verùm quibuscumque influit in pectus, ij purulenti euadunt, quippe càm purgatio sit acclius & diutius in pectore moram trahat, putret & fit affectus purulentus, quibuscumque autem in vesicam cruentatur id album à loci calore euadit excerniturque. Gal. com. in part. 10. lib. 2. de nat. humana.
5. Quid enim illud est quod in pleuritide cum inflammatio sit, excernitur pituita quædam putris, & ea soluis pleuritidem? quid illud est? An non sanguis biliosus pleuritidis auctor? Curnon aut pus, aut sanguis excernitur si materia coniuncta est malo? An quia membrana inflammatur, ideo sanguis quodammodo pituitescit, ut sit in inflammationibus partium nervosarum: fit enim excretio aut seu tenuis, aut mucosæ pituitosæque materiæ. Ad hunc locum pertinebit illud Hippocratis in Coacis. Quidam anginosi cum euaserint sunt purulenti si non sit expurgatio sursum pituitosa. An hæc pituita materia est y-nanches? videtur esse, quia quo excreto malum cessat, id videtur esse causa mali. Quæstio quæ hic proponitur scitu digna est.
6. Si reuocatio spiritus & sanguinis intro febres & dolores in partibus externis læ laborantibus. At contra fit, nam Pangius ait, inter

diu dolores venereos sedari quia suo tempore, & calore sanguis & spiritus fouent, & recreant partes quæ nocte desertæ ab iis doluerant.

7. Matutinum tempus veri est simillimum. Quod ver si corpus omnino sanam excipiat, in eo statu conseruat nil de natura innouas. Non sic æstas, autumnus, hyems, licet enim corpus omni carens reprehensione excipiant, tamen quia peculiarem unumquodque horum temporum humorem generat, non ita, ut ver in eo bono statu corpus seruant. Hæc Gal. com. ad apho. 20. lib. 3. Hanc de matutino tempore ægris laudent opinionem, & de scanti morborum in tempus matutinum orientium iudicium, leges apud Fernel. cap. 8. lib. meth. med. in febribus. Et forte ea ratione ab aduerbio aut quo manum pro manè deductum a dictum manus a, um, priore syllaba longa, d est bonus, a, um, quod matutinum tempus sit auspiciatius & fauorabilius, & hæc coniectura nostra est. Celsus cap. 5. lib. 3. apertissimè explicat hanc questionem de matutino tempore, ait que matutinum tempus sua naturam melius esse sed morbi vitio, aliquando non est melius. Textus est, illo loco sicco pede non transeundum.

8. Vnde in hydropicis, & in cacochymis sanguis est saniosus medius inter sanguinem & pus verum. Imo puris nomen habere potest, cum ex opinione Donati in Terent. pus dicatur omnis suc. us & humor corpori onerosus. Et forte illud est Hippocratis quod in corpore ægro capacitates corporis sunt plenæ ichoris: iste ichor est πῶδες τι Vnde paulò ante diximus in tussi materiam tandem pituitosam albam crassamque reddi, & dum coquitur, πῶδες τι ὁμοῖον ὅτι πῶδες τι. Hipp. 7. epid. de Charite.

9. Pus aliquando generaliter sumitur pro humore albiscente, ut cum Hipp. libro de aliment. ait venam à pure nutriti: aliquando pro corrupto humore à sanguine erat πῶδες τι ὁμοῖον ὅτι πῶδες τι, ut cum Hipp. 4. de morbis vermes in pueris contentis in vtero gigni ait, cum ex sanguine & lacte putrente, quod dulce est, pus fit feruidum animalis materia. Sed puris nomen, ut hic generaliter vsurpetur patet ex Hipp. Et Donat. in Ter. pus omnis humor dicitur corpori onerosus, unde expuere omnem molestiam.

CONSILIVM IV.

De sanguinis missione in melancholicis & data occasione explicatur illud Hipp. cur sanguis faciat ad sapientiam.

*Melancholici
alij à limo,
alij ab affa-
tione sangui-
nis.*

*Cap. 7. lib. 3.
de aff. et. loc.*

2. epid.

EX Galeni & omnium Medicorum sententia, melancholici alij sunt à face & limo sanguinis, & maxima eorum pars lienosa est. Hos iuvat etiam febris, ut quæ coquat digeratque eum succum frigidiusculum qui est limus & superfluitas sanguinis. Et quartana febris tuta esse dicitur, & à magno morbo, id est, à comitiali, vindicare, quod successu temporis, humor crudus mitificetur. Ut mirum non sit, si quartana à tali nata humore fœculento, è genere morborum chronicorum censeatur. Ideoque Macrobius conferens iecur cum splene, ait illud caloris, hunc frigoris sedem esse & domicilium: & ideo sinistras partes debiliores dextris, quod dextras calor suus regat, id est, ab iecore calido manans (de quo dubitari potest cum cor fons caloris vocetur) at sinistræ contagione frigoris eas obtinentis, hebetes redduntur. De quo abundè diximus in eo opusculo quod de causis convulsionis conscriptum est. Alij sunt melancholici per affationem humoris biliosi, aut sanguinis ipsius. Vndè corpora biliosa quæ carent perspiratu sunt melancholica. In his affatio, suppressioque spectatur. Galenus utrumque breviter est complexus. Nam & quæstionem tractavit de mittendo sanguine ipsis melancholicis, & explicavit qui nam sint melancholici, siue natura, siue vitæ instituto, siue ex euentu, ut suppressionis ratione, siue propter cibos potusque id contingat. Hippocrates ab effectis melancholicos collegit in epidemiis. Ac primùm videamus qui nam ex Gal. melancholici dicantur; Ex corporis habitu æstimandi sunt melancholici molles, „ candidi & obæsi nequaquam sunt melancholici macri, nigri, „ hirsuti, & quibus latæ venæ, aptissimi sunt ut in iis humor melan- „ cholicus cumuletur. Et fit nonnumquam ut homines præ rubro co- „ lore. (ἐξερύθησας Græci vocant) affatim in melancholicam tempe- „ riem decendant: secundo loco flavi, idque maximè, si vigiliis, labo-

ribus, & tenui victu vli fuerint. Item Celsus; Tenuioribus plus sanguinis, plenioribus magis caro abundat. Melancholici sæpè sunt macri & tamen amplas & plenas habent venas. Deinde exponit Gal. qui cibi humori tali generando sint idonei. Quo loco verè exponit quinam sint ij in quibus humor melancholicus facile generetur & cumuletur. paulò post ex sententia Dioclis docet sanguinem crassiores generari in melancholicis hypochondriacis, in iis præsertim venis quæ alimentum à ventriculo excipiunt. Id autem euenit ratione caloris exuperantis. Hippocrates aliter (vt antè dictum est) melancholicos obseruauit. Morbos fortiter atrabilarios habent balbus, caluus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus. Et paulò post, Balbi, celere lingua præditi, atræ bilis humori obnoxij sunt (Græcè μελαγχολικοί εἰσι.) Et ante, vocis gracilitatem varix soluit. Ac locus iste Hippocratis de balbis, de caluis, quod sint melancholici, admodum obscurus est. Nec enim rationem reddit Hippocrates suo impeditus laconismo. Aliqui enim interpretari possint & balbos, & gracili voce præditos melancholicos esse, quoniam frigidiores sunt temperamento, ideoque pituita multa crassa frigidaque abundant. At pituita consistentiæ ratione humori melancholico qui sanguinis limus est, assimilis esse solet. Quo modo Galenus interpretatur: melancholicus humor quartani circuitus causa est, & incontinentiæ lingue, & stuporis partium, quia ob humoris crassitudinem tales affectiones consequuntur, quales ex crassa & lenta pituita eueniunt. Sic incontinentia lingue & stupor, aliquid non est absolutè Melancholicum, nec absolutè pituitosum, sed mixtum & aliquid. Nam timor, tristitiæque absque causa manifesta, elephas, cancer, scabies, lepra, & vitiligo nigra melancholici sunt affectus absolutè. Sic aliud est dicere balbos, linguæque hæsitantes ἰχνοφώνους melancholicos, aliud nigros & hirsutos. Nam priores melancholici dicuntur sumpta improprie pituita pro humore melancholico: nigri & hirsuti proprie melancholici dicuntur, sumptoque in propria significatione melancholici nomine. Sic conciliandi loci videntur. Dum hîc finem impono occurrit alius Galeni locus verè confirmans ea quæ antè diximus. Ita enim Hippocrat. in morbis melancholicis ad hæc (id est ad ver & autumnum) periculosi decubitus stuporem corporis, vel conuulsionem, vel furorem, vel cæcitatem significant. Apoplexiæ, conuulsionem & cæcitates (ait Gal.) ob humorem pituitosum fiunt, fiunt & ob melancholicum,

sect. 5. lib. 2.
epid.

Com. ad
apho. 40. li.

Apho. 56. l. 6.

38 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quoniam vtrisque est crassitudo. Sic hoc loco stupor corporis aut
 partis melancholici humoris soboles videtur, quod tamen alio
 loco negat Galenus. At his omnilis quæ subtiliter comminiscitur
 Galenus, multò subtilius Arculanus explicat qua ratione blasfi,
 balbique melancholici dicantur: hæc eius verba sunt, minus ele-
 gantia quidem, sed rem verè exprimentia, Corpora habentia cor-
 calidum, cerebrum autem humidum, sunt dispositioni melanco-
 licæ opportuna, nam caliditas cordis est cholera nigra in corde
 generatrix, cerebri autem humiditas causa est cur faciliè impres-
 sio eius suscipiatur quod in corde gignitur: idè, balbi & lingua
 vacillantes, ad melancholiam parati sunt, maximè si linguas lenes
 habuerint, & oculos mobiles, & cætera. sic pilositas, rubor faciei
 calorem cordis significant, blasfitas, mollitiesque lingua cerebri
 humiditatem. Arculanus autem solutionem quæstionis de me-
 melancholicis & balbis eruisse videtur ex Hippocrate. Nam ille 2.
 epid. sub finem, Quorum pectora bilem generant balbi sunt, fu-
 riosi & calui sunt: in quo explicatur ista cordis intemperies cali-
 da, author incõditorum animi motuum: nomine autem pectoris
 cor ipsum per synecdochen audiendum est. An verò rationes Ar-
 culani ipsæ per se nitantur, an faciliè euertantur, ipse videris. Nam
 Hippocrates absolutè blasfos, & gracili voce præditos melanco-
 licos affectus pati docet, Arculanus non absolutè blasfos, sed quo-
 rum cor est præcalidum & fuliginosi excrementi parens, cerebro
 ipso humidiorè existente vt ex balbutie linguæque hæsitantia
 apparet.

Nisi fortè coniungamus hos duos, blasfos & hirsutos, quos dis-
 iunxit Hippocrates, coniungit verò Arculanus.

Nisi dicamus non verè balbos esse melancholicos, vt quibus
 humidius frigidiusque cerebrum existat, sed improprie balbos, vt
 quibus præ calore partim aduentitio, partim cerebro innato, mul-
 tæ pituitæ sit diarrhœa, fusio colliquatioque, vnde pyralismus &
 oris totius perpetuus mador, hinc balbuties mollitiesque ipsius
 linguæ. Hæc nostra est coniectura. Quæ licet dignitate & veritate
 cum prioribus non contendat, habet tamen suum quoddam pa-
 trocinium quo aliquatenus tuta esse possit.

Paulò longius digressi sumus quàm opinati fuerimus: sed hæc
 digressio est ad id quod instituimus valdè opportuna. Sciendum
 enim fuit qui nam sint verè melancholici, vt de sanguine mit-
 tendo in melancholicis plenius constet. Nunc itaque ad rem in-

I.
 Quibus ce-
 rebrum hu-
 midius, cor-
 autem cali-
 dius, si me-
 lancholicæ
 sunt oppor-
 tuni.
 Arculanus
 cap de me-
 lanchol.

Nota de con-
 iunctione &
 disiuactione
 blasfi & hir-
 suti.

Pituita diarr-
 rhœa à calore
 balbutiei
 causa.

stitutam redeamus. Primum verò audiendus est Galenus quid e
instituto hæc de phlebotomia quaestionem ex hypothesi exami-
nat. Audito enim Galeno, eiusque rationibus ad tutam re-
ductis, veritas facilius innotescet. Ita Galenus, Vbi vniuersum cor-
pus sanguinem melancholicum continet, curatio à phlebotomia
incipiet: vbi solum cerebrum, infirmius (quod ad dispositionem
attinet) sanguinis detractione non eget, licet alia de causa sanguis
mitti possit. An verò cerebrum solum, an totum corpus sanguine
melancholico abundet, discernendum. Corporis enim habitus
est considerandus. De hoc paulò ante dictum. Itaque vbi cerebrum
aut intemperatum est, aut sanguine melancholico plenum, non
necessariò ceterum corpus ita affectum est: at contra. Si totum
corpus ita affectum est, vix immune est ab ea affectione cere-
brum. Ita enim Gal. Constat autem ad totius corporis intempe-
raturas mentis læsionem consequi, affecto nimirum cerebro,
non secus ac totum corpus affectum est. Quæstio tamen esse pos-
sit an si solum cerebrum sanguinem multum melancholicum
contineat, à sanguinis detractione sit abstinendum. Hanc ean-
dem distinctionem doctè obseruat Galenus de malo cerebri to-
pico, de que malo per consensum nato, cum agitur de vertigine:
Capitis solius caliditatem; quouis alio modo habentis, balneum
iuuat. Cum verò flatulentus spiritus ob humorum prauitatem ad
caput fertur, hos lauare non conuenit. Qui locus diligenter ad-
uertendus est, quoniam grauis in eo lapsus esse solet. Nunc ad
sanguinis detractionem in melancholicis redeamus: vena media
secanda est: & si melancholicus sanguis non videatur, supprimen-
dus est: sin talis appareat, vacuandus pro virium modulo. Vt au-
tem finem commentandi faciam, quoniam nos hîc prolixos esse
non oportet, concludemus totam hanc commentationem. Con-
clusio autem fiet in præclara Hippocratis sententia, hæc autem
est eiusmodi: Credo inter ea quæ sunt in corpore, nil magis ad
prudentiam conferre quàm sanguinem. Hic enim cum in con-
stanti habitu consistit, consistit & prudentia: sanguine verò per-
mutato, concidit & prudentia. Græca litera est ἐνερgeticωτέρα. εἰ
μὲν τὸ αἷμα ἐν τῷ χρεστικῷ χήματι μένῃ μένει, καὶ ἡ φρόνησις ἐξ αὐτῆς
σοφίας τῷ αἵματος μελαπύπλευ καὶ τὸ φρόνημα. Hoc autem Hippo-
crates familiari & apud nos nato exemplo docet: Cum corpus in-
uaserit somnus, sanguis frigescit: id dum fit languidiores fiunt cor-
poris meatus Græce Νέξοδοι. id patet nam aggrauata corpora re-

Cap. 7 lib. 2.
de locis aff.

66

66

66

42

66

Ad part. 34.
sect. 1. lib. 1.
prophet.

66

Com. in 4.
ACHL.

“

66

20

55

Permutatio
sanguinis ef-
ficat ut concidat prudētia.
In sanguine
magna pars
vitalitatis
residet, ait
Plinius.

*Augmentum
sanguinis, af-
feri μεταπτω-
σιν τῆς ψυχῆς*

*Publius Sy-
rus.*

*Hip. 1. de
dieta.*

clinantur: & oculi ardent & prudentia permutatur, Græcè ἀλλοιῶ-
ται, opinionēque peregrinæ mentem exercent, quæ infomnia
vocantur. Ad hanc tandē sententiā pertinet quoque locus Hipp.
lib. 3. de diæta, cum loquitur de immodica repletionē quam somni
turbulenti sequuntur, Qualia patitur corpus, talia videt anima
visu iam concluso. Et in remulenti aucto repente sanguine με-
ταπτεσθαι ψυχῆς καὶ ἐν ψυχῆς φρονήματα: Sic sanguinis ἐξαλλαγή
τῆς φρόνῃς ἐξαλλάσσει. Nam si omnino conturbatur sanguis,
omnino ἡ φρόνῃς ἀπόλλυται. Deinde subdit Hippocrates, τὰ
κατὰ φύσιν καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἔστιν. ὅταν διὰ τὸ εἰωθότος ἔχει
μεταστῇ, ἀνδρεται ἡμῶν ἡ φρόνῃς. Hic locus est valdè obscurus,
& vix intelligibilis: Ita interpretes, affectus & cognitiones consue-
tudines quædam sunt, id est, à consuetudine proficiuntur: cum
autem à consuetudine recesserimus, tollitur nobis prudentia,
id est, habitus ratione comparatus ad administrandas vel res pri-
uatas, vel publicas. Porro vt dicebat Preta, grauissimum est impe-
rium consuetudinis: per eam enim & animi morbi & artes com-
parantur: nec non per eandem conseruantur. De artibus id con-
stat facilè. Animi verò pathemata non nisi consuetudine in bo-
num malumue habitum transeunt. Nam quæ boni maliue specie
obiiciuntur, si aut ratione persequimur, aut vitamus, in eo appe-
titio cernitur, eaque cum ratione coniuncta. Cum reluctamur ra-
tioni, plusque potest delectatio quàm ratio, tum contra mentis
præscriptionem allicitur appetitio eaque ratione vacat. Si tran-
quilla ratio motu turbido cietur, perturbationes fiunt, quæ cum
inueterauerint, morbi existunt. Si contra rationi obediunt auscul-
tantque, virtutes morales inde exurgunt & expullulant. Hic ar-
tes, virtutes vitiaque à consuetudine ducuntur, à qua cum rece-
ditur perit prudentia, quæ virtutibus morum perpetuo cohæret
opinionē Aristotelis. Hanc sententiā quorundam auspiciu &
ingenio sic sumus interpretati, pluraque in eam rem statui scribi-
que possent, nisi vereremur ne instituta hæc brevis explicatio
mentis Hippocraticæ, in commentarium redundaret. Nunc alios
quosdam locos lustremus in quibus Hippocrates eandem penè
celebrat sententiā, quod sanguis maximè ad prudentiam fa-
ciat. De animæ sapientia insipientiaque sic statuendum: quod
humidissimum est in igne & siccissimum in aqua si in corpore
temperamentum acceperit, homines fiunt sapientissimi, quia
ignis habet humiditatem ab aqua, aqua autem siccitatem ab
igne

ignem, vterque autem sufficit. Et convenienter iis quæ dicta sunt Hippocrates de phrenitide loquens ita scripsit : Sanguis qui est in homine maximam partem ad prudentiam confert. Quidam dicunt totum. Cùm verò bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consueta compage ac motione dimouet & seorsum facit, homo desipit & non sibi constat (quia calefactus sanguis totum corpus calfacit) præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Græca verba vt appositè dicta inculcanda sunt : bilis commota διακινεῖ καὶ διουρεῖ τὸ αἷμα ἐν τῇς συστάσις εἰσθηγίας καὶ κινήσεως, καὶ διαθερμαίνει. Homo verò non sibi constat præ copia febris calefacto toto corpore, καὶ ὑπὸ τῇς τοῦ αἵματος διουρήσεως καὶ κινήσεως ὅς τῇς εἰσθηγίας. Et postea de melancholicis loquens, nam ab atrabile delirant homines, ὅταν φθαρῇ τὸ αἷμα ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. Nam tales, vt vocat, μελαγχολοῦντες habent ὁρμῶνται, alij verò μαίονται. Sic ingressus bilis aut pituitæ in sanguinem motum naturalem impediens & sanguinem serosum, proinde morbosum reddens, prudentiam adimit, & delirandi porrigit occasionem. Item facit aër opinione Hipp. Qui aër ad venas peruenit, confert ad ventriculorū ingressum & ad cerebrū, sic enim sapientiam & motum membris exhibet. Id dum non fit, sed pituita in aqueductus irrumpit, tum cōuellendi occasio est, vt paulò antè demonstraauerat. Vt omnia ad ἀνακεφαλαιώσιν reducantur, vis est in verbis Hippo. ponenda. Primùm hoc statuit Hipp. sanguinem ad sapientiam facere, nam qualis sanguis, talis spiritus, qualis spiritus, talis animus. Hic autem medicè nos locutos intelligas. Sanguinem autem benè temperatum esse oportet, & suam consistentiam & motum naturalem habere. Propterea Asiaticos ceteris prudentiores Hippocrates dicebat ob cœli clementiam & bonitatem temperamenti. Quibus ergo sanguis est optimè temperatus, blando, benigno, & habituoso spiritu perfusus, non alteratus, non mixtione alijs humoris alienatus sui que dissimilis, denique in qualitate, quantitate, motu, consistentia laudabilis, ij prudentia & benignitate morum sunt commendabiles. Quorum sanguis aliter habet, eorum mens facilè vacillat & agrotat. Sensus denique bonitas temperamenti perfectione & spirituum puritate censetur. Expendamus verba Hippocratis cùm morbum agrotationemque & defectionem sanguinis depingit, quæ causa est cur homo imprudens insipiensque reddatur. Primùm confide-

Ad finem l. i.
de morb.

cc

cc

νήσιος τῇς
χολῆς.
Ingressus bi-
lis in sangui-
nem.

2.

Istud sangui-
nis vitium
vocat Hipp.
in Coacis αἱ-
ματος φθορὰ
καὶ ἐκλυσις.

Hic locus est
obscurus, sed
paulò post
aperietur.

Apud Gal. cō.
ad part. 13 i.

prorb. ait
tandiu mor-
bum crudum
dici, quandiu
bilis cum san-
guine sursum
feriur.

Lib. de sacro
morbo.

In lib. de lo-
ciscis aeribus.

Sanguis in
quantitate,
qualitate,
motu & con-
sistentia lau-
dabilis, ad
prudentiam
facit.

rat τὸ χῆμα καθεστῆκός: vertunt, constantem habitum. Hic ubi perfistit, prudentia in homine relucet. Opponit τῷ χῆμα π καθεστῆκός τι τὸ ἐξαλλαγνῷ: id est digressum defectionemque ex isto habitu. Et tunc prudentiæ fit iactura. Istam autem ἐξαλλαγνῷ considerat in qualitate, & in quantitate sanguinis. In qualitate, ut cūm refrigerat sanguis, id quod in somno fit, vnde insomnia & peregrinæ opiniones; aut cūm incalescit, ut dum bilis sanguinem subit, quod contingit in phrenitide, ut postea aperiemus. In quantitate, ut in ebrietate, aucto enim sanguine ἢ φρόνησις, καὶ σύνεσις vim patitur & alteratur. Deinde addit, si conturbatus omnino fuerit sanguis, sequitur τῆς φρονήσεως ἀπόλεισις casus, ruina, deperditio. Aliud enim est simplex ἐξαλλαγή, aliud omnimoda ταραχή. Hæc sunt quæ libro de flatibus. Libro verò de morbis aliis vocibus est vsus. Nam in sanguine naturaliter constituto considerat τι τὸ σύστασιν quam Aristoteles πῆξιν vocat, & κίνησιν naturalem: his opponit, nempe τῇ συστάσει τὴν ὕρμησιν, τῇ δὲ κινήσει διακίνησιν ἢ τῆς εἰωθῆναι κινήσεως. Id autem fit maximè cūm in sanguinem bilis subit, & fiunt ἐπιρροαί, ut libro de acutis loquitur Hippocrates. Itaque siue sanguis διουρεῖ (id quod Aristoteles vocat τὸ αἷμα ὑγρῶναι, id est serosum humidiorēque fieri, propterea que morbo si sanguinis rariorē subit) siue dimouetur ex proprio & naturali motu & cursu, tunc mens aberrat, magnarūque in corpore mutationum nascitur occasio. Fortè est illud quod in libro de flatibus dixit, sanguinem habere suum χῆμα καθεστῆκός: Caterū duo sunt notanda, prius, quod bilis sanguinem subiens, serosumque reddens, aut emouens, sanguinem calefacit, calfactus cæterum corpus recalfacit, hinc erroris mentis occasio: itaque semper hîc consideratur intemperies perturbationis mentis causa: alterum, dum loquitur de atrabile sanguinem subeunte, vnde aut τὸ δόλοια aut μανία, vocat τὸ αἷμα φθαρῆναι ὑπὸ πολλῆς καὶ φλέγματος, vnde antè dixit prudentiā aboleri ἀπὸ τῆς πάμπαν ταραχῆς τὸ αἷμα. Notanda vis verbis φθαρῆναι. Nec enim contentus fuit Hippocrates πρὸς τι τὸ μανία verbis διακινεῖν καὶ διουρεῖν ut antè. Caterū vnum addam animi gratia, quod fortè delicatius exquisitiusque à me dictum putauerit aliquis: nempe nomen ἐήσματα non tam consuetudines, illas significare quæ ad virtutes morales comparandum valent, quàm consuetam illam constitutionem, motionemque & statum sanguinis, quæ constitutio naturalisque motio bonarū & quietarū animi functionum causa

Ante ex Hipp.
locum addu-
ximus de de-
coloribus in
quibus est
τοῦ αἵματος
καὶ ἐκλυσις
καὶ φάρος.

existit. Quid enim illud est quod scripsit Hippocrates, τὰ παθήματα καὶ ἀναγνώρισματὰ ἐπίσμοτὰ ὄντιν: affectus & cognitiones consuetudines quædam sunt: melius referemus τὰ ἐπίσμοτὰ ad τὴν σφαιρὴν καὶ κίνησιν ἐὰν ᾖ de qua ante diximus, quam σφαιρὴν καὶ κίνησιν εἰωθῆμεν ubi sanguis deferuit, ab eaque est depulsus ac dejectus, tunc mens labat aberratque. Si enim sanguinis quies, aut nativa quædam sui generis motio & consistentia ad prudentiam facit, quæ iis sunt contraria, mentem emouent & de rationis gradu deiiciunt. Sic τὸ ἐπίσμος, idest consueta sanguinis motio agitataque naturalis, temperies & consistentia & affectiones animi & cognitiones has illasue parit. Sed hoc longius quidem repetitum videtur, ex interioribus tamen Hippocratis arcanis: Item vnus locus alterius est interpres & enarrator. Sed suus cuique abundat sensus. De sanguine seroso eodemque morbo nil amplius dicam cum plerisque in locis operum nostrorum abundè dixerimus, & aliàs, cum maius quoddam suppeditabit otium, aliquando dicturi sumus. Duo breuiter annotabo de sero & ichore: Lib. de arti.
vnum est Hippocratis, Galeni alterum: ita Hipp. Quæcunque
carnem in orbem circumfitam habent, ea omnia ventriculum
habent. Omne enim inconcretum & quod non coaluit, siue pelli-
cula, siue carne contegatur, cauum est. Impletur autem dum
agrū est sanie, Græcè ἰχὺρ, dum sanum est flatu Græcè πνεῦμα,
melius spiritum quàm flatum vertas. Alter locus Galeni est quo
apparet tantam esse vim immutationis ipsius sanguinis, siue per
se, siue ob mixtionem rei alienæ, ut inde mouendæ mentis nascatur
ocasio: Ita verò Gal. Crudo in morbo bona crisis fieri non
potest: crudus autem est in quo bilis vnà cum sanguine sursum
fertur, quocunque tempore id fiat: magisque tale aliquid euenit,
cum igneæ caliditatis in cerebro collectæ immoderatio fuerit:
Græcè θερμότης ἡγεοισμένη in capite dicit, ut focus in capite
existat.

At verò hæc propositio, quod sanguis ad sapientiam vel plurimum, vel omnino faciat, non modo à nobis leniter tractata & degustata est summo labro, sed satis accuratè explicata est. Eò autem libentius eam explicandam suscepimus, quod sapientius ab Hippocrate repetita est. Vbi enim generationem phrenitidis explicat, in qua delirij summa sunt omnia, ait id effici tum quia sanguis habeat motum quendam non solitum, tum quod admistione bilis aut similis humoris alieni, suam σφαιρὴν amittat, & ut alio

Aliud est abundare flatu qui πνεῦμα dicitur, aliud flatu qui ἰχὺρ.

3.

Ad part. 13. sect. 1. lib. 1. prorrh.

Quando bilis cum sanguine miscetur sursumque fertur, tandiu morbus crudus dicitur Gal.

Quid sit sanguinem amittere suam consistentiam. Lib. de flatibus.

44 CONSILIORVM MEDICINALIVM

loco loquitur, τὸ χῆμα καθεστηκός, idest, habitum naturalem constantem, alio loco ad hæc duo addit φθοράν, corruptionem. Sed ex bilis mixtione ἢ φθορὰ sequitur, & ex motu solito commotio, & consistentiæ nativæ permutatio. Et in Coacis Hipp. loquens de decoloribus ait, in his esse τὸ αἷματος φθορὰν καὶ ἐκλυσιν: nomine τῆς ἐκλύσεως sanguinis consistentiæ dissolutionem significat. Denique fit τὸ αἷματος ἐξαλλαγή, hinc sanguinis fit διαστροφή, & hanc sanguinis διαστροφήν sequitur corporis ipsius διαστροφήν quædam, ut loquitur Hippocrates. Maximè autem de Epilepsia à flatu nata.

διαστροφή αἵματος.

Lib. de flat.

Quòd autem sanguinis mutatio siue in motu, siue in consistentia, seu in quanto, seu in quali, & facillè fiat, & maximi sit momenti, ipse Hippocrates demonstrat exemplo familiari & sub sensum plebeiorum cadenti. Illud autem à somno ducitur. In hoc enim ob blandum vaporem à cibo crudo recens ingesto & nondum modificato excitatum, sanguis aliquantulum alteratus, & paulò frigidior redditus, hominem consopit, dissolvit & effeminat, ut semimortuus appareat. Idem in temulentis apparet, cum copia vaporis extranei peregrinas opiniones affert, & corpus aut languidum, aut furibundum & ferocienti bestię assimile reddit. Si tantula hæc commutatio in sanguine, & eiusdem simplex alteratio, tanti momenti est, istasque affert turbas, quid fiet, vel cum vitiosus ipse per se erit, vel admistione humoris alieni genitus est?

Tamen obiciat quis, non est necesse sanguinem alterari, nec vapores subire venas, sed per inanes vias & spatia dum feruntur sursū implent suo vapore intacto sanguine.

in Timæo.

Abundè quidem ea de re dixeramus, tum in paginis prædictis initio huius commentarij, tum in 2. libro Consiliorum meorum explicans locum libri 4. acutorum, ubi docet humorum ἐπιρροίας καὶ εἰσόδους vnde sequuntur τὰ πνευμάτων ἀπολήψεις. Tamen quoniam nuper legenti occurrit locus integer ex Platone à Galeno ad finem libri in alium locum translatus, & qui miro quodammodo humorum vim explicat, cum pede sicco transeundum non putavi. Quæ verò ratio eò me maximè adduxit, ea est, quod illo loci Plato videtur explicare Hippocratis sententiam de motu bilis in sanguinem, & sanguinis in serum mutatione, vnde perturbationes mentis consequuntur. Et id quod nunc à nobis dicitur, erit instar commentarij ad locum illum Platonis: explicabitque vicissim alium locum libri acutorum, in quo author libri utitur vocabus nō vñtatis, vnde obscuritas gigni solet. Nunc autem audiamus Platonem loquentem, ut textum textui opponendo veritas tandem eluceat atque appareat.

TEXTVS PLATONIS.

Cum quatuor sint ex quibus corpus constet, ignis, aer, aqua & terra, horum excessus, defectus & propriae sedis mutatio (Græcè μεταστάσις) & si horum unumquodque non suscipiat id quod conuenit, μεταστάσεις καὶ νόσους παρ' ἑαυτοῦ melius, μεταστάσεις, id est perturbationes & morbos afferunt. Cum enim à natura recedit & commutatur unumquodque (μεταστάσις dicitur) quæ frigida erant calfiunt, quæ graua leuia fiunt, & multas mutationes (μεταβολὰς) suscipiunt. Hoc de elementis, nunc de humoribus: Pituita alba intus detenta nocet & molesta Pituita alba intus. est ob spiritum bullarum, διὰ τὸ πνοεῖν πνεύματος. Si verò foras ex- Pituita alba foras. paret (ἔξω τὰς ἀναπνοὰς ἔχον.) mitior quidem illa, sed tamen corpus variegat (καταποικίζει) unde leucas, alphos, & congeneres affectus parit. Sed vide quid noceat pituita non nocet nisi in bullas vertatur & Gal. com. ad aphor. 51. lib. 7. ait pituitam, per se non molestantem esse nec sternutamentum prouocare nisi aut in flatum vertatur, aut acrimoniam acquirat. Id quod ex Platone desumptum videtur.

COMMENTARIVS.

Antequam ultra progrediamur, dicatur aliquid de pituita alba, dulci eaque innocenti, quod dolores non pariat. Hæc aut intus manet, aut foras exit. Intus nihil molestiarum infert, nisi dicatur id facere ob flatum bullarum. Id quod obscurius dictum est. Nisi forte cum referuer, aut pars eius præcruditate in flatum; aut agitatione in spumam quandam vertatur & tunc doloris nonnihil afferat. Flatus enim leui de causa excitatur, & cruciatum infert. Et dum natura eam coquit, excitare potest flatus & πνοή. Si extra mouetur materia phlegmatica alba, & si habet ἀναπνοή, materia enim cruda facile ἢ φύσας excitatur. leucas, & alphos in cute parit. Notandum id εἰ ἀναπνοή, id est si perspirat & exhalat ista materia, vitiligine alba cutim inficit. Habere τὴν ἀναπνοήν foras humores dicuntur, cum natura foras emittit. Plato id ab Hipp. mutuatus est. Nam ad finem 4. de morbis, dum explicat cur pedes in hydropo rumeant aut non, ait aliàs aquam habere suam πνοήν, ἀναπνοήν, & ὁρμήν, vritur enim his tribus, aut non habere. Et prout id fit, aut tumet pars, aut detumet. Ad eandem sententiam Aristoteles quarit cur pueris & mulieribus minùs frequens sit vitiligo quam viris, & mulieribus si acci-

Vnde apud Gal 2 ad Glauco. in-
guntur hæc ἀπὸ πνοῦ καὶ φουσάδης. In materia enim cruda facile ἢ φύσας exci-
tatur.

Probl. 4. 1. 10.

46 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Lib. de aere
& locis.

Com. ad part.
38. sect. 2. lib.
6. Epid.

Pituita atræ
bili mixta
Epilepsiam
parit.
Pituita aliàs
in somno,
aliàs extra
somnum ali-
ter agit.
Plato multū
tribuit æqua-
litati aut
inequalitati,
libertati aut
impedimento
meatum. Id
Plin. admo-
nuerat c. 24.
l. 2.

dat, iam annosis accidit. Quia, ait. vitiligo exitus spiritus est, at cor-
pora puerorum & mulierum minus perspirant, quàm virorum.
Quæ autem corpora consenuerunt, perspirantiora fiunt more
edificiorum veterum, quorum structura partium iam laxior esse
incipit. Hippocrates vocat ἀγρία in senibus. Sic cum ait Arist.
vitiligo exitus spiritus est, attingit eam platonice ἀνὰ πύλον. Mi-
nùs quidem medicè Aristoteles de vitilagine. Ergo, apparet vt pi-
tuita alba dolorem non exhibet, saltem commemoratione di-
gnum. Id quod Gal. quoque docet explicans eodem ex Platone
vires feri humorū. Pituita sero torpor & frigus inest, non mo-
dicas nec malignitas, nisi fortè aut falsa aut acida euaserit. At Plato
postea cum pituita alba iungit succum aut bilem nigram, & tunc
affectiones sequuntur maximè terrificæ: cuiusmodi est morbus
sacer. Fit autem cum pituita atræ bili mixta diuinas ἀεὶ δόδους quæ
sunt in capite inuaserit ac infestauerit: Et quod notandum maxi-
mè ita ait, Vt in somno mitior est, sic eadem pituita atro iuncta
succo cū vigilantes inuaserit, diutius vrget. Videmus enim vul-
gò euenire vt vigilantes paroxysmo epileptico prehendantur po-
tius quàm dormientes. Quod non abs re à Platone dictum est. Et
si plenum commentarium scribere nobis animus foret, pleniori-
bus velis solueremus, & diligentius in eius rei quæstionem incum-
beremus. De pituita satis. Nunc ad alia.

TEXTVS PLATONIS.

Pituita verò falsa acidaque fons est omnium affectionum & mor-
borum quicumque κατὰ φύσιν dicuntur, id est, quorum essentia in de-
fluxione consistit, & varia sortiuntur nomina prout in has aut illas
partes humor defluerit.

COMMENTARIVS.

Hipp. 4. acut.
part. 27. τὰς
ἐπιπτώσεις
consist. τῆς με-
λαίνης χολῆς
καὶ δριμύτητος
πύματος.

Diligenter animaduertere debet an affectiones πνευματικὰ
agnoscant solam sui causam pituitam acidam ac falsam. Galenus
loco prius adducto ex sexto Epid. dolorem & malignitatem his
maximè duobus humoribus & eorum sero attribuit. Sed hæc in-
quirere alius sunt loci atque temporis: Itaque ex inquisitione
superfedendum puto. Nunc de bile flaua.

TEXTVS PLATONIS.

Quaecunque in corpore inflammantur ardentque, à bile flava id habent. Cui enim foras exhalat, Græcè ἀναπνέω ἐξ ὧ χύστα, referens omnis generis tumores, φουσμάτα emittit. Inclusa gignit morbos exurentes plurimos. Maximumque cum puro sanguini admixta fibrarum genus ex proprio ordine depulerit, quæ fibræ eò sanguini datæ sunt, ut nec minus tenuis nec crassus foret, nec præ caliditate (cùm humor sit) e corpore effluat, & ne præ densitate motioni sit ineptus, & vix in venis sese conuertiat. Et cætera. Addit, in mortuo sanguine si quis fibras colligat, is diffluit. Alioqui cum ambiente frigore relictæ coguntur.

De viribus bilis quæ corpus continet, sensus acutiem faciat meatus corporis apertos retineat, coctioni proficit vide fragmenti Galeni ex Stobæo in præfatione librorum de dogmatis Hipp. & Platonis.

COMMENTARIVS.

Non est dubium quin bilis cum accensa fuerit & foris & intus excitato summo ardore & deflagratione, molestias non inferat. Quod ante de pituita alba dictum est quæ haberet suam quandam foras ἀναπνέω, idem & de bile dici potest. Vnde cùm Hippocrates bonum esse ait erysipelas foras exire, id non fit nisi per istam exhalationem & translationem intus foras. Mirum autem cur dicat bilem in habitum corporis φουσμάτα gignere, intus verò περιχέουσα νοσήματα. Φύσμημα enim flatum significat, & aliquid spirituosum, aut inflationem. Et idem facit foris bilis, quod pituita intus. Hæc enim molesta est (ut dictum est ante) ob flatum τῆ πομφόλιχων: quid aliud est quàm dicere & τὰ φύσμημα. Nam πνεῦμα, φύσμημα, & πομφόλιξ habent aliquid συγγένες. Dicendum est bilem ubi feruet in habitu corporis non tam tuberculum aut verè tumorem excitare, quàm tumorem improprie & potius pustulas. Et τὰ φύσώδεα & φύσμημα ad pituitam potius quàm ad bilem flavam referenda sunt. Tamen quoniam ubi bilis cum sanguine feruet, bullæ & tenues vesiculæ excitantur, ideo parum medicè fortasse ea omnia nomine τῶ φουσμάτων comprehendit. τὸ γὰρ φύσμημα in bullante humore dicitur. Et ebullientis sanguinis eruptio φύσμημα ab Euripide nominatur. Quam significationem Plato est secutus.

Sed quaeritur hîc maximè cur bilis cum sanguine mixta fibras e proprio ordine dimouet. Quomodo id fit? Primum quid est fibrarum genus ἐκ τῆς τὰ ξέως deturbare? an febras elidit, destruit,

Per feruorem enim φλοσμία & pustula excitantur

48 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*x. de morb.
ad finem.*

vt sanguis expers fibrarum dicatur? Id videtur Plato hoc loco,
& Hippocrates (ex cuius doctrina Plato desumpſiſſe videtur)
primus id ſtatuiffe. Ita Hippocr. Sanguis ad ſapientiam maximè
facit : Cùm bilis commota ad venas & ad ſanguinem ingreſſa
fuerit, ſanguinem ex conſueta conſiſtentia ac motu emouet, fe-
roſum facit & calfacit. Calfacto hoc, corpus concaleſcit, & homo
deſipit ſanguine in ſerum tranſmutato, motu non ſolito contin-
gente, & præ febre.

lib. de ſteril.

Ita ad verbum Hipp. & paulò poſt de maniacis, Cùm ſanguis à
bile & pituita corruptus fuerit, morbum habent & dementes fiūt.
Vide quì loquatur per verbum φθαρῖναι. Corruptitur enim ſan-
guis per rei alienæ admiſſionem; verbum διουρεῖν per reſolui in
ſerum vertimus. Et apud Hippo. ἡ γυνὴ διερρηθεῖſα, ſemen morbo-
ſum & ſeroſum & generationi ineptum ſignificat. Sanguis, ait
Hippo. qui à corpore morboſus deſcendit genituram ſeroſam fa-
cit (διουρεῖ) & ad compingendum difficilem. Seroſa autem facta
genitura, tempore aut paucò, aut multo cum ichore & ſanie egre-
ditur.

*Aſſi. itur ſan-
guis à bile
tripliciter.*

- 1.
- 2.
- 3.

Cùm itaque Plato ait à bile cum ſanguine puro mixta fibra-
rum genus elidi & perturbari, id videtur eſſe quod ſcribit Hippo.
A bile ſanguinem ſubeunte, ipſum ſanguinem tripliciter affici.
Primùm ſuam conſiſtentiam amittit, attenuatur enim, id quòd
non fit niſi fibrarum vitio. Item ex proprio motu dimouetur, &
aliud quendam curſum inflectit. Tertiò caleſcit. vnde hæc per
bilis ſubeuntis vim & poteſtatem. Plato tamen paulò obſcurius
loquitur quàm Hippocrates. Nam ait genus fibrarum à proprio
quodam ordine deturbari ob ipſam bilem. Non dicit fibras cor-
rumpi, non ſanguinem attenuari & in ichorem reſolui. vnde
qua ſtatio eſt, an tanti ſit iſta deturbatio fibrarum ex ordine quo-
dam ſuo, vt ſanguis propterea ſuam quandam σῖσταν, & κίνησιν, &
οὐκ ἐρίαν amittat? Sequuntur & alia verba Platonis ita obſcura:
vt nec ea n rem aperiant, nec quorſum dicantur, facile conſtet.

TEXTVS PLATONIS.

*Cùm hanc in ſanguine vim habeant fibræ, bilis natura facta ve-
tus ſanguis, Græcè γυνὴ γερῶν παλαιὸν αἷμα, cum rursus ex carne in
ipſum ſanguinem illiquefacta mittitur calida humidaque ſenſum
primò inuecta ob fibrarum vim gelafcens coit: gelatoque ac reſtincto
illius*

illius violenter feruore, tempestatem intus tremoremque excitat. At si maiore se vi inferat, euictis à caliditate propria fibris, confusoque earum ordine efferuescēs victrix euadit. Et si ad extremum perdurare validior potest, ad medullas penetrans perurensque animæ ibidem quædam dissoluit retinacula, hancque ipsam liberat. Cum minor copia est, corpusque liquefcens & reluctatur, denicta aut per corpus uniuersum excidit, aut in superum infernumque ventrem per venas expulsa, deque corpore, velut ex discordi ciuitate eiecta, intestinorum lænitatem difficultatemque affert, & cætera id genus mala. *Textus Græcus sonat, bilis caliditate sua superans, fibras efferuescens in confusionem δέσσει ad verbum, conseruat. Si destruit fibras, & propriè sanguinem quomodo dicetur διασώζειν? Nam vox illa δέσσει si præualere significat, frustra dixit κραλίσσασα χολή. Id est, vincens ac superans, hic interpretes dixit, δέσσει, victrix euasit, & tamen τὰς ἰσὰς non refert ad participium κραλίσσασα sed ad verbum δέσσει. Quia participium ζέσσεια accusatiuum non regit, sed est verbum absolutum. Et pleonasmus est dum dicitur κραλίσσασα δέσσει, superans, superauit.

COMMENTARIVS.

Inftar commentarij in hunc Platonis locum, vtilis erit explicatio sententiæ Hippocraticæ, quam Galenus summo studio industriaque conscripsit. Docet Hippocrates quæ fiant apoplectici quidam repente & absque causâ manifesta, quibus corpus aut plenum est omnino, aut cacochymum, aut vtrumque. In aliis dolor est & tristis sensus in parte quadam, in aliis stupor est & immobilitas. Vbi est summa plenitudo, bonorum fiunt interceptiones, & spirituum. Vbi notabis Hippocratem alibi meminisse *σπλήν* *φλεβῶν*, alibi vocat *πνευμάτων σπλήν* *ἀνὰ τὰς φλέβας*. In priore venæ propriè intelliguntur, in posteriore cum ait *ἀνὰ τὰς φλέβας*, arteriæ vnde per *σπλήν* spirituum per venas, audies vel pulsus intermissionem, vel ipsam etiam *ἀσφυζίαν*. fit autem id cum humores aut in venis aut extra venas sunt ita coacti & compressi præ multitudine, vt calor naturalis opprimatur ac velut stranguletur, id quod vocat *πῆξιν* *καὶ σφίνωσιν* *τῶν χυμῶν* *καὶ σπιν*: barbari humorum conculcationem ac incuneationem vocant.

Ac non mirum si vbi hæc eueniunt aut sanguis qui non erat

G

Legatur lib. Theoph. de vertig.

Part. 27. lib. 4. acut.

ad part. 23. 4. ac.

50 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ad part. 27.
lib. 4.

viciosus, corrumpitur, vt qui non habeat suam ἀναπνοήν, aut iam corruptus erat. Vnde Gal. com. in lib. de acut. ait, exeuntibus & flabellatis succis qui sunt fluxionum auctores incorruptus & naturaliter fusus liquidusque fit sanguis. Cum manent iidem succi, Græcè τὰ αἵματα δὲ χυμῶν, natuumque calorem extinguunt καὶ δυνάμεις (id quod obscurius dictum, ni velis interpretari difficere & dissipare τὸ ἐμφυτον θερμὸν) sanguis tanquam in mortuo corpore πύγνυται. concrescit ac cogitur, eadem & ferè Platonis verba in eo textu quem illustrandum suscepimus, Cum bilis facta vetus sanguis (id est ac si dicat id quod in comm. Gal. ait, vbi corpus χυκοχυμώτερον ἦ) ex carne illiquefacta in sanguinem immissa fuerit, ob fibrarum vim gelascens coit. Et eo loco idem Plato ait quod Hippo. in illo libro 4. acutorum & Gal. in com. Cum dolores accesserunt (nam diximus aliàs initio morbi vehementis corpus attonitum immotumque reddi, aliàs mobile, sed dolens) bilis atra, acriumque fluxionum fiunt eruptiones & incurfus, Græcè ἐκπύσεις. Hoc quid aliud est, quam humores biliosos velut liquefactos in sanguinem influere & cum eo misceri, & veluti naturalem compagem sanguinis, Græcè σῖσαιν violare, aut extra vasa in partes quasdam peculiare hepar, cor inferri, & sic magnas in corpore turbas excitare. Plato fibras violari perturbarique philosophatur; Galenus in eo comm. sanguinem per influxum, & plenitudinem suffocari conculcarique, qui iam aut vitium contraxerat, aut difflatione prohibitus corrumpitur. Subdit Hippocrates, Do-
 „ lent morsæ partes, intenduntur &c. Itaque corrupto sanguine,
 „ spiritibus naturales vias nequeuntibus transire fiunt perfrigerationes & dolores, grauitates capitis, tenebrosæ obuersationes,
 „ aphonia, &c. ἕκαστος τῆς αἵσεως, ob stationem, si iam ad cor & hepar fluxiones repant. Vbi notabistria, διαφθοράν αἵματος: spirituum δυνάμεις, καὶ humorum aut sanguinis aut vtrorumque πλὴν αἵσιν. Vnde sanguinis διαφθορά, an iam talis erat sanguis? Nam Galenus ait fluxiones acrium humorum contingere τῷ σώματι ὄντος χυκοχυμώτερον. An per admistionem acrium humorum? an per plenitudinem & πῆξιν καὶ αἵσιν καὶ σφίωσιν? id quod Galenus videtur insinuare. Nam vbi sanguis χυκοχυμώτερος naturam stimulat ad excretionem: si id fit intus, & non foras, malo est in particula fortè succus & sanguis laudabilis esse poterat, sed per affluxum acrium humorum calore oppresso, sanguis partis corrumpitur. Sanguis (ait) διαφθέρει, repleta à fluxionibus particula quæ affi-

citur. Plato vult per ingressum istius bilis elidi fibras, & attenuari sanguinem. Et etiam verisimile est cum acres & biliosæ sint efflu- xiones, & tenues, cum sanguinem subeunt ipsum attenuari. Nisi fortè congelatur & πύγνται per suffocationem, suffocationem quidem per repletionem.

*Si attenuatur
quò fit faciliè
πύγνται καὶ
στάσις.*

Quod attinet ad *σπύλην* spirituum & venarum (nam duo hæc antè adscripsimus,) obseruatur & impedimentum motus in spiri- tibus, & in humoribus & in sanguine. Dictum quoque ex in- numeris Hippocratis locis in sanguine considerari *κίνησιν, στάσις, καὶ συμμετρίαν, καὶ φθοράν*. Sic motus in ipso sanguine peruertitur, hinc prudentia hominis alteratur.

De statu quem *στάσις* vocat & Galenus & Hippo. Plato, vt ante dictū est, nomine *τῆς στάσεως* tumultus, discessio, & seditio intelli- gitur, itē factio. Et cum humores dicuntur ob contrarias qualitates & à natura discessionem, turbare & commouere corpus, *ἢ στάσις* hu- morū dicitur. Et tamen in aliis locis *ἢ στάσις* significat cessationem à motu, statum, stationē & quietē. Sic dico contraria nomine *τῆς στάσεως* comprahendi videtur. *στάσις* per se stationem significat, & ex euentu discessum, *σπύγνται*, seditionē. Quia in factione primū qui facit factionem ab vna discedit parte eamque deserit, ad aliā sese adiungit atque cōfert, ab ea stat parte sic præeunt motu ac se paratione in parte alia priori contraria statur, confiditur, consisti- tur. Hinc statio Græcis *στάσις*. Et quod prius dixit Plato quatuor humores efficere *τὰς στάσεις* non *στάσεις*, vt malè legitur, idē paulò post de bile loquens ait *χίμαρας* efficere, idest, tumultum ac tem- pestatem. Et in libris de acutis explicans signa plenitudinis san- guineæ ait *τὸ ὁμιλῶν στάσις*, constantiam & immobilitatem ocu- lorum neruorum principio immobili atque veluti congelato. Et manuum addit *διαστάσεις* quæ opponuntur *ταῖς στάσεσι*, porrectio- nem enim & mobilitatem manuum *αἰ διαστάσεις* significant.

*Com. ad par
26. 4. 4. 4.*

Ergo *τὸ αἷματος φθοράν καὶ διαφθοράν* (nil interest) Hipp. confi- derat, cum nimirum sanguis suam *στάσιν* amittit aut per rei alie- næ missionē (vt de bile dictum est) aut per propriam in se altera- tionē & corruptionē ob qualitātū aut dissidium aut exuperantiā. Præter hanc *φθοράν* spectatur motus impeditus spirituum. Alibi mo- tum impeditum in sanguine respicit: sed id eodem refertur: vnde aliàs dicitur *τὸ φλεβῶν σπύλην* (de sanguine audiendum) aliàs *τὸ πνευμάτων σπύλην*. vide opinionem Galeni. Hæc autem maximè fiunt in corpore cacochoymo. Dolor irritat fluxionem. fluxio fit

*Com. ad par
23. 8. 27. 4.
asunt.*

52 CONSILIORVM MEDICINALIVM

com. in par.
27 lib. 4. acu.

& augetur dolor. Auctis doloribus contrarij effectus contingunt. Ideò ait Hippocratem interpretans Galenus. Idque ipsum alterius causa redditur contraria. Atque ista corruptio sanguinis & spirituum, fit ob plethoram partium quam facit humorum influxus, influxum autem dolor & morsus partium. Celerior fit corruptio si corpus cacochymum, & augetur cum suffocatur sanguis ob plethoram. Et impeditur aditus humoribus & spiritibus. Et fit τῶν sanguinis causa perfrigerationis. In textu Gal. legitur ὅταν δὲ ὅτι τὸ αἷμα. legendum ὅταν δὲ ἐστὶ τὸ αἷμα, cum steterit sanguis. Ante enim legitur τῶν δὲ χυμῶν. Et insignis est hic in textu error. Ex his omnibus apparet quantum συμμετρία sanguinis in quanto & quali ad sapientiam actionesque temperatas conferat.

Paulò longius orationem commentationemque nostram produximus quam institutum fuerat. Sed æstus quidam interpretandi & locos explicandi nos abripuit.

Nunc ad rem institutam aggrediamur; locorum enim obscuritas & difficultas effecit, ut aliquid operæ impenderimus in iis explicandis quæ obiter in classicis auctoribus animaduuerimus. Quamquam aliqua ex iis præter rem, in re tamen & è re esse possint. Diximus quos tumultus, quas turbas & seditiones afferat sanguinis mutatio seu in quanto, seu in quali, seu in consistentia, & aliis id genus. Ergo quicunque naturæ sunt ita comparatae ut sanguis ceterique humores varias mutationes subeant, ea sunt variæ, inconstantes, & tamen in aliqua constantia inconstantiam habent. Huiusmodi est melancholicorum natura. Ideò diximus ex Aristotele melancholicos perpetuò medicinam appetere, & ob suam temperiem vehementes appetitiones motionesque habere, nec non corpus eis perpetuo dolere. Vnde & lamentis medicos afficiunt, & querelis subinde repetitis obruunt & obtundunt. Is locus ad institutum apprimè facit. Tales μελαγχολικὸς interpretes vertit, qui atra bile laborant. De iisdem locus est alius apud eundem Aristotelem dum disputat de voluptatibus; impotentiaque aliam ex imbecillitate ortam, aliam ex temeritate considerat. Acutorum hominum & atrabilariorum maximè est temeraria impotentia, quoniam acuti propter celeritatem, atrabilarij autem ob vehementiam; rationem suam & iudicium non retinent, hoc ipso quòd visionem aliquam obiectamque speciem animo facillè sequantur: & alio loco, faciliùs impotentia sanari

Fundamentū
disputationis.

De ea constantia aut
inconstantia
post dicemus
ex eodem
Arist.

4.
cap. 7. lib. 7.
stibic.

potest eorum qui atra bile tenentur, quàm eorum qui statuunt, nec stant in eo quod sit iudicatum. Quibus ex locis apparet & impetus animi in iis quos atra bilis tenet, vehementes esse, & varios esse ancipitesque melancholicos. Vnde videmus præclaros primariosque homines, ingenio valere, & melancholicos esse, & tamen multa facere quæ hominem constantem decent. Immo ad quandam *ἐκστασιν* facile & ad *ἐνθουσιασµόν* facile deveniunt. Et Plato asseuerat ingeniosos plurimum concitados & furiosos esse solere. Democritoque placuit nullum virum ingenio magnum, esse posse nisi qui furore quodam percitus fuerit ac concitatus. Et de Poetis Platonis illud, fores poëticae frustra absque furore pulsantur. Vnde verò in melancholicis varietas ista, ista *σφοδρὰ ὀρεξις καὶ ὁρμη*? Nec enim in isto furore & ecstasi diu manere possunt. Vnde & illud quod dolendi finem non faciant? an humor in iis efferus? venenatus? non potens regi gubernarique à natura? Id quod placuit Aristoteli. Et similem affectionem melancholicam explicat Hippocrates quam sua lingua *φροντίδα* vocat, curam vertunt interpretes. Animi quædam affectio est in qua ita ad rem aliquam attentus est, ut ab ea non facile recedat. Et quod in ventriculo est *ἀλύειν*, id est in animo *φροντίς ἀλύειν* enim Gal. interpretatur, nullo modo quiescere, sed ab vno negotio ad aliud facile transire. Et tunc ad animum quodammodo *τὸ ἀλύειν* referendum est. Hac autem *τῆς φροντίδος* signa sunt ex Hippo. anxietas, lucis ac hominum fuga, tenebrarum amor, timor, septi transversus tumor, in visceribus ipsis velut spina esse videtur & punctiones: hoc vltimum annotandum est. Etenim conueniens esse videtur iis quæ ab Arist. dicuntur, nempe quod dolor sit quidam assiduus. Nos id experientia docet. Nam videas melancholicos tales querimoniis modum finemque non imponere. Dolet modò pars hæc, modo illa. Et reuera aut fuliginosum excrementum causa est, aut status quidam malignus, virulento quoque serò comitatus in membranas & *τὰ περιόγια* sese insinuat dolorum eam ilia dem concitans. Immo placide non dormiunt, sed turbulentis insomniis mens eorum agitur. Id explicat Arist. melancholici ideo crebro in somnis excitantur, quia calore largiore urgente animus moueri æquo amplius cogatur. Et cum motus vehementior sit, meritò dormire nequeunt. Putat autem Aristoteles placidissimum esse somnum cum motus plurimus est: motus autem est plurimus cum larga caloris copia in partem internam retra-

Arist. p. o. v. lib. 30.

Melancholicis ingeniosi. In Phædro. c.

ad finem 2. de morb.

Com ad aph. 56. lib. 7.

c.

c.

c.

c.

c.

c.

c.

c.

c.

Prob. 15. lib.

30.

c.

c.

c.

54 CONSILIORVM MEDICINALIVM

hitur: id autem fit vbi cibus ingestus est, tunc enim & calor plurimus, & vapor plurimus, & motus plurimus, sic insomnium aut nullum aut paucum. Et isto motu desistente, animus quiescit & prudentior fit. Vbi enim plurima vehementissimaque est agitatio, nullum oboritur insomnium, ait Arist. Nec animus tunc quiescit & per se est cum somnium nullum est, contra qui in motu plurimo est, nec paulisper quiescit, hic nequit intelligere. At cum grauis somnus est, motus est plurimus, agitur animus, ideo non intelligit, intelligendo somniat. Id facit pro melancholicis, nam si in eorum animis est perturbatio, si motus plurimus, ergo somnus grauis & placidus esse potest, & insomniorum vacuitas est. Contrà euenit, nam & insomniis exercentur, & crebro dormientes excitantur. Sic contrariæ rationes videntur. Ita nodus soluendus. Vt concedant placidum & interruptum esse somnum cum præ caloris copia & vaporum motus plurimus est, tamen si motus iste æquo maior sit, implacidus interruptusque est somnus, vt in agrotantibus contingit. Ideo appositè dixit plenius antè Arist. de melancholicis loquens, calore maiore urgente, animus moueri æquo ampliùs cogitur. Id autem fit in melancholicis. Hæc de insomniis & motu turbulento in somnis. Quæ fortassis in partem contrariam agitari possent.

Sed istæ mutationes frequentes in melancholicis quæ & ad corpus, & ad animum referuntur, an ratione caloris, an frigoris, an aliarum similium qualitarum fiant? Aristoteles enim id asserere videtur. In quibus, ait, multa & frigida bilis est atra, hi stolidi, sunt & ignaui. In quibus multa & calida, ij perciti, ingeniosi, amantissimi, propensi ad omnem excandescentiam; nonnulli etiam loquaciores. Et quia in multis ille calor sedi mentis vicinus est, morbis vesaniæ implicantur, aut instinctu lymphatico inferuescunt, inde Sibyllæ & omnes qui diuino spiraculo instigari creduntur, cum id non morbo sed naturali intemperie accidit. Quibus idem calor in aliquam mediocritatem remittitur, ij quidem melancholici sunt, sed prudentiores. Habitus autem melancholicus vt varios morbos creat, etiam ipse inæquabilis est. aliàs enim frigidus, vt aqua, aliàs calidus. Et si quid formidandum nuntiatur, si habitus iusto frigidior, timidum reddet: Si ampliùs caleat, metus inuectus ad mediocritatem reducet. Fit sæpè vt angamur succumbamusque animo, sed cur, ratio non potest reddi: contrà, securitate animi gestimus, nec rationem reddere valemus. Quod bifariam expli-

*Probl. primo
lib. 4o.*

cate possumus. Vel quia huius rei causa non redditur facile, cum hunc angorem simpliciter humor melancholicus non inferat, vel quod ægri ipsi cur ita sint affecti, vix explicatur. Vnde illud Hipp. timor & mœstitia absque causa manifesta melancholica sunt pathemata. Et reuera timor & tristitia sine causa manifesta melancholiam significant tanquam posteriora: & tanquam priora inducunt. Præ timore enim & ægritudine fiunt homines melancholici. Tamen Aristoteles hîc calori frigoriq; totum tribuit. Quibus calore natiuo marcescente oritur ægritudo, ij sibi potius laqueum petunt: Et iuuenes potius quàm senes se laqueo interimunt. Senibus per ætatem calor marcescit, iuuenibus, per vim ipsius affectus. Quibus calor subitò extinctus est, vti repenti se interficiunt, cum nullum antè indicium præcesserit. Et tandem ita concludit: Cum atrabilis friget, varias animi molestias anxietatesque gignit, calidior autem, securitatem lætitiæque præstat: hinc pueri lætiores, senes tristiores. Et ait eos qui à coitu tristiores existunt, tales ideo fieri quia excreto semine abundè refrigerantur: contra qui copiam quandam excrementi cum semine emisserunt, leuati sarcina hilariores fiunt. Denique ita concludit Aristoteles. Homines melancholici varij inæqualesque existunt, quia vis atrabilis varia & inæqualis est. Nam vehementer & calida & frigida reddi potest, & quoniam vim obrinet morum instituendorum (nam cal. & frigidum inter ea quæ in corpore nostro sunt mores condit) ideo nos morum qualitate afficit, vt vinum. Et vinum & atra bilis flatuosa est. Ad finem, post verba quædam inuoluta & obscura, aut melancholicos omnes non per morbum, sed per naturam esse ingenio singulari.

Ego verò vereor ne Aristoteles. vt physicus plus æquo tribuerit primis istis qualitatibus, calido & frigido. Et videtur incidere in errorem eorum qui calid. frig. humidum & siccum omnium morborum causas & principia posuerunt. Hippocrates eos suggillat. Nec more vulgi, aut physicorum in iis qualitatibus consistit, sed altiùs sese effert, & aliarum qualitarum, humorumque vim potentiamque considerat. Quod si aliàs, in melancholicis maxime locum habere debet. Nec enim melancholicorum inæqualitates, varietas morum, impetus, milleque animi pathemata affectus sunt simpliciter caloris aut frigoris, sed aliquid aliud præterea est spectandum. Aristoteles quidem iis qualitatibus multum tribuit vt naturalis scriptor, quod magnam efficientiam habeant.

Calid. & frigidum morum opifex.

56 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Lib. de veteri medicina.

Arist. primis
qualitatibus
Hipp. contra
secundis mul-
tum tribuit.

Cur Autum-
nus n. o. bo-
ris
ferax.

4. modis bilis
adusta consi-
deratur.

De viribus
sanguinis &
succo acidi,
salis, acris
(quia quod
nutrit dulce
esse debet)
Hippo. ad finē
libri de ve-
tere Med.
Sanguis me-
lancholicorum
non ita facile
putret ob
qualitatem
acrem, salis,
acidam mor-
dantem etc.

Hippocrates contra de iis qualitatibus statuit. Calidum & frigidum omnium qualitarum minimè potentes esse iudico: sed secundis qualitatibus id quicquid est quod in corpore nostro geritur & fit, tribuendum est. Calidum enim & frigidum facile sese mutuo elidunt & infringunt. Superius docuimus quæ sit vis sanguinis acris, falsi & acidi, ut pote quo natura uti recusat. Et ex eo loco eruenda demonstratio eorum quæ hic dicuntur. Ut autumno humores & serum virulentam qualitatem habent, & malignos morbos concitant, an quia calidi? an quia frigidi? Galenus cum Hippocrate ad temporis inæqualitatem recurrit: ea de re dubito. Sed & adustio, & suppressio fuliginis, & inæqualitas, & intempestivus victus qui æstate præcessit, & fructuum natura corruptibilis, accedente quadam naturæ & caloris naturalis imbecillitate, hæc (inquam) omnia hæc concurrentia pariunt malignam aliquam qualitatem morborum sui generis fautricem & matrem. Porro schola medica considerat bilem adustam quatuor modis. Aut enim succus melancholicus naturalis aduritur, aut sanguinis pars purior, aut bilis flava, aut falsa pituita. Quæ adustione nascitur iudicio & sapientiæ obesse creditur, ad furorem concitationemque animi alioqui plurimum valens. Si extinguitur, partibus subtilioribus resolutis, remanente terra fuligine, hinc stoliditas, metus & stupor. Sola naturalis ad sapientiam facere dicitur. Volunt quidem accendi, non uti, ut spiritus tenuēs, scintillantes excitentur qui propter suam λεπτομερεια hominēs agiles & alacres reddant. Sic tamen non est considerandus calor simpliciter, aut frigus, sed humores & quædam aliæ qualitates efficaciores. Et ita terminavisse videmur in eam primam sententiam Hippocratis, quod sanguis ad sapientiam faciat. Quanquam prima scribendi occasio fuit quæstio de mittendo sanguine in melancholicis, Dioscorismos ex Galeno attulimus. Et reuera non est vulgaris ea quæstio. Nam si sanguis melancholicorum virus quoddam in se continet, si acer, si falsuginosus aut simili qualitate donatus, ea ne qualitas per phlebotomiam tollitur, aut corrigitur? Dicam vnum à nobis sæpius observatum. Hypochondriacorum & melancholicorum verè dictorum sanguis non ita facile corrumpitur & ferefcit, ut sanguineorum & calidorum humidorumque corporum sanguis. Ratio est. Sanguis eorum si acer, si falsus, si mordax si acidus, ea qualitate se munit & tuetur aduersus communem putredinem.

putredinem. Malignus quidem & doloris parens est eorum sanguis ob inclusam qualitatem nescio quam, quæ naturā stimulat & angit, sed notas non habet faciliē vulgares putredinis. Vbi enim semel talis sanguis nitrosus, acer, salūque putruit, dii boni, quantos dolores excitat, quam erroneos & vagabundos, & qui cruces ægrotantium medicorumque dicuntur? In maxima hypochondriacorum parte agnosco calorem nescio quem aridum, squallentem, mordacem, adurentem & zymosin fermentationemque in humores faciliē inducentem, an ratione istius caloris sanguis demendus, an hac ratione calori nativo, visceribusque ipsis refrigeratio afferri debet? Qui rerum nouarum accensi desiderio sine distinctione (id quod artis pars maxima est) sanguinem detrahunt, audacter in eo habitu & temperamento id facient, partim caloris acrimonia inducti, partim sanguinis maligna qualitate persuasi: phlebotomia enim minuendo calorem, tandem temperabit reliquum, & partem maligni sanguinis amoliendo, locum generationi melioris præparabit. Item: si tum demum benè habent melancholici cum pinguescunt, temperato & madefacto eo calore sicco qui in iis marcorem maciemque accersit, cur non conferret venæ sectio? Nam & vulgò pinguefacere dicitur. Tollit enim & prauum sanguinem maciei causam, & refrigerium affert isti calori intemperato. Sic ex euentu sanguinis detractio quandam *εὐεξία* inducit. Fidem facit experientia quotidiana, facit & historia extenuatē illius mulieris apud Gal. quæ euacuato impendiō magis sanguine pici simillimo, priorem habitum nitoremque recuperauit. At dices, visceribus ipsis iniusta est & impressa sicca & squallens intemperies? quid proficias licet massam sanguinis exhauseris? vnde sanguis *αἷς τῶν φαντασίαι* & aspectu apparet laudabilis: Et tamen magna pars melancholicorum, præsertim hypochondriacorum aut febre marasmode interit, aut tympanite, nonnunquam ob caloris naturalis ad bonos succos generandos aptis paupertatem; & caloris contra naturam ad *ὑδροπικρία* facientis, diro hydrope, idest aqua intercute. de hoc viderint qui audentiùs sanguinem detrahare voluerint. At alia etiam ratio est quæ ad liberaliorem sanguinis detractionem adhortabitur, nempe & frequentia doloris & sæuitia. Si enim constat & ex Aristotele & experientia ipsa, eos qui atro succo abundant, vt dolendi, ita conquerendi finem non facere, quod doloris præsentius erit remedium ipsa sanguinis detractione? At dolor non ob calorem, non ob frigus

phlebot. melancholicis confert, quia caloris acrimoniam minuit, pinguefacit, & dolorum sæuitiam temperat.

H

58. CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Vnde vide-
mus tumores
melancholi-
cos ut can-
eros, carcino-
mata plum-
bo, cerussa,
solano, plan-
tagine acizoo
inuari. Quia
adustio ipsa
tabesque hu-
mori impres-
sa eo reme-
diorum usu
inuatur.*

*Generales in
iure definitio-
nes & in me-
dicina propo-
sitiones peri-
culosæ.*

*lib. de veteri
medicina.*

*Biliofi cum
sint παρὶ
φλεβῶν tamen
tenues sunt,
quia natura
non fruitur
istò sanguine.
Fideo Celsus
ait, Tenuiori-
bus magis
sanguis, ple-
nioribus ma-
gis caro abun-
dat.*

adeft, sed ob ineffabilem inexplicabilemque qualitatem ipsius sanguinis, quam à nescio qua viscerum affectione & diathesi acquirit. Et natura eum succum vt non mitem & benignum refugit, relegatque & quoad potest, suis facultatis expellentis præfidiis vsa, repellit ac reiecit. Hoc dum fit, dolores in partibus nervosis, quia humor cietur, excitantur. Et vnum notandum est de iis, quòd calcis modo eorum calor fuliginem prauam excitat etiam benignitate alimenti irrigatus: & à sumpto cibo deterius multò habent. Immo quasi febricitare videntur. Nec est quod dolor in iis frequens ad sanguinem demendum prouocet. Si autem quoties de dolore conqueruntur, toties sanguis detrahatur, vt conquerendi, vt dolendi, ita euacuandi sanguinis finis non fiet. Hoc tamen relinquendum erit medentium prudentiæ, vt cui, quando, & quantum, & cur sanguis mitti debeat, intelligant. Vt enim in iure omnis definitio periculosa, ita generales propositiones in arte medica sunt periculosæ. Nam distinctione & diorismo indigent, qui est velut anima earum propositionum generalium. Alioquin in magnos errores promptus est lapsus. Hæc est doctrina Hippocratis, qui expendens has propositiones, omnis caseus bonus, omnis malus, omne vinum meracum bonum malumue, docet quantis subiaceant erroribus qui ne definite eas pronuntiant. Idem de sanguinis detractione in melancholicis, an facienda, an non, crebrius ne an rarius. Tandem vt commentandi finem faciam, melancholicis præsertim si localis in cerebro fuerit melancholia, aut si hypochondriaca, benè consultum volo consideratis iis quæ in cursu orationis à nobis sunt demonstrata. Nam in melancholicis hæc maximè considerantur: viscerum ipsorum calida siccaque intemperies: prouentus humorum adustorum, vnde scabies, lepra, morphæa, terminthi, clauī, varices, hæmorrhoides, maculæ, exanthemata πυελοναῖα vt vocat Hippocrates, cancri, carcinomata, denique formidolosus ipse elephas. Præterea cutis obstructio, fuliginosi excrementi suppressio (quod excrementum quia inutile planè, eo natura non vitur vt sero, sed quantum potest excludere nititur) quæ suppressio grauium symptomatum causa existit: dolorum frequentium generatio & prouocatio modò in his, modò in illis partibus: vt numquam reperias melancholicum sine dolore, siue quod ita sit, siue quod opinione & τῇ φαντασίᾳ maius quiddam sit. Et nisi libri nostri certam fidem facerent de generatione causæ istorum dolorum, nos crederemus omnes euentos

eos dolores & fictitios. At aliter res habet. Quanquam non negamus *πλὴν φαιπασίαν* plurimum posse in melancholicis. Hæc cum ita sint, cum sit viscerum *δυσχεαία*, obstructio, suppressio, prouentus humorum acidorum, acrium, salforum nitrosorumque (addo etiam virulentiam & *χαυνοήθειαν* & peculiarem putredinem) non tam fortè cogitandum est de frequenti aut luculenta sanguinis detractioe, quàm viscerum & humorum correctione, quam *ἐπανόρησιν* vocant. Sic frequens vsus balneorum lactis asinini, iusculorum (nisi forte borborigmi & fluctuationes & flatuum origo prouentusque impediatur) ex carnibus vitulinis paratorum, tranquillitas animi conducit: Denique id quicquid tollens colorem eum plumbeum & citrinum melancholicorum, *ἐν χροίαν, & ἐν σαρκίαν, & ἐν ἐξίαν* conciliat. Tunc enim benè habere creduntur. Vt idem in melancholicis fiat quod in hæmoptoicis consulit Hippocrates, ut sanguis velut pinguis & benignus reddatur. At vulgus credit sanguinis frequentem detractioem pinguefacere, quia minuitur calor acer, febrilis & mordax qui maciei causa est. Pituitosum enim fit corpus. Pituita autem alendo est idonea, non pus, non ichor, non bilis vtraque, ait Gal. ad part. 44. lib. 2. acut. De vsu medicamentorum dubitatur. Nam alij vehementer purgantia calidaque præscribunt. Vnde hierarum & confectioeum, ut hamech, logodij, Rufi, Archigenis, operosa concinnatio ad melancholicos definita & destinata. Præclarius Mesuëus, qui quodammodo temperat illud adverbium Hippocratis *ἀσποτέρως*, ut non adhibeatur ea vehementia quæ Hippocrati placuisse visa est. Nam vult melancholicos non semel, non bis, sed frequentius purgandos, non validè, ut natura euacuationem regat & moderetur, non naturam regat euacuatio. Præclarius Aëtius de emolumento hieræ Archigenis qua melancholici & epileptici iuuantur, non quod bilem excernant nigram, sed quia (ait) dispositio impressa partibus solidis sensim aboletur & exteritur sine commemorabili excretionem humoris. Etiam minima quantitate, sed frequentius, sumebatur confectio hæc, ut sensim fieret delendo diathesin, quod non nisi cum periculo si *ἀσπρόως* id fieret, contingere potuisset: contra faciunt quidam Medici celebres purgatores, qui non cessant purgare, donec totum corpus exhauriatur & macrescat. At iste humor non tam est irritandus quam fouendus, alendus, mansuefaciendus. Et malo fundamento vtuntur tales Medici, cum melancholici morbi non tam consistant in humore, quàm in partium

6.

7.

*Tanti facienda est ἐνδύα-
φώπου in
omni morbo,
ut non sit fe-
rè alia ratio
recuperandæ
valetudinis.
Arist. proble.
14. lib. 1.*

60 CONSILIORVM MEDICINALIVM

solidarum (in quibus ἡ φύσις consistit) vitio & diathesi. Id quod cum Archigene animaduertit Aëtius. Vt sensum sentiam me labi in recentiorum opinionē qui morbos quosdā τῆς ὅλης φύσεως nouo exemplo & inuento, constituerunt. At vereor ne diutius exactiusque de melancholicis comminiscens melancholicus fiam. Circa enim studium, vigilia, vehemens & pertinax exercitatio, commentatio, animique contentio ad eam diathesin inducendam valet. Sed malo commentandi finem facere, vt ne ego mihi pro subiecto & materia fiam. Ego autem misertus dolensque vicem melancholicorum, hanc ad scribendum materiam præsumpsi. Maxime verò impulerunt tria, medicorum non satis considerata in morbis melancholicis curandis ratio, eorumdem pudor, & calamitosorum ægrorum tædium. De Medicis hoc dicam. Omnes in melancholicorum cura semper accusant lienem, & cum splen viscus sit frigidius, foris & intus calfaciunt impenitē: omnes enim herba splenicæ ferè sunt calidæ & ριπτιχῆ. Sic lædunt: & vt concedam spleni cōsulere, reliquo corpori officiunt. Cæterum in his morbis medicos & pudet tantę diurnitatis & querelarum, & ægros tēdet. Sic vt tēdio & pudori consulatur, videndum est. Aliqui & pro remedio cgris desperatio, & arti infamia pro laude contingit.

ANNOTATIONES.

1. Hanc quæstionem agitat Arist. prob. 38. lib. II. Cur lingua hæsitantes sint melancholico habitu? an quia properè sequi imaginationem non nisi melancholicum est hæsitantes autem tales sunt. Nam impetus dicendi præruit & antecedit facultatem eorum cum animus visa sequatur. Balbos constat habere instrumenta vocalia tardiora: & tales vinolenti redduntur, cum suam imaginationem non rationem sequantur. Tamen credibilius est balbos, gracili voce præditos & lingua hæsitantes verè melancholicos esse, non pituitosos, nam idem Hippocr. 1. epid. vocis gracilitatem & hæitationem oborto varice elidi soluique scribit. Id quod inquisitione dignum est.
2. Omnis enim sanguis vitiosus se ipso integro tenuior fit, in serum enim ferè degenerat. Hippo. hoc loco id videtur significare. Sed hæc sententiæ de sanguine vitioso qui attenuatur est Arist. prob. 2. lib. 10. Sed si sanguis putrens per putredinem fit seipso tenuior, qui stabit illud Hipp. lib. de carnibus, quod aqua putrefacta seipsa fit cras-

fior, ut & cetera omnia. An illud verum? Mirum quod hoc tempore tantum sit seri in sanguine. Sexentis (ait Galenus) quotidie venam secamus, paucissimam aquam supernatare reperimus, sanguine concreto, quamquam omnibus quibus vena secanda est, corpus male est affectum, & lesa omnium naturalis administratio, tum ne his quidem aqua supernatat, nisi pauca naturaliter habente corpore, renes serum perpurgant cap. 6. lib. 5. De usu partium. Et quaestio, id quod abscessus est in partibus extra vasa, id ipsum est fibris in venis, unde quod pus est in abscessu, id est hypostasis in venis, in morbis venarum per putredinem tenditur ad attenuationem, nam sanguis serosior fit & tenuior (id quod in febris quartanis fit) in abscessibus tenditur ad crassificationem. Sanguis aqua multa dilutus non probatur vulgo à Medicis. Tamen ex Hipp. 4. de morb. non videtur ea aqua inutilis. Nam febris aqua est inimicissima. Bilis & humor biliosus nutrimentum est febris. Ex eo loco probares sudores esse inutiles, quia exhalat aqua quæ bilem & calorem temperaret remanetque humoris pars crassior & velut strigmentum.

3. Ceterum animaduvertere oportet sanum dici bifariam, absolute, & late. Melancholici qui perpetuò parte aliqua laborant, etiam sani dicuntur, sed late: & tamen dolent, dolor autem contra naturam est. Illi non abundant maxima ex parte ichore, sed flatu. Ichore non ita abundant nec febriculosi sunt: flatu non abundant qui πνεύμα quoddam amicum est, sed qui φύμα, de quo Hipp. lib. scripsit. Sic surditates quæ in febris contingunt, item & parotides, utraque cum per raptum mixtionemque bilis eveniant, crudelitatem etiamnum morbi indicant. Et inter locos Galeni memorabilis est iste, cum dicit, crudum tandiu morbum dici, cum bilis cum sanguine permiscetur.

4. Melancholici nec sano sunt corpore, nec animo, licet magnorum sint facinorum autores. Strenuè & vehementer agunt & habent insipientiæ & sapientiæ intervalla. Idem iis contingit, quod & amantibus Comici contingere dicunt, horum disputationes sana consilia habent aliquando, se statim resurgentis amoris vi ac seuitia devincuntur.

5. Didicimus ex Gal. ἐξερύγης & sanguineos melancholicos fieri: & Gal. ad part. 70. lib. 3. epid. sect. 3. Quibus multus sanguis & calidus generatur, ij promptè in melancholicorum humorum vitium deveniunt. Biliosi qui venas amplas habent & sanguinem feruidioris facile fiunt melancholici. Nam calor magnus & materia multa,

62 CONSILIORVM MEDICINALIVM

multam exustione fuliginem excitat, ait Hipp. part. 1. sect. 6. lib. 6. epid. Nescio cur Plinius cap. 38. lib. 11. dicat biliosos abundare sanguine & eo pingui. Nescio cur dicat sanguinem pinguem. Nam soli obesi & qui sanguinem pinguem habent, non sunt melancholici.

6. Faciei pallor est in maxima melancholicorum parte. Vnde ait Celsus, quibus diu color (sine ictero) malus est, ij vel capitis doloribus confluantur, vel terram edunt. Deinde paulo post agit de pallida & tumida facie cap. 7. lib. 2.

7. Passim diximus in melancholicis (maximè per adustionem & suppressionem) fuliginosum esse excrementum, quod est multorum malorum causa. Ideo reseratio cutis & temperatio prodest. Nam cum biliosi & calidi sanguinis aestum in praecordiis habeant, multam excitant fuliginem. Ita ait Hipp. 6. epid. Calidior venula (id est arteria) sanguinis copia exustum gignit.

8. Herbae splenicae & quae dantur melancholicis si non vincant calore, tamen tenuitatem partium habent & siccant. Sic in earum usu erratur, unde Auicenna in quodam capite loquens de cura dolorum capitis. De humoribus istis melancholicis locutus ait, Si doloris causa sit succus melancholicus & is naturalis & phlegmaticus, admittentur calfacientia cum humectantibus: Si adustus succus melancholicus, remoue omne exiccans, & calfaciens, & sis contentius humectantibus. Id quod notandum est, nam ad oculos videmus tenuantia, calfacientia & siccantia melancholicis praescribi: Et tum maxima pars melancholicorum fit ab adusto humore. Quorsum enim audito melancholicum nomine statim ad Capparis corticem aut decoctum myricae seu tamaricis confugitur? Cortex capparis abstergit, incidit, ex-calfacit, digerit, contrahit, densat &c. Quid opus his viribus in plurima melancholicorum parte, cum ea visceribus calidis & siccis esse videatur. Immo Dioclis opinione in iis lactium vena ardeant & inflammantur. Tamaricis etiam cortex digerit & siccant, quorsum ad melancholicos qui sicci & squallidi apparent?

CONSILIVM V.

De Causo.

DE febre quæ Grecis Καῦσις, latinis ardens febris, barbaris Causon dicitur pauca commentari mihi consilium est. De eius causa, signis assidentibus & pathognomonicis: De sede humoris: De crisibus; & de Causo proprio loqui animus est, prætermisso & relato in aliud tempus Causo illegitimo. De utroque author libri 4. acutorum abundè sed confuse scripsit. Causa autem quæ nos maximè impulit ut hoc negotij susciperetur, est varietas opinionum. De pathognomónico signo veri Causi. video enim Galenum quodammodo varium, maximè dum loquitur de siti, quæ ἀχόεισι & signum pathognomonicum febris ardentis esse perhibetur. Et tamen aliis in locis non necessario adesse sitim apparet, cum tamen facultas naturalis integra satis videatur. Et tamen cum medici hominem causo correptum sitis expertem vident, extinctam facultatem esse autumant: Ita enim Hippo. In Causo sitis ἀλώγως malignum: Quod si necessario sitis adesse non debet, id in malis non est ponendum. Itaque ea de re videndum est, ut constet de siti ubi adesse aut abesse debeat.

Primum audiamus Galenum de distinctione febris tertianæ veræ & ardentis, quoniam utraque habet aliquid ὁμογενές. Ardens & tertiana febris materiâ conueniunt, loco ipsius materiæ non conueniunt, ut fiat febris ardens, in venis præcipuè iecoris & ventris ubi maximè bilis abundat, Tertiana sit cum totius corporis carnes nimis affluunt bile. Si carnes bile affluunt, non est necesse rigorem in tertiana excitari à vasis in habitum corporis per propositionem, omnis rigor, aut ab vlcere, aut à vase. Ideo si cutis stringatur bilioforum, & quantum bilis in carnosio congestum genere antè expurgabatur, quia in statu ab Hippocrate descripto, non purgabatur, ideo febres tertianæ natæ fuerunt. Hinc patet in venis ventris & iecoris bile putrefacta & accensâ Causon gigni: Tertianam bile in vniuerso corporis genere carnosio congesta & accensa.

Com. ad part.
20. sect. 1. lib.
1. epid. & cap.
3. lib. 2. de crisi-
bus: in ter-
tiana enim
per totum
corporis habi-
tum bilem
ferri ait.

3.
Ex eo Galen.
loco magna
fialorum
medicorum
pars in febre
tertiana cor-
pus vniuersū
superficialis
scarificatio-
nibus euacuatur.

Nunc est differentia de loco. Sed est locus alius qui prædicto quodammodo aduersatur. Eo loci inquit Gal. de sede ardentis febris & de pathognomonicis signis, præsertim de siti, quæ aliàs pathognomonicum ardentis febris putatur, Galenus ita scripsit, In vna corporis parte, quæcunque illa sit, interdum causus gignitur, interdum in toto corpore. Si in toto sit corpore, sitis adest necessariò, cum verò in vna parte, non de necessitate sitim infert, nisi pars ipsa sitim pariat. Omnium primum id facit os ventriculi, deinde ventriculus, post stomachus, post pulmo, & subinde ieiunum intestinum.

4.
Sitis quã-
do est. Ta-
men in ep.
l. 1. Quod si-
tiant causi
capti, hoc pro-
prium est fe-
bris καυσω-
δους.

Gal. com. ad
apho. 37. l. 4.
Acuta febris
fit humoribus
putrentibus.
Putrescunt
vel sæpè toto
corpore, sæ-
pius in vasis
solis.
Com. in part.
33. sect. 3. lib. 3.
epid. ardentē
febrem &
phrenitici af-
fectiones esse
ερυσιπελατō-
δους declarat

An sitis signū
causi patho-
gnomonicum.

Ex hoc Galeni loco duo commemoratione digna venari oportet. Prius est quod non videatur stare differentia inter Causon & tertianam simplicem. Prius enim dixit tertianam gigni cum totius corporis carnes bile abundant: hic causi sedem vnam statuit totum corpus, alteram, partem vnam. Hic & causi & tertianæ febris focum statuit in totius corporis carnibus. Quæ ergo differentia est? Et paulò antè in eodem commento apertius explicat quid vniuersi corporis nomine intelligat, Si in sola parte materia redundet, aut ab ea attrahatur, erysipelas existet, verum si venæ totius corporis exsiccatae carnosae partibus humiditates attraxerint, in toto corpore affectio excitabitur, quæ causon referet. Id quod maiorem quandam solertiam requirit vt intelligatur. Ægrè enim intelligi potest quid & causus, & tertiana febris in toto corpore excitetur & foueatur. vnde mouens eam quæstionem Galenus dubitando ait, An solùm causus sit cum venæ arefactæ biliosos ichores allexerint? An non & carne patiente Causus erit, seu in parte vna, seu in toto corpore pati eam contigerit?

Posterius quod ex contextu Galeni colligitur, est, quod sitis non est Causi pathognomonicum. Inseparabile enim foret, cum de essentia ipsius febris ardentis dicatur. Ait enim Galenus aliàs in Causo sitim adesse, aliàs non. Adesse, si in toto corpore focus sit febris, aut si pars quædam focus sit quæ necessariò sitim accersat. Non adesse, si pars aliqua laboreat & focus sit qui sitim necessariò non afferat. Sic in Causo omnino & necessario sitim adesse non oportet. Ideo medicus de Causo præfagiens, si quempiam Causo implicitum viderit & expertem sitis (quæ alioqui magna esse debet) non statim malè ominari debet, & vacuitatem absentiamque sitis facultatis naturalis intermortuæ signum esse existimare.

Id quod ad honorem dignitatemque Medici apprimè pertinebit.

Sed est apud Galenum, locus alius aliud quàm ante edocens: *com. ad part. 34. sect. 3. lib. 3. epid.* æstare, vt & perpetuò sitire, est ardenti feбри peculiare. Nullum aliud est insigne argumentum. Est enim sitis assidua & exurens calor, quæ duo perpetua sunt. Hippocrates (ait Gal.) ardentem febrem assiduitate sitis cognoscit & caloris exurentis, vt phrenitin delirio assiduo. Sit alia febris quæ corpus fundat & liquefaciat, non prius tamen vocabitur ardens quàm adiunctam habeat perpetuo sitim immensam, & ardentem & fastidiosum calorem. *part. 34. c. 15. d. sect.* Et tamen Hippo. narrat de febribus ardentibus in quibus ægri erant soporosi & non multum sitiebant: nec enim febris valdè acuta erat. Sed hoc rarò contingit vt non sit vehemens sitis, præsertim si febris non ita sit acuta, licet ardens existat.

Et alio in loco narrat Hippocrates in quadam constitutione arduentes febres & phrenitides vagatas fuisse, deinde subdit: Et alij sitibundi erant, alij non. Ita Gal. Potuissent aliqui non sitire vel ob facultatis potum appetentis offensam, vel quia maligna humiditas illis ad ventrem non confluxerat. Omnibus enim putrida quædam humiditas fuisse collecta, sed non pari portione, nec æquè praua. *ad particul. 14. sect. 3. lib. 3. epid.*

Alij sitibundi erant, quia confluxerat humor vitiosus in mentem. Nam cum bilis, vel pituita salsa ventriculi tunicas imbibit, sitis inexplebilis excitatur. Tum quia os ventriculi nondum ab humore ita læsum erat, vt facultas corrupta foret. Tamen omnino, saltè vt plurimum, sitis intolerabilis est comes ardentis febris. *com. ad part. 4. lib. 4. acut.* Ideo authorem libri quarti acutorum redarguit, quod non tantum pathognomonicum sitim annumerarit describens Καύσον, sed tantum inter συνεδρεύοντα, id est, assidentia retulerit. At signa συνεδρεύοντα possunt & adesse & abesse.

Vt tandem de siti aliquid constet, vt ne decipiamur frustra, & imprudenter de ægris aliquid non pronuntiemus. In febre ardente sitis adesse debet, vt absolutè dicatur aliquid, & è genere *ἐν γενεῇ* τῆς πυρετικῆς νόσου est, non autem è genere τῆς συνεδρεύουσας: nam si è genere assidentium foret, abesse posset satis sæpè. Tamen, vt antè declaratum est, est causus in quo non sit necesse adesse sitim, præsertim si focus Causi sit particularis, & in ea parte quæ inflammata & erysipelatis modo affecta sitim non prouocet. Quæ Galeni sententia est, vt doceat existere Causon quendam, cuius patho-

66 CONSILIORVM MEDICINALIVM

gnomonicum non sit sitis. Et tamen semper audire oportet verum Causon. Nec enim mirum si in Causo non exquisito non ita inexplibilis sitis adsit. Quanquam Hippocrates etiam loquens de secunda specie Causi quem pituita salsa generat inter signa,

4. acut. par. 13.

magnam sitim recenset. In causo si quæ sitis adesse debet, non adsit his de causis id fieri potest, vel quia, ut dictum est, focus non est in parte quæ sitim afferat: vel quia mens læsa est, ut affectionis sensus non sit, & nil representetur animo ipsi quia mens (in qua est το κριτικόν) labat & ægrotat: vel quia facultas naturalis potionis appetens in ventriculo residens extincta est. Omitto communem illam vulgaremque causam, nempe descensum & distillationem pituitæ dulcis qua tonsillæ, & fauces irrigantur. Si impedita sit tantum ad tempus aut languidior, sed non extincta & emortua facultas, potest sitis ad tempus non sentiri, deinde percipitur: Notandum porro est facultatē naturali ventriculi emortua, sitim non adesse, quia impressionem causæ sitiferæ huc referre autumant. Mente quoque labante & læsa, non putat se sitire æger, quia mens speciem istius affectionis non recipit. Id obscurum est, sed si quis intelligat qua ratione is doloris sensum non habeat cuius mens ægrotat, distinctionem istam haud dubiò est percepturus.

Quibus de causis sitis que adesse debet in causo non adsit.

Cæterum cum sitis absentia in Causo abolitæ facultatis index est, alia signa lethalia recenset Hippocrates.

com. ad part. 14. sect. 3. lib. 3. epid.

Item ante ex Hippocrate & Galeno diximus non adesse sitim in Causo, ut cum putrens humiditas in ventrem non influxit. Est & ex recentioribus quidam, qui vnum non negligendum adnotavit, nempe cur sitis sit aliquando maior quam febris, & cur sit minor quam febris. Sitis maior est quam febris, ut cum in inflammatione iuxta os ventriculi, arefcit magis os ventriculi quam cor exuratur: Et contra, cum facultas languet, aut venter multa natat humiditate sitis febrī non est analoga, est enim minor quam febris. Ego verò etiam ea de re meum interponam iudicium: Vidi plerosque febrientes ardente febre, aut non valdè dissimili, & tamen cum calor esset acerrimus, lingua exusta, signaque forent ardentis febris, tamen non aderat sitis, aut ea mediocris. Ratio verò non referenda videbatur ad aliquam causarum

Cur sitis maior aut minor sit quam febris.

6.

Instrumenti propria affectio causa est vacuitatis & absentia sitis.

suprapositarum, sed ad instrumenti propriam affectionem. Lingua cum sit aut pellucida, aut nigra exusta, & totus stomachus cui illa continua est, eo penè modo affectus sit, arentibus iis

partibus & supra modum siccatis non percipitur sensus indigentia, quia nervus subiectus linguae non est eo modo affectus & dispositus esse quo debet. Itaque vacuitas absentiaque sitis non est signum emorientis facultatis, sed indicat abesse sitim, non causam quidem eius, sed sensum necessitatis & indigentiae sitiferæ deesse ob partes malè affectas, ut pote superficie exusta & torrefacta, in quibus causæ sitiferæ prima impressio & sensio esse debet. Hæc nostra est coniectura, quæ si cui probabilis videatur, excipiat, sin minùs, verisimiliore probabiliorique adducta, explodatur.

Itaque non quoties in Causo sitis abest, quæ tamen παθογενεσις esse creditur, toties malè ominari de Causi euentu oportet, nec statim de ruina & casu facultatis naturalis in ventriculo & hepate residentis, iudicare, cum certis aliis de causis abesse sitis possit. Ad sententiam Hippocratis accessit Fernel. cap. de febrium symptomatis, Interdum, ait, corpus febrî exardescit sine siti: non quod frigida distillatio aluum proluat, sed quod ardoris causa longius sit à ventriculo. Quæ Hippocratis opinio est.

Antequam finis extremaque manus huic τραυματιῇ imponatur, duo breuiter attingam quæ ad hoc de Causo institutum pertinebunt: Prius est, cur in Causo extimæ partes in algeant: Posterior de causis ipsius Κάωσις ex Hippocratis mente, maximè verò de procatarteticis quas videtur Hippocrates in Causi generatione plurimi fecisse.

De priori parte dicemus, incipiendo ab iis quæ dicuntur ab Hippocrate de secunda Causi specie, in qua dicit, lingua falsa, extrema frigida: cur potius meminit extremorum frigidorum in secunda Causi specie quàm in prima. Primam speciem excitat attractio ichorum biliosorum à venulis arentibus: secundam pituita potius falsa. Galenus tacitè redarguit autorem libri quarti acutorum quod indistinctè dixerit in Causo secundo & notho frigere extremas partes. Nec enim frigent extrema nisi cum malignus est. (malignum autem morbum dicimus eum qui communem sortem aliorum morborum superat, & ægrè curationem admittit) Si enim non est malignus Causus in extimas partes calor expanditur. Si falsus humor vel in pulmone, vel ventre, vel in hepate putruerit, fumosa est caliditatis substantia. Si malignus morbus, refrigerantur extrema ob virtutem imbecillam, & ob magnitudinem phlegmones sanguinem vniuersum ad se attrahentis. Duabus enim de causis morbus lethalis dicitur. Nota imbecilli-

68 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Inflammati
 & maligna
 humorum pu-
 trede cause
 sunt ob quas
 continua fi-
 bris fit.

Com. ad part.
 5. l. 2. prorrh.

9.

ad part. 21.
 sect. 2. prorrh.
 Gal. in com.
 præcedentis
 particule.

In causa
 frigent ex-
 tremis, id
 quod mali-
 gnitatis si-
 gnum esse
 superius est
 dictum, id
 quod falsum
 esse ex eo loco
 hic ex Galeno
 citato patet.
 ad part. 14.
 sect. 1. 6. epid.

Gal. com. ad
 præfat. sect. 2.
 l. 3. epid. ubi
 ex professo ex-
 pendit hunc
 aphorismum,
 an febres ex
 hypochondriis
 malignæ.

10.
 Com. ad aph.
 48. lib. 4.
 ibidem.

tatem & phlegmonem duas esse causas. Galenus in apho. duas causas memorat ob quas febris continua existit, nec tendit $\alpha\epsilon\iota$ & $\delta\gamma\alpha\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha$, inflammationem & malignam humorum putredinem. Inflammatio præsertim $\alpha\epsilon\iota\delta\iota\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ retrahit intro calorem: & maligna humorum putredo & $\chi\epsilon\kappa\omicron\eta\theta\epsilon\iota\alpha$ humorum vires imbecillas affert. Galenus in prorrhético explicans quæ causa sit cur vires ad summum veniant imbecillitatis nulla præeunte vacuatione, duarum causarum alterutram assignat, vel copiam grauantem, vel vnius principiorum $\delta\gamma\alpha\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha$. Inflammatio verò partium internarum an morbum facit malignum? Id Galenus videtur loco superscripto, item & Hippocrates, ita enim, Febres ex hypochondriorum doloribus, malignæ. Quæ sententia indistinctè pronuntiata: febres ait Galenus, non omnes febres malignæ sunt quæ sequuntur affectionem partium in ventre contentarum; sed si ob septum transversum affectum, aut hepar, aut ventriculum contingant. Deinde ait, Quinetiam licet ventriculus inflammetur, aut septum, aut hepar, non statim febris maligna est dicenda, acuta fortè dicenda, quanquam ne hoc quidem verum est, nedum maligna ob phlegmonem harum partium dicenda videatur. Vnde idem Gal. non semper astuans febris sequitur ad vteri inflammationem. Id quod non omninò verum videtur. Nisi fortè dicamus eos Gal. locos audiendos de inflammatione aut parua aut magna. Et dum Hippocrates meminit dolorum hypochondrij tacitè inflammationem insinuat cuius comes est dolor. Quamquam ut ingenuè fatear, indistinctè pronuntiatum est illud, Febres ex hypochondriorum doloribus, malignæ. Id quod Gal. reprehendit. Melius enim veriusque diceret, febres ex cerebro, vel membranis affectis, vel à corde affecto, vel ventriculo affecto, malignæ. Ergò non abs re quaesui an febris ex eo maligna dici posset quod phlegmonem etiam satis insignem partium internarum sequeretur. In vtramque partem rationes nituntur.

Persequamur institutum nostrum $\alpha\epsilon\iota$ & $\chi\epsilon\kappa\omicron\eta\theta\epsilon\iota\varsigma$, & de causis perfrigerationis partium extimarum tum cum omnia intus ardent & conflagrant. Id quod in continuis febribus conuenit, in intermittentibus numquam obseruauit Galenus. Solis ardentibus maligis & lypyriis attribuit idem author. Causa hæc esse putatur, cum fortis phlegmone vel erysipelas interno profundòque euenerit in corpore; totus sanguis ad locum patientem reuoca-

tur, vruntur profunda, cutis refrigeratur, vt fit in principiis accet-
tionum. Sed an ista phlegmone vel erysipelas malignæ febris qua-
tenus talis est, essentiam constituit? Quod enim antediximus ex
Galeno melius dici febres malignas ex affecto cerebro, vel iecore,
non hoc absolutè dicit Galenus, sed quasi disputando & oppu-
gnando sententiam authoris prorrh. de febribus ex hypochon-
driis, probabilius esse ait pronuntiare febres ex affecto cerebro
esse malignas, non autem febres ex hypochondriorum dolore,
quod tamen author prorrhetici explicauit.

Vt terminetur disputatio de perfrigeratione partium extima-
rum in Causo, maximè verò in eo quem pituita salsa putrens pa-
rit, ita Galenus audiendus: Extrema frigere in causo & febre quæ
ἀσώδης dicitur, ob magnam viscerum inflammationem contin-
git, quæ phlegmone ex crassis fit succis. Qui prima Causi specie
tenentur quem parit ichor & tenuior bilis, liberantur facilius,
quodd tenuis & feruens humor sit. Posteriores Causon pituita
potius salsa gignit quæ tantam febrem, quantam bilis, non affert,
nec tantam fitim, nec ita in spiritum vertitur & euanescit. Immo
sæpe adest alui profluuium non iuuans, quia non ita facilè coqui-
tur & obsequitur ista pituita putris.

Declarant quoque & ipsæ crises. Nam cum tenuis est materia
crisis fit per abscessum καὶ ἐξέρου: cum crassior & pituitosior per
σπέρσιον. vnde Causus secundus per parotiden aut hæmorrh-
giam soluitur, cum focus in pulmone est: si in ieiuno intestino vel
hepate, coxarum dolor, pudendi liuor, testis ipsius contentio vel
quia in eo ipso teste inflammatio concipitur, vel quia attrahitur
ab aliqua parte superiore inflammata, hæc, inquam omnia, iudi-
catoria existunt. Antequam finio vnum addam, an acutarum fe-
brium materia, licet pituita sit, frigida esse possit vt ratione istius
frigoris materici & extimæ partes algeant, & frigidi sudores ema-
nent. Galenus vult acutas febres gigni vel in solis vasis putrenti-
bus humoribus, vel in toto corpore. Et quod frigidus sudor sit in
acuta febre hanc causam recensuit, Cum putreant humores in va-
sis, eoque ex putredine magna caliditas sit, & tamen quæ excer-
nuntur frigida sentiuntur, exitiale idest, docet enim in animalis
corpore humorum multitudinem superbundare tantam frigidi-
tatem habentium, vt nec à calore natiuo, nec à febrili calefiant.
Sic acuta febris mala vt signum & vt causa. Causa quidem, quia
promptè dissoluit corpora: signum autem quoniam humorum

ad part. 47.
lib. 4. acut.

In textu Gal.
ait, nec febrē
auget.

II.

ad part. 17.
lib. 4. acut.

An acutarum
febrium ma-
teria frigida.

Quis sit fo-
cus febrium
acutarum.

Com. ad aph.
37. lib. 4.

multitudinem esse frigidissimam ostendit, vt quæ neque à calore febrili transmutetur.

*Quomodo
in Cauſo
non conferat
venæ ſectio.
Et ad hunc
ſcopum Ariſt.
pro. 6. l. 1. &
prob. 29. eiuſ-
dem libri
querit cur
hyeme febres
ardentes sæ-
pè graſcentur.*

Ex hoc loco duo venari & colligere poſſumus, vnum eſt, acutarum febrium etiam cauſam frigidiffimam eſſe, poſterius ſi ita ſit, & ſi ex Galeno pituita falſa cauſa cauſa ſit, cur ita ſanguis audacter demitur in Cauſo: cùm ita ſit materia frigida vt neuter calor & natiuus & febrilis calfacere queat? Deinde Galenus ſibi non conſtat, quorſum enim frigidi ſudoris cauſam ad materiam ita frigidam refert? Idem enim eſſe iudicium videtur de frigidis ſudoribus & de partium extimarum perfrigeratione. Cauſa enim cur in Cauſo algeant partes extimæ, interioribus ita ardentibus, eſt phlegmone interna viſceris alicuius, & imbecillitas. Phlegmone & incendium internum attrahit foris intrò more cucurbitularum, ipſum calorem naturalem. Idem verò de extimarum partium frigore & frigidi ſudoris cauſa, videtur eſſe iudicium, ſicque Gal. ſibi diſſentit: nam frigiditatis partium extimarum cauſam ad phlegmonem internam reuocat, ſudorum frigidorum cauſam ad materiæ frigiditatem.

12.
*com. ad aph.
19. lib. 2.*

ad aph 37. l. 4

Non eſt ergo recurrendum ad copiam materiæ frigidæ tanquam acutarum febrium cauſam. Galenus enim ſcribit morbos longos à craſſis & frigidis humoribus naſci; acutorum morborum, præſertim qui vel ſunt continuæ febres, vel febres comites habent, cauſa eſt humor calidus & tenuis qui vel æqualiter in omnibus corporis partibus aptus eſt generari, vel loco aliquo eſt inclufus. Ideo in acutis morbis ſubitæ fiunt mutationes ob naturam humorum morbum committentium. Niſi fortè recurramus ad id quod ſcripſit Gal. ad hiſto. de Sileno & Philini vxore, peſſimos & grauiffimos eſſe morbos in quibus pituita & bilis magna copia (& ferè æqualiter) colligitur. Sic bilis adurentem calorem mouet, pituita & ſuccus crudus calſieri nequit, vnde ſudorum frigidorum prouentus. Nec reuera admittere poſſum iſtam Galeni rationem qua dici febrem acutam peſſimam eſſe vt ſignum quod ſignificet multitudinem materiæ frigidiffimæ. Melius in eodem commentario dixerat ſuccis ex putrentibus in vaſis, vehementem caliditatem ſequi poſſe, naturam verò ſolidas partes regentem, id eſt calorem natiuum, ex eodem Hippocrate, aut extingui aut proximam eſſe interitui, dum in febre acuta in qua omnia & foris & intus ardere debent, ſudor frigidus apparet, & partes extimæ in algent. Idem Gal. exponit in epid. quomodo reſpiratio ini-

tio morborum acutorum fit frequens, deinde rara, & corpus refrigerat, quia humores putres æqualiter accensi sunt, & discusso calore febrili tam paucus restat calor nativus, ut proximè occumbat.

Ultimam partem rerum institutarum expediāmus de causis procatarcticis quatenus ad Causon pertinebit. Nam cum ichores acres à venulis arefactis attrahuntur, & febris *καυσώδης* excitatur, id in causis antecedentibus numeratur. Sed labor, vigilia, haustus vini meraci post insolatum externarum causarum in censu esse creditur. Breuiter id attingemus. Sunt ex medicis qui causas procatarcticas negligunt, sunt qui pluri faciunt. Nā cum extra corpus posita sint, videntur negligendæ: tamen *καὶ παρὰ τὴν διάγνωσιν καὶ τὴν θεραπείαν* non parum habent momenti. vulgus ferè totus est in causis externis, & frustra eas causas tanti facit. Nec enim videndum quid morbum faciat, sed quid tollat, ait Celsus. Externæ causæ internas & antecedentes quasi irritat & prouocant. Ab externa enim causa ferè fit initium motus, id quod eleganter indicat verbum *παρὰ τὴν αἰτίαν*. Huc pertinet quod Gal. scripsit, Causæ externæ diarias febres excitant si corpus morbo non sit opportunum. Et ita laborasset Silenus, sed quia iam ad aliquid deterius aptum & comparatum erat corpus, ideo graui morbo est implicatus. vnde statim morbi initio grauias diraque symptomata apparuerunt. Et causæ procatarctica tam lethalem morbum non prouduxissent, sed internas causas prouocantes & lacescentes, mutuas quasi operas in perniciem Sileni dederunt. Sed ut omnis ea de re tollatur ambiguitas, adduci debet autoritas Galeni qui quodam loco de istis causis precatarcticis amplissimè dixit omnemque dubitationem leuauit. Et quoniam ille textus paulò prolixior est, piget transcribere. Tamen propter vtilitatem huc transferam: Hipp. non purgat eos qui ob intempestiuos labores capite dolent. At corpore nostro ad morbosam dispositionem parato, ut propè completa sit, aliquid externum accidens eam affectionem patefecit, febrem accendens, vel capitis dolorem, vel catarrhum. Deinde ex eo continenter ad morbosæ affectionis dispositionem non sine periculo languent: & tamen non cursus morbum excitauit, aut motio, aut intemperantia. Nil enim horum sua natura vehementem languorem excitare potest. Si febris ex his causis fit, Diaria est. Si enim nulla subsit dispositio, nullum morbi genus inde consequetur.

Causarum procatarcticarum obseruatio non negligenda in medicina facienda.

ad hist. de Sileno. i. epid. Inter homines qui a causis procatarcticis mouentur & excitantur, hic in solâ diariam incidet, hic non egrotabit, ille in morbo grauem labetur. Quare? quia ita ad morbum erat dispositus, cō ad part. i. i. sect. 4. acut.

“Causæ procatarctice ad morbos graues inuocandos sunt inefficaces, nisi corpus suscipiens ita sit dispositum.”

“

13. Et tamen, vt aliquid nostro ingenio comparatum afferamus, potentissimam vim passionum animi esse affirmamus. Causa hæc

14. *αἰσθησις* nec ne dicatur, tamen vbi quis ex ægritudine tanquam causa procatactica in morbum incidit, grauissimè omnium laborat. Ipsa enim ægritudo imprimit nescio quid animo, deinde corpori, animi instrumento, vnde functionum omnium & omnis œconomia ratio, & vt ita dicam, cardines concuti ac conuelli videntur. Et nisi ipsa ægritudo resederit, ægrè autem leuatur ac refidit, vix ac ne vix quidem corpus suum primum robur ac vigore recuperat ac resumit. Declarat hæcticarum prompta ob ægritudinem animique pathemata & mœrorem generatio. Quod enim vix longo interuallo facit febris etiam satis magna, id est, contactis partibus & solidis partibus ipsius cordis hæticam non generat, id breuissimo spatio facit mœror animique ægritudo. Immo nostrâ ipsi experientiam iudiciumque interponemus. Nos nos (inquâ) in ipsis operibus Artis experientia didicimus eos omnes quos mœror ægritudoque animi in morbum, tanquam primaria ac externa causa coniecero, aut lethaliter aut grauissimè periculosissimeque agrotare. vix enim ægri, si liberari debent, etiam rebus omnibus ritè factis, liberantur. Tanta est vis ipsius ægritudinis pathematumque animi. Nam cum omnis ægritudo miseria est, tum etiam est carnificina, habet ardorem libido, leuitatem læticia gestiens, humilitatem motus: Sed ægritudo maiora quædam affert, tabem, cruciatum, afflictionem, fœditatem: lacerat ipsa, exest animum planeque conficit.

De viribus
ipsarum ægritudinum
auctoris sententia.

Hæc ex Mar-
co Tullio in
Tusculanis.

15. Itaque cum ægritudo tale sit monstrum & quod renascentis hydrae instar, repullet ac reuiuifcat, qua possumus ratione, & animo penè hercule oppugnemus, vincamus, elidamus, conteramus. Denique eam animi præsentiam infractionemque adhibeamus quæ masculam virilemque virtutem in nobis inesse declararet ac testatur.

ANNOTATIONES.

1. *Hippo.* Causon fieri autumat cum venulae arefactæ acres & biliosos ichores ad se traxerint. In Græco nomen plurale τὰ φλέβια legitur. Et aiunt quidam ex Hippocratis doctrina, Causon proprie gigni cum venulae attraxerunt, vt ἐν τοῖς φλέβιαις Causus consistat, sed aliæ febres continuæ ἐν τοῖς φλέβιαις. id est in maioribus venis.

2. In

2. In causo alius saepe fluit per inflammationem ieiuni intestini & lactium unde & impeditur exaddeis, & fit bilis & ichoris generatio, unde alai irritatio unde quando post Causon succedit hydrops, is habet ferè coniunctum fluorem alui. Quod notandum est. unde in tali casu & balneum potest conferre ut diximus alibi: Et phlebotomia ratione inflammationis potest conferre, (id quod multis non placet) etiam aluo fluente. Et reuera in causo vero & illegitimo fluit soluta anus nullo profectu, ob lactium & ieiuni inflammationem & propter immodicum potum, & corruptionem alimenti quod in corpore & ventre bilioso & aestuante bile scit, unde excernendi calcar. Vnde cum in febribus aqua summo sit remedio ad sitim, quæri solet an conferatim & raro an parum & sæpè propinanda rationes utrimque concurrunt. Vid. Arist. probl. 57. lib. 1. probl.

3. Quæ ob solam fluxam bilem febris accenditur, sine aliquo visceris affectu, & si maneat adhuc intra vasa bilis, ardens febris vocatur. cap. 6. lib. 2. de scribis.

4. Febres acutæ fiunt putrentibus humoribus. Putrent autem sæpius toto corpore, sæpius in vasis solis. Com. ad aph. 37. lib. 4. Com. ad part. 33. sect. 3. lib. 3. epid. Quibus in iecoris & ventris regionem, maxime in eius os $\chi\alpha\chi\omicron\chi\upsilon\mu\alpha$ irrepsit, hos arduentes febres sollicitant.

5. Inter ceteros locos ex quibus colligas Causi sedem esse in habitu corporis, unus est com. ad histo. 10. sectio. 2. lib. 3. ep. ubi ait febrem ardentem à biliosis esse humoribus, ideo necesse esse in ea muliere coaceruatum humorem biliosum $\chi\alpha\tau\epsilon\ \delta\lambda\omicron\nu\ \tau\omicron\nu\ \delta\iota\chi\omicron\nu\ \tau\epsilon\ \sigma\acute{\omega}\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$. Per totam corporis molem. At in primis venis & simo iecoris cruditates fuisse, unde alui profluvium & urinae tenues. Sic causa coniuncta $\tau\epsilon\ \chi\alpha\upsilon\omicron\varsigma$ erat in habitu corporis, non in ore ventriculi, primis venis & cano iecoris, quod tamen fieri aliis locis autumavit. Quidam ut distinctionem assignent aiunt $\chi\alpha\upsilon\omicron\nu\ \epsilon\iota\ \tau\omicron\iota\varsigma\ \phi\lambda\epsilon\beta\omicron\iota\varsigma$ consistere, siue toto corpore sparsæ sint venulae, siue in una parte, At alia febres ut synochi & $\sigma\upsilon\nu\epsilon\chi\alpha\iota\varsigma\ \epsilon\iota\ \tau\omicron\iota\varsigma\ \phi\lambda\epsilon\beta\iota$, id est in maioribus venis quæ inter alas & inguina interiacent. Id Hippocratis doctrinæ quadrare autumant: Quod an sit verum, quæstionis est.

6. Gal. com. in particul. 59. sect. 3. lib. 3. epid. cur in Causo quidam sitiant, alij non crassitudo humorum & tenuitas aquosa acervata erat (supple circa os ventris quod est sitis sedes) utraque frigida est sua sponte: vel acquirit calorem à putredine. In quibus calor putredinosus acquirit in iis sitis, in quibus non, non adest.

7. Quoniam autem pituita sæpè multa est, & copiosior quàm ut

K

74 CONSILIORVM MEDICINALIVM

queat & à calore febrili & naturali cal fieri & transmutari, ideo in
imo corpore manet calor, in extimis non elucet. Gal. com. ad aph. 37.
lib. 4.

8. Cacoethia in febris, Cacoethia in ulceribus non omnis humor
vitiosus non inducit, nec omnis putris, sed quem & cetera corru-
pit atque deprauauit. Et tamen Galenus apho. 57. lib. 5. ait in Ca-
chexia sanguinem suam symmetriam seruare. Si seruatur symmetria,
cur cachexia auget putredinem humorum?

9. Quid est necesse partium extimarum refrigerationem signum esse
malignitatis? Nam quia sanguis in media corporis parte colligitur
(ait Galenus) in Causo, ideo eò reuocatio fit caloris & spiritus, id
quod ipse Galenus docet com. in part. 21. sect. 2. prorrh. uti partium
internarum inflammationes magni quidem facit, sed ideo malignas
esse non dicit.

10. Si reuocatio caloris & spiritus ob internam phlegmonem cau-
sa est algoris partium extimarum, physica est hæc ratio, & non ideo
causari oportet malignitatem aliquam. Tamen Gal. dum in secunda
specie causi pro symptomate frigus partium extimarum recenset, ait,
non perpetuò Causus talis est, id est, comitatus frigore partium exti-
marum, sed cum malignus fuerit. Sic cacoethia hoc symptoma causa-
tur. vide ad par. 16. lib. 4. acut.

11. Causus qui habet sedem in pulmone, hæmorrhagia liberatur,
ait Galenus in 4. acut. Tamen per eandem peripneumonia non amat
hæmorrhagiam: ferè par esse ratio videtur Causi focus in pulmone
habentis & peripneumonia. vide de peripneumonia cap. 3. lib. 3. de
crisibus. Pleuritis amat hæmorrhagiam, partim non amat, & inter
causos & peripneumoniam ambigit. Minus enim quam Causus
amat, & magis quam peripneumonia Gal. ibidem. Gal. in epid. gene-
raliter non habita ratione ipsius foci in pulmone pronuntiat hæmor-
rhagiam omni causo familiarissimam.

12. Morbi longi sunt trifariam, vitio partis, culpa ægri & igno-
rantia medici, nec non peccati difficultate. Hæc in tribus consistit,
in copia materie, nature imbecillitate & meatuum angustia.

13. Hic damno animi pathemata. Est tamen ubi profunt in
ægris, est ubi obsunt. Docuimus alias quomodo obrepere profut. Qui
locus est notandus. Et Gal. com. ad part. 9. sect. 5. 1. 6. epi. docet quibus
de industria ira excitari debeat, & quibus non; quibus cor & caput
calidiora sunt, & affectu calido laborant, sed contra. Et Gal. ait
Hippocratem consuluisset in defectibus animi irritationem quandam

animi, ut conatus fortitudine, defectus imbecillitate sanetur. Vide Gal. cap. 11. lib. de ther. ad Pisonem. unde notatur ex Hippo. illud, Colorum mutationes fiunt aut corde laxante (unde pulchri & pellucidi,) aut constringente, unde subvirides. Tristitia & mæror πωροεις ας affert. Et hist. 11. sect. 3. lib. 3. epid. vide quos effectus habuerit mæror, cum tamen esset morbus tantum à plenitudine (id quod minime est periculosum, & facit ut etiam dies sextus benè indicet ut de virgine Parissæa patet) nam conuulsiones & terrifica fuere symptomata.

14. Melancholici & quibus animus in miseria est, habent quædam intervalla, sed amatorum more, licet eorum disputationes sana quædam consilia, ea statim amoris resurgentis sæuitia ac impetu devincuntur: sic melancholicis contingit. Sed notandum quæ mæror, & ἀπαρρησία, id est fuga hominum testentur πᾶτος μάλα σχολίων apud Hipp. in Coac. Hollerij. ubi animaduertit interpretes ab eodè humore contraria extrema pendere, hereticam virtutem & ἀρετήν, cum homo quasi hominem exuens sit μωδὶ ὁρῶντος. legatur locus iste.

15. Quòd in ægris & viris prudentibus mærorem damnemus hilaritatem præsentiamque animi desideremus, id temperandum est. aliud est gaudium, aliud hilaritas. Hæc profusum sæpè risum inuictum habet cum expiratione sonora & intercisa. Gaudium à rebus seriis & animo pacato & conscientia rerum cum virtute iunctarum, ducitur, hoc boni viri citra tamen risum fruuntur.

CONSILIUM VI.

De Impotentia coeundi.

I Nutilis sæpè est Medicorum opera, qui opiatas excitandæ, explicandæque veneri proprias architectantur & concinnant, quò ægri & corpore & animo dominabur sint gratiores: Nam hîc iudicio opus est, undeque frigidiores ineptique, & insulsi ingrati sunt salacissimo mulierum generi. Et obiter vnum notandum, quòd is tardus dicatur, qui corpore, & membris ineptus est, & imbecillus ad venerem, & ideo minus amabilis apud dominas. Tar-

76 CONSILIORVM MEDICINALIVM

76
dus facile venerem non explicat, id quod est meretricibus odio-
sum: insulsus qui caret sale, non est salax, & cupidus coitus.

Aliquādo non arrigit verpus, alias arrigit sed moliusculus est. Sic
non subit, nec semen eiacularur. Id fit aut vitio peculiari instru-
menti, aut totius corporis morbo, aut seminis defectu, aut eius
inefficacia, vt minùs turgeat, & penuria spirituum laboret, &
minùs intentus maneat verpus.

Videndum de ætate, si ætas congrua, an olim minùs aut
magis aptus fuerit, an procliuior ad libidinem, vt vetere vber-
tate quasi arefactus languerit, naturæque infirmior manus quasi
dederit.

Videndum quoque an naturalia illi non laborarint, an mercu-
rijlitum aut cinabrij suffrium passa fuerint, an vitio diætæ vt si vi-
nis albis & tenuioribus vsus fuerit rebus liquidioribus, quæ quasi
laxant, & effœminant carnes & semen. Assa enim carnem solidio-
rem reddunt scire oportet an parciùs ederit, vt sufficiat ad esse,
non autem ad robur.

Item canones alij sunt obseruandi vt loco & tempore congre-
diatur, non crudus, alioqui ineptus erit: præcedente titillatione, vt
sit ad venerem incentiuum & calcar. Id fit retenta vrina, & meien-
di desiderio.

Minus bona habitudo ineptitudinem istam conciliat vel quia
totum alimentum absumit, & non sinit semen esse reliquum, vt
succulentæ & *ευρηπικæ* nutrices, minùs sunt aptæ, fiunt enim vasa
angustiora, & in viris & in mulieribus, præ mole & pinguitudine.
Rationes apud Aëcium exponuntur à nobis.

Denique videndum ne, quæ ad fertur, infœcunditas, aut im-
potentia vt iusta repudiij causa, sit imaginaria & falsæ & mendaciis
amicitiæ testis. Sunt enim corpora quædam quæ simul iuncta
quamdam habent antipathiam ad iustam fœcunditatem & lætam
de qua sic Plinius loquitur. Est quædam priuatim dissociatio cor-
porum, & inter steriles, vbi cum aliis iungere gignunt Acetosa,
& olera fugienda: Commendant Asparagos ad excitandam vene-
rem, facilis est vsus: Absit ieiunium: vitetur nimia repletio: tum
ne cruditas oriatur aut ne reuocatus calor, & spiritus ad ventricu-
lum pleniorē deferat testes & partes femini mitificando, & co-
gendo destinatas.

Nimia cura obest, solliciti arrigunt, sed fugax est erectio.

Quidam hoc commendant quod sequitur.

24. Amygd. pistaciarum, pinearum, & dactylorum añ. 3 i. conseruæ satyrij, anthos, myrobolanorum condit. añ. 3 i. cortic. citrij conditi. 3 i. f. zinzib. conditi 3 f. scincorum vino albo lautorum. 3 vj. carnis caponis, & perdicis añ. 3 iij. cinnamomi caryophyll. nucis mosch. añ. 3 ij. macropip. 3 j. galliæ moschata. 3 j. seminis anisi, foeniculi añ. 3 f. sacchari 3 xij. fiet opiata, vtatur singulis matutinis, vel hac sequenti.

24. Satyrionis conditi 3 f. Radicis & seminis ascalonij añ. 3 i. f. seminis erucæ, fraxini & pastinacæ añ. 3 j. renum scincorum 9 iij. conseruæ eryngij 3 f. zinziberis conditi 3 f. confectionis alkermes 3 j. f. cum syrupo conseruationis satyrij fiat opiata, de qua cap. dormiturus ad quantitatem nucis moschatae adde conseruam anthos.

24. Aq. vitæ 3 iij. seminis staphidosagriæ 3 iij. macerari sinas per horas duodecim ad verpi totum, & perinæi.

Ex maiore parte istorum simplicium concinnatur à Fernelio opiata nomine Diasatyrium; huic inest mira vis calfaciendi: sed & in multis, vt antè diximus, bona victus ratio sanguinis boni, & spirituum proba generatio, vnde fecundum & multum semen conficitur, & superfluit ex reliquiis alimenti, sic cibus & potus primæ tenent, bellariorum & multorum ciborum infarctus (vnde æstus & turbatio contingit) nocent plurimum sanitati, & minus fecundos, & ad palæstram veneream idoneos reddunt. Notandum illud Hipp. cibaria, & potus & obsonia (excepto pane & maza quæ fit ex farina hordei tosti liquore aliquo subacta) exceptis & carnibus, & piscibus, & aqua reliqua omnia tenues & debiles vtilitates habent ad augmentum, ad robur & ad sanitatem. Ad sanitatem (ait alio loco) optima sunt quæ modicè ingesta sufficiunt, vt & famis. & sitis sint medela.

Quod si ob causam aliquam impotentius reddatur corpus, est opiata Analeptica apud eundem Fernelium cuius vsus esse potest in eo affectu.

ANNOTATIO.

1. Non perperam hoc adieci de reficiendis & consulendis viribus sed quod primum animaduerti debet, est quod non semper more medicorum practitorum ad excitandam venerem impense calidis utendum est. Nam calidiora extinguunt semen, vt sabina & agnus castus.

K iij

Lib. de affectionibus.

78 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Item quidam temperamento sunt calidiore, & aestuantiora habent viscera, & hi minus sæpè ob δυσχεστίας istam miris apti sunt ad explicandum venerem: deinde verò quæ sunt calidiora flatus dissipant, quorum usus aliquis ad arrectionem: itaque hîc iudicio opus est, nilque temerè agendum.

CONSILIVM VII.

De Fædis coloribus.

Difficile iudicatur in quo febris hæc virginalis consistat, si est obstructio cur aliæ febres ab obstructione non habent eadem symptomata, gressum difficilem, & alia? cur non color olivæ in aliis febribus? si allegatur ætas virginum (nam & anno septimo, & sequ. morbus oritur) cur mares iuniores quibus debet esse hæmorrhagia iis virginalibus symptomatis non præhenduntur? aliquæ quidem experiuntur mala, sed quæ cum fædorum colorum, (sic enim morbus iste latens à symptomate nomen fortitur) incommodis gravitate, & vehementia non ausint contendere. An quia instat tempus menstruum, & natura quia veller intendere excretionem istam, nec potest, intestinum quoddam & cæcum quoddam fit bellum, omnium malorum author? An quia marium, & mulierum morbi longo intervallo differunt? Non videtur iste motus mensium causa, nam & septennes virgines decolores fiunt, celerius virgines quàm mares egrotant isto morbo, ut extra uterum facilius crescunt, & adolescunt ut sanguis non requiratur ad incrementum cum iam satis idoneum habeant. Quidam morbi sunt nervorum, venarum alij, musculorum alij, carniū alij, alij arteriarum: sic morbus, id est ea febris virginalis fædo colore comitata in arteriis sedem potius habet, & iis quæ ad splenem pertinent, unde lienosum cor habere dicuntur, & saliens & χερδιον μόν, id est celerē motum cordis, & palpitationi similem, sæpè ob sanguinis φθορὰν, λύσιν, & ἔκτασιν; sic Hip. in Coacis, ait decolorem faciem cum gressu difficili, spirandique difficultate, & desiderio rerum alienarum, significare sanguinis corruptionem & exolutionem seu φθορὰν & λύσιν, Theophrastus in feminibus vo-

κατὰ φύσιν ἔκστασις. id est è natura egressionem ea corruptione prægressa.

Ratio victus in primis seruanda.

A glutinosis & obstructiones parientibus abstinendum, maxime de potu prouidendum; sitis enim est insatiabilis: aqua cum quarta parte vini, talleolis, citrij & saccharo pauco valet, vino diluto vtatur aut decocto graminis, & ceterach cum cinnamomo & chalybe. Non bibat dormitura. Curatio.

Non constringat corpus vt iuncea appareat.

Clysteres frequentes ex maluis, capill. veneris agrimonio, chamæp. anetho, mercur. cuscuta cum hiera, diaphan, lenit. catholic. melle mercuriali, saccharo rubro. 1.

Purgetur corpus, aut medicamento familiari, aut syrupo solenni; vitetur vsus rerum multum aperientium metu paralyticos. Non vtatur multis iusculis vt fere fit, sanguis fit serosior, & putris amittens natiuam consistentiam, & alendo inutilis est. 2.
Rond. de
splenis affect.

Affis vtatur moderate affis, vt caro sit solidior, & firmior, ideo in pastu probò decoctum rad. scynæ, immo per dies aliquot vtatur sudori blande eliciendo. Hipp. 2. de
diæt.

Si febris adsit, venæ sectio: breui etiam tundenda saphena, sedata febre balneum aquæ tepentis, item pedum lotio.

Confert litus ex oxyrrhodino ad sauitiam doloris capitis familiaris.

Vtatur sæpè semine foeniculi florentini, aut tabellis diarrh. abbatis.

Pilulæ ex puluere hieræ tartaro pauco, croco martis agar. rheo, fenn. cinnam. terebinth. gummi ammon. spica nardi, electi trias. trochisc. de myrrha, syrupo, de hyssopo: si respuat pilulas, sit in vsu medicamentum paratum ex decoct. rad. enul camp. torment. fannam. eryng. rubiæ maioris, fol. eupat. polytr. bipin, scab. beton. flor. veton. altilis bugloss. & genistæ, coquitur senna infund. rheum, cum ligno aloes & cinnam. syrup. rosa. pall. dissoluetur, ex iis parari poterit syrup. magist. aucta dosi omnium.

Purgato corpore vtetur sequentibus tabellis.

2℥. pul. scynæ & sassafras añ. 3 j. limaturæ chalyb. præp. 3 j. lumbr. terræ præp. 3 ij. ras. ebor. cor. cerui, diamarg. frig. añ. 3 f. pul. rubiæ maior. cort. citrii cond. conf. rosar. bugloss. añ. 3 f. ligni aloes & cinnam. añ. 3 f. cum saccharo in aqua bugloss. & ros. soluto. fiant 24. tabellæ, pondus sit singul. 3 f. capiat. per dies 24. Hæc non sunt
usurpanda sibi
hysterica sit
mulier.

80. CONSILIORVM MEDICINALIVM

Crocus martis hoc in affectu primas tenet, ideo minori cum apparatu parari poterunt hæ pilulæ.

24. Croci martis ʒ s. sauh. ʒ. iiij. cinn. & granor. Ker. añ. ʒ j. fiat Elect. per tabellas, vel opiata seq. erit in vsu.

25. Conf. bugloss. viola. borrag. añ. ʒ. vj. conf. campanæ & consol. añ ʒ i. corticis citrij ʒ ij. nuces conditas duas puluer. lætif. & diatr. añ. ʒ j. confect. de hyacintho ʒ s. sennæ pul. ʒ. j. croci martis ʒ iiij. cum syrupo de pomis fiet opiata de qua cap. ad magnitudinem nucis.

Hipp. 2. de
diæt.

Decoctum scynæ parabitur, habita ratione ætatis, corporis, & temporis, addita radice cichorij.

Laudatur vsus aquarum naturalium, ob aciditatem ratione æstus.

ANNOTATIONES.

1. Vnde remedia quæ crocum martis recipiunt, peculiarem vim habent ad fædo: colores & viscerum infarctus contumaces. Quidam infundunt certam huius quantitatem in vino albo cum semen. coriand. aut ligno Aloes, & de eo propinant 3. aut 4 uncias singulis matutinis.

2. De vsu iusculorum crebro quæstio esse potest, cum sanguis sit seresus. nam cum tumeat caro & leucophlegmatiam minetur, frequens iuscul. vsus videtur absurdus. sic est quædam eo in casu arteidei ʒis nam æstus internus est: item dubitant an sanguis ille seresus & subviridis sit ante febrem, an post, & singulis diebus febre rebellante magis corrumpatur.

Plin.

3. Asæ carnes solidiorem carnē præbent Hipp. sed febris, incendiū interius, sitis, aliter suadent: hic iudicio opus tales virgines æriginosum corpus habentes ut & ij qui pravis scatent humoribus famem & sitim ferunt, quod maligno humore abundant qui eis instar pabuli est: sic vene nata animalia nec fame nec siti pereunt, quia in ijs nec calor, nec sanguis, nec sudor.

Eger

CONSILIVM VIII.

De Scelotyrbe.

AEger nobilis affectu laborat iam annuo qui scelotyrbe dicitur, & est species quædam paralyseos partium interiorum ab osse sacro, & spinæ superiore parte cum genuum infirmitate, initio data medicamenta valida per os sumenda: decoctum hermodactylorum, cum tamen à mitioribus esset inchoandum, in eo bis peccatum est, & quod data medicamenta purgantia per os cum inferiores partes malum occuparet. Illud enim est axioma Galeni: Quæ per ventrem inferiorem fiunt purgationes, fluxiones in partes vicinas conciunt: Alterum peccatum quod initio data valida medicamenta, cum mitius agendum foret ita; enim princeps, dum loquitur de curatione paralyseos initio; ne properes initio in vsu fortium rerum, imo tarda vsque ad quartum & septimum, lenit initio, clysteribus vtitur, & reuera consilium illud principis est sani iudicij, & qui omittunt graviter in medendo peccant.

L. nat. r. nov.

lib. 3. fen. 2. cap. 4.

Notent valida medica. initio. in paralyf.

Cum à spina dorsi malum sit, consulimus vsum cauteriorum summa parte media & ad os sacrum.

Vsus clysterum conuenit addita Terebinthina, item terebinthina per os sumenda.

Litus ex axungiiis addita terebinthina, castoreo aut oleo chymico.

In pastu potio Guaiacina diluta, aut sarcaparillæ decoctum.

Opiata ex puluere scynæ, senna, rheobarbaro & puluere laxatiuo, addito melle.

Fotus ex calfacientibus herbis.

In lecto eliciatur sudor instar stupharum siccarum, confert balneum adstringens cum alumine aut magma ex vinaceis.

ANNOTATIO.

1. Plin. lib. 25 cap. 3. notat in Germani Caesaris exercitu citra rhenū ex vitiosi & medicati fontis aquæ potu, vi malefica cōspurcata.

L

32 CONSILIORVM MEDICINALIVM

duos novos exilijſſe morbos ⁊ quorum primus nervos crurum adeo obledibat vt compages in genibus diſſolueretur & crura vacillarent quem ob id οκελोटρῶν appellaret. Alter putridum erat oris male olentis vitium quod τομακκλιν recte appellabant quo intra biennium omnes dentes decidebant. Reperta autem auxilio eſt herba quæ vocatur britannica, non nervis modo, & oris malis ſalutaris ſed contra anginas quoque & ſerpentes.

CONSILIVM IX.

De Elephante pedum.

VXor filij, ſan-germani magni inæquali erat temperamento, internorum bellum & calor, externarum partium, frigiditas, humiditas, & manuum quidam mador, Tumor erat crurum & pedum ſiniſtrorum, cacochymia ſuſpecta erat, licet faciei color niteſceret.

i.
Vnde illud
faciei evapora
& mæſtitia
multa malum
Hipp.

Iuſſa eſt à multis iuſculis abſtinere metu leucophlegmatix. Interea non negligenda, interna intemperies, purgationes inſtituta, phlebotomia, uſus vini aqua temperati, ſemen coriandri & fœniculi à paſtu, moderatè tamen quia ſitibunda eſt, Redacta ad aquas Niuernenſes, plumbares pro balneo.

Si malum rediuium, fotus ex lexiuio ſarmentorum additis lupinis, & alumine, & vino ſtyptico, furfur contunditur aſpergitur aceto mulſo & applicatur.

Item ordinatum hoc cataplaſma.

℞. Farinæ hordei, fabarum añ. ʒ. iij. farinæ lini, orobi & lupinorum. añ. ʒ. ij. coque in oxymelite parato cum camapyti & betonica, ſcabiola, chamæmelo. Adde radicis figilli beatæ mariæ crudæ ʒ j. ſ. pulueris roſ. chamæmeli añ. ʒ j. Ireos ʒ j. cum oleo chamæmeli, fiet cataplaſma. Aliquando addetur ſapa & terebinthina. Aliquando parabitur cum vino.

Item fiet cataplaſma ex furfure frumenti imposito ſartagini addito vino albo, & aqu. decoct. camæm. Hirudines valent.

Si malum arte ſuperius fuerit, vtatur ad dies aliquot ſarſaparilla decoct. vel rod. ſaſſafras. Valeat radix mechoacan.

ANNOTATIO.

I. Elephas seu Elephantiasis; Leontiasis aut Satyriasis & lepra arabum à nonnullis dicitur, Tumor est secundum modum qui accidit in venis varicum qui in unaquaque parte organica potest contingere in cruribus, pedibus, virga, lingua, toto corpore, ut Nicomacho apud Gal. Accidit autem potissimum iis quibus intemperata sunt viscera, maxime iecur & lien, unde perennis fit humoris melancholici adusti aut pituitosi prouentus qui quidem humores dum ad partes inferiores transmittuntur, eos in tumorem attollunt. Signa sunt, caliditas loci asperitas, color niger aut fuscus, eruptio sanguinis nigri ex partibus affectis, urina crassa, excrementa Alui melancholica, vsus rerum sanguinem, & humores adurentium.

CONSILIVM X.

*De Puella trienni nauseam patiente à
natiuitate.*

PVella triennis ex quo nata est nauseam ἀνέμετον patitur, causam mali referimus ad intemperiem hepatis, bilis multæ genitricem, & facit biliosam parte superiore vel quod τῇ φούρῃ & φούρῃ vel ἔξῃ à natura ductum habet à folliculo fellis in fundum ventriculi.

*Biliosi sunt
φούρῃ vel ἔξῃ
I.*

Clysteribus vtendum putamus, cum aluus libera est, agra à molestia hac libera quoque est.

2.

Victus humectans, refrigerans, perperam alij medici malum à capite repetiuerunt & siccantibus vsi sunt.

Abstineat à multo butyro, pinguibus iusculis cum omphacio, vel succò limonum conuenient, vtatur malis granatis, & malis aureis.

3.

A pastu sumat cydoniatum Aurelianum, vel simile non crasum Abstineat ab iis quæ obstruunt.

Vtatur vino dilutissimo addita aqua, radicis graminis, aut cichorij; & quia vix admittit medicamenta in declinatione lunæ

L ij

84 CONSILIORVM MEDICINALIVM

vtatur aqua Rhei, vel fyrupo, de cichorio, vel cassia in bolo, vel clarificata, vel Rheo, colato per manicam Hipp. cum cinnamomo & saccharo cando, vel paucio Iulep. rosato.

Syrupus rosarum valet cum decocto graminis vel decocto prunorum & passularum, syrupus oxyfacch. & de limonibus.

Conserua rosarum pallid. vel tabellæ, triasant. addito paucio puluere Elect. de succo rosarum.

Litus ad hepar & ventriculum ex rosaceo. fons blandus ex fantalis & rosa addito aceto.

Si febris prehenderit phlebotomia.

Balnea in tempore opportuno conferent, in aceto rosaceo intingat carnem pulli aut alia.

ANNOTATIONES.

1. Biliosorum duo sunt genera, alij biliosi sunt τῇ φύσει, alij ex euentu, Natura biliosi vel tales sunt temperamento vt qui sunt hepate preternaturali, unde biliosi humoris prouentus sobolescit, habitu dicuntur biliosi, id est conformatione, quorum ita conformata est vesicula fellis, vt ad ventriculum aut ieiunum intestinum excurrat canaliculus felleus, & hi vocantur πικρόχολοι ἄνω. Talis erat Paulus Rhetor apud Gal. 2. de Acut. qui cum temper. pituitosus esset, tamen crebris vomitionibus torquebatur illique perpetuo erat adstricta aluus, Alij sunt ex euentu qui piperatis, salsis acerbis edulis vescuntur, & curis vigiliis, irarum aestu, & mororibus corpus extenuant & conficiunt.

2. Scitum illud Hipp. sect. 3. 6. epid. ventris segnitie omnium confusio vasorumque.

3. τὰ λιπαρὰ πρὸς τὰ φλεγμῶντα ἔξυμφέρει. ἔδὲ πρὸς τὰ ἀχάρτα, ἔδὲ πρὸς τὰ σπόμενα ἀλλὰ πρὸς τὰ φλεγμῶντα ἔξυμφέρει τὰ ψυχρὰ. Hipp. de affect.

CONSILIVM XI.

De falsa specie Ischiadis.

Nobilis vir falsa quadam Ischiadis specie laborabat, corpus erat olim valde biliosum, & à longo tempore sentiebat imbecillitatem cruris sinistri. Ratio victus instituta, vsus moderatus vini, & veneris, frequentes clysteres addita betonica yua moschata, radice sanamondæ, consolida hiera, diapruno, Terebinthina interdum.

Apozema laxatiuum addito syrupo de pomis.

A medicamentis validis, & pilulis abstinendum validioribus putauimus. Quia in Ischiade clysteres præferuntur medicamentis per os sumendis, item natura corporis ægri consideranda; detractiones sanguinis è brachio, & malleolis conferent.

Clyst. præferuntur medicamentis in Ischiade.

Prouocandæ hæmorrhoides & anus fouendus.

Frequens vsus blandarum pilularum: A calidioribus oleis abstinendum: solis chalafticis locus esto.

Forus blandus antè ex rosa, capillaribus chamæpitidis, beton. ebulo, saluia, chamæ. meliloto, cortice ligni sancti, enula campana, semine lini, fœniculi. A calidioribus abstinendum.

Prouocetur sudor partis admoto latere imbrice.

Litus ex axungis gallinæ, taxi, medulla cerui, lautis in vino albo, addito oleo amygd. dulcium rosato, terebinthina pauca, Emplast. ex empl. ad fract. ossium, desiccatio rubro, terebinthina, addito puluere Ireos, gummi Taca-macha si haberi potest.

Cauterium externæ Tibiæ.

Verno tempore aquæ spucenses, & Borboniac.

Decoctum blandum scynæ, imo & balneum aquæ tepentis consulitur.

CONSILIVM XII.

Ad Serpiginem in facie pfora prænuntiam.

Opiata laxatiua instituta est ex decocto conueniente herbis splenicis senna, Tamarindis, Cassia, puluere sennæ, additis pomis redolentibus, in decoct. conscrua violarum pulpa passulorum, cortice citrij, confectione hamech.

Sectio venæ valet, victus refrigerans & humectans: panis addito hordeo, Panis pistus in lacte, hordeum in iusculis carniū, hordeata frequentia, pomorum & prunorum vsus & esus, epithemata iecori tempore calido: vinum fractum aqua, serum lactis cum bipinella vel fumaria, mala aurea, citria; ruptorium brachio; cassia frequens loco opiata, cum puluere sennæ, lotio capitis pustulis pleni, faciei remedia adhibeantur.

Lotio capitis ex lexiuio sarmentorum caulium rubr. addita scabiosa in decocto pariet. agrimo. lapatho, radice campanæ, lupinis, surfure & vino albo, lauetur caput hydromelite ex melle rosato vel mercuriali.

Pro facie vnguentum citrinum, pomata cum pauco sublimato dulcificato.

Item ꝑ. vnguentor. rosati, Mesuæi citrini añ. ʒ. i. sulphuris puluerisati & aqua rosarum excepti. ʒ. j. f. terebinthinæ ʒ ij. cum succo citrij, fiat vnguentum. vel

ꝑ. aquar. plantag. ros. nenuph. añ. ʒ. iiij. sublimati gran. xv. ferue fiant simul.

ꝑ. Amygdal. dulcium ex corticat. & in aqua rosarij macer. ʒ ij. f. mica panis secalini ʒ iiij. mellis ʒ ij. f. rad. ireos flor. ʒ ij. farinæ hordei & lupin. añ. ʒ j. cum mucore gummi tragacanth. extracti in aqua damascena, fiat pasta pro toto corpore.

Lotio ex decocto hordei integri additis amygdalis, vel sero lactis.

Aqua seu lac virginale vulgo dictum; vnguentum album ad scabiem, pruritum, & id genus affectus mirè conducit.

7. Therap.

2.

ANNOTATIONES.

1. Sic parari solet lac virginalè à recentioribus, ℞. litharg. auri ʒ ij. cerusæ, felis commu. añ. ʒ i. aceti, aquæ plantag. rosar. añ. ʒ ij. caphuræ ʒ i. fiat collyrium, traiciatur per manicam.
2. Fernel parat ung. album cum ʒ. iij. cerusæ lytharg. ʒ ij. laur. diu in aqua rosarum quâ cicta mortario excipiuntur sensim que oleum rosarum affunditur quantum combibere possint continentera gitando, additur sub finem aceti albi pauxillum & caphuræ ʒ j. s.

CONSILIUM XIII.

De Oculorum morbis maximè de macula ex morbillis reliqua.

MOrbi oculorum difficiles ob varietatē partium ex quibus constant, & spirituum quibus tanquam soles duo splendēt & sunt illustres, pars spiritiosa est & remedia vulgo refrigerantia eos spiritus obtundunt & reperiunt, ratione membranarum, & humorum frigore læduntur.

Difficiliores sunt curatu quia sunt in actione perpetua, quia lumini obiciuntur, quod lumen oculo sano amicum, agro inimicum est, quia incognato genere excedit, pes laborans nec sessionem, nec ambulationem requirit, sed quietem: cur non & oculus. testis catarrhæ operatio, motus, & actio calfacit, difficillimi, si dolor capitis ut in hac agra fit, & id minatur, cecitatem: item si morbus oculi sit consecrarius exanthematum, virus enim indomitum est.

Circumcidenda omnis negotiosa cogitatio, & oculus mentem sequatur non mens: oculos assidua cogitatio occæcat. Plin.

Summa consilij est ut sedetur dolor capitis in morbis oculorum ob multas rationes. A calidioribus temperandum. Cataplasmata ex mica panis farina hordei cum rosato Mesuæi, Oxyrrhodium medicamenta temperata. Opiata laxatiua additis Tamarindis & conferuis. Apophlegmatismi. Errhina nocent, licet Hipp. I.

88 CONSILIORVM MEDICINALIVM

in prorrh. 2. suadeat, notandum non imitandum sine magna cautione. Cauterium in confinio suturarum anterioris capitis. Curanda vt laborans fœdis coloribus. Macula oculi lambenda; digerenda, discutienda sine validiore medicamento. Decoctum sarsaparillæ blandum ad absumendum putre serum in vsu sit quotidiano, idque dilutissimum. Valebit aqua ex herbis conuenientibus addito saccharo cando. Seto tandem est adhibitus.

ANNOTATIONES.

1. Commendat Mathiolus vinum ex Euphrasia & similibus herbis ad visum quasi deperditum. Verum euphrasia & similes herbe magno & caeco errore in oculorum morbis sæpius vsurpantur. Nam ubi in oculis est siccitas, squalor, & ob mœrores, vigilias aut inedias spirituum consumptio, quis dubitat quin vinum ex dictis herbis sit nociturum.

2. In oculis, in omni animali est quoddam pingue quod intelligi debet de quodam glutinoso quod necessarium est ob actionem oculi continuam. Ideo cauendum sæpè ne nimium siccemus oculos & squalorem inducamus. Senibus enim frequens hebetudo accedit ob squalorem & siccitatem oculorum.

CONSILIVM XIV.

De Tumore Epigastrij.

Filius D. Sangermani conqueritur de Tumore & leni dolore Epigastrij, qui in Mesenterij glandulis collectus videtur non ab similis charadum tumori. Affectus hic & ætate & temperamento congener est, illi perpetuum quasi alui profluvium non vera sit dysenteria, nec venæ mesaraicæ exugunt chylum vt ad hepar perueniat & fiat hæmatosis.

Bona victus lex imperata.

Forus ex malacticis, litus ex oxyrrhodino.

Balnea.

Medicamentum additis herbis vulnerariis.

Pilulæ

Pilulæ addito croco martis, vel tabellæ, vel conferua eadem croco addito.

Emplastrum ex mucore rad. althææ coctæ in oxycrato emplast. de mucag. & diachylo, addito cerato santalino aquæ Spadendes cum infusione foliorum orientalium.

ANNOTATIO.

I. Notat Gal. comm. in aph. 7. lib. 6. dolorem & tumores ventris sublimes leniores esse: non sublimes periculosiores quod in profundo iecore, intestinis, ventriculo & c. partibus principatum habentibus inhaerescant. Et iis non facile remedia admoueantur ut aliis supra peritoneum, quibus autem ob ingluuiem magnus fit utriusque bilis & pituitæ prouentus. Natura valens & robusta plerumque superuacua in pancreas & mesenterium ignobiles partes deponit, quæ totius corporis velut sentina sunt. In eas autem ex vicinis partibus illabuntur humores aut his locis & glandulis tempore exaggerantur qui tumores primum molles, dein tractu temporis renitentes ingenerant. quod notauit Hipp. 1. de morb. mul. Lien. (ait) eleuatus & repletus distribuit per venas corpori. & maximè in epiploon & partes ventrem ambientes & crura.

CONSILIVM XV.

De dolore cruris post ictum ex Globo missili ex Catapulta.

CRuris dolor fuit infirmitas, extenuatio quædam ob ictum ex Globulo missili ex catapulta acceptum. Dictum est, licet extenuatio quædam adsit, non desinit tamen pars continere in se serum quoddam quod gignitur in parte vitio materiæ partis, quia omnis pars imbecilla alimentum non probè conficit, ideo euacuandum illud serum & pars roboranda.

Purgatio aliqua, Phlebotomia, fons ex rosa in vino rubro addito cypero & chamæpiti, betonica, oleum de catellis, aditus aquæ Spadensis: stuphæ in lecto cum imbricato latere, Balsamum

M

90 CONSILIORVM MEDICINALIVM

extemporaneum aut Arregon, vnguentum ceroneum ex emplastro ad fracturas cum emplastro diuino. Tibiæ non stringantur ligaturis, vsus balnei in musto.

CONSILIVM XVI.

De varicosa hernia & hæmorrhoidibus.

AD herniam varicosam & hæmorrhoidum speciem in hypochondriaco, hæc præscripta fuerunt.

Purgatio ex cassia, senna addita & pauco cinnamomo, medicamentum aliud ex folliculis cum bipinell. melissæ eupatotij decocto, additis syrupis de pomis & de cichoreo: phlebotomia vtriusque brachij.

Non irritentur hæmorrhoides, oblatae per se, & si caput fecerint, aut blandè, prouocatae, aut potiùs allectæ aperiantur.

Ad scortum fatus blandus roborans ex vtraque rosa, a lumine, pauco polygono vtroque, & herba Roberti. Litus ex oxyrrhodo.

Ad inguen vt interceptiatur humor, emplastrum valde adstringens. Supra partem emplastrum, ex palmeo deficcatiuo rubro, vnguento comitissæ, puluere rosarum, & rad. ireos.

Malleolorum sectio si opus sit.

Lac asinæ. Aquæ naturales Forgenses.

Subligaculum conseruans.

CONSILIVM XVII.

De suppressione urinae.

INquisitum in causas illius suppressionis quæ fit aut vacuâ aut plenâ vesicâ.

Putauit æger more vulgi à sola pituita id malum oriri, ideo cauius, ne diureticis vteretur, donec de causa morbi constaret.

Olim laboravit sarcofi ad parastatas & partes vicinas, fortè renouatur malum: censuimus purgandum corpus, minutâ venâ temperandum, clysmis refrigerandum: Emulsionibus, pilulis vtendum ex aloë lota, iniectionibus in vesicam, deinde cathetere explorandum num lapis subsit an non.

Opiata laxatiua instituta, materialia fuerunt eadem quæ in syrupum de Althæa assumuntur.

Litus ad Perinæum ex rosato Mesuæi, balnea, abstinendum diureticis, Locus non fuit aquis naturalibus donec de morbi causis constaret. Dilutum cassiæ præscriptum.

CONSILIVM XVIII.

De Catarrho & sputo sanguinis.

QVoniam ludo palmario impendio magis sese exercebat nobilis Thesaurarius bilioso temperamento, statura longa corporis destillationibus obnoxius, sputationi sanguinis & hæmoptæ non expectorato, quæ sequuntur præscribuntur. Vitæ lex primò necessaria est.

Syrupi lenientes, horâ somni syrupus de succis iuiub. cum diacodio.

Gargarismus cum decort. hordei. rad. cynogloss. symphyti addito iuleb. rosato.

Hordeata, cassia cum Thamarindis pulpa passul, foeniculo dulci & rhabarbaro.

℞. Sacchari candi 3vj. Elect. diatriagac. frigid. 3ij. bol. arm. 3j. conferuæ. ros. 3j. f. confetuæ symphyti & corticis citri 3j. diamarg. frig. 3j. carab. rasuræ eboris pulueris glycy. añ. 3℥. cum sacch. in aqua ros. soluto fiant tabellæ.

Quod sequitur valet in excretionem sanguinis.

℞. Mumia 3j. f. terræ sigill. boli arm. añ. 3℥. antheræ 3j. conferuæ rosar. sicca. 3ij. tragacanthi 3j. f. sacchari penidiati & rosati añ. 3ij. cum pauca quant. sacchari & gummi tracacanthi in aqua. ros. soluto, fiat pasta ex qua fiant trochis vsuales.

Vtatur sæpè conferva rosarum.

ANNOTATIONES.

2. Epid.

1. Hic rufus est biliosus, mites habet tamen humores, licet aliter Hipp. Quorum pectora bilem generant balbi, furiosi, & calui fiunt verum tibi obnoxij, iuxta illud Celsi, destillatio in corpore tenui & longo tabem minatur.

2. Sputum sanguinis est de apicibus artis Plin. cap. 38. lib. 11. notat de duobus Consulibus qui habuere sanguinis excretionem per os non periculosas; Est & epistola de hæmoptico apud Plin. epistola 19. lib.

5. Ante annos aliquot, ait, dum intente instanterque pronuntiat sanguinem reiecit atque ob hoc in Ægyptum missus à me, post longam peregrinationem confirmatus rediit nuper: deinde dum per continuos dies nimis imperat voci, veteris infirmitatis tussicula admonitus rursus sanguinem reddidit, quæ ex causa destinavi eum mittere in prædia tua quæ Foro iulij possides: audiui enim te sæpè referentem esse ibi & aëra salubrem & lac huiusmodi curationibus accommodatissimum.

CONSILIVM XIX.

De Aure suppurata & manante sanie.

Non abs re incumbendum in curam grauis affectus auris qui grauior futurus est ni provideatur, dignitas partis, sensus exquisitus, angustia loci, vicinitas cerebri id suadent. Nervus à quinta coniugatione in aurem inferitur exquisiti sensus, item eò dolor maior est, quò in angustiore loco, item morbi oculorum intra oculos nocent, morbi aurium, non solum intra aures nocent, sed ad cerebrum progrediuntur, hinc deliria phrenitides.

Hic & dolor ex interuallis reperens, & saniosa excretio notanda. Quod eò periculosius, quia cum (ait Gal.) aures non sunt destinatae expurgando cerebro & aliena est à natura excretio per aures. In pueris natura ad tempus abutitur auribus, adductus aphorismus lib. 6. Quibus natura nares humidiores, & genitura humidior, minùs sani viuunt.

Sic ægro, & aures sunt humidiores quæ reddunt saniosum quid

Dolor in angustia; Senec.

Aeger hic hypochondriacum quid habet.

Com. ad aph. 24. lib. 1.

& tabem quandam, id quod pessimum est vt signum, nec mirum si minus integra fruatur sanitate. Ideo ex Hipp. Corpora vclut crum quæ vesicam non habent, nec meunt, nec saluant, nec spuunt, sunt saniora.

Adductus locus ex Hipp. 4. de morbis Quibus per os nares, vesicam alium fit excretio, sani sunt, quod per eas partes videatur fieri excretio omnis humoris peccantis. Et cum humor affligens per eas partes euacuatur, nullus morbus præhendit. Si hoc verum est, quorsum phlebotomia? non meminit Hipp. nec aurium, nec venarum, quarum apertio liberat à morbis.

*Lib. 2. de
dieta.*

Quæstio an iuuanda excretio, an minuenda, an supprimenda, an quid agendum forte idem fiet quod in hæmorrhoidibus, omnino suppressere funebre est. Laudat vinum mellitum Aëtius ad aures manantes, & cum iudicio siccantibus vtendum dicit.

*Tetrabibli. 2.
serm. 2 c. 81.*

Rondeletius quoque cataplasmata instituit vtilia dolori demulcendo. ex rad. lilior. mal. fol. solani, hyosc. flor. ros. nymph. chamœm. melil. farin. hordei lentium additis oleis ros. viol. nymph. & pingued. anseris.

Probat quoque lac recens mulsu, vt & albumen oui fortiter agitaru.

Nam hic dolor & excretio consideranda veniunt: dolori debetur eaque satis frequens phlebotomia, ni agrum hæmorrhagia ei ætati propria leuauerit.

Purgatio decreta ex pilulis communibus, & imperatoriis, aliquando ex fortioribus: hypochondriis prouisum per hypochondriaca, frictions; errhina quoque commendantur.

In dolore & inflammatione oleum rosatu cum tantillo aceti. quod remedium Galeni est vt ne cui mirum videatur mel rosatu indatur, aut syrupus de siccis, aut de absinthio, cur non & in inflammatione, iulep. rosatu conueniat.

In tinnitu aurium Manardus decoctum ligni Indici commendat, fortè non alienum erit ab hoc loco; cum de purulenta aure agatur.

Epif. 2. l. 19.

Succus porri, ad sonitum aurium commendatur à Fuchio, & allij Ascalonij.

CONSILIVM XX:

De congressus impotentia.

Quidam annos natus viginti sex ad venerem ineptus erat explendam; non talis natura, sed quia primis annis pubertatis cestro libidinis excitatus sese exhausserat & confecerat; sic & instrumentorum erat quædam imbecillitas intempestiuo labore contracta, & aut minus aut inefficacius semen, insulsus non erat, quia satis ad libidinem titillabatur, sed tardus, quia venerem explicare non poterat, euiratus erat, quarit à nobis vt vir fiat.

In hoc affectu considerandum an defectus sit materiæ seminalis, an eius vitium, an instrumentorum & vasorum spermaticorum, an eiaculantium.

Magna hîc prudentia adhibenda, nam nec nimis calfaciendus (vt fit in aliis, quod frigidis conuenit) quia ætas & temperamentum reclamationat, & febris facîle moueretur: nec ad vulgaria remedia adigendus; nam vsu calidiorum flatus dissiparentur, quorum aliquis vsus est in exercenda venere, frigidiora nocerent semen extinguendo, & nimium refrigerando.

Iuscula moderata conueniunt, vinum temperandum, & cibo præbito bibendum. Abstinendum per tempus ab actu venereo; aliquando verpus patitur resolutionem aliquam ob maiorem extensionem manufactam, id quod meretrices conari narrat Rondeletius, balneum non confert metu effœminationis partium: ni in eo coquantur adstringentia ad robur partium, aut immergatur corporis media pars in magmate racemorum.

Clysteres cum herbis mediocriter siccantibus: medicamenta roborantia, cassia, & quæ emolliunt laxando non proderunt.

2. Tabellæ roborantes & conseruæ.

Pro decoct. medicamenti rad. tormentillæ, sanamundæ & consolidæ vtriusque, veronica, fragaria, belis, prunella, pilosella, herba Roberti, stellaria, grana Kermes, flores vetonicæ altilis, semen card. portul. ocymi: folia sennæ infund. & Rheum, syrup. de cich. compof. dissol.

℥. Pulueris elect. triafant. 3 j. Aromatici rosati, diambrae, pulueris scynae, corallij & succini añ. 3 j. conseruae rosarum & symphyti Rhab. 3 ij. conseruae ros. 3 ij. radicis torment. dictamni & ligni aloes. añ. 3 j. fiant tabellae cum sacch. in aqua ros. soluto & vino hippocratico pauco.

Fiat massa panis qualis descripta apud Fernelium.

Hæc opiata fit in vsu. ℥. Conseruae rosarum, corticis citrij, myrob. añ. 3 vj. pulueris scynae 3 ij. f. conseruae consolidae 3 iij. pinearum, pistac. añ. 3 j. f. diasatyrion 3 ij. diamarg. frig. & diarrhod. añ. 3 f. terræ sigill. 3 f. cum saccharo rosato fiat conditum cum saccharo vel opiata cum syrupo. horâ somni præsertim.

Confectio diasatyrion erit instar omnium descripta apud Fernelium.

Fotus blandi ad perinæum & partes vicinas, ex rosis commun. & transmar. santalis, radicibus consolidae, bistortae & tormentillae vtriusque, foliis myrti, & plantag. coctis in aqua & vino.

℥. Emplast. contra rupt. 3 j. vnguent. comitiff. & desiccatiui rubr. añ. 3 vj. trochisci de spodio, & terra sigillata añ. 3 j. pulueris santal. & mastich. añ. 3 iij. cum cera lota in aqua ros. & aceto pauco, addita pauca terebinth. fiat magdaleon pro inguinibus & partibus vicinis.

℥. Emplast. ad fract. ossium. 3 ij. cerati santali. 3 j. pro lumbis.

Iniectiones fiant in penem roborantes ex rosarum heptaphylli, pentraphylli & scabiosae decocto.

Fortè & blandum scynae decoctum valebit, additis santalis.

ANNOTATIONES.

1. De excitantibus ad venerem, aut venerem sopientibus extinguentibusque abundè cap. 10. lib. 26. Plin. ubi ex Theophrasto citat esse herbam quandam veneris concitatricem quæ post coitum sexagesimum etiam venerem non sinit elanguere, notandus locus, item de satyrio quod si quis id manu tangat ad venerem stimulat ibidem. Sed hæc fidem superant.

2. Plinio cap. 23 lib. 21. commendatur herba dicta scolymos in vino sumpta. Fuchsius ex Plinio citat locum lepidum, exemplo Cicadarum, & ad venerem mentham satiuam commendat.

Cicer. (res vulgaris) ad venerem stimulat, semen auget, ideo eius

*gratia admissariis equis datur: est autem cicer rubrum, quod ideo
venereum vocatur, ocymum etiam valet.*

CONSILIVM XXI.

Pro quodam iuvene ad venerem inutili.

I.

Iunior ad venerem audior, promptior & ardentior fuit, hinc & feminis minor vis & vitalitas, & instrumentorum mollities, parum arrigit, & arrectio fugax, effluit etiam sponte sine libidinis pruritu quippiam spermaticum, sed falsum & adulterinum: temperamento est calidior. Equitationibus magnis & frequentibus usus. A calidioribus abstinendum putauimus: item venerem exercendam, sed ex longis interuallis & p̄gressis incentiuus, & pruritibus libidinis hęc capita sunt deliberationis.

Putamus purgandum corpus cassia, rheo, addito cinnamomo.

Clysteres non vulgares, ex emollientibus, sed qui sint vice iniectionis ex rosis communibus plantag. foliis rubi, radicibus tormentillæ, trifolio, consolidis, lapatho, agrimonio, dissolue mel rosatum, sacch. rubrum & rosatum, syrup. ros. pallidar. cum diapruno pauco sine oleis.

Opiata sit in usu ex conseru. bugloss. borrag. anthos, cortice citrij, florum saluix, beton. addendo parum seminis erucæ & pastinacæ, renum scincorum, pinearum, pistaciarum cum tantillo confectionis alkermes vel de hyacintho: vtatur satyrio condito & p̄sertim eius radice succulentiore; nam duplex radix est, vna tenuior, & inutilis, alia succulentior.

*Satyrium
quod valet
est trifolium sa-
tyriacum ita
vocatum.*

Frequens sit usus pinearum, pistaciarum & amygdalarum. Item bulborum, paratorum vt decet, & parum conditorum.

Cerebellis passerum & columbarum quidam vtuntur ad excitandam venerem.

Imus venter & perinæum foueantur sequenti decocto aut muria.

℞. Saluix minoris, puleg. toris mar. añ. m. j. feminis erucæ, pastinacæ añ. 3 s. ros. rub. florum chamæmm. elilot. añ. m. f. cyperi 3 j. f. excipe

excipe sacculo, qui bulliat in aqua & vino rubro styptico pro foru perinæ & pectinis.

Parte deterfa fiat litus ex mastichino additis ouis formicarum & pauco castorio, non alienum erit admouere emplastra vt ante dictum est.

ANNOTATIONES.

1. Hoc in loco dicimus iuuenem quasi euiratum, & quod iunior in palastra venerea se exercuerit & quod magnis laboribus se confecerit Plinius notat de equis, hircis & arietibus ad coitum segnioribus, ob assiduos labores, & ea ad coitum impotentia vocatur pro sedamum. eamque ob imbecillitatem quæ immodica venere contrahitur, Democritus damnauit venerem vt in qua homo ex homine exiliret, & hercle raritas eius utilior. Caesar lib. 6. de bello Gallico Germanis loquens, ait, quod qui diu impuberes manserunt maximam inter suos laudem ferunt: hinc alitur statura, aluntur vires, nerui confirmantur, intra annum viginti, feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; nam homo pubescens nodum quendam soluit, & soluere sentit Gallis (denouer) precipue si quas fuerit ægritudo & Plin. cap. 6. lib. 28. & 37. lib. 71. solus homo ait pubescit, quod nisi contingat, sterilis est in gignendo, siue mas sit siue femina.
2. Vfus ciccerum commendatur Gal. semini generando aptum, inflammationes, facit venerem stimulat: rubrum autem calidius albo & lædit, vesicam exulceratam & renes: semen bombacis idem præstat Sed maxime sal ad venerem excitat ideo putauere quidam Venerem ex mari ortam: apud Plutarch. vsus salis prohibitus erat sacerdotibus, vt essent castiores, & in sacrificiis à sale abstinencebatur.

Cap. 10. lib. 26

Plurima generamur morborum primo coitu & primo seminarum mense soluntur.

CONSILIVM XXII.

De Vetere Arthritide.

Vltus ratio in primis seruanda. Abstinentum ab iis quæ ad cutem humores pellunt. Vini vsus moderandus, venus mediocris, sectio venæ ex interuallis, purgationes antè paroxysmum arthriticum. Hirudines pedibus aliquando admouendæ. Cauteria

N

98 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Manardus c.
32. l. 14. reme-
dia prescri-
bit non negli-
genda.

1.

reperenda. Forus blandi ex herbis coctis in aqua & vino cum sacco vel spongia. Balneum aquæ dulcis, additis rosis summitatibus rubi. Balnea naturalia sæuiente dolore. Ceratum Galeni cum populerue aut vitellis ouorum, vulgare cataplasma ex mica panis cocta in lacte vel zytho. modicè repellendum. Fluxionem minuent & dolorem, rosa, lens, lactuca, intybum, fructus myrthi & semina frigida, in primo impetu valet acizoon, Mica panis secalini cocta in oxycrato inflammata parte. Cassia applicata pro diuitibus valde siccantia emplastra sub finem dolorum addi solita, vitanda, aut moderanda, est enim partium & siccitas & squalor.

2.

Vsus lactis asinini, hypnotica sæuiente dolore, item vsus olei ex torpedine ad demulcendos dolores arthriticos, vsus pilul. validarum vitandus. Opiata laxatiua addito puluere scynæ præferenda.

ANNOTATIONES.

1. *Laudant balnea aquæ tepentis domestica, laudant & naturalia; immo aquæ naturales suo tempore maximè conferre possunt.*

2. *De podagra Romanis incognita Plin. cap. 10. li. 26. morbus auorū memoria incognitus & peregrinus insanabilis non est credendus; sponte & desinit & curatur remediis conuenientibus: idem narrat eos qui lacte asinino vsi sunt fere à morbo arthritico immunes. cap. 9. lib. 28. Sic non modo nascentibus nobis, sed & senescentibus lac prodest.*

CONSILIVM XXIII.

De paraphimosi.

Vir erat annos natus sexaginta paraphimosin in balano habens, dubitabatur an à lue, an à nimio conatu, an ob fluorem muliebrem vxoris: malignum quid phlogosis & tumor & replicatio præputij præse ferebar.

Consultum vt corpus diligenter purgaretur, aut opiata laxatiua, aut sole mni syrupo.

Phlebotomia brachij, imo malleolorum si phlogosis gliscat.

Balneum, litus, & prægrediens forus mollis ad partem.

Vfus radicis fassafras aut scynæ additis fantalis ob intempericm hominis in potu, & post opiatam conuenientem cardiacam : iniectio detergens & parum emolliens, inter balanum & præputium.

Emplastrum de mucilaginibus cum pauco neapolitano. Immò pillulæ mercuriales valebunt; & leuis sectio malo rebellante.

ANNOTATIO.

Nomen Φίμωσις non modo ad penem referri debet, sed ad omnes partes naturales quæ meatum habent. Et diduci possunt, ut oculos, anum, præputium, uterum, labia verum de præputio frequentius dici consuevit sic glandem seu balanum tegente ut nudari non possit; capistratio à nonnullis dicitur. Est autem Φίμωσις nexus summi oris sacculorum cum toto superiore eius ambitu in angustum collecto funiculo claudantur & religantur. Et Φίμωσις cum è contrario, tum præputium, tum alia naturales meatus occludentia ita retrorsum deducta sunt ut reduci nequeant.

CONSILIVM XXIV.

Pro D. Villebois seneschalio aliquid vertiginosum sentiente partim ab hypochondriis, partim à capite.

CVique ætati sua est sanitas, sui germani & proprii morbi, progressus & incrementum impediendum, licet currentibus annis multæ eueniant mutationes.

Senibus, inter alios morbos vertigo est familiaris affectus, terrificus, sed qui plus terroris sæpè quàm periculi afferat, ideò non negligendus. Nam ut morbi animi sic & corporis, non ibi finiuntur ubi oriuntur, facilis ortus, difficilis interitus eorum, ubi sunt in ortu, & quasi incunabulis, facile vitantur, adulti vix evitantur.

N ij

Hipp. lib. de
precept.

In D. ægrotante quinquagenario vertiginis leue quoddam initium est cum sub deliquio animi dii prohibeant incrementum, & eo minus negligendus affectus nascens quia licet fortè à partibus imis sit, cerebrum pars princeps afficiatur, tandem morbus alienigena in cerebro sedem firmat quasi ius ciuitatis habiturus quod eò perniciosus est. Cæterum vt notauit Hippocrates, parua etiamnum causa in parte principe magnum quid affert, magnas item tragœdias ciet. *μακρὴν αὖτις ἀκρίβειαν λυέται ἢ μή τι πλεονέκτημα τῶν κύριον πάθη.* malum hoc non tam per se formidandum quàm consecutione maiorum metuendum, ex metu securitas nec aliquis celerius opprimitur quàm qui nil timeret. Apud comicos timido celeritas tribuitur ad querendum percontandum: securo tarditas, timens paucis verbis & vitur & alium audit: securus pluribus, summum indicium securitatis superbia est, nimia securitas frequens est initium calamitatis.

Et prudens Medicus minùs de hoc malo, vt de omni graui quod quid peius minatur, securus sit, ne si neglectus sit morbus, aut ars malo victa fuerit, vel ignorasse vel fefellisse reputetur.

I.

In domino ægrotante minùs negligendus ætati congener, quia eius animus in quies est, & curis perpetuis studiisque affectus, corpus assiduo labore affectum. Accedit, quod ei cerebrum exquisiti sensus (neruos & membranas audio) celeres sunt motus, defœcaciùs & expurgatiùs est cerebrum, talia capita vertigini, & deterioribus affectibus patent.

Hipp lib. 2. de
dieta, de vi-
su, & auditu
qui moueat
spiritus, &
deficet.

Id quod metum auget est, quia circa ortus & obitus lunæ malum se prodit, at astra maximè vim in caput exercent, vt in sedem & metropolin rationis & prudentiæ: accedit quòd assidua cogitatio occæcat abducto intus visu, Magna pars vrbianorum studiosorum imbecillo est ventriculo, quod obseruatione maximè dignum est, immo & capite, ob studia & curas, in his cruditas & vaporum in caput summissio.

Ad hos canones pro tuenda sanitate, & vitando malo consilium omne dirigendum.

Cap. 6. lib. 28.

Caput non nimis regendum, nec aperiendum & contumeliis aëris obliendum. Quanquam antiquitas pinxit omnes ferè tecto capite, vt erat sollicita detegendo rationis domicilio, tamen Plinius ait veteres statuisse vt coram Magistratu capita aperirentur non tam venerationis gratiâ, quàm vt consuetudine capita fierent firmiora.

Vitetur nimius labor corporis, & animi, ne labore pertinaci vires trucidantur. Labor animi reddit, corpus infirmius, & corporis idem rependit animo, licet ignavia corpus hebetet, labor firmet illa maturam senectutem hic longam adolescentiam faciat hæc sint mediocria.

Valetudinarij viuunt qui inquieti viuunt.

Moderanda ergo omnis animi actio (vt dixi) quod ad sanitatem confert autore Platone, sumens simile ex equis coniugatis eundem currum trahentibus vt par eorum sit tractus, labor & conatus.

Ieiunium vitandum, delectus sit ciborum vt melior sit coctio, vina calidiora vitanda. Primo haustu sit aqua fractum & quasi enerue & præsumatur cibus.

Odorata vitanda.

Non soli capiti prouidendum sed & visceribus in quibus aliquid est hypochondriacum hinc teter vapor. Non excitanda sternutamenta. Blando errhino melicrato vtendum aut iure betæ.

Lectio sit moderata, præsertim à cibo.

Acæpis, alliis & acrioribus alimentis abstinendum.

Si animus nimis vigil, nec placidus somnus vel defectu benigni vaporis aut mentis agitatione, aut cerebri siccitate, hordeata, & conseruæ nenupharis, & violarum sub horam somni in vsu sunt.

A pastu aut gelatina cytoniorum, aut puluis digestiuus, & panis bis coctus dulciarius.

Consulimus partibus nutritiis vnde mali prima labes ne cerebrum coafficiatur.

Clysterum frequens vsus esto.

℞. Rad. bugloss. torment. caryophyllorum & tunicis añ. ʒ. ij. bipin. *Purgatio.*
veroni. bugloss. meliss. beroni. epithy. eu pat. añ. m. s. feminis fœniculi florent. card. añ. ʒ. s. foliorum fennæ ʒ. iij. infunde per horas aliquot addendo cort. citrij conditi ʒ. j. s. dissol. express. ʒ. ij. Rhab. ad partem cum cinnamomo, & ligno aloes infusi syrupi de pomis laxat. & de cichorio comp. añ. ʒ. vj. fiat dosis.

℞. aloes lotæ in succo bugloss. aut borrag. ʒ. vj. rhabarb. ʒ. j. fennæ *Pilula.*
ʒ. iij. ligni aloes & ambræ añ. gran. x. rad. dictamni & elect. trias. añ. ʒ. j. feminis ocymi & visci querni añ. ʒ. s. cum syrupo de cichor. composito fiat massa vtatur ante pastum. possunt validiores pilule decenri, sed vsu rariores.

102 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Conditum.

24. Conferua viol. bug. borrag. cort. citrij añ. 3. f. confer. beton. anthos. añ. 3. ij visci quer. 3 f. diamarg. frig. & elect. de gemmis añ. j. crad. dictamini 3 f. pulueris angelicæ grana sex. conf. alker mes 3 j. myrob. 3 ij. cum saccharo bugloss. aut rosar. fiat conditum pro fine pastus.

Tabellæ.

24. Pulueris dia ireos 3 j. radice dictamni torment. añ. 3 j. diarrhod. abb. trias. simpl. añ. 3 ij. raf. eboris, cornu cerui, dent. apri, visci quer. marg. elect. añ. 3 j. confectionis alker mes gran. x. confer. rosar. & corticis citrij añ. 3 iij. cum sacch. in aqua ros. soluto fiant tabellæ vsuales.

Balnea æstate in vsu sunt.

Hæc est summa Consilij nostri. A validis, & à capite euocantibus abstinendum putamus, danda opera partibus nutritioni dicatis, non neglecto capite, hoc nostrum sit præiudicium tanquam ad grauiora præludium: iudicium Medico domestico relinquimus, plus pedes multi faciunt quam vnus. Conuiuium à pluribus collatum melius est ac lautius, quam vnum atque simplex. Multorum conuentus rectius decernit quàm vir vnus. quisquis ille est, *Arif. in polit.* Medicus domesticus, addat, detrahat pro ratione loci, temporis, ægroti, & ingenij morbi.

ANNOTATIONES.

1. In sicco prudentia esse dicitur, & qui calidior, & siccior sunt cerebro, ij sæpe acriores, actuosiores prudentiores aut potius celeriores ingenij. Zoroastes hominum primus risit eo die quo genitus est; eodem cerebrum ita palpitauit vt impositam repelleret manum, id quod futura scientiæ erat præsagium, tales non tam sunt prudentes quam scientes.
2. Ad ægros qui consueuerunt ferre aëris incommoda eodem habitu omni tempore (ad eo magna vis consuetudinis mollitiæ spectata) accommodari potest apophth. 20 & 24 de Agésilao lib. 1. apoph. & 19. lib. 8 de Polemone. Et reuera (vt ait Celsus) assueti duris frustra ad delicias vocantur. Sic aliquid de Parthis & Græcis simile scribunt; nam in ingenti clade mortuorum facie tabo perfusa capita sunt distincta ex mollitiæ eorum qui tecta habebant capita, & duritiæ eorum quibus aperta erant semper capita.

CONSILIVM XXV.

Pro muliere stranguriam septennem patiente.

NOuies vtero gestauerat, nona grauiditate puellam vtero gerebat. Ad tertium mensem, meiendi desiderium incessit, aliis rebus occupata non meminit urinam emittere. Aliquo post tempore eam non reddidit. Conqueritur, stranguriosum quid ei contigit, id vires acquisiuit etiam à partu in quo spes erat sanitatis: ab eo tempore miserè eo affectu afflicta est: dubitant an lapis, an oris vesicæ vlcera, omittitur immissio catheteris, augetur malum calamitosum, læditur iniectionibus in sinum pudoris; vel magna est exulceratio, vel iniectiones sunt acriores. Medici ambigunt quid & vnde id sit, vrina non foetet, reddit aliquando crassas vrinas & cum lacteo sedimento quod abscessum vel in vesica, vel in parastatis, vel renibus significat, etsi nunquam de rene quæsta est, ad nos itum est, imploratur auxilium.

An hæc tantula suppressio & retentio urinæ potuit tantum malum accersere? potuit, si diis placet. Ita Gal. Cùm crassior vrina est semel retenta & diutius, & non reddita legitimo & statò tempore fit initium lapidis, id decretum Galeni fortè in hac agra locum habuit.

*Com. in 6. epi.
in eum aphor.
in pueris post
mictum con-
cretio.*

Id facile fieri potuit in mulieribus quarum urinæ sunt iumentorum vrinis magis similes in grauidis, quibus ob foetum facile urinæ difficultas oboritur. Accedit quòd ea mulier gestabat filiam & imò quasi ventre collocatam, vnde vesica constringi potuit. Item gestatio foemellarum aliquid sæpè mali moris & ominis secum trahit & gestat. Quærendum est an non fluorem muliebrem sit passa, an non à viro aliquid contraxerit, item obstetrix obseruet & exploret, an vterus loco non sit motus. Exploranda fuit cathetere, & ad lapidem, & ad vlcera, qua parte manent & sæuiant mulierum morbi sunt curatu difficiliores & maximè ob pudorem quia se se facile non produnt, si quid præsertim circà naturalia oriatur: forte fuit initium calculi ex leui occasione & se exprimendo, & comprimendo facile cogit lapidem manente & ex-

*Inuestigatio
cause.*

164 CONSILIORVM MEDICINALIVM

„ pressa tenuiori materia, & Hippocrates ait, lapis fit ex biliosissima
„ materia (vt est sabulum) & pituitosissima, quæ est mucus tanquam
„ camentum lapidis.

Alia sunt remedia lapidis, alia vlcerum, & quod vnum iuuat, alterum lædit, ideo constet de morbo.

Vetus.

Ægra abstineat ab acidis, salis, & acris, & à diureticis, vretica non damno, emulsiones ex decocto hordei seminibus frigidis, maioribus & minoribus.

Addatur saccharum rosatum in vlcere, candum in lapide.

Vtatur cassia in bolæ addito diatrag. frigido, vel clarificatâ cassiâ soluta in decocto rad. pentaphyll. tunicis, oxyl. bipinellæ pilos. paucis baccis halicababi additis foliis sennæ & ʒj. f. cassiæ.

Clysteres.

Clysteres frequentes, si vlcera sunt addantur herbe vulnerariæ, veronica, beton. consolida, clysteres ex decocto capitis vitul. ex lacte ad fomentum quibus interdum addi poterit papauer, aut philonium.

Fotus blandi ad imum ventrem.

Phlebotomia, brachij, & malleolorum. semicupia; balnea, immissio partium pudendarum in peluim profundam aqua, & lacte plenam.

Hypnotica.

Vtatur hypnoticis, vt omni arte leuetur malum, pilula de cynoglossa locum habebunt, iniectiones valent ex althæa, consolida, fragaria, agrim, fanicula, bugla, veronica, addito syrupo de ficcis & iuleb. rosato, aut melle violar. aut rosato si ferre queat. Item aqua amygdalata iniecta.

Si vlcera rebellent trochisci Gordonij aut albi Rhæsis, aut aqua Lantfranci subiiciuntur.

Potus

Vtatur aqua saccharata, vino fracto, ptisana, pomaceo, aqua alba ex amygdalis.

Puluis.

℥. Puluer. Elect. diatrag. frig. ʒvj. glycy. ʒij. seminis portul. & papaueris albi añ. ʒiiij. boli arm. ʒij. carabes, diamarg. frig. añ. ʒi. rasuræ eboris, cornu cerui, antheræ añ. ʒi. conferuæ ros. ʒj. sacchari rosati ʒiiij. f. puluis cap. aliquando manè ʒi. ex hydromelite.

Vtatur trochiscis alkekengi Fernelianis, hydromeli conferet ex decocto pentaphylli, hordei, melle & saccharo cando aromatizato, ligno aloes aut rhodio.

Si vlcera sunt terebinth. lota valet: radix sassafra conferet: lac asinæ manè & vesperi.

Quia emacruit vtatur marci-panibus ex carne pullorum cum amygdalis,

amygdalis, pistaciis, penidiis lautis in aqua ros. & nenuph. ad vlce-
ra massa pilularum sequens utilis erit tempore & loco.

24. Pulveris consolidæ & radices sanamondæ añ. 3. s. terebinth.
vsta & puluerisatæ 9 iij. cōseruæ ros. sicca 3 s. Rhab. 3 j. rhapsontici
9 ij. carabes 9 j. Elect. diatragac. frigidi & diaireos añ. 9 ij. cum sy-
rupo rosa. siccarum, fiat massa capiat. 3 j. pro dosi.

Pilula.

CONSILIVM XXVI.

De Tumore cancroso pro. D. de S. leân.

Non ita pridem prædixeramus oriturum cancrosum quid,
cū mali maligni initia & incunabula (vt sic dicam) videre-
mus, vtinam nos augures augurium fefellisset, mitius cum domi-
na ægra actum fuisset, nec tanta mali atque doloris acerbitas fuisset,
nec proiecta appetentia fuisset, quæ mala vt signum, & vt
causa: vt signum quia dominatum atrabilis docet, hæc proster-
nit appetitum, vt acidus & naturalis succus melancholicus acuire so-
let, ab adustione enim natura abhorret: vt causa quia corpus mar-
cessit & macrescit, deest habituosa & glutinosa substantia quæ ca-
lori febrili resistat, maligna atrabilis acerbitas alimento, cum ap-
petitu sumpto, mitigatur & demulcetur.

Causa.

*Atrabilis ap-
petentiam
deicit, aci-
dus succus
naturalis
contra eam
acuit.*

Quæstio nunc: an pyroticum, aut suprâ aut infrâ partem tu-
mentem conferat? vtrique parti sua sunt patrocini momenta.

Hic quid dicam animi sum anceps, an suprâ an infrâ malum. Id
canon est prudentiæ, non tam videndum vt prosumus, quàm vt
non obsumus; cū enim nobis res sit cum corpore succo atro & fe-
roce scatente, videndum ne quid sinistri contingat in ea parte
quam cauterium exusserit, & domestici iudicium medici laude
id remedium dissuadentis. Si mite cauterium, inutile, si immitius
vix præstabitur periculum: meum antè fuit præiudicium cū de
eare rogaremur, certo nunc iudicio confirmamus. Ægra tabescit
vi morbi, ætate, mœrore, defectu alimenti noui, appetitu, pro-
strato tabo melancholico & ichore carnes irrigantur, vereor ne
pro leuamento noui mali sit irritamentum, itaque abstinendum,
brachio adhiberi potest minore cum periculo, profectu mini-

Hipp. in Aph.
hypocondri-
acæ mulieres
difficilius cu-
rantur quam
viri, & non
ita huic affe-
ctioni obno-
xie.

mo. De prognostico certè hoc dicere licet quòd malum hoc graue & plenum terroris existit in muliere potissimum; quotidianis enim rerum euentis & obseruationibus deprehendere licet, mulieres non pronas esse ad hypocondriacum affectum & melancholiam ab adustione, repugnans enim habent temperamentum, sed vbi semel in eum affectum inciderunt, difficilius curantur.

Cancrì sunt alendi non curandi, nec irritandi, inutilis opera est, & ægri sequitur calamitas mitigare, delinire humanius, tutius, irritare crudelius, periculosius.

Phlebotomia ex interuallis iuuat, conciliatio somni etiam laudano monstri paracelsici, vel solem nibus & solitis hypnoticis.

2.

Syrupus de pomis, de succis, pilularum vsus non probatur, opiata ex conferuis puluere sennæ, rheo, & similibus vtilior & tutior: omni ope excitanda appetentia, & etiã deteriore cibo sed gratiore, diuturnum ægotantium desiderium; iuuat medicorum indulgentia (Hipp. teste) in morbo diuturno.

ANNOTATIONES.

1. Melancholici vbi sunt inappetentes male habent, splenici sunt voraces sed de acido succo melancholico non de adusto est iudicium: nam sæpè appetentiam deicit, immo voraces splenici sunt non tam ob acidum succum quam cancrösam lienis dispositionem.

2. Purgatio instituitur frequentior non vehementior, & sicubi aliàs entericis locum habet vt sit nutritionis & purgationis gradus & vicissitudo, frequens & mitior euacuatio supplet vicem minus frequentis sed validioris, quanquam Hipp. in Aph. per inferiora vult melancholicos adspersionibus repurgari. Tamen cum quartanariis mitius agitur, cum tamen ea ab humore sit melancholico. Item crancros qui sunt soboles istius humoris alimus & nutrimus, vehementibus irritamus. Ita autem hic scrupulus adimitur, Agitandi sunt & purgandi melancholici adspersionibus non omnes, sed qui purgatione egent. Ita Mesuæus, in morbis melancholicis non semel, non bis, sed per interualla, molienda est euacuatio, eaque ita temperata esse debet, vt natura regat euacuationem, non euacuatio naturam ipsam. In his ergo maxime habenda ratio adustionis & caloris adurentis nec simpliciter calor considerandus, quod tumores atrabilarj satis superque testantur. Estque virus quoddam iunctum cum adustione quod plumbo solanoue emendatur quodammodo, aliisque vehementio-

ribus magis ac magis irritatur: quod si in externis affectibus curandis qui virus & pertinaciam melancholicam redolent, moderatio adhibenda est, ut non exacerbentur sed nutriantur, cum non idē in internis affectibus melancholicis usurpandum. Irritatio istorum morborum, seu internorum, seu externorum, doloris prouocatio est, mors ipsa denique, eorundem nutritio, est fomentum quoddam, dolorum leuatio, dulcedo quaedam, vitæ eiusque prorogatio. Sic melancholicis lac, balnea, & quidquid modicum temperatumque est profuit, quod violentum irritansque obsuit. Sic enim adustio humorum, & maxime sibilis flaua assetur, imprimat vim nescio quam humoribus: unde quos alioquin irritat frigus, & calor, eos lenit, fouet mitigat mediam ac temperatam. Et quod de humoribus atrabilariis dicitur, idem de moribus melancholicorum audiendum est: acerbioribus obiurgationibus irritantur ac ferociunt, mollioribus verbis & frigidis minimè corriguntur, moderatis rationibus ac sermonibus facillè acquiescunt ac temperantur.

CONSILIUM XXVII.

De hernia pro filia D. Margeret.

R Amicofsi colicos dolores facillè patiuntur, id fit ob ligaturas, & subligacula astringentia. Item aliquod vitium est in conformatione, in mesenterio & intestinis: fit æstus in intestinis, flatus generatio & impetus, Alui durities, vnde caloris incrementum, imo motus *ᾠεῖται πρὸς* intestinorum vitiatur quodammodo, & ob flatus yernaculos calida ventri admouentur; hinc calor, hinc alui durities & egestio laboriosa quæ intestinum expellit, quòd venter intumēt, deinde subsidit, id à glandularum mesenterij tumore, & quasi fermentatione oritur, vel vbi serum putre aut flatus adsunt.

Pro ramice non valdè probantur remedia per os sumpta, quidquid obganniant impostores, qui vocem factò sublimiorem habent, puluis tamen probari potest post vsum topicorum, de quo Fernelius in libello consiliorum egit.

Consultum est ut omnis agitatio corporis violenta vitaretur.

Pilularum communium vsus communis valet ad alium facilem.

*Conueniens
deligatio plu-
rimum præ-
stat in cura-
tione hernie.
Puluis.*

Maxima vis in fasciarum conuenientium vsu.

In fine pastus conueniet hic puluis.

℞. Panis tosti & puluerisati, ℥j. radice consolidæ ℥j. f. coriandri conditi, fceniculi, anisi, añ. ℥ij. conseruæ rosa sicca ℥j. f. carabes, rasuræ eboris, ligni rhodij añ. ℥. f. pulueris elect. triasant. 9 ij. sacch. rosati & communis añ. ℥ij. fiat puluis de quo capiat post pastum.

Vtatur conserua siue opiata sequenti, bis aut ter in hebdomada, maximè circa lunæ occasum.

Opiata.

℞. Conseruæ berberorum, rosarum añ. ℥vj. Myuæ cydonior. ℥j. conseruæ symphyti ℥j. corticis citrij myrob. conditarum añ. ℥. iiij. corallij rub. radice bardanæ, pentaphylli. & bistort. añ. 9 iiij. seminis portul. plantag. añ. ℥j. Elect. diatrag. frig. & diarrhod. añ. ℥. f. rasuræ chalybis præpar. ℥. f. cum syrupo cytoniorum & iuleb. rosato, fiat opiata de qua sumat vt dictum est. vel

℞. Conseruæ symph. maioris, rosarum antiq. corticis citr. sacchari cond. añ. ℥j. figill. beatæ Mar. iaceæ, albæ, & nigre añ. ℥. ij. boli arm. in aqua rosar. lot. sang. drac. añ. ℥ij. f. acaciæ hypocist. añ. ℥j. f. carn. cydon. sacch. cond. sine aromatibus ℥ij. limaturæ chalyb. ℥j. syrup. myrtini. q. f. fiat opiata ad vsum.

Valebit emplast. contra ruptur. cum mastiche, magnetis lapide, acacia, hypocist, bol. arm. except. oleo cydon. & terebinthina.

Fotus.

Item fotus ex ℥. f. a luminis dissol. in ℥. j. aquæ fabrorum & coct. ad medias pro fotu.

CONSILIVM XXVIII.

De sterilitate an ex parte viri, an mulieris.

IN rebus æstimandis & iudicio ferendo omnia vtrinque ad certam regulam sunt reuocanda, ne falsum pro vero supponatur.

Atque cum aliàs tum maximè, cum agitur de infœcunditate, quæ molesta esse solet, & matrimoniorum perturbatrix, soboles enim eorum est vinculum, fidum pignus, & amicitia conciliatrix.

Et quoniam ad tristiorem partem strenua est suspicio vimque affert veritati: ea suspicio innocenti sæpè nocet dum spes prolis titillat, sollicitat, lites fouet. In causa infœcunditatis æqua laus est afferenda.

In re quæ proponitur maritus culpâ non vacat, non vacat & mulier.

Mola quæ est moles indigesta & naturæ quoddam irritum opus & quasi ludibrium, docet, aut viri semen effœctum, aut vterum naturæ agrum vligine plenum, vnde semen ferescit & vim genitiuam amittit.

Vir arrigit, emittit, effundit, & immittit, benè venerem explicat, id quod viro parrociniatur naturalia sunt secundum naturam: mulier *ῥῆν* quendam patitur, & eo tabo irriginis vterus minùs est aptus ad semen concipiendum, etiam prolificum, vt sua virili & mascula vi semen muliebre ad texturam, & primum exordium, & ad opus mutuum excitet, impuritas vteri quæ hunc quasi indignabundum reddit, maximè causa est sterilitatis.

Dicunt mulierem habere corpus *εὐσπερον* & habitius item & virum. At corpora habitiora sæpè non sunt magis prolifica, imò minùs. Macra sunt salaciora, libidiniosiora, & fœcundiora, licet semen prolificum glutinis plus habere debeat & lentæ, substantiæ ad fœcunditatem, & diurnitatem, & plantæ sunt viuaciores quæ plus lenti & glutinosi habent humoris. Salaces aliquando sunt infœcundi, cum habeant salem ad libidinem, sed non *ἐνέργειαν* prolificam. Id fortè huic viro conuenit statim incitatur, statim venerem explicat, statim elanguet, non desinit tamen semen esse naturale & fœcundum: in amplexu suo & congressus aculeo, cunctantior esse debet, vt non tam facilè semen emittatur.

Iudicium dominorum consulum & rei æstimatorum esse debet, vt habeatur ratio viri, non negligatur mulier.

Viri, vt bona victus lege vtatur, si negotiosus actiones temperet: labor corporis mentem impedit, labor mentis corpus adimit (vt loquitur Plin.) & attenuat, homines negotia perplexa tractantes Græ. *πολυπράγμονες* aut non sunt prolifici, aut prolem valetudinariam producant.

Purgetur vir aliquando senna, syrupo de cichoreo, & rosarum vt semen serosius esse desinat, cassia effœminat ni addatur rheum. vide potum ante institutum ad eum finem.

Vtatur tabellis roborantibus cum rheo & croco martis, ligno

1.

2.

*Fluores albi
veneri offi-
ciant & no-
cent Hipp.
sect. 2. 2. Spi.
Eorum collu-
u e semen ef-
fectum fit &
indignabun-
dus vterus
congressum
auersatur.*

3.

4.

*Labor corpo-
ris menti ob-
est & vice
versa.*

Purgatio.

Tabella.

110 CONSILIORVM MEDICINALIVM

rhodio, aloes, addito puluere scincorum præparatorum, vtatur & conferuis. Verum hæ tabellæ non conueniunt, si non fluidum semen, & imbecilli hepatis signum non adsit.

Fotus virilium blandus: quanquam de eo dubitatur, quia è natura habent.

Purgationes pro muliere instituendæ sint blandæ, fotus, & infessus, addita arthemisia, matricaria, betonica, bistorta, sana monda, rosis, consolida vtraque conferent.

Imo iniectiones in vterum ex iisdem herbis.

Tabellæ roborantes ex triasantalo, Rheo, croco martis.

Decoctum blandum ex scyna si pōss, perseveret. Sed maxime videndum ne mulieri sit levis suspicio de impotentia viri, vt ne vinculum matrimonii resoluatur, quod spes prolis firmat, & id passim hodie fit, & cum mulieres non ament viros nisi frigidiusculæ, impotentiam facile prætexunt ad dissoluendum matrimonium. Et infœcunditatem adferunt vt iustam repudii causam, sed

Corpora quædam simul iuncta habent quandam antipathiam.

sapè imaginariam, & falsæ & mendacis amicitia testem: sunt enim corpora quædam quæ simul iuncta habent quandam antipathiam ad iustam fœcunditatem & latam. est quædam priuatim dissociatio corporum (ait Plin.) & inter steriles vbi cum aliis iunxere gignunt, alii, aliæque tantum mares, alii fœminas gignunt, alii alternant, alii semel in vita datur gignere.

Valerius ca. 1. l. 2. & de coelibatu punito c. 9. l. 2.

Verum cupiditas puerorum coniugali fidei præponi non debet, etsi natura quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit, & nos parentes alendo, nepotum nutriendorum debito alligauit.

ANNOTATIONES.

1. Senes sunt ad venerem inepti, & vanum sapè trahunt laborem, sunt tamquam milites emeriti imo seniliter oderunt, quod in iuuentute fuit amabile, Aiunt auroram deam, (& hinc auroræ nomen) habuisse quendam Deum maritum, quem (cum is senex factus esset) in crepusculo & summo mane relicto cubili maritum deserebat.

2. Diximus aliàs virum non debere esse aut fatuum, aut insulsam, quia aut non excitatur ad venerem aut eam non explet. At ex parte mulieris in congressu non debet nimiam se mouere quod mulieres quæ nolunt concipere faciunt, & id latine, crissare dicitur, id autem faciunt vt concinniorē venerem exhibeant viris, aut vt sibi abigant

conceptum semen, quod incidit in vuluam fœminæ in ipso conceptu non se mouentis; sic salacitas in viro, & nimia concussatio & motus in congressu sterilitatem facit.

3. Ea dari debent talibus corporibus quæ minuunt corpus, frictio dura & vehemens spissat, mollis lenit, multa corpus adimit, ut ait Plin.

4. Paulo post aliud dicitur, citaturque locus Plinij cap. 37. lib. 11. ex quo colligere licet corpora pingua minus fœcunda & senescere cele- Plin.
rius. Et reuera obseruationeprehendimus homines hyrtos esse sala-
ciores & libidinosiores.

5. Ut mulier concipiat puram esse oportet, quo ad fieri potest, nam muco plenæ nec facile concipiunt nec signa conceptus percipiunt, vnde Hipp. lib. de carnibus, horrorem, calorem dentium fridorem, conuul-
sionem quandam circa articulos, uteri segnitiam & torporem signa
conceptus prodit sed puras mulieres hoc pati asseuerat, crassæ & mu-
cosæ non ita percipiunt.

6. Non fuit visum diuortium Romæ inter virum & uxorem, nisi Plut. in com-
par. inter thes.
& Rom.
post annum vicesimum & quingentesimum ab vrbe condita, idque ob
sterilitatem. Seruilius spurius primus cum uxore infœcunditatis cau-
sa diuortium fecit.

CONSILIVM XXIX.

De Febre ῥευσμῶδης pro D. Gobelin Abbatisa.

QVoniam in acutis morbis minimis momentis maximæ
fiunt inclinationes, vnde etiam bonorum medicorum in
dubio fluctuat animus aut ad sanitatem aut ad mortem; vereor in
hac ægra (quod omen Deus auertat) ne non sit tam locus spei
quàm desperationi A' No-^{lia} medicum assidentem aut docet aut
confirmat consules medicos absentia ipsa dubios & ancipites red-
dit æqua lanx ad medicum domesticum, desiderium & incertum
consilium ad absentes medicos pertinet. Desperatio hinc aliqua
nata quod morbus sit auctus, est enim febris ῥευσμῶδης magnus
morbus, maior in sene muliere, maximus quod non ita pridem
gravi morbo afflicta fuerit, à quo vix dum respirauit viresque re-

I.

plin. sec. li. 7.
Epistola de
pomponio
tragedo &
Arist. 3. polit.

fumpfit, si morbus remediis non cesserit, sed ea eluserit, vix forte nostris obsequetur, conferemus consilia in salutem Aegræ, quia in collatis consiliis est quid auspicius, firmitus & augustius, quam in singulari iudicio, si morbo victore frustrâ, data & tardius missa id morbo celeri non negligentia cunctabundæ tribuendum. Ut dictum ita factum; & quia in numero est quid magnum & angusta vis perhibetur consilii collati quod singulis quibusque iudicii parum insit, omnibus plurimum.

Nostrum consilium D. Martino Collegæ forte obuio communicavi, aperui. Ille illud probauit, subscripsit, idem censuit & non recensuit.

R. media

Clysteres ex carniū vitulinarum decocto. Epithemata ad cor & hepar ob incendium, litus ad spinam ex rosato Mesuæi. Forus blandi ad renem veteris & querulæ affectionis sedem, si sæuiat dolor nephriticus, modo non sit à febre.

2.

Apozemata instar gratarum emulsionum dilutum cassiæ cum syrupo limonum, abstineat rheo ni lingua & morbus madescat, terebinthina cum rheo in eo ardore damnetur; miror cur data, nisi ob suppressam vrinam, at sæpe in febribus ardentibus suppressio vrinæ est & ὀπισθεν ob febrem, fortè eo necessitas adegit. Boni consules, si non probarint, inter viros bonos, quos malus animus & affectus transuersos non agit, tam grata esse debet dissentientis simplicitas, quàm probantis auctoritas, modo sit studium, & cognoscendæ veritatis stimulus, candor debet adesse potius quàm tristis & ambitiosa censura; difficilis sæpe rerum cognitio & in ambiguo multa ambigunt & vacillant.

Phlebotomia valet ni vires reclamant.

Conciliandus somnus nenupharino, hordeata, lotiones pedum, distillatum instaurans cum iuleb rosato.

ANNOTATIONES.

1. Non potest Medicus per Epistolas cibi aut balnei tempus eligere, vena tangenda est vetus prouerbiū est, gladiatorem in arena consilium capere, aliquid aduersarij vultus, aliquid manus mota, aliquid ipsa inclinatio corporis intuentem monet, quid fieri soleat, quid oporteat in vniuersum mandari potest & scribi. Tale consilium non tantum absentibus, sed etiam posteris datur. Illud autem quando fieri debeat aut quemadmodum ex longinquo nemo suadebit, cum rebus ipsis

ipsis deliberandum est, non tantum præsentis, sed vigilantis est occasionem observare properantem. Sen. Epist. lib. 3.

2. Dulcia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole multum diffundantur; calefacta autem & diffusa caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. Hipp. 2. de diæta. Terebinthina autem mordax aspera arteriæ & ori Gal. lib. 7. compos. phar. part. oleosa & pinguis citissime flammam & ignem concipit ideoque præsentente febre aut alicuius partis inflammatione non usurpanda calore enim atque acrimonia phlogosim exasperat atque incendium adauget.

CONSILIVM XXX.

De Sterilitate.

Multa pro alia muliere & eius viro dicta sunt: sed hæc noua sese res offert; nam non longè à nuptiis infecta fuit tabe venerea à viro, hinc vterus dispositionem *ῥευματικὴν* contraxit. Quærebatur num ea labes sterilitatis causa esse potest. An non, & partes naturales & vterus ipse ob gonorrhæam infectus fuerit, in luem enim veneram non fit præscriptio, latent reliquæ, domatur venenum non vincitur. Querimonia est de sterilitate an ex parte viri aut mulieris, videas benè habita corpora & sana non beari prole? in quo Medici valdè ambigunt & anxij sunt. Primò, quia eorum conscientia eos remordet ne quid aut peccent aut fauceant alterutri: ne innocens accusetur, deinde quia incitantur desiderio in querulis coniugibus proles excitandæ quòd beatum amoris pignus sit proles. In hac muliere est *ῥῆξις γυναικείος*, fundus agerque naturæ alieno humore irriguus sordescit & elanguescit. Præcipua cura vt vterus sit sanus ne semen fœcundum exole scat & vim natiuam amittat.

Mulier bona victus lege vtatur, vitet lactis vsum, fructuum, vt sanguis sit robustior.

Vtatur puluere digestiuo à pastu, aut pane biscocto, magnas corporis & animi vitabit actiones, & motus præsertim à conceptu & retento semine, clysteres frequentes etiam ex decocto herbarum vulnerariarum, blando medicamento vtetur.

In luem veneream non fit præscriptio

1.

2.

Quæ vteros habent humidos siccos &c. non concipiunt Hipp. in Aph.

P

114 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Habebit syrupum magistralem, item pilulas vsui deuotas.

Vide antè innumera remedia ad eundem finem. Aliquando seceretur vena brachij, aliquando malleolorum si purgationes voto non responderint.

Fotus ad partes naturales; iniectiones in vterum moderatæ. Pessaria.

Primo vere balnea, aliquando semicupia, emplastrum pro matrice ad lumbos.

Decoctum sarsaparillæ conuenienti tempore. Pilularum forma sequens vsui esse potest.

Pilula.

℞. Aloes in aqua betonica lauta 3 vj. rhabbari 3 iij. trochiscorum de carabe 3 ij. castor. 3 s. agar. troch. 3 iij. ladani 3 ij. radice bist. & tormentil. añ. 3 j. diambra, spica nardi, croci martis 3 j. cum syrupo capillarium veneris, fiat pilularum massa, pro dosi capi ut 3 s. vnâ horâ ante pastum.

3. Capiat aliquando pilulam ex terebinthina lauta in aqua buglossi, aur decocto herbarum capillarium.

Prodest lauta in aqua betonica, capiat autem vere, & autumno sub finem mensis menstrui.

In decocto medicamento sint sanamonda, eryngium, tormentilla, grana Kermes, & alkekengi & similia: syrupus magistralis ex iisdem additis sarsaparilla, parthenio, veronica, scabiosa, rhab, agarico, syrupo bizantino.

Puluis digestius prædictus addito ligno sassafras, decoctum sarsaparillæ sine vi elicitò sudore: in semicupio arthemisia, mercur. nepetha, matric. capillar. bipinella, radices bardanæ, bi tortæ, chamæmil. semen lini, bulliant. suffitus ex trochiscis aliptæ moscata pessus.

Suffitus.

℞. Pulueris rosar. & antheræ. añ. 3 ij. ireos. 3 j. zibeth. ambra añ. gran. 4. moschi tantill. sant. citronij 3 j. fiat puluis excipiendus bombace. Si calor, irroretur pessus aq. rosa. & nenupharis cum mucore seminis psyllij, ambra & santalis.

℞. Radicis pentaphyll. bistort. sanamondæ añ. 3 j. beton. veronica, robertiana, adianthi, rosa. polyg. maioris an. p. i. ligni rhodij. corticis guaiacij & santal vtriusque añ. 3 iij. coque in hydromel. adde saccharum rosatum.

Vide de sterilitate lib. x. consil. Ballonij

Suffitus fient ex conuenientibus.

De suffitu & conseruis vtilibus maximè de conserua saluæ, pluria alijs locis.

Inter cætera si hæc parum profecerint, valebit vsus radicis limonij & saluæ in vino albo.

Interea non negligendum quod dictum est de suspectis reliquiis luis in eam rem valebit opiata Fernelij, atque vtile erit aliquot diluculis sudores hausto guaiacino cremore blandè promouere.

Meminimus trochiscorum aliptæ moschata.

Non erit alienum dare aliquando opiata quæ ad venerem excitet, ocymum id præstat, vterum purgat, item salua.

4.

Ad intentiones prædictas laudatur syrupus ex succis matricariæ, agripal. nepethæ cum saccharo, si calidiora fuerint hæc, ad temperatiora veniendum est.

ANNOTATIONES.

1. *Mibi nunquam emoritur ista lues, nec eius omnes fibræ eliduntur, domatur quidem, omnino vincitur ac extinguatur nunquam; adeo magna vis est morbi καὶ τὴν ὅλην εἶσιν. vnum tamen observatione dignum quod tumores veneri tandem natura gratiam recipientes & contagionis sunt expertes & boni moris esse incipiant, ait Vigonius.*

2. *Vulgus est proletarium totum incumbit veneri apud ignobiles vulgaris reperitur generatio Plin. cap. 14. lib. 7. de mulieribus aptis aut ineptis ad conceptum abundè Hipp. 2. prorrh.*

3. *Pilularum ex terebinthina vsus vere, & autumnno frequentè satis in vsu, sterilitati medetur nobilis mulier clarissimorum medicorum consilium secuta, hæc arte & ingenio sterilitatem vitasse se affirmavit frequenter deuorabat pilulam vnâ ex terebinthina optima, præsertim incante vere per tres menses & exacta æstate initio autumnii per tres alios menses quod creditur non est difficile; maximas enim doctes & opportunitates terebinthina est consecuta: Et quoniam difficile in pilularum formam terebinthina reformatur: modum id faciendi ex magistrorum artis consilio aperimus. terebinthina in decocto conueniente elixanda est vt faciliùs ducatur, & consistentiam acquirat formandis pilulis apprimè utilem.*

26. *Rad. tormentillæ & bisorta añ. ʒ. s. parthenij, polytrichi, melissæ betonicæ, & trifolij odorati añ. p. j. fiat decoct.*

27. *Terebinth. ʒ. ij. bulliant in aqua decoct. superioris blanda ebullitione, deinde sinantur refrigerare in parte decoctionis eiusdem acti*

P ij

frigida, addæ rhei 3 j. pul. Karabes ʒ ij. myrrhæ 3 s. ambre griseæ ʒ s. formetur massa, de qua capiat pilulam vnā, vt dictum est.

4. Ad conceptum mirum quod scribit Mathiolus de succo saluie cum pauco sale Agrippa (ait) hanc sacram herbam vocat, quam prægnantes mulieres, si fluida laxaque fuerint commodè comedere possunt, nam continet conceptum vitalemque reddit, at si succi huius heminam 4. à secubitu die adiecto pauco sale hauserit, deinde viro misceatur concipiet, aiunt in Ægypto post suas pestilentias mulieres ab iis qui superfuerunt coactas fuisse vt cum succum biberent atque inde plurimi producti sunt sætus.

CONSILIVM XXXI.

Ad surditatis initia pro D. Bazanier.

Pilula.

Purgationes conuenientes ex mass. pil. de agar. cocciar. lucis & aur. añ. 3 j. aloes nutr. in decoct. beton. & macerat. 3 iij. cum syrupo de stæchade dosis à 3 j. ad ʒ iiij. Panes humeris applicentur calidi, cucurbitulæ, iniectiones in aurem conuenientes sed copia fati bona, deinde repurgentur. Adhibeatur cauterium brachio, Turundæ illinendæ basilicone ad suppurationem aliquam, oleum violatum. Anemones & brassicæ succus valet pro Errhino.

Succus ex anguilla tosta in verubus.

2.

Item succus bulbi extractus cum pauco vino albo, botto imbutus aqua cardui indatur. Masticatoria, oleum amygdal. dulcium aliquando amararum cum pauco oleo rutæ, vel

3.

Eschalottes

2℥. Succor. rutæ, bulbi esculenti añ. 3 j. vini albi subtiliss. & generosi 3 ii. madeant super cineres calidos, impleatur, horâ somni, auris, deinde obruretur cottone moschato.

Opiata.

Opiata ex conferuis saluie, anthos, melissæ, conf. acor. enulæ, aromat. rofat maior. mithrid. vetere, hyeme potissimum cum syrupo. de stæchade. Purganda auris auriscalpio.

ANNOTATIONES.

1. Cum omnis aurium tinnitus sit ferè incurabilis, raroque voto satagentis medici respondeatur, æquum esse putant quidam dolorem aliquem inducere, si inducere tutum sit cum aurium dolor tormentis annumeretur, saltem immixtis Turundulis unguento basilicone aut alio vim suppuratoriam nato illitis, aliqua suppuratio molienda, ita enim fit, ut abscedendi quadam lege & ratione materia coctione ipsa obsequentior reddita, foras erumpat ægrorum commodo maximo.
2. Quibusdam non placet iniectio oleorum in aures, tum quia ratione viscosæ naturæ obstruunt, tum quia sordes, si quæ forinsecus inciderint ratione viscosi olei faciliè medio in meatu inhaerescant, unde novi mali, nova occasio.
3. Cum anfractuosa sint aures, iniecta liquoris conuenientis guttula non satis esse potest, sed potius implenda est auris deinde, cottione occludenda.

CONSILIUM XXXII.

De lethargo syncope & cardialgia.

AD sextum Calend. Aprilis Dominus Coronæus deliquio animi correptus ferè exanimatus est. Adiutus, parumper vires & corpus resumpsit, domum redux factus est ἀφ' αἰῶνος. Aliquid lethargicum ominabamur, testes marcor quidam animi, corporis torpor, inexpugnabilis sopor, molis corporis quasi quassatio, nec nisi punctus aut vellicatus sensum probabat superstitem sed hebetiorem, deliria fugacia, si morbus inueterasset typhomania fuisset, sensus caloris insignis maximè in fronte, & qua plexus retiformis latet, aderat. Et id maximè lethargum presagiebat, plus periculi quàm spei aderat nisi quod narrabant ægrum aliquid simile olim passum sed non tam terrificum; id aliquantum nos solabatur, Nam securus faciliè in iis aliquis esse debet quæ sine periculo eua-

118 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Celsus.

Hipp. de præc.
parua causa
medicis exo-
luitur nisi
quid sit circa
partem prin-
cipem.

Cerebrum
metropolis
frigidi &
glutinosi.

fit. Parum tamen spei erat, maximè quia morbi cerebri de apici-
bus artis sunt; nam levis causa sæpè grauem morbum promouet,
effectus causam superat, id quæ quia pars princeps & sensus scatu-
rigo, deinde in ambiguo versabamur, an reficiendus râtum, an pur-
gandus & extenuandus; pertulerat in ediam ieiunus, etiam diei in-
tegrum, at defectu alimenti spiritus ardent, bilis suaui alimento ca-
rens efferatur & suo fero (quod frænum est) destituitur, & ven-
triculus inanis aliunde mendicat alimentum, sed sæpè infelix per
colliquationem, hinc malorum ilias, syncopæ, spasmi, cardial-
giæ. In dubio hoc vicit sententia de repurgando, & à capite
reuellendo, cum & plethoræ sese signa proderent: metus alioqui
erat, aut siriafeos cerebri aut sphaceli, aut morbi attoniti quem
sæpè phlogosis in cerebro facit in paroxysmo & extra (quod mi-
rum) phlebotomiam alacriter non tulit medicamenta facile &
quod medicis facile negotium facessit, est admirabilis cerebri, &
vasorum eius in inæqualitate æqualitas, medulla eius est glutino-
sa, frigida, humida. Vnde Hipp. cerebrum vocat metropolin frigi-
di & glutinosi. Arteriæ & venæ calidiores elaborato spiritu & te-
nui sanguineque turgent, hinc aiunt cerebrum frigidum aërem
impensè calidum æquare. Quid hoc est? in hoc quippe naturæ ars
& solertia se probat. Glutinosa substantia impedit quo minùs aut
arescat, aut marcescat, deflagret & ἀναλωσιν patiatur. Quod cōtin-
geret ob assiduas cogitationes, studia & quinque sensuum iuges
actiones. Vnde quibus cerebrum est siccius & defœccatius, paulò
prudentiores fiunt, sed id boni sæua mercede compensatur: testes
homines acerrimi ingenij quibus sacer morbus non pepercit, &
cum consentiunt natura glutinosa frigida cerebri & arteriarum
calor, in ista inæqualitæqualitate fœlicitas actionum relucet. Vsu
remediorum reducta hæc temperies cerebri & meatuum cerebri
libertas, vnde spiritus, suos motus & meatus habent (cum cere-
brum vel vt mens, vel vt corpus laboreat) agrum auspato à pe-
riculo liberauit, & charæ coniugi desideratum restituit, hæc acta
me ordinario M. & consulibus D. D. Marefcotio; Martino, Se-
guyno.

ANNOTATIO.

1. Cerebrum glandula est fluxibus opportuna Gal. cap. 8. lib. de sang. missione. At quomodo excrementis se facile liberet, docet Hipp. lib. de Glandulis 1.

CONSILIVM XXXIII.

*De puella quam ob terrifica symptomata vel
possessam vel obsessam esse putabant, quasi
de censu τῶν ἐνεργημένων ἔς numero
diceretur.*

IAm ante proposuimus puellam, quæ ex quo nata est erat *χενοτόμαχος* & nauseabunda, & tamen *ἀνέμετος*, nec enim reuomebat maxime nauseabat circa quosdam cibos. virgo de qua hoc loco, pathemata habebat melancholica, & inter cætera vnum fuit mirandum, cum ea totam se Deo vouisset, & consecrasset, tamen in ipsa communione cum Christi corpus, tanquam Deus ipse vi sacramenti sumendus esset, non poterat sumere & vti. Nauseabunda erat & *χενοτόμαχος*. Alij putabant id fieri quod in pane *ἄζυμος* corpus Christi contineretur, id enim peculiare obseruatum est in ea, quod panem *ἄζυμον* & sacrum, & non sacrum sumere non poterat.

Alij putabant id contingere ob respectum ad corpus Christi & sacramenti reuerentiam & conscientia aculeum aut metum iudicii Dei, si forte corpus Christi non sumeretur eo modo quo id fieri debet. Tanta vis pathematum animi.

Alij id quicquid fuit melancholicum putabant. Tanta est vis & energia humoris melancholici. Imo homines similes reddit *ἐνεργημένοις* vnde ad *ἐξορισμὸς* tanquam ad summam anchoram & sacram confugitur.

Cæterum in hoc perplexo negotio varias in partes iudicia hominum distracta sunt, & in rebus dubiis sanior pars sequenda fuit.

1.

2.

120 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Non omittenda consilia & remedia diuina censuimus nam in Ritu Ecclesiastico & remediis diuinis remedium remediorum consistit, humanis consiliis & auxiliis præualent. Purganda, syrupo de succis iuuanda. Balneis vtendum, sero lactis colato, opiatīs ex conferuis addita confectiōe Alkermes, succo citrij myrobolanis, croco martis, bolo.

ANNOTATIONES.

1. Sic obseruant physici soli homini contingere inter cætera animantia vt vulneratus non reddat sanguinem, & pars incruenta maneat & id metui tribuitur.
2. Melancholici toti iacent, vt aiunt, in fermento. Id est ægro sunt animo ira, & passionibus animi turgent, & multa humori melancholico in mores licent, vnum & idem in articulo placet & displicet, crebris mutationibus vt remediis vtuntur. Id in mulieribus multò formidabilius est ob iudicij imbecillitatem & sexus anxietatem.

CONSILIVM XXXIV.

De scrophulis pro Domina L. M.

Causa.

DE scrophulis multi multa & sæpè in vanum, morbus enim est ludificans operam medicorum. Rondeletius multa remedia adhibet, & calida plurima in quo, pace tanti viri dicam, ab eo dissentimus, humor enim acer, mordax salsus & nitrosus id genus mali gignit & fouet.

Viſus.

Exacta vitæ lex tenenda: fœtus ad partem ex scabiosa, bipinel, veronica, coctis cum medulla ligni sancti.

Opiata.

Opiata laxatiua cum puluere scynæ.

Detractio sanguinis, sanguisugæ parti admouendæ, lac asinæ quod ex Galeno ab elephant. liberat, balnea, serum lactis æstate addita, bipinella, veronica fumaria, scordio, rore solis, pilosella.

Syrupus regis fabor. Pomatium, sanamondæ radix hîc & in malignis morbis mirificas habet vires, item radix buglossi temperando.

Vsus pilularum addito mercurio.

Scrophu-

Scrophulariam ratione nominis chæradibus proficiam putant, tamen aron imitatur & chelidonium minus vocatur, ita aiunt, si loco sicco nascatur periculosa est, acrimonia enim sua exulcerat & imitatur malitiam humoris, strumas committentis; si loco humido, & vliginoso perutilis; vide, an hoc verisimile. Chirurgus nos alloquatur ut de emplastris non calfacientibus conveniatur, cauteria vtilia sunt.

*Fuchsius.
Galeopsis siue
scrophularia
maior com-
mendatur
maxime ad
strumas.*

ANNOTATIO.

1. *Lues venerea, strumæ, elephas aliquid habent cognatum & ovæ-
væ tres has hydras unus alexicacos Hercules, hydræ grossis vincit &
opprimit. Strumas autem sanat profusa per os maligna pituita quæ
in capite redundabat, illincque in subiectas partes delabens illarum
causa fuerat. Mercurius enim cum sit frigidus & humidus impendit
suprà omnia medicamenta calidorum humorum feruorem obviandit,
furorem & impetum coercet, siccitatem temperat, malignitatem cohi-
bet calida & sicca viscera ita humectat ut bilis in posterum minimè
colligant. Dolores calidos per se mitigat, frigidos ex accidenti, purga-
toria scilicet vi in aluum deturbans, vel in os regerens scirrhus emollit
& resolvit ratione humiditatis tenuitati partium coniunctæ. At vero
Mercurius, de quo hic fit mentio, is est quem dulcem aut dulcificatum
vocant alij aquilam albam seu cœlestem aut sublimatum dulcem; non
crudus & minimè præparatus qui plumbi fusi instar, partibus quibus
adheret, paralysem inducit ventricolum lædit, intestina diris crucia-
tibus torquet, corpus subtumidum & in præteritum reddit, gravissimaque
symptomata inuehit. Ille autem paratur ex hydrarg. crudi 3vj. &
sublimati 3viij. in mortario marmoreo, cum pistillo, ligneo, simul agi-
tatione diuturna commixtis & tritis, adeo ut nulla hydrarg. crudi
bulla supersit, quibus peractis, massa in matraccio colli longi colloca-
tus & igne cinctio, per 6. horas circiter sublimatur extincto igne.
Mercurius sublimatus summitati vasis adhærens excipitur à facibus
& fuligine venenata separatur, qui si gustanti dulcis non percipiatur,
aut ulceri sordido adhibitus escharam facere deprehendatur, eodem
apparatu iterum edulcandus est. Sic dulcatus hydrarg. exhibetur cum
morbi cacoethia & pernicacia id præsidij genus expostulat forma boli
aut pilul. cum pilulis cocciis troch. alhandal. extract. scam. Aloes,
pul. rhei. sennæ diaphæn. cass. conf. Et. hamech. &c. quæ vim eius lan-
guidam & ignauam irritant quibus admiscuntur spica cinnam. am-*

Q

bra, Moschus, sed potissimum folia auri aut eius scobs, seu limatura. Nihil enim est quod argentum viuum auidius imbibat quam aurum, atque ita illud per aluum cum auro egeritur cum quo maxima intercedit amicitia, nam ipsum purgat, sordes expuit, crebro tactatu fictilibus in vasis, & quæ inaurantur hydr. intercedente, aurum pertinacissimè retinent metallaque omnia hydrarg. supernatare obseruamus, vt aquæ ligna, præter aurum quod vnum ad se rapit. At si ptyalis- mum prouocare expedit, hydrarg. sine purgantibus exhibetur.

CONSILIVM XXXV.

De Fluore muliebri & muliere cachectica.

I.
Vterus plenus
attractæ hu-
miditatis.

Agitur de graui symptomate tertij generis in excretis, excreta aut toto genere sunt contra naturam, aut iuuant, vt hæmorrhoids. Quod excernitur, quandiu, quomodo, vnde, consideratur locus à quo & in quem. Tribus de causis p̄s hic muliebris curatu est difficilis, primò quòd inueteratus iam habitum contraxit, deinde per se, quia iam in vtero labes contracta est, & in temperamento laborat, & in solutione continui ob vlcusculum quod videtur natum ante octo annos ob partum difficilem, vnde quid membranofum excretum est: deinde morbi & vteri & in vtero sunt difficiles & per se, & quia aliæ partes in eum se exonerant. Accedit quod ex Hipp. vterus sit plenus attractæ humiditatis; tertio à stirpe materna aliquid genitium & insitum est. Morbi, vt hæreditatis ad posteros infausto omine, perueniunt, & per traduces propagantur, Totum corpus cacochymum est, breui futurum cachecticum. Mœror multum confert, nam tædio valetudinis impatibilis, (vt loquitur Plin.) nihil non agit & frustrà, accedit desiderium prolis, & eiusdem habendæ desperatio, vtinam esset aliqua vt hæreditatum ita morborum insitorum felix præscriptio & ius ad alios non deuolueretur tanquam æternæ possessionis vt elephas, sæpè hemicrania, strumæ. Ægra eadem patitur, quæ & virgines fœdo colore deturpat, morbus hic ferax multorum est maiorum egris, & medicis, crux est & tormentum, omnia probant & improbant, vtuntur crebris mutationibus tanquam remediis

Artis præsidia aut eleuantur, aut eluduntur, & vterus irriguus prauo quodam tabo spem tollit sobolis, quæ est prærogatiuum coniugalis amicitia, pignus & vinculum matrimonij, hac collunie semen effectum fit, & indignabundus vterus congressum auersatur, vterus benè constitutus vbi genitalis temporis hora aduenit, conchatum more ad vniones gignendos halituosi roris desiderio tenetur, & oscitatione quadam recipit, vnde Hipp. vterinorum malorum & suffocationum originem repetit ex eo quod vterus aridior orgasmum habet, errabundus sursum, deorsum inclinat penè furibundè, & *τοῦτο ἐν πάδι* id est ad blandum, & genuinum fontem seu hepar fit seu alia pars gratiosi roris, incitatur, cum alieno humore & putri siue alienigene, siue indigeno madescit, id malum & vt signum & vt causa: vt signum, quia, cum sit fastidiosi odoris, corruptionis est index: vt causa, quia perpetuò partem afficit & deterius quàm ante stimulum veneris hebetat, congressus desiderium minuit, spem blandæ proles adimit: partus difficilis prædictus ligamenta laxauit, spem prolapsus vteri attulit & refriget vterus, ob immodicum sanguinis fluxum & eius laudabilis; coagulatus enim, ex firmis fibris cum cæteroquin in decoloribus virginibus, & cachecticis sanguis putris sit elisis fibris serofus. Hipp. ait esse in sanguine *λευκῶν* elisis fibris & *φθορῶν* corruptâ substantiâ.

Hoc in negotio animus in dubio vacillat, si fluor perseverat, magna incommoda sequuntur, si supprimitur, maiora; maxima, si à toto corpore est. Eo suppresso vidimus vterum gangræna affectum, id me mouet quod mulier sit cacochema, terret & Galeni decretum. Totum corpus vtero ferè simile est, quod notandum est in hoc morbo. Qui fluor fit per exonerationem partium male affectarum robore naturæ tandem in colliquatium funebrem terminatur; nam aut cita mors, aut præ tæbe & tabo vita misera consequitur. Probamus diuretica, aut vretica potius, ne error contingat quem obseruat D. Ron deletius de cachectica & pallida virgine, quæ paralytica facta est vsu diureticorum, non prius exactè liberatis obstructionibus: Consilij, & concilij nostri summa hæc est.

Totum corpus vtero simile.

Victus ratio satis exacta esto; euechymis assuescat, ventriculi male affecti, acidis, salis, austeris delectantur: benè affecti dulcibus, ex quibus vera sit nutritio, fræni prauo appetitui sunt iniiciendi, pessimum signum est sitis inexplebilis. Nutritio non sit plena

cap. 31. methodi.

victus.

124 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quia corpus cacochymum, etsi fortè benignitate alimenti prauus succus mitigatur. Sumat alimenta ἀπεριττα quæ parùm habeant excrementi, vt corruptioni via obstruatur.

2.

Habenda ratio totius corporis, & partis totius per medicamenta crebra, & mitia aliò humorem auertentia.

Purgatio.

Vsus frequens foliorum orientalium, Rhabarbari cum syrupo rosarum pallidarum non valdè recenti, syrupo de pomis, ob palpitationem cordis, & diathesin hypochondriacam.

Decoctum sit conueniens additis herbis vulnerariis, radice consolidæ, sanamondæ, fragariæ, yna arthritica, taraxaco, veronica & similibus, æstate folia siue flores tunicis seu coronariæ hortensis his, adde prunellam bipinell. buglam, faniculam, herbam Roberti, equisetum.

Tabellæ.

Tabellæ ex triasantalò triplo, rheo, addito chalybe præparato.

Tabellæ aliæ quales præscribuntur cachecticis & decoloribus virginibus ex cortice citrij condito rasura eboris, cornu cerui, lapidibus preciosis, coralliis, puluere sassafras, puluere vermium terrestrium præparatorum, fœniculo, limatura chalybis præparata.

Pilulæ.

Pilulæ ex aloe nutrita in succo buglossi, rheo, crocomartis, radice pentaphyll. ladano, carabe, addita pauca terebinthina vsta, & dialacca si fortè aureliis præparatur.

Poterit vti parua quantitate terebinthinæ lautæ vel per se, vel cum pauco rheo.

Opiata.

Opiata ex conferuis symphyti, rosarum, florum cichorij, calendulæ, coralliis, elect. diatragac. frigidi cum puluere radicis tunicis.

Si calor acrior cassia iuuat, aliàs senna & syrupus ros. cum agarico.

Conserua rosar. Ribes elect. diaireos, diatragacanth. frigidum.

Forus ad pectinem ex rosa, mastiche, & olibano, fiat suffitus.

Sudorificum.

Decoctum sudorificum non validum addita radice sassafras cum pauca medulla ligni Indici & maiore quantitate sarcaparillæ.

Santala addantur quæ moderatè sudorem proliciunt, corpus non nimis tegendum vt tantum eliciatur sudor, non vi exprimatur.

Initio pastus, secundo vtetur decocto sed imbecillimo cum æstus erit, id non fiat.

Omni ratione excitandus appetitus, à cibo abstinere malum, cacochymj fere sunt inappetentes, & cibos fastidiunt, & suo quasi *Plin. cap. 71.* tabo & malo succo aluntur more venenatorum animalium quæ *l. 10.* fame non intereunt quia illis nec calor, nec sanguis, nec sudor, quæ sale naturali auiditatem augent.

Apozemata ex diureticis non valde calfacientibus viis expe- *Apozemata.* ditis per catharsin ne fiat ad habitum crudorum traductio paralyseos minax, & author; adde taraxacum, capillares herbas radicem bardanæ, rubiæ, & cætera.

Aliàs vtetur aliis apozematis additis radicibus & herbis vulnerariis & rosa transmarina, pyrotica duo ad latera spinæ inter lumbos & os sacrum, vbi ferè desinunt ligamenta vteri.

Phlebotomia parca manu, sed frequens si impurior reddatur *Vene sectio.* sanguis.

Blandi Fetus ad imum ventrem ex corroborantibus non mul- *Fetus.* tum calfaciendo.

Emplastrum ad lumbos roborans ex mastiche, rosis, vnguento comitissæ, bolo addito, & terebinthina.

Aqua rhabarbari ex decocto vulnerario conferet. Iniectiones in vterum ex radice tormentillæ, consolidæ, bistortæ, fragariæ, polygono, veronica, bellide, & aliquot aliis similibus cum syrupo de ficcis.

Aliquando pro iniectione fiet hydromeli ex aqua, melle rosato, *Iniectiones.* hordeo, si acrius id sentiatur mitigetur.

Balnea Borbonensia circà autumnum & immersione corporis *Balnea.* & haustu ad vncias quatuor.

Magis placent aquæ vulgo dictæ, Forgenses, propè Rhotomagum.

Si non vacet & placeat iis vti, fiat balneum domi, additis astringentibus & alumine præsertim recipiat fumum ex puluere conueniente per infundibulum.

Clysteres apprimè conferent.

Pessaria non acria ad robur vteri detergendo & siccando.

Hæc decreta consulis D. M. I. Altino, I. Martino, Seguyno, Doctoribus medicis, & I. Guillemeau Chirurgo Parisiensi & Regio, & à me in ordinem redacta.

ANNOTATIONES.

1. *Uterus Hipp. dicitur plenus attractæ humiditatis tamen apud Galen. quæ lac prouocant, minùs calida esse debent quia (ait) mammae attrahunt, quæ menses cient calidiora sunt, quia uterus non attrahit, ait Galenus.*

Hinc prouer. A lasorixam 2. *Plinius cap. 24. lib. 22. in la situdine & siti homo ad iram est pro-*
quæri. Item nior, sed hæc animæ asperitas dulciore cibo mitigatur, ira, luctus, tri-
illud Plauti, stitia, animi impetus cibo mollitur. In eadem sententia est etiam Se-
fumes & mo- neca lib. 2. de ira, senes difficiles, & queruli sunt, ut ægri & conualef-
ra bilem in centes, & quorum aut la situdine aut detractio sanguinis exhau-
nares con- stus est calor, in eadem causa sunt siti famèque rabidi & quibus
ciunt. exangue corpus est, malignèque alitur & deficit.

CONSILIVM XXXVI.

De sputo cruento, pro Thesaurario.

*Ad D. D. Andream Laurentium Archiatrum
Henrici IV. Gallie et Nauarra Regis.*

A Gebatur de cruento sputo in Thesaurario; hic hypochondria-
 cus, melancholicus & cacochymus laborabat, quo tempore
 maligni morbi vagabantur, & qui fauces & thoracem inuade-
 bant; hinc ambigui eramus, an ista excretio esset verenda; si mos
 morborum vagantium cernitur metus est, si temperamentum
 cernitur, minor metus esse debet. Hippocrates inclinationes &
 motus sursum, sanguinis etiam ad partes thoracicas minùs formi-
 dables in melancholicis esse ait, leui de causa sanguinem excer-
 nunt ob naturam flatulentam: flatuosi fiunt hæmoptoici exiguo
 incommodo pterygo-dees fiunt hæmoptoici, quia flatuosi. Item
 excretio per superiora etiam à liene per ventriculum supplet vi-
 ces hæmorrhoidum, præcedunt dolores ad hypochondria, tale ge-
 nus excretionis: & reuerà talis æger breui feliciter est libera-

*Gal. de uxore
Pölini.*

tus, & bona de eius salute concepta spes nos non fefellit.

Sed desiderasti D. Archiater locum illum Hipp. de securitate excretionis sanguinis per os in atrabilaris, qui leuaret metum quadam tenus ægrotantis de reiecto per os sanguine, miratusque es esse apud Hippocratem. Indicas tuum genium, mores ciuiles, & discendi aculeum, qui summæ in te doctrinæ est index, Socratem quippe agis & exscribis qui scientissimus parùm se scire prædica-
bat, & dum se ad discendum pauperem credidit, ad docendum se locupletem fecit, profiteri enim se discere volentem est lumen ad consummatam rerum cognitionem. Ignari nulla de re dubitant, soli sapiunt, philautia eos transuersos agit, in alienis æstimandis sunt ambitiosè tristes aut eleuant aliena aut cachinnantur. Tu aliter facis, id quod tuum animum ciuilem candidum & rotundum declarat. item sunt alij qui nolunt docere quod sciunt, & tanquam arcanum putant & neminem docere, & communicare id *Plin.* quod sciunt in auctoritatem scientiæ esse putant, quod culpâ non vacat. indico locum Hippocratis, desiderium tuum (C. Archiater) lenio, me, mea que quantula sunt voueo, & dico.

ANNOTATIO.

I. *Soli homini contingit profluuium sanguinis è naribus, aliàs id terrificum, & aut vetus vitium capitis, aut sanguinis, aut hepatis latentem labem significat, ut contigit D. Michelo; huic hepar in vitio erat & nostro iudicio erat corruptum, totum corpus auruginosum, familiaris erat illi hæmorrhagia, ut prædixeramus obiit in Deo, tamen Plinius mentionem facit Volusini præfecti, cui omnibus annis per os fluxit sanguis & attigit annum 90.*

CONSILIVM XXXVII.

De ulcere Renis.

Nobilis mulier habet antiquum vlcus in rene, cacochymia quam secuta est soboles deterior, cachexia, & leucophlegmatia hydropis prænuntia, ni Deus auerterit.

118 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Videtur morbus semper in eodem statu, nec progreditur nec retrograditur. At (ait Hipp.) tranquillitas morbi diuturnitatem significat non fit vlla ἐφοδός.

*ἀταραξία in
morbis lon-
gitudinem si-
gnificat.
Phlebotomia.*

Si calor insignis ad renem dolentem, valet venæ sectio parca manu.

Aqua alba ex amygdalis, hordeata cum saccharo cando & rosato, aut buglossato, aut violato.

Conserua rosarum rubra & alba, decoctum blandum scynæ cum vulnerariis.

Purgatio.

Aqua Rhabarb. cum santalis & veronica, radice pentaphyl. consolidæ & caryophyllatæ. Item quæ sequuntur valent.

*D. Andreas
Laurentius
Archiatr
hoc addidit*

℞. Terebinthinæ vstæ 3 ij. s. corallij rubri terræ sigillatæ añ. 3 j. pulueris sæpiæ, & baccarum hederæ añ. 3 s. carabes 9 ij. excipe omnia terebinthina Veneta & balsamo Peruncanio, fiat massa, formentur, pro 3 j. tres pilulæ cap. 3 s. tertio quoque die.

*Decoctum su-
dorificum.*

℞. Radicis scynæ 3 s. sagrim. veronicæ fœminæ bipinel ana m. j. coque in lib. iij. aquæ ad consumptionem quartæ partis cap. 3 vii j. per 30. dies, manè.

℞. Succi milefolij, rubi summitatum quercus añ. 3 iij. succi betonice 3 ij. s. pulueris alabastris certam quantitatem, infunde alabastrum in olei rosati omphacini lib. s. per horas xx. cum succis supra dictis & cera, fiat vnguentum pro renibus.

Vtatur post pascha decocto primulæ veris, buglæ, faniculæ, bellidis, bipinel. Robertianæ, symphyti, addito melle rosato saccharo rosato aut cando.

Phlebotomia parca sed frequens, vt in abscessibus internis conuenit.

Liens.

Litus ex seuo aut medulla cerui in aqua vitæ lautis pro tumen-
tibus partibus.

Fetus.

Fetus partium, modò harum, modò illarum, cum herbis non multum calfacientibus, coctis in aqua & vino albo, addatur parum aluminis.

Sacculi ex furfure, auena, cicere rubro, milio, sale, salvia, chamædry, chamæp. rosis, radice gentianæ, consolidæ, & iridis florentinæ, baccis lauri & iuniperi: adde semen seseleos, lupinum, fœniculum, limaturam Guaiaci, lac asinæ, si non profit absteineatur.

Tabellæ.

Tabellæ diaireos, diatrag. frigidi Elect. Tabellæ Elect. triasantalium cum Rhabarb. addito croco martis, redeat ad aquas naturales si malum contra remedia nostra rebellarit vt superius & superbius.

Exacta

Exacta vitæ lex non est necessaria, tamen prudens & certa prodest, quia laborant renes, & est abscessus aliqua vietus lege frænandus.

CONSILIVM XXXVIII.

De abscessu renis et uteri prolapsu.

Abscessu, renis laborabat, D. Bourgeois, comes erat ilias multorum symptomaton: dolenda fuit *ἡ πύελος* tam seuorum malorum exiguum spem salutis adferens, extenuabatur malum, eludebatur, non domabatur, licet collata fuerint consilia, vix spes aliqua restat, terret vlcus renum, hinc œconomię naturalis confusio. Renibus magnus est consensus cum ore ventriculi. Hinc illę lacrymę, erat cachectica, cachexia magis terret quàm caco-chymia. Hęc illam parturit: partibus contracta, labes *ἐν τῇ ἐξεί* obferum putre & paupertatem caloris naturalis *φύσιν* & tumor partium terrificus est, & hydropis minax, consolatur tantillum, quod sit fugax & non constitit, est (vt ait Hippo.) aliqua *ἀναπνοή* aut *διαπνοή*, idest nōnulla meatuum libertas, alioqui humor resideret hydropem adferens incluso spiritu, quod exemplo vasis liquore pleni patet, quem spiritus intercludit, & licet vas inclines ore prono & sit singultus, non effluit, sic Hipp. philosophatur.

Summa hęc consilij, purgetur blande. A scammoniatis abstinenceatur, syrupus rosa. cum agarico valet. aut 3j. mechoacan in vino infundatur aut seminis ebuli tantundem, ad vterum prolapsum irriguum ichore pessulus confert ex subere, cera, puluere antheræ aut rosarum nuce cupressi ligno rhodio.

Adstringens emplastrum ad lumbos, modò non impediatur cursum mensium.

Forus partium tumidarum ex roborantibus calorem naturalem, chalasticis discutientibus, cataplasmata ex farinis, hordei lentium coctis in oxymelite communi & pauco scyllitico.

Litus ex oleo iuino, vulpino puluere ireos, addito aut vino albo aut aqua vitæ.

Differatur vsus aquarum naturalium donec aëris incommoda

R

Causa.

Purgatio.

Emplastrum.

Forus.

Cataplasma.

Litus.

130 CONSILIORVM MEDICINALIVM

& contumeliæ mitescant, & spes sit earum transitus per ambages, & volumina corporis, Balnea naturalia calidiora conferent, leucophlegmatix, de pyrotico sumus anxij quid consulamus, nisi calor naturalis sit, vegetus, verenda est gangræna, quæ in pari affectu sæpè contingit, dissuadet id maximè longitudo morbi, vnde per traducem tanta malorum propagatio differatur, donec lares patrios reuiserit, puluis digestius aut aromaticum rosatum valet, essentia anisi aut caryophilorum suspectior est.

CONSILIVM XXXIX.

De hepatis intemperie.

IN nobili viro D. Damours duo maximè considerantur, temperamentum calidum siccum valdè biliosum multorum vber incommodorum & ferax, item civilis & politica vita, homo suæ spontis, vni tantum Rouæo alteri Meccænati addictus, homo alioqui nullis obligatus legibus, modo militiae, modo ruri, sed Celsus loquitur de homine sano, & qui suo arbitrio sanitatem suam regere potest, sic intemperies hepatis à parentibus contracta, iure hereditatis hausta ac expressa, si non tollenda, attemperanda, modificanda, corrigenda modico contrariorum vsu, vt tamen cum hominibus æger, vir politicus viuat, & se à consortio hominum ciuili non seducat ac retrahat.

Celsus lib. 1.

Comm. in aphor. 1. 2.

1.

Cap. 1. l. 23. & 2. l. 14.

2.

Galenus in præfatione in librum de ægmatis Hipp. & Plat.

Vtatur vino præsumpto cibo aut iusculo præhausto alioqui vinum nocet ex Galeno; vitet motus animi celeres, cursum citatis & elocatis equis, valet pomacium, syrupus de pomis & violatus, iuleb. rosat. æstate balneum, phlebotomia, serum lactis cum cichorio sylvestri, cassia cum iusculo vitulinæ carnis, tinctura rosarum, lac asininum, temperamentum hoc minatur mille incommoda, imo Rondeletius notat biliosos ad phthisin propensos, dubito an hic locus Galeni sit verus sanguis alit, calfacit, sanitatem, bonumque colorem efficit, bilis flaua continet corpus, non permittit latentes meatus dissolui, incitat & acuit sensum, coctioni prodest, ductus excrementorum apertos & faciles facit, atrabilis est velut sedes & fundamentum reliquis humoribus pituita neruis, membranis, articulis & linguæ ad motus facilitatem prodest.

ANNOTATIONES.

1. Et Plin. cap. 38. lib. 16. loquens de plantis, ait, nec omnibus adeps caroque larga, sicut nec animalium acerrimis, at biliosi aores sunt.

2. Hac arte parari solet tinctura rosarum in libris 4. aquæ tepidæ maceratur 3j. rosar. rubrarum exsiccat. quibus additur uncia una aut altera succi limonum, aut ut chymicis placet 3j. aut 3i. spiritus aciduli vitrioli aut sulphuris, post quatuor horas aqua colore rosarum tincta filtratur saccharoque dulcoratur. Confert mirifice calidæ intemperiei hepatis & febribus. Ex floribus violarum bugloss. borrag. &c. eadem viâ, variæ ad varios affectus tincturæ educi possunt.

CONSILIVM XL.

De affectibus hysteriis, & hypochondriacis.

Multa symptomata sunt observata in D. Battefou, scotodinos, vertigines, flatus in cerebro ἐκλύσεις, crurum dolores, murmura in ventre, huic olim quasi congenita fuit hemicrania, cui cephalalgia successit, multa pathemata hysterica hypochondriaca, nunquam conquerendi finis consideranda causæ fontis & affectus mali diurnitas.

Habitus corporis plenior, longa viduitas cum ferax esset & proli studuisset, dedissetque operam & operata fuisset, actiones animi inquietæ, irasci celeris, sensus exquisitus, ex utero proluuiës quædam. Quæstio unde tanta malorum ilia. Certum est quod morbi mulierum & virorum longè differunt & mulieres hypochondriacæ & melancholicæ κατὰ φύσιν πικρὰ, deterioris sunt conditionis, quàm viri. Errant medici curantes morbos viriles ut mulieres, mulierum genus veretur suos morbos detegere præ incitiis & pudore, initia & progressus ignorantur, hinc morbi obstinati & versipelles, quod ad cephalæam attinet, ob sensum partis exquisitum, ea sæpè oritur & quia depuratiùs & exactius sit cerebrum.

1. de morbis mulierum.

R ij

Hipp. l. de M.
sacro, ait se-
tus cerebrum
aut supra, aut
infra modum
repurgari
hincque sen-
sus acutem
oriri. Inter-
dum autem
potius in ta-
mentis. Hipp.
l. de aff. part.

Sub finem lib. de Septimestri partu ad quadragenarium num-
rum hunc aut illum refertur causa cur quidam pueri sint imbecil-
lo capite & cerebro, locus notandus: bona habitudo & *εὐεξία*: ta-
men Hipp. damnasse videtur, quia ad *εὐεξία* sequitur ardoris in-
flammatiō: cum quid tale anima patitur, ad insaniam adigitur &
cerebrum patitur, hīc contra commune iudicium *εὐεξία* vitupe-
ratur alio loco laudatur.

Vnde potest quaestio moueri plurimum vtilitatis allatura, an
sensus exquisitior retundendus, an minuenda bona habitudo, vt
ne quid medicus ex prauiudicio peccet.

Multa sunt à Medicis instituta de quibus disputari potest, sed
boni sunt consulenda aliorum iudicia. Consilium nostrum & col-
legarum D. Martini, Seguyi & Altini est eiusmodi.

Omnia quae calidiora & caput feriunt vitanda.

Fotus blandi non calfacientes ad hypochondria, ob flatūs. Pur-
gationes blandae, actiones animi frangendae & moderandae, sanguis
temperandus, minuendus aliquando, abstinendum à graueolenti-
bus ad nares ad moueri solitis, Balnea amotis calidioribus, & ca-
put replentibus, conseruae cephalicae, vtero & hypochondriis con-
sulendum, Suffus ad vterum. Pessuli, Arteriotomia in acerbitate
doloris capitis. Si vtatur aquis medicatis, à valde sulphureis absti-
near. Cultus vteri nouo coniugio eoque lato, & grato tanquam
naturae agri & fundi omnibus remediis praefendus.

Quae sequuntur remediorum formulae à medico Paracelsico
praescriptae fuerunt.

Hydromeli.

℞. Radicis scynae ℥j. f. visci querni, radicis acetosae, taraxaci añ.
℥j. corticis frax. ligni rhodij, rasurae eboris añ. ℥f. vuarum corin-
thiar. ℥iiij. malaxentur in libris 4. hydromelitis per horas 24.
coque ad medias, sub finem adde flores bugloss. borag. calendulae,
cola per manicam, aromatiza cinnamomo cap. ℥iiij. pro dosi, manē
horā 7. vel vtatur syrupo de pomis, vel violato addito succo li-
monum.

Syrupus.

℞. Aquarum bugloss. fumariae, endiuiae, pomorum redolent. añ.
lib. j. in his macera per tres dies ad ignem lentum, Balnei Mariae
foliorum sennae ℥iiij. agar. troch. ʒvj. epith. santali citrini cinnamo.
añ. ʒf. fortiter exprime, per torcular. in expressione denuo adde
eorundem folliculorum ℥j. f. conseruae florum viol. bugloss. cicho-
rij, & per tres dies ad eundem ignem macera, exprime, coque &
cum ouorum albuminibus clarificetur. huic expressioni clarae ad-

de succi pomorum redolent. & violarum añ. ʒ. iij. cum sacch. suffici-
cienti denuo coque adde sub finem coctionis rhab. ʒ. f. prius ma-
cerati in aqua cichorij, fiet syrupus, dosis ad ʒ. ij. vsus sit bis
mense.

ʒ. Radicis cich. acetos. oxylapat. taraxa. añ. ʒ. j. polypo. & visci *Opiata.*
querni. añ. ʒ. vj. sem. cardui citrij ruræ añ. ʒ. f. 4. semin. frigidor.
maior. añ. ʒ. iij. fumar. agrimo. meliss. capill. veneris añ. m. j. florum
calendul. genistæ. lilij. tilia arboris añ. xj. florum. borrag. bugloss.
añ. xij. coque in æquis partibus seri lactis & aquæ pomorum in
lib. i. f. colaturæ claræ adde foliorum orient. ʒ. ij. f. macerentur per
duos dies ad ignem balnei colentur exprimantur, adde succi vio-
larum ʒ. iij. manna ʒ. vj coque in syrupo ad mellis consistentiam
in qua adde extra ignem cassia & thamarin. añ. ʒ. iij. pulueris sen-
næ ʒ. vj. Rhab. ʒ. f. puluer. diatrag. ʒ. iij. anisi & cinnamomi añ. ʒ. f.
fiat opiata capiat ʒ. f. vel ʒ. vj. pro dosi, in qua addes fœculæ Bryonia
ʒ. j. si affectio hysterica diu exet.

ʒ. Pulueris triasant. coral. præparati, Margar. præparat. vnicor- *Tabella.*
nis, spodij, ossis e corde cerui añ. ʒ. j. salis crami & croci chalybis sine
aceto & sine igne parati añ. ʒ. iij. confectio de hyacintho ʒ. ij.
sacchari rosar. in aqua bugloss. & melissæ dissol. quod suff. fiat elect.
per tabell. ponderis ʒ. j. capiat manè.

ʒ. Crustarum panis albi in vino granat. infusarum & exsiccat.
ʒ. j. conseruæ ros. sicca ʒ. f. fœniculi & anisi añ. ʒ. ij. corallij præparati,
margar. añ. ʒ. j. f. maltich. ʒ. ij. cinna. ʒ. j. sacchari rosati dupl. vtatur
ex cochleari.

Forus facti ad hepar, & mesenterium ex corticibus cappar. frax. *Fotus.*
filicis cichorij valerianæ, tarax. ligno rhodio, santalis, agrimo. lin-
gua ceruina, hepar. polytrich. matricar. arthemis. meliss. absinth.
semine lini, cyton. cocta omnia, in aqua fabrorum, addendo aceti
rosa. & scyllitici añ. lib. f. item.

ʒ. Seminis papaueris albi, hyosch. lactu. portula. psyllij añ. ʒ. iij. *Enema.*
florum sambuci, chamæ. nenuph. añ. p. j. coque in lacte dissol.
vitellum oui, croci ʒ. j. castor. ʒ. f. fiat enema iniiciend. horâ
somni.

Loti pedes papauer. lactuæ nenuph. viol. chamæm. sambuci,
anethi decocto.

ʒ. Aquæ ros. bugloss. nenuph. meliss. añ. ʒ. iij. diamarg. frigid. *Epithema.*
ʒ. ij. diamoschi. ʒ. j. f. vini albi. ʒ. ij. aceti rosar. ʒ. i. f. pulueris feminis

R iii

134 CONSILIORVM MEDICINALIVM

papa. ̄iiii. theriacēs recent ̄i. f. croci, camph. añ. ̄i. fiat epith. pro fronte, & temporibus hora somni.

In paroxysmo vertiginoso, etiamsi lapsa fuerit agra, hæc aqua antiscodotina vsui erit.

24. Corticis citrii flauī exiccati ̄ii. visci querni, ̄i. f. foliorum betonicæ, melissæ añ. m. f. florum calendulæ, lilij conuallium viol. buglossi, añ. p. ij. seminis cardui citrii, tunicis acetosæ añ. ̄j. theriacēs ̄ij. confectiois de hyacintho ̄j. diamarg. frigid. diacoralli añ. ̄ij. vini albi generosi lib. j. f. aquarum florum tilia arboris, cerasor. nigrorum, pomorum lib. ij. ponantur in alambico digerantur per quatuor dies in balneo mariæ, fiat distillatio ad vsū dictum.

CONSILIVM XLI.

De dolore brachij.

Nobilis domina de Monglat ab aliquot mēsis brachij doloribus laborans, quærit à nobis vt dolorem malumque leniamus: varia huic dolori demulcendo vsurpata fuere remedia, sed frustra, dolores brachiorum sunt rebelles, vt plurimum & sæpè aut ignorantia aut præproprio sanitatis desiderio peccatur, dum initio ea vsurpantur quæ sub finem progressu morbo adhibenda sunt.

Phlebotomia omīssa est, fiat in parte opposita deinde in agra. A nimis calfacientibus & liquantibus abstinetur.

Purgatio ex blandis pilulis sine quibus cum agarico addito Rhab. & ligno aloes.

Syrupus ros. cum agarico valet, temperetur syrupo viol. aut de pomis, aut de cichorio composito.

Ad dolores nocturnos, aut hordeatum cum semine papaueris, aut pilulæ è cynoglossō.

Panes fiant oblongi applicandi brachio.

Decoctum herbarum coctarum cum aqua & vino, applicentur facculi expressi arcula supraposita.

Rebellante morbo blādum decoctum sudorificum. Sanguisuga.

Balsamum quale præscriptum alibi, ceronea cataplasma ex farinis, oleum de catellis.

Miraculo posuit litus ex aqua vitæ cum theriaca veteri.

CONSILIVM XLII.

De Hepatis, & partium aluinarum phlogosi.

DOlores colici præcesserunt, sed inflammationis notæ erant in visceribus, maximè in hepate, æstus erat ex pugna humoris biliosi, aut flatu, aut humoris crudi, tandem tumor in ventre infra iecur apparuit, rotundus blando manns contactu irritatus: suspicio fuit aut tumoris glandularum mesenterii, aut dextri vterorum cornu.

Blandis fotibus vsi sumus quinquies sanguinem detraximus, ob phlogosin, dilutum cassiæ dedimus vt ardorem intestinorum temperaremus, visum est dare medicamentum non celer actione, vt sensim demoliretur tumorem, nam hyragogon non prodest, syrupus magistralis ex senna rheo, cum herbis vulnerariis & radicibus detergentibus, vsus pilularum de hiera addito gummi ammoniaco & bdellio, agarico, dissolue gummi in oxymelite & aceto scyllitico illine oleo de capparibus, mucagine seminis lini, addito vnguento dialthæas aut de mucaginibus.

CONSILIVM XLIII.

De Epilepticiis conuulsionibus & rudimentis apoplexia.

Ad Rempublicam Venetam de legati morbo missum.

Nobilis Legatus inclyræ Venetiæ pauld' ante idus Ianuarii, morbo fuit affectus & lecto afflictus, principium fuit apo-

Plin. sic lo-
quitur.

2.

3.

4.

plexia, marcor animi, vocis priuatio, item sensus & motus, paulò post partim vi naturæ irritata partim humoris efferi aliquid fuit conuulsium. Malum quisquies repetiuit, causæ visæ sunt dominatus humoris efferi nempe bilis à qua vapor summissus cerebrum tentauit, index curatio. Multa bile euacuata ad se rediit, morbus extenuatus, causa alia malum quoddam serum quod nunc in corporibus dominatur, quia hyems suam apud nos non habuit temperiem, accessit ipsius subiecti dispositio. D. Legatus habet cerebrum exquisiti sensus, id effecerunt labores, & curæ iuges, in-tempesta, imbecillo est stomacho, cuiusmodi est magna pars vrbanorum & cupidorum literarum, & eorum, qui se magnis implicant negotiis, curiose & sedulò cum sanitatis iactura, curat negotia & dignitatem clarissimæ Reip. Venetæ, pertinax animi labor vires conuellit, ego primus medicus vocatus, bis sanguinem detraxi; quod in capite insignis ardor sentiretur ad plexum retiformem, adiutus vires & corpus resumpsit erat enim corporis quassatio quadam, initio aliquid funebre ominabamur, sed Dei, opt. max. manus adiutrix & sospitalis medicis, coadiuuantibus malum omen auertit, dubitandi occasio fuit grauitas morborum cerebri, medicorum sæpè operam eludens ob partis dignitatem, in cerebro est æqualis inæqualitas. Arteriarum & spirituum tenuitas & calor substantia glutinosa, alioqui ob iuges actiones marcesceret, in quo solertia naturæ relucet. Quæ res nos consules medicos ad duo impulerunt: Prius vt adhiberemus remedia quæ ad morbum profligandum valerent, & præcauendum anteuertendum que similem, quod Deus auertat. Posterius vt actiones animi temperet, Vix parem animum esse posse putamus tam perplexo Legati oneri & negotio. Frustra autem alicuius rei foret prædictio nisi cautio adhiberetur,

ANNOTATIONES.

1. Dominus Legatus voluisset se liberare ea legationis cura, sed id sperare non audebat ne iugam excutere videretur, voluit se magis morbo quam oratione excusare vt loquitur de Sulpitio Tullius Philippica 9. Qui Sulpitius obiens legationem mortuus est locus quadrat D. Legato.

Nunquam epilepticum quid passus erat cum bile abundaret & pruritum præsensisset, abstinenter cibis fuisse, animum laboribus fatigasset,

gasset, est redditus aphonos, vomitiones pravae bilis, ac si febrilis paroxysmus fuisset, incredibilis ardoris & caloris sensus in toto capite, linguam momordit, ferè truncavit, rediit malum die quinquies. Restitutus misso sanguine educta bile deorsum. Quæritur qua ratione malum prævertatur, ne quid tale contingat, natus est annos 40. aut eò circa, sicco est capite, & nil penè mungit ut pueris congener est morbus, ita circa annos 40. aut 42. vi anni climacterici malum id adori tur nunquam quid tale expertos.

H'pp. lib. 2.
proph. & li-
bris de dieta.

Pilo est ruffo. & bilis dominatus significatur, mirum quod Plinius notat de cervis, hi bilis dominatum ex pilo designant, & tamen ca- rent febribus, & vitant febres qui cervinà carne utuntur. Aiunt ceruum esse animal timidum & calorem acrem non habere nec hu- mores.

In ægro dominatus, & vis humorum observatur, sensus acuties: à qua parte convulsionis occasio, videtur Hippocrates tanti facere di- gnotionem loci ex quo epilepsia dependeat, ut quasi satius sit à capi- te, aut à pede, aut à manu esse quàm planè ignorari, sed id per compa- rationem dictum est, cognitio originis mali, prudentiores, & cautiores reddit.

Æger habet cerebrum minus repurgatum, unde aut sternutamenti, aut vertiginis, aut sacri morbi occasio, unde qui trochiscis de tyro seu vipera utuntur, fiant vertiginosi cerebro nimis repurgato.

Quidam in eo casu ad cephalalgiam ob exquisitum sensum dant, narcotica. Non ferenda inedia, & si quidam medici inedia perinaci dicant aculeos bilis retundi omnes, ego vero contra, nam efferatur bi- lis, corpus repurgandum non validis medicamentis, benè consuletur usu pilulæ aloë cum pulvere triasantali, Enemata frequentia erunt ex usu.

Bilis benigna
& mansueta
inediæ bene-
ficio effera &
immitis red-
ditur.

Amuleta valent & alexipharmaca, pulvis cranij humani.

Feratur in annulo ungula alces quæ carnem digiti contingat, ra- dix ononidis valet cum oxymelite.

Mediocris labor & animi & corporis, qui humores crudos & ἀπὲρ τῆς reddit.

3. Morbus sacer a bile non fit sed à pituita Galen. Non à quavis fit pituita sternutamentum, sed aut flatulenta, aut acri, ideò Plato, ait, pituitam non esse causam doloris nisi per pompholigas. i. bullas fla- tuosas, bilis sensum acuit, & alimentum reſeratis viis distribuit, ideò videndum, ut temperetur, & ut cystis fellis suam faciat officium, nam cum diligenter repurgatur ab hepate fel, hepar mitius & dul-

3.
H'pp. de mor-
bo sacro.

Lib. 5. que-
stionum que-
stione 9. defici-
ficus fructus
dulcis lignum
& folia ama-
rissi.

cus redditur, quò pertinet notandus locus apud Plutarch. cur ficus fructus ita sit dulcis cum folia & lignum ipsius arboris amarissima sint, similitudinem de felle & hepate affert author.

4. Ad actiones animi & corporis moderandas pertinebit locus ex Plutarcho; simile affert de curru, quem duo coniuges equi trahunt nisi pari nisu & labore trahant, & si vnus alterum excedat, inanis est labor: idem de corpore & animo. Actiones & conatus concordēs & similes esse oportet, vt in negotiis tractandis sint pares animi vires & corporis, nam nimia animi actio corpus debilitat, & corporis labor inmodicus animo officit.

4. Corporis & animi labor quodammodo similis esse debet.

CONSILIVM XLIV.

De latente pulmonis & hepatis intemperie & aliis affectibus.

I.

Causa.

IN nobili iuvene annos 30. nato perdita valetudine (vt ait Tullius) latens est labes hepatis & pulmonis, nonnulla spirandi difficultas, sputum mali moris, faucium & gutturis calor, squalor & siccitas, quam his temporibus quibus populares morbi vagantur, malum signum deprehendimus, & minax affectionis, pulmonum, imo tabis & febris hecticæ *καὶ δὲ πυρετῶν*.

Accedit quòd aeger ob labem veneream aliquando vnctus fuerit. At quicumque (aut certè maiors pars) hydrargyrosin passi sunt. In iis ferè labes in pulmonibus delitescit, cur id fiat, aliorum sit iudicium: labem aut pulmonis aut hepatis pallor in facie designat, de tertio articulo id vnum annotabo. Ad venereum satis promptus, non est nec fatuus nec insulsus arripit, semen habet, at in congressu non totum emittit ac eiacularur, sed circum prostates & parastatas haeret ac ignauum manet, id quod aut languorem partium naturalium, aut hebetudinem aut quasi viarum obstructionem à collapsu partium significat.

Hydrargy-
ris ferè sem-
per pulmonibus labem
inurit, δεινὸν
ταὶ δὲ πυρετῶν
καὶ δὲ πυρετῶν.

Vitus.

A calidioribus alimentis abstinendum. Ardoris faucium maximè ratio habenda. In decocto carniū & volucrum addatur hordeum mundatum: imò hordeata in iure carniū parata con-

ferent, Amygdala apparanda in eum finem; lauentur aqua rolarum, aut nenupharis, fumantur, aut mane, aut hora somni, vinum diluatur vel ptisana, nisi sit ingrata, vel aqua, non apponantur linthea calida gutturi, phlebotomia parca manu.

Pro affectu pulmonis valet pectorale decoctum addita radice consolidæ, pedisati, pilosella, scabiosa; infundatur & coletur cassia addito saccharo cando, decoctum ficuum & passularum, pectus lini cum butyro loto in aqua rosacea, saccharum violaceum, syrupi solemnes, pilulæ albæ, A succo glycyrr. nigro abstinendum, delingendum mel, aut solum, aut cum butyro recenti. *Purgatio.*

Pro hepate decoctum agrim. hepaticæ, intyborum, adianti cum folliculis rhab. syrupo de cichorio composito, & de limonibus.

24. Diatrag. frigidi tabellati 3 i. f. pilularum albarum 3 ij. 9 iiij. glycy. 3 i. f. conferuæ vngul. caball. & rosarum. añ. 3 f. sacchari candi, corticis citrij conditi añ. 3 f. cum saccharo in aqua rosarum soluto, fiant tabellæ vsuales. *Tabellæ.*

24. Amygd. dulcium in aqua rosarum maceratarum & excorticatarum 3 ij. pinearum pistaciarum añ. 3 vj. pulpæ passularum, lautarum in aqua rosacea, pulpæ dactylorum añ. 3 vi. medullæ seminum frigid. maiorum, & bombacis añ. 3 j. gummi tragacanthi, pulpæ caponis 3 iiij. coxarum ranarum 3 i. amyli. 3 i. f. cum saccharo sufficienti fiant marcipanes igni lento, capiat & in pastu & extrâ, addi potest pulpa carnis testudinum. *Marcy seu musti panes.*

Fiat saccharum rosatum in rupe pineis confixum, si marcescat æger, significabit, & parabitur resumptiuus ex testudinibus syrupus.

Perseueret in vsu lactis asinini.

Pro latente vitio in partibus naturalibus, parabitur balsamum pro litu earum partium.

24. Rosarum, saluix, chamæp. veronica, pilosellæ, scordij añ. m. j. cyper. 3 i. f. fatalorum, ligni rhodii añ. 3 iii. seminis ocymy pœonic añ. 3 ii. macerentur in vino albo vulgari & frontigniaco cum aqua scabiosæ, & pauca aqua imperiali, deinde bulliant sensim in fictili nouo donec tabuerint. Adde medullæ cerui 3 i. f. ol. irini 3 ii. ol. de spica. 3 i. gummi elemi, & terebinth. añ. 3 i. bulliant ad consumptionem aliquam succorum & aquarum. fiat expressio pro balsamo. *Balsamum.*

Aliquando, ob serum putre quod in pulmonibus colligitur, vtendum erit blando & tenui scynæ decocto.

140 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Vtatur syrupo suo pectorali parato ex succis vngulæ caball, bipinella, pedis cati, bugloss, cum saccharo cando & rosato.

Litus.

Pro thorace litus ex rosato Mesuari; veteres interdunt frequentiori vsu remollientium & pinguium, ne pulmo mollior fiat, & si qua sit putredo, ne augeatur, præsertim si sputum sit putre ac purulentum.

2.

Non erit alienum uti blando & moderato balneo ad difflationem corporis, vitetur colliquatio vsu aut diuturniori, aut si e puentiori, aut calidiore.

Syrupus violatus hodiernus recens miri est profectus.

ANNOTATIONES.

1. Pro isto ægroto valet locus Hipp. 2. Epid. sect. 1. color qui multum est pallidus & ex candido pallet, quoniam hoc omne ab hepate est.

2. Hippocr. 1. de morb. sputum semiputrefactum non absolute coctum & mitificatum ἡμισυμεν vocat. Et excretionem hanc è pulmone semiputrefactam ἐκτεθυλησμένην effeminatam, diuisam & nil compacti habentem: abominetur autem illud sputum, vocatque μωσάτρεα: το σάλον, quod aut malitiam & malignitatem sputi denotat, & rei quæ extunditur: tale autem redditur, ob continuum & nimium vsu rerum emollientium, intus seu foris vsurpatarum.

CONSILIVM XLV.

De Ischiade.

1.

A Longo tempore ischias molesta fuit rudimenta arthritica, rheumatismus minatur, & pedum tumor, cachexia, imo stupor brachiorum & metus tandem paralyseos cuiusdam.

Consultus est vsus tabellarum diacarthami aut electuarij de citro, aut syrupus ante præscriptus cum granis burgæ, spinæ, aut dosis conueniens ex fenna, rheo & syrupo rosarum pallidarum cum radice eryngij, sanamondæ. Phlebotomia facis frequens sed mediocris, cauteria in occipite, ad partes tumentes, id quod sequitur.

24. Axungia porci, medullæ cerui añ. ꝑ. iij. butyri loti in vino albo, aut aqua vitæ lib. f. pulueris ireos, ꝑ. j. f. terebint. ꝑ. j. castorei ꝑ. ij. fiat linimentum, Balsamum potest parari, ad spinam dorsi, fortus sicci ex herbis. Cataplasmata vt antè cum farinis coctis in hydromelite hyssopato, scylla additâ, gentianâ, sapâ, cypero.

Sudorifica per dies quindecim vsurpanda emplastra de baccis lauri.

Balnea plumbaria, dialacca, diacucurma, trochisci halicacabi, mechoacani, tabellæ aromatici rosati, cauterium in occipite, si ischias perseueret cauterium infra os sacrum ad musculum natium.

Cataplasmata ad ischios euocantia ex gummi item emplastr. ex sulphure, picenigra, diachylo ireato, terebinth. oleo irino, sulph. aut empl. de baccis lauri. ad fract. ossium, ceroneum, gratia Dei cum tereb.

Inter cetera laudantur pilulæ stomachicæ, & vehementiores euocantes à capite.

ANNOTATIONES.

1. Misera arthriticorum conditio, si comedendum manus, si ambulandum pedes non habent, si dolendum, pedes & manus habent, vt dicebat Polemon sophista.

2. Ischiâs iisdem remedijs curatur atque arthritis, præterquam quòd repellentia non admittit; sed purgato corpore valenter foras ex profunda coyle trahentibus vt cataplasmate ex stercore columb. &c. & clyst. acribus indiget. repellentibus autem non vtendum in Ischiade, quia iunctura in profundo sita est. Et ex vicinis & ambientibus vasis repellentium ope ad illam humores protuderentur.

CONSILIVM XLVI.

De raucitate & affectu rheumatico.

TRia in hoc agro notantur: vitium ossium natium, vt de narè loqui videatur, raucitas vocis, magna cum tussicula, & affectu rheumatico, dolore membrorum omniū, maximè partium

S iij

neruofarum, offium vitium ex reliquiis luis venerea secutum, raucitas, partim faucibus vitiatis, partim contractâ in bronchiis pulmonum labe.

Purgandum diligenter corpus: luculenta sanguinis detractio. Cataplasmata anodyna, fofus, hypnotica interdum. Obvium offium narium ad amuleta venerea veniendum; domitum est venenum non victum, decoctum radicis fassafra, cum fantalis, opiata laxatiua ad luem ex puluere fassaf. cort. guaiaci, folior, fenna, rhei, agarici, turbith. cinnamomi, zin ziberis, anifi, fyrupo de pomis compos. & rofar. cum agarico.

Temperandum à vino, cibus vino præbendus, a calidioribus abstinendum ob pulmonum intemperiem, de pilulis ex mercurio videbitur. Anxia res, anxium consilium, ab errhinis abstinendum, ne violenta narium munctione confractio offium maior sequatur. thorax refumptiuo vnguento liniatur, hydromeli cum saccharo cando, fyrupus vngulæ caballina, pedis cati, de symphyto Fernelij, decoctum galli decrepiti vt fieri & parari solet cum manna calabrino, diatragacanth. diaireos, aqua scabiosæ & bipinellæ cum saccharo rosato, aut violato. saccharum rosatum paratum cum maceratis passulis in aqua rosarum; lac asininum, balneum aquæ dulcis, syrpus refumptiuus: gelatina. Sed maxime habenda ratio ipsorum pulmonum quia aliquid mali præfagiunt, quod Dominus auertat & auerruncet tanquam verus medicus & fofpes.

ANNO TATIO.

I. *Quicumque (aut certè maior pars) inunctionem ex hydrargyro passi sunt, in iis ferè labe in pulmonibus inexplicabilis delitescit, unde coloris suauitas seu bona coloratio (vt ait Tullius) ἡ χλωρομα λαμβάνειν Hipp. perit decutiturque, at latentem pulmonis, aut hepatis labem pallor in facie designat.*

CONSILIVM XLVII.

De affectu oris qui τὸ μανδύκιν dicitur.

Pro Oeconomo D. Britannici.

ANtiquitas affectum oris vocatum celebrat, hic æger aliquid simile patitur, vlcera maligna, erodentia & minantia corruptionem gingivarum, & membranularum ossium, cancrum metuiamus: de lue venerea suspicio erat, tamen ea est imminuta & euata. Aliene aliquid pendere videtur, melancholicum quid est & splenicum. Aliquo loci Hippocrates vlcera oris, quorum origo à splene est, valde terrifica scripsit, in hoc agro ferè remedia, & industriam chirurgicam ludificantur.

Consulimus purgationem conuenientem, phlebotomiam; vsum balneorum tempore opportuno; decoctum sudorificum per dies aliquot, præmittantur pilulæ ex mercurio, singulis dosibus, ita tamen vt ptyalismus non prouocetur, apozemata laxantia addito puluere amborum cancrorum.

1. Mellis Narbonensis ꝑ̄ iiij. ol. sulphuris parum pro litu partium. pro topico laudatus est vsus mercurij dulcificati, gargarismus ex vulnerariis.

2. Herbae Roberti, Nicotianæ, pilosellæ, veronicæ, scabiosæ, betonicæ & scabiosæ, añ. p. j. rasuræ guaiaci ꝑ̄ vj. rosarum vulgarium & transmarinarum añ. p. j. rad. bistort. pentaphyll. añ. ꝑ̄ f. fiat decoctio ad lib. ij. dissol. syrupi de succis, mellis rosati añ. ꝑ̄ vj. sacchi rosati ꝑ̄ f. pro gargarismo.

ANNOTATIONES.

1. Hipp. lib. de int. affect. hunc affectum τὸ μανδύκιν, quem alij scorbutum appellant, describere videtur: venter (ait) inflatur, postea vero etiam lien intumescit & durus est & dolores acuti in splenem incidunt; color etiam mutatur & niger conspicitur pallidus, ex ore male olet & gingivæ à dentibus discedunt & in tibiis vlcera erumpunt, membra extenuantur, alius dura existit. Et in fine 2. prorrh. quibus lienes ma-

Cap. 3. l. 25.

Lil. de mor.
Gall.

gni, iis gingivæ vitiuntur, & os graue olet, in tibiis mala ulcera habent & nigras cicatrices. meminit quoque Strabo huius affectus, quem, non $\tau\omicron\mu\alpha\chi\epsilon\chi\mu\nu$, sed à voce $\chi\epsilon\chi\mu\nu$, quod iis os $\chi\epsilon\chi\mu\nu$ oleat, $\tau\omicron\mu\alpha\chi\epsilon\chi\mu\nu$ vocat. Plinius autem confundit stomacacem cum scelotyrbæ, quam visio aquarum locorū trans Rhenum in Germania fieri dicit. Est enim scelotyrbæ proprie paralytis quædam species, qua qui laborant recte incedere nequeunt sed nunc in læuam, nunc in dextram contorquent corpus ob partium inferiorum resolutionem quandam.

2. Fallopius Mercurium, diuinum mixtum appellat atque duo esse in rerum natura quæ illi admirationem pariunt, magnetem nimirum & hydrargyrum; ex quo quidem possumus ostendere resurrectionem, nam in cineres conuertitur, & leuissimo labore in propriam formam redit. Multa quippe edit opera, quorum nulla probabilis ratio reddi potest, quod sit ut ad occultam qualitatem sit confugienda; eiusmodi est facultas illa qua pyralismam seu saluationem & sputationem mouet, atque vis illa cathartica, quæ licet frigidus adeo excellit, ut ne vitione eam exuat, sed in cinere retineat, multò quam ante validiorem. Purgat autem crassum mucum atque ipsam pituitam, & ex consecutione quadam bilem utramque. Et quanquam modò supra, modo infra, interdum utroque modo purgat, maxime tamen propria & ingentia vi supra purgare natum est, caput petit, confugit quia igneum quocumque modo adhibeatur, sicque quidquid colliquauit, undique primum in ventriculum, dein in fauces & os regerit & compellit non tussi, non vomitione, sed continua & molesta mucosi sputi profusione reijciendum, quæ purgandi ratio veteribus incognita, & ab iis nunquam tentata, oris profluuium à recentioribus vocitatur. At vero si quando morbi species, eiusue pernicacia aut cacoethia id præsidij genus in usum reuocandum esse insinuat, ut pyralismus non proxocetur, purgantibus admisceri debet quæ vim illius languidam & ignauam stimulent, ne quod in ventriculum attraxit fusis liquidisque carnibus & humoribus illic subsistat, & grauissimorum symptomatum causa sit. Ea que ratione grauissimis morbis expugnandis, lepræ, scrophulis, scabiei, morphæis, impetigini, lumbricis enicandis, lvi venereæ conferre potest, nam terget, mundificat, modo per aluum, modo per vrinas sanguinis massam repurgat, postremòque corporis habitum superuacaneorum humorum illuue liberat.

In

CONSILIVM XLVIII.

De Tussi permolesta pro D. Florette Consule.

IN molesta tussi & quasi pruritu ad summam partem asperæ arteriæ post somnum purgationes blandæ sunt institutæ, cassiâ & in bolo, & in potu colato, ptisanæ vsus in vino, hordeata, amygdalata, lac asinæ, item hoc instauratiuum & resumptiuum.

℞. Caponem vnum, pullos duos, armum vitulinum aut carnem pectoris vitulini, coque in aqua fluuiali aut cisternæ, addendo parum aquæ scabiosæ, & oxytriphylli: in eadem aqua coque tres aut duas testudines nemorales demptis extremis, adde pulmonariam herbam, tussilaginem, hordeum mundatum, bipinellam, pilosellam minorem, siue pedem cati, seminis papaueris & bombacis añ. ʒ i. semina frigida maiora, seminis sesamis ʒ ii. passulas xxx. gummi arabici & tragacanthi añ. ʒ f. penidiarum ʒ i. f. cum sufficienti quantitate sacchari, fiat syrupus ad libras duas.

℞. Conseruæ rosarum mollis ʒ ii. conseruæ tussilaginis, violarum & pedis cati añ. ʒ vi. pulmonis vulpis preparati ʒ iii. mannæ Calab. ʒ i. f. conseruæ symphyti ʒ f. diamargariti frigidi, & diatrag. añ. ʒ f. cum syrupo de siccis, & iuleb. rosato fiat opiata, capiet frustulum horâ somni cum syrupo sequenti.

℞. Syrupi violati & rosarum siccarum & nenupharis añ. ʒ i. f. syrupi papaueris rubri ʒ ii. capiat parum ex cochleari, cum prædicta opiata.

Coquatur vetus gallus cum carne vitulina, farciatur venter foliis & floribus vngulæ caballinæ, hordeo, passulis, iuiubis, sebesth. semine bombacis, & gummi tragacanthæ portiuncula, vtatur decocto manè cum ʒ i. f. mannæ Calabrinæ.

CONSILIVM XLIX.

*Pro iuvene melancholico cuius mentem mæror
perculit & de suo statu dimouit.*

Victus ratio humectans & refrigerans præscripta. B. Inea, lac
asinæ, serum lactis cum eufrafia & buglossio. Purgatio ex
fenna, syrupo de pomis, cum herbis splenicis, venæ sectio bra-
chii & capitis, item saphenæ, hirundinum vsus. Pyrotica internis
tibiis, aquæ Pugenfes, feri lactis vsus frequens, hordeata, elleborif-
mus malo rebellante eligatur; elleborus niger qui floret circà fi-
nem Decemb- is flore purpureo, aut dentur grana octo extracti
ellebori nigri, hyeme purgetur modò pilulis ante cibum, modò
paulò validioribus.

1. Moderatus victus, colloquia amicorum blanda & amica, nihil
molestum aut quod iram prouocet, dicendum, læta omnia. Acer-
ba omnia aut tristia vitentur.

Rerum seriarum narrationes vitandæ, ægro concedendum,
condonandum paulò, indulgentius fauendum, vt frontem con-
trahat nullo modo, sed apertam habeat.

Amicis colloquiis consolandus, leuandus, demulcendus.

Musica, ludus amicus & facilis, blanda exercitatio.

2. Medicamenta blanda cum granis Kermes, nisi forte res tan-
dem (vt dictum est,) elleborisimum requirat, succus pomorum va-
let, caesaries decurranda.

3.

ANNOTATIONES.

1. Celebratur hic versus apud Græcos, qui citatur à Plutarcho
apud Apollonium *Ἰσχυὶς νοσέουσι ἰατροὶ λόγοι*, ægroto animo
medicus est oratio; siquidem, vt inquit sapiens Hebræus, sermo mollis
frangit iram: huc allusit Horatius in Epistolis

Sunt verba & voces quibus hunc lenire dolorem

Possis, & magnam morbi depellere partem.

Sed vt in corporum morbis pro ratione valetudinis alia atque alia,

adhibentur præsidia, itidem in animi malis non eadem adhibenda est oratio, sed interim dissimulandum, interim acrius iurgandum, nonnunquam blandius monendum iuxta Pauli monitum, argue, obsecra, increpa.

2. Antiquitus ellebori plurimus usus fuit ad leuanda mentis & capitis vitia, hinc natum Adag. apud Aristoph. in *Vespis* τῆς ἐν ἐλβε-
 πορ, quo dicto significat insanire quempiam, & ἐν ἐλβε πορ, insani-
 re est Gr. duo elleborigenera Diosc. lib. 4. album & nigrum, quod alij
 entomon, alij polyrrizon, alij melampodion vocant: albo vomitiones
 cientur, nigro aluus inferior diluitur, vtriusque periculosa sumptio.
 Ita tamen olim frequenti in usu fuit ut ad peruidenda acrius quæ
 commentabantur studiorum gratia sæpius sumpserint: sic legimus
 apud. Gell. cap. 15 lib. 17. Carneadæ academicum scripturum aduer-
 sus Stoici Zenonis libros, superiora corporis elleboro purgavisse, ne quid
 ex corruptis in stomacho humoribus ad domicilia usque animi redun-
 daret, & constantiam vigoremque mentis labefaceret, tantâ curâ
 tantoque apparatu vir ingenio præstanti ad refellenda quæ scripse-
 rat Zeno aggressus. Constat tamen purgationem ex elleboro difficilem
 esse terrorisque plenam, nec adhibendam nisi cum pericacioris morbi
 necessitas expostulat, nec aliis cessit remediis. bilem enim atram, dein-
 de flavam atque crassam pituitam detrahit in aluum, non è visceri-
 bus modo, sed & è venis, è quibus sanguinem rapit, & è partibus ex-
 tremis, maximeque è cerebro, ideo confert elephantiasin, melaneholia,
 furori, epilepsie &c. In quibus affectibus tuto dari potest legitima
 quantitate & præparatus ut decet. infunduntur radices certâ quan-
 titate contusæ in iure carniū pingui, aut in hydromelite, aut in aqua
 hordei, expressumque datur. Alij ex fibris elleb. extractum pa-
 rant, radices & fibras macerant per diem integrum in aceto rosato.
 effuso aceto rad. exsiccatas contundunt in matrarium capax recon-
 dunt, supereffund. succi limonum partem unam, & succi pomorum,
 redolentium partes duas in bal. Mariæ digerunt, colant, exprimunt,
 purumque sic ab impuro separant.

3. *Cæsaries* nomen inuenit à cædendo, hinc Gallia comata ex lon-
 gâ cæsarie dicta, *Cæsaries* promissa, id est longa, *Cæsariati* comati
 dicuntur, mulieres non habebant cæsariem, sed viri, nunc viri longâ,
 naturalem & artificiosam habent cæsariem, cæsione prætermissa
 Galli vocant perriue.

CONSILIVM L.

*De incontinentia vrina & stillicidio inuoluntario
post lithotomiam, pro filio D. Machau.*

*Tortuosa vrina
fluens calculo
existente
in vesica.*

CVM calculus est in vesica, non fluit vrina, nec emeiitur sine dolore, & tortuosior est vrina fluens, vt verbo Pliniano vtat. cum grandior est calculus & discinduntur fibræ sphincteris musculi, ferè vrina non retinetur, sed inuoluntariè distillat magno ægrotantium fastidio, dolore, & incommodo, nisi forrè ad annos pubertatis prægressa lithotomia puero: si quædam fibræ intactæ manserint, officium præbent læsarum, & caro extuberat fecundior, supplens vicem læsarum fibrarum.

Vitus:

Vitæ ratio sit commoda & salubris, vtatur pane & carnibus coctis facilibus, fructibus coctis, cerasis nouis cum pane, alias vrinam mouent; ientaculum sine potu aut paucis, sero largior potus ad sitim sedandam, noctu bis aut semel meiat, vino vtatur dilutissimo hyeme præsertim, si aquâ coctâ vtatur, addatur cauda equina, herba equisetum vocata, vt parcat potui, tamen si vrina coloratior, calidior, non ita sit parcus in potu, satius enim est in eam partem (plus bibendo) peccare, teneat in ore aliquid siti placandæ idoneum, vitentur salsa, piperata, lateri indormiat primò, deinde dorso ad mediam noctem, à miætu indormiat alteri lateri, surgens manè è lecto meiat, desideat, si fieri possit. Aluo liberiore minùs emeiitur, mediocriter exerceatur, vtatur medicamentulis roborantibus purgando. Cassia sola nocet, laxando partes nervosas, vesicam & partes spermati conficiendo, & continendo dicatas. Topica adhibenda conueniant proprio puberum temperamento, calida sed moderatè, & humectantia non multum siccantia, forus ex aqua fabrorum cum vino crasso. Aquæ naturales minerales, vitriculæ, borbonenses, pucenses, spadenses, earum stillicidium, vallet balneum, potus, fæx illorum fontium, aut loco illorum aqua fabrorum cum sulphure, alumine, nitro, vitriolo albo, aut alio cum limatura ferri & chalybis; sacculi parati cum cauda equina, rosis

ad fotum, si non contingat melior sanitas, borbonensia balnea adeat, ad haustum, balneum & stillicidij commodum, parabuntur tabellæ ex equiseto, santalo & saccharo.

Cydoniatum Aurelianum aliquando conferet, modò non adstringat nimis aluum.

V stillans vrina recipiatur vase commodo, parabitur bursa aut vas ex ferro candido albo, cum imposita spongiola, ita tamen vt ingressum non impediant.

ANNOTATIO.

1. *Quibus salutariter lapis detractus est, nec in ipsa sectione perierant, aut dubiæ sunt salutis, Cassiam dare pro cathartico nocet, quod fit, vel quia diuretica est, vel quia nonnisi cum tormine aliquo, ab inferiore parte aluum euocat aliquando, dum inflatur in aluo perturbationem excitat. perturbatio autem ista vulnus vesicæ inflatum irritat. At in exhibitione catharticonum obseruandi sunt maximè dies critici; in iis enim motus quidam fiunt naturæ, quos vel impedire, vel reprimere non parum est. Aqua hordei & iulep. rosatum in vsu frequenti esse debet. De clysteribus vnum notandum est, qui sunt blandiores sepe ignaui & inutiles subsistunt, & præter hoc quod inutiles sunt, lædunt sæpè & vulnus afficiunt deterius, ideo acrisculi sunt subiiciendi, attemperanda tamen res est, pro natura ægri, proque intestinorū sensu pigro vel acuto. At quod ad vulnus attinet, detergentia, & mundificantia vlceri non imponunt lithotomi, quia, aiunt, ipsa vrina quæ sensim per vulnus fluit, detergenti vim habet, & supplet vicem medicamentorum detergentium.*

CONSILIVM LI.

De cachexia cum faciei pallore, & symptomatis hypochondriacis.

Institutum iusculum, armus vitellinus cum pullo farto cum acetosa, lapatho, bugloss. borag. bipinella, endiuia, portul. floribus genistæ, capparibus, pompo de carpendulo, coletur pullus, exprimatur vsui.

150 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Debet fieri
decoctio apta
antequam
fiat hydro-
meli.

Hydromeli paratum cum ꝑ j. radices filicis, chynæ ꝑ ligno rho-
dio, ebore ad ꝑ s. coque in hydromelitis libris quatuor per duas
horas ad consumptionem tertiæ partis, adde flores genistæ sub fi-
nem, cichorij, buglossi, violar, aceti ꝑ iiij, cola, aromatiza cinnam. &
santalo cap. ꝑ iiij, manè per dies duodecim.

I. ꝑ. Syrupi de pomis, granat. limonum, violacei tincti & acidio-
ris redditi añ. ꝑ iiij, vtatur.

Inter cetera tinctura rosacea & prærubra valet.

Purgatio.

ꝑ. Foliorum sennæ 3 vj, santali citrini ꝑ j, aquæ buglossi, pomor-
um de curpend. añ. ꝑ iiij, succi limonum ꝑ j, macera per horas
duodecim, exprime, adde succi pomorum ꝑ j, sacchari violati 3 iiij,
agita cum albumine oui, vtatur eo decocto post iusculum.

Syrup. mag.

ꝑ. Aquarum fumariz, buglossi, pomorum, cicho. añ. lib. s. succi li-
monum ꝑ vi, adde ꝑ j. R hab. ad partem infusi succi ros. pallidarum
ꝑ iiij, cum saccharo, fiat syrupus.

2.

Notanda hæc
formula &
examinanda.

ꝑ. Aloes in aqua cichorij ad ignem beatæ Mariæ soluta, & post
ad mucaginem coagulata ꝑ ij, gummi ammoniaci in aqua rosa-
rum soluti per setaceum traiectioni ꝑ s. triasant. ꝑ ij, myrrhæ 3 iiij, ma-
stiches 3 j, salis absinth. ꝑ iiij, croci ꝑ s. cum syrupo de succo rosa-
rum, fiat massa, de qua capiet ꝑ j, aut paulò plus ante pastum.

Clysteres instituti hæmorrhoidum prouocatio.

Tabellæ.

ꝑ. Pulueris triasant. ꝑ ij, corallij præparati, perlarum præparata-
rum añ, spodij cornu cerui añ, 3 s. ossis de corde cerui vnicornis añ,
ꝑ j, fragment. hyacinthi, smaragdorum cum succo limonum parat.
croci martis sine igne & aceto parati, ꝑ iiij, confectio. de hyacin-
tho, cinnamomi interioris ꝑ j, sacchari in aqua rosarum soluti
quod suff. fiant tabellæ.

Balneum institutum. serum lactis à balneo.

ꝑ. Seri lactis ꝑ ij, tria poma de carpendulo incisa bulliant: fiat
colatura, adde flores cichorij, buglossi, borrag. añ. ad p. j, bulliat de-
nuo, adde saccharum cum albumine clarificetur, capiat manè.

ANNOTATIONES.

1. In præcedentibus dictum qua arte eliciatur tinctura ex rosis, aut
floribus violar. buglossi, borrag. &c.

2. Vera aloes præparatio fit hac ratione, eius certa quantitas in
puluerem redacta in phialam vitream immittitur, affunditur aqua
cichorij. end. aut acetosa in balneo Mariæ, maceratio fit per 3. vel 4.

die, demum aqua rubicundissima aloes, essentia tincla extrahitur & a facilius, per inclinationem separatur destillaturque per alembicum, donec mellis consistentiam acquisuerit.

CONSILIVM LII.

Ad mulierem recens nuptam, epileptici conuulsionibus afflictam & affectu qui

σπασμὸς ὀνόμος vocatur.

H Vicægræ inito consilio hæc remedia sunt instituta, clysteres ex emollientibus, arthemisia, absinthio centauryo minore, melle mercuriali, & hiera.

Institutum decoctum ex rad. fenicul. polyp. tarax. zing. oxalid. oxylapathi, pæoniæ fœminæ, cypero, valeriana, radice filicis fœm. agrim. fumar. bipinel. chamæ, chamæpithis. mentha, nepeta, hyssopo, calend. floribus centaur. minoris, semine card. nigel. Rom. glycyrr. spica nardi calamo arom. fi. decoctio, cuius in colatura foliorum sennæ vino albo nutritur 3 ij. Agar. troch. 3 iij. seminis earth. 3 ij. caryophyl. 3 i. f. macera, dein exprime ad 3 xij. dissol. syrupi rosarum cum agarico 3 ij. oxymel scyllit. 3 j. fiat in tres doses apozema.

Sectio venarum brachij & saphenæ.

24. Radicis pæoniæ & cyperi añ. 3 ij. chynæ 3 iij. saffrafras 3 i. f. rasuræ iuniperi & ligni rhodij añ. 3 i. florum lilij conuallium, tilia, calendulæ añ 3 iij. florum anthos p. iij. baccarum iuniperi, p. iij. corticis exterioris citrij sicci 3 iiii. concisa pone in doliolo quod capiat pintas xxiii. infunde libras xx. hydromelitis parari ex parte mellis & partibus octo aquæ, ad supernatationem adde lib. f. fermenti cereuisiæ. pone in loco tepido, pone in furnum pistoris, sinatur fermentari, donec cesset ebullitio, donec deferbuerit, fiat transcolatio, capiat 3 6. per dies duodecim, pro effectu iterabit.

Primis diebus quibus vtetur eo hydromelite post dosim acceptam fiat forus hypogastrii & lienis.

Forus fiet ex radice gentianæ, aristoloch. enulæ ad 3 ix. cortice

152 CONSILIORVM MEDICINALIVM

hæderæ arboris, mediani fraxini, radice chelidonæ ad 3 ii. foliis ceterach, erysimi, nasturtii, absinth. centaurii, menthæ, melissæ, arthemissæ, tanac. añ. m. i. floribus sambuci & ebuli, baccis lauri, iunip. coquantur in aqua fabror. & quartâ parte vini albi & cum aceto scyllit. f. otus fiat cum spongiis.

Purgatio vt antè, vel per sequens apozema.

Syrupus.

24. Foliorum orientalium 3 vi. agar. troch. 3 iii. rhab. 3 i. f. turb. hermod. 3 i. caryoph. 3 iii. cinnam. macis. 3 ii. f. irrigentur omnia vino albo infunde per quatrè in unum in vase vitreo clauso in balneo Mariæ, in ea quantitate aquæ beton. calend. cardui, valerianæ quæ supernatet sex digitos, post ebullitiones leues fiat express. adde syrupi rosarum pallidar. mannæ Calabrinæ per solutionem depurata filtrationem 3 x. sacchari candi 3 viij. post exhalationem in alambico reduc in syrupum, cap. 3 ij. cum ptisana vel aqua beton. & cardui horis tribus ante iusculum.

Pilule.

Bis hebdomade capiat 3 f. huius massæ.

24. Gummi ammoniaci in aceto scyllitico soluti 3 iij. bdellij ita parati 3 ij. aloes depurata in succo rosar. absinth. centau. minoris, rutæ 3 i. extracti sennæ 3 f. myrrh. 3 ij. croci 3 i. f. salis gemmæ 3 iij. cum syrupo rosarum fiat massa, addendo dum formatur olei anisi 3 j. ad vsu.

Vesperis cubitura capiat opiatam & manè cum non vtetur hydromelite prædicto.

Opiata.

24. Florum galangæ calendulæ añ. 3 j. florum anthes. 3 j. f. Theriac. 3 vi. confec. alkermes & de hyacinth. añ. 3 f. cranij humani, visci quercini añ. 3 iii. radice valeri. 3 vi. diambriæ & aromat. rosati añ. 3 ii. cum syrupo parato per extractionem è succo menth. arthemissæ & vino albo fiat opiatam, adde puluerem corticis externi citrij, ferularum bryoniæ & radice campanæ singul. añ. ad 3 f. caphuræ 3 f. capiat instar auellanæ superbibendo parum hydrom. vel vini albi.

Non omittantur frictions capitis, lotiones partium inferiorum ex decocto nerualium herbarum & hysteriarum, cucurb. frequentes clyst.

Item aqua ad necessitatem paranda.

Pilule.

24. Radicis enul. camp. bryon. arist. gentianæ cyperi añ. 3 ii. pæoniæ vtriusque valerianæ, añ. 3 iii. zedoariæ angel. imperatoria galangæ añ. 3 i. corticis aranciorum & citrij sicci añ. 3 ii. f. florum rutæ maior. añ. 3 j. florum, anth. stœch. hyperici añ. p. ii. baccarum iunip.

iunip. ʒ iii. caryop. cinnamo. macis añ. ʒ x. infunde in quantitate vini Hispanici quæ supernatet sex digitos, adde theriacis ʒ iiii. per octo dies, fiat separatio per filtrum à facce, mox distilletur in balneo Mariæ a lambico vitreo, in cuius capitello sint circa lumbum noduli quatuor repleti croco & granis sex camphoræ, mellago in fundo valis manens coaguletur ad consistentiam pilularum, quæ loco dictæ opiatæ sumi poterunt iisdem horis fæces calcinentur ad albedinem cineribus affundatur aqua distillata quæ post dierum aliquot digestionem separetur inclinatione, seruetur & in vase vitreo sub ore benè obturato ad vsum. Nares vngantur oleo succini, & gagatis, spina in paroxysmo vngatur axungia humana & suilla, cocta cum salvia & vino generoso.

ANNOTATIO.

i. *Elleborismo miras tribuit vires aduersus epilepsiam Plinius, & eum extulit exemplo bruti hominis primarij; huius loco, nonnulli tempore paroxysmi cochlear vnum aut alterum vini emetici, in os infundunt. Valet item contra epilepsiam decoctum rad. eiyngij pæoniæ maris & visci quercini cum hydromelite.* Cap. 7. & 8. lib. 12.

CONSILIVM LIII.

De vrina incontinentia.

Virgo Aureliæ matura viro, etiam à tenera ætatula vrinæ incontinentia laborat, cui vt ritè, & ex arte medeamur, Quosdam articulos & quæstiunculas descripsimus quibus responderunt Medici domestici, vt collatis sententiis re diligenter expendâ, & fructu remediorum aut vtili, aut inutuli in commune aliquid consularur.

An à natalibus malum natum.

An à parentibus lapidosus, an non fuerit calculosa.

An non præcesserit casus in os sacrum aut in perinæum, num suspicio paralyseos osculi vesicæ, aut casu, aut alio modo.

Num passa fædos colores, an adhibita remedia, nam obseruat

Cap. de paralyse.

V

Rondeletius vii gines quasdam factas paralyticas vsu remediorum calidiorum & aperientium in medendo fœdis coloribus : sic videndum an id mali in virgine, aut à renibus, aut à vesica. An non sit diabetes morbus grauis, an in fundo vasis vrinarii phlegma, aut quid lacteum & purulentum, an vrina sit graueolens. An fluat vrina non sentienti & vigili & dormienti. An sitibunda. An in sopore malum minus: nam quibusdam dormientibus horologium apponitur vt meminerint vrinam reddere.

Explicentur remedia adhibita. An non ad balnea, & plumbares aquas traducta. An non rutus.

A multis iusculis abstinendum, & diureticis, frequens haustus & paruus, à vino albo abstineat, aqua ferrata vsui sit, scyna aut sarsaparella vtilis. Fotus ex astringentibus; semicupia ad partes imas, ius lentium valet si calorem in ore sentiat, cassia cum tamarindis & rhabarbaro, in pastu, cydoniatum Aurelianum ex succo, non quod durius est, nam ventrem astringeret, & malum augeret.

Corpus purgetur syrupo magistrali infra scripto.

Puluis.

24. Florum vrticæ Græcæ nenuph. añ. p. i. seminis lact. portul. ligni rhodii, cannabis, & santalorum añ. 3 i. seminis plantaginis, maluæ, corallorum añ. 3 scum saccharo cando & rosa. añ. 3 i. fiat puluis cap. manè 3 i. cum paucio vino albo aqua ferrata diluto.

Vtatur iusculo gallinæ coctæ cum lactuc. portul. bugloss. borrag. farciantur interiora granis berberis, radice pauca symphyti, tormentilla, myrobal. gummi arabico addita 3 i. rhabarbari, fiat panatella addito vitello oui.

Syrupus.

Spinæ dorsi imæ parti adhibe emplastrum astringens.

Fiat syrupus ex bugla, fanicula, vrtica mortua, robertiana, oxytriph. primul. veris, consolida maiore, torment. acetosa, oxylap. granis Kermes & berberis, santalis omnibus, passulis integris aqua rosarum lautis, semine plantag. lact. melon. cum 3 iiii. sennæ, addita expressione 3 i. rhabarbari seorsim infusi, addito ligno aloes, iuleb. rosato & syrupo granatorum.

CONSILIVM LIV.

De profluvio seminis non venereo.

Non abs re vir nobilis curam suæ sanitatis habet, (quorsum enim fœlicitas, si non adsit sanitas?) & naturam ducem sequi cœstinauit, hæc æternitatis est avida, aliàs capax, aliàs rapax, & per novam sobolem, vt per progerminationem id facit: si in arboribus adeò sedula, quid in homine agat qui ad Deum tanquam archetypum formatur, & ex tantulo semine re tantula miros effectus producit. ideo D. laborans in eo conseruando laborat vt semen sit prolificum, non insulsum, non degener, non euanidum, vt homo ex homine exiliat, tantulum semen ex omnibus quasi partibus deciduum rapit secum ideam quandam hominis, vt homo sit tanquam character, & transcriptio quædam viua: semen est tradux ad æternam propagationem, ex omnibus partibus decedit, & deceditur ex prona quasi semita ductuque, omnes meatus, aut tubi ad partes naturales imas (quæ per *ἰστονομία*, naturales dicuntur, aut potius *κατ' ἐξοχὴν*) tendunt, diriguntur, conspirant; hinc summa in palæstra venerea voluptas, ideò harum partium maximè habenda ratio, siue vt simplices, siue instrumentales considerentur, nerui tendines miro artificio fabricati, in generatione valent plurimum. At partium principum ad opus aliquod etiam leues affectus magni sunt momenti; inter cætera animantia homo à congressu maximè exoluitur quia proportionem corporis multum seminis excernitur, & quod robustum est exilit, & vt ædificij constructio, sic corporis compages quatitur ac conuellitur, dum semen decedit. Mirum quod maximè in mixtu & egeredi conatu ægro domino semē effluat, id partium vicinia & sympathia facit, hinc qui meiendi desiderio tenentur cōcumbere nequeunt, quia meatus implentur per affluxum, & qui concumbunt si meiendere velint, penis intenditur, id quod ad rem præsentem pertinet, inde est formæ & morum similitudo, & in aliis animalibus, maior est similitudo quàm in homine, quia cogitatio aliò traducit, celeriter transuolat; hinc maiores differentię, dissimilitudines, quia velocitas cogitationum, celeritas animi notas multifarias im-

primit, non sic in aliis animantibus: imo in iis certi sunt per anni tempora concubitus homini omnibus horis dierum ac noctium (quod ut aiunt) magis intersit hominem nasci quàm cetera animalia: imo nulla animalia grauida præter mulierem coirum norunt: itaque non mirum si sanitatis maximè ratio habetur, & ut natura ad pristinam integritatem redeat vsus veneris ad æternitatem quandam per sobolem & ad sanitatem si moderatus est confert, ut natura ad pristinam integritatem redeat. Quia qui tardiùs & moderatius venerem exercuerunt maximam laudem habuerunt, quia validiores & longioris vitæ fuerunt, sic statura corporis alitur, aluntur vires. Mirum in homine cæteris animantibus in congressu satietas, homini propè nulla, licet vsus veneris ad æternitatem producenda sobole & ad sanitatem si moderatus est conterat, ut præfractior & magis ridiculus videatur Democritus, qui vsus veneris damnarit, ut in qua homo ex homine exiliat. Id ad paganos non ad Christianos, apud quos eximia soboles desideratur ad gloriam Dei, & eius cultum, & eximia gerenda negotia in Reip. decus & salutem, laudo antiquitatis studium quæ tanti fecit hominis generationem, ut remedia quædam excogitarit ad generando liberos pulchros & bonos, hermesias vocatur.

Plin. c. 63. l. 7.

Continet multa laudanda & non negligenda, non ita est efficax ut quod promittit emittat & exoluat, & spem effectus mentiretur aut eleuaret.

Vitellus.

Danda quæ succum lentum generant, ut sunt extrema animalium, & testudines, & ostrea; Arborea sunt viuaciores, quæ lentum habent succum, exercitium violentum malum, inutilis à cibo contentio animi & iugis actio, spiritus ad partes superiores fertur, inferiores fraudatæ spiritu imbecilliores redduntur.

Homines solertes & negotiosi liberos generant imbecilliores, vulgus est pro letarium, robustos generat.

Magna pars urbanorum est imbecilliore ventriculo, item studiosorum. pertinax vigilia cruditatis parens, ex cruditate affluxus humorum & effluxus: labor naturalis in visu, auditu & cæteris excessus vitetur.

In epid.

Ira vitanda, licet oxythymiam laudet Hippocrates & ex candescencia ad bonos succos generandos & *ευχρησται*. Id de pinguibus & succulentis audiendum, non de biliosis, & graui negotio occupatis & studiosis.

Corpus & animus instar duorum equorum viribus æqualium

corpus & animum tanquam curru & vehiculo, id est, se ipsos trahere debent.

Sinapi, acria, allia sunt vitanda.

Diata, aliquando siccans & astringens.

Portul. inrybum (nam quidam aiunt cichoracea semen minuer) plantago, lactuc. bugloss. borrago in iure conferunt, hordeata, oryza. quidam consulebat pistacia, pineas, passulas, auellanas, amigdala, sed parum consulto.

Semen enim augent, & ad venerem excitandam commendantur, hinc instituuntur ut sit semen crassius vsus sit vini crassa diluti aqua, aut simplici, aut in aqua torquis aureus candens extinguitur.

Purgatio ex rheo & syrupo de cicho. ex interuallis, apozemata *Purgatio.*
ex end. scariol. plantag. semine lact. citrull. coque in aqua, adde syrupum limonum, de granat. rosa. siccarum.

Opiata commendatur ex acetositate citri, semine canabis, camphora. semine portul. lact. nenuph. floribus, semine agni casti, ruta. *Opiata.*

Alia opiata ex cydoniis conditis ad 3 ij. corall. rub. margar. añ. 3 f. balauft. 3 j. semine agni casti, & ruta ad 3 j. conditum fiat cum syrupo rosarum siccarum, valent trochisci de terra sigillata.

Quod ad topica spectat.

Fotus ad perinaeum ex foliis plantag. tapfi, centinod. cupresso, *Fotus.*
rosis, floribus cham. cortice granat. sacculus plenus bulliat in rubro vino & aqua fabrorum.

24. Olei rosati, myrtill. mast. añ. 3 j. pulueris corall. rab. mastich. *Litus.*
anthera añ. 3 j. cum cera fit vnguentum.

Emplastrum comitissae & deficcat. rub. confert.

Quae euocant ad cutim valent, de aquis plumbaribus videbitur *Emplastrum.*
si res vrgeat.

Inseffus in plena, decocto astringenti, pelui impositis partibus naturalibus.

Testudines valent, cancri fluuiales, syrupus resumptiuus.

Semen falicis, & vrticis albae confert.

Valet purgatio ex conferua rosarum nymphæ, symphyti *2.*
rhabar. myrobalanis conditis, aut syrupus conueniens, iuuat man- *Li. 2. de diat.*
dere rheum cum passulis, vtatur vino optimo non huius anni, in *Plin. 5. 14.*
quo vina sunt tenuia quæ sanguinem ex Hippocrate imbecillum generant & serum tenue.

Abstineat à diureticis, vtatur pane in lacte subacto.
 Marcipanes cum carne pullorum conferunt.
 Diarrhod. abbatis, electuarius de gummis, pasta regia.
 Hæc scripta collatâ sententiâ, M. Iacobi Guillemeau Chirur-
 gij.

ANNOTATIONES.

1. Quoniam de Gonorrhœa agitur, non venerea, & quæ scortatorum est flagellum, sed de quodam seminis effluuio naturali & tamen morbofo, vnum annotabo de usu veneris: diximus usu veneris vim & corpori & animo inferri, unde corpora vieta & flaccidiora fiunt, animus imbecillior; nec omitti debet nominis eunuchi etymologia; nomen ipsum videtur ridiculum, quia homo quasi effeminatur, tamen traxit originem vel ἀπὸ τῆς ἐύνης, à lecto, cui custodes eunuchi erant ad tuendam coniugum castitatem, & quia diligentiores erant & obseruantiores æqui & pudici, quàm famulæ: vel dicitur eunuchus quasi ἐὺ νῦν ἔχῃς, quasi magis mente constet, ob neglectum veneris usum; unde venerea dicebantur ἀπὸ τῶν ἀντικύτων antiquis, quasi extrâ rationem seu irrati-
 nabilia.
2. Tiberius sui temporis medicos sugillabat, qui Surrentinum vinum laudarent ob tenuitatem salubritatemque, cum tamen acidiusculum foret & generosum acetum esse dicebat: Clodius successor nobilem vappam vocabat, talia vina Galli vocant Ginguets.

CONSILIVM LV.

De febre assidua cum grauibz symptomatis.

causa.

DOMINA Myron Britannia incola incidit in grauem morbum, id est in febrem continuam cum grauibz symptomatis, maximè quia habet hypochondriacum aliquid ab intemperie ingenuita: accesserunt, & causæ externæ de quibus dicam. Tria videntur grauem morbum intulisse, cui febris lenta & quasi hectica successit κατὰ τὴν ἑστῆσαν. Primum natura & ingenium morborum grassantium, qui κακὸν ὄντες sunt, à sero maligno, putri, ob præ-

gressa tempora quæ suam temperiem non retinuerunt, hinc futura symptomaton facessens negotium medicis, & ægros in metum desperationis æmulum coniciens.

Secundum, timor ob naufragij periculum in cymba: Recens erat nupta, confecerat multa itinera dispendio sanitatis dubiâ & ancipiti vitâ.

*Qui cymba
venit tan-
tum abesi-
morte quam
ligni crasitu-
do impedit.*

Tertium, natura agræ à me satis cognitæ, temperamentum biliosius quàm natura lexis ferat, hinc hypochondriaca, hinc vetus de liene querela; mulieres calidiore temperamento afflictæ sunt valetudinis, non desperatæ, hinc Aristoteles: melancholici perpetuò medicinam appetunt.

Frustrâ accusatur vterus, vt malè sit in omnibus morbis mulierum (quamquam id non sit negligendum) nupsit nuper ægra, & eius vterus colitur, frustrâ darentur hysterica remedia, vt quæ nimium calfaciant & augeant viscerum æstum, hypochondriacamque intemperiem; multorum malorum authorem, Quod Hippocrates dicat vterum morborum muliebrium causam, id in-

*Vterus mu-
liebrium
morborum
causa Hipp.*

telligi debet quatenus est ἰδιουγενής muliebris per sympathiam, aut ἰδιονάθειαν vteri, & saluo meliore iudicio hypochondriaca symptomata redolent hysterica symptomata.

*notanda est
melancholico-
rum distin-
ctio: ad rem
conueniuntque*

Melancholici ab adustione non sunt vehementer purgandi, cum melancholici dicantur, non tam ij qui succo melancholico abundant, quàm qui partibus solidis tales sunt, est solertis medici id distinguere, nocet vnum pro altero supponere ob remedia hysterica, non negligatur distinctio & examen, noua est coniux, faciles & foelices partus, (Deo auspice) & cultus vteri tanquam fundi ob nouum coniugium erit medela symptomatum hysterico-

*Cultus vteri
hystericis me-
detur affecti-
bus Hipp. de
morb. Mul. &
Vul. c. 1. & 2.
à J. adu. 1. 1.
Herba olim
vocata ne-
penthes obli-
uionem timo-
ris & tristi-
tie inducit.*

Concinnandus syrupus cum senna, theo, splenicis, addito succis bugli, pomorum, eufrasia, yuæ arthriticæ, oxymyphylly, granis Kermes; radice tunicis, pentaphylly, radice scynæ parum ob se- rum putre, tempore ceraforum addatur succus eorum, flores & fo- lia veronica; valet sectio basilicæ & dextræ, & sinistræ, exploret medicus, an non tumeat lien, causa sæpè tabis corporis, tumor est discutiendus, inutilis alioquin erit opera.

Arist.

Capiti consulatur remediis conuenientibus iam præscriptis.

Si hæmorrhoides appareant & caput faciant num opus sit eas aperire, videbitur, sunt morbus in muliere, in viro sanitas. Balnea conuenient, lac asinæ, serum lactis oui albumine clarificatum ad-

datur bipinella, aut euphrasia, non ea herba quæ fel terræ, & fumaria dicitur.

Vide Gal. de
locis aff.

In hypochondriacis sæpè accusatur ventriculus, cum sit innocens, sed aut in pyloro aut ieiuno intestino mali labes delitescit, ut notauit Diocles, quod Galenus primus obseruauit, ut iam antè notauimus, variis in locis.

CONSILIVM LVI.

De febre lenta & tumoribus glandularum gutturis strumam minitantibus.

Aurora mor-
bis ut musis
amica ideo,
qui morbi
circa matu-
num tempus
exacerbatio-
nes habent ut
plurimum
negotioses sūt.

Rondeletius
in ea est sen-
tentia & im-
pendio calfa-
cientibus uti-
tur.

TRia sunt obseruanda in ægrotante puella annos 26. nata, quæ ante menses aliquot afflictioris fuit valetudinis, febris lenta quæ præcessit, & cacochymiam habet parentem cachexiæ: pro fluuium alui mesentericum, linguæ siccitas, quam nos in illa à somno excitata obseruauimus, quod eò est deterius quia in aurora salubri alioqui apparet. Tertium quod metum affert, est tumor in glandulis colli chœradum minax, nisi prudenter & ex arte Medici prouidissent, & præuidissent, purgando & suppuratum impediendo, hoc dirum omen auerterunt, licet foeliciter, (sed id raro) in quibusdam suppurato tales tumores euauerunt, cōsumpta membranula quæ materiem continebat, maximè si pus maturum sit: nam antè si effluat aliquid cancriforme affert, sic mora quædam licet tædiosa securior est. Quidam artis periti (ut non omnia omnes vident) in Chœradum cognitione & curatione vacillarunt, à pituita illas nasci putant, & ad calfacientia & siccantia recurrunt, item ad hydrotica calfacientia, hinc in malum cancerum fit conuersio & transitus, dum illa pituita incalescit plus æquo & exasperatur. At, ut ex Platone notat Galenus, pituita non quæuis nocet, sed salsa aut acida: salsa est atræ bilis soboles, & affinis, hinc quibus in facie gutta est rosacea, in iis chœradum & cancrorum est seminarium: imo & arthritidis, sic grauis error committitur in usu calfacientium & siccantium remediorum, & antiquitas prudentius præscripsit serum lactis, asinæ lac, syrupum regis saporis. Sic post longum morbum tumores in glandulis colli paruerunt, glandulæ sunt

sunt partes depositaria & emunctoria cerebri, aut male affecti, aut onusti prauo succo. Victus ratio humectans & refrigerans confert, cum iam hecticae sebris signa se prodant, neglectis tumoribus istis ad tempus, licet cassaficientia & siccantia resiciamus.

Repressa & mitigata febre tantillum scynæ in aqua macerabitur, adiuta radice cichorij & polypodij.

Aqua rhubar. cum radice oxalidis, & tunicis, lac asinæ quod ab *Purgatio.*
Elephante vindicar.

Utatur decocto sequenti quo die, lacte non utetur.

24. Radicis consolidaē maioris, scrophulariæ minoris, enulae camp. in oxycrato, temperatæ filipendulæ añ. ʒ. ss. faniculæ, buglæ, bellidis, pilosellæ, bipinell. robertianæ, beton. añ. m. ij. glycyrr. paf. sul. añ. ʒ. vj. florum cord. p. ij. fiat decoctio capiat ʒ. iiii. pro dosi cum pauco vino albo & syrup. capill. veneris, instar apozematis. *Apoz. ma.*

Parti applicetur lamina plumbi fugituo illiti, vel, ʒ. Empla-
strum diachyl.ireati ʒij. gummi ammoniaci aceto soluti ʒf. fiat
emplastrum.

Scrophularia ipſo nomine & fronte mirum quid promittit ad curationem choeradam, ſed in exoluendo promiſſo languet, viribus æquat Aron ſeu ſerpentariam calidam & ſiccā, valet ros ſolis, herba dicta, & pes cati ſiue pilofella minor.

Si tumores colli sint contrumaciores, valet hoc emplastrum.

24. Emplastri de vigo, duplo mercurio $\frac{3}{4}$ s. emplastr. de cerusa, malaxentur sine oleis, emplastrum diuinum mirifice confert. Emplastri
opimum.

Radix herbæ quæ dicitur gladiolus confusa cum rosato Mesuæi
prodest tumoribus istis, & per dies quadraginta detur ʒ℥. pulueris
illius radices miro euentu.

Valent opiata ex conferuis cardiacis non calfacientibus.

Valent hordeata tempore legitimo præscripta horâ somni.

Miraculo proficere aiunt iaccam albam, (quam speciem violæ esse aiunt) item papauer rubrum macerant in vino, contundunt, mucaginem tumori choeradico applicant, id remedium temperando prodest, & eas habet dotes quas requirimus in remediis strumarum, exclusis calfacientibus, & nimium siccantibus.

CONSILIVM LVII.

De contumacibus ruboribus post exanthemata.

Consultum est vt æger sumat cassiam sæpè, diluto vino vtratur, minuatur sanguine, serum lactis sumat, aut lac asinæ: lauetque faciem eodem. vel

Vnguentum. ʒ℥. Rosat. mesu. lauti in aqua nenupharis ʒ iij. nutriti ʒ f. pulueris vnguenti citrini ʒ iij. pro litu faciei. Sed noctu lintecum vinctum imponendum est.

Pomata cum oleo ex frigidis semin. confert.

Lotio.

Paretur lib. i. f. emulsionis ex seminibus frigidis & amygdalis contusis in decocto anagallidis, hordei, floribus nymphææ, sem. & foliis acetosæ, adde ʒ iij. aquæ nenuphar. lauetur facies, aut aqua liliorum cum troch. alb. rhasis. vel

Accipe sex pedes veruecinis, contunde cum carne & ossibus: coque totum in aqua, quæ post fiet mucaginosa, lauetur facies: satius erit accipere aquam nenupharis aut plantag. quæ miras habent vires ad faciei nitorem in quibus soluitur caphura, aut maceratione sem. psyllij.

Item valebit cremor lactis cum aqua rosarum, aut oleum de vitellis ouorum: vel accipitur frustum lardi antiquum, coquitur in vino rubro ad perfectionem, vbi refrixit pinguedo supereminens asseruatur vsui. Duretus radit frustum lardi ramenta diu macerata in aqua fontana aqua rosarum excipit & vasi calido imponit.

Duresis pomata.

CONSILIVM LVIII.

De serpigine, specie tineæ & pityriasi.

Temperamento est melancholica per adustionem quandam, & id habet à stirpe generis nobiliss. mulier. Purgabitur opiat laxatiua, ex herbis conuenientibus, hepaticis, & splenicis, senna,

Purgatie.

rheo, syrupo de agrimonio Rondeletij, byzantino, regis laboris, additis conferuis conuenientibus, cassia in sero lactis, senna cum decoctio carnis vitulinae.

Parabitur syrupus ex succis, cum granis Kermes & fructu haliacabi, at inter cetera recenti. Æstare huic syrupo addetur succus ceraforum, additis ocellis id est floribus veronicae altilis, hic confert hypochondriacis.

Detractio sanguinis certa de causa est præter missa, id medici domestici ex prudentia pender, inde forte malum est rebelle magis & inextricabile vt loquitur Plinius. Medicus etiam prudens anceps est & labat. pomaceum defæcatum conferet, cui tamen vinum dilutum præferatur. Lac asinae aut caprae, vt vitetur hectica diathesis, vitanda est nimia abstinencia & ieiunium, serum lactis colatum cum syrupo violato, iuleb. rosato. Balnea cum herbis non calidis, sub finem adde 24. lb. lactis, antè addatur furfur anagallis, palea hordei. Epithemata ad cor valent.

Balnea.

Valet pasta deterfua ex amygdalis nudis, maceratis in aqua rosarum & nenupharis, mica panis secalini cum melle, iride florentino, farina hordei, fabarum cum medulla gummi tragacanthæ, extracta in aqua scabiosæ, aut eius decocto addita acetosa, sunt qui addunt mucorem aut infusum, ari radice siue serpentariæ. A fotu & balneo litus conferet ex ʒj. rosati Mesuæi cum 3j. pulueris mercurij dulcificati: aut applicatio laminæ plumbeæ litæ mercur. dulcificato vnguent. diapompho. de cerusa.

Pasta.

Litus.

Panis in lacte subactus: cucurbitulae siccae & cornicula.

Decoctum ex anagallide, furfure, hordeo, vt antè dictum, fotus ex radice althææ, fol. acetosæ, violariæ primulae veris, anagallidis, caulibus rubris, cum melle simplici, aut rosato, aut mercuriali.

Fotus.

CONSILIVM LIX.

Pro filia D. Habert cui tumores in collo, & ulcera in gingiuis soboles diatheseos strumosa.

Multa de cerebro dicta sunt cur frigidum & glutinosum, item de tempore, quod à sero putri morbi grassantur,
X ij

164 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tempora enim à sua temperie degenerarunt, quæ nunc præter-
mitto, glandulæ colli sunt quasi depositariæ cerebri, aut malè affe-
cti, aut prauo humore onusti: Et vlcera multa vidimus, & diros
abscessus, in quibus quia interni iuxta & externi erant, curis con-
trà se afficerentur, quia vlcus iatus, foras, & contrà penetraret, hinc
gingiuarum labes humore traducto & transmissio.

Purgatio.

Consulendum capiti, repurgandum etiam tabella diacarthami,
de citro, aut succo rosarum.

Syrupus.

*Hinc miras
dotes tribuit
E. H. S.*

Syrupus magistralis cum chamædry, chamæpity, tertia specie
symphiti, aut potius tertia specie oxylapathi quæ bonus Henri-
cus dicitur, agrimon, salvia, vita, veronica, vulnerariis herbis, pauca
medulla Guaiaci, pentaphyllo, addatur rhabar, fenna, agaricus, sy-
rupus byzant. rosar. pallidar. succus, aut decoctum florum
perfici.

Opiata.

Loco syrupi fiat opiata ex decocto simili & laxantibus, addendo
conseruam violarum, buglos, nenuph, melissæ, betonica, corticem
citrij, cum puluere sarsaparillæ, scynæ diathodone abbat, adden-
do duas tabellas de succo rosarum.

Decoctum sudorificum blandum.

Cucurbitulæ scapulis: hirudines temporibus: Emplastrum
de betonica capiti.

I.

Horâ somni conseruæ cephalicæ mediocres non calfacientes,
errhina ex non calidis conferent quæ blandè suum mucosum &
capite eliciant.

Foris quadrantia ceronea, cataplasmata ex farina lentium,
orobi, fabarum, cocta in hydromelite, addita therebinthina, em-
plastrum diuinum, diuinum effectum, & officium præstabit.

Potui domestico vino, aut aquæ addatur sarsaparilla, aut
scyna.

ANNOTATIO.

1. In usu errhinorum magna cautione vtendum est, siue vtendū
tempus & particulare & vniuersale consideres, siue materiam. De
tempore quod duplex est, particulare vt singulis diebus, aut manè,
aut vesperi, vesperi omnia sunt cruda, manè cocta & parata exclu-
sioni, sic quod errhinum commodè vsui esse poterit matutino tempore,
vesperi inutile esse poterit à cœna; manè enim sequax & obediens est
materia, vespere rebellis: serò crassa per cruditatem, manè

per coctionem, crassa fit enim, lauis, & aequalis, sic minore negotio extunditur; quod pertinet locus celeberr. Hipp. 3. de dieta, nares citra causam apertam à cœnâ implentur, & repletæ esse videntur, emungunt autem nihil, ubi manè deambulare & exercere cœperint, emungunt ac spuant; mucus & salina, repletionis sunt xpiis i. index & signum: quiescente corpore meatus spiritus illa obstruant: ubi calefactum est corpus præ labore attenuantur & excernuntur.

De tempore particulari dictum est, de vniuersali dicendum. Alia errhina æstatis tempore, alia autumnii, alia hyemis vsui esse debent: in materia ferè peccatur, ferè enim omnia ex herbis calidis & siccis parantur, ut hyssopi, maior stœch. anagall. cui postremæ vis inest maxime deterforia, desiccatoria, & ob calorem nonnullum attractoria. At magna hominum pars non mungit facile, ob siccitatem quandam & caliditatem quæ inest in capite, id genus sunt biliosi, melanch. atrabilarij, qui curis & solitudine animum exercent, ab eorum enim naribus nil excernitur, nisi partes hæ fuerint præhumectatæ. Ideo Hipp. 3. acut. dicebat balneo nares humescere, sicque valèt potius quæ suo blando calore & halitu humido partes istas tepesacient: de maioranæ pugillo in aqua multa macerato dici hoc potest, quod tutò usurpatur à nonnullis; tutius betæ, & anagall. succus, hydremeli. ad deterg. & humect. conferre potest.

Pro diuersitate temporu varia errhina usurpantur.

CONSILIVM LX.

Ad ardorem & reliquias antiquæ Gonorrhœæ.

Cogitatur de isto fluxu non omnino sistendo, sed moderando, in id præscripta victus ratio conueniens.

1.
Emulsiones.

Consultus vsus emulsionis ex decocto hordei amygdalis semper, vermiculari, sem. frigidis, aqua plantag. & rosarum, syrupo violato. Bolus ex cassia, rheo. cum terebinthina & diatrag. frigid. pauca conferua nymphææ, sub finem, cum rheo solo pro litu ad perinæum rosato Mesuæi addatur parum argenti viui in succis saluæ & limonum extincti profunt temperata, si calor adsit, inie-

Bolus.

Litus.

166 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Ationes ex refrigerantibus aquis, hordei decocto, lacte, vulnerariis herbis: tandem ad aluminosam aquam deueniendum.

Vfus conferuæ rosarum nenuph. cum cydoniato Aurelio & myrobalanis conditis.

Opiata.

Pilule.

Bolus.

Iniectiones.

Opiata laxatiua ex conferuis aptis, rheo, & senna: vel tabellæ roborantes ex santalis conf. ros. Karabe, & rheo: item pilulæ sub finem vsui esse possunt, ex aloë lota, Karabe, senna, rheo, pulu. iunip. & hederæ, except. tereb. aut syrup. de althæa. Alternis diebus exhibendæ sunt tabellæ diatragacanthi. syrupus additis herbis vulnerariis halicacabi fructu, ciceribus, transcolata: conferua rosacea valet pro pœtu, aut decoctum scynæ cum rad. cich. aut cum oxyacantha. Sed quia æger est salax & libidinosus, id quod fluxum ad partes imas prouocat, danda quædam remedia quæ semen minuant & quæ ad sterilitatem faciunt, aqua rhabarb. in qua radix sanamundæ pentaphylli incoquatur, hordeata conferunt.

Item terebinthinæ parum lauræ 3 ij. mellis parum, pulueris diatrag. frigidi. 3 j. fiat bol. meminimus ante iniectionum. Iterum dicimus eas parandas ex hordeo, palea hordei, veronica, pilosella, bellide, semine cydoniorum, psyllij, consolida, medulla guaiaci, agrimon pentaphyllo, plantag. florib. hyperici, cum syrup. absinthij, rosarum siccarum melle ros. Trochiscis albi rhasis, sub finem malo rebellante. alia iniectio conueniet ex aqua plantaginis myrthi, solani vel decocto eius, cum trochiscis rhasis & pauca aqua aluminosa, vel tantillo hydrarg. dulcificati.

ANNOTATIO.

1. Videndum sedulo ne diuturnum ceruicis vesicæ vlcus nobis imponat. Ex hoc enim, curatâ interdum gonorrhœâ, perinde atque, è proflatis post diuturnas gonorrhœas purulenta quædam illuies, aliis in totam vitam, aliis donec iusta curatio adhibita sit, stillare & ægri indursum commaculare consuevit, quæ Gonorrhœam emittitur.

CONSILIVM LXI.

De Satyriasi.

Quidam vxorem duxit, post aliquot annos laborauit satyriasi, cæque vehementi & molesta, longè ante Gonorrhœa laborarat, à qua liberatus erat, & à matrimonio vxor eius ne minimum incommodi senserat; viscera habet calida & æstum internum (is enim est temper. melancholicus) sæpè conquerendo obicit. sentit acrimoniam & nitrosi humoris velut insultum & impetum. T.
Causa. Opinio primi deliberantis saluo nostro iudicio, vt benignè præfatus est, fuit, vt enematis primum consuleretur, phlebotomiâ, blandis medicamentis non neglecto respectu humoris melancholici additis feminibus viticis & nymphææ. Probauit quoque balneum, lac caprillum, opiatam ex conferuis refrigerantibus, & aliquantùm corroborantibus, litum ad partes naturales & lumbos ex nenupharino. Oleo & rosato Mesuæi. Animo & corpori prouidendum putauit: Animo contrà pathemata, quòd ad illecebras & imaginarias voluptuarias cogitationes attinet: cogitatio voluptuaria cum illecebris semen auget alliciendo & sensim deorsum attrahendo, maximè cum picturas pulchras, aut mulieres cogitant, aut vident. Litus.

Vtatur iusculis æger cum extremitatibus vitulinis & gallinis cum hordeo & passulis, ita moderatos esse oportet vt contemperatio adhibeatur, & stimulus veneris omnino non tollatur: valet syrupus de pomis simplex & cum senna, syrupus nenupharis, iuleb. rosatum, syrupus violatus. Opiata laxatiua cum senna, tamarindis, materialibus syrupi de cichorio composito, cassia, manna, conferuis temperantibus, tabellæ diatragacanthi frigidi ex intervalis. Opiata corroborans, Balneum vniuersale & particulare; lac asininum, serum lactis clarificatum cum albuminibus ouorum, addito syrupo violato & iulepo rosato, aut saccharo violato, aut buglossato. Iniectiones in penem ob glandulas malè affectas, aliquando ob vlcusculum in glandulis ipsis. Opiata.

Alius sit semper mollis, vel arte, vel natura: qui aluo sunt sic-

cioire, sunt libidinosiores (quanquam hoc disputari potest) priapismo, satyriasi, & gonorrhææ obnoxij magis. In pelui lacte plena infideat, addita portulaca, trifolio, nymphæa.

Aeizoon & cichoracea sunt minus apta, quia generationi obesse dicuntur.

Sunt qui laudant trochiscos de camphora.

ANNOTATIO.

1. Aliud est homo insulsus, aliud fatuus, ille caret sale, & non excitatur facile ad venerem, fatuus non potest facile explicare venerem & explere, senex vanum trahit laborem, licet excrementa sint sulsa & nitrosa: unde gementes dicuntur à comico. i. tussientes & quasi gemebundi ob excrementum nitrosum, ideo dantur lenientia ad sputum mouendum non calida ut in astmaticis à copia, unde laudatur pulgium quod vitia pulmonum facit excreabilia, ut loquitur Plinius.

CONSILIVM LXII.

De vertigine & symptomatis melancholicis & hystericis.

Causa.

Offensis obnoxia infirmitas ait Celsus.

OMnibus diligenter expensis, iudicamus oculorum suffusionem & tenebrosam vertiginem, à vaporibus melancholicis, tam ab hypochondriis quam ab utero elatis originem ducere: quamobrem distinctione opus est, & affectuum partium maxime habenda ratio. nam remedia quæ utero suam dicarunt operam, calida tenuiumque partium boni vel tetri odoris hypochondriis nocent, vertiginem augent, capiti, iecori & præcordiis plurimum obfunt: sic iudicio opus est, ut prima mali causa innotescat, & cæcognitâ, legitima præsidia adhiberi queant. Obseruatum est N. D. à teneris annis capitis doloribus fuisse obnoxiam, quæ causa esse potest cur hæc pars citissime afficiatur. Et ad id non mediocriter conferet exquisitus neruorum & cerebri membranarum sensus, idè non probamus remedia calida & odorata, seu interiùs assumpta, seu exteriùs adhibita, siue in balneis (magnoperè tamen profuturis) seu

seu in fotibus regioni ventriculi admouendis, iuuandæ coctioni & flatibus discutiendis dicatis & acomodatis.

Delectus sit ciborum; humectantia maximè conferunt, à cali *Vitus* dioribus & siccioribus alimentis abstinendum.

Moderanda omnis animi actio & contentio, cura & negotiorum grauiorum tractatio seu. *πλυαραγμοσιν.*

Aperiat ex interuallis vena brachij, aut temporis dextri, si dolor vrgeat, aut crebrius vertigines adorianur. *Phlebotomia.*

Vtatur opiata & consgrua solutiua à D. Quercetano præscriptâ, quam si respuat, eius loco parabitur syrupus magistralis, non minoris virtutis & efficacæ, si hysterici diuexetur symptomatis, clysmatis vtendum, vitandaque erunt, peculiari de causâ, nisi urgente maxima necessitate, fœtida naribus admouenda. Somnus conciliabitur syrupo nymphææ cum tantillo diacodij vt exquisitior partium sensus spiritusque quodammodo consopiantur, conuenienti tempore balnea aquæ tepentis fumo & odore carentis ex vsu erunt incoctis foliis viol. nymph. bugloss. lapathi borrag. Et vitis æstatis maximè, hora somni cap. conscr. rosar. bugloss. borrag. cum tantillo cons. melissæ & consolidæ. Denique maximè prouidendum, vt cognoscatur fons & origo affectionis huius, nam dolores acerbi de quibus conqueritur N. D. non omnino ab vtero, sed ab hypochondriis & cerebro repetendi sunt, quod quadam confortij lege seu per sympathiam laborat & cuius maximè habenda ratio est.

CONSILIUM LXIII.

De morsu canis rabidi.

IN omni morsu cauendum, etiam si non rabiât, dente canis omnis virus gerit. Teneatur vulnus apertum per dies quamplurimos, parte morsa si non sit neruus, aut tendo insignis scapello est scarificanda pars, aut sangui sugæ admouendæ, & cauteria sine magno dolore, applicanda cucurbitula, aut pullus per medium sectus, cataplasma valet ex allio, fermento, capâ, theriaca, & momento salis. Stercus columbinum cum ruta viridi, panis è clibano extra-

*Cucurbitula
cum scarifica-
tu.*

Cataplasma

Y

170 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ctus, aut tostus vino, aut aqua vitæ madefactus. Celsus admouet ceram cum resina, ammon. Galb. allium, mel, sinapi cum nucibus; Oxalis sumpta, & admota cum allio & fermento prodest, ne laetur vlcus aquâ solâ, alioqui decreto omnium est incurabile, æger injiciendus in aquam, vt cogatur liberè, vino cum sale, aut muria ablui potest vlcus. Theriaca sumpta, admota, & quia æger adierat aquas marinas, & rubor insolens apparebat in facie sanguis detra- hatur ex vtraque basilica, lotio faciei valet cum lacte asinino & anagallide: bis in hebdomada blandè purgetur decocto sennæ, ex bipinella, scordio, eufrasia & buglossò.

Pene scilio.

Ius bipinellæ & acetosæ cum vino albo paucò alexiterium est, pugillus madeat in vino, opiata vsus, conserua cum puluere can- crorum fluuiarium, aut eorum puluis cum vino albo per multos dies ore sumptus.

Sudorificum blandum vsui esse potest cum aqua scabiosæ, bi- pinellæ, vlmariæ & theriacali, impositis lagenis aqua plenis, præ- missis remediis sequi. de balneo controuersia esse debet.

Purgatio.

℞. Meliss. oxal. bipin. scabios. scord. añ. p. j. sem. ocymi, & cardui añ. 3 s. fol. senn. 3. s. caryophyllo 3 fiat decoct. in qua infunde rhei elect. 3 iij. cinn. 3 j. in colatura diss. syrup. ros. pall. 3 j. conf. hamech. 3 iij. fiat potus.

Opiata.

℞. Conf. bugl. borrag. anth. añ. 3 j. conf. meliss. cort. citr. cond. sal- uia añ. 3 s. pul. canc. fluu. 3 j. s. theriaces. 3 ij. fiat opiata cum syrupo de pomis, vtatur manè & vespèri.

Syrupus.

℞. Rad. oryl. 3 j. rad. & fol. acer. m. j. bipinellæ, rutæ meliss. scor- dij, plantag. vetonicæ & beton. añ. m. s. rad. sanam. 3 vj. sem. ocymi & cardui añ. 3 j. s. fiat decoct. in aqua bull. fol. orient. 3 iij. festuca- rum ellebori nigri 3 s. dissol. in colatura tabellas elect. de suc. ros. tres syrup. ros. pallid. 3 iij. fiat syrup. cap. bis hebdom. cum aqua scordij, & bipinellæ 3 s. aut 3 vj. pro qualibet dosi.

CONSILIVM LXIV.

*De affectione hypochondriaca pro angenosij
uxore.*

Non est artificis rationem semper reddere cur id vel illud ægro præscripseris cum & artis, & vsus fiducia pronuntiet, edicat vt artifex. hoc vel illud faciendum denique *αὐτὸς ἐφα* ne si rationem reddat hæsitanti ægro & omnia secura metuenti maiorem hæsitandi occasionem prætexat ac insinuet. Medicorum, & aliorum in arte magistrorum decreta, tanquam senatus consulta esse debent, quorum ratio vt omnia arcano pectore conclusa non nisi loco & tempore ab eo tanquam ab oraculo elicienda est, tamen apud magistros artis succinctè & præcisè, non ad pompam & fastum dictorum factorumque rationem reddere medicus consortione officij, vt frater non erubescit, nec eum quantum id fiat pœnitet, modo ad ægrotantis salutem id referatur. Certis argumentis collegimus in nobili muliere, cui nos remedia præscripsimus aliquid esse hypochondriacum, quod nomen habet aliquid latentis energix quæ opinione maior est, & plura se effectu promunt & efferunt quam nomen & affectionis ratio promittat. In intemperie cal. sicca primarum venarum, vnde alimenti non sit elixatio halitiosa, sed assatio fuliginosa & *λιγνώδης*, & in phlogosi dioclæa consistere videtur, quasi verò, tot symptomaton quæ hypochondriacos querulos, & ærumnosos reddunt fibræ, soboles, propagines, ab ista tantula intemperie tanquam ab antiqua matrice & radice pullulent & oriantur. Adeò obscurè eius affectionis reconditior est cognitio, manifesti tamen effectus, licet origine noti, quia dispositio hypochondriaca & fautrix & alumna, hæc tamen non facile agnoscitur, in hypochondriacis sanguis est acriusculus, nitrosior, alendo ineptus, quem & carnes repudiant, & neruis molestus est, vnde punctiones, stupores quasi paralyseos minaces, mille querelæ, mille tædia, dolores animi, & corporis, mille cruciamenta, fixi, vagi dolores, quasi maligno spiritu errabundo, & ab incerto fomite nascente, per omnia penetrabundo tanquam lu-

Y ij

pus est qui patrem non vidit, hic dolendi & querendi non est intermissio. Tabescunt & in dies macrescunt tantisper dum *ευεξία* habent atque *ευστασία* ab iis radiis immunes sunt, maximè dum calor in humido radicali nutritur, & fouetur, dum halituosus est, sed dum *ἐκλαμψον* is facit, & acriusculus fit, non ampliùs irriguo humore radicali fatus, tepesfactus ac mansuefactus tunc, hypochondriacos affectus, ut latēs anguis sese prodit & sensim nitor faciei deperit & *ευεξία* tollitur, dilabatur corpus, ac extenuatur, nec priùs hypochondriaci meliusculi sunt, quàm cum pinguescunt, licet primus nitor atque *ευστασία* sit irreuocabilis, unde Aristoteles & Physici; Melancholicos dicunt medicinam appetere, quia eorum corpus pungitur ac dolet, & infœlicibus plantis, ea conterunt ut prius dictum ac mirati sumus in agra nostra factam mutationem ipsius habitus & *ἔξω* corporis. Antè paucos annos corpus habuit *ευστασιον* quasi *ευεξία* habens, cum coloris suauitate, ut videretur quasi præ mole corporis *ἀναρππος*, nunc macra ac dilapsa apparet, & ab eo tempore morbi & dolores apparent, ac sobolescunt *ευεξία* bona ut signum & ut causa. habet *ευστασία* multa commoda, aut pauca, aut nulla, nisi fortè mouet illud Hippocratis, conducit ad sapientiam, ut minimè carnosì sint homines, nam ad carnis *ευεξία* ardoris inflammatio consequitur, cum autem quid tale accidit aqua superatâ homo ad insaniam adigitur, attamen dictum iam ante carnis bonam *ευεξία* in iis quibus astant viscera, & qui in album hypochondriacorum referuntur, procurandam esse, nam in his post maciem *ευεξία* est quasi sanitatis terminus & ad bene de agro sperandum signum: immo ad morum suauitatē valet, id declarauit Cæsar qui minus metuebat à Dolabella & Antonio, utroque elegante succulento & florido, quam à Cassio & Bruto macilentis, subristibus & strigosioribus, itaque id dare operam oportet in agra nostra ut elisis, si fieri possit, fibris affectionis hypochondriacæ quæ falsò credita paralyses rudimenta, dolores, inflammationes & mille rædia alia suscitât ut primæ *ευεξία* restituatur. Id fiet idoneâ victus lege, purgatiunculis sæpiùs repetitis, phlebotomia parca manu celebrata, clysmatis refriger. hordeatis, emulsionibus addito semi. pap. albi, balneis, lacte asinæ.

In historia de
Bymontio.

de diætâ ad
finem.

3.

Macri magis
formidandi
quam floridi
& succulenti.

ANNOTATIONES.

i. Sic apud Comicum in Andr. obsterrix dicit, date bibere quod iussi,

date quod imperant, sic auctoritatem medicorum imitata.

2. Vnam maxime notandum de melancholicis quod maxime habenda sit ratio adustionis, & caloris adurentis propterea non simpliciter calor considerandus id testatur natura, conditioque tumorum ab eo humore natorum, nam plumbum & cerusa maximum auxilium adferunt. Quid ita? quoniam est virus quoddam iunctum cum adustione, quod solatro plumbagine cerusa, plantagine, emendabile est, ceteris impendio magis irritatur & efferatur.

3. Melancholici pinguefaciendi sunt alioqui eorum humores ferociunt magis, dulcedo enim alimēti temperat & suaviorēs mitioresque reddit humores, contra quia melancholici perpetuo conqueruntur molestumque rei cuiuspiam sensum habent, putant extenuatione, purgatione, sibi opis nonnihil posse adferri, at contra fit, nec enim tam quantitas humorum molesta esse solet, immò bene habent illi cum evēgia compararunt, dummodo evēgia non impediāt difflatum fuliginum, quæ etiamnum in talibus visceribus generantur, nil itaque tam noxium est quàm fames, abstinentia, extenuatio, & si in aliis extenuatio iram prouocet multò magis in melancholicis consilium est Hipp. dum loquitur de iis quibus aspera arteria exulcerata est ob acres fluxiones, & tussis iugis, est permolesta, studium curaque esse debet, ut ij reficiantur & quam crassissimi fiant, denique necessum est ut idem hic contingat quod arboribus quæ æstatis initio ad ferendos futuros æstus umbram sibi ex foliis & pampinis comparare solent, nam talia corpora similia sunt arboribus quæ in regione arida & siticalosa nascuntur, ait Themistius.

Bonus habitus confert melanch. dummodo difflatum non impediāt.

Hipp. lib. de diet.

CONSILIVM LXV.

De cholera morbo pro D. Angetio.

Magni refert, ut qui reip. utiles sunt & bene præstiti muneris, officiique fiducia sint commendabiles; firma sanitate fruantur, salus enim reip. cum eorum salute coniungitur, & ex valetudinis detrimento, resp. nonnihil capit detrimenti. Sic olim inter vota quæ pro principe nuncupabantur, id primum, ut vita proluxa foret, eodem

Y iij

174 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Cholera du-
plex humida
& sicca.*

*Celsus sic lo-
quitur.*

*Eadem sunt
præcauendo-
rum & eu-
randorum
morb. præsi-
dia.*

*Facile quis
securus est in
iis quæ sine
periculo eua-
sit ille solli-
citari debet
cui hæc noua
sunt Cels.*

& iure pro magistratu idem fieri debet; quæ causa fuit vt vnum de
D. Trancautio ascribere officij nostri ratio monuerit, quod ad
eius salutem apprimè pertineat. Cholera morbus sæpè nobis
& videntibus & medicis eum sæpè præhendit, morbus ita acutus
& præceps vt ferè & vitæ filum præciderit & ita præceps vt tenui,
extremaque spe salus eius penderet, facies illa Hippocratica cum
oculo cauo characteris & coloris mutatione apparebat, apud
Hippocratem cholera, morbum acutissimum *ὑπὸ τῶν χολάδων*
dictam quod *χολάδες* intestina vocentur *τοῦτο τὸ χολάδες τῆς ἡπα-
τος δὲ χολάδα*. duplicem reperio, vnam humidam: siccam alteram; in
humida est perturbatio ventris immodica bilem per vomitum &
deiectionem excernentis. Morbus hic facillè hominem consumit,
ob defectus animi, frequentes bilis & crudorum humorum ex-
cretiones, quas excipit *ἐφιδρώσις* pulsus vermiculans, surarum
contractio, & tensio, frequens morbus, iis quibus, aut alimentum
in lactibus corrumpitur, aut non distribuitur, & effectus salutaris
est, quia si æger supersit sanior degit. Sicca cholera dolorifica est,
quia fit à maligno flatu distendente & diuellente; iis familiaris est
qui aut fungis vescuntur, aut valde crudis alimentis, mixto vino
generoso, pipere, sale, allio; nulla penè fit excretio, quod flatus
obicis instar impedit, sed venter differtur dolore ac quasi distum-
pitur. humida est cholera quæ dominum afflixit, & nisi repurge-
tur antequam morbus sit redux, aut vena illi secetur si quid vr-
geat, verendum, ne oscitans, imprudens, & nimium sui securus op-
primatur, & quoniam omnis mali præuisio est inutilis ni ad eum
cautio ad hibeatur, ideò medicus familiaris & sæpè in aurem per-
sonet quid & quantum periculi re neglectâ ingruat; Summaque
rerum in eo est, vt bona victus lege vtatur, vt blando medicamen-
to tertio quoque mense vtatur, hæc præcautio morbum immi-
nentem arcebit cum faciliùs excludatur morbus, quàm iam in-
troducitur expellatur, & quanquam de eo morbo aliquis securus
esse potest quo sæpè depræhensus ab eo liberatus est, tamen ea fal-
so credita securitate, & à periculo liberatione, non est viri boni sa-
lus sæpiùs periclitanda, hic enim canon prudentiæ apud comicum.
Quod cauere possis, stultum est admittere;

CONSILIVM LXVI.

De febribus diariis hectica prodromis & rene purulento.

D. Robinelli vidua laborat intemperie calida sicca quæ febris hectica minax est, & cum non videatur febricitare, habet quædam diarias, quæ febres hecticas, aut veras, aut nothas prægrediuntur, vt aliàs ex Arculano annotauimus, verus quoque est querela renis purulenti, immo nescio quod tabum, aut semen maleficum circum partes vteri stabulatur, quod conspirat in eius perniciem, fouet, & alit alia mala sic, vt continuatio, & series quædam sit malorum, hinc illæ lachrymæ, hinc illa misericordia, & medicorum aures perpetuò obtunduntur, ac verberantur, hinc reperimus verum illud Hipp. summum est bonum sanitas, diuitiarum, aut bonorum corporis nulla est vtilitas citra sanitatem: nec mirum si artis præsidia eludantur nam naturam obscuram, (id est intemperies & quæ ab ipso sunt fata) mutare difficillimum; non transformantur, corriguntur quidem. Et mirum cum veteres calidæ intemperies, ætatis flexu & fluxu curentur, aut minuantur per Hippocratem. Cur hæc mulier veritatem illius oraculi Hippocratici non persentiscat, maximè vero cum in victus ratione non peccet, præter intemp. etiam malam partium diathesim, atque *diaphoriam* accusare licet, tot symptomatum causam. Corrigendæ ergo intemperiei conueniet vsus syrapi ex succo plantaginis vtriusque, acetosæ, lamij, addito nenuph. ex iuleb. rosato, vt molestias caloris adurentis & hæmorrhoidum deuilet. Pomatio vtatur, opiata laxatiua, qualis post describetur: clysteribus ex sero lactis addito butyro, plumbeato, qualitas enim plumbi hic apprimè confert, vel iniiciuntur hordeata, vel aquæ refrigerantes cum mucaginibus. vtetur emulsionibus, item pasta (in formam massæ panis) in quam iagredietur semen papaueris: in calore isto & phlogosi conferunt glutinosa, & lenta quia cum suo lentore domant & temperant, vt de glycyrrhisa aliàs annotauimus. Immo est de-

L. 3. de dieta.

I.

In epid. morbi conuulsi in senectâ relinquent

Gal. in comm. interpretatur de calidis.

2.

176 CONSILIORVM MEDICINALIVM

liberatum num litus ad lumbos ex hydrargyro pauco conferret.

3 lib. meth.

Cassia valebit, quanquam in ardore renum Rondeletius (nescio quo motus consilio) cassia interdicit, quia ait, calfacit propter non nullam quam in se habet caliditatem.

Ibidem in meth.

Sed & ob vlcus verus renum quidam consulere vsu decocti sudorifici. Ita Rondeletius. post euacuationes vtile erit promouere sudores, vel ingressu, laconici, vel guaiacino cremore qui mouet sudores, vlcera terget, copiam vrinae minuit, sic in omni vlcere renum, & vesicae iuuat, & hac quaestio est de apicibus artis.

Iniecti clysmi ex mollientibus plantag. foliis papau. seminibus frig. & femin. papau. semine psyllij cydon. coctis in sero lactis. Ad-dita est aliquando clysteri 3 s. pilulae de cynoglossio.

Facta est opiata soluens ex 3 ij. foliorum fennae coctis cum al-thaea, fumaria, plantagine, bipinella, cicerbita, rostro porcino, pass. dissolutae sunt 3 ij. cassiae additae 3 vj. thamaris, mucaginis seminis psyllij extract. in aq. parietar. 3 vj. vsa est ad 3 j. praescriptus syrupus de papauere rubro, data quotidie mane de hac opiata sequente ad quantitatem nucis.

24. Conser. ros. nenuph. añ. 3 iij. ras. eboris, cornu cerui, elect. tria-fant. añ. 9 ij. limaturae chalibis praeparatæ 3 iij. cum syrupo de ci-chorio simpl. fiet opiata ad vsu.

ANNOTATIONES.

1. Optimum bene valere, secundum formosum esse: tertium habere diuitias nulla fraude quaesitas, ait Plato in Gorgia.

Hipp. οὐ γὰρ οὐκ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν φύσιν νοσήσασιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐκείνων.

2. In doctrina Hipp. sunt morbi congeniti seu connutriti, Plinio pa-rentales dicti, qui vt hereditates ad posteros veniunt atque in manci-patum suntque aeternae possessionis, sic in eos morbos non est longioris temporis exceptio.

CONSILIVM LXVII.

De Rheumatismo.

Malpignius ci-tat libellum

Vxor D. Piiartij Aurifabri videtur laborare ea affectione quam ρευματισμὸν vocamus de quo libellum dedita opera exarauimus

exarauimus, cuius vis in eo consistit, vt & effluat in habitum humor, aut impulsus à partibus internis robustis, aut rigato toto musculoso genere per *δυσχυσιν* quandam humorum in habitu contentorum: immo vero id fit forte & per impulsione, & per attractione. Itē vis cōsistit in eo vt à parte in partē subinde fiant translationes, vnde tandem insignis circum articulos abscessus excitatur, in plenitudine & cacochymia id maximè excitatur, vt Holle-rius annotauit, vulgus ad caput id refert & soli capiti studet, ratus fluxionem esse à capite. Gal. ad robur partium principum se se liberantium prauo humore dispendio imbecilli corporis habitus, in quem relegant deponuntque suas sordes. Duo sunt loci commemorabiles, qui non longè sunt dissimiles huc adducendi vt ex iis demonstratio aliqua defumi queat, prior est in aphorismis, cum loquitur de fluxu immodico sanguinis: Fieri potest, ait, si ora vasorum ad vterum pertinentium plus æquo aperiantur, & si sanguis, vel tenuior, vel calidior fiat, & totum corpus ob aliquem malum habitum grauetur sanguine, licet suam symmetriam copia non excedat, expellit ideo ad venas vteri, vt accidit *ἐν τοῖς πνευματικαῖς διαθέσει* in quibus aliàs in aliam partem fluxus fit, fieri potest (inquam) vt immodica mensium sit euacuatio.

Alius locus est Gal. de venæ sect. partes imbecillæ, ait, excrementitiis morbis capiuntur hâc ratione *τοῖς πνευματικαῖς διαθέσει* fieri scito, vniuerso corpore imbecillo existente, quæ vna est aliqua, *καχεξία*, id est, mali habitus species, principibus illius partibus, licet in iis paucus sit sanguis, grauâri solitis, eumque ad carnosas iuxta cutem partes protrudentibus, & magis ad glandulas, & cat. Et paulò post, Quibus pulmo, lien &c. cerebrum, carnosio genere natura sunt robustiora, in iis ad glandulas & carnes fluxiones perueniunt, cum præsertim, vniuersus corporis habitus imbecillus fuerit, vt *ἐν πνευματικαῖς διαθέσει*. quo in casu Gal. roborat partes, euacuato priùs sanguine, licet imbecillitas sit carniū, & mitum quod immodicus non est sanguis, suam enim symmetriam quantitate retinet, quare ergo grauantur partes? si modicus est sanguis, imo si parcior vnde tanta *πλεονεξία*. Aiunt id fieri ob imbecillitatem partium, nam imbecillo homini exiguum etiam pondus oneri est, & cum partes robustæ sese exonerant in genus musculosum & glandulas, fit quadam plenitudo ad vires. Ego verò non tam ad quantitatem sanguinis id reuoco, quàm ad vitium quoddam eius, imbecillitas partium & habitus non est sine morbo, ca-

*sum de reben-
matismo anno
1643 editum.*

*Lib. de mater
ebirurg. cap.
de repell.
8. cap. de sang.
missione.*

8. cap.

I.

Z

178 CONSILIORVM MEDICINALIVM

chexia ipsa & summa decoloratio habet & designat aliquid καχεξία. Non in aliqua euacuatione sanguinis & corporis externi, habitusque roboratione salus ægrotantium consistit vt placet Galeno; alia quædam ratio inquirenda est vnde videmus & cachecticas & decolores virgines non iuuari, aut sanguinis detractione, aut purgatione, (licet vtrumque queat vsurpari, sed curatio non inde pendet) balnea naturales, & crocus martis, miraculo curant. Qui est latens, aliquid quod non nisi medicamento virium latentium exigatur & depellatur, fidem quoque facit quod cachexia ipsa in leucophlegmatiam, aut elephantem degenerat ac terminatur. Vide plura alio loco in morbo huius mulieris & in omnibus similibus, ex dicto Hipp. omnes cavitates & inania musculorum ichore replentur. venæ sectio in hoc affectu remedium est ηγερμων, sub finem blanda catharsis; & quoniam genu valde laborat & tumet, placet emplastrum ex sigillo beatæ Mariæ crudo. Emplastrum de baccis lauri cum puluere ireos, ichore replentur carnes, & muco maligno nerui & ligamenta, qui mucus cum laudabilis est, apte, & sine dolore mouentur partes: sin minus contra, & quo magis ægri extenuantur, partes replentur tetro ichore & muco. & ex Gal. iste mucus ne affusione nec cataplasmate, nec medicamento attrahitur aut discutitur, sed coctione, & mitificatione eget, potius, cataplasma valet ex farinis in vino coctis addendo sapam, facem vini, sigillum crudum B. Mariæ; experiunda sunt, stuphæ siccæ sub finem, aquæ plumbares primas fortè tenebunt.

Consil. 30.

Com. in l. 3. de
Articulis.
Præclara
quæstio pro
emplastris ex
gummi-
quefacienti-
bus.

ANNOTATIO.

1. Morbus huius mulieris ad febrem laboriosam accedit, in qua circum maxillas, & articulos abscessus fiunt. ex Hipp. & fortè in habitu corporis, & genere musculofo est materia morbifica, vt Gal. ait, materiam causi in vniuerso corporis habitu esse. Et Gal. com. in aph. 31. lib. 4. communem locum qui patitur in lassitudine, & labore spontaneo, & non spontaneo, genus vniuersum musculosum esse putat.

CONSILIVM LXVIII.

*Pro D. Mombeliart dysuriam & stranguriam
patiente.*

AB equitatione mictus cruentus, excreti lapides, dolor in rene. Dolor ad splenis regionem, qui autem non est splenis, sed per viciniam renis laborantis & tumefacti fit. Urinae alias crassae, mucosae, purulentae. suspicio ulceris. Cathetere probatus, non deprehensus lapis, licet eius magna sit suspicio, & non percipitur, nisi à valde perito, aut certis de causis eludit, aut fallit catheterem. Ideo ad probationem deueniendum putamus.

Nobis argumenta sunt affecti renis, affectae vesicae, aut quia in ea calculus est, aut exulceratio internae membranae à pure, ichore, aut tabo à renibus manante. plerique enim habiti sunt lapidosi in vesica, unde stranguria, quibus à rene malum erat, item ulceris rudimenta in collo vesicae, aut partibus vicinis suspicamur, at interest scire, an vlcus sit in vrethra, an lapis, alioqui futilis futura est disputatio.

*Vide ante
conf. 26.*

Quaestio praecleara est, an pus sit, aut quid purulentum, an necesse sit vlcus esse, nam in venis sanguis pus fit. apud veteres, ait Donatus, explicans illud Terentianum. Expuere omnem molestiam ex animo. pus, ait, significare omnem humorem corpori onerosum. Vietus ratio conueniens praescripta.

In Eunucho.

Clysteres etiam additis herbis vulnerariis sunt instar fomenti, in eo agro cui alius pigrior est, cassia in bolo, & dissoluta, imo clarificata.

Si vlcus, studendum vlceri, imo dilutius decoctum Guaiaci valet; si vlcus sit in eam formam accipiat $\frac{3}{4}$ s. maceretur in decocto passul. gram. & acetosae, fiat instar ptissanae ad vsum in pastu.

Abstinentum à validis diureticis. hordeata valent emulsiones, lac asinae, aut caprae, bis die.

Syrupus nenupharis ad somnum ciendum, & leniendas molestias, dolorem, balnea, iniectiones conuenientes in vesicam. Ad

Z ij

180 CONSILIORVM MEDICINALIVM

dilatandum. Nam ob frequentem enixum in micturiendo strin-
gitur os vesicæ, emittitur id quod tenuius est, remanet fæx, hinc cillæ
lachrymæ.

Decoctum folliculorum & cassiæ valet, litus blandi, vsus hydro-
melitis recentis & aquosi, vsus aquæ albæ, missio sanguinis, ex
brachio & saphena. Aquæ Spadenses ob vlcus, si sit in vesica lapis,
aduocandus lithotomus.

ANNOTATIONES.

I. In urinis quorundam mucosum quid, tenax & glutinosum appa-
ret quod matulæ, suo lentore ac tenacitate adhaerescit ita pertinaci-
ter & obstinatè, ut inde auelli nequeat, deinde postquam fundus ma-
tulæ propendet, & dorsum versus inclinatur, ea materies cogitur in
se, & conglobatur & affatim acervatimque velut prouoluitur. De
causa eius materia sic præter naturam genita plerique digladian-
tur, alij ad renes referunt, alij ad cacochymiam corporis & fluorem
maliebre, alij ad colliquationem quandam corporis, vulgus ad ca-
tarrhum, alij ad prauam quandam dispositionem partium omnium
urinariarum, alij ad vlcus sordidius ipsius vesicæ, alij ad morbum ve-
sicæ, alij ad hyperfarcosin vretæ, ut effluat id quod tenuius est, re-
maneat quod crassius præ angustia aquæ ductus, alij ad calculum in
vesica contentum: immò cum calculus in vesica & frequens micturiendi
desiderium, æger se comprimit ob dolorem, & ita emittit id quod te-
nuius est, quia compressio est, in conando remanet crassius id quod in
dies lente scit, & obseruauerunt primarij & lithotomi lapide in vesica
contento diutius, non initio cum dolores excitat, & ipsa vesica ægro-
tat, & fœtet mucum illum naturæ molestum excerni, tales urinas red-
di, donec exclusus sit: laborat enim & egrotat vesica, & quia pars est
membranosa & habet aliquid vespōdis, tale in ea congeritur excre-
mentum, tum à proprio ipsius excremento, tum ab externo: ubi vero
excluso lapide vesica melius habet, tum nil tale generatur, quorum
demonstratio peti potest ex Galeno comm. ad part. 66. lib. 3. art. cum
distinguit excrementa partium carnosarum ab excrementis partium
spermaticarum, maxime vero membranosarum, sunt enim μῦξώδεια,
tenacia, lenta glutinis instar, & cum id quod in mucosa urina appa-
ret, non sit dissimile ei excremento quod decedit partibus spermaticis
urinæ istius mætaginosæ, causa necessario adscribetur morbo ipsius ve-
sicæ, ægrotat autem quoties in ea lapis existit, Simile quid à Fernelio

obser. cap. 16. de vrinis & Gal. ad aph. 3. lib. 5. non videtur definire excrementum superfluum, simile quidem naturæ partis ut humor existit, in osse medulla, in hepate sanguis. spumens humor in carne pulmonum, in articulorum compagibus humor glutinosus & in cadaveribus eorum qui calculo interierunt vesica inuenta est plena muco, isto simili mucilagini extractæ ex seminibus carnosiss & succulentis.

2. De iniectionibus in vesicam videndum an sit vlcus simplex, an cum calculo, indicatio enim alia adest, Rondeletius ad deterfionem puris in vesica iniicit guaiaci decoctum. Item parat alia non pœnitende lectionis, si aquæ refrigerantes, aut similia eiciuntur, ista refrigeratio confert ad coagmentationem lapidis, & ipsius vesicæ naturam spermaticeam ledere potest. purgato corpore, bolis potius quam potio-

Ballonius l. 2.
conf.

nibus utendum, remedia topica vsurpari possunt quæ leniter ardorem reprimant, pus abstergant, & vlcus glutinent, in eum modum.
4. Trochiscor. Gordonij sine opio ℥ij. diss. vnum in lacte caprino, aut hordei decocto, si vlcus quis purificare malit quam glutinare & per catheterem in vesicam per aliquot dies iniciatur, purificato vlcere diss. vnus trochisc. in lacte ouillo, nam glutinat, si pus crassum admodum diss. Troch. 1. in aqua mulsæ, hæc magis conducunt quàm sumpta, quòd ab ore ad vesicam longa sit via, dolor autem quem meiando patitur ager mitigatur sotu pectinis ex malua, rad. alth. nymph. flor. cham. melil. semi. nymph. calami aromatici.

CONSILIVM LXIX.

Pro D. des Broses tussiculoso phthifico.

DEstillatio erat ferina in pulmones verus tabi & feri putris collectio in pulmone, ut in epilepticarum ouium cerebro faniosus est humor auctor mali, autoritate Hipp. iam vlcuscula & vomiculæ in pulmone.

Quæstio fuit an utendum siccantibus detergentibus & aduersus pulmonum & mollitudinem & putredinem eorumdem an humectantibus: illa putredinem arcent, robur pulmoni conciliant, hæc putredinem pariunt, reuerà temperanda hæc sunt, ne humectatione nimia sputum effœminetur, ut loquitur Hipp. &

Lib. de sacro morbo.

Quibus pulmones sunt calidiores iis quædam tabes est familiaris nomine tabis largius sumpto.

Vide l. 2. conj. Ball.

Lib. de morbo Galenus lib. de locis aff.

182 CONSILIORVM MEDICINALIVM

putredo augeatur, neue ficcatione os siccius reddatur & sputum non educatur, veteres in simili casu utebantur Hedrychroo, id est compositione quadam ad pulmones corroborandos, & nunc sunt qui concinnant tabellas cum flore sulphuris ad siccandum eo modo quo olim hedrychroon laudabatur.

Capita intra hæc constitimus, linctus cassie, aut cassia soluta, gar-
garismi refrigerantes & astringentes, in ferina destillatione in
materia calida catarrhi: in frigida aqua tepida ore contenta.

Aëcius in ferina destillatione vitur oxyrhodino & capitiflotio-
ne ex incrassantibus & refrigerantibus, id quod notabile.

Si febris putrida coniuncta est ex urinis patebit, corpus purge-
tur. Emplastrum ex thure & mastiche cum emplastro de betonica
ad futuram coronariam in formam T.

Pulvis cum pulvere scynæ pulmonis vulpis, penidiarum, elect.
diatrag frig. conferua rosarum vel tabellæ instituentur additis flo-
ribus sulphuris, ut quidam volunt hoc modo.

℞. Pulvis diatrag frig. & diarrh. abb. añ. 3 j. florum sulphuris 3 s.
sacchari optimi 3 ij. gummi tragac. dissol. in aqua rosar. aut cinn. 9
j. confundantur in mort. marm. dein cum tantillo olei anis. forme-
tur massa tabell. dosi a 3 s. ad 9 ij.

Syrupus de symphyto descriptore Fernelio valet, vel similis à
D. magno celebritate medendi maximo institutus in Hist. Godo-
nij lib. 2. consiliorum nostrorum.

Formula masticatoriæ, additis iis quæ pulmonem siccant, vi
sua rypica & à corruptione impediunt.

Quæstio præclara, an balneum conferat? conferre potest multis
rationibus, quas prudens medicus fabricaretur, an non & blando-
rum sudorificorum vsus etiam commodus, ut serum putre absor-
beat, nam quod corpora strigiosiora & macilentiora eò magis sa-
nie & ichore quæ supersunt carnes scatent.

Quoniam putres etiam humores in ventriculo, & mesenterio
succrescunt, & diarrhææ funestæ tabescentibus contingunt, infu-
sum rhab. ex vsu est aliquando. Item pilulæ ex aloë lauta, pulvere
diatrag. frigidi rosa, rhab. santalis.

Vel tabellæ ex pulvere diatrag. frigidi & triasantalino, ex
rheo.

Conferui symphyti, nicotianæ, ros. viol. herbæ paralyseos, & pul-
ueribus thoracis conferet.

Caro cydoniorum, & conferua nymphææ addi potest cum pau-

*Primula ve-
ris siccata &
astringit.*

co puluere scynæ, aut radicis sassafras: litus ex oleis refrigerantibus lautis in aqua hordei & rosarum.

Sectio venæ frequens, sed pauca euacuatio sanguinis.

Suffumigium ex herbis vulnerariis & nicotiana symphyto utroque, puluere guaiaci, ad ficcandos pulmones, valet item hic syrupus qui proximè viribus æquat syrupum de symphyto.

*Plura in li. 1.
conf. Ball. ad
tabidos &
hæmopticos
initio.*

24. Florum & germinum salicis an. m. f. rad. althææ. vtriusq. plantag. bechij marrub. albi, sonchi. seu rostri porcini caulium rubr. añ. p. j. iuiub. sebesth. num. 20. feminis bomb. 3 f. florum nymph. p. ij. fiet decoct. in aqua hordei, & aqua macerationis rosar. provincial. incol. ad lib. i. dissol. succi bipinel. pilosell. & pomorum, añ. 3 iij. saccha. quod sufficiat, fiat syrup. ad vsum ex cochleari.

Notandum quod in tabescentibus à pulmone (idem etiam de reliquis) consumpta valent (modo non sit febris putrida iuncta) iis de causis quas alibi attulimus, suppleant enim vicem testitudinum nemoralium.

1.

Valet & hordeum mundatum, in iusculo carniū crepante & cocto.

*L. 1. conf. Ball.
initio.*

Aqua alba confert.

Manna cum iusculo galli decrepiti.

Pineolatum in rupe, syrupus ex passulis, sed & ad pulmones valet syrupus de symphyto quem concinnauit Fernelius. Item pasta seu electuarium regium quod optimum est, & paratum legetur lib. 4. meth. medendi, item mandere rheum cum passulis utile erit.

Caterum quidam somnifera tabescentibus, maximè si tussiculi sint, præscribunt, quod magna cum cautione faciendum. Galenus enim notat semen papaueris suppressere ea quæ à thorace, & pulmone educuntur, valere autem in tenui & acri fluxione.

*1. de alim. fac.
cap. de semi.
papaueris.*

ANNOTATIO.

1. Ad tabidos & pulmonicos dari debent ea quæ calorem tabiscentem temperant, & lentum succum habent, ut resistent calori depascenti qui consumit corpus, carnes enim (ait Hipp.) magis liquecunt a malis quam nutriantur ab assumptis. vnde notandum vnum apud Plinium cum loquitur de succis arborum, viuaciores sunt, ait, plantæ quibus succus lentior est. Idem iudicium de corporibus, & ille humor

184 CONSILIORVM MEDICINALIVM

radicalis lentus, halituosus, glutinosus, in eo affectu syrupus sequens maximè commendatur.

℞. Caponem unum succulentum, armum vitulinum, aut partem pectoris vitulini, coque in aqua fontana & parte aquæ scabiosæ, & in eadem incoque carnem & testudinum nemoralium detractis extremitatibus, adde hordei mundati m. ij. flor. tussilag. nymph. violar. an. ma. j. sem. frig. maior. & minor. añ. ʒss. sem. papau. albi ʒss. scariola, acetos. lactuca añ. m. j. gummi tragac. & arab. an. ʒ iij. passul. ʒ ij. sem. sesami ʒ iij. penid. ʒ j. fiat decoct. ad ℥ ij. s. adde sacchari quod sufficit. fiat syrupus ad vsum.

CONSILIVM LXX.

De arthritide lumborum doloribus & aliis affectibus.

SYMPTOMATA hæc vexant D. Deudicourt, dolor ad vmbilicum, ructus graues, nidorulenti, acidi aliquando inflatio non tam sumpto statim cibo, quàm in anadofi. Arthritis, quæ symptomata, comitatur & dolor circum lumbos, id autem fit sæpè quia mesenterium quod hîc laborat, alligatur lumbis & spinæ, quò fit vt affectiones mesentericas, spinæ dolores & lumborum, iem & paralyses quædam sequantur, vt Meloduni post dolores colicos contingit.

Nota de paralysi melodunensibus & pictaviensibus familiari.

Si ea symptomata fugacia sint, bono est, si stabilia, durioris, & exitiabilis fati sunt minacia: nam aut dominatum caloris contrà naturam significant & paupertatem natiui & partium imbecillitatem, aut rebellem obstructionem in mesenterio; sed notanda maximè distinctio hoc in loco μεταερισμών recentium, aut veterum, & diuisio obstructionis Attenuatiuæ & Oppilatiuæ.

Attenuatiua est in senibus, in pulmone vnde dyspnæa, in neruo optico, vnde cæcitas, in vtretra vnde vrinæ suppressio.

Allatus locus de morbo ructuoso, quem Hippocrates ῥσων Lib. de morb. ἐρυμώδεια vocat de morbis qui in iuuenibus curantur, in senibus immedicabilis. Item quod icterici admodum flatuosi sunt.

Denique

Denique cum ille sit arthriticus, mitiorque morbus in dies fiat, an id bono est, an materia supprimitur an imminuitur. At arthritides biliosæ vna cum senectate releuantur, alioqui arthritidem cessare, exitio est, & aut epilepsiam, aut apoplexiam accersit & quasi in locum suum sufficit ac substituit.

Visum est laborandum esse in obstructionis ablationem, si ab infarctu est humorum, & ἐν σφινώσει iniiciendi clysteres, purgandum corpus, diligenter balneo vtendum, fotu hypochondriaco non calfaciente.

ANNOTATIO.

1. Arguitur vulgo imbecillitas partium, vt morborum causa & morbus sæpè in materia est: tamen Galenus aliquo loco ridet eos, qui imbecillitatem causam in ere perpetuo habent, quasi aut parum dicant, aut nihil tamen lib. de symptomatum causis tanti facit partium imbecillitatem, vt licet nulla materia superflua affluat, febris tamen redeat, contrà sentit com. in aphoris. de eunuchis, qui locus notatu dignus: hac voce vtitur etiam.

Celsus dum sic ait, Magna pars urbanorum stomachum imbecillum habet, signa edit pallorem, nauseam &c.

Apud eundem capitis infirmi fit mentio, & ad id commendat affusam aquam frigidam. & alio loco cuilibet pars aliqua natura est imbecilla, an ea imbecillitas ad intemperiem, an ad morbos materiae reuocanda.

Raro non aliquis partem habet imbecillam.

Itaque videndum quid nomen imbecillitas, significet aut aliud quid habeat ἀπὸ τοῦ nec id negligendum, ne frustra partem naturam imbecillam inaniamus & medicamentis affligamus. Immo detracto sanguine infirmemus. Nam imbecillitas robur addendum suadet & insinuat, vnde qui sæpè capitis doloribus capiuntur, capite sunt imbecillimo, & repletio eas partes quaquaversus distendens dolorem excitat.

Celsus. Et alibi offensus obnoxia infirmitas.

CONSILIVM LXXI.

*De febre assidua cum symptomatis paraphoricis
catarrhoicis & cataphoricis.*

Obscure blā-
de & con-
stabilis desi-
pientie pesti-
me Hippocr.
prorrh.

AVrelius adolescens medio Octobri, capite doluit, febris sed ea fallax, cum se febrile non putaret, nulla dum intermissio officij, lex vitæ neglecta, dolor tamen capitis in dies aggrauescibat, externa accusabantur, ut ætas ad omnia prona. tandem febris aucta, dolor capitis auctior, febris verè κεφαλική τυφώδης, nihilominus tamen sui negligens modo ruris, modo in vrbe fuit, securus omnium, tandem lecto affigitur & affligitur, fallax pulsus ut in morbis capitis, vrina fallacior, ille febrile non respondebat, & in capite focus erat, segnities alui nec nisi arte prouocata, quicquam ex aluo affluebat. Æstus viscerum, sed maior capitis; oculus ardens, facies rubra, maximè genæ, aliquid pulmonicum suspicabamur, dolor capitis maior ad synciput, omnia noctu graviora, clamores, iactationes, deliria fugacia, indecora corporis compositio, mox ad se reditus, rursus deliria intra verba, somnus profundior, ut vix excitaretur, deinde κῶμα ἀγρυπνον, & inæqualis symptomatum mixtura, mox catochus, nisi quod deliratio iugis non foret, mox lethargicum quid mox typhomanias species; tandem oculi fixi & rigentes ut in catoche, obscura phrenitis, blanda, contrectabilis, dextrarum partium rigor, reuera πρᾶσιμώδης, & deinde paraplegia cum quid, siriafin quandam & φλόγῳσιν suspicari sumus, difficilis respiratio, qualis peripneumonico: omnia visa sunt mitiora, conualecendi spes aliqua, morbus variè lufit oppugnatus, sed non expugnatus inualuit: dolores repetunt, omnia in peius ruere, per dies 40. traxit mors.

In primo insultu morbi negligentia ipsa agrotantis coniecit eum in periculum, cum morbo victus lecto per decumbendi necessitatem afflictus est, adeò terrifica symptomata paruerunt, ut aliquid funebre nos ominaremur, utinam nos augures augurium ipsum potius fefellisset quam dira fors bonæ indolis iuuenem sustulisset.

Symptomata quæ caput exercent, aut sunt cataphorica cum somno profundo, aut paraphorica, cum delirio, aut catarrhoica cum fluxionibus, aut cephalalgica, cum dolore capitis, tria sustinuit æger, paraphorica cephalalgica; cataphorica. Et cum morbi cerebri sint curatu difficiles, cogniti sunt difficillimi. parvæ eius causæ grauiæ in capite edunt symptomata immo solus vapor reter, furtim surrepens convulsiones terrificas inuehit, & magno medicorum dedecore. Sæpè capita hominum morbo capitis consumptorum aperta sunt in quibus nil commemorabile repertum est, quod mortem intenterat, cum alioquin medicus aut abscessum, aut simile quid repertum iri pronuntiasset, spes augurantium ipsa inspectio fefellit & eorum fiducia, & expectatio in stuporem vertit, ac si cum ipsâ animâ mortis occasio euolasset.

Causa interitus & symptomatum terrore plenorum fuit illa si-riasis & phlogosis præsertim membranarum cerebri, in his & in cerebro non tam fuit alteratio quam alienatio, & in iis fuit quædam hectica intemperies diuturnitate temporis contracta, morbus forte initio fuerat curabilis, sed ex euentu incurabilis factus est, febricitans nec cibo, nec largiore potu abstinuit, & aëris gravitatem & contumelias non vitavit, sic tota vis venenata se in caput inclinavit. Accessit pulmonis dextri impuritas, in quo vomica erant veteris tabi, & puris reliqui, ex peripneumonia, quâ ante annum laboravit, & ita ut medici magis aduersum rerum exitum timerent, quàm sperarent secundum. vnde Hipp. notat quosdam ex pulmone lethargos cum afficitur cerebrum tetro vapore, vnde marcor, cerebri & marcet æger, nec fari potest. ut vno dicam verbo Typhomania erat potius species quædam, mixtis symptomatis phrenitidis, & lethargi, non vera & aperta fuit phrenitis, in qua ad omnem audaciam prompta mens est, sed ob impressam inustamque hecticam cerebro & membranis intemperiem obscuram, vulgus designat phrenitin ex morfu, clamore, insultibus, inuolatu in obuium quemque vnguibus, delirio perpetuo, sed alia est sine his manifestis. Id quod Galenus disertè expressit, & sese ipse eleganti, eâ enumeratione vicit in prorrhethico. Citat locum Hipp. ex epid. nullus phrenitorum valde insaniuit, sed veteriosa ad somnum inclinatione grauati peribant, & hi phrenitici obscuri vocantur & id sæpè vulgo ignotum & medicis; eos demum vocant phreniti eos qui clamant & exiliunt, in obscura ea virium languor est, & hectica quædam affectio phrenitidis est, idem contingit quod la-

Sympt. cerebri aut cataphorica paraphorica, catarrhoica, aut cephalalgica.

Parua causa medelis exoluitur nisi quid circa partem principem sit. Hipp. de præc.

Aliud afficit cerebrum ob alterationem, aliud per alienationem quandâ Gal. in 7. comm. p. 33. Hipp. prorrh. hanc dicit esse similem lanis tinctorum λευκόπλοον, καὶ δυσία πλωτον.

Celsus in lethargo marcor & inextinguibilis dormiendi necessitas, in phrenitide prompta ad omnem audaciam mens est.

I.

*Ad par. 33.
lib. 1. prorrh.*

*Anatome
corporis.*

*Hipp. hanc
affect. vocat
vntepueros.
cerebri.*

nis tinctis, quæ colorem non deponunt, ita quidem hæc affectio cerebro impressa hectico modo vix elui potest, & ni beneficio ætatis adiutus fuisset, & artis ope, vix tanto morbo superfuisset, sed morte fuisset præuentus, tandem aggrauescente valetudine succubuit, expertus illud Hipp. Quibus conuulsis oculi fixi relucet, non apud se hi sunt & diu agrotant, sperandi & desperandi vices fuerunt: tamen in deteriorem semper partem nostrum iudicium & prognosin vertisse, auriti testes multi fuerunt. Egro in sua initia resoluta sectione internæ partes oculis subiiciuntur, aperto capite, venæ quasi varicosæ tabo & sanguine nigro turgent videntur, item obseruatum.

In ventriculo medio seram multum, medulla cerebri quæ mollior & friabilis esse debet siccior, membranæ siccissimæ, quasi per syriasin & deflagrationem arefactæ & rigentes vix lacerabantur, vix nouacula præcidebantur acutiei secantis resistentes. Imo sectæ crepabant more membranarum arietinarum igni obiectarum atque occalescentium, pulmonis partes dextræ lateri ad hæsu contumaciore lacerabiles, plenæ vomicis, tabo & pure scatentibus, hæc reliqua ex graui peripneumonia, quæ anno præterito illum oppressit ac penè consumpsit, hepar labem conceperat, sed non maximam qualem pulmo, hinc illæ lachrymæ, sic hectica intemperies cerebri, pulmonum maxima, hepatis minor labes, iuuenem (arte malo victâ) arte & natura repugnantem oppresserunt, expugnaverunt, sustulerunt.

ANNOTATIO.

1. Tremulæ obscuræ blandæque, & contrectabiles desipientiæ valde phrenitiæ, ut Didymarcho in Co. obuenit ut cit. Hipp. 1. prorrh. Gal in com. meminit phreniticorum, de quibus loquitur Hipp. 3. epid. Nullus phreniticorum, ait, vehementer insaniuit, velut aliis vsuuenit, sed alia quadam veteriosa in somnum inclinatione capite grauati peribant. Et paulò post, phrenitide ex bilioso sueco generationem habente cum is in cerebrum decubuerit, principio quidem qualitate ipsius nondum toti corpori cerebri permixta confusaque tumultuosa sunt desipientiæ: procedente vero tempore, simile quippiam contrahitur lanis quæ à tinctoribus appellatis tincturam accipiunt, nempe & hæ vix elnibiles redduntur, non secus atque eæ quæ ab initio colorem habent, talis igitur cerebri tinctura Græc. Βαφὴ desipien-

tiam hecticam habet, atque ob id affectio horum, vt februm hecticarum praua est.

CONSILIVM LXXII.

Pro muliere sterili fluxu muliebri laborante.

PRaefferunt fœdi colores, labes viscerum obseruatur, mala ex se & ex consequenti: per se quoniam cachecticum quid est, & intemperies cordis, & arteriarum, ex euentu & quasi auctarij vice, quia hæ virgines prauo vtuntur victu & res alienas liguriunt, vnde humorum prauorum cumulus & propagatio, ab eo tempore nupfit, à nuptiis sterilitas inde morboſi menses & $\rho\epsilon\varsigma$ $\gamma\upsilon\alpha\chi\epsilon\iota\omicron\varsigma$. At longè distinguntur, si natura benè ordinata euntibus mensibus dat inducias $\rho\epsilon\varsigma$ fit, id non fit in morboſo mense, nec in gonorrhæa virulenta.

Symptomata, odoratus immunitio, aliquid ephialticum, $\alpha\alpha\sigma\eta\omega\delta\epsilon\varsigma$ menses mali $\rho\epsilon\varsigma$, vteri indignatio congressum respuentis, dolor, molestusque sensus in consuetudine ipsa, ex quo tempore resoluta est virginitas res meliores non fuerunt, vnde non mirum si non possit $\gamma\upsilon\alpha\chi\alpha\theta\eta\tau\alpha\iota$, nec mater fieri, hinc illud Hipp. Sana muliere moderati sunt menses, pauciores, plures, ad pauciores dies sunt quid morboſum & sterile, & vt de morboſis, ita de sanis, & quibus per pauciores dies sunt menses succulentæ sunt & viriles & $\mu\epsilon\upsilon\iota\sigma\iota\tau\omicron\chi\alpha\iota$ non fiunt, nec partus, nec conceptus sunt memores.

Purganda non validè & liquando non sistatur fluxus, roborantibus est vtendum.

Decoctum vulnerarium valet, caryophyllata pentaphyllum, fragaria, pulueres siccantes, pilulæ purgantes addita terebinthina cum diatragacantho frig. addito rheo: de aquis naturalibus videndum.

ANNOTATIO.

I. *Plurima genera morborum primo coitu & primâ mensam eruptione solvantur, quod si non solvantur, vix, ac ne vix curationem admittunt, ait Plin.*

CONSILIVM LXXIII.

De rubore narium.

Gelsus:

Eib. I. ACUT.

DRobinella sentit ex interuallis appulsum fuliginis, aut vaporis calidi, vt est prædita visceribus calidis, extrema naris incalescit, intumescit, sed vt mulieri non potest eripi cura cultus corporis, ita nil negligit quod ad id mali cuitandum pertinere possit; imo etiam ad Empiricos confugit. Illi calidis rem irritant, & infecta planè res est. Nos eâ ratione ei consultum volumus, quia malum à visceribus, iis danda opera est, phlebotomia, purgatio cum cassia valet cathol. senna, lautio pedum, epithemata, cucurbitula, enemata refriger. caueat topica frigidiora, eaque quæ moram in parte affecta trahant, vnguentum citrinum, cera virginea lauta in aqua rosarum, & nenuph. vinum fragorum, cremor hordei, decoctum hordei quo mangones ad mangonium puerorum, & nitorem utebantur Hipp. tempore, emplastrum molle ex gummi tragac. arabico, amylo, pauca cerussa & cera virg. loco cerussæ lythargyrus valebit. ℥. fol. salicis m. ij. albumina xij. ouorum, succi limonum ℥. ij. distillantur cum lacte, oleum ex seminibus frigidis, aqua liliorum cum troch. albi rhafis, vel emulsiones, aqua rosarum cum poco mucore feminis althææ & gummi tragacanthæ, frustum carnis vitulinæ manè applicatum, valet pasta regia Fernelij & hordecum mundatum in iusculis.

CONSILIVM LXXIV.

*De quodam vomitum patiente cum ventris
tormine.*

ENimvero id totum de quo agitur hypochondriacum est magnum quid, & opinione maius. Res enim subindicata latet, & intestina est, quam vix animus apprehendat, accusatur semper ventriculus licet innocens & viciniae lege patiens, dioclea pylori phlogosis intelligitur, chylus adurit, talis sanguis, at natura adustionem horret, elixationem admittit, vnde locus est Plinij, cur homines sunt breuiore s suis temporibus, quàm olim, quia adustio semen alterat & consumit, hinc marcor, squallor, tabes: nuper octo vidi ægrotantes simili morbo afflictos alimento sumpto, gravis erat ventriculus, coctio talis qualis in anadosi dolor, corpus differebatur (verbo Terentiano) dolore, noctu quies & inducia, die sequenti redundatio stomachi.

Assumptorum vomitus hæc per menses tres, alios per quatuor exercuere, pars ægrorum emarcuit, tabuit, collapsus aqualieulus. Mors, pars, at cuius minore virium dispendio morbus productus erat, afflicta quidem & lecto & morbo, vomitus periodicus vt in celiacis, ventriculus quidem facit officium, pylorus obstructus, & mesareon, aut oppilatiua, aut attenuatiua obstructione (vt loquuntur veteres practici, non tam verborum quam rerum aucupes) per collapsum vasorum & viarum, & hæc fatalis filum vitæ præcidit. Id fit in opticis nervis, vnde perfecta cœcitas, illaso oculo in apertis cadaueribus eorum, quos sua sors peremerat, aliàs inuenta pylori inflammatio obstructionis & angustiae causa, in aliis glandularum mesenterij durities, impendio magis & quasi callus, mesenterij vt quidam sphacelus, vt mirum non fuerit si ventriculus alimentum appetiuerit, quoad potuerit coxerit res ingestas, sed vitio anadoseos & ob vitium labemque mesenterij omnia reiectantur vomitu, licet chylus gratiam naturæ receperit.

Videor tanquam in tabula afferre lineamenta ad viuum expressa causæ tam dira symptomata excitantis, & grauiora, ni dii

192 CONSILIORVM MEDICINALIVM

prohibeant excitaturæ, ni tutelaris deus fibras tam pertinacis affectus eliserit. Est quædam attenuatiua oppilatio natura fatifcente & instrumentis nutritioni dicatis feriantibus, credo labem nescio quam & *κακότηδες*; vnde *σφάλματος*, vt ita dicam per alienationem non per alterationem. & præclare actum à te qui temperatis vsus fueris, inductus opinione intestinæ *φλογώσεως* quæ tot malorum est fabricatrix; hic metuo aduersos rerum exitus, tamen si velis explicare ægram vt dolendi ita querendi, & quærendæ medicinæ non sit finis; non quin naturæ dandæ sunt induciæ. valent tabellæ ex chalybe, aqua rhabarbari, aquæ naturales; balnea, medicamentum in balneo, fœtus mites, pilulæ ex aloë lota, succino, puluere sennæ, fatalis addita pauca quantitate pilul. aggreg. exceptis omnibus syrupo de cichorio, somnifera, pilulæ de cynoglossa, decoctum folliculorum addito rheo, & saccharo cando, ne reuomat.

curatio.

CONSILIVM LXV.

Pro fluxu dysenterico & mesenterico.

Considerauimus tempus à quo laborant (erat enim iam tertius mensis exactus) periodon, motum humoris, speciem humoris, & doloris.

*Omnia fluor
est dysenter.
diarrh. mesenter.
& hepatica.*

Quæsitum, an fluor esset simpliciter dysentericus an diarrhoeicus, an mesentericus, an hepaticus, in quanto, quali, & excretionis modo.

Intestinum ob diuturnitatem floris *τὴν διάθεσιν ρευματικὴν* conceperat.

Non abs re, de periodo quærebat, an certis horis, an incertis rediret fluor, veteres hepaticum & cerebralem distinxerunt, à stomachico & intestinali, quod primus sit periodicus, cerebialis ferè à distillatione est, hæc autem dici solet esse nocturna potius: tamen Hippocrates longarum dysenteriarum, & lienteriarum causam à capite repetiuit.

Lib. de affect.

Eteā dispositio rheumatica duo facit, excrementa à iecore facile

cilè recipit, & ea magis corrumpit ob vetus vitium, parti sanæ suum alimentum est solatium, ægræ tanquam onus est.

Gal. dum libris de locis affect. medetur *ῥευματικῇ διαθέσει* tria *Gal. 2. de diff. feb.* statuit, vt alimenta sumantur, non facilè corrumpenda, vt astringant, vt roborent.

Apozemata sunt instituta ex iis quæ hepar reficerent, & quia *Apozemata.* vlcusculorum & tabi nescio cuius erat suspicio nonnulla, portio herbarum vulnerariarum incocta est, vt buglæ, saniculæ, symphyti minoris agrimonij, veronicæ, sanamondæ.

Aqua rhabatbari imperata est, lac capræ, quæ depasceret folia falicis, summitates ruborum, viminis & rosariorum.

CONSILIVM LXXVI.

De tumore hepatis seu fermentatione.

Cuiusdam Præsidis seruo febricitanti tumor & durities quædam ad tactum apparebat, alij scirrhum dicebant, alij non à flatu quia fugax fuisset; initio paroxysmorum regio hepatis appareret tensa & inflata, sed id residit calore febrili aucto. Nos putabamus id esse quod Hippocrates in epidemiis vocat hepatis fermentationem quandam, nam in febribus aliquando & cystis fellis *ῥευματικῇ hepatis.* intumescit, & totum hepar feruente & bulliente in capillaribus venis sanguine, & turgentibus humoribus, & ij medici quibus sine experientia ratio quædam suffragatur nec morbum istum norunt nec medicari possunt. In tali affectu nō est parcendum sanguinis detractioni, hæc enim largior opitulatur, malactica & foris admodum *Liberalis vena sectio hepatis fermentationi conuenit.* ferè sunt inefficacia, profluuium quoque biliosum iuuat, sed illud non solet opportunè euenire nisi detracto luculenter sanguine ardor mitescat, & tumor duritiesque minuantur, id quod valde est notandum.

CONSILIVM LXXVII.

*De auditu imminuto qui βαρηκοΐα, & δυσηκοΐα
dicitur.*

*ad apho. 17.
13.*

Magna vis est constitutionis temporis, πρὸς τὴν εὐηκοΐαν, ἢ βαρηκοΐαν, ἢ δυσηκοΐαν. Περὶ δὲ τοῦ βαρηκοΐας ἢ τοῦ δυσηκοΐας paulo post dicitur: nam in aquilonia constitutione & animæ, & corporis constitutiones meliores existunt, conciliatur enim partibus vis, robur & ἐντομία & Gal. diligenter operationes istas animæ & naturæ distinguit quas vocat φυσικὰς & ψυχικὰς ἐνεργείας. Aquilo reddit corpus εὐκίνητον & ὑγρόν, ut ait Hippocrates sectione tertia lib. 3. Aphorism.

Cum dicit mobile, & bene audiens corpus, animæ functionem & τὴν ἐνέργειαν significat, cum autem benè coloratum, dicit naturæ operationem, & cum paulo post dissolutionem explicat quam affert Auster, ait, mala est ista Austri διάλυσις ad omne opus siue ψυχικόν siue ζωπικόν: credo quod ζωπικόν confundit μετὰ τὸ φυσικόν si austrino & humido tempore auditus est obtusior id ab humectatione est, & ex humectatione διάλυσις sequitur, à dissolutione quadam actionis læsæ: actio siquidem est partium solidarum.

1.

Sic δυσηκοΐα ab austro est χαλὰ τὴν λύσιν πινά. Quod ad curationem attinet, aliter te geras si sit obstructio, aliter si humectatio, & dissolutio, contrariis enim oppugnatur morbus, & obstructioni debentur ἐκφραγτικὰ. quæ autem mixta sunt ex rhypticis & attenuantibus, & detergentia, humiditati siccantia, dissolutioni, συσπικτικὰ, id est quæ contendunt, ac firmant.

*ad par. 32. 1. 1.
prorrh.
ad part. 27. 1.
prorrh.*

Cæterum imminuta auditio symptoma est, actio enim læsa est in genere eorum quæ audiuntur: morbus est obstructio, hæc autem aut fixa est, aut fugax Galeno, surditas fit ob humorem quemdam in auditoriis meatibus impactum Græcè διὰ τὴν σφηνόθετα χυμὸν & alio loco, firmatos vna in parte humores species vna symptomatis, tum naturalis partis tum humoris virtuti peculiaris consequitur.

In obftructione aurium quidam habent olea fufpecta, vt quæ *Curatio.*
obftruant fuo lentore, aquæ vitæ, aut theriacalis, aut rutæ valent,
caftoreum, oleum de terebinth. chymicum, femen cumini infu-
fum in aqua vitæ, & rutæ deinde expreffum, fuccus bulbi efculen-
ti & rutæ & vinum album. *2.*

Quibufdam placet in fuma obftructione procurandam quan-
dam fuppurationem, vt aliquid ex aure emanet, fed habenda ma-
ximè ratio fubiectorum vifcerum.

Catharfis instituenda ex interuallis eaque blanda.

Mulier ægra cui hæc decernuntur remedia multis fignis melan-
cholica deprehenditur, tamen mollem carnem haber, candidam,
obefulam. At qui talem carnem habent Gale. nequaquam habent
humorem melancholicum. videndum eft ne habitus exterior nos *Lib. de hor.*
decipiat, fraudemque faciat, fæpè enim exterior interiori non eft *Aff.*
fimilis.

ANNOTATIONES.

1. Aurium affectus funt fuma cura prænofcendi, ac præfertim
ij qui cum dolore exiftunt, oculorum quidem dolores & morbi nofcen-
di quidem & plurimi faciendi, fed non tanti quanti aurium affectio-
nes. Notandum enim quod eleganter fcripfit Celfus cap. 7. lib. 6. au-
rium vsum proximum luminibus nobis dedit natura, fed in auribus
aliquanto maius periculum eft, nam vitia oculorum intra ipfos nocent
aurium inflammationes doloresque ad dementiam mortemque præ-
cipitant.

2. Decoctum cannabis fatiue vermes in auribus delitefcetes, aut
alia animalcula allicit authore Plin.

CONSILIVM LXXVIII.

*De Melancholia hypochondriaca pro muliere
hysterica.*

Solemne eft illud Philofophorum decretum, omne imbecil- *Arist. Seneca*
lum querulum effe: cum autem duplex imbecillum, fit natu- *lib. de ira.*

Bb ij

196 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ra & valetudine. In primo genere, est mulier valetudinarij, in secundo, hæc mulier in vtroque hæret & laborat, vnde perpetuò querula est, & medicorum aures querelis subinde nouis fatigando querendi finem non facit, quia non facit dolendi, nec conquerendi satietas est. At querere oportet an iure dolendo queratur, an in fractione animi id contingat, an quia melancholica est, an melancholici perpetuo doleant, omne enim animans duce natura voluptatem quærit & dolorem, vt summum malum fugit dolorique remedium quærit. In eo genere sunt melancholici (præsertim si humor per affationem, aut suppressionem actiusculus est) siue quòd natura, siue quòd valetudine imbecilli sunt, propterea quod queruli. Ideo Arist. ait, melancholicos perpetuo medicinam appetere id est summis & assiduis votis remedia postulant, siue sint alimenta, siue sint medicamenta, immo eorum maior pars pharmacorum est, quam alimentorum appetentior. quare? quia deiectam habent appetentiam, vnde? ab intemperie & affectione praua quam Gal. in prognosticis eleganter vocat *χώρασις* τῆς τροφῆς.

Id est oris superioris ventriculi: temperatæ enim naturæ dulcia & appetunt & iis fruuntur, intemperatæ imminutam habent appetentiam, & exoticas in cibis qualitates desiderant, vnde tales melancholici sicci sunt & strigosiores.

Cæterum abhærent à cibis nisi excedente qualitate præditis, medicamenta purgantia appetunt, licet ab iis sæpè deterrimè habeant quia humores eorum aduruntur nec putrescunt, putredine ordinaria, quæ humores exclusioni paratioris & obsequentiores reddit. Sed quæri potest, quænam sit hæc dispositio diathesis, siue intemperies τῶν ὑποχονδριακῶν? Rondeletius ex Dioclis non omnino vera opinione, sed plausibili, & ex parte probabili, putat id totum malum pendere à mala intemperie primarum venarum mesaræi & etiam mesenterij. Declarant signa hîc non enumeranda, inter quæ est volæ manuum siccitas, & squalor. At cutis squalida labem vitiumque ventris significat, declarat curatio medicamenta humect. refrigerandoque purgantia, syrupus de pomis, syrupus violaceus, lac asinæ aut capræ Balneorum frequens vsus à cibo, aquæ Spadenses, Niuernenses ἀπὸ πυλῆος imò eis vlcera oriuntur & χερνύδες tumores qui non nisi pompholyge, plumbo, cerusa, & mercurio leniuntur & mitigantur, & quod fit foris, idem domi & in visceribus fieri debet.

Quest. obiter
hic agitur
de melancholicis.

7. Ethicorum.
Melancholici
perpetuo medicamenta
appetunt.

Gal. de loc.
Aff. cap. de
melanch.
Hipp. in Co-
cis.
Legitima hy-
pochondria-
corum curatio

Sed impediunt flatus multi qui in hypochondriacis scaturiunt, & indicatione quadam contraria auerunt ab usu rerum humectantium, & refrigerantium, quæ causam oppugnant: sic quod est primæ & radicalis affectionis remedium, auget symptoma, ut fit in hydropo & squalore & hæticâ viscerum intemperie, cum enim quæ flatum discutunt calidiora tenuiorumque partium esse debeant, siccitatem squaloremque partium augment, quæ causa impulit Themistium magnum physicum, & tamen non satis bonum medicum, ut credat atram bilem naturaliter frigidam refrigerare ventrem, & iecur partes nutritioni deuotas & consecratas: quod si verum est, mirum non esse debet, si tantus sit flatuum proventus in hypochondriacis. Imo verò καὶ ἐξ ὅχλιν flatuosa melancholia esse dicitur: quanquam hypochondriacis, & iis quibus æstuant viscera, quos θερμοκοιλίης vocat Hipp. non raro vsuueniat, ut cum calore acri abundant, non desinant esse flatuosi, immo in tympanitem ferè post dolores aluiuos diuturnos & vix placabiles incedant, & iis non raro secari vena solet secundum illud Hippocratis ἀνεμὴν φλεβοτομήν λυει. Verum isto loco Themistius rationem reddebat cur melancholica corpora macra essent, ita enim ait, Affecta sunt corpora, ut eo non fruatur alimento quo vescuntur, & idem alimentum non subit partes nutriendas, & id genus corpora sunt infœlicibus lignis assimilia, quæ in regione arida, & siticulosa nascuntur. Themistius autem atram bilem propriè non sumit, sed pro succo melancholico frigido, magna enim pars melancholicorum & deterior morbosiorque per flauam bilem, aut succum melancholicum vstum, aut sanguinem generatur: vnde cineri, aut tartaro calcique talis humor similis est, quibus per adustionem calor est acer & mordax; vnde melancholici tales sunt pilosi, abundant multo excremento fuliginoso, quia in iis sanguis & succus est acriusculus, & calidiores sunt arteriæ plenæque fuligine.

Quoniam Themistius videt multos effectus frigoris, causam putat frigidam, at in magna parte hypochondriacorum est calor acer & mordax, hic est corruptor, & fructum non capit corpus, imò quò corpus calidius calore aduentitio, & febrili, calore naturali omnium bonorum authore, eò frigidius existit.

Id quod expressit illud Hipp. quibus calidior venula est; idest arteria, multitudo sanguinis exustum procreat & idem excernit; exustum, autem τὸ χυμῶδες vocat, à quo fuliginosum excre-

Contrarie indicationes in cura melancholicorum obseruandæ.

Cur melancholici macrescunt.

Visa bilis & melancholicus grauita inducit sympt.

Effectus frigidi non arguit semper causam frigidam.

Secl. 6. lib. 6. epid. partic 2.

*Celer cordis
motus ab in-
temp hēctica,
& quadam
aneurismatis
specie oritur.*

mentum multum, intemperies cordis & arteriarum, concurrente pulmonis calore & siccitate tam celeris motus, cordis (præsertim per gressum) causa est, & tam affectio hēctica est, non sic in aliis febrientibus contingit, non enim moti, ita anhelosi sunt: imo in corde ipso iam speciem aneurismatis subesse autumamus spiritu & sanguine mirum in modum arterias distendente & dilatante.

*Com. ad part.
72. l. 5. apho.*

Sed nunc relicto disputationis filo cætera perstringamus, nunquid cordis magnitudo, & eius intemperies in ea muliere, cuius ergo susceptum est hoc præludium difficilis respirationis causa esse possit, qualis esse solet in iis qui cucurrerunt. Vnde tanta inappetentia? biliosa cum sit temperamento, cur tantopere flatuosa? icterici non admodum flatuosi quia in iis bilis abundat, non pituita quæ in flatum resoluatur & raro imbecillitate partium nutritioni seruientium, (quæ vna causa est generationis flatuum) laborant, ait Galenus, quæ opinio an vera sit porro inquirendum.

*Com. ad apho.
65. l. 4. aphor.*

Difficultas hæc spirandi quia creber & frequens est spiritus nomine τὸ καρδιαγμῶς, apud quosdam veteres exprimitur: præsertim cum palpitationi similis est. Erotianus παλμὸν ἀθρόως & σφοδρῶς ἐν τῇ καρδίᾳ, (proprie dicto corde) γινόμενος cur καρδιαγμῶς, id vocetur vel. καρδιαλγία, non est facile explicare: nisi id fiat, vel quia talis affectio significet vim vitalem maximo incendio laborare, vel quia cum per æstum cor celerrimè vehementissimèque moueatur, anima deficere videatur, & id veteres vocant καρδιώσσειν, & καρδιαλγῆν, dici verbo vulgari potest, vnde cum pulmo inflammatur, frequentia sunt animi deliquia, & ἐκλύσεις; hæc nostra coniectura & præiudicium aliorum sit iudicium.

*Attenuantia
& incidentia
hepar siccant
lienem mi-
nuunt quod
sepe malum
est.*

Item peccatur in hypochondriacorum morbis nam ferè ad lienem opera dirigitur, & dum incidētia, ῥυτίκη & attenuantia, cappares, tamarix, cassutha, chamædrys, chamæpitys, flores sparti, immo radices calidiores præscribuntur, hepar siccatur primum, quia integris viribus traducitur ab iis medicamentosis simplicibus, & dum vulgus & medicorum & hominum intendit per corticem tamaricis & asplenium lienem minuere, minuit: imo fortè fit vt perexiguus sit splen, quod malo est; nam satis amplum & validum esse oportet splenem, vt hepatis sanguinem purget, alioqui mille incommoda sequuntur.

Ideo non est bonum minui lienem aspleniis medicamentis, nam vbi minor non benè defæcat sanguinem; hinc inappetentia,

& mille incommoda. sic narrant de chameleonte, qui nec bibit, nec comedit, soloque aëre nutritur; quòd hic lienem non habet, *Plin. c. 33. l. 8.* semper hiat, semper tenuem qua vescitur auram reciprocatur chameleon.

Quamquam quaestio est an medicamenta splenica integris viribus hepar pertranseant, si id sit non sit sine noxâ hepatis. At aiunt non esse necesse, quia à vena porta sunt rami mesenterici, quorum vnus ad splenem tendit: melius faciunt qui in affectibus splenis & hypochondriacis ad buglossum, borrag. nymphæam, succum pomorum confugiunt, alia vero siccant longo vsu impendio magis. At, omnis ὑπαρξίς melancholiæ hypochondriacæ consistit in intemperie sicca partium in hypochond. contentarum, cum nonnulla caliditate sine affluxu, sed cum obstructione potius à sanguinis & aliorum humorum crassitie. Eamque ob rem limaturam chalybis in hypochondriacis & decoloribus virginibus commendant, quod pluribus explicatum est alibi.

Quæ cum ita se habeant hypochondriacis sunt vt plurimum φαρμαχία ἐργασθεῖς, nam in ista siccitate partium naturalium in qua illius affectionis omnis ὑπαρξιν diximus residere, non purgandum ἀδρότερος i. vehementer. Enim vero hypochondriaci ferè æstuantia habent viscera, calida & sicca sunt temperie bilis acris genitrice, & cum suo calore & siccitate symbolum habeant & affinitatem cum febre, mirum cur ferè non febricitent, aut patiantur febrem quandam sui generis: quanquam reuerà interdum, diarias quasdam febres patiuntur febrium hecticarum ὑποδρόμους. Sed & obseruauit antiquitas; Mulierem rarò fieri hypochondriacam, διὰ τὴν φλόγωσιν, sed vbi sit, deterius habere, quia id est alienius à temperamento frigido humido, quod muliebri est, cum tamen perpetuò doleant & conquerantur: item sentiunt punctiones & lancinationes & in cute & in visceribus. Ideo Arist. dicebat corpus melancholicorum perpetuo pungi reuera, quod de elephantice scribunt, inter signa quidem æquiuoca duo hæc notant; quòd rarò febriant, & quod in cute punctiones sentiant. Notanda hæc & reuerà hypochondriacum esse verè est habere gradum vnum ad elephantem. Rondeletius ait, hypochondriacos & melancholicos videri quidem cærere febre, sed tamen febrire quadam specie febris quæ iis propria est. Sed vnum obseruatione dignum, metus est maior ipso periculo, & phantasia maximè afficitur. De his verum quod *Metus & mæstitia si perseuerent signum melancholicum Hip.*

*Qui delica-
tiores sunt ce-
rebro facilius
melancholiam
afficiuntur.*

mor in his ipso maior solet esse periclo. Item illud; Quid timeam ignoro, timeo tamen omnia demens. symptomata sunt minora quam opinio ipsa concipiat sed causa maior est, & efficacior quam opinio percipiat imò est gradus ad elephantem. Sic nomen hypochondriacæ affectionis (nec enim morbus est qui notari possit, sed effectus se prodit) multa includit & opinione maiora: Mirumque est, quòd qui delicatiores, imò benè temperato cerebro facilius & grauius afficiuntur, exhalatio tetra facilius impressionem facit, stupidi & obtusioris ingenio non ita percelluntur.

Sic prius hominum genus foeliciore est ingenio quam fortunâ & valetudine. At vero quòd ad therapiam attinet eamque difficilem reddit, est, quòd affectionis remedium auget symptomata, flatus borborygmos, inflationes, morbus non tam est in humoribus, quam in partibus solidis.

Actius.

Vna consolatio est, neglecti isti morbi sæpè fiunt leuiiores mirumque ad aliquid conferre negligentiam. Sed & ipsa senectus quæ morbus est, remedio est, præsertim si ex macro habitu comparetur.

Sed his relictis breuiter curationis capita attingamus.

*Capita deli-
berationis
pro therapia.*

Consulendum capiti tremulo, partibus naturalibus, in quibus scaturigo & soboles flatuum ἀνω & κατω qui flatus tantorum maiorum sunt auctores: consulendum quoque & partibus vterinis.

Capiti, litu ex oleo de salvia arte chymica extracto, expresso nucis moschatae, ol. nardino cum cera in aqua vitæ lauta, castoreum valeret nisi foetor adesset, valet quoque litus ex oleo de spica nardi, vulpino, lumbricorum, addita aqua vitæ emplastrum palmatum, diuinum, & de meliloto.

Hystericæ affectioni trochiscis de gallia moschata, suffitu exceptis, pilulis quoque de castoreo, & assa foetida cum aloë.

Partibus naturalibus præsertim ne ipsis flatibus tanti tumultus seditionis oppressiois que partium spirabilium authoribus studendum, medicamento legitimo. Diētum est ante, omne medicamentum esse illi mulieri ἐπὶ τῷ δαί, ideo balneum præmittendum videretur, purgatio sit ex catholico ad ℥ij. s. colatum & clarum in multas doses, vel rhab. cum syrupo de cich. comp. cum rheo, & vt deorsum reuoluantur flatus, clysmata ex iure pingui, quia sicciora sunt extra & intestina.

Difficultas oritur διὰ τὴν εὐπερίστατον causa calida, intemperies lactium calida & sicca, vnde obstructio attenuatiua, remedia huius
natiua

natiuæ intemperiei augent symptomata, vt obseruatum ante & verè iuuatur vino absinthite, tabellis calidis. puluis digestius confert, oui luteum cum saccharo, aut grano ambræ griseæ.

Fotus blandi ad splenem & ventriculum, vsui esse possunt.

ANNOTATIONES.

1. Vt quod de ea dicitur pertineat ad omnes alios hypochondriacos quorum magnus est numerus. *Ægra πολυπύμων* est actiosa, & negotiosa vnde animus inquiet, & qui non sinit corpus refoueri. Est autem labor naturalis, aut violentus: naturalis, labor, visus, auditus, vocis curarum, anima in id quod videtur intenta mouetur & calefit; calefacta euacuato humore siccatur, de auditu idem, mirum ne est, si illa non pinguescat cæterum cum hæc mulier hypochondriaca sit, mirum quoque quod niteat facies, quæ in aliis decolor & plumbea, in sanguineis *ἐν ῥοιᾷ* est, & teste Hipp. *ἐκ αὐτῆς*.

Hipp locus aureus lib. de dieta. loquens de visu & auditu. Hipp. 2. prorrh. & in epid.

Illi autem contingit quod pueris cachecticis quibus in cauo hepatis bilis recocta tanti mali author existit. At verè splenica non est benè colorata & inappetens, quod splenicis veris non euenit. Credo esse, velut *ἀνέμετος* quoddam vas fori cordis.

Lienosi sunt voraces, tum ob acidum succum, tum etiam ob acroscroscam lienis dispositionem

Quæstio mota cur virgines decolores tam male spirent cum alij febricitantes (ni malum in pulmone) id non patiantur. cur olim eam difficultatem spirandi non patiebatur, interna calent, fuligo magna, arteria calidior exustum quid procreat, corpus non ita spirans, bilis torrida, nitrum, sulphur dominatur, vt in vetere Gallo. Teste Hipp. 2. de diet. hinc omnia antiqua & marcida aluum magis mouent quam recentia quia putredine propiora: fidem facit caro Gallorum nitrosa & salsuginosa. Si à calore ætas defecta & inclinans remedio esse debet, morbi calidi in senectâ relinquunt. Hipp.

An detractio sanguinis valet quæstio mensis in biliosis sunt detrimentosi, ait Hipp. & sæpè *λεμόδυλον* afferunt.

In hypochondriacis præsertim qui sunt tormenta medicorum ob acres humores qui eos pungunt (qui partim natura, partim victus ratione, partim curis & solitudine fieri possunt, maximè vero sunt quibus viscerum est intemperies,) si temperantia tantum adhibeas, malum non tollimus, sed lenimus tantum, si acria, & quæ humorem tollunt irritamus: idem contingit quod & in herpetibus, & serpigine. Glutinosa mollia remedia malum fouent immo deterius faciunt, acria causam euocando non statim sanant sed irritant (qui locus pul-

Cc

Gal. c. 12. l. 2.
de simpl. me-
dicament.
facul.

cherrimus ab externis affectibus ad internos nos ducendo) sanitatem enim ratione euacuationis succum mordacem abluendo & detergendo non τὴν βίτην πρὸς τὸν σπένον efficiunt: imò contemperantia aliquando mordicationem maiorem efficiunt ex accidenti, ut si corrumpuntur & vna alunt fouentque cacochymiam. Sic videmus serpigini, psoræ, scabiei & c. à bile vsta, pituitaue salsa cutis vitiiis aquam salisam lythar. sulph. Aquam hydram aluminosam prodesse magis quam temperata & βίτην παρὰ τὴν, quæ alunt fouentq; cacoch. & acrimoniam. An ea lex contrariorum, ut contrariis contraria elidantur & oppugnentur his & simil. ration. chymici fundamenta sua stabiliunt dum dicunt similia similibus curari.

Sed hæc omnia ad rationis & veritatis normam & legem reuocanda sunt, nam ea Gal. methodus in cura prædictorum affectuum non destruit solemne illud Axioma Therapeuticum. Contraria contrariorum sunt remedia.

2. Non abs re dicebamus paulo ante perperam in hypochondriacis calidis & siccis dari medicamenta splenica falsa lienis affecti opinione, minuitur enim hepar, siccatur, augetur intemperies sicca, educitur serum liquato sanguine, & defectu seri sanguis aduritur, & cum lien minor est iusto, non ritè defæcat sanguinem humore melancholico; quo fit ut in venis & arteriis ardeat, unde pici aut gagatæ lapidi simillimus existit. Ideoque Galen. non vult detrahi sanguinem si in cerebro tantum affectio sit & nigrescat sanguis, si in toto corpore sanguis nigrior, audentius sanguinem mittit, si non sit melancholicus suppressatur, sic statuit eas distinctiones: In hac muliere flatus generabatur ob inæqualem intemperiem ventriculi & hepatis, & ij distendebant ventriculum in dies ventriculus amplior & capacior non poterat comprehendere cibos, unde ructuum & flatuum perennitas generationis. In hac muliere (ut in cadauere obseruatum) sanguis nigruebat, corque vix refrigerium accipiebat hinc pulsus inæqualis & palpitationi similis, ventriculus amplissimus erat, frigidiusculus unde rebus calidis, delectabatur, licet lingua sicca, esset & calidius hepar, sic ventriculus vix cibos coquebat.

CONSILIVM LXXIX.

De doloribus hystericis & hypochondriacis.

Virgo matura viro doloribus sauis ad regionem ventriculi torquetur, & maximè ἐν τῇ ἀναδόσει ipsius alimenti, tribus post horis ab eodem alimento sumpto. Inter cætera, repetunt sæuiuntque magis noctu, & ita venter ob agitationem spiritus, inflatulentis & humoris qui suos motus & αἰόλους non habet, quasi fermentatio foret aliqua, intumescit, vt nisi distringatur laxeturque, opprimatur creperque inedia, distentio fit diuulsiōque, eaque ita dolorifica vt vix ferendo sit, & tamen habet ὀρθοστέδιον, nec eius lamentis querelisque locus datur, ferè fit enim vt ij morbi negligantur qui decumbendi necessitatem non afferant, licet ipsi per se sæui & immanes existant. Vnde dolores dentium quia vulgares podagræ, tusses, tormina ventris & verminationes ferè negliguntur, quia sine febre, & vulgo homines affligant. Vulgus solet tantum misereri febricitantium, quia morbus est perspicuus, & vtinam ipsi hypochondriaci apertè febricitarent. At ob squallorem & hecticum quemdam calorem eorum humor non est suppurabilis, nec hypostasi declaratur. Dolor lateris, aut pleuritis nescio quæ totum hominem ad se conuertit, in lecto retinet, medicos cogit, denique nullo non magisterio & artificio oppugnatur, cum dolores dentium, tusses, tormina, sæuitiæ sint superiores immo tormentis adnumerentur.

Quod cum verum sit, & nil tam infirmum corpus faciat quàm dolor, is primùm omni arte est mitigandus, & is morbus in quo dolores adfunt, pluris est æstimandus, maioreque procuratione dignus, quam is à quo dolores absunt, & reuerà dictu est mirum quanta & quàm longa dolorum acerbitas ferè constantiam & patientiam ipsius virginis vicerit & conuulserit, & piget scribere ne id vertatur artis medicæ dedecori. Sæpe, ait Tullius, non sunt grauiora carnificum tormenta quàm quorundam morborum cruciamenta. Id quod hîc obseruatum est, & ferè iis non condolemus, quiaut assiduo dolore affliguntur quasi conquerendi, eorum affli-

Dentium affectus, podagræ, tormina &c. negliguntur sæpe licet tormentis adnumerentur. ait Celsus.

Dolor vires maximè infringit, & huic promptè occurrendum, dum habet rationem causæ morbi augentis, aut fouentis.

204 CONSILIORVM MEDICINALIVM

*Quæ uilia
putantur co-
gnoscere diffi-
cile Hipp. de
flat.
In epist.*

*Muliebres
morbi fere
incogniti
Hipp.*

*Diuerſi om-
nium morb.
muliebr. cau-
ſa Hipp.*

Aph. lib.

Sen. in epist.

*Dolor in an-
guſto.*

duitas opinionem faciat, aut ſublati, aut imminuti mali. Eorum vicem dolemus, qui febricula, aut inflammatione laborant, ut dictum eſt, tabem, heſticam febrem, dolores dentium & grauiora hiſ mala in aliis negligimus, quod non ſunt ea ita conſpicua, ut inflammationes, aut herpes. Id Langius tranſtulit ingenioſè ad animi & corporis affectiones; pluris vulgus facit corporis leuem affectionem in alio quia euidentis eſt, quam animi cruciamenta & tormenta: magis tamen in morbo eſſe iudicantur qui tabe, aut marcore laborant, quàm qui manifeſta inflammatione, aut febris hæ enim magis apparent & ſenſum feriunt: ſic ſunt in grauiore poena improbi qui lento paſſu ducuntur ad æternam mortem, carniſex enim animus quotidie minutis iſtibus pungit & cædit. Hippocrati hæ ſunt cauſæ cur morbi muliebres ἀνίατοι. 1. ferè ſunt incogniti: 2. præ pudore non narrantur, & ſæpè progreſſi ſunt antequam ingreſſi videantur. 3. error medicorum ſi curant morbos viriles & muliebres, nam longè differunt, ſunt enim & corporum & hominum proprietates, id quod mirum, cum non tam longè fœmina à mare differat, & illa, mas inuerſus dicatur. An ob uterum? an fas eas tragœdias excitari in uiduis & virginibus ob tantulam partem? Sunt morbi peculiareſ fœminis, alij maribus. Olim arthritiſ mulieri pepercit non nunc: non quod (ait Seneca) mulierum natura immutata ſit, ſed vita, & cum virorum licentiam æquarunt morbos virorum æquarunt, & quia fœminam exuerunt morbis virorum pleſtuntur. Hipp. mille motus uteri agnoſcit, & uterum omnium morborum muliebrium radicem putat.

In hac dolores ſunt deſcripti paulo ante, & ij à ſumpto cibo repullulant, & integraſcunt; unde id? dolores potius mitigari deberent appulſu boni & amici alimenti, flatuſ ſunt multi à materia cruda & calore imbecilliore, nec enim vigente hyeme nec æſtate media flatuſ oriuntur.

Mirum cur nondum aut tympaniteſ ortuſ fuit, aut tranſlatio ad caput iuxta aphoriſm. Qui circa umbilicum laboreſ & doloreſ qui neque medicamento, neque aliter ſoluuntur, in hydropem ſiccum tranſeunt.

Quid hoc quod tam diuturni doloreſ? nemo enim poteſt valdè dolere & diu, ait Seneca; ſic amantiſſima noſtri natura cuncta diſpoſuit, ut doloreſ aut breuem fecerit, aut tolerabilem. Dentium, articulorum, neruorum, aurium doloreſ ſunt acutiſſimi, quia in anguſto.

Caterum in examine istorum dolorum quæsitum est, an essent hypochondriaci, an hysterici, an mixti, licet enim ventrem superiorem affligant possunt etiam esse hysterici, ita enim intelligere oportet motus ipsos vteri sursum deorsum ad hepar & lienem, ut loquitur Hippocrates, non quod re ipsa loco moueatur vterus, sed quod sui, aut appetentis, aut indignabundi argumenta edat, in his aut illis partibus, habet enim insignes venas, quibus, cum hepate consentit, & nervos quibus cum cerebro, & arterias, quibus cum corde.

Sed hæ insignes afflictiones contingunt virginibus viro matu-
ris, incredibile enim dictu quantæ mutationes in ætates incidunt
primis coitibus & prima mensium eruptione, natura enim sui
motus dat quoddam signum, & dum sanguis suo exitu frustratur,
refluens ad hypochondria oppressionem facit. *Varij vteri
motus.*

At norandum est, sanguinem, aut ad alimentum, aut ad augmentum, aut ad foetum futurum suppetere debere, vbi sufficit ad alimoniam, aut ad augmentum, id quod restat superuacuum est (natura autem eo consilio mulieres læuiore frigidioreque effecit, ut corpore minùs spirabili plus sanguinis restitaret) id quod non solum in interno, sed & in externo corpore fieri debet. Ideo venæ laxiores esse debent, ut ad habitum sanguis feratur, deinde eæ sunt laxandæ quæ ad vterum pertinent: frustra enim euacuationem per vterum menstruum ciceremus, nisi habitus ipse plenus foret. Tunc enim argueretur sanguinem & ipsi virgini sufficere & puero futuro. At discernere num redundet an non, & in externo & in interno corpore, hic opus hic labor est.

In curatione sunt *αἰτεῖται* ex parte flatuum, ex parte temperamēti & caloris genitiui acriusculi. Ergo obseruata sunt hæc, species morbi, situs, causa, curatio, prognosis. Hecticus est calor causa mali & dispositio hypochondriaca, & ob appulsum noui alimenti dolor in digestionem sentitur, prius alimentum ferè non descendit, nec fit attractio ob obstructionem & tumorem partium sanguine repletarum: sic alimentum, aut corrumpitur, aut non attrahitur, & hypochondriacorum febris est sui generis, & febris est tumori cancroso non dissimilis, vnde sola temperata profunt hypochondriacis & balnea maximè, ut antè obseruatum. *Curatio.*

Ut in rebus omnibus est quædam maturitas suaque tempora, sic in virginibus suo tempore natura molitur *κατὰ ῥῆξιν*, quam si

non consequitur, hinc oppressiones, humor enim motus & non promotus oppressionem facit.

Menstruales non fiunt sæpè quia partes sunt validæ quæ totum sanguinem sibi, & retinent & acquirunt, & nisi partes infirmiores reddantur & sanguis imbecillior non fluat; idem fit quod in alienatione mentis à raptu, & vi sanguinis, effœminandus enim est ager & sanguis de consilio Aëtij & ad deliquium animi detrahendus. Quod an verum sit quæstione dignum videtur; quod autem ob robur ipsius sanguinis ipse aliò transferatur eoque, aut menstrui materia pauca sit, aut nulla, patet ex Galen. & vt è contrario morbi causa tollatur, videtur ei robori sanguinis imminuendo incumbendum esse.

Sed ad therapiam pertinet quoque illud, cur cum recumbit in lecto minùs frequens & grauis dolor est, cum aut sedet, aut deambulat amplior fit, in lecto inflectitur facilius corpus, & per inflexionem duo sequuntur commoda: vnum, quod per inflexionem recalescit venter, calefactus autem venter melius coquit; secundum est, quod dum flectitur corpus laxantur partes & sinuantur; id quod exitum flatibus dare solet: horum demonstratio eruenda est ex Aristotele, dum quærit cur sit melius cubare corpore inflexo quam distento, vbi physicas rationes exponit memoria non indignas. Itaque instituta conuenienti victus lege, repurgato corpore, balneum institutur, venæ sectio celebrata è brachio ratione ipsius plethoræ, licet non sit secuta manifesta alleuatio, nil perinde est, iteranda tamen est. Quasi si quis artem medicus is & artis euentum præstare semper debeat & possit. In arte medica licet sit perpetuum quod fieri debet, non est tamen perpetuum quod sequi conuenit, post modum vena in malleolo tundenda est, quò inclinet sanguis deorsum, qui in hac virgine semper (contra naturæ morem in mulieribus) partes superiores appetiuit.

Celsus.

CONSILIVM LXXX.

*Pro notario paralyticon aliquid patiente , aut
potius laxationem quandam articulorum
ipsarum omoplatarum.*

NOtarius quidam colico dolore vexatus est eoque acerbissimo, tanta fuit immanitas, ut præripuerit occasionem mendi cum methodo quadam metu maioris incommodi, sæpe ad leuationem doloris immittendus fuit balneo, cœlo frigidiusculo, immò, ut verbo dicam, cum temeritate remedia rapienda potius fuerunt, humor qui id genus dolores concitabat, erat æruginosus qualis in agri illius corpore congeri ac cumulari solet. Quare? ob ipsorum viscerum intemperiem & feruorem, non tam forte à natura quàm à diæta contractum: vnum enim de eo agronotandum est quod & ad notitiã & istius colici doloris & familiaris, & morbi alterius qui inde secutus est & cuius gratia hic locus tractatur, maxime pertinebit. Illud vero est, ager iste etiam dum prosperrima sanitate fruitur (si modo in eo sanitas est) solius vini & panis vsu sustinetur, à carnibus iusculis, & omnibus aliis esculentis abhorret, ad solum vini, & eius generosioris & meracioris vsum confugit, hinc prouentus bilis, hinc feri indomiti congeries, hinc inappetentia, augetur enim intemperies nescio quæ in dies magis appetentiam deiiciens, calor enim acer ori ventriculi molestus est, edendi desiderium adempturus.

*Sic loquitur
Celsus.*

Hinc sitis assidua & rerum quæ alienam qualitatem excedentem habent, immoderata cupiditas: ita enim à Galeno dictum definitumque est, soli, ait, extra naturalem statum constituti amarioris acerbis, acidisque cibis delectantur, naturaliter habentes & excrementis vacui pinguibus & dulcibus, & nulla vehementi qualitate præditis cum volupate delectantur.

*Benè habētes
dulcibus egre
amaris, falsis
acidis &c.
delectantur.
ad par. 14.
sect. 5. l. 6. c. 1.*

Caterum præter incommoda quæ affert vini vsus præsertim ubi cibo non est temperatus, de quibus incommodis dictum est, aliud etiam lōgè deterius est, est autem neruosi generis imbecilli-

Vinum ieiunos bibere nouitio n. uento inuulsiſſimum & placitū Med. nouitate ſeſe commendantiū Plin.

1.

ad apho. 21. lib. 2.

Com ad apho. 28. l. 6.

Obiectio de vino quā quis in affectionibus nervorum vſum vini tueri queat.

Gal. ad aph. 5 l. 5. Vinum ſub iam nervoſis partibus vſu quo qualitate amicum.

3.

tas, vnde cerebri affectio, & apoplex. epileps. tremoris nervorum, paralyſeos opportunitas, & ſi enim vini ſua ſunt commoda, præfertim ſi præſumptis cibis hauriatur; ita maximum ſequitur detrimentum ſi ieiuno vacuoque ventriculo & nullo proiecto alimento bibatur. Obiter autem dictum hoc ſit tamen quoniam extat ea de re præclarum Galeni edictum illud nō debet prætermitti: Qui vel inedia, ait Gal. velalui profluuiū, aut fluxu ſanguinis, aut tali euacuatione, famem habent, non capiunt ex vſu vini utilitatem, imo offenduntur, quoniam & conuulſionibus & deliriis conſeſtim corripiuntur, ſi antequam cibum ſumpſerint vinum bibant. Item dum loquitur de iis qui ſunt opportuni podagricis inſultibus, tria maximè recenſet, quæ eius affectionis occaſionem afferunt, deſidiam, crapulam & vini vſum maximè ventriculo inani. Nocent, ait, & potus multi & generoſi vini, præcipuè cum aliquis ieiunus potarit.

Vnde mirum non eſt ſi noſter ager inciderit in ſpeciem aliquam paralyſeos, aut potius relaxationis articulorum ipſius humeri: vinum ad id eſt valdè efficax, niſi forte quis dicat vinum quia calfacit & ſiccāt, tantum abeſſe, vt obſit nervis vt eos roboret, pares enim habet vires, ac olea arte chymica elicita, quæ ſiccādo & calfaciendo tantoperè firmant, contendunt & roborant nervos. Id quod Galeni patrocinio tueri facile poſſit. Quæ enim incommoda vinum ſanare videtur ea ante ipſum effecerat, ſic vinum nervis erit alexipharmacum, nedum venenum, vnde malè epitheto Bacchi inſignitur ὁ οἶνος λυσιμελής. Ita Galenus, Vinum facile nervos replet ob calidam temperiem, intrat enim, vt cum non habeat craſſam ſubſtantiam, ſic ſubſtantię copia nervos conuellit, rursus autem qualitate ſanat eam quam fecit diſpoſitionem nervos calfaciendo atque exſiccando, & ſi id non facit, mors ſequitur, & vt vinum ſanat conuulſionem ita & febris. Quis autem apud Galenum locus eſt, qui vino magis patrocinetur, cur tam cautè podagricis, lunaticis, tremulis, paralyticis, & omnibus quibus nervoſum genus afficitur, interdicitur? & vt paulo antè dictum eſt; datur à Galeno hemicranicis; ſi ſiccāt, ſi calfacit, etiam paulò immoderatus ſumptum, non nocebit, imò medicatam vim habebit, & tamen audito affectu cerebri, aut nervorum, aut membranarum, cane & angue peius exulat. Neſcio cur id fiat niſi dixerimus calfaciendo & ſiccando iuvare poſſe, ſed vel maligno tetroque vapore nociturum eſſe vel plus ipſum vinum fundere, liquare & humores

humores irritare quam possit digerere; unde fluxionum prouetus & neruosi generis repletio & humectatio, unde Galenus ait, repletis neruis conuulsio fit, replet autem vinum.

Relaxatio ista & παθος τοῦ ἐλαυτικόν, secutum est dolores colicos. An id fit, reuera vidimus plerosque qui post longos morbos, præsertim post colicos dolores speciem quandam paralyseos contraxerint. Quod quâ ratione eueniat pluribus, satis est locum indicasse, est philosophi in ipsius causæ inuestigationem incumbere. Primum notus est Hipp. aphorismus; Cui intestinum à dextra parte articulorum morbo laborauit, erat quietior, postquam verò id curatum fuit, erat dolentior, id quod tribus de causis contingit: vel quia nunquam duæ partes sunt inter se similes, vt æqualiter afficiantur, vel quia duobus doloribus omnino non eundem locum occupantibus, eorum maior obscurat & eleuat minorem, vel vt ipse ait Galenus in com. quod humorum in articulos influentium motus ad colon intestinum est conuersus, & reuocatus: si id verum est cur non post dolores colicos humor in articulos referri non potest? itaque nouum non est, aut dolorem articulorum, aut paralyseos colici doloris esse consecutarias. Quidam id intestinorum malum de descensu in scrotum interpretantur, mauult Galenus de dolore colico intelligi. De eâ quoque re I. Hollerius arte medendi & singulari iudicio antiquis medendi magistris non postponendus, hoc litteris consignauit, quod autem à veteribus scriptum est colicum dolorem in paralyseos transire, id rarum apud nos, familiare vero est Britonibus; cuidam sacerdoti ex dolore colico paralyseos quæ colicum dolorem soluit, sed ea superfuit, quâ hoc fit vt ab intestinis in principia neruorum fiat humoris recursus? vide an sit vera paralyseos.

Non est mihi institutum amplius de paralyseos disputare, ampla enim esset materies, & quæ non esset huius instituti, tria tantum præstabo; primum per capitula proponam ea quæ in medicorum consilio eram propositurus de paralyseos. At non tam paralyseos quam relaxatio neruorum & articuli à nobis deprehensa est. Secundo, an cum sub finem morbi paralyseos contingit, num ea à siccitate potius sit repetenda. Tertio, si sub finem morbi contingit, cur non potius contrahuntur articuli quam laxantur?

In toto homine, totâque vita obseruatur, & τὸν οὖλον καὶ τὸν λῶσιν, conformatio & apta membrorum colligatio, vt corpus vnum & continuum esse videatur.

Magis fundit & liquat vinum quam possit digerere, unde dist. prouentus, & neruosi generis repletio & infirmitas Gal. ad aph. 5. lib. 5.

4. 6. epid. par. 3. sect. 4.

5.

In scholio in cap. de colico dolore. Historia.

τὸν οὖλον καὶ τὸν λῶσιν in vita obseruatur vt corpus vnum & continuum sit.

Paralyfis ab obftructione nascitur, à compressione, diuisione, seu solutione continui: sic laxatio ligamentorum paralyseos causa esse potest.

Aliquando superiores partes resoluuntur, aliquando inferiores, vt crurum & tibiaram, est resolutio quæ *ὁμιλοῦνται*, antiquis vocatur, malum hoc cōtingit, ex prauarum aquarum vsu. In exercitu Germanici Imperatoris, cum superiores partes occupantur, si cerebri non est suspicio, ad medullam spinalem, & ceruicem malum refertur.

Si primæ vertebræ ceruicis afficiuntur vsque ad quintam, periculum est ne vox intercipiatur.

Si quinta, ad manum affectio extenditur, vnde apud Hipp. tremor erat in manibus Pythionis, erat enim collectio in primo intercostali, qua parte thorax est contiguus vertebris ceruicis. Si ergo in quinta malum est, absoluta est paralyfis; Si in sexta, non sensu, sed motu priuatur manus. Si septima & octaua, thorax afficitur, sed & quidam digiti resoluuntur quoniam nerui ab ipso cubito & olecrano ad digitos tendunt laborantes.

Causa, obftructio, compressio, solutio continui.

An siccitas paralyseos causa sit, dubitatur; nam sub finem morborum corpore emaciato videmus paralyfim quandam oriri partibus redditis imbecillis, corpore languidiusculo reddito, compagibus ipsis aliqua ex parte dissutis & vacillantibus.

An non à siccitate potius & imbecillitate quadam hæc locatio, laxitas, & resolutio sequitur.

Tertium iam erat vt quæreremus etiam si sub finem morborum paralyfis sequitur corpore sicciore reddito. cur non potius coarctatio, & constrictio sequitur, non obftructio, non compressio? Ac quod sub finem morborum præsertim post dolores colicos aliquid *ὁμιλοῦνται* oriatur & contingat, illud paulo ante dictum est, & recentiorum obseruationibus testatius redditum. Et non alienum erit Fernelij obseruationem attexere. Obseruauimus tertianam diuturnam, & quartanam in atrocem cruciatum colico immaniorem desinere qui nonnunquam & in artuum dolores, & in paralyfim facessit: & eodem capite, paulò ante attulerat historiam cuiusdam qui cum biliosa vomitioni foret obnoxius, eâ suppressâ immanes colicos dolores sustinuit: hos secuta est paralyfis partium quæ sub capite sunt, rigores erant frequentes, idem Fernel. scripsit, alius quæuis humor in spinæ medulla infixus paraly-

De hoc affectu in præcedentibus cons. 8.

Part. i. sect. 1.
l. 3. epid.
Paulus c. 18.
l. 3. particulares paraly-
ses explicat.

Vide de Tabæ
coxaria post
sex morbi
mensis, in
coactu paulo
post dicitur
de ea.
De paralyfi
post colicum
dolorem Æg.
c. 18 l. 3.
Fernel. c. 10.
l. 4. patho.
Et apud Hip.
Enichis post
cholericas af-
fectiones di-
stensionem
neruorum
cruraliū pas-
sus est 7. epi.
c. 3. l. 5. patho.

sim committit ac sæpè flava bilis hanc infligit, cum sub finem intermittentium febrium in spinam dorsi & nervorum propagines & origines, effunditur, his autoritatibus & exemplis res facta est multo illustrior.

Hæc paralyssis post colicum dolorem Pictaviensibus familiaris est.

Nunc autem postremam partem attingam, cur cum morbus longus præcesserit consumpto multo humore & spiritu, pars non constricta potius fuerit quam laxa ac dissoluta: hoc pluribus verbis explicare animus non est, nunc tantum adducam Hippocratis auctoritatem, ex qua huius rei demonstratio, aut saltem probabilis quædam ratio duci poterit, locus est commemoratione dignus, & tanto viro Hippocrate dignus, qui non ea quæ sub sensum cadunt more vulgi observat, sed quæ reconditoris sunt cognitionis. Sententia Hippocratis hæc est: Carne expertibus citius & excidit articulus & reponitur quam carne præditis. Minor inflammatio humidis & macilentis quam siccis & carne præditis oboritur: quia ubi violenta est luxatio, repositio quoque dolorifica est: dolorem sequitur inflammatio & inflammationem astrictio: ubi mucus adest & carnis inopia, facilis est repositio; hinc dolor nullus, nulla inflammatio, nulla astrictio, lubricus enim ob mucum redditur articulus, deinde subdit Hippocrates.

Part. 29. l. 1. de artic.

Vide lib. Ball. de arthritide.

Omnino autem mucosiores sunt articuli macilentis quam σαρπηνοί, id est carnosus & carne præditis, nam carnes eorum qui non rectè per inedia extenuati sunt, Græcè λεγόμενοι καὶ χυμώτοι ea mucosæ sunt magis, si graciles sunt quam si carnosus sunt, & tunc παχέες dicuntur, si cum inflammatione mucus subsit per ipsam inflammationem ipse articulus quodammodo vincitur, & ligatur & non multum propter mucum elabitur. Hæc autem Hippocratis verba paulùm à ratione aliena videntur, nam cum quis fit macilentus per febrem, fit consumptio spiritus & carnis: febris enim, ait Plinius, sanguinem consumit, inedia consumit & extenuat, unde aphorismus, corporibus carnes humidæ habentibus fames adhibenda, siccatur enim corpora. Galenus edito eleganti cōmentario explicat carnes eorum qui vel fame, vel luctu & mœrore, vel iracundia, vel dolore extenuantur, mucosas etiamnum fieri, quia per ea pathemata ipsis in carnibus fiunt quædam συπτήσεις, colliquationes & mucos liquato opplentur carnes, qui per eam corporis superficiem non diffatur, nec sensibili nec insensibili transpiratu. At cum medicus dietam instituit & corpus attenuare vult primum id inedia coerces, deinde frictione, & exercitatione: si aliqua col-

6.

Ibidem,

“

“

7.

Apbo. 59. l. 7. In part. 30. l. 1 de artic.

212 CONSILIORVM MEDICINALIVM

liquatio contingit, vel per manifestum sudorem, vel insensibilem transpiratum reliquum digerit, sic si qua ex corpore reliqua est humiditas, ea educitur, ni educatur corpus liquatum tumer.

8. Hic locus dignus est nota, vt disputemus contra eos qui deducto alimento satis esse putant ad consumendos humores superfluos famem præscribere: nam si corpora sunt biliosa, bilis magis efferuescit, & æruginis naturam induit: si pituitosa, liquato adipe & carnibus, mucus quidam colligitur qui molestiam infert, at vbi vel exercitatio, vel frictio, vel decoctum conueniens adhibetur, foras digeritur & egeritur quod dilapsum ac colliquefactum erat.

9. Antequam ad vmbilicum res deducatur quoniam de relaxatione articuli humeri ipsius dictum est, duo breuiter attingentur; prius de muco, quid sit, vbi sit, & quarum partium sit, & an facile consumatur: posterius relaxato articulo an pars tabescat, an crassior fiat, an non, vt otiosis contingit.

Mucus & partium carnosarum & neruosarum esse videtur, ex textu superiore, & tamen Galenus videtur detrahere partibus ipsis carnosis, Caro ait non propria sui ratione fit mucosa, aut alia pars sanguinea, sed proprium excrementum est quale in affectionibus rheumaticis (ἡ δὲ θέρσις Πύματις vocat) & in iecorariis excretionibus, Græcè τὰ διαχρήματα ἡπατις frequenter in ossibus & cartilaginibus & membranis apparet, raro in carnibus, hic mucosus humor, aut ex communicatione quam cum illis partibus habet, aut ex copia succi qui in illud confluit cum pituitosus & mucosus humor, ibi collectus est, hic ægrè exinanitur, cum nec perfusionibus, nec cataplasmatibus, nec medicamentis attrahi, aut discuti queat.

Posterior pars est, an si pars luxatur & excidit, extenuatur; cum contrà aliis appareat obæsiior crassior, & tumentior. Aphorismus sic habet; Quis coxendico dolore affectis coxa excidit & incidit, mucī superueniunt, in Greco ἐπὶ τὴν κοίτην. At cum mucus præcedat laxationis & luxationis causa, melius legitur ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς, id est in acetabulo ingenerantur mucī, nisi pro eodem vtrumque verbum sumatur, & quamquam cum laxatio contingit & facta est, mucus etiam denuò ingeneratur, tamen ante genitus erat, sic in primo erat τὸ ἐπὶ τὴν κοίτην: in posteriore τὸ ἐπὶ τὴν κοίτην per causā morbigicā productionem. item apud Hippocratem est alius locus de tabe coxaria quæ post morbum semestrē contingit: Quibus sæpè recidiua facta est si sextum mensem ex-

Varia de mu-
cose excre-
mento que-
stiones.

10. Nomen hoc
διαχρήματα
ἐπὶ τὴν κοίτην
potest expli-
cari ex c. 4.
h. v. de locis
aff. et.
Ex hoc loco
apparetur
morbi mem-
branarū, car-
tilaginum &
partium ner-
uosarū vix
elidantur,
mucus enim
nec facillè co-
quitur nec
discutitur.

11. 9. c. 60. l. 6
In coxis.

cefferunt facile in coxariam tabem incident : id fit cum humor
contumax vix & ægrè exclusus venis in articulum magnum &
latum decubuit, vbi qui calidiore loco coqui nequiuuit, ægrè con-
coquetur, cætera ad demonstrationem eius rei in Coacarum
comm. apud Hollerium. nam dubitare quis posset num necesse sit
à venis & reliquo corpore ad articulum humores confluere, an
non diuturnitate morbi carnes circum articulos liquentur, hinc
mucorum prouentus, hinc laxitas, hanc exitus ossis è suo loco con-
sequitur.

*Pars muco
plena aut ob
venarū flu-
xim, aut car-
nium vicinarū
conuulsiu.*

12.

Caro autem crurum, aut tibiærum in luxatis tabescit, licet,
περὶ τὴν φαρτασίην, mole quodammodo tumidior esse videatur.
Et Galenus tria considerat in elapso articulo, vt non fiat nutritio
inde tabes sequatur, Articuli è sua sede emotionem: ineptitudi-
nem ad vsum: otium; otij nomine omnia concludi possent, nam
pars otiiatur, & quia suo loco dimota est, & quia ad vsum inutilis
visa est, inde iners pars manet. Quare ergo non nutritur? Notan-
dus est Aristo. locus, quo docet corpus nostrum continuum, aut
aliquando contiguum esse & ratione ipsius continuitatis vaso-
rum fit in omnes partes diuisio & partitio, nulla vena seorsim per
se est, sed omnes, pars sunt vnus, si os separatum esset, officio non
fungeretur, vena etiam si qua separata foret, nec suæ origini con-
tinuatenderet, suum sanguinem seruare non posset. Calor pro-
fluens ab origine facit ne gelet &c. Ergo in relaxatione summa,
non mirum si partes emacientur. Et si quædam superficies carnosæ
tumentiorque apparet vera caro non est. Cum quis exercetur &
fricatur, is fibrarum substantiam pleniorē habet, carnis tenuio-
rem, sed validiorem: contra non exercitati fibras graciles habent
& carnem multam, sed mollem præ humiditate, est enim ista caro
caseis qui coagulantur similis: exercitatorum verò integrè coa-
gulatis: plura vide eo loci ad hanc tractationem valdè confe-
rentia.

*Cap. 9. l. 2. de
part. anim.*

*Com. ad part.
81. l. 3. de art.*

Atque vt tandem scribendi finis fiat, consideret medicus an
sit extenuatio omnino facta in iis, qui aut paralytici fiunt, aut qui-
bus relaxati & exoluti sunt articuli (longe enim interest) an pro-
luantur nescio quo muco liquatis carnibus, & non excusso dige-
stoque eo quod liquatum est. Tunc enim falsa opinione extenua-
tionis & maciei, & marasmi non inducēis vt omnino à sudorifico
abstineas. Huc enim pertinet historia memorabilis apud Gale-
num de quodam qui cum tophos & *πορρώδες τι* in renibus habe-

*Observatione
digna in cura
paralyticos.*

*Historia Gal.
notanda.*

ret, vsus est medicamentis attenuantibus eo vsque, vt digitos agere mobiles haberet & quiddam cauum sonantes præ siccitate, medici id obseruantes, non habita ratione victus qui præcesserat ad remedia paralytica impendio magis calfacientia siccantiaque confugerunt, nil profectum est, immo magis malum ingrauescebat. Melior habitus liberaliore victu restitutus est, restitutaque & fanitas est & motus digitis est restitutus, indeque *τὸ κίνησις* mendendi elicietur vt motus & sensus deperditio, aut deprauatio aliqua aliquid *ἡ ἀλυσίς* portendens non tam corporis extenuatione opus esse quam refectione edoceat, alioqui multi hic errores committerentur.

*ex rationis
capita.*

Quoniam prauo vtitur victu aeger iussus, & (aut maturanda fanitatis spes tenuis foret) monitus ad alium sese conuertere. Purgatio ex solemni syrupo est instituta, vsus decocti scynæ cum guaiaci medulla interiori additis passul. & glycyrr. masticatoria, erithina, pyrotica ad futuram coronalem, frictiones, litus ex balsamo parato ex herbis nerualibus concisis & in oleo hypericonis per dies aliquot ad solem obiectis, deinde igne lento costis addito vino, mastiche & terebinthina, totoque expresso in oleum eliciatur, fortus ante cum spongia in similibus herbarum decocto macerata, his peractis admotum est emplastrum, ex emplastro ad fract. ossium, contra rupturam, desiccatur rub. admisto puluere saluix, denique cantharidum puluis admotus fuit humeris, & brachio sero multo euacuato restitutus est, magna ex parte, id quod obseruatione dignum est, declarauitque curatio quodammodo temeraria, quam verè de causis tanti mali cogitauerimus.

ANNOTATIONES.

1. Qua ratione in dolore capitis, imo in hemicrania vinum conferat (id quod præter vulgarem opinionem est) somnum conciliando, ideoque humorem conquendo Gal. com. in part. 5. sectio. 6. lib. 6. epid. item eo loco experimentum facit quomodo ieiunio ventriculo vinum datum noceat.
2. Ita Mesuæus capite de paralyti vinum in paralyti vitetur, nam facit penetrare materias ad nervos quæ non penetrarent, est inimicum nervis & oculis, ipsius abusus est causa morbi ipsorum.
3. Coniectura hæc nostra est, vt plus subeundo vinum fundat, & li-

quet quam foras digerat: at medicamenta hydrotica fundunt & digerunt.

4. De paralyſi poſt colicum dolorem Paul. *Æg.* caput ſcripſit ad finem 18. cap. lib. 3. & Ballonius in lib. *epiſt. medicinalium*.

5. Hic dicimus paralyſin ſequi poſt colicos dolores & ſub finem morborum quod Fernelius explicauit amplè locis citatis.

6. Ad hunc locum facit prob. 5. lib. 1. *Ariſt.* cur vtentibus prauo cibo & in ediam patientibus pedes intumeſcant, tabeſcant & intumeſcant, vt ſit in cachecticis. Primum intumeſcant, deinde exareſcant.

7. *Μύξα*. mucus dicitur, eſt autem ſubſtantia quædam lenta, glutinoſa, quæ propriè in oſſibus cartilagine & membranis congeritur: impropriè autem in carnibus vide *com. ad part.* 66. lib. 3. de art. huc pertinet id *Hipp. lib. de loc. in homine*: mucus omnibus à natura eſt, cum purus fuerit articuli ſani ſunt & benè mouentur: labor & dolor ſit cum à carne humiditas fluxerit vitioſa.

8. Vulgo dicitur per inedias ventrem bilioſos & acros humores ad ſe attrahere: vnde apud *Hipp.* 4. de morbis ventriculus vacuus fruitur corpore colliqueſcente idem penè *com. ad apho.* 50. lib. 6.

9. Calor appulſu noui alimenti recreatur, ſed cum defectu noui cogitur mendicare aliunde ac veluti reſumere dimiſſum alimentum ac remandere reuocatum, tunc fatiſcit & corpus magis ac magis collabitur vnde in febribus prout ſunt gradus purgationis, ita & renutritionis.

10. Horum demonſtratio petenda ex *com. ad apho.* 39. lib. 5. ubi docet excrementum (loquitur maxime de naturali) habere humorem ſimilem naturæ partis, vt ſanguis in hepate eſt, & in articulorum compaginibus humor glutinoſus.

11. Quod hic humor mucosus ſit proprius membranarum & neruoſi generis apparet ex principiis ipſis generationis; nam *Hipp. lib. de carnibus* docet alias partes ex pingui eſſe, vt oſſa, alias ex glutinoſo, vt membranas & neruos, alias à ſanguine vt carnes.

12. *Ariſt. prob.* 5. lib. 1. docet per famem & inediam & ob prauum viſtum pedes intumeſcere, quia corpus tabeſcit, qui locus huc pertinet.

CONSILIVM LXXXI.

*Pro Domina de Roissy ischiadicos dolores
patiente.*

Appetente vere & humoribus quasi vernantibus dolor ad ischium sinistrum acerbus, non vera tamen ischias, sed incipiens, ni malo occursum fuisset, his capitibus breuiter res tractata est.

Morbi neruosi generis de apicibus artis sunt ob curandi difficultatem ex parte humoris & obiecti, seu subiecti corporis.

In humore consideratur modus quo dolor mouetur & natura ipsius.

Modus aut per modum fluxionis à superioribus in inferiores partes, à nobilibus in minus nobiles, aut per congestionem in parte iam imbecilla. Tertium modum addo ex Galeno per colliquationem quandam in carnibus ipsis, quam colliquationem non sequitur digestio foras ut fit in senibus, qui colliquantur & dolent.

Duæ forte huc concurrunt, fluxio & fusio humorum in ipsis carnibus & musculis, unde rarefactio, & diminuitur caro musculorum. unde apud Hippocratem τὸ ἀσάρκον ἢ ἄλιον κέλος vocatur, demusculatum interpres vertit.

Cauetur ne humor à parte robusta, aut ignobili in imbecillam & minus nobilem repellatur, præsertim hæc methodus seruatur; contra Hipp. & Galenus sentit, humorem enim tuto aiunt regeri posse in fortiores & nobiliores, ut pote quæ cum viribus polleant, his vsæ humorem coquunt & mitificant.

Ratio posterior de liquatione humorum, & carniū casu in senibus (ut dictum est) cernitur, diffuunt enim carnes circa ossa & tabent hinc dolores.

Humor qui aut arthritin, aut ischiadem facit, ambiguus est, de ischiade rarò à sanguine Galeno à bile & pituita mixtis sæpè, hinc illud Plato. pituita acida & salsa fons est affectionum καὶ παρρηϊκῶν, si frigidus,

Morbi neruosi generis, ex parte humoris & subiecti curatu difficiles.

3. causa in generis, fluxio congestio & colliquatio.

2. de nat. hum. hic locus est notandus.

In timæo.

fi frigidus, aut calidus humor foret, per simplices qualitates oppositas vinceretur. At istæ secundæ qualitates non habent ita contrarium, vnde quod remedium nunc iuvat, mox idem lædit & medicorum opprobrium morbus hic dicitur, & cæca origo eius paulo videtur.

Medicamenta per os sumpta initio non ita conferunt, præsertim si sint *μολύβδα* hoc enim therapeuticum præceptum, quæ per interiorem ventrem fiunt evacuationes, fluxiones ferè in partes vicinas commouent.

Sacculi ex fufure, fofus, enemata, astringentia lumbis, detractio sanguinis è brachio, non ligare tibias, non impingere materiam in articulos: vfa est clysmatis, axungia porci lauta in aqua vitæ, cataplasmatibus, ceroneis non valde calfacientibus, vesicis fuillis lacte plenis, breuî Dei beneficio conualuit.

Sed plurimum adiuta fuit ceroneo sequenti.

℞. Diachyl. albi ireati ℥ iij. gummi pini picis naual. benioing añ. ℥ j. ceræ nouæ ℥ j. f. dissol. lento igni, adde emplastrum de melilot. & de mucag. añ. ℥ f. cum oleo chamæ. & terebenthina, fiat cerotum.

Ad part. 66.
l. 3. de articu-
lis docet Gal.
quale sit ex-
crementum
neruorum, os-
sium, cartila-
ginum & quâ
egre coqua-
tur, digeratur
& euacuetur.
cc Gal. 9. sec.
locos loquês
de priapif-
mo.

CONSILIVM LXXXII.

De stranguria dysuria & ischuria.

D. Deliure circa mensem Maium modo stranguriâ laborauit, modo dysuriâ, ischuria aliquando, purulentum minxit limpidum τὸ μὲν ὥδεις tunc dixisses verè φλέγμα πῶδεις, aut τὸ πῶν φλέγμα πῶδεις, sanguinis concreti grumi excernuntur, denique abominanda erant omnia quæ per vrinam, & cum vrina excernebantur, hypochondrium sinistrum effloreat & intumebat, splenem laborare & induruisse suspicabantur, foris & intus medici utebantur remediis respicientibus lienem, interea ren sinister coafficiebatur, & iam calfactus fortibus splenicis & decoctis vicinia ipsa ladebatur, de eo ægroto hæc tria notanda; Primum temperamentum biliosum valde, hepate intemperato: Secundo ante annos 25, de lumborum dolore querebatur: Tertio, gonorrhœa ali-

E e

218 CONSILIORVM MEDICINALIVM

quando laborat & dum graua symptomata & dolores pateretur ad partes vrinarias, renes, vesicam, etiãnum medici splenem curabant, rati fortè eas vrinās vitiosas indices esse exonerationis ipsius lienis, non raro enim id contingit. Ideo formulæ remedium similitè pariterque dicabant operam & reni, & spleni. Sic forte paulum temeraria fuit medicatio, (pace medicorum dicam, à more enim meo alienum est quemquam suggillare, ne dum artis nostræ magistros & officij societate consortes & collegas) quia quod spleni consulere poterat, renem laborantem lædere poterat. In excretionē obseruatur materia, modus excretionis.

Materia & modus excretionis obseruatur.

Si hoc, vel illud totum renale est, & successu temporis vrinariæ partes mittentes, ducentes, excipientes laborant.

Excretio multiplex qualis affectis renibus esse solet, ideo fallaces sunt in renalibus vrinæ, materia, pus, sanies, tabum, vrina tenuis, crassa mucosa, vlcus renis antiquum notat: mucosa bifariam, aut ob pituitam purulentam, vel pus pituitosum; hinc excretio mucosa, & ob quoddam vlcus fit sæpè talis, vel quod partes membranosa spermatica, iam dissoluuntur, aut tale proprium excrementum colligunt & excernunt, id quod Gal. docet libris de articulis.

Ea vrina mucosa, aut calculum in vesica significat, aut ori vesicæ vlcus, aut veterem affectionem vesicæ ad part. 65. l. 3. de art.

Tertia ratio ob peculiare vitium parastatarum, vt in iis qui gonorrhœa laborant, vel calculum in vesica habent.

Nunc de modo, modus est stranguriosus, qui senibus est familiaris ob pituitam falsam, dysuria est aliàs ob infarctum & obstructionem & humorum confluxum in partes vrinarias. A splene stranguria quædam esse potest. At nec tam facile nec tam diuturna est.

Modus.

Sic hîc renes accusandi sunt omnium iudicio.

Et tamen splenica sunt data toties, hic lien fateor laborat vt signum, non vt causa; quia quibus lien efflorescit, iis corpus extenuatur & docet male administrari œconomiam naturalem, vt signum & ministrat materiam ob viciniam: immo ren potest quadruplo maior esse etiã consumpta carne & facere opinionem tumentis splenis, id quod obseruauimus.

Gonorrhœa quæ olim præcessit maximè in causa & relinquit in lumbis dolores & querelas: item symptomata memorata facile inducere potest affectis viis vrinariis, stranguriam & dysuriam.

I. Aquæ naturalis.

Laudo vsu aquarum naturalium, offendunt tamen siccatos &

emaciatos, tamen si vlcus renis in causa est, ab iis non desistendum : curato vlcere tabes & marcor desinet, Balnea conferent, *Purgatio.* purgatio ex lenituo, phlebotomia frequentior ex basilica sinistra valde proderit, si hemorrhoides sese offerant excipiantur.

Si suspicio carunculæ in vrethra, huic consulatur quadrantibus remediis, iniectiones fiant frequentes.

Lac asinæ & mane & vesperi, ni hypochondrij affectio dissuas-
rit, sed experiundum.

Hydromeli probò, fugiatur oxymeli præscriptum, & diuretica deterfundunt & ardorem vrinæ cient.

Nec probò splenica nimis deterforia, nimis sanguinem deter-
gunt sero detracto, & venas aperiunt.

In supressa vrina succus amygdulcium, supradictum hydrome-
li parabitur etiam cum herbis vulnerariis, non multum calfacien-
tibus & aperientibus; conserua rosarum in bolo & potu.

ANNOTATIONES.

1. Cum æger olim Gonorrhœa laborarit, videndum num etiam hy-
drargyrosim passus sit, aquarum enim naturalium vsus (maximè ea-
rum quæ vitriolo imbuuntur) nociturus esset : nam dicuntur nocere iis
qui vncti fuerunt in lue venerea, ratio est quod odium interuenit cal-
cantho, quo illæ aquæ imbuuntur & argento viuo, quod à calcantho
dicunt cogi, coerceri, & colligi, vnde postea id argentum viuum magis
vires exercet in partes & eas corrumpit.

2. Lac in magnis doloribus, idque recens multum, dolorem mitigat,
ardorem temperat, vlcera abluit, deterget, illinit intestina, solidat, ro-
borat, vim acrium humorum obtundit, eorumque malignitatem re-
primit, nec terreri oportet initio si obsit, perseverandum experientia
docet, sit enim ut tempore lac refrænet, & contemperet cacoëthiam
& prauitatem humorum in corpore turgentium, sic Hipp. 2. de morb.
mul. exhibet in fluxu muliebri bilioso, lac asinum, aut serum, cā ta-
men cautione ut lienosa non sit mulier, aut flatuosa exanguis, ἢ δὲ ἡ
φύσει πολλῆς ὁδῆς ἢ πνευματώδους λεῖψαμος μὴτε ὀρρον μὴτε γάλα πίνε-
το, ideo non abs re obseruauit author lac asinæ minime profuturum
præsentē aliqua hypochondrij affectione, puta tumore, obstructione,
aut duritie.

CONSILIVM LXXXIII.

Ad fluores muliebres pro D. preposita.

Ratio victus pernecessaria in primis, diligentissime corpus purgandum aliàs decocto foliorum sennæ mundatorum cum pinpinella, plantagine, betonica, bugla, fanicula, melissa, radice oxalidis, adiicitur & rhab. & syrupus rosarum pallid.

Aliquando conuenient pilulæ tempore frigidiore.

Pilulæ.

℞. Pulueris hieræ, picæ ʒ ij. rhab. ʒ iij. massæ pilularum sine quibus 3 j. pulueris ireos florentiæ & castorei añ. 3 f. ligni aloës & pulueris guaiaci añ. gran. 8. fiet massa. possunt addi trochisci de camph. ladanum & agaricus.

Aliquando deglutiat vel in forma liquida 3 ij. terebinth. vel in pilul. cum pauca mastiche & saccharo.

Tabellæ.

Tabellæ triasantali triplo, aut quadrup. rhab. addatur crocus martis vel chalybs ipse præparatus, aut rhabarbarum conditum cum syrupo violato, sectio venæ: si sanguis impurus, audentius erit ex vtroque brachio demendus.

Fiat aqua ex maceratione rhab. qualis datur puellis decoctum fragariæ, aut sarsaparillæ, aut schinæ addito cinnamomo puluis terræ sigillatæ ex luteo oui.

Ambra grisea ex eodem luteo.

Conserua rosarum in frequentissimo vsu addi postet bolus, aut terra sigillata.

Puluis.

℞. Pulueris elect. diatrag. frigidi & diaireos añ. 3 f. coriandri conditi & fœnic. conditi añ. 3 j. quatuor seminum frigidorum, maior. & papaueris albi añ. 3 j. boli armenæ, & pulueris elect. diarrh. abb. añ. ʒ j. pulueris chalybis præparati & tartari præparati añ. 3 j. sacch. ros. ʒ vj. rasuræ eboris ʒ f. fiat puluis. Æstuarium conferet, sed maxime aquæ Spadenses aut Niuernenses.

Sed & sarsaparillæ, aut ligni indici, aut schinæ decoctum maxime profuturum profitebor.

An ad fluorem muliebrem balneum vtile, vt ad alui profluuium ex Galeno. dubitari potest.

Saccharum candum valet, pulvis rad. pentaph. & lignum rhodium.

CONSILIVM LXXXIV.

Pro Iacobo Memmao raucitatem conquerenti.

AD ea symptomata, de quibus querela est, remedia quidem medica non negligenda, tamen hic ægrotatio potius est quam ægrotatio, sic ab animo potius repetenda sunt quam ab arte quod ad has miseras occalluisse iam debet: ista enim ægrotatio non solum miseria est, sed est carnificina, tabem enim affert, cruciatum, foeditatem, lacerat, exest animum, conficit. Omnis medela animis præsentia. Vitia vocis sensim atque sensim accrescunt, nec solum contumelias iniuriasque aëris sequuntur & humores, sed animi pathemata, quæ omnes naturæ actiones pervertunt. Ideo Claudius apud Suero. vocis modulandæ corrigendæque ergo musicæ studium amavit, meditabatur, exercebatur clystere vomituque purgabatur pomis & officientibus abstinebat, & blandiente profectu tandem prodiit, pronuntiabat dulci & proprio oris sono. Augustus dabat operam phoniaco qui vocem leniret, ac remitteret. Quibus patet moderatis actionibus corporis & animi, animique tranquillitate calorem naturalem foueri, pulmones temperari, vocem quoque pro rauca & fusca, leuem reddi, & canoram. Cassia lingenda, aliquando in bolo deglutienda, habeat paratam confectioem de rebecca venetianam conseruam rosarum, & de floribus vngul. caball. glycyt. mandat, pugillus aut buglossi, aut bipinellæ cum priuatim cibum capiet in vino macerabit.

Passularum vsus si reperiuntur.

Manna si habetur cum carniū decocto.

Succus amygd. dulcium.

Tabellæ aut hypoglottides.

24. Pulueris elect. diatrag. frig. 3 vj. electuar. diaireos 3 iij. sacch. candi 3 j. ras. eboris, cornu cerui añ. 9 ij. conseruæ rosar. 3 s. cum saccharo in aqua ros. soluto, adiecto pauco diatrag. frig. & tantillo cinnamomi, fiant tabellæ vel formulæ.

Ee iij

Animi pathemata alterant vocem, & in viribus & in qualitate.

1.

Purgatio.

2.

Tabellæ.

122 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Valebit & linctus mellis purissimi, sumere ficus vel coctas, vel crudas prodest, & melicratum, terebinthina linctu sumpta si ingrata nimis non est, syrupus de glycyrr. pomatium. vsus ptissanæ.

ANNOTATIONES.

1. Ita animus mœrore percellitur vt corpus sustinere nequeat ac velut sequatur omnium membrorum ruma, ait, Donat. in Adolph.
2. Confectio de Rebecca expectorationem iuuans, sic parari solet Venetiis. ℞ glycyrr. minutim incisa ʒ j. s. rad. ireos flor. ʒ ij. insund. in aqua rosac. duos dies coqu. in ℥ j. sacchari cum gummi tragacanthæ f. baculus ad vsum.

CONSILIVM LXXXV.

Pro D. du Breuil cephalalgiam patiente.

NOs ex scripto medici nonnihil subolfecimus de morbo dominæ iam semestri capitis dolore affectæ & afflictæ, subolfecimus quidem non intelleximus, quia adeo ieiunum scriptum sterile & ab artis imperito profectum vt rem tantum attigerimus, id quod in re quæ est tanti momenti & tanta perfunctorie agendum nõ fuit, nam aut actum agemus, aut re non intellecta periculum agræ creabimus more eorum qui ad scopum non visum collimant, vt quo fors tulerit tela scopum alludant non feriant, itaque domestici medici imploramus ingenium & solertiam qui solus rem acu attinget. Nos videmus melancholiæ in cerebro fixæ iam εν τῇ ἐξῇ existentis magna esse argumenta. Quo malum immedicabilius est, leientericus fluxus œconomiam naturalem fatiscere declarat, & ni nos medicus ab ea opinione retraxerit, eam sequimur sententiam, nec suis patrociniis destituta est: candor dominæ laborantis morumque suauitas debet nos pellicere, hortari, imo cogere vt tantam mali acerbitatem, aut tollamus, aut leuemus, tollere ἀδύνατον.

Extat enim illud Hippocratis oraculum: Quibus dolores sine manifesta causa fiunt, diuturni in toto capite, & debiles fiunt gra-

cilesque, his prædicendum morbum priore grauiorem esse &c. Vide plura apud Hippo. ad hanc agram accommodanda, item illud eodem in loco: Qui à multo tempore apparent & facies sub-
tumida, eos capite dolere scias &c.

Interea blando vsu rhab. ægræ consulatur, item pilularum de hiera cum puluere diamarg. frigidi, opiatae corroborantes valent, apertio venarum frontis, aut arteriarum si dolor vrgeat, præcedat tamen apertio venarum brachij & hæc pro virium modulo, cælo benigniore fatus capitis ex malacticis addita senna, sed amica consolatione fibræ illius ægritudinis quæ iam altius radices egerit, sunt elidendæ, & si qua sunt quæ eius animum exasperare possunt, ea notitiæ subtrahere oportet.

ANNOTATIONES.

1. Morbi (ait Seneca in epist.) aut sunt longi, aut præcipites: longi dant intercapedinem & refectioi locum atque inducias: breues autem & præcipites citissime, aut extinguunt, aut extinguuntur.
2. Egrotantis animi Medicus est sermo, ægritudo autem non solum est miseria, ait Tull. sed etiam carnificina, exest animum, corpus conficit & tabem inducit facile dein verò experientia verum deprehendere licet eos quos animi ægritudo & tristitia in morbum coniecit tanquam primaria ac externa causa, aut lethaliter, aut grauissime ærotare vix enim ægri, si liberari debent etiam rebus omnibus rite factis & administratis, liberantur.

CONSILIVM LXXXVI.

Pro muliere carnotensi febre lenta laborante.

Species febris consideranda primùm, dein tempus quo nata est, denique procatasticum. Omnes facile præhenduntur morbis suæ tempeciei propriis. De externa causa ægritudo fuit morbus animi amissis liberis, mulier autem ob infirmitatem iudicij facilius altius afficitur, & ob mollitiem corporis, nec enim ei adest ad resistendum facultas: de animo mulierum notandum

*Omnes
congeneribus
temperiei suæ
morbis præ-
henduntur.
Gal.*

1.

224 CONSILIORVM MEDICINALIVM

illud Gal. cum vitale robur infirmum est, animi vero pathemata valida, facile animi essentia dissoluitur, hinc iræ, hinc odia, & iræ quidem lenibus de causis, quia animum qui (benè & præclarè ut loquitur Comicus) gubernat, mulieres ipsæ infirmum gerunt. de animo hætenus, de corpore nunc, illud est Hipp. qui sunt blæsi linguaquæ hæsitant patiuntur morbos fortiter melancholicos, quia cerebro ut molliori & effœminatori facile imprimuntur fuligines & tetri vapores ab æstuantibus visceribus, à pulmone præfertim excitati.

2. Epid.

Ut ad morbum animi reditus sit, tanta est vis ægritudinis ut œconomiam naturalem perturbet declarat ob mœrorem febris hectica quæ primo præhendit quod aliàs successu temporis euenit, mœror vno quasi ictu plus facit quam humores, qui longas febres procreant.

Tempus vernum fauet quod salubre est, quodque si recipit corpus sanum, illud in eo statu conseruat, ait Gal. hic non tam efficientis quam suscipientis causæ ratio habenda, at hoc anno efficientis causæ magna fuit vis, ver enim siccum fuit & aquilonium, at cum tempestiua tempestiue non fiunt, morbi fiunt inconstantes & difficilis iudicij; dein habenda quoque ratio suscipientis causæ: nam licet per apho. quartanæ in æstatem incidentes sint breues, contrà fit si lien sit infirmus, ait Hipp.

τὸ πικτικὸν
& ἐπιδεκτικὸν
ἔχειν ἡ ἀντι-
κτικὴ ἡ ἀντι-
καταρτικὴ
ratio in mor-
bis.

Hinc Aëtius
conualescen-
tes melana-
gogo purgan-
dos esse dice-
bat.

Hic dolor à
pastu vel est
notha colica
febres longas
sequi solita
vel proprius
hypechond.

Species febris erratica & in morbis longis humor maximè melancholicus gignitur pro reliquiis febris, dolor à pastu in ventre: tussis quæ à splene esse potest denique id totum hypochondriacum, ideo clysmi laudantur. Cathartica blanda, balnea, phlebotomia syrupus labor, fofus, limatura chalybis, tabellæ triasantal. cum rheo.

ANNOTATIO.

1. Huc alludit Aristot. dum ait, omne imbecillum natura querulum esse. Et Seneca lib. 2. de ira Senes, ait, difficiles sunt & queruli, ut ægri & conualescentes, & quorum, aut lassitudine, aut detractione sanguinis exhaustus est calor. In eadem causa sunt siti fameque rabi- di & quibus exangue corpus est maligneque alitur & deficit. Eamque ob causam iracundiores sunt valetudine, aut ætate fessi. Vetus pro- uerbum est à lasso rixam queri. denique quibus quauis ex causa cor- pus infirmum est iis animi pathemata valida sunt.

Morbi

CONSILIVM LXXXVII.

De tinnitu aurium.

MOrbi cerebri cum magni sint momenti curatu sunt difficiles & difficiliorese ferè quàm cognitu. Et ideo Hipp. naturam diligentem in conformatione cerebri & eius repurgatione statuit, vt vel suprâ, vel infrâ, vel intra modum repurgetur.

Tribus de causis curatu difficiles sunt, quia princeps pars quia locus angustus, & vt dolor in angusto maior est, ita ægotandi & dolendi causa conclusa est: Tertio quia pars facile inæquali in temperie laborat ob diffimilem temperaturam parenchymatis cerebri & ardorem arteriarum, cerebri ἀνοησία penè; contrâ nervorum, & membranarum sensum exactum, hinc symptomata cephalalgica, cataphorica, catarrhoica & paraphorica. Iam verò agitur de strepitu sonituque & tinnitu auris, in quibus essentia consideratur ex causâ, loci naturâ, facultatis robore. Omnia hæc cruditatis & flatulenti sunt soboles spiritus: sunt symptomata læsæ auditionis, quod in oculo cæcitas, hebetudo & error, idest surditas, tinnitus, sonitus in aure: differunt tamen, bombus enim exolutionem partis cerebri, vnde vis audiendi manat, sequitur.

Dolor in angusto atq; Senec. ideo aurium, dentium, dolores sunt atrocissimi.

Ceterum hæc vel ex acuitate sensus, vel vitio instrumenti, vel per se in cerebro, vel à partibus subiectis, primario, vel secundo.

Bombus vt à tinnitu & sonitu differat.

Per se continuus est, tamen affectio quæ initio erat per sympathiam, tandem per protopathiam fit, causa in ægro fuit externa, sed eam iuuat facile dispositio partis corporis & humorum: at vero Celso authore valetudinarij viuunt, qui corporum suorum robora inquietâ agitatione & vigilia minuere solent, & Hipp. pertinax vigilia cibos crudos & ἀπένευσ facit, quod huic ægro contrigit, nam & cacochymus est, & pertinaci studio ipse inquietus & assiduus inhaeret.

Tertiò vlcus fuit in aure ab inflammatione, ab inflammatione autem vel abscessu, malum.

Obseruatione verò dignum est facultatem corpus nostrum dis-

Ff

226 CONSILIORVM MEDICINALIVM

penſantem, ſeu naturam; ita in corpore omnia temperare vt harmonia quædam ſequatur, & omnium actionum integritas: contra fit ſi quid intemperatum, inæquale, anomalum, & maximè ſi partes contrario temperamento prædita. In hepate & ventriculo id fit, item maximè in cerebro, hinc vertigines, palpitationes cordis tinnitus. Sonitus aurium, & tamen naturâ cerebrum frigidum eſt, imo ab Hippo. frigidi & humidi ſedes, & metropolis dicitur.

Tinnitus in iis ſymptomatis numeratur, quæ in affectione corporum conſiſtunt, vt colorum mutatio ad viſum refertur, ita ad auditum tinnitus: differunt tamen in hoc, nam ſi ad affectum ſimplicem referuntur ab actione læſa ſunt; ſi ad actionem læſam proximè à morbo pendet, vt ſoni, vel ab anguſtia, vel à flatibus, In tinnitu ſtatus eliditur, & interrumpitur quod facit materie tenuitas, robur facultatis, anguſtia loci. Bombi cauſa ſtatus craſſior bombilans more apum, & ferè eſt ab exolutione quadam partis illius cerebri à qua vis audiendi deriuatur, vt ante dictum.

Ad tinnitum præcedentem, in iuvene cacochymo cerebrum ſtudio pertinace fatigante, iam abſceſſum auris paſſo, cum magno iudicio ſeſe gerere oportet, quod impuritas eſt ſanguinis & in toto corpore & in cerebro maximè, præſertim verò quod in ea familia facile congeritur putre & indomitum ſerum, quod eam valetudinariam efficit. Decreto medicorum, & exacta purgatio, detractio ſanguinis, balnea, & decoctum ſudorificum eſt inſtitutum à quo benè foeliciterque habuit.

CONSILIVM LXXXVIII.

De cachexia pro uxore Gaij.

Et quoniam
intemperan-
tia prauusque
victus sædū
hunc affectū
inducit; ſunt
autem morbi
ſupplicia lu-
xurie & in-
temperantiæ
vide Senecā
epiſt. 1. l. 15.

IN hac ægra partim ſe prodidit nobis ægritudo, partim ægrota-
io, vt iam languor quidam eſſe videatur: ac ægritudo quidem,
quoniam animo ſibi multa finxit, quæ efficiunt vt animus ſit in-
quies & irrequietus, & cum mulier ſit, ob mollitudinem corporis
& animi iudicii que imbecillitatem, altiùs ſe penitusque impi-
mit ægritudo, iuxta illud Galeni; Quibus vitale robur inſirmum

est, animi vero pathemata valida, his animæ essentia facile dissoluitur, vt paulo annotauimus.

Ægrotatio in hoc quod febris lenta, dolor capitis hemicranicus, lentitudo corporis, deturpatio coloris, & pro viuido & nitido, penè subuiridis, & cum virore pallidus, menses decolores: denique cacochymia, quam proximè sequitur cachexia à prauo corruptoque sanguine, quo tantisper partes fruuntur, & aliter fit quam in ἀποφία, quia nutritio non fit: hic vitiosa nutritio per labem alimenti, siue externi, siue interni, vnde Galen. etiam in cachexia sanguinem suam seruare συμμετέλει ait, licet corpus eo grauetur, sed suam symmetriam quidem seruat, τῷ πλήθει, id quod omittitur in textu Græco.

Hunc morbum & σπασμομὴν horum Hipp. expressit miro modo. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauis sunt & longo tempore non admodum ieteri, hi seu viri seu fœminæ capite dolent, lapides & terram comedunt & hæmorrhoidas habent, quæ omnia concurrunt in hanc ægram, prauus color, diuturnus dolor capitis, pica, hæmorrhoids; hæmorrhoids autem in muliere morbus est ex Celso & Aristotele; in viris purgatio est naturalis, in muliere non item, & vt signum & vt causa.

Vnde quæstio an in humoribus morbus hic consistat, an in dispositione quadam praua & quasi habituali & hæctica affectione: si in humoribus, in euacuatione & purgatione spes est.

Si in habitu & ἐν τῇ ἔξει, vt aiunt, vix arte corrigi emendarique potest, vnde Gal. com. in lib. 2. prorrh. in vitilagine & leuce iam dispositio & habitus iam introductus, & licet humores omnes euacuaueris, nihilò magis proficias.

Et Hipp. 4. acutorum sub finem, pallidos, decolores & subtimidos non purgabis, ἀχρώς purgare non conuenit, & in Aphorismis. Qui salubritatem corporis habent, & qui prauo vtuntur victu agrè in purgationibus habent.

Et Aëtius loquens de melancholicis & epilepticis, ait eos iuari vsu hieræ Archigenis cum nullam bilem excreuissent, sed quod malus habitus membranarum cerebri exteritur, datur parua quantitate, vt non fiat euacuatio condigna.

Quo fit vt Hipp. lib. Epid. pallentibus ad coloris suauitatem, calore foras reuocato ὀξύθυμια consulat, lætitiā & in nimia confidentia metum, prout aut lætitia excitandus animus, aut metu, si confidentior sit exanimandus & proijciendus.

Ff ij

1.

2.

Com. ad aph.
57.1.5.

2. Prorrh.

“

“

“

Hæmorrhoids
in muliere
morbus in
viro sanitas
ex Cels. Arist.

3.

Lib. de locis
in hom.

Locus hic ad-
mirabilis
Aëtij medici
serm. 2. primæ
retrahibili.

4.

*Quod facit
cibus caco-
chymus id
facit genitum
alimentum
ob partium
intemperiem.*

*Plura in Bal-
lonij comm.
in apho. 36. l. 2.*

In eo maximè laboratum est, vt daretur opera & purgationi humorum, propter cacochymiam, & ipsi cachexiæ corrigendæ, quæ leuces, vitiliginis & elephantiaseos sæpè est antesignanus, intemperies enim inusta impressaque partibus corruptionis alimenti causa existit, & quod facit prauus cibus assumptus, idem facit genitus ob intemperiem partium ipsarum. Generatur enim virosum alimentum quo natura etiamnum fruitur loco melioris alimenti, vnde tandem habitus cachecticus introducitur, & Galenus explicans cur in purgatione exoluantur ij qui prauo vtuntur alimento, per eos intelligit & qui capiunt prauum alimentum & qui iam contentum habent in corpore, & vitiosa dicuntur alimenta per relationem ad prauum sanguinem, qui ex iis generari debet, nunquid enim quod externus cibus prauus facit, idem non faciat alimentum bonum, corruptum autem propter maleficum calorem & febrilem siue à natura datum siue introductum.

Ad eam intemperiem natiuam dominæ ægrotantis consuluntur aquæ spadenfes, item & blandum decoctum scynæ ad consumendum virus, quod prauæ nutritionis causa iuuans & insuauis prauique coloris, cum enim gignitur succus per coctionem, is licet nutriet nutritione largius sumptâ, tamen is *ἐν γαστρὶ* non inducit, item excrementa alimenti nocentiora sunt & fastidiosiora quam in aliis temperamentis & augent fouentque primam intemperiem primamque mali labem, idè purgatio valet frequens vt ne malum augeatur peiusque sit homini viuenti quidem & prima sua sanitate qualicumque vtenti.

Instituta enemata hypochondriaca & hysterica. Apozemata cum senna agar. rheo & syrupo de pomis, balnea.

Cauteria brachio, fots chalaistici ad lienem.

Aquæ spadenfes, pilulæ ad prouocandos menses.

ANNOTATIONES.

1. *Lib. 2. Epid. sect. 1. Hipp. locus notandus & huc pertinet. Color est qui multum pallidus est, & ex candicante pallet, quia omnis huiusmodi ab hepate est inde fiunt hepatici in iis morbis, & morbi regij ab hepate, & qui à splene sunt nigriores. &c.*
2. *Nil tam vulgare est quam nomen cachexiæ quæ τὴν ἐνέζια contraria est: in utraque moles corporis plena satis est & uber, sed in cachexia torpor est, & lentor corporis, in habitu autem bono & lauda-*

bili est alacritas. Illic carnes subtimidae, quales in facie cadauerosae Comici, ubi caro, quasi cadauerosa liuore, & rubore quodam infusata & personata tumidulaque apparet. Duplex est autem cachexia, vniuersalis & particularis ut ex longa lippitudine oculis euenit: vniuersalis ferè à iecore est quæ triplex censetur. Vna pituitosa quæ in virginibus apparet, in quibus flos nitorque faciei decutitur deperitque. Secunda melancholica quæ ut in elephantem leucem, aut vitiliginem pituitosa terminatur. Tertiam Galenus Aquam cachexiam vocat, sanguine in aquam conuerso. In cachexia vitiosa nutritio est, nutritio tamen quia apponitur alimentum parti, & licet sanguis sit vitiosus, est tamen sanguis, ideo ab atrophia differt in qua nutritio non fit, carnesque liquantur & corpus fit exuccum sensim, strigosumque; quanquam autem Fernelius differentiam posuerit inter καχεξία & ἀτροφία tamen aliter quibusdam esse videtur, Gorrheus enim cachexiam in solidarum corporis partium deprauatione statuit quæ alimentum omne corrumpitur. Tertia enim coctio in habitu fieri solita malè perficitur & alimentum corrumpitur inducitur enim cacochymia quam excipit cachexia, & quia corrupto alimento non potest bona nutritio contingere, sequitur ut cachexiæ ἢ ἀτροφία succedat in quo à Fernelio longè Gorrheus discrepauit, in cachexia enim moles carnis apparet foueturque qualicumque sanguine: sed cachectici habent aliquid faciei cadauerosæ, in atrophia collabitur moles; Et Celsus definiuit cachexiam per tabis speciem ubi malus corporis habitus est, sic morbum per symptoma definit. Tamen longè interest partem tabescere omnino, aut aliquatenus nutriri a simulatione & adhæsione facta ad partes solidas, licet deprauatio sit alimenti, unde vitiliginosæ virginis & elephantici carnem & molem habent, nisi forte dicas tandem in atrophiam desinere ipsam cachexiam, si diu duret, aut ipsam tumidam carnem & quasi cadauerosam cachecticorum improprie carnem dici & improprie nutriri. Quo pertinet illud Arist. Cur qui vitioso cibo utuntur & fame diutina laborant, pedibus intumescent: per tabem consumptionemque, id euenire posse putat, tabescunt enim qui esuriunt, & qui vitioso fruuntur alimento, natura enim abhorret & mauult suum fraudare genium, quàm tale capere alimentum: qui fit ergo ut cum prauus sit sanguis nutritio fiat in molem & tumorem habitui athletico similem, nisi quod color non est geniuus & floridus. An alimentum in suis fontibus corruptum est, & appellens ad habitum corporis non hic corrigitur, sed retinens aliquid de vetere inquinamento nutrit etiamnum partes? An in suis fontibus

Donatus in
Hesya.
Gal.

Lib. 1. de ali-
mentis cap. de
lente.

Qua ratione
cacochymia
tollit ἐν γένει
& καχεξία
τῆς ἐν γένει
νιὰν vide
apud Duretū
in append. c.

11. 1. 3.
Fernel. lib.
consil. & path.
c. 7. 1. 6.

Virgines sūt
aliquando
leucophleg-
maticæ, ter-
tia autem est
hydropis spe-
cies de hac
leucophleg-
matica & cur
pituita alba
καρ' ἐξ ὧν
dicatur accu-
rate ut solet
omnia Holle-
rius.

Arist. probl. 5.
1. 1.

bonum, sed alludens affluensque ad habitum vitio morboque ipsius habitus talem qualem nutritionem, molem & characterem facit, unde qui prauo alimento, aut eo facile corruptibili fruuntur, tument turgentque, sed praua nutritio vocatur, & qui calida siccaque habent viscera, partesque solidas, & ad melancholicum temperamentum vergentes (nec enim melancholici tantum dicuntur qui humorem melancholicum colligunt, sed qui tales sunt & in eorum & partibus solidis) capto etiam euchymo alimento non pinguescant, mirabiles enim sunt naturæ effectus. Vnde in aliis locis mouimus questionem, qui fiat ut in habitu corporis sit multus adeps, qui à priore sanguine est item bonitasque coloris, cum tamen viscera ipsa, idest hepar & lien putria appareant.

1. Epid. Ball.

Imo maior quædam quæstio, num ipse habitus peculiarem quandam naturam habeat, ut habeat quoque suos morbos non repetita origine à partibus internis. Partes enim extimæ corporis dicuntur à Galeno naturæ imbecillæ, ut pote in quas, partes internæ ut primariæ & principes, in quas (inquam) ut depositarias suum virus amandent & ablegent, quin & habere suarum actionum vim, non ab hepate, aut aliunde mendicantem Galenus auctor est, sic suam quandam naturam habent suum ministerium suas vires & genium, suam sanitatem, suos morbos.

Lib. de locis affect.

Virgines illæ fiunt sæpè leucophlegmaticæ licet bilioso sint temperamento & sitibundæ tamen Gal. inter eos qui temperamento sunt frigido leucophlegmaticos recenset ad part. 70. sect. 3. lib. 3. Epid.

Cum quis diu ægrotat & non purgatur, ferè carnes liquantur & corrumpuntur, & fit aqua, sic fit hydrops, ait Hipp. libro & παθών, & sanè in cacochymis id fit, & tandem in cachecticis, si corrumpitur caro quæ aqua fit: nam lib. de carnibus Hipp. ait per putredinem omnia crassescere.

4. Virgines quarum pallet sedataque est facies, ferè omnes cachecticæ sunt. Sed inter symptomata quæ eas virgines comitantur, est gressus impotentia & difficultas spirandi, ut ne minimum arduum possint ascendere, unde hoc: An ratione febris? cur alij grauius febricitantes non sic habent? an ob flatus? cur qui colico dolore laborant, & omnes hypochondriaci flatuosi non sic habent? an ob obstructionem? cur iis qui longis morbis à forti obstructione natis infestantur non idem contingit? an quia diaphragma premitur? unde in aliis idem contingeret, at non videtur ferè quid simile in aliis. an quia cor intemperie laborat? idem in febricitantibus non cernitur. An ratione sple-

ni? sepe non tumet, idem in quartanarios & quibus induruit splen, caderet. An quia ob prauam nutritionem partium, non aucto, sed mutato & viliato sanguine totius corporis est *υωδρότης* lentitudo, grauitas, ita ipsa viscera partes quæ internæ sunt ponderi ipsi naturæ; maximè hepar & pulmo, unde grauata natura non potest molem corporis sustinere, cor non refrigeratur vasis quasi collapsis, vt obstructio sit & attenuatiua & obstructiua: causa illius *δυσπνοίας* crebriorisque spiritus, aut in gressu, aut in ascensu mihi videtur cognitu difficilis, ideò meas coniecturas tantum attuli, sed reuera in fædis coloribus magna est obstructio, & quasi omnium vasorum *σπασμὸς*, unde spiritus suas non habent *ἑρῶδες*, motus, & meandros, vt idem *Causa gressus difficilis in fæd. color. ob vasorum angustiam spirituumque interceptionē.* virgunculis contingat, quod iis qui incubo laborant, in iis enim quasi perpetuus incubus est.

Duretus cap. 13. 2. coac. lib. non id tam refert ad necessitatem inspirationis, quam expirationis, ob fuliginosum multum excrementum, & vasorum angustiam, est enim quædam intemperies hectica in ipsis arteriis.

CONSILIVM LXXXIX.

De tussicula & spirandi difficultate cum suffocationis metu.

Tussicula quædam tanquam paranympus adest, postea tanta difficultas spirandi, cum febre aliqua eum detinet, vt præfentis suffocationis metus adsit. Ea accessio iam sexies eum afflixit, & cum quasi de funere agitur, ecce oborta sudatiuncula, dyspnœa eum relinquit, & primæ sanitati restituitur, quod mirum est.

Huic malè conformatus thorax, sternum est eminens & gibbum. Vnde queritur, an à capite hoc, an à materiâ in pulmone, quæ eum paroxysmum committat, an à visceribus cum splenicus sit. Si à pulmone est, quî fiat vt tanto interuallo sanus degat nil tale expertus; aiunt à visceribus malum oriri excitato crudo vapore & crasso quid dyspnœam eam committit, nec finit agrum quiescere,

232 CONSILIORVM MEDICINALIVM

donec discussus fuerit. Id etiam in plerisque vidimus ægrotantibus.

An sit tantum quoddam incendium, fugax tamen in corde, quod καρδιαγμὸν improprie dictum, id est crebrum & celerem motum cordis affert, de quo ante hoc in libro, ut hic idem fiat quod in palpitatione cordis, prout enim vapor, aut in has, aut illas partes sese insinuat, ita varias edit affectiones idem forte est quod in ephialte.

Vide aph. 12. l. 3.

An suffocantis catarrhi species est respiratio præparata in qua æger ita est affectus, ut ni certam figuram deligat non possit animam ducere.

Hipp. l. de indicationibus & Gal. aph. 34 l. 4. & 12. lib. 3. ubi agitur de catarrho suffocante.

An sit tantum paroxysmus febrilis, in quo non est nouum oriri quasdam ἀσφοξίας, conuulsiones, incubum, vertigines, spirituum interceptiones, manuum palpitationes, quæ aut diurnæ febris signa sunt, aut breuis in deterius iudicationis.

Victus ratio præscripta, vena secta, bechica instituta.

Purgatus est syrupo magistrali, post cuius vsum pristina sanitati fuit restitutus; dum hæc scribimus agitur septimus ferè mensis, ex quo malum non recruduit.

ANNOTATIO.

1. Difficultatem spirandi adfert angustia pulmonum, compressio à peruersione spinæ pectoris depressione, tuberculo, item vasorum obstructio, ab humorum copia, conuiuentia eorumdem, ex marcore pulmonis, substantiæ adhæsus pulmonum ad latera. Ad crassos & obstructuentes humores educendos valent, quæ moderatè humida, si viscosi, non solum opus humiditate, sed & deterfione, ex acidis: sic melicratum ad crassa, oxymeli ad viscosa conducit. Deinde ptissana, & vinum dulce, si & peripneumonia & pleuritis cocta sit, nullaque adsit inflammatio, si sitim facit vinum non confert, impedit enim expectorationem, quæ autem iuuant nec sitim adferant, nec sint diuretica, ideoque aquæ naturales pulmonicis nociuæ, quod ducant urinas & expectorationem impediunt, & acria omnia interdiciuntur à Gal. in dyspnœa, fundunt enim sanguinem, & liquant & educta tenuiori portione crassius readdunt quod relinquitur & 6. Epid. sect. 4. de filia Agessij asthmatica locus præclarus est, quo interdicat acribus: at Gal. loco citato dum acria damnat, id temperamenti adhibet, ut pauca quanti-

Diuretica nocent pulmonicis, quia sanguinem liquant & impediunt expectorationem. 12. l. 5. simpl.

*quantitate acris addantur liquidis, ut vitrorumque vsu valetudini
egre respirantium consalatur.*

CONSILIVM XC.

*Pro muliere issodunenfi splenica cum metu
hydropis.*

Symptomata quæ narrantur docent lienem iamdiu male affe-
ctum fuisse, dolor enim ac tumor conspicuus hydropis præ-
nuntius, affecti lienis soboles est, qui ab humoris melancholici
illuue quodammodo distenditur ac turgescit: huius signa sunt
respiratio crebrior & difficilior, præsertim in cursu & labore, aut
cum in latus dextrum decumbitur, appetentia persistit, ventriculi
tamen læditur concoctio, flatus sursum deorsumque erumpunt
cum hypoch. sinistri rugitu quodam & murmure, corpus in dies
macrescit, iuxta illud. Cum lien floret corpus extenuatur, attrahit
enim ut molle corpus: carnes liquantur, humor in splenem illa-
psus relegatur alio.

Prouisum ventriculo, quia morbus erat annuus & tument
iamque scirrroso spleni ventriculus compatitur, prouisum foru,
litu.

Aqua decoctionis ceterach, addito caryophyllo & cinnamomo
valet. Aqua frigida interdicta.

De victu prouisum est abunde.

Præscriptus pulvis digestiuus.

Syrupus magistralis ex rad. aperientibus in aceto maceratis, ru-
biæ, eryngij, helenij, symphyti, splenicis. Cortice tamaricis, semin.
ebuli. Cortice capp. fraxini, vlmi, coctæ ꝑij. foliorum sennæ. ꝑf.
agarici, zingiber. cortex citri conditi additus ꝑf. electi rhabarb.
addita, syrupus bizantinus.

Pulvis ex limatura chalybis macerata in vino albo, cum coriand.
sem. aut cum tabellis, aut pilulis conuenientibus.

Oxymeli paratum ex decocto florum genistæ, & ceterach cla-
rum addito cinnamomo & caryophyllis.

Gg

234 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Fotus ad lienem non ex malaëticis solis (nec enim nimis molliendum metu cancri) sed ex rad. bryoniae, helenij, sigilli beatæ Mariæ añ. ʒ. rad. bismalua ʒ j. f. seminis lini ʒ iij. floribus chamæm. cypero pauco, coctio facta in aqua & aceto sub finem addito.

Cataplasmæ ex ʒ j. f. radicis bryoniae, erucæ, sigilli beatæ Mariæ ʒ iij. puluere chamæmeli, & ceterachcum lib. ʒ. axungia porci veteris.

Phlebotomia etiamnum præsentē tumore aliquo consultitur.

Danda opera prouocandis mensibus, vsu pilularum ruffi, capillarium, rubia, cicerum rubrorum.

Primo vere vsus aquarum naturalium:

CONSILIVM XCI.

Pro uxore consulis de Goussencourt quæ à duobus annis ter, aut quater passa est effluuium sanguinis sursum deorsum.

Agitur de symptomate tertij generis in excretis & retentis. Excreta aut toto genere contra naturam, aut quantitate, aut qualitate, hinc & res quæ excernitur & quale & quantum consideratur, modus excernendi, locus quò fit excretio, quod excernitur sanguis est, res planè contra naturam & excretio symptomatica est, si menses & hæmorrhoides exceperis. Quamquam in muliere hæmorrhoids morbus est, hinc aphorif. Sanguis qualiscumque dum suprà fertur, malus, infrà autem, bonus, cum niger exit, excretio mala per os, ni in muliere deficiant menses. Item Hippocrates ait, sterilibus vomitum sanguinis ad concipiendum prodesse, ergo in hac muliere excretio mala ratione loci.

Excretio fit ergo ἀπορραγνῆς ut loquitur Gal. id est per ἡμῶν Gal. laudat quidem excretionem deorsum si pauca sit, & non sit ἀπορραγνῆς seu ἀθρόως i. confertim. Item vult nigrorem sanguinis acquiri tarditate gressus, sic peccat quantitate, item colore; nam pici similis est, aut assatione, aut corruptione.

Gal. distinguere vult opus naturæ à symptomate.

Hæmorrhoids in muliere morbus, in uirris purgatio, ait Celsus.

In coacis daret.

lib. de sympt. diff.

Sic tria pro affirmante parte occurrunt, quòd per os sanguis ex-
cernitur 2. per os 3. affatim multus; at symptomatica sunt hæc
omnia.

Contra pro negante, non omnis vomitus sanguinis malus, vt de
muliere antè dictum Plinius notat de Saturnino, qui quotannis
ore sanguinem reiecit & annos 90. vixit. Item apho. Qui sangui-
nem euomunt, alibi est *πύσι* i. expuunt, bonum, larga excretio
melior est quam parua, ex doctrina Hipp. vt ante dictum in Epist.
ad D. Laurentium.

Secundò Gal. ait multos habere lienem imbecillum, qui ab he-
pate sanguinem non repurgat sanguis suppressus *ἀθυμία* gignit,
excretus, vomitus cruentos. *cap. 1. 6. de
loc. affect.*

Tertiò in melancholicis sanguinis excretiones non omnino
malæ, quod obseruatione dignum est, melancholici flatu abun-
dant, authore excretionis sanguinis *πύσι* *ἀθυμία* sunt *ἀθυμία* ob
flatus.

Siue sit erosio, siue anastomosis & velut *καὶ τῶν* venarum
prauum sanguinem eructantium, siue latens causa. Vereor in simi-
li casu cadat, nisi, soletur illud Celsi, Sunt hominum proprietates,
sine quarum notitia non facillè præfagitur, facillè quis securus est,
in iis quæ sæpè sine periculo euasit. Ille sollicitari debet cui noua
sunt, hinc Aphrodis. quærit. cur morbi frequentes minùs sint pe-
riculosi, quàm rariores. Mulier hæc restibilis fuit fœcunditatis hæ-
morrhoides aliquando passa est, hinc sanguis aliò cursum inflexit,
sanguis ei mitti debet, & eo audentiùs quia fertilis fuit edicto
Hippocratis. 1.

Frequenter repurganda, quia cacochyma, & quia fuit hæmor-
rhoidalis, syrup. de pomis cum rhab. & folliculis, additis intyb.
plantag. iuleb rosato, aperientia minùs quadrant, ne referent ora
vasorum, tabellæ trias. cum rheo, formulæ, ex bolo quas deuoret,
lac asinæ, conferua rosarum frequens, à pilulis abstinendum, cassia
cum rhab. valet, opiata ex conferua rosar. & symphyti. lapide hæ-
matite corallis, terra sigl. bolo. enemata. 2.
Lib. de super-
suratione.

ANNOTATIONES.

F. Qui fit vt tanta sanguinis copia effluxit & ita niger, & cur re-
petierit iam sæpiùs ea excretio: si ruptum vas, aut erosum qui fit vt
non vniuersus sanguis effluat præsertim, si ruptum non potest tanta.

G g ij

236 CONSILIORVM MEDICINALIVM

erumpere copia & putris & niger, nisi iam ante collectus fuerit, sed uantum sensim ex suis vasis effluit sanguis sit tanquam operculum uo ddam (Græcis ὀπίσσω) quod impedit quominus effluat vniuersus sanguis & vna cum sanguine anima, quod autem sanguis, & pus maxime sua crassitie impediunt venarum, & arteriarum effluuium, & quod eo excreto, aut deteriso aperiantur ora venarum, aut arteriarum, denuo docet Gal. in aphor. qui locus apprimè elegans & utilis ad diagnosim.

Com. ad aph.
27. l. 6.

2. *Questio an frugalior, an liberalior victus dandus liberalior conuenire videtur ad contemperandum. de eo nos alio loco, sed & vnum obseruatione dignum est quod, in mulieribus fertilibus quas Hippocrates μνηστικὰς vocat, audacter sanguinem mittimus cum desinunt vtero gestare, ut sit in mutilatis, quibus cruenta succedit dysenteria.*

CONSILIVM XCII.

De affectione qua dicitur ἱππος.

Com. ad part.
24. l. i. prog.
& co. ad part.
11. l. aut. sectio
2. prorrh.
Romæ pætorū
familia ob
hoc vitium
oculorum na-
tium.

Com. ad part.
10. sectio 2.
prorrh.

Oculorum affectio est ἱππος, insita & naturalis per quam illi non quiescunt, Gal. stridori dentium naturali comparat. dicunt non esse morbum, quod de eo nemo priscorum scripserit, apud latinos oculus pætus dicitur qui huc atque illuc mouetur & vertitur, & sic significaret illud quod ἱππον vocamus, quanquam sunt qui pætum interpretantur eum qui obliquis oculis in altum respicit, aut qui alterum oculum minorem habet. Alij Strabonem dicunt qui oculos distortos habet; pætum eum, qui oculos leuiter declinatos; tamen potius & pætus & ἱππος ad perpetuam oculorum mobilitatem refertur. Apud Hippo. contrariæ sunt affectiones ὀφθαλμοὶ πεπηγότες & ἱπποὶ; namque πεπηγότες, sit ob immobilitatem musculorum oculos mouentium, immobilitatem; vel ob omnium oculi musculorum resolutionem, vel æquam contentionem, & quæ in neutram partem vergat. Equis autem cum instabilis est oculus. In primo prognost. oculos vocat, ὀφθαλμοὶ κινεῖται id est instabiles, mobiles: interpretes, delusus voce hac ὀφθαλμοὶ φημι quod in vrinis sublimitatem significat vocat oculos ὀφθαλμοὶ κινεῖται. i. est sublimes

& male (nisi alludat ad illud quod diximus patum significare, qui obliquis oculis in sublime respicit) tamen oculus dictus ἐναωρῶμενος ^{ἐνδεδνημένος} vos instabilem significat & oculus ἐδεδνημένος ἢ ἐναωρῶμενος & ^{significat in-} αἰθήρκετος idem significat, item & πυκνὰ κινέμενος, & τῷ οφθαλμῷ ^{significat in-} ἑλκυστικὸν ἢ ῥίψιν ἢ ἐναωρῶμενα ἢ πυκνὰ κίνησις, idem sonant com. ad ^{significat in-} part. 27. sect. 1. lib. 6. Epid. vbi legitur οφθαλμοὶ ἐνδεδνημένοι. Lati- ^{significat in-} nus interpres vertit *obtortos oculos*, melius *oculos intus motos* & ^{significat in-} *quasi verrigine affectos*. Ceterum oculus mobilis in morbis, aut ^{significat in-} delirium, aut tremorem musculorum oculi declarat. ^{significat in-}

Author libri definitionum ἵππων bifariam interpretatur, equus est affectus oculi oculum firman-^{Uida com.} tis, qui comprehendit basim viso-^{Vega, in pro-} rij instrumenti, septimus quidam in oculo musculus est qui firmi-^{gnost. 6. l. 1.} ter adhæret oculo à posteriori parte, per quem firmatur oculus, & neruus opticus quē ipse amplectitur. Idem author libri definitio-
num præter primam definitionem allatam τῷ ἵππῳ, ait affectum esse ab ipso ortu, per quem instabiles semper sunt palpebræ: in posteriore definitione ad palpebras malum refert, in priore ad oculum ipsum, quæ opinio est castigatior & melior.

Ceterum si ab imbecillitate est consumpta humiditate nimia, & comparata quadam firmitate ipsi septimo musculo oculum confirmanti, tandem ea affectio corrigitur, ut in puerorum epilepsia contingit. Calor enim naturalis certo tempore in humido multo facit suam ἐκλαμψιν ut Hipp. de quadraginta diebus notat ad finem libri de octimestri partu & eodem loco, ait elegantissime Αἱ δυνάμεις ἀμβλύνονται ἐν μύξαις, id est, in mucco facultates hebetantur.

Ceterum credo patos fieri, & ob calorem nimium agitantem, eo modo quo videmus irascentes mobiles oculos habere, & ob infirmitatem neruosi generis, cum vitium à calore est, delirij est nota, ut dictum antè.

Item aliquando affecta est neruorum origo, aliquando peculiaris est affectio ipsius musculi, non repetito & accersito altius principio.

Hæc instituta sunt puero ita laboranti.

Vitus ratio tenuis pro ratione ætatis, cœna parciore, purgatio bis mense, ex fenna & syrupo rosarum.

Utatur aqua in qua coquantur passulæ, semen fœniculi addito cinnamomo.

238 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Vtatur blandis masticatoriis addita nuce moschata, mandat saluam.

Exercitatio antè pastus. Non dormiat à pastu citò.

Exsiccetur cerebrum sacculis conuenientibus, horâ somni, conseruæ conuenientes cum pauco puluere seminis pconia.

Pyroticum nuçæ colli.

CONSILIVM XCIII.

De dolore capitis & oculorum.

Dolor capitis contumax, & oculorum, qui filiam D. præsidis miserè & diu afflixit, adeo perduellis & rebellis fuit, vt omnia artis præsidia neglexerit. Is à materia fuit non simpliciter calida, aut frigida, sed à falsâ pituitâ per putredinem calida, quæ strumarum ferè author est, & hisce temporibus innumeris, & strumæ, & cæcitates præeunte dolore capitis & oculorum contigerunt. Pestilens fuit constitutio, quam præcesserunt ista mala, & inflammationes oculorum eadem materiâ loco apto cancos facit, adeo effrenis est, in cerebro non facit, aut quia aliò amandatur, aut ratione temperiei cerebri, id non facit, vnde quærit Aphrodiseus cur in mammis fit cancer in cerebro non fit; quia cerebrum & frigidum & humidum est, & sic resistit falsedini, aut acrimoniæ materiæ cancerum genituræ, & ad eundem sensum Hippo. scripsit, cerebrum est sedes frigidi & humidum, & quasi metropolis est, calidum autem est pinguis sedes & metropolis; quod enim calescit, primum omnium quum diffunditur pingue fit, & ideò cerebrum quia minimum pinguedinis habet, plurimum verò glutinositatis, à calido exuri nequit, libro de carnibus. Viæ ratio legitima instituta fuit, multoties sectæ venæ cum ex partibus superioribus tum inferioribus; temporum venis admotæ sanguisugæ, cucurbitulæ omoplatis, enemata omnis generis iniecta; frequentes purgationes institutæ ex senna, rheo. syrup. de pomis cum decocto. cephal. & hepat.

Malum ita rebelle fuit vt nullis ferè cesserit remediis.

*Cancer in
mammis non
in cerebro ge-
neratur ra-
tione frig. &
humiditat. is.
aphrod. prob.
90 J. I.*

Hippo.

CONSILIVM XCIV.

Ad Gonorrhææ reliquias.

Tantum malum non est vt maior quædam machina sit adhibenda. Repurgetur cholagogo, quia excretio est *χολαγος*.

De frictionibus ad inguina ex frigitiuo videbitur.

Institutus puluis ad gonorrhæam sequens.

℥. Quatuor semi. frig. maior. añ. 3 j. puluer. elect. diatrag. frig. *Pulvis*
corall. vtriusque añ. 3 j. f. antheræ 3 ij. Karabes sem. myrrill. & cydoniorum, hederæ 3 ij. puluer. scynæ 3 j. f. liquiritiæ rasæ 3 ij. tartar. vini 3 j. f. sacchari rosati q. f. fiat puluis.

Data terebinthina cum mellis parua quantitate.

Puluis diatrag. frig. & conserua nymphææ.

℥. Aloes 3 f. cretæ succini gentianæ, aristolo. dictami, myrrh. *Pilula.*
añ. 3 f. mithrid. 3 f. terebinth. 3 j. cum syrupo de alth. fiat massa, de qua capiat pilulas quatuor tertio quoque die, tribus horis ante iusculum. vel hæc. *Sunt qui crocum maris addunt.*

℥. Rhab. 3 j. f. hieræ simp. 3 ij. pilul. sine quibus & ireos florent. añ. 3 iij. croci gran. ij. castorei 3 j. cum aqua matricar. & vino albo infusionis granorum aliquot ambræ griseæ, fiat massa de qua cap. 3 j. potest addi agaricum: & quia rheumaticis doloribus interdum diuexatur, quæsitum an in rheumatismo arthritidis minace balneum tutum, iuuat referando cutim, bilem & serum temperando, nocet euocando in habitum & liquando, ineunte vere id fieri potest, vt locus sit blande sudorifico, meliora sunt apozemata, quam pilulæ, licet medicamenta liquida horreat, caput habebat *πυρεσις* *Fotus.*
Fotus emolliens institutus, deinde decoctum violar. pariet. saponariæ, veronicæ, paleæ, hord. furfuris oxylapathi caul. rub. fumiterræ, scabiosæ, tapfi, pinguis gallinæ, plantag. cocta cum hydrom. mell. mercur. fotus cum spongiis, quarum magna est vis.

Post lixiuium sarment. trumorum caulium, lupinorum, ex crobo, agrimo. marrubio, rad. bryoniæ, cypero iride, & senna,

240 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Pasta. Pasta ex amygdalis amaris, farina orobi, lupinorum pane furfuraceo, rad. iteos, pulu. vng. citrini, melle rosato, aut mercuriali, addito gummi tragacanthæ lauto in aqua rosarum.

Litus. Et quia darta faciem inuadebant, consultum oleum de ouis lib. i. aquæ plantag. in aqua feruefiant, grana x. sublimati.

Opiata. Denique vt monuimus antè, cum ager fastidiat liquida, pilularum loco potest parari, opiata laxatiua ex conferuis rosar. nymph.

Tabella. bugloss. borrag. rheo, & senna, item valent tabellæ roborantes ex santalis & rheo. vel syrupus solemnis additis herbis vulnerariis, hali cacabi fructu, ciceribus transcolata conferua rosea. Repur-

Sudorificum. gato corpore diligenter proderit decoctum scynæ cum oxyacantha, aut radice cichorij.

CONSILIVM XCV.

De fluxu sanguinis & fluore muliebri cum suspicionem cancrosum in utero affectionis.

2. de morbis mulierum. **C**ircà mensem Nouembrem contigit fluxus sanguinis vxori Tassini, iam annum quinquagesimum assecuta, cum facta elictis *αἱμαρρῶσις* venarum fluxus non substitit, id contigit, vel quia pituita putris & falsa quæ abundant annosæ mulieres & viragines, venas referarat, vel quia qua data porta consuetudine fluendi sanguis viam appetiuerat, vel quia iam *καρκινώδες* π concipiebatur, tunc autem eroduntur ab atro sanguine, vel quia immodicum sanguinis fluxum *ῥῆς*, isque malignus sequitur, ait Hipp. quia ex-
hausto multo sanguine is qui residuus est *καταλῶδες* redditur, maximè si purgatus non fuerit.

ad finem lib. de locis in hom. Cum procedit tardiùs *καθαρῶσις* *ῥῶσις* est *πυώδες*: cum celerius, subcruentus. Iunioribus sunt subcruenti, senioribus sunt mucosi & quasi *πυώδες* sed non vero pure, grauissimi sunt mulierum morbi, partim ex parte illarum, partim ex parte medicorum: illarum quidem, quia siue fluant menses, siue non fluant, si quid peccatur morbi fiunt, item quod ob verecundiam morbos celant: medicorum, quod earum morbos non norunt, & vt viriles curant, licet longè differant, ait Hipp.

Cacochymæ,

Cacochymæ, non modo habent menses decolores, sed & inordinatos. In l. 5. aphor.

Cur aliis præter, & mensis fluit seorsim, aliis confusim, confunduntur laxatis viis, & fatigatâ naturâ. Cum natura valet, retinet, cum infirmatur, confusio fit, & id totum est symptomaticum & motu morbi. In venis mesaraicis & chylus & sanguis continentur diuersa ratione.

Remedia sunt victus ratio legitima, phleb. catharsis blanda, clysteres anodynî, lac asinæ, decoctum brassicæ ad colluendum valet, decoctum prunellæ, plantag. vtriusque ros. betonicæ, veronicæ, geranij, sanamundæ, pimpin. stellaris. Curatio.

Serum lactis cum succo aliquo in mortario plumbeo subactum mirifice est profuturum, item vnguenta diampholygos, de plumbo, & de cerusa, tam simplici quam vlcera to cancro conueniunt.

ANNOTATIONES.

1. Hic decipi non oportet, nec confundendus fluor albus, cum purulenta excretionem, ut cum Hipp. 2. epid. narrat de ea quæ gemellos peperit laboriose, nec purgata est benè & tumor totius corporis euenit, & rubram mensē ad sextum mensem durauit, dein & leuig. omni tempore fluxerunt quæ rubro statim colore inficerentur, sed alba hæc fieri putauit ob mutationem ad albedinem propter suppuratum, putat enim vitio obstetricis relictam carunculam quæ putruit & ora vasorum corrodit exulcerauitque, unde vlcus & alborum excretio.

2. Cum sanguis qua data porta consuetudine fluendi ad uterum fertur sæpe varice. (ut in tibiis) in utero & circum uterum fiunt, loco hæmorrhoidum in ano, mulieribus, vel in utero hæmorrhoidum, & quibus sanguis qualitate peccat, vel si salaces sunt & non satis, aut subiguntur, aut concipiunt, unde melancholicæ fiunt, ut constat de muliere salace quæ cum succussione equi ad venerem excitata esset nec ei satisfieret à marito, exijt à potestate mentis tandem ex utero omnibus pacificatis exijt ingens copia sanguinis picem referentis, balnea naturalia adiit, concepit, ad se rediit. Historia.

Et notandum quod contigit nob li mulieri, dolor incredibilis ad uterum suspicio fuit humoris melancholici in utero & hypochondriis tandem morbo cessante carbunculus magnus & ferox oboritur est. si ad

Hh

*partes interiores ad uterum præsertim, sanguis inclinat, carcinoma-
tis, aut cancri metus.*

CONSILIVM XCVI.

De voce pene deperdita.

D. De Bobigny conqueritur de symptomate, nempe de vocis vitio; quæ enim vox clara liberaque esse debet, ea obscura est & vix intelligibilis.

Symptoma autem est in genere eorum quæ audiuntur; causa esse videtur in vitio organorum, organa sunt triplicia, excipientia, deducantia, mouentia.

Obstructio esse videtur, morbus ergo est in conformatione: si obstructio est, cur non adest difficultas respirationis? obstructio ista sufficit ad vocem corrumpendam, non ad respirationem difficilem.

Possunt institui tabellæ ex elect. diaireos mastich. oliba, diarhod. abb. cinnam. cum saccharo soluto in aqua infusionis stœch. aut rorismarini.

Purgatio.

Valeat hydromeli, coma absinthij adiecta, & oxymeli vt nulla moueatur tussis ad expediendos palmones, venæ sectio ex interuallis, cassia, manna dissol. in iusculo galli veteris, succus glycy. niger, oleum ex saccharo.

*Apozemata
bechica.*

Capillarium decoctum, maxime adianthi, valere creditur, palmones detergere & animam quasi dilatare, linctus cassiæ superbibendo decoctum caulium & cicerum rubrorum.

Decoctum ficuum & passularum cum bipinella.

Linctus mellis aliquando solius, aliquando cum optimo butyro.

Pomatium bonum est & vinum dulce si febris non adsit, idque oligophorum. Est enim calidis visceribus prædita, ideo cauendum ab iis quæ impendio magis ealfaciunt & siccant.

Purging magis conueniunt; oxymeli autem inter ea censetur, vt campana & hyssopus, magis (inquam) quamquæ dulcia & humida sunt, sputum enim effoeminant, vt ait Hippocrates, nisi fortè

quis dicat emolliendum esse ut id quod emollitum est detergeatur facilius τὸν ῥυπτικὸν vfu.

Maximè vero videndum ut contrarium contrario opponatur, an sit obstructio, an induratio, an plenitudo aliqua.

ANNOTATIONES.

1. Obseruati sunt quibus ob aërem frigidum ambientē neruis recurrentibus refrigeratis vox est imminuta & penè adempta, laryngis vitium obscuram sæpe reddit vocem, dum patitur resolutionem quandā, Aërius eo in casu utitur garg. acriusculo spiritus detentione, coaceruata respiratione. & continua vociferatione; glycyrriza commandata valet. forus ad laryngem ex rosa, cypero, sem. fenicali.

Notat Auicennas rarius esse quoque de genere eorum qui vocem emendant.

2. De singulari fato illius mulieris unum quoque addemus, cum per annos aliquot sensim, atque paulatim emacruisset, omne alimētum genus fastidiuisset & ut loquitur Hippocrates Στοιχειώδεις ἐχεν τὸς βρώσιμας & οὐδὲν tandem repente ac inopinato extincta est, ac cum cibum nec appeteret nec caperet (apud Hipp. autem λαμβάνειν significat cum aliqua appetētia accipere) quotidie viuēdo moriebatur, & moriendo vivebat, præhensa est paroxysmo febris tertianū typū referentis, tertio post die idē paroxysmus, à quo reualuit & fuit ἀπὸ πέτος, & habebat more solito iocum & deambulationē cogitans. At accessit rigor & ὁ δόμος tertiani, & tertij paroxysmi, fuit rigor ingens & tantus ut ab eo non potuerit, ut loquitur Hipp. ἀναρπάξαι τὸν σώμα, totum erat sanè λεπτεπίλετον, interna conflagrabant incendio, sequenti die fato concessit, conquerebatur maximè de dolore ad hypogastrium, inuenitur aperto cadauere, pulmo aliqua ex parte inflammatus, hepar exuccum & mali coloris, sed uterus erat corruptus, & quasi gangræna affectus, plenus tabo, & sanie, quæ erat duodenis maritus per tres annos penè abstinerat à congressu, fortè si ager fundusque cultus fuisset meliùs eum ea actum foret.

Laborarat olim πρὸ γυναικείῳ, qui erat tetri odoris, aliqua ex parte & ferè omnino suppressus erat.

Interiit fere à veneno interno & genitino, hæc cum aliàs fecunda esset, quod mirum: cum scemellam conceperat, fluebat ista materia etiam copiosa, cum marem, aut minor erat, aut sistebatur.

Aliam etiam videre contigit mulierem quæ patitur menstrua toto grauiditatis tempore cum mas concipitur, id non euenit cum femina

244 CONSILIORVM MEDICINALIVM

concepta est, sed querat quis, quomodo febris continua non præcessit? qui tertiana tam simplex eam susculit. At tertiana periculo vacat, imo & febres quæ quo quo modo intermittunt, nedum tertiana quæ tantam intermissionem habet. vide aliquid simile contigisse apud Gal. qui notat causas in corporibus nostris generari quæ potentia & virtute tum virus rabidorum canum, tum lethalia medicamenta representant.

In proxi. et.

Sic in morbis nec præcipitanter timidos, nec temere securos esse oportebit, & reuera iis qui vitio singulari, præsertim vero corruptione partis intereunt parum tutos securosque esse oportet nec prædici exitus potest, ut fit in morbis humoralibus, imo febre fere vacare videntur, id quod in cantore Durantel & in præposito dicto Hardy & aliis multis à nobis visum est anno 1594.

In morbis à partium corruptione non potest certo prædici exitus ut in humoral. morbis.

CONSILIVM XCVII.

De tussi molesta & sputo cruento.

I. Duo sunt symptomata quæ molestiam inferunt, tussis sæpè inanis & cruentum sputum hæc sequuntur, aut destillationem à capite, aut collectionem veterem materiæ in pulmone contentæ, aut exonerationem quandam à visceribus & partibus pulmonis vicinis: tribus enim modis, tussis molestiæ excitantur, & sputum sanguineum apparet, vnde frustra sæpè caput omnium horum authorem creditur, quanquam ab eo iniuriarum eiusmodi maxima pendet occasio.

Tussis molesta & sputum cruentum aut à destillatione collectione, & exoneratione à part. pulm. vicinis. Antiquitas tussim quandam a splene molestum esse statuit.

2.

Distillatio morbus non est, sed morbi est consequens, maximè vero, ut dictum est, affectionem capitis consequitur. Caput vel ut pars similis, vel ut organica afficitur: ut similis, ut cum calidior, aut frigidior pars; organica, ut cum plenior & obstructionibus scattentior.

Veterem assiduam molestaque tussim Senec. per tussim vocat.

Duo verò maximè observari debent facultatis retentricis, aut imbecillitas, aut excrettricis ab acriuscula materia irritatio id quod facit ut perennitas descensus & defluxus materiæ consequatur: in priore διάχυσις & σύντηξις cernitur, in posteriore organus & impetus aliquis, vnde tussicendi assiduitas, posterius est pe-

cularis generatio humoris efferi, mali, falsuginosi, qui quoquo-
uersus se insinuauerit & irruerit, hinc sœuit, hinc grassatur, hinc fero-
ciam exercet, vnde videmus eos in quibus est eius humoris gene-
ratio, distillationibus, & febri inde natae marcorique confectio
obnoxios.

Cæterum catarrhus omnis, authore Hippocrate à carnibus est
calidis aut frigidis; à calidis per fusionem & colliquationem: à fri-
gidis per expressionem, maximè verò marcor, & extenuatio eos
adoritur, qui defluxui à calore acris orto obnoxij videntur.

Ideo plerique peccant qui falso persuasi tussim omnem à frigi-
do ortam magnam auxilij vim, in vsu rerum calidarum, aut ad-
mouendarum, aut assumendarum solent collocare, frigus quidem
ocasio esse potest, sed & febrem & distillationem acris & ferini
humoris potest concitare, sic falli non oportet.

Imo grauissimè peccatur in vsu remediorum topicorum caput
calfaciuntium ob tussim & defluxiones: contra caput refrigerare
oportet aliquando; ita enim Aëtius loquens de vsu oxorrhodini
in distillatione ferina, ait ab eo remedio refrigerante distillatio-
nem ferinam incrassescere, tussim sedari, somnum induci, calorem
exurentem temperari.

Purgatio, venæ sectio, humorum temperatio, materiei acris de-
labentis inhibitiō, correctio, delinitio, & (tempori) à pulmone ex-
clusio valet. accedit partium à quibus humor fluit robur & con-
firmatio, valent cathartica, aliàs lenientia, aliàs viscera repur-
gantia.

Cassia vel linetu sumpta, vel bolo, vel iusculo soluta, addita ta-
marindorum, aut passularum pulpa, conferet, senna valet.

Quæstio est, an in acribus stillicidiis, pilulæ acriusculaque re-
media conferant: rationes vtrique probabiles afferri possunt, eas
scholasticis exquirendas relinquamus, audiamus ea de re antiquo-
rum consilium. Galenus in methodo medendi dat medicamenta
ex alto euocantia in phthoe, vbi præsertim teter humor in capite
gignitur qui stillandi assiduitate partes subiectas irrigans eas affi-
cit, vnde rarò, sed tamen interdum danda opera purgationi per
fortiora medicamenta, quia mitiorum vis est sæpè ignaua & elu-
ditur, vnde Fracastoriusea in parte Galenum æmulatus id genus
remediorum violentorum consuluit in hæmoptoicis *κατὰ τὴν*
στάσιν. & Hippocrates in descensu putris pituitæ à capite vali-
dius purgandum putat, contra de Phtheiria si loquens Celsus me-

*Locus notan-
dus de capite
refrigerando
in distillatio-
nibus ferinis
ex Aet. vide
plura in 2.
conf. Ballonij
libro.
Curationis
capita.*

*In hæmoptysi
cauendum ab
aloe, syrupo
rosa. pallid.
& aliis que
vim habent
ἀνασχυτικῇ
Vide Hipp. l.
de internis
affect. Gal. 5.
meth. c. 14. &
15.
Ballonius in
lib. 1. conf.
Lib. de inter-
affect.
Lib. 6.*

dicamenta intus lenia danda sunt ne quid acrioris pituitæ concitent.

Venæ sectio ex vfu esto, bis anno, & cum latus sinistrum dolitet, paulo crebrius ab ea parte sanguis est demendus.

*Lib. de inter.
affect. Hipp.
hæmopticos
pingue facit
ne tabeant &
inopia cibi
sanguis effertur.
Fames &
mora bilem
in nares con-
cunt. Plaut.*

In hæmoptysi est vbi plenius cibandum est vbi parcius; si copia sanguinis est, parcius: si acrimonia, temperationis ergo plenius; nam fames & inedia bilem in nares concunt.

Temperatio humorum iusculorum vfu, prunis, violis, syrup. viol. iuiub. de nenuph. iuleb. alexand. ficubus, hordeo, in iusculo cocto, opiat, pilulis bechicis.

Syrupus de lamio ex vrtica, & de symphyto descriptione Fernelij & iusculis. pomorum redolentium vngul. caball, berbecorum granatorum, aqua rosarum addito semine papaueris rubri & albi.

Balnea, lac alina.

*Cap. ult. l. 4.
locorū affect.
Obnitiū
iusculorum
vsum & rerū
liquidarum
effeminatur
sputum Hipp.*

Sed & licet magna sit vtilitas iusculorum, in iis tamen temperatos moderatosque esse oportet, nam patet ex Galeno liquidarum rerum frequentiori vfu, pulmonis carnes rariores & putredini obiectas magis fore, immo & sanguis tenuior serosiorque fit & putredini opportunior.

Manna conferet.

Conserua rosarum, rosa enim priuilegio vim habet sistendi catarrhi vnde rosa *ῥοσὶ τῶ πλείον* dicitur, quod inhibeat fluxiones.

Sed & inhibito in faucibus fieri debet, gargareonem & pharyngem & laryngem gargarismis corroborando, id quod pauci animaduenerunt, tamen id genus remedij in primis ex vfu futurum est.

℞. Plantag. berbecorum, portul. añ. m. j. seminis papaueris albi ʒ ij. hyoscy. ʒ j. fiat decoctio in aqua hordei, in colatura dissol. diamaron. ʒ j. aquæ rosarum & succi granatorum añ. ʒ ss. β. gargarismus ad ʒ j. colluat os frigide.

Data præscriptaque est opiata ex conseruis rosarum nenuph. viol. symphyti, additis rasuris.

Et in sanguinis reiectione, consultum est, vt vteretur addereturque bolus armena, terra sigillata, mumia.

Vel puluis ex iisdem concinnaretur aptus formandis, aut cylindris, aut pilulis hypoglottidibus, aut tabellis, sed videndum ne vfu nimio astringentium *ἀναγκάσει* impediatur.

ANNOTATIONES.

1. Hic æger cui hæc sunt instituta macilentus est & satis procerus, de eo audiendum videtur quod scripsit Celsus cap. 7. lib. 2. frequens distillatio in corpore tenuis & longo tabem timendam esse testabatur.

2. Quid est quod tantopere reformidatur sputum cruentum ut tabis prodromus, Galenus enim ait, mitissimi sunt morbi in quibus cruenta reijciuntur, loquitur de pleuritidibus sanguineis sic pro nomine, morbi, lege, pleuritides.

Hæc autem affectio terrificæ est, quia sæpè est tabis minax, tamen si solandus æger est, adducetur locus Plinij de Macrino & Saturnino urbis præfecto utrique hæmoptysis erat familiaris & tamen Saturninus annum nonagesimum attigit. Et notaumus alibi, magnas excretionis sanguinis e pulmone minus esse periculosas quam parvas. Qui sanguinem emittunt ait Hipp. si sine febre quidem, salutare, si verò cum febre malum, curare verò acerbis & refrigerantibus aph. 37. lib. 7.

3. Nil est tam vulgare quam tussis, & quo magis tussis est vulgaris, eò ferè negligitur, & idem dolori dentium contingit, qui quia crebro scuit, nullique parcat, aut ætati, aut sexui, eo minoris æstimatur & tamen tormentis annumeratur, tussis præsertim quæ vetustior & molestior mala sæpè, ut signum, & ut causa: ut signum, quia, aut vitium partium à quibus manat fluxio, aut in quas repit, aut humoris malitiam significat: ut causa, quia successu & excussu pulmonem offendit, & caput: immò caput replet (ait Hipp.) ab agitationem, & pulmonem calfacit, quæ incommoda magnificat. Tussis autem alia est humida, alia sicca, humida ferè à distillatione est, & plus nocet quantitate quam qualitate humor. arida non ita à distillatione est, nisi fortè aliquando ab efferi indomitique humoris labentis irritatione, sæpius est à refrigeratione, (unde, cum os aperitur, aut quis loquitur statim ruſsit) à tuberculo, ab exulceratione, & horum materia irritans non facile exigitur: Testatur pleuritis cruda, in qua inanis est tussis. Fernelius ait eam tussim quæ semel anno, aut ex intervallis molesta est, à distillatione, esse quæ continenter nullaquæ, aut minima intermissione fatigat, aut vitiosam pulmonis affectionem, aut veterem obstructionem, aut stabilem intus causam habet, quod tamen probabile videtur; nam quibusdam ferina distillatio est, eaquæ à capite & assiduo vexat, testis sensus ipse, nam dum fauces transit molestiam infert irri-

248 CONSILIORVM MEDICINALIVM

tando, error autem aliquando in ea tussi committitur, quæ à latente in pulmone vitio oritur, dantur enim sæpè styptica eaque virus in pulmone suppressant, si enim ponimus, aut pus, aut saniem subesse, sicque obstructionem tussis causam agnoscimus, adstringendo obstructio augetur, & materia expectorabilis, sistitur.

CONSILIVM XCVIII.

De Alui fluore, hæmorrhoidibus & aliis affectibus pro uxore Anglorum legati.

Infuete & subita temporum locorum tempestatumque mutationes sæpe gravium morborum cause obrepentinam corporis humorumque agitationem. Epist. ad damagetum.

Nobilis domina clarissimi Angliæ Legati coniux, ex quo Luteriam appulit (agitur autem annus quintus) iubia & iubica fuit valetudine, siue id loci, aëris, & cœli mutatione contigerit, siue potius, ut ait Hipp. quod ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων πᾶμφορος ἐστὶ τῶν πᾶντων νοσημάτων, & totus homo à natiuitate morbus est.

Primum eius faciem & nonnullas partes ignes sacri affecerunt, & ea quæ Græcis φλοσίνια & φλυκταίνω dicuntur. Affectus quidem cutanei aliàs lædunt, aliàs non lædunt: lædunt, & mali sunt, ut signa, cum ob vitium internum, aut imbecillitatem expullulant; prosunt & ut bonum signum apparent, si criticè, si per exonerationem quandam efflorescant. in nobili domina cacochymix effectus & soboles fuerunt, neque enim criticè erumpunt.

Celsus.

Curaneum hoc malum licet sæpè fugax & innocens fuerit; tamen afflixit, quia faciem maculauit. At fœminis cura, & cultus corporis non facile eripi potest. Aliquo post tempore profluvia alui eam exercuerunt, aliàs cœliaca mesenterica, aliàs leienterica: ab his vix ac ne vix liberari potuit.

Sed & inter cætera sæuit molestus hæmorrhoidum dolor, ubi enim semel eminebant ora venarum & tanquam capitulis surgebant, oborta inflammatio, dolor mouebatur tormentis penè annumerandus; aliàs immodicus erat fluor, & tamen minus fuit molestus, fluxus etiam non mediocris quàm omnimoda suppressio, verebamur ne inclinata in præcordia & in viscerum aliquod materiâ graui morbo corripereetur: ideo non suppressimus quòd

Sub finem c. 6
de hæmorh.

*Austus hu-
mor melan-
cholicus gra-
viorum capi-
tis dolorum
sepius causa
esse solet.*

3.
ib. 3. c. 19. de

Lib. 3. c. 19. de
hyst. animal.
Credidit an-
tiquitas quod
diis non esset
sanguis sed
ixor aliquis
pro sanguine.

ἀνατελεῖται πρὸς τὴν αἷμα. Nec enim tam sanguis est, quàm saniosus sanguis; & reuera *ἰχρὸν ἰχρὸν* autem inter verum sanguinem & pus medius est quodammodo, ait Celsus. Apud Aristotelem vero generalius sumpto nomine, sanies, sanguis incoctus est *αἷμα ἀπτερόν*. *Απτερόν* autem dicitur, aut quia nondum coctus est, aut quia in serum diluitur, aut quia nondum coctus est, aut quia in serum diluitur & conuertitur, sic enim per putredinem amissis suis fibris sanguis in putre quoddam serum resoluitur, id quod sanguini illustris dominae contigit, quoties enim sanguis detractus est, (detractus est autem ferè vicesies necessitate ad id impellente & vere & autumno, quo tempore morbi eius gliscunt, & egerminant) impurus fluxit & impurius quàm quis credere possit.

Ut mirum non sit, si non sufficiat menstrua euacuatio per finem pudoris, sed & alia purgatio subsequitur per anum, menstrua ferè periodum retinens, & ea videtur supplere. Id in quo deficit consueta per menses euacuatio, quæ alioqui aliis mulieribus minùs valetudinariis satis esse solet.

Hinc Aristoteles paucis mulieribus mariscas fluere ait, aut varices oriri, aut sanguinem è naribus manare, & si quid horum accidit detrimentum in menstrua decumbit: supra enim statuerat sanguinis è naribus, aut ex sede profluuium, varicium quoque ortum non contingere solere, nisi iis quibus sanguis morbosior esse solet, aut quibus viscus aliquod malè habet, vt credam quidem mulieribus menstrualibus fluxum hemorrhoidum morbum esse, viris non morbum, sed sanitatis tutelam, sed de his fortassis plura quam par sit præsertim apud artis peritum.

Intra verò hæc remedia consistendum putauimus.

Vere & autumno, & sæpiùs aliquando sanguis detractus est, ni detrahebatur graui aliquo symptomate premebatur.

Cassia in sculo dissoluta magno profectu vsa est, temperabatur enim pulmonum & hepatis intemperies quædam.

Balnea in vsu frequenti fuerunt, æstus hypochondriorum moderandi ergo.

Ad pathemata melancholica opiata contulerunt, hedricis medicamentis vsa est, ad demulcendos dolores.

Hæc porro à me non tam docendi quam communicandi studio dictata sunt, nulla enim non opera dari debet, vt illustrissimæ dominae saluti consulatur, hæc eius valetudo, & incommoda & imbecilla ad id nos inuitat, & tanto citiùs quantò promptiùs in mor-

*Loco supra
posito.*

4.

5.

6.

*Arist. 19. l. 3
de hist. ani-
malium.*

Civatio.

bos ruit, in multa enim imprudens caderet nisi ab amico medico moneatur. Offensis enim infirmitas est maximè obnoxia, sed & ad hoc officium & obsequium accendere debet illius candor, & suauitas, Medici enim fuit amici notare peculiarem naturam quo facilius imminentes morbi arceantur & præsentes abigantur, facilius quippe morbus excluditur, quam introductus expellitur, hoc autem operæ pretium magis faciat amicus medicus quam extraneus, vtilior enim est amicus, licet par sit scientia, ideo in suo medico non solum scientiam, sed & fidelitatem, & beneuolentiam Tullius requisivit.

Celsus.
Raro quisquam
non aliquam
partem im-
becillam ha-
bet.
Ægrius eijci-
tur quam non
admittitur
hospes.

7.
Hipp. Tulli

ANNOTATIONES.

1. Hæc domina in Franciam venit cum suo coniuge Legato, quod nouum & insolens erat Augusti Cæsaris temporibus, hic enim Legatorum nemini permisit, nisi grauate & hybernis mensibus uxorem interuifere. Apud Tacitum est disceptatio arguta Seueri Cæcinnæ & Valerij Messalini, an mulieres debeant esse comites suorum maritorum siue in bello, seu in legationibus.

Suetonius.
Lib 3.

2. Nota loquendi formam Cornelij Celsi in iis quibus vitium non est internum, sed tantum quædam quædam hæmorrhoidum fluor purgatio est, non morbus, in aliis contra, si vitium internum, si symptomaticè, omnino fluit sanguis, est morbus. Estque quod dicimus, vi morbi sit, & vi naturæ.

Quod autem ad fluxum earum immodicum pertinet, duo animaduersione, & prouisione digna sunt, prius, quod, qui sunt cacochymi, & laborant hepatis intemperie, quique vitiosum sanguinem congerunt, ij fluxus immodicos patiuntur, atque sanguis peccat duobus modis & ῥα τὰ τοῦ πλῆθος & ῥα τὰ τοῦ πᾶθος. maximè vero in mulieribus, si enim fluxus muliebris à Gale. comm. ad part. epidemiorum ὁ Ἰφες Boëthius vocatus, & qui mense velut vectigal redditur, non sufficit naturæ ad expurgandum & fluxus hæmorrhoidum requiritur, malum id est, & ut signum & ut causa. Et reuera quotquot mulieres fluori hæmorrhoidum obnoxias vidi, eæ valetudinariae vixerunt. Notatque Hollerius viduis aliquando loco mensium fluere hæmorrhoidas, item quibusdam grauidis quatuor menses, posterius quod obseruandum est, ad therapiam pertinet, nempe quod diligenter & exactè purgari debent ij quibus immodicè fluunt hæmorrhoides, corpore enim legitime repurgato promptius & tutius & desinant & supprimuntur.

Hæmorrhoi-
dibus mulie-
res obnoxie
fere sunt va-
letudinariae.

Desinunt he-
morrhoides po-
re legitimis
purgēt omni-
bus vacuato.

hæmorrhoides purgationibus; cacochymia, quæ extra vasa est foras
exigitur, corpus temperatur & refrigeratur, hinc sanguis gignitur
temperatior, ideoque minus ad naturam irritandam idoneus, quæ
non potest frui sanguine feruidiore, & naturam melius $\mu\epsilon\lambda\alpha\varsigma\ \chi\omicron\lambda\iota\mu\omega\tau\epsilon$ ex-
sapi nte.

non morbo-
sum

Que in san-
guine consi-
stenda ve-
niunt.

3. Aristoteles ait pro ætatum ratione sanguinem distingui, & τὸ
πρῶτον τὸ εἶδος, ad finem cap. decimi noni lib. tertij de historia ani-
malium. In sanguine autem cernitur, substantia, qualitas, color, cali-
ditas, frigiditas, consistentia, quæ οὐ τοῦτο dicitur, & cum serum fit
istam οὐ τοῦτο vitiatam dicimus. Idem Aristoteles viam paraturus
ad tractatum de hæmorrhoidibus ducit sanguinem in sanum &
morbosum vocat. Et hinc occasio ducitur & canon secandæ venæ,
fit autem malus & φῶρος & ῥῶτος, omnis τὸν ἔχει habeat necessum est,
nisi fibris sit cossus ut sanguis damarum: Hipp. lib. de natura
pueri laudat sanguinem fluentem à parva si grume scat.

Autumno

generantur
sanguinis
ichores πρῶ-
τοι.

4. Hunc locum de sanie & sanguine putri illustrat Aristoteles
reddens rationem, cur soli homini hæmorrhagia è naribus contingat,
probl. 2. lib. 10. admonet inter cetera hoc quod quisque sanguis vi-
tiatus integro tenuior existit. Talis autem est qui se excrementis
miscuit & quasi in sanem degenerat.

Autumno
generantur
sanguinis
ichores πρῶ-
τοι.

Ichor autem in malam fere partem capitur apud Hip. & est qua-
dam anni pars ichorum procreatrix & singuli humores suas quas-
dam habent humiditates ὡς γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ, ὡς ἡ γυνή, qui quidem relient
naturam humoris proprii & ἑαυτῶν, unde apud Paulum sub æqui-
noctium vernum sunt γυναικῶν ichores sanguinis. At vero circa virgi-
liarum ortum sunt & generantur, maxime ἡ γυνή πρῶτοι & quemad-
modum cuique humori suum est serum naturale, ita humori præter
naturam suam quodammodo & serum malum.

Cuique humo-
ri natu-
ræ præter natu-
ræ suæ
serum.

Est & aliud excrementum quod proprie λεῖψος vocatur, & ma-
xime is succrescit qui pravis alimentis utuntur, ut sunt cæpæ, alia,
&c.

sed rorant
sanguinem
quibus visce-
ra sunt imbe-
cilla.

5. Alij audentius sanguinem demunt cum impurus est, quod impu-
rum sanguinem noxam afferre corpori asserant: alij contra: Gal. re-
strictior est in sanguine mittendo cum impurus, virisque suæ rationes
patrocinantur.

Hæmorrhagiæ
familiares in
quibus visce-
ra sunt imbe-
cilla.

6. Citauimus ante ex Aristotele soli homini inter animantia hæmor-
rhagiam contingere, id quod Plinius docet cap. 38. lib. 11. sed m. ximè
notandum est us partem aliquam in vitiis esse quibus familiaris est
hæmorrhagia, quamquam id distinctione opus habet, videndum

enim num sanguis fluat, καὶ τὴν ἀτονίαν an per plethorā, & conatum naturae. verum ex hoc Aristotelis loco multa notatione digna eruuntur, & maximè quod pertinet ad sanguinem ἰχθυοειδῆ, & ad haemorrhoidum fluxum, an sit morbus in mulieribus, an simplex purgatio. Celsus subtiliter & medicè loquens de iis quibus parum tuto supprimuntur haemorrhoides, praesertim cum tali profluvio imbecilliores non redduntur, ait hanc purgationem non morbum esse: in varice enim, haemorrhoides τὸ αἷμα ὅτι νεοσπῶδες, at ἐν πῶ sanguis est morbosus, menstrua autem mulieres à ceteris morbis sanguinis vindicant. Et τὴν ἀλλαν νεοσπῶτικὴν & μετ' ἡμετέρας οὐ νεοσπῶδες: non dicit νεοσπῶτικὴν, ac si velit & menstruam purgationem esse aliquid νεοσπῶτικόν, id est morbosum, quòd si mulieribus contingant varices haemorrhoides, καὶ τὰ μὲν γὰρ γίνονται χαίρω, id est pauciora, detrimentum in menstrua incumbit, ait Gaza, non quòd in viris fiant à laudabili sanguine: loquens enim generaliter, ait, νεοσπῶτος τὸ αἷμα τὸς ἐστὶν, varix, haemorrhagia, haemorrhoidis.

7. Nil magis aegris prodest, quàm ab eo curari à quo volunt. Senec. lib. 4. declamat. 5. decl.

CONSILIUM XCIX.

De hepatis & pulmonum calida intemperie cum totius corporis extenuatione.

Pro D. Iudith Memmæa.

CVM morbus est incognitus etiamnum remedia sunt tentanda, hæc si minùs iuvent, modo alleuetur æger sapius repetantur; communibus autem utendum remediis donec res patuerit, id maximè in longis, quia res virget in acutis.

In deliberando aliquid ponere quod non est, magni refert; exactè etiam nimis querere, nec aliquid statuere donec *προδείκνυται* res innotescat, non vacat periculo, id enim affectatum nimis.

Puella habet cerebrum κατὰ πρὸς τὸν & nares humidiores Hipp.

li iij

Hipp. lib. de
loc. in homi.

254 CONSILIORVM MEDICINALIYM

Sanguis hu-
midior, vel
natura, vel
morbo.

I.

6. epid. hic
locus legitur.
Cap. 4. l. 3. de
sympto. caus.

Que sicciora
humid. pri-
migenia: hu-
midiora hu-
mid. excre-
mentitia.

Hipp. lib. de
carnib.

Cap. 19. l. 3. de
hist. animal.

Plin. c. 38. l. 11
Arist. probl. 2.
l. 10.

opponit τὸ ὑγρὸν τῇ φύσει, τὸ ὑγρὸν ἐκ τῆς φύσεως. Aristoteles autem loquens de sanguine humidior & morbosior, ait, ita esse vel natura, vel morbo. Seu τῇ φύσει vel φύσει qui natura nares habent humidiores morbosior sani sunt, qui ἐκ φύσεως vice versa.

Catarrhosus eo se habet modo, quo is qui diarrhoea laborat, quod diarrhoea in ventre, id est in cerebro catarrhus, ait Galen.

Plerique sunt sicci, humiditatem tamen plurimam habent, quo enim quidque est siccus humiditate primigenia, eò humidius est humiditate excrementitia, id senes declarant, sed & in aliis ætati- bus id fit; maximè verò humiditatem excrementitiam habent, qui calorem habent fugacem, qualis in palea accenditur, contra qui calorem stabilem habent & carnes solidas, minus sunt excremen- tosi, nisi peccent in ratione victus.

Puellæ huic multa est humiditas excrementitia, quòd imbecillæ naturæ est argumentum, & caloris instabilis, tussiculosa est, cere- broque est amplo & humidissimo, sic tabescit defectu boni roris, & alimenti fixi, & glutinosi, & excrementis scatet cerebrum enim ferè liquefit.

Cerebrum est metropolis humidi & glutinosi, & facile colli- quationem patitur à calido præsertim, facile enim fit à calore σὺν- τηξίς vel διάχυσις, σὺν τηξίς, enim tristius nomen est, tristioris causæ argumentum.

Rubor est genarum fugax, pulsus frequens cum mollitudine, macies, sputa subviridia guttulis sanguinis aspersa, quæ non tam à vasis, quàm à pulmonis substantia delicata aliquantum excoriata, Ichor enim sanguineus manat: hæmorrhagiæ frequentes, hæ sunt calidiorum pulmonum notæ: quibus verò imbecillior & calidior est pulmo, iis hæmorrhagiæ è naribus sunt frequentes, unde Hipp. attractio, pulmonis incendium. At vero puellas hæmorrhagicas esse ferè contra naturam est, melius enim per vterum repurgaren- tur, ideo

Aristoteles damnat mariscas & fluxum è naribus in mulieri- bus menstrualibus, rationes explicatæ sunt paulo antè, quanquam Hipp. vult menstruo deficiente bono esse si fluat è nare sanguis, fluor enim succedaneus est.

De hæmorrhagiâ vnum notandum, quòd hæc soli homini con- tingat ex Plinio, Aristoteles id belle explicat in problematis, do- cetque quòd omnis sanguis vitiosus ipso sanguine integro sero- sior est, & tenuior,

D. Fernelius annotat eos è naribus sanguinis fluxum pati, quibus viscera sunt imbecilla, & iecur maximè, id quod hydropicis contingit, itaque est potius robur addendum iecori, quam captanda occasio mittendi sæpè sanguinis, quia stillat sanguis, qui è nare fluit. hinc illud Hippocratis, Quibus è naribus fluit sanguis, iis, vel speres splenem in tumorem eleuatum, vel caput dolere, vel habituros ante oculos. *μαρμαρυγας.*

*Cap. 4. l. 2.
meth. med.
Contra eos
qui secant
venam quia
vident è nare
sanguinem
fluere lib. 2.
prorb.*

Extenuatur puellæ corpus in dies. omnis extenuatio, aut alimenti penuria, aut corruptione, aut exercitio validiore, aut dolore, aut morbo colliquante, præsertim euacuatione, aut crescendi opportunitate. Coloris tamen bonitas, sæpè fallax est, ut quæ sæpè sit potius index intemperiei viscerum quam humorum bonitatis.

Marcoris causa aliàs later, aliàs non; tabescunt quidam ob morbum, *τῆς ὅλης ὀσῆς*, quod ipse Gal. docet exemplo Auruginoso. *Lib. de loc. aff.* rum quibus hepar vitiosum est, cùm nil manus tactu deprehendat.

Videtur ferè ob noxia pemphingodi, febris inflatiua & scintillans vocatur, præbet enim opinionem exilientium, & manui occurrentium scintillarum.

Si in hepate *ἀτονία* foret aliis signis id pateret.

Videbatur ipsius iecoris *σιζασις* mala ut mollior & laxior, sic facultas retentrix imbecillior & quia quia humores non satis retinentur, effluunt.

Contra *ἀεξίς* oculorum, ophthalmiæ frequentes pulmonem potius calidum accusabant, sic & hepati & pulmone consulendum fuit.

Laudatur cassia cum rosacea conserua: immo conserua ista in usu, iuscula glutinosa, santalorum in aqua maceratio, mastiche, crusta panis, lac asinæ, litus iecoris ex santalino, elect. triasant. syrupus de lamio. *curatio.*

Dubitatur de lacte quia fumidum est, & caput opplet. volebant lapidem iaspidem collo appendi. Gal. iaspidis viridis meminit, nec tantum tribuendum authoritati eorum qui proprietates occultas laudant, quin ad manifestas concurratur, hæmatites lapis si fossilis reperietur, non autem factitius, probatur, non indormiat puluinari ex pluma molliori facto, non obuertat faciem igni, omnis excessus & grauitas aëris vitetur. De usu frigida quatenus utendum sit vide apud Hipp. de liquidorum usu.

ANNOTATIONES.

1. Serosior sanguis & qui in aquam citrinam resolutus est, non caret vitio: velenim ob putredinem fit talis sanguis, resolutus à putredine fibræ, vel serescit, quia crudior est nondumque coctus, vel ob potum liberaliorem, vel iecoris imbecillitatem. vniversus sanguis fit serosior, ut in hydropicis apparet, vel etiam ob imbecilliores renes, ut qui nequeant, illud attrahere, vel eorundem obstructionem, quod pertinet locus Gal. ad partic. 28. 2. prog. loquens de urinis subrubris, eas ad diuturnitatem, sed securitatem morbi ait apparere, fiunt autem cum sanguinis serum cum urina excernitur: indicat autem id exuperantiam sanguinis non exquisitè cocti & confecti, & quia est exuperantia humoris integerrimi, abest periculum, quia humidior, & serosior quàm esse debet coctione opus habet, idem docet Gal. ad hist. 2. d. Hermocr. sect. j. lib. 3. epid.

Sed obseruatione dignum quod ait Gal. primum quod suis temporibus serè expers erat seri sanguis, nunc autem & pueris, & natu maioribus in putre serum resolutus est, quod fit ut vini albi vsus sit salubrior, quia tenuitate partium & subeundi facilitate sanguinis serum seernit & expurgat: posterius, quod non detrahebatur sanguis nisi male affectis.

2. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens bonum, ait Hipp. aph. 31. lib. 3. rationem reddit Galenus in com. nam si ob aliquam dispositionem lædit mulierem retentus, si per aliam partem vacuetur, omnem tollit læsionem.

CONSILIVM C.

De Aphthis in ore & calida viscerum
intemperie.

Cum olim fecundissima foret domina des Marellis, utcumque peratatem gestare desineret, esset tamen restibilis fecunditatis, desit esse menstrua, vnde aphthæ in ore, siccitas, calor thoracis &c. hæc autem temperamento sanguineo erat.

Consultum

Consultum est, vt bis terue anno vena incideretur, eoque frequentius ex Hipp. quò fecundior fuit, natura enim solita erat multum sanguinis absumere in nutritione, & formatione foetus, nam molestior & periculosior erit ei mensum suppressio (licet naturalis) quam si sterilis fuisset, ob consuetudinem, & generandi multi sanguinis, & foras in enixu emittendi, & nisi de demenso solitoque cibo detrahatur, ægrotabit, vt ij quibus crus est mutilatum, & dysenteriae cruentæ sunt obnoxij: par enim est propemodum ratio. Solus namque sanguis temporarium sumit incrementum (ait Plin.) & citissimè generatur, si quidem hostiæ abundantio-^{Lib. de super foet.} rem fundunt sanguinem si biberint, id etiam & nutrices docēt, in quibus tam facile, & lac euanescit, & exuberat. Victus ratio ad vnguem seruanda, iuscula refrigerantia non multum nutrienda, ouis & carnibus vtendum parcius, stricta tamen victus lex non placet, vt ne defectu pabuli accendantur humores, sub finem Pastus aqua frigida, cydoniatum, frustum pomi, epithemata ad cor & hepar, vinum dilutissimum, pomaceum, pirarium, ptissana pro vino, hordeata non plena, sed cremor solius hordei, additis sem. frigidis, vinum diluatur aqua hordei.

Lotio pedum, balnea, lac asinae domi hordeo nutritæ, syrupus iuspissans sanguinem, iulep. rosat. gargarismi refrigerantes, cassia, clyst. refrig. apertio venæ malleoli.

ANNOTATIO.

1. Hipp. loco laudato sic habet. γυνή ἢ τις ἀεικλώμων ἔσται πίπτουσα κυισκομένη φλεβοτομεῖσθαι δις τὸ ἐνιαυτὸν ὅσοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν. *Mulier quæ facile concipiebat, si concipere desinat, illi bis in annum è manibus, tum cruribus vena tundenda est. Rationes sunt in contextu.*

CONSILIVM CI.

De vertigine.

Hic morbus quò maioris est momenti, eò maiori studio curaque profligandus est. Et cum multæ sint vertiginis causæ, vel indigenæ, id est à cerebro natæ, vel alienigenæ, tentanda sunt remedia communia donec peculiaris affectionis notitia maior fuerit, tunc enim in eam partem cura dirigitur, itaque in communioribus remediis erit consistendum.

Ratio victus in cibo, potu, rebus non naturalibus seruanda est, maximè vero animi pathemata moderanda sunt, quæ hîc plurimum virium habent.

Pulueres corroborantes à pastu cydoniatum.

℞. Sem. anisi, fœniculi & coriandri cond. añ. ʒ. f. sem. pæoniæ ʒ. j. confervæ rosarum siccæ ʒ. iij. diaireos ʒ. f. ossis è corde cerui, & diamarg. frigid. añ. ʒ. f. cum sacch. rosar. ʒ. iij. fiat pulvis.

Pilulæ in frequenti vsu minores, maiores.

℞. Pilul. imper. afflaiereth. añ. ʒ. ij. visci quer. vngulæ Alces & rad. pæoniæ añ. gran. vj. fiant pilulæ minores.

℞. Mass. pillul. de hiæra dupla aloë, sine quibus & aggreg. Mesuari, cocciarum añ. ʒ. j. salis gemmæ, cranij hum. sem. pæon. añ. ʒ. j. puluer. fennæ ʒ. f. cum aqua beton. infus. cinn. & ligni aloës fiat massa, de qua cap. semel hebdomada.

℞. Confervæ rosar. ʒ. f. bugloss. borrag. melissæ, tunicis altilis, calendulæ, florum pæoniæ añ. ʒ. j. f. corticis citrij ʒ. j. sem. pæon. ʒ. f. cranij hum. mithrid. añ. ʒ. j. cum pauco pul. diamarg. frig. fiat opiata ad vsum. Pærmica, aut vitanda, aut moderatè vtenda, ptyalismus utilis est, cucurbitulæ, clysteres, lotiones pedum tempore conuenienti. Phlebotomia, vere, & autumno, aliquando è maleolo. Non vtendum vino, nisi præsumpto cibo, aut præhausto iusculo.

Non dormiendum statim à cibo. Nimia actio cerebri, & vigilie obsunt. Mutationes aëris fugiendæ.

CONSILIVM CII.

Ad impediendum abortum, pro filia D. de Monglat.

Ratio victus est præscripta, nec est quod gravida perpetuo se se cõtineat in lecto metu maioris mali nisi, forte ad octauum mensem, aut principium noni.

Applicabitur emplastrum ex vnguento comitissæ, tragacanth. mastich. cera & bolo armena.

Conserua rosarum liquida valet, & bolo & potu sumpta.

Quoniam p̃q̃r quendam patitur, is omnino prohibendus non est, sed vtendum infuso rhei cum santalo citrino, aut aqua rhabarb. sola, vel tabellis rhei ex elect. triasant, aut pilulis ex eodem rheo concinnatis.

Conuenient tabellæ cum coralliis rasur. ebor. corn. ceru. succino, rosa, lapide hæmatite, cum saccharo in aqua ros. soluto, vtendum, & pul. ex foeniculo dulei, coriandro, rosa, corallio, mica panis tosti puluerata, cum saccharo rosato, aut pane biscocto.

Phlebotomia confert. scutum ad regionem ventriculi ex lapide aquilæ, absinthio, rosa, cypero, nuce moschata, caryoph. cum tantillo croci, vel madeant flores bugloss. in vino. clysteres (qui per se in grauidis reformidantur) ratione torminum subiiciuntur anodyn. subodoretur gratos odores, ingratos refugiat.

CONSILIVM CIII.

Ad fluorem muliebrem.

ANte omnia, moderata vitæ lex vtilissima & pernecessaria est, tantique momenti, vt ea sola tam molesti morbi vindex

Kk ij

& liberatrix esse possit, alioqui licet salus ipsa ægram seruare cupiat, ea non possit.

Detractio sanguinis frequens utilis, clysmatum vsus, & tabellarum triasantali triplo rheo, aut sumitur ex ouo sorbili puluis paratus ex osse sapiæ, diatrag. frig. pane tosto, & siccato elect. diair. anthera, rasura eboris multa, cornu ceruino, coralliis.

Decoctum sudorificum ex scyna & sarcaparilla.

Suffitus per infundibulum decocti. rad. symph. enul. camp. rofar. rad. pentaphylli, sem. lini, pæoniæ, cyperi, calam. arom. flor. cham. arthemisiæ.

Vfus aquarum Niuernensium potu, deinde plombarium balneo, post sequentis syrapi vsum.

Syrupus.

24. Rad. enul. camp. symph. vtriusque sanamondæ seu caryophyll. pentaph. dictamni añ. 3 vj. cichorij totius, hepat. eupat. frag. buglæ, saniculæ, primulæ veris, veronicæ, scabiosæ, melissæ añ. m. j. feminis cardui 3 ij. rofar. prouinc. & transmarin. añ. m. j. halicacabi fructus x. fiat decoctio in qua leuiter bull. fol. orient. 3 iiij. succi pomorum & buglossi. añ. 3 ij. colaturæ ʒ j. adde infus. 3 j. rhei infusi in parte decocti. cum ligno rhodio, sant. citr. & cinnam. sacchar. q. s. fiet syrupus mediocriter coctus, exhib. cum aqua buglossi. & bipinellæ ad 3 ij.

Agaricus quidem confert, sed quia mulier fluori sanguinis immodico obnoxia est, eo abstinendum fuit.

CONSILIVM CIV.

*Ad molestos herpes & serpiginem, cum sur-
fure & squammis.*

Serpigini, psoræ, scabiei, & cæt. à bile vsta, aut succo melancholico pituitaue salsa cutis vitiis, aqua salsa, sulphur, lithargyrus, testæ oui in aceto maceratæ donec mollescant consumanturque, conferunt. An ea lex est contrariorum vt contrariis elidantur & oppugnentur, an non potius *ὁμοειδὲς* conueniunt, vt acribus mitigantia aptentur? Temperantia conueniunt per se & mixta de-

tergentibus & acriusculis, & nocent aliquando. Id bellissimè explicauit Gal. acria, ait, medentur mordacibus humoribus, quia educunt succum mordacem abluendo, & abstergendo non statim sanant, sed exasperant potius, sanitatem enim efficiunt ratione euacuationis, non ratione τῆς ὀνιχράσεως: immò contemperantia aliquando maiorem mordicationem efficiunt ex accidente, vt si corrumpuntur, & vnà alunt fouentque cacochymiam: si humoribus acris sunt superiora iuuant, si humorum maiores sunt vires, lædunt: immò alitur foueturque cacochymia & acrimonia. Quo fit vt medici ea misceant temperentque, ideo vt valetudini Nob. viri consulatur, hæc ex vsu erunt remedia. Victus ratio refriger. & humectans in primis conueniet, vtatur ptissana loco vini, aut pomatio limpidissimo & probè defœcato. vsus cassiæ in potu vel bolo, aut dissol. in iusculis vitellinæ carnis, in quibus folia senæ certa quantitate macerata prius fuerint. balneum ni vires dehortentur conferet. Item lac asinæ, & abluere partes impetiginosas eodem lacte. hordeata clariuscula, & syrupus violatus recens, cum syrupo de lupulo cum aqua cichorij & passularum.

Cap. 12. l. 2.
de si. pl.
med. facult.

Victus ratio.

Purgatio.

1.

Fouendæ sunt partes sero lactis, in quo coquatur hordeum, furfur, scabiosa, anagallis, morsus gallinæ, rad. bismal. fol. helxines, vel ex sacculo, aut potius spongiâ.

Fissuræ linantur vng. aureo, addito vitello oui, mucore sem. cydon. extract. in aqua rosar. aut desiccet. rubro ob metallica. mica panis macerata in decoct. auenæ valet ad lauandum; si malum rebellat aqua aluminosa (inflamm. mitigata) aut argenti viui. sulphur cum axungia: enulatum cum mercurio pauco, citrij succo, addito vng. ros. Mesuæi, aut pomata sequens.

Fotus.

Litus.

24. Frustum laridi falsi, in talleolas incidatur, eas per nonem dies in aqua frigida tempera, quotidie mutando, quibus exactis in aqua plantag. & ros. denuò macera. & vas cineribus calidis impone vt liquentur & tabescant talleolæ, additis deinde ʒ ij. succi limonum, niue candidiorem pomatam efficies, maculis faciei, & surfuribus extergendis maximè idoneam: quidam præscripsit quod sequitur.

24. Axung. suillæ ʒ j. infunde & laua in aceto ex vino albo & in eodem coque, adde sulphuris & mercurij añ. ʒ ij. f. vng. ad vsum.

ANNOTATIO.

1. Notat Plin. cap. 12. lib. 28. Poppæam Neronis uxorem ad faciei nitorem asinino lacte uti solere. Item Dion Niceus in vita Neronis narrat Sabinam quingentas asinas habere, quæ proximè peperissent. hæc quotidie mulgebantur, ut ipsa earum lacte lauaretur, formam enim & nitorem corporis magno studio curabat.

CONSILIVM CV.

Ad tumorem genæ lupiam minitantem.

Institutum medicamentum cum decoct. primulæ veris, beton. lupul. scabios. rad. dictam. torment. helenij, florum stæch. genistæ, anthos, incocta fenna agar. infus. syrup. de stæch. additus & diaphœnicum.

Si respuat medicamentum præscriptum, uti poterit sequentibus pilulis.

℞. Mass. pilul. sine quibus 3 iij. imp. 3 iij. rhei electi 3 j. mass. pilul. de agar. & cocciarum añ. 3 j. f. cum syrupo de stæch. & 3 j. visci. quer. fiat massa de qua cap. 3 iij. pro dosi semel, aut bis mense.

Interea teneatur in ore & manducetur hoc masticatorium, ad pituitam è toto cerebri corpore, maximè ex eius ventriculis per infundibulum in os & palatum attrahendam.

℞. Pul. nucis moschatæ gran. x. mastich. olib. añ. 3 j. staphid. agriæ & rad. gentianæ añ. 3 j. f. circos gran. x. sacch. candi. 3 j. f. cum gummi tragacanth. temperato in aqua beton. fiat massa de qua fiant formulæ ore tenendæ & versandæ.

℞. Ligni sancti 3 j. macer. in aqua tepida per horas decem. incoque post agrim. m. f. hyssopi, parum glycyrr. 3 ij. ex hac aqua accip. 3 j. f. in qua incoque mellis Narbonens. 3 j. f. despumetur & cum aceto ad gustum fiat oxymeli aromatiz. cinnam. pro gargarismo & collutione oris.

Fotus instituti ex remoll. & digerentibus, addita radice bryon. parua quantitate & scabiosa multa.

Litus ex chamæm. axungiiis lautis in vino, aut decoct. chamæm. mucoribus pariter extractis, addito aceto sub finem & paucogumm. ammon. cataplas. ex farinis orobi, erui, lupinorum coctis in oxymelite.

Sudorificum non erit inutile, emplast. de Vigo cum mercur. diachyl. ireato empl. de meliloto, vel cum empl. de cerusa cum mercurio.

Rebellante malo pilulæ ex hydrarg. conuenient & syrupus paratus ex rad. symph. torment. sanam. person. heib. pipinell. meliss. vtraque veronica succisa, eupatorio. iua arthr. sem. card. acetos. passul. corinth incoque ʒ iij fol. orient. agar. ʒ j. dissol. express. ʒ j. rhei in aqua vlmari. inf. cum cinn. & caryophyllis aliquot, add. ʒ iij. succi pomorum de carpend. ʒ iij. syrup. ros. pallid. sacch. ad sufficientiam cap. ʒ j. s. pro dosi cum aqua buglossi, syrupi prædicta simpl. coqu. in aqua fluuiali in qua macer. per horas xij. sarcapar. ʒ ij.

Huius syrupi loco poterit vsui esse sequens opiata ad ʒ j. exhibenda 8. quoque die.

℞ Pul. sarcap. ʒ x. pul. fol. senn. ʒ ij. rhei ʒ iij. pul. trium tabell. diacarth. ʒ j. cōfer. melissæ ʒ vj. conf. hamech. ʒ j. cum mellis desp. quart. iij. fiat opiata. Conueniens victus ratio præscripta, ad vnguem seruanda est.

CONSILIVM CVI.

De intemperie omnium viscerum calida ad elephantiasim accedente.

Monachus quidam intemperie calida viscerum omnium, quanta maxima dici potest laborat, vt elephantias eos metus sit à cibo (licet in vsu vini moderatus) oculorum & faciei ardor & quasi deflagratio.

Consultum est vt cassia vteretur & in bolo, & dissoluta cum fero lactis, aut decocto hordei, vel decocto foliorum fennæ in decocto vitulinæ carnis cum herbis refrigerantibus & sem. frigidis.

264 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Phlebotomia semel mense & ex brachio dextro & sinistro, feri lactis vsus & nenupharini syripi, hordeata: lotio pedum. balnea temperata, postea corniculorum applicatio: litus ex hydrargyro pauco cum vnguen. rosato Mesuci ad lumbos, & plantas pedum. Litus ex populeone aliquando ad lumbos cum trochiscis de camphora, epithemata ad cor & hepar, vel ex oxycrato & aqua rosar. & plantag. poma, pruna. circumcidatur vinum omnino metu incrementi ipsius intemperiei, quæ elephantem dirum minetur, vel vtatur diluto ex aqua hordei præsumpto cibo multo, & aqua præbibita, vel mica panis in vino sic diluto maceretur, vt animam vini hauriat.

1. De Zytho dubitatur, quia crassum generat succum, acrimoniam habet per hordei putrefactionem, vt nisi lupulus adderetur, vix statim ab acore vindicaretur: immò aiunt quidam medicinæ proceres hordeum putrefactum lolij vires æmulari. Lolium autem quàm officiat, nemo dubitat, imò & lolium & zythū grauat caput & inebriat, ideò dubitatur, an huic ægro conueniat ad dirum elephantem procliui, nisi forte zythum aquatum & minus, præferunt pomaceum lymphidum defœcatum nec acidum, nec prædulce.

Neque vero abs re de pomaceo & piraceo quærentur dotes & conditiones. Nam Hipp. ait vina tenuia dulcia vrinam mouere, & aluum humectare, corpus & sanguinem debilem facere, aduersariumque in corpore sanguinem augere.

2. de dieta.

Nunquid hæ qualitates dulce, tenue, facile incidunt in pomaceum, & piraceum? si id fit, non possunt non infensa esse corpori, præfertim eas qualitates adepta, de iis videbit prudens medicus.

Item ad eundem ægrum pilulæ ex hydrargyro præscriptæ sunt cum temperantibus paratæ.

Sed absuit parum, quin castratio imperaretur, quod citrà hanc corrigi non posse videretur tanta phlogosis, hæctica ferè adeò prouecta erat.

ANNOTATIO.

1. *Quanquam bona habitudo, corporis & roboris firmitas, suauitas coloris, eorum qui versus septentrionem cereuisia vtuntur; satis ipsi cereuisie videantur patrocinari, tamen eius utilitates vna maceratione putredinis matre & corruptionis obscurantur & abolentur, cum, sicut in aceto fieri solet, quod acidum est parte serosa & liquida; superstitie*

superfite paucō calore nativo, at parie terrestri acriusculum, ob caloris putredinalis impressionem, calor natiuus hordei penè exulet & succedat putredinalis, hinc elephas, hinc carinaria, hinc impetigo. Lolij enim naturam hordeum maceratione, putrilagine, & fermentatione acquirit at lolium vi malefica insigne. Zithum autem damnat Dioscorides, damnat Gal. damnant & hi versus ab Eobano scitè scripti.

Qui docuit crasso Cererem confundere succo.

Hinc iratus erat, Bacchus & ipsa Ceres

Nam pelusiaci qui laudat pocula Zithi

Illi nec cerebrum nec caput esse puto

Renibus, & nervis cerebroque hic noxiis humor

Sapè etiam lepræ semina fœda iacit.

CONSILIVM CVII.

De hydrope.

TVMOR ventris erat insignis & scroti vt facile fit confluxus & transfluxus. his remedijs vti oportuit adacto scalpello ipsi scrotō, ad educendas aquas & ichorem & flatum.

Victus ratio præscripta exsiccans, vtatur assis potius quam elixis carnibus, illæ solidiorem carnem efficiunt, potus sit vinum album, cum decocto eryngij & scynæ, pulvis digestiuus cum aniso, fœniculo, coriandro, diarrh. abbat. decoctum filicis maris cum passulis corinthiacis.

Vfus clysteris semel hebdomada, sequenti die purgatio ex senna, manna, syrupo rosarum cum agarico addita particula elect. de citro, de succo rosarum, aut diacarth. ex decocto rad. enul. eryng. brusci &c. granor. halicacabi, cicer. rubrorum; vel parabitur syrupus cum folliculis, agar; puluere sennæ, cassia, addito diaprūno solut. & trochiscis halicacabi. Manè cum non purgabitur, vtetur decocto brusci, eryngij, campanæ, addita scyna, vel per se, vel cum vino post sumptam tabellam trias, cum martis croco.

Dilutum rhei cum aqua prassij ordinatum, vel accipitur ʒj s. rad. ebuli, vinum album & aqua hordei, & fit bis expressio ad

LI

Veternosi pro hydropticis sumuntur apud terentium veterinosus autem dicitur vetere morbo detentus & affectus cuius generis est vetus hydrops.

Purgatio.

Potus.

266 CONSILIORVM MEDICINALIVM

vsus: vsus ialap, aur mechoacan, ligni nephritici, sassafras eryng.
& lithospermi.

Tabella.

℞. Cort. citrij cond. 3 j. sras. ebor. corn. cerui, frag. lapidum pre-
tios. añ. 3 j. rad. sassa. & scynæ. añ. 3 iij. croci martis parum, kermes
3 s. diamarg. frig. & rosar. añ. 3 ij. fœniculi florent. parum, cum sac-
charo in aqua vngul. caball. solut. fiant tabella vel triplo saccharo
conditum ad vsus, loco tabellarum triasantal.

℞. Rad. scynæ & farcap. añ. 3 ij. macer. in ℥. vj. aquæ per horas
8. dein fiat consumptio tertiæ partis & aromatiz. cinnamomo.

Fotus.

Fotus matutinus ex rad. camp. alth. scyllæ chamæm. pariet. be-
ton. stœchade, absinth. addito cypero & scœnæ anth. coctis in aqua
& vino albo, addito aceto.

Litus.

Litus ex Chalcitidis vel emplast. de baccis lauri, vel.

℞. Mucor. sem. leni extracti in decoct. fotus super. ℥. s. sigilli bea-
tæ mariæ crudæ 3 iij. butyr. recent. lauri in vino albo & aceto 3
viij. puluer. dauci, cumini, ireos, añ. 3 s. fiat litus.

Cataplasma.

Cataplasma fiat ex farina hord. fabar. orobi, cum mica panis se-
calini, adde parum terebinth. & olei chamæm. efficacius erit quod
sequitur, paratum ex farinis lini fabar. orobi, lupin. coct. in oxyme-
lite addit. rad. bryoniæ crudæ, dialtheas, terebinthina, puluis ireos,
& hæ farina aliàs coquuntur in oxymelite parato cum chamæ-
pity. beton. veron. scab. ad 3 j. s. sigill. bea. Mariæ crudi pul. cha-
mæm. 3 j. s. ireos 3 j. terebinth. addi potest magno profectu, fiat ca-
taplasma aliquando cum vino, aliàs cum sapa. Puluis datus ex sac-
charo cando, nucleis mespilorum, & milio solis, probatur solda-
nella ad 3 j. cum vino albo cæteris nil proficientibus.

*Aque natu-
rales.*

Novo vere si supersit adeat aquas plumbares vel Niuernenses,
& ut aliis facile fluat utatur syrupo passularum purgante se-
quenti.

*Syrupus pass.
purgans.*

℞. Fol. senn. 3 ij coqu. in decocto pector. in colaturæ suffic. quant.
coque passul. 3 iij. & cum sacchar. fiat in formam opiata liquidæ
capiantur passulæ aliquæ cum prædicto syrupo.

CONSILIVM CVIII.

De fluoribus albis & aliis affectibus.

Nobilis domina cacochema labem contraxit in vtero & vitium siue ex marito impuro, siue labe interna: illa cum abhorreat medicamenta, consulimus vt in ouo rhabarbari puluis includatur sumendus, antè decoctum rad. eryng. trifolij, cum passulis corinrh. & damascenis, vtatur syrupo de pomis, & de cerasis.

Fluores albi non sunt negligendi, siue à toto corpore siue ab interno vtero fluant, vtumque non negligendum.

Decoctum interioris guaiaci & scynæ plurimum conferet, sit gratum, vtatur manè & ante coenam.

Cum occasio aduenerit, valeb. t. decoct. rad. consolidæ, sanamundæ, fragariæ, yvæ arthriticæ, trifolij, taraxaci, veronicæ, roris folis, pilosellæ minoris (quæ pes cati dicitur) florum tunicis, coronariæ hortensis, prunellæ, pimpinellæ, buglæ, faniculæ, siue herbæ roberti.

Diamarg. frig. aromat. rosat. diatrag. frig. ex interualli exhibeb. item id quod sequitur.

24. Corticis citrij cond. 3 j. ras. ebor. cornu cerui fragment. lapidum pretios. añ. 9 j. rad. saffrafras & scynæ añ. 9 iij. croci martis 3 f. Tabellæ.
kermes 3 f. diamarg. frig. & rosati añ. 9 ij. foeniculi florent. parum, fiant tabellæ.

Pro matrice balani ex rosis rad. ireos, florentiæ, zibetho, ambra, Balani.
betonica, dictamnò & c.

Si partes inferiores paulo sint calidiores post purgationem, pessuli ex aqua rosarum granis duobus zibethi, mucore psyllij extracto in aqua rosarum conuenienti.

Semicupium aut balneum cum herbis conuenientibus conueniet, lignum nephriticum utile.

Cylindri ex ligno aloës diamarg. frig. arom. ros. diambra; humor qui ab vtero fluit non statim reprimendus, aut suppressendus si fieri possit ipsa ægra habitior reddatur, iusculis cum carne vitu-

268 CONSILIORVM MEDICINALIVM

lina, volatilibus, cum farina panis albi, vitello oui, saccharo, instar panatellæ.

fructio.

Diaspermaton Fernelij valebit, item aquarum naturalium vsus, Mentionem fecimus decocti sudores prouocantis accip. ℞. vj. in quib. macer. sarcapar. & scynæ puluer. hor. x. dein fiat, ebull. & consumptio tertiæ partis, aromatiz. cinnamomo addatur parum pulueris sassafra, fiat iniectio in matricem cum syringua ordinaria, vel

*Puluis albus
fit ex vitriolo
albo infuso,
et liquefacto
ad 3. l. f.*

℥. Agrimo. hord. añ. m. j. post temperationem bull. in aqua in ℥. ij. dissol. 3 j. f. pulueris albi, fiat iniectio in matricem ter aut quater in die.

CONSILIVM CIX.

De doloribus capitis, & ad hepar & ventrem.

Mulier annos nata 40. iam dudum de doloribus capitis, & ad hepar & ventrem conqueritur, multa horum compescendorum gratia vsurpata fuere à multis remedia, sed frustra querit à nobis vt malum doloremque leniamus.

Purgatio.

Consuluimus vsum mannae calabrini cum iure prunorum & passul. aut cum iusculo parato ex carnibus.

*Iusculum
purgans.*

Apozemata parentur ex decoct. rad. fragar. cichorij, eryng. tataraci. Aristol. tamaricis herb. veron. potentillæ, bipinellæ, milij solis, cuscute chamæd. chamæp. acetos, trifol. quinqufol. cum syrupo de limonibus capill. veneris, aut de pomis, vel

℥. Polyp. quer. glycy. añ. 3 vj. agrim. ceterach. añ. p. ij. cremoris tartari albi 3 ij. coque in aqua melissæ, dissolue syrup. rosar. pallid. cum agar. 3 j. f.

Aperiatur basilica sequenti die.

℥. Rad. petros. fcenicul. gram. añ. 3 j. ras. ebor. cornu cerui añ. 3 iij. rad. cich. sectæ in partes 3 f. sem. melonum. 3 j. include ventre pulli consuto, dein elixetur cum carne vituli, sub finem adde fol. agrim. meliss. ceterach. añ. p. ij. in iuscul. colati 3 vj. dissol. cremorem tartari albi ad 3 j. succi pomorum 3 j. adde succum limonum cap. per decem dies manè.

℞. Fol. fenn. 3 iij. irrigentur succo limonum, infunde per horas 12. in vino albo, admisceatur iusculo, alternis diebus.

℞. Croci martis 3 ij. pul. diambrae aromat. rosar. añ. 3 j. f. pul. cort. citrij & aurantiorum añ. 3 ii. cinnam. 3 i. f. macis 3 i. cremoris tartari crystallini 3 ii. f. fiat vt alkool. excipe syrupo parato ex vino maluatico & sacch. cap. 3 i. mane superbibendo parum vini albi, aut iusculi cum aqua borrag. deambulando manè.

Deglutiat pilulas stomachicas cum gummis ad 3 f. vel cap. pilulas præscriptas cum croco per 20. dies.

℞. Confect. alkermes 3 i. magist. perlar. & coralli añ. 3 f. corticis aurantiorum, & citrij conditi sicci añ. 3 iij. cinnam. 3 i. fant. citr. 3 Tab l'x. ii. sacch. q. f. cum mucore sem. cydon. extracto in aquæ nastæ, fiant tabellæ pondere 3 ii. capiat vnam in ingressu lecti.

Pulvis digestiuus valet, & scutum circa orificium ventriculi applicatum.

Vtatur aquis, aut spadensibus, aut forgensibus: spadenses sunt meliores habent vitriolum admixtum ferro.

Nastæ herba est, paulo calidior, ex qua detrahatur calidiuscula.

CONSILIVM CX.

Ad luem veneream incipientem.

IN nobili viro multa luis venereæ indicia apparent, vt euaderet tutus hæc remedia sunt instituta, quæ dum vsurpabuntur hanc seruabit victus legem. V. eius ratio.

Abstineat ab esu fructuum & eorum omnium quæ cruditatem generant.

Aluus molliatur 3. quoque die clysmatis conuenientibus; cibis vtatur potius assis quam elixis, pane vtatur biscocto & pro bellariis vuis damascenis, aut corinthiacis, aut prunis turonen-sibus.

Purgetur æger, sectâ prius basilicâ dextrâ & dein malleoli. Venæ sectio.

℞. Sarcæpar. 3 ii. f. rad. scynæ 3 i. medullæ Guaiaci 3 ii. rempe- rentur in 12 x. aquæ puriss. per hor. xvi. bull. leuiter ad consu- m- sutorificum. prionem tertiæ partis additis ad gratiam glycyrr. & cinnamomi tantillo in suo magmate diu satis quiescant, antequam in phialis.

Ll iij

270 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ponatur, cap. 3 vi. mane & tantumdem vespertinis horis, dein connectus fuder.

Dum bulliet hoc decoctum accipiat spuma eius in summa vasis parte apparens imponatur vasculo & ea parte vlcera lauentur cum decoctum erit colatum super magma ponantur ꝑ x. aquæ pro secundo decocto quod in pastu sumet.

Vnguento vtatur super partem vlceratam dum sudabit, vel de morbo, vel sequenti.

ꝑ. Vng. apost. 3 vi. vng. de morbo, 3 i. misce & pone in parua pi-xyde terrea & imponatur hoc vnguentum linteo, vt vlcera cooperiantur & supra imponatur vng. de mercurio simplici, parabitur massa pilularum addito mercurio bene parato & sæpe per lin-teum transcolato, deinde melle, aut butyro recenti extincto mas-sæ pilularum, postea addatur, vt sæpe tres pilulas paruas accipiat, secundo quoque die, cum decocto sudorifico, in tribus pilulis po-nantur tantum grana nouem mercurii.

ANNOTATIO.

1. *Luis venereæ alexiterium est hydrargyrus, hanc hydram solus vincit & opprimt. Quod tamen quibusdam recentioribus non placet, qui tutum huius vsum esse non putant. Nam, aiunt, non opprimere venenum, sed diffiatu prohibet. verum usu hydrargyri proliciuntur sudores, tenuitasque eius id facit attenuata materia sibi quaquauer-sum exitum querente. Nec obstat quod quidam asserunt frigidum esse quoad partes extimas, sed in imo calorem summum habet & tenuitatem paruum, quo vtroque tantam habet energiam; quod autem semini corrupto bellum indicat tanquam alexipharmacum, hanc reddunt rationem nonnulli, asseruntque id fieri, quod magna sit analogia inter semen, & hydrargyram omnium metallorum velut semen quoddam. Et quatenus semen eius author corruptum quid est, eatenus quadam antipathia argentum vivum illud persequitur.*

CONSILIVM CXI.

De vermibus.

NE quid deterius contingat his remediis occurri debet puel-
la suis torminibus à vermibus diuexata.

℞. Decoctoinis rad. eryng. cichorii. asparag. herbar. acetos. adianth.
cichorii, bipinellæ ꝑ i. in qua infunde rhei minutim incisi ʒ i. f.
cinnamomi ʒ i. cap. de colatura ʒ iii. manè, & tantumdem ante *Purgatio.*
coenam.

Iniiciantur clysteres ex lacte, vitello oui, saccharo, melle viola- *Enemata.*
to, dulcia per inferiora, acida, aut paulum amara per superiora iu-
uant, assis vtatur potius quam elixis.

A dulcibus & lacte & cruditate generantibus abstineat, cibi
condiantur, omphacio, caryophyllis nuce moschata, succo citrii,
aut aurantiorum, item caro citrii inter pastus.

Cortice vtatur citrii liquidioris confecti, & tabellis ante pastus
diamarg. frig. diari h. abb. addito puluere lumbr. præparatorum. *Litus.*

Vmbilicus fricetur vngaturque oleo amygdal. amar. succo
rutæ, absinth. mali aurei, felle ouillo addita cera alba, aut tincta.
aliquando accipientur folia bipinellæ, talleolæ citrii, vt fiat aqua
addatur rasura eboris, corallina, cornu ceruinum ad vsum fre-
quentem, addatur sacchari parum: mala aurea sunt gratissima,
vel

℞. Aquæ morsus ʒ vi. pul. Corallinæ parum syrup. de limon. ʒ i.
bis cap. in die.

Triasantalum cum rheo duplo, aut triplo valet item pomum
cum tantillo croci. *Tabella.*

Coriandrum conditum cum vino vtile; item decoct. eryngii
addito coriandro & cinnamomo, vel

℞. Ligni nephritici ʒ i. maceretur in aquæ coctæ ʒ viii. extra
ignem posita.

Relante malo concinnabuntur pilulæ parvæ ex hy. lrag. dul-
cific. gran. viii. & scam. præparati, gran. 6 cum syrupo de limoni-
bus, aut horum puluis miscebitur cum pomo cocto. *r.*

ANNOTATIO.

1. *Matthiolus cap. 70. lib. 5. argentum viuum commendat; quod dragmæ vnius pondere exhibet, quod licet in casibus desperatis contulisse, atque aliquando vtile fuisse dicat: tamen vbi necessitas non vrget, & alius mitioribus medicamentis res peragi potest, hoc præsidio non est utendum, cum prauam corpori diathesim imprimere, contraque stuporem & paralytim inducere possit. Sed multo tutius alij, si quid grauitè vrget dulcificatum mercurium exhibent, ex quo cum aloë acræo sicco & cinnamomo pilulas formant, lumbricis enecandis apprimè viles.*

CONSILIVM CXII.

De Arthritide.

Vir egregius circa Februarium laborauit vniuerso corpore & singulis membris, quidam putabant esse rheumatismum, cum tamen esset arthritis, ille bis, aut ter in vitaprehendit; hæc relabatur, & sæpè reuirescit, quia est diathesis partibus impressa. Nos iudicium nostrum afferimus, non vt curemus omninò morbum, sed frequentem relapsum vitemus illi ferè sexies sanguinem misimus, hic impurus erat, putamus hepatis maximè habendam esse rationem. Bis anno, vere & autumnò, mittendus sanguis, aut paulò frequentius. Parandus syrupus magistralis ex rad. pentaphylli, sana munda, cichor. person. fol. eupat. pilosellæ, lich. nis yux arthr. asplen. saluæ vitæ, capill. ven. sem. bardanæ melon. flor. genist. gram. halicac. pass. corinth. ficubus incoctis fol. fennæ cum sem. fœn. flor. addita suff. quant. sacch. post colat. & express. 3 i. f. rhei ad partem cum cinnam. & ligno aloes infusi.

Syrupus magistralis.

Utatur aliquando blando potu ex decocto sarcap. & scynæ, aliquando manè ad proliciendos sudores blandos, aliquanto initio pausus.

Gauia medicamenta obsunt, prouidendum vt mitior sit morbu, non validis medicamentis excutere sit studium, quia inutile foret, nam genitium.

Conueniet

Conueniet blandum decoctum addita 3 i. f. rhei & tantillo cin-
nam. de quo capiat 3 iiii. aut 3 vi. lac asinae, aut serum lactis, quod
parari potest calore ignis, additis ouorum albuminibus.

Blandi forus, cum dolor reperit, & litus conferent, & sudorifica *Fetus*
blanda in lecto, ad eliciendum virus.

Manna calabrino vtetur ex interuallis, ex decocto carniū vi-
tulinarum: item conseruā ex floribus caryophyllorum nostro-
rum: pro potu parabitur decoctum ex 3 i. ligni nephritici in 3 viii.
aquae macerat. extrā ignem. Aut ex magno cyatho aquae, octaua *Potus diuinus*
parte vini tribus talleolis citrii cum cortice sant. citr. & saccharo *vulgo dictus*
grata concinnabitur potio. cataplasma valet ex farina hordei, fa- *gratus, gratior*
barum, orobi, lini cum mica panis secalini, terebinth. tantillo & *ad dno vino*
oleo chamamelino. *& tantillo*
trino.

Horā somni sēpē conciliandus somnus, hordeatis cum decocto
pull.

Ante pastus sumat tabellam, vel elect. diamarg. frig. vel aroma-
ticirosati, in fine pastus puluerem conuenientem ad roborandas
partes.

In vehementi dolore cerotum ex psyllio conferet.

24. Mucor. sem. psyll. lini cydon. conquass. 16 f. vitellos ouorum *Litus.*
duorum, amyli 3 ii. caphurae parum, fiat linimentum; Si diamarg.
& aromat. rosat. tabellas respuat, harum loco conueniet opiata se-
quens.

24. Cortic. citrii conditi 3 ii. ras. ebor. cornu cerui frag. lapidum *Tabellæ.*
pretios. añ. 3 i. saffrafras scinae añ. 3 i. f. granor. xermes. 3 f. diamarg.
frig. 3 ii. scenicul. florent. & triasant. añ. 3 f. cum sacch. in aqua bu-
gloss. soluto fiant tabellæ, quibus à pastu, & ante pastus vtetur.

Si malum rebelle, pyrotica conferent.

CONSILIVM CXIII.

De calculosa affectione.

IVuenis quidam annos natus 25. specie quadam calculosa affe-
ctionis laborat, & circa renum regionem dolorem grauem saepe
persentiscit, hinc quæ sequuntur remedia sunt instituta, clysteres

M m

274 CONSILIORVM MEDICINALIVM

ex remoll. ciceribus rubris capill. chamam. coct. in sero lactis
diffol. cath. bened. laxat. terebinth. oleum liliorum.

Purgatio.

Manna, cassia, conueniet ex decoct. Galli veteris, sem. bardanæ,
melonum, milij solis, saxifragæ & bipinellæ, cicerum rubrorum:
dein vtetur bolis sequentibus.

Bolis.

℥. Terebinth. lauræ in aqua. pariet. ℥ f. rhei ʒ j. lapidis iudaici ʒ f.
cum diatrag frig. fiant Boli.

Puluis.

Data tabellæ diatrag. frig. bechicæ, diaireos.
Puluis institutus ex milio solis, puluere burgæ spinæ, lapide iu-
daico, elect. ducis cum aqua terebinthinæ.

Datus succus amygdal. dulc. cum aqua stillat. terebinthinæ, item
cum succo mali aurei, & vino albo.

℥. 4. sem. frig. maior. añ. ʒ f. asparag. lithosper. añ. ʒ ij. puluer. la-
pidum cancrorum, & lap. iudaici añ. ʒ f. pulueris burgæ spinæ &
sem. bardanæ añ. ʒ f. syrupi de raphano parum, dianthos ʒ j. fiat
puluis vtendus cum iulep. sequenti.

℥. Syrupi de althæa & limonum añ. ʒ j. syrupi de raphano ʒ f.
aquæ decoct. fabarum. ʒ iiij. fiat iulep.

Syrupus magistralis tandem concinnabitur, de quo capiat circā
vltimas lunæ quadras, superbibendo decoct. galli veteris, milij so-
lis, saxifragæ, & cicerum rubrorum.

Syrupus.

℥. Rad. eryng. petros. asparag. cichor. frag. añ. ʒ f. capillar. om-
nium, bipinell. saxifrag. arestæ bouis, violar. bisfal. añ. m. j. borag.
bugloss. end. & summitatum lupuli, seseleos añ. ʒ j. ficuum, passul.
mundat. iuiub. sebeth. añ. ʒ j. grana halicacabi x. folior. orienta. ʒ ij.
agar. nodulo inclusi ʒ j. fiat decoctio in colat. ʒ j. dissolue sacchari
q. f. coqu. in syrupi consistentiam addendo extra ignem ʒ f. rhei
electi, in parte decoct. præd. infus. cum tantillo cinnam. & ligni
aloes fiat syrupus.

Iuscula frequentia cum decocto carnis vitulinæ hordei. add.
succum citrij.

Litus.

Litus ad regionem renum ex temperatis.

Cœlo clementiore, semicupium incoctis fol. vitis malux, bis-
mal. & violariæ rad. alth. flor. nymph. capitibus aliquot papauer. albi
sæuiente dolore.

Emuls.

℥. Medull. sem. melon. recent. ʒ j. amygd. dulc. ʒ vj. sem. lact. &
papau. alb. añ. ʒ f. grana alkekengi 4. tere dilig. in mortario affund.
ʒ j. f. decoct. rad. althææ, glycyrr. hordei & florum nymph. fia'
Emulsio in qua dissol. gummi Arabici in aqua nenupharis lique-

facti 3 ij. cap. magnum haustum post moram quadrantis horæ in semicupio. capiat item hora somni.

CONSILIVM CXIV.

De Cachexia, Ictero, & aliis affectibus.

Nobilis mulier cachectica erat, macra, ictERICA, nauseabunda, colicis doloribus obnoxia, intra hæc breuia capita constitimus.

Vsus sit aquæ rhei cum decocto splenico hepatico additis lichene chamæp. & santalis.

Syrupus magist. cum passulis, flor. tunicis altilis, taraxaco, rubia tinctorum, hepatica, ciceribus rub. gran. kermes, eupat. cassutha, cortice tamaricis, capparum, rad. sanamundæ, tormentillæ, scabiosa, bellide additis fol. fennæ, & rheo. succo citrij, pomorum, bugloss. ceras. & saccharo, vsus ad 3 j. cum aqua. bugloss. oxytriphylli. conuenient tabellæ cum simplice rheo, & croco martis vel sequentes.

24. Cortic. citrij. cond. 3 i. s. ras. ebor. cornu cerui, fragment. lapi. dum pretios. añ. 3 i. rad. saffrafras & scynæ añ. 3 i. croci martis 3 vi. gran. kermes 3 s. puluer. lumbr. terræ præparat. 3 i. diamarg. f. ig. & rosati añ. 3 ii. fœnic. florent. tantillum, cum saccharo in aqua rosar. & bugloss. soluto, fiant tabellæ pond. 3 ii. valebit conserua ex flor. tunicis altilis, bugloss. & borrag.

Vtatur iusculo cum pullo & harmo vitulino cum hordeo & passulis.

Syrupus pomorum. iulep. rosat. de cichorio simplex & byzantinus erit ex vsu.

Phlebotomia aliquando parcâ manu.

Balnea aquæ dulcis, sed diu in iis non est immorandum.

Pro vtero, primas tenet syrupus ex cerasis, de agresta exactè paratus.

Litus ad hepar, ex cerato santalino.

24. Hordei m. ii. coriand. parati 3 ii. apii, adianthi añ. p. i. fiat decoct.

Mm ij

276 CONSILIORVM MEDICINALIVM

vtatur cum vino albo mane si febris non adsit, aut paretur cum saccharo & melle.

Vtatur hordeatis paratis cum iure pulli, & carniū vitulinarum, cap. manè & serò.

Lac asinæ, serum lactis, cum syrupo violarum percolatum diligenter, conuenit, & panis in lacte subactus, item aqua nephritica.

CONSILIVM CXV.

De pulmonis calida intemperie.

AD prophylaxim affectus pulmonis, cum caloris sensu, & salua falsuginosa, ac si sputum foret piperatum, nobili viro hæc præscripta fuerunt.

Opiata.

Cassia frequens vsus, vel opiatæ laxatiuæ, ex decocto pectorali refrigerante, cum tamarindis, passulis corinth. flor. nymphaeæ, intybaceis, cum folliculis, addita cassia, pulpa sebesthen, confer. violarum.

Cassia non colata magis lenit, temperat, humectat bilem & pituitam ducit.

Cassia dissoluatur in iusculo, vel refrigerante decocto, modò coletur, modò non, sed non colata est melius profectura, medulla enim potentiorē habet effectum. Baculus glycyrr. temperetur in ptissana vulgari, facta cum hordeo, additis sem. 4. frigid. diligenda est glycyrr. sic temperata, frequens vsus conueniet pilul. hypoglottidon, vel tabellarum paratarum ex bechicis, addito addito papauere albo.

Iulep. rosar. cum aqua portione syrupi de nymph. vtrumque dissol. aqua decoct. hordei: frustula pomorum succulentorum & suaueolentium, addita aqua rosacea.

Hordeata.

Hordeata frequentia, cum aqua parata, in qua temperabis sem. cucurbit. lactucæ & aliquando papaueris albi.

Somnifera.

Somnifera valebunt blanda, præsertim si tussis molester, vsus frequens pomorum non minus coctorum additis iuiubis, floribus nymphaeæ.

Lac asinæ.

Lac asinum tempore commodo.

Non attrahere aërem nimis calidum, ex luculento igni, iuscula refrigerantia, epithemata, reserare basilicam sinistram.

Balneorum creberrimus vsus, nam licet, quorundam opinione, ^{Balnea.} pulmonicis non conferat, quòd liquet & humores fundat, vnde aut febris, aut inflammatio: ramen ad eos affectus Hipp. commendat, Peripneumoniæ (ait) ^{3. acut.} magis quàm ardenti feбри confert balneum, nam lateris & pectoris mulcet dolorem, sputum educit, [“] maturat, &c. quidam nomine peripneumoniæ communiter intelligi voluit omnem pectoris dolorem. Nam peripneumonia vera non habet coniunctum lateris dolorem, & tamen Hipp. loquens de peripneumonia meminit lateris doloris, quem balneum discutit.

CONSILIVM CXVI.

In hydropis metu, & pulmonis, hepatisque latente vitio.

PRudenter se gerere oportet, ne vsu hydroticorum calidiorum augeatur intemperies hepatis & pulmonum post intemperiem impense calidam. sequitur aliquando hydrops dum serum putre gignitur, loco laudabilis sanguinis, aut tympanites sequitur. ^{Hipp. de int. affect. per 10. dies initio quasi à cibo abstinendum putat, dat lac caprillum ad 4. heminas addit 4. partē mulse.}

Purgationes ex interuallis, à calfacientibus multum abstinendo.

Phlebotomia si hepatis & pulmonum phlogosis sese prodatur. radix filicis maris confert, manna calabrinum profuit.

Si tument partes imæ, maximeque scrotum, cauterio locus esse potest. ^{Hipp. ibid. si tumor, ait, cōstitutus sit in scroto, & febribus acutis, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito.}

Vsus mechoacan, aut ialap erit utilis, aut herbæ nephriticæ.

Iusculorum rarus vsus, aut in forma panatellæ.

Forus blandi ad ventrem.

Cataplasmata ex farinis qualia sunt alio loco ante præscripta vinum album cum radice campanæ & eryngii, scyna, sassafra: tabellarum de citro vsus esto cum vino albo.

Syrupus ex floribus persicæ arboris.

Electarium triasantalinum triplo rheo, cum croco Martis, feniculum florentinum, aut anisum.

Mm iij

Pulvis conueniens à pafu.

Hæc decreta confulibus D.M. Ellenio & Petræo clariff. collegis. die 12. Ian. 1609.

CONSILIVM CXVII.

De Calculo renum.

Dolor de quo iamdudum conqueritur, vel à rene originem ducit, ratione cuiusdam calculi, qui in eo iam rudimentum quoddam accepit, qui si talis existit qualem vrinæ demonftrant, haud dubiè bona victus lege ab huius moleftiis vindicari poterit. Quod autem ad hypogaftrii & tefticuli dolorem attinet; is exci- tatur cum ab obftructione vreteris à calculo, tum ob confenfum tefticulorum cum vafis fpermaticis quæ ab emulgente oriuntur. Ad doloris moleftias demulcendas paroxyfmi tempore, & præ- cautionem eiuſdem præſentis, aut imminentis, phlebotomia, fi plethora ſubeſt, & purgationibus corpus vacuandum eſt, quæ non modo humores in partem affectam influentes, ſed & iam ipſi reni impactos vacuent & eliminent. At verò præſidia quibus ea præ- ſtari poſſunt, ſunt leues purgationes, clyſteres, pilulæ, apozemata, demum, fotus, litus, balnea, vnguenta, & alia de quibus in ſequen- tibus dicetur ſi dolor recrudescat & *παλιγκοταίνει*. Et quia nil ma- gis vrget, & medici ſolicitudinem ad ſe conuertit, quàm dolor grauis maximè in paroxyſmo, dicemus in primis, quibus artibus is quàm primum leniri poſſit & demulceri: dein quid ſit alio cura- tionis tempore peragendum. Cum redibit paroxyſmus iniicien- da erunt enemata conſueta, addita terebinthina veneta, fouendæ- que erit pars dolore obſeſſa ſacculis, quibus ſi dolor non ſedetur & conquieſcat, demergendus erit in balneum aquæ tepentis fu- mo & odore carentis, in quo diu morabitur, modo nulla virium dehortetur imbecillitas: dein illinienda erit renum regio vn- guento ad id accomodato quibus præſidiis ſi non miteſcat dolor, ea demum iteranda erunt & denuo æger in balneum demitten- dus erit, vt relaxatis balnei tepore partibus, longè facilius calculus à rene per vreteres in veſicam, ab hacque foras protrudatur & eli-

Hipp.

minetur. In doloris acerbitate vtile erit olei amygd. dulc. sine igne extracti $\frac{3}{4}$ j. f. & succi limonum $\frac{3}{4}$ f. propinare, demum dolore sedato, bolum cass. cum rheo, addita interdum benedictæ laxat. portiuncula exhibere, vel potionem sequentem, si bolum respuat, cum rheo concinnatam; dein interpositis aliquot diebus terebinthinam: si verò in multos dies producat dolor, vtile etiam erit haurire apozemata, aut decoct. cicerum rubr. cum rad. petros. altheæ, bipinell. &c. diebus scilicet iis quibus non purgabitur: si nausea, vomitio, aut ventriculi imbecillitas fatiget ob consensum quem habet cum renibus, is roborandus erit vnctione ex oleo mastichino, aut emplastro ex mastiche cera & oleo cydon. Quin & ad huius morbi præcautionem magna est purgationis efficacia ex cassia cum rheo, benedicta lax. interdum; caputque deplendum quod graue perferitur. Interim vero 15. quoque die repetenda erit, maximè si de renum aliqua grauitate conqueratur, catharsis, aut ex pilulis stomachicis 8. quoque die deuorandis; diebus vero intermediis conuenient tabellæ triasant. quadr. rheo.

Sed & ad præcauendum hunc affectum insignes & certas vires habet quod sequitur iusculum.

℥. Hord. integ. p. j. rad. petros. acetos. fœn. cich. brusci añ. 3. j. 4. sem. frig. maior. conquass. añ. $\frac{3}{4}$ f. fol. acetos. portul. lactuca, pimpinella, summitatum mal. & viol. añ. m. f. bull. in aqua fluuiatili cum gallo gallinaceo & crure vitulino, seruetur decoctum, de quo cap. $\frac{3}{4}$ vi. per 4. dies manè hor. 2. antè cibum cum succi mali citrii $\frac{3}{4}$ f. antè cum eodem iusculo, sub ipsum sumptionis, feruefacta: sic enim mox vrinae funduntur multæ subsidencia multa arenosa, & humore crasso ac viscido prædita, & alui libertas procurabitur; adstrictio enim alui vna est ex causis cur dolor ita frequenter redeat.

Inrerim diæta instituenda est, quæ conuenienti vsu rerum sex non naturalium minimum in corpore crassorum lentorum & viscidorum humorum coaceruet. Ergo piscibus abstinendum, carne bubula, suilla, auium palustrium, caseo, leguminibus, lacticiiniis, ouis frixis, duris, placentis pistoriisquæ omnibus operibus, acetariis, fructibus crudis, pane azymo: denique omni alimentorum obstruentium genere. fugienda in cibo & potu satietas, vt quæ sit cruditatis parens, item somnus diurnus, aut statim à cibo.

Vitandæ aquæ palustres & limosæ, vina crassa, zythum &c. potulenta, fugienda.

Vinum sit album, aut rubrum tenue, aqua multa decoct. gram. aut alth. dilutum.

Acetariorum loco sint cappares, crista marina, talleolæ citrij faccharatæ, aut bipinella condita.

Licebit etiam vtiliter hyberno tempore, 4. aut 5. dierum spatio, vacuato corpore hydromelite vti antè pastus, demum per 10. aut 12 dies, quiescet; tumque si grauitas in rene percipiatur, purgato deinceps corpore, repetendus erit hydromelitis vsus.

Sequuntur formulæ remedium supra commemoratorum.

℞. Cass. rec. extr. ʒj. rhei electi ʒj. cum pauco cinnam. & diatrag. f. bolus cap. vt dictum est. Interdum vero loco rhei puluer. ʒj. f. bened. laxat. addenda. Si bolum respuat vti poterit potione sequenti.

℞. Rad. petros. asparag. fœnic. gram. sem. earth. añ. ʒiij. beton. viol. pariet. adianth. saxifrag. bipinell. end. bugloss. totius añ. m. f. pruna damasc. n. vj. sem. melon. cucum. alth. citrij, cardui añ. ʒf. glycyrr. rasæ ʒj. cicer. rub ʒiij. flor. cord. añ. p. j. f. decoct. ad j. dos. in colatura inf. rhei elect. ʒij. cinn. ʒj. in express. diff. cathol. & sy up. capill. ven. añ. ʒf. f. dos. cap. vt dictum est. In paroxysmo cassia primastener.

℞. Terebinth. venetæ lotæ in aqua pariet. ʒiij. rhei electi tenuiss. pul. ʒf. cum ʒij. diatrag. frig. f. parui boli, inuoluantur obeliis vino albo madefactis, cap. ex cochleari cum syrupo capill. veneris, post purgationem.

℞. ʒ. rad. aper. añ. ʒf. oxylap. gram. añ. ʒvj. cich. totius, agrim. cusc. cutæ, capill. omn. bipinell. e. saxifr. beton. viol. pariet. bugloss. totius añ. m. f. ʒ. sem. fig. maior. sem. alth. milij. solis añ. ʒj. glycyrr. rasæ ʒij. cicer. rubr. ʒf. flor. cord. añ. p. j. f. decoct. ad quart. ʒ. in colatura diff. syrup. de alth. capill. & de limonibus añ. ʒi. f. f. apoz. clarū aromat. cinn. ʒi. capiat ʒ. sequent. matutinis per horam antè cibum; sed prius capiat tabellam vnam elect. triasant. vt dictum est, idque intermediis temporibus purgationis.

Sequentibus pilulis vtetur, semel in hebdomade antè pastus hyberno tempore, vt aluus libera maneat.

℞. Aloës non lotæ ʒiij. rhei elect. pulu. agar. trochisc. añ. ʒi. f. pulu. elect. ducis ʒf. excipiantur diaphœnico, f. parua massa cap. ʒii. f. aut ʒi. pro di. si.

Sequenti die clystere aluum proluere, ante accessionem multum proderit.

℞ Mal.

24 Mal. bism. pariet. viol. betæ añ. m. j. cicerum rubr. 3 j. sem. lini, fœnic. fœnug. añ. 3 iij flor. chamæm. melil. añ. p. j. f. decoct. in hydrom. ad 4 j. in colatura diss. cathol. & diaph. añ. 3 f. mellis ros. & tercibinib. venetæ añ. 3 vj. olei amygd. dulc. 3 iij. f. clyster. iniic. vt dictum est. si reiecto primo dolor permanferit, alter iniiciatur.

24 Mal. bism. totius viol. pariet. añ. m. i. cham. melil. añ. m. f. alth. lini añ. 3 iij. f. sacculi duo, bulliant in aqua & vino albo, pro foru paris dolentis alternatim applicabuntur, si dolor renum grauis sit bull. in lacte.

Ex eadem materia parabitur balneum in quo æger vrgente dolore infidebit.

A foru flitus pro renibus fauiente dolore.

24 Mucag. sem. alth. lini extr. in aqua pariet. añ. 3 j. f. adipis cuniculi 3 vj. olei amygd. dulc. & de scorp. lor. in aqu. saxifr. añ. q. f. f. linimentum, addetur ceratum santalinum in summo æstu.

24 Pulu. diatr. frig. 3 f. pul. nucl. mesp. 3 f. sem. millij folis, lapid. iudaici añ. 3 j. sem. alth. petros. maced. añ. 3 f. cum sacch. 3 j. f. puluis, capiat manẽ post purgatum corpus, & vsum apozematum præscriptorum ex cochleari, superbibendo parum vini albi per 3. aut 4. dies continuos, postea abstinabit, quoad iterum purgatus fuerit.

Hæc decreta consulibus Clariss. Med. D. Gorræo, Petræo, & Riolano.

CONSILIVM CXVIII.

Pro Muliere ad conuulsiones epilepticas prona.

Symptomata commemorata vt terroris plena sunt, ita à mala causa ortum ducent, quæcumque & vndeunque illa sit. Et quod periodis quibusdam malum reuertitur, id diathesim iam inductam declarat, quæ vt causa generatrix, ita & reducis paroxysmi auctor existit. Malum est, quod frequenter rediuius affectus redeat, prius, quod partes principes cor & cerebrum imperat, pessimum, quod non solum per consensum cerebrum laboret, sed etiam per se, & quod in morbus ipsa obsidione caput deterius afficiat, quàm affectum fuerit. Quod palpitationes præcedant, deinceps

Nn

282 CONSILIORVM MEDICINALIVM

Idea affectio-
nis istius &
vertig. &
convuls. à Gal.
explicatur. ad
part. 27.4.
acut.

de Vertigines, Epilepsia, Paranympsi, deinde aliquid convulsivum id ab inferioribus partibus teter vapor facile confurgens facile committit. An vera sit Epilepsia in incerto est, cum à Medico sit additum, *Et velut quaedam Epilepsia*; Hipp. more qui cum dicit *πασμῶδες τι*, aut *πασμὸν τινα* absolutam convulsionem non putat, ut singultus fidem quoque facit.

Ceterum cum dicimus partes inferiores, & parentes & fontes vaporis istius tot gravium symptomatum authoris, in ambiguo etiam versamur. Nam & viscera sub hoc nomine intelligi possunt, & vterus ipse gravium morborum, & generi muliebri *καὶ τὴν ἰδέαν* propriorum author & fundus. Possunt intelligi partes externae crura, tibiae, pedes, à quibus solis aliquando tanta labes manat, quatenus à principe Avicenna morbus in habitu corporis nominatur. Haec autem cognoscere. Ideam morbi cognoscere est. Aliis atque aliis signis res distinguenda est, cum magni inter sit ad remedia usurpanda, si ab utero, si à praecordiis, si ab habitu ipso & cruribus (ut historia morbi subindicat) malum est repetendum: Nam & tremor tibiarum, & extenuatio, quid, nisi malum portendit.

Sensus frigoris in ventriculo, ventris adstrictio, contrariam quandam temperiem ventriculi & hepatis declarant, id quum adest, magnorum morborum fons & suscitabulum existit, plura ipsa *αὐτοψία* docere potest.

Concinnetur elect. lenitium quo facilitas aluo concilietur, hanc blandius ducere optabilius est.

Clysterum frequens usus.

Detractio sanguinis vere & autumnno, maxime si sanguis peccet & *κατὰ τὸ πλῆθος, καὶ κατὰ τὸ πάθος*. Item catharsis. sed autumnno blandior, & frequentior, ob contumaciam humorum, & nescio quod Empyreuma à praegressa aestate, & adustionem, quam vnam natura abhorret quae duo morbos autumnales, aut funestos, aut longos reddunt, (vnde *καὶ ἔξοχῶν* autumnus pestifer dicitur, & funebris:) funestos, cum tabum malignum cito vitae stamen abrumpit, alterato aut dissipato spiritu: longos ob humorum contumaciam, obstructionem à prava diæta; addo partium latens & intestinum vitium vix explicandum. Hinc virium infirmitas. At solae vires, aut praesentes morbos abigunt, aut futuros arcent. Ventriculo robur concilietur, par studium esto in cerebro roborando, vitando quae sanguinem & spiritus inflammant.

Maior animi impetus reprimendus; iræ frænos iniicere: nam animi motus malum prouocant.

Pyrótica tibiis.

Vngulæ Alces vsus ad insultus epilepticos apprimè conferens, gestanda quoque.

3.

Aquarum naturalium vsus, maximè Niuernensium, vt né maiore sumptu Spadenses affectentur. Sed hæc Medicus domesticus expendet, examinabit.

ANNOTATIONES.

1. Morbi longi ob crassos humores sunt coctu difficiles, & qui partibus impinguntur, dispositiones morborum & humorum magis tumoribus præduris, quàm inflammationibus assimilantur. Pauci sunt morbi longi per compassionem, & absque loco patiente, in quo venæ omnes habent æqualiter humores putrentes. Gal. ad aph. lib. 2. acutorum.

2. Quæstio fuit an balneum conferret. Aliàs conferre potest, aliàs obesse. Ita Gal. dum loquitur de Vertigine: Capitis solius caliditatem quouis alio modo habentis balneum inuat. Cum verò spiritus flatulentus ob humorum prauitatem ad caput fertur, hos lauare non conuenit. Ac si dicat, si malum in cerebro locale est, balneum confert, sin minus, nequaquam.

3. Quidam affirmant se hanc medendi rationem præsertim ad Epilepticos à quibusdam accepisse. Animonij præparati ʒss. accipitur maceraturque in ℥ij. vini albi optimi; Paroxysmi tempore cochlear vnum istius vini in os infunditur,

CONSILIVM CXIX.

De inordinatis mensibus, & uteri quodam Rheumatismo, & aliis affectibus.

Mulier hæc partim diuino fauore, partim artis ope liberata est periculo, omnino tamen restituta non videtur, nam Iuperstes cacochymia succrescentem cacochymiam induxit, atque

Nn ij

ad eo in cachexiam quandam adduxit: omnis enim coloris suauitas nitorque decussus est, inde totius corporis affectio indicatur, quanquam aliarum partium vernacula quædam affectio quæ *κατὰ τὴν ἰδέαν*, id ex symptomatum syndrome apparet, quorum *ἐκτετακτοῦ* facit propagatio causæ morbificæ. Corporis coloratio similis est humoribus subiectis: id quod declarat aliquid intus male geri, siue id splenicum sit, siue insignis obstructionis soboles. Magna sunt argumenta hypochondriacæ affectionis, non minora vteri laborantis: quanquam Gal. totum corpus vtero simile est omnino, gr. *τὸ πᾶν*, quidam (ferè) interpretantur.

Somnus turbulentus, deiecta appetentia, à sumpto cibo oppressio, malacia quædam, denique sensus quidam caloris excitati à quodam fuscitabulo, ac si calx irrigata foret; vbi primum benignitate alimenti æstuantia viscera madescunt & irrorantur: id autem declarat maximè dioclam, phlogosim, obstructionemque lactium, vnde hypochondriacum *παθος* maximè originem ducit, opinione principis.

At affectio vteri partim eius propria est, partim aliunde. declarant laboriosi menses, decolores, nec per idem tempus venientes, parciores. Inde quoque deterius habet, quòd omnis humor motus & non promotus oppressionem faciat. Decolorationem autem non solum pituita, sed & vtraque bilis facit Galeno. Proprium autem est mulierum cacochymarum, vt earum menses statam periodum non feruent, natiuoque careant colore. Si crassiores humores difficiliùs fluunt, moramque trahunt; si humidiores & tenuiores anteuertunt, diutiùsque perseverant. Muliebria enim aqua laborantibus diuturniora. Ac calamitatem morboſi mensis auget vteri *πευματικὸς*, vt mirum non sit, si concipiendi opportunitas sublata, spem prolis ademerit. vnde irriguus vterus, humore aduena, & fortè indigena, proindeque indignabundus *τὴν μήτραν* reformidat. At tellus nisi benè culta annuo puerperio læta esse non solet. sic totius corporis, maximèque vteri cura habenda est.

Cum menses decolores sint, habeat frequentem syrupum solennem ex Rheo. Agar. folliculis.

Maximè probo in vsu quotidiano aquam macerationis Rheis parato decocto ex capillaribus, primula veris, chamæpit. & oxylapatho.

Puluis sit ad *πόσιν*, maximè: quæ obstructa liberant, & *ποτικὰ*, calidiora vitentur.

LIBER TERTIVS.

285

Detractio sanguinis, cum is ægroter, & κατὰ τὸ πλεονος, κατὰ τὸ πείθος.

Vterus aliàs morosus & τῆς μίξεως indignans repurgetur, purior factus exciterur, stimulis istis concitus cum olim καὶ φέρος fuerit, fiat ἐνήκοος (vt eleganter loquitur Aristoteles) vt culto fundo fructus suavis egerminet. 10. de hist. anim.

CONSILIVM CXX.

Pro Consule iam rudimenta Apoplexiæ experto.

Cerebri læsiones vt magni momenti sunt, ita parvæ non mediocrem etiamnum curam, magnæ maximam requirunt. si quando aliàs, hîc nil negligi debet, primas tenent Apoplexiæ, harum initia & rudimenta tanti esse debent, vt vel leuissima symptomata non negligantur. Nedum illud quod in ægro pathognomonicum est quodammodo, id genus linguæ ἀχάρεια & incautè prehensens ἀφασία. Hæc in clariss. virum inciderunt. sic enim ex fide historiæ à magistris artis medicæ & eleganter conscripæ cōstat.

Quoniam vero & tempus, & ætas, & temperamentum, & vitæ institutura (cuius vis cæteris non est inferior) & cerebri nescio quæ contracta labes, & infirmitas malum reuocare possent; hîc danda opera, hîc vigilandum, hîc anteuertendum. Sed non multa apud artis magistros edisserenda. Purgetur frequenter Apoz. recipiente sennam, agar. & syrup. ros. pallid. addito rheo. Bis mense purgetur per syrupum ex eadem materia, vel cœlo frigid. catapotiiis cephalicis addito rheo.

Opiata concinnanda ex puluer. splen. hepaticis conseruis, cephalicis non admodum calfacientibus adiecta confect. Alkermes.

Linatur ceruix ex oleo saluiæ, castorei cum pauco ol. nucis moschatæ adiecta mucag. sem. alth. extractæ in aqua saluiæ & cera.

Gargar. ex salu. beton. hyssop. coctis in hydromelite teneat nucem moschatam in ore. Detractiones sanguinis pro re nata.

Cauterium ad collum. Vena frontis aperienda si plethorici cerebri argumenta adsint, si fieri possit prouocandæ & aper. hæmorrhoides. Abstineat à vino quoad eius fieri potest, vtatur scynæ decocto addendo hyemis tempore saluiæ parum. Non prouocentur sudores eo decocto, vel eius loco sit hydrosaccharum. Res vene-

Nn iij

Parua causa
medulj
exaluitur nisi
quid circa
partem prin-
cipem sit. Hip.
de præcept.

Quantum li-
bera alius
capiti conse-
rat. Hipp. 2 de
diet. Alius
euacuata ex
reliquo corpo-
re & capite
humiditatem
ad se attra-
hit, euacuato
capite & au-
ditus, & vi-
sus repurgan-
tur, & homi-
nes agiles fiunt.
Et plen. Gal.
ex Hipp. de
Aëre & loc. qui
natura alium
liberam ha-
bent, minime
pleuritide &c.
morbis cor-
rip. ad aph 33.
lib. 6.

reas prudenter exerceat. quod enim ad venerea, quæ sunt λυσίμε-
 λεία καὶ λυσίγῃα καὶ ἀνοίαι sæpè accersunt & ad animi pathemata hîc
 præclarè facit aurea mediocritas. Magnarum cogitationum cur-
 sus reprimendus, vt enim laboranti pedine sedendum, nec ambu-
 landum, sic nec cerebro infirmo laborandum.

CONSILIVM CXXI.

De Vlcere inguinis & Tumore.

PRoponis nobis quæstionem perdifficilem de vlcere, & tumo-
 re inguinis dextri, ad cuius diiudicationem cuperemus rem
 paulò altius repetitam: nam cum tumor is multis de causis oriri
 posset, vel in ipsis inguinum glandulis, vel ab intestini aut omenti
 prolapsu, vel ab vtero in eam partem inclinato, non possumus in-
 telligere quæ signa singulorum præcesserint. an scilicet suppressi
 menses, vel sanies è pudendo manarit, an dolores coxarum, femo-
 rum, lumborum præcesserint aut etiam pubis, quæ omnia vtero
 malè affecto eueniunt. Præterea dubij sumus an tormina aliqua,
 alui profluvia, vomitiones, & reliqua quæ solent intestinis labo-
 rantibus excitari, apparuerint. Nam quod de stercore reiecto nar-
 ras, dubium & ambiguum signum videtur, quod fœtore carere
 scripseris. Similiter & vermis tam ab vtero quam ab intestinis
 reiici potuit; sed plerumque in omnibus vlceribus putridis & malè
 curatis & deterfis gignitur, nec tamen intelligimus quanta fuerit
 eius longitudo.

His de causis non est facile tibi persatisfacere, quodque rescribi-
 mus coniectura magis quàm certa ratione dictum accipies. Itaque
 nullis apparentibus signis malè affecti vteri, aut intestini maioris,
 vt Ileï, verisimile putamus in inguen dextrum prolapsam fuisse
 apophysim quandam cæci intestini, quæ referta sordibus tandem
 computruit, & sinum effecit. ex ea apophysi ita affecta non est ne-
 cesse symptomata ea consequi quæ maiore intestino eoque toto
 sequi consu-uerunt, cuiusmodi sunt voluulus, vomitiones, alui
 profluvia & reliqua commemorata.

LIBER TERTIVS.

287

Hic affectus curari possit necne primum videndum est, deinde quibus remediis. Verum curationem sperare partis affectæ natura impedit, quæ regigni nequit, & coalescere si diuisa fuerit.

Remedia autem non alia adhibenda existimamus, quam quæ detergendis vlceribus dicata sunt, eoque magis quò pars affecta pèrpetuis sordibus magis inquinatur.

Fiant autem frequentes, quibus non tantum leuabitur malum, sed etiam innotescere poterit an vlcus penetret in intestinum, an in vterum, si diligenter attenderis vtriusque partis reiectiones.

Præter topica remedia, censemus etiam purgandum corpus frequenter remediis ægræ acomodatis, clysteres etiam crebro iniiciendos, prouidendumque ventriculi actioni eupeptis & euchymis alimentis.

His accedere poterit & schinæ vsus eo modo quo expedire iudicabis. lactis asinini vsus præsertim per æstatem vlceribus acomodatus est, quòd vehementer detergeat.

Quòd si malè affecti vteri signa appareant, vtero consulendum erit, si Ileci eodem modo Ileco & eius affectionibus incumbendum. Hæc decreta Consulibus D. M. I. Gorraeo. & I. Contao.

CONSILIVM CXXII.

De Vrina incontinentia.

Virgo nobilis vrinæ incontinentia iamdudum laborabat, sequentibus remediis illi consultum fuit.

Primum abstineat ab omni iure, præsertim ab eo quod vrinam prouocet, vt quod fit ex rad. scæn. petros. & asparagi, item ab omnibus herbis viridibus: sequenti autem syrupo 10. quoque die manè vtatur.

℞. Rad. polyp. cichor. cyp. añ. ʒi. plantag. totius bugloss. borrag. maior. ceterach, fumar. primulæ veris, absinth. romani añ. m. j. sem. citrij, pass. mund. añ. ʒi. sem. acetos. plant. coriand. gran. berber. añ. ʒi. sem. scenic. ʒi. folior. fenn. mund. ʒi. myrobal. citr. & embl. añ. ʒi. fiat decoct. in colat. ad ʒss. dissol. rhei electi infus. in parte decoct. antecedentis express. factam ad ʒi. syrup. ros. laxati-

Fouebitur extrema pars spinæ propè os facium hoc decocto.

24. Salu. maior. orig. calam. primulae veris, lauend. rutae añ. m. j. rad. acor. cyp. añ. 3 j flor. cham. mel. anethi absinth. rom. añ. p. j. medij cort. quercus & balaust. añ. p. j. f. sacculus qui bull. in aquis partibus viui styptici & aquae fabrorum pro fetu partis nominatae, post fetum illinatur.

22. Olei costi & ol. samb. flor. añ. ʒj. f. de hyper. ʒvj. pul. cyp. ireos
flor. añ ʒij. pul. balaust. ʒ f. cum cera f. linim. pro parte dicta & offe
sacro. Si non leuetur hoc remedio, applicabitur. emplast. contra
rupt. offi sacro mista mastiche.

Singulis diebus vtetur hoc puluere.

24. Mirobal. omn. affectorum & extinct. in aceto añ. 3 j. sem.
nasturt. coriand. præp. conqu. extinct. in succo omphac. añ 3 j. f.
ambr. citr. cupulorum glandium, nucis cupr. añ. 9 iiij. cini am.
electi 3 j. corall. 9 j. pelliculæ stomachi gallinarum præpar. 9 iiij.
cum sacch. suff. f. pulvis; vtatur ex cochleati bis in die longè ante
pastum.

Vtatur aqua bullita ferrata, abstineat à vino albo: cuius loco paulo adstringens vinum bibat aqua prædicta dilutum. Vitabit salsa, acria & aromata. lute lentium coct. vtetur aliquando.

His remediis sanitatem recuperabit.

Si medicamenta per os assumenda abhorreat, vtendum erit clysteribus.

26. Hydrom. coct. cum sem. carminar. & cyp. sal. maior. flor. cham. & anethi quart. 3. in colar. diff. conf. h. eraz simpl. 3 f mellis anth. sacch. rub. añ. 3 j. olei de hyp. & irini añ. 3 j. f. f. enema, v. i. tur sept.

Hæc decreta Consul, D. M. Petreus, & Contæo.

De dolore

CONSILIVM CXXIII.

De dolore Thoracis & Cervicis.

VIr nobilis varias aëris incommoditates perpeffus cœpit conqueri de dolore Thoracis, ad medullam spinalem. Item de cervicis graui dolore. Mala victus ratio, animi excandescencia, irarum ardor, habendi ardens defiderium, famis & inediae tolerantia fecit vt ad ventriculum affluerint varij humores æruginosi præsertim, qui cum grauissimè torserint affligerintue: videbatur penè opprimi & suffocari præ congestis in ventriculo, partibusque vicinis humoribus. Vocatus D. Palmarius medicamentum præscribit purgans, Apozemata celebria, malum quieuit. Lata est alius excrementis biliosis, æruginosis, perseuerabat tussis ficior, nullus capitis dolor, visus est restitutus, in morbum recidit, conquestus est de difficili respiratione, cuius causam referebat ad oppressionem diaphragmatis à liene. Missus sanguis ad 3. vascula, corruptus erat, alleuatus, paucis post diebus ex interuallis malè habebat. His omnibus successit inappetentia, tumor pedum ædematosus, dolor ad regionem ventriculi, scrotum intumebat præsertim serò & mane, cœptū est quæri de causa eorū symptomatū. Medici accusabant hepar, idemque ab intemperie calida laborare dicebant, & humores serofos gignere, huc & illuc relegare, accusatus quoque lien est. Non ita pridem fuerant præscriptæ tabellæ elect. trias. quadr. rheo, superbibito tantillo vini absinth. & aquæ decoct. cichorij. Rebus diligenter examinatis hæc ab iis præscripta sunt purgetur bis in hebdomade cum ʒj. f. syr. de cich. compos. cum rheo in quo diss. express. ʒij. rhei elect. inf. in aqua agrimonij cum ʒ f. sant. citrini.

Item 2. diebus interiectis vtatur suo elect. trias. cum quadr. rheo. post 15. dies foueatur vtrumque hypoch. foru sequenti.

ʒ℥. Fol. mal. bisin viol. cich. totius & agrim. añ. m. 1. absint. scolop. capill. ven. ceterach, chamæm. añ. m. f. rosar. rub. & mentha. añ. p. ii. sem. anisi fœniculi añ. ʒj. rad. cyp. scœnanth. calam. arom. añ. ʒj. f. 2. sacculi interfuti, qui bulliant in aqua & 3. parte vini albi pro fotu cum philtris.

290 CONSILIORVM MEDICINALIVM

24. Olei de absinth. de capp. & ros. añ. 3 j. f. litus post forum, præscripta est diæta hæc vt primum cibus eucharis carnis potius tostis quam dixis, vino albo & rubro dilutissimo iusculis ferè abstineret.

FINIS

PARADIGMATA
E T
HISTORIÆ MORBORVM
OB RARITATEM OBSERVA-
TIONE DIGNISSIMÆ,

*Quarum lectio non minus rei ipsius gravitate, & admira-
tione, quàm utilitatis ubertate est ad medendum
& præsentendum profutura.*

Authore M. GVILLIELMO BALLONIO
D. Medico Paris. Celeberrimo.

E T
Editore M. IACOBO THEVART D. Medico Parisiensi.

PARISIIS.

M. D. C. XLVIII.

CONSILIORVM MEDICINALIUM
E T

HISTORIAE MORBORVM
OB RARITATEM OBSERVA-
TIONE DIGNISSIMAE

Quarum lectio non minus est utilis quam
tunc, quam videretur oportere et ad medicandum
et praescribendum profutura.

Auctore M. GUILIELMO BALLONIO
D. Medico Parisiensi Celeberrimo.
E T
Editore M. IACOBO THEVART D. Medico Parisiensi.

PARISIIS

M. DC. XVIII



LECTORIBVS BENEVOLIS
 GVILLIELMVS DE BAILLOV
 MEDICVS *ευπατρις*

Sæpè illud usu-venit ut quæ nobis obuia sunt, & sub sensum cadunt, ea nobis in nihilo habeantur: contra ea mirari soleamus ac amplecti quæ à nostris sensibus sunt remota. Et tamen in iis quæ ob oculos, aut ponuntur, aut fortè incidunt, vis magna poni debet: quòd eorū observatio ad communem rerū eximiarum effigiem animo imprimendam plurimùm sit profutura. Relinquamus externa, in domesticis diligentiam nostram acuamus. Cum hoc opusculum rei medicæ sit accommodatum, è communi foro res est à nobis repetenda. Quoties noui morbi incogniti que in dies surgunt ac nascuntur, qui à plerisque negliguntur? Sed id malè, magnòque ægrotantium incommodo. Quod eò ab illis prætermittitur, aut quod omnium morborum ut est nomen idem, ita & rationem, & ideam, & indolem eandem esse falsò crediderunt: aut quod ignorant quorsum rerum singularum observatio pertineat, & quantum adiumenti sit allatura: aut, cum sibi persuadeant inde nonnihil & ad laudem, & ad cognoscendum opis contingere posse, hoc tamen flocci faciunt, & turpi otio languère malunt. Quorum ut sinistra leuetur opinio, ignorantia adiuvetur, & ignauus in re fructuosa animus stimuletur addito minimo calcari, uno id verbo res potest explicari. Nemo ignorat ex singulorum in quoque corpore cognitione uniuersam ac generalem rerum in arte medica comprehensionem fluxisse: in qua communium theorematon omnis ratio vertitur, & tota vis posita iacet. Et cum admirabilis iste cursus ac progressio ceperit inde, minimo ex isto principio in tantam copiam & rerum ubertatem sensim increpescens: ne mirum sit si quæ rara sunt & communem aliorum opinionem superant, ea necesse sit proponi & ad communem usum accommodari. Vt enim fructuosa fuit eorum quæ ut plurimùm contingere cognitio, ita minorem non est habitura

Oo iij

apud creditos homines qui otio non abutuntur, autoritatem eorum quæ raro eueniunt operosa observatio. Aut si illa in loco aliquo ponitur, cur hæc exulabit? Quanquam, nisi nos in nostra opera industriaque excitanda cœcetiāmus, pluris faciendum putamus id quod raro venit, quàm quod sæpè sese iactat in populo, ut nullus sit qui etiam in quadruplo eius notitiam non profiteatur. Nam ut rariorum rerum observatio eruditorum ferit sensus, ac eis ad blanditur: ita in tritis vulgaribusque rebus imperitæ multitudinis dissoluta industria versari solet. Qui in theatris laudem quarunt aliquam, dum mores hominum ficto simulatoque sermone, aut persequuntur, aut informantur, non quod omnibus notum proponunt, sed reconditum aliquid & inauditum vulgo exponunt, ut ex adumbrata simulataque fabulæ serie aliquid expressum verumque eliciatur: Eodem modo in arte medica, cuius non ubique non adest usus, sæpè ea quæ præclara minusque subsensum cadunt, notari debent, ut in iis quæ euentura sunt aliquid sit quod meminerimus, ac ne frustra res admiremur, ac si nil tale unquā contigisset. Quod multis qui popularem gratiam venantur ex usu fuit, qui ut suam ignorantiam occultent, aut rei occultæ & à communi seruire remotæ nonnullam explicationem venditent, tum demum gloriantur cum quid novum euenisse vulgo persuadent. Nam si ex animo res processerit, nec opinionem rei euentus sefellerit, publicandæ suæ industriæ inde occasionem querunt, cum tamen potius fortunæ talis euentus sit ascribendus, si quid aduersum euenierit, ad rei difficultatem nunquā antea à quoquam perceptæ confugiunt. Ac dum eorum quæ raro eueniunt (eueniunt tamen, sed hoc fugiunt, non aduertentes) ignari de populo malè merentur, iustam se satis occasionem prætexere putant, si se rei difficultate & insolentia defenderint. Quod ut effugiamus, ex propriis observationibus, & veterum Neotericorumque scriptis nonnulla morborum raro in vultu seuientium & deinde uacua elicere volumus, ut hæc animis nostris retenta impressaque proficiant. Nam & ita admirationis in morbis (quæ admiratio artem obscurat) occasio omnis tolletur, & similibus exemplis eruditi quod erit muneris, procum exemplorum prolatio summa cum delectatione autoritatem & sequemur fidem orationi asferre soleat. Valete.



GVILLIELMI
BALLONII
MEDICI PARISIENSIS
CLARISSIMI PARADIGMATA,
E T

*HISTORIÆ MORBORVM OB RARITATEM
obſervatione digniſſimæ, quarum lectio, non minùs rei ipſius
grauitate, & admiratione, quàm utilitatis ubertate eſt
ad medendum & preſentiendum profutura.*

HISTORIA PRIMA.

P Ominus de Montgeron in multa apud Henricum
III. gratia inter 4. & 5. costam vulneratus fuit, &
pugio rectâ qui sem adactus erat, & mediastinum
penetrauerat, deinde paulum inflectendo opposi-
tam penè partem attigerat. Et minima etiam sectio-
ne sedes ipsius pugionis indagari potuerat, & fluenti sanguini,
deinde supresso exitus parari, ac si contraria & opposita fuisset
apertio. Sed ut sæpè summorum virorum, & fiduciam rerum
magnarum habentium cæcitas est maxima etiam in rebus mini-
mis, quod ratio, quod tactus, quod tumor quidam eminens princi-
pio dictitabat, nimirum fieri debere eo loco apertionem id differ-
tur, negligitur, tandem necis occasionem allaturum. Ingens fuit
hæmorrhagia, insignis alicuius rami venæ αζύγης cæsi argumen-

tum. Iussus omnino quiescere. Nulla tussis penè toto morbi tempore, Difficultas spirandi exigua, Poterat in vtrumque latus dormire. Quidam ex Medicis volebat experiri, num alacer esset in se erigendo, iubebat vt sese æger paulum erigeret; maximè vt detegeretur, num aliquid in capacitate esset, quod motu ipso deprehenderetur. Sed, vt inter pares inuidia facilè se iactat, aliis id non placuit; maximè vero quòd eius opinionis autores primi non essent, & tamen id ad explorandum maximè fuerat opportunum, post 4. diem initum consilium (quoniam vulnus ad cicatricem tendebat) super iis quæ ad vulnus attinent, num tuto sineretur claudi, an vero dilatandum foret, an omnino claudendum, diuisæ fuerunt sententiæ. Alij omnino debere claudi censuerunt, quòd multum sanguinis & spiritus effluxisset, quòd nil alienum videretur in capacitate contentum, quòd Gal. & Guidonis consilio vulnera thoracis primo quoque tempore essent ad cicatricem ducenda, alioqui fistulæ metum esse, & sphaceli alicuius, aut syderationis in pulmone, qui alioqui alieno aëri & externo assuetu, facilè affici alterarique posset. Naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad vrinas, aut intestina. Pleuritides beneficio naturæ transumpta exuctaque materia curari. Alij contra nitebantur suspecta esse ægri bona & præter rationem allevationem. Insigne vas incisum, sic non esse probabile, vt intra quatrimum clauderetur. Formidabilem esse cicatricem externam, quòd cum pars interna sit mēbranosa, propterea que amplius vulnere diducatur quàm carnosa, & tardius coalescat quàm ipsa carnosa, metus sit ne falsa opinione internæ membranæ ad cicatricem perductæ, præter opinionem vulnus refricetur & refringatur. Ac tum fortè non amplius locus erit pyulco, aut euacuationi suppressæ saniei. Dicebant nil referre, si benè habere videretur primis diebus, sed expectandos alios dies criticos, & quid serus vesper veheret. In his vulneribus tuta omnia timēda esse. Non metum esse debere fistulæ, nisi vulnus consenuisset. Non ita metuendum esse ab externo aëre, quòd plus detrimenti esset affuturum à suppressa sanie, aut pure, quàm ab externo ambiente. Et qui dictum est naturæ opus committi debere, & aliàs tutiores vias confinxisse naturam: contrà dictum nouercam & brutam esse naturam, & aliquando veluti consultò, pus & saniem ad tempus seruare; quod cum cōmodè excerni non potest, repentina mors obtingit. Sic satius esse cum vulnus hic & pateat, si quid alienum sit, illac expurgare, quàm aut nouas vias comminisci,

comminisci, aut occlusum obseratumque vulnus denuò aperire, magna enim esset ignorantiae suspicio, & iuncta crudelitatis opinio; immò & tutissimè fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant & locum esse idoneum sectioni in purulentis. Qui praeerat omnia sic moderari voluit, vt vtrique parti adblandiretur: at istae blanditiae & temperamenta aegrum perdiderunt, desitum est vulnus cicatricem contrahere. Triumphus antè victoriam caneatur. Iam satagentium quorundam Chirurgorum avaritia, sibi loculos amplissimos acquirebat ad emungendam regiam liberalitatem, attentiores ad rem erant, non aegri rem, sed suam. Regis qui frequenter aderat (aeger enim erat amicus Caesaris) beneuolentiam aucupari volebant, & in hoc omnis eorum ratio, animus, industria, & negotium otiosum versabatur. Iam libellos supplices vulgo placets, ad demerendam Regis liberalitatem porrigebant. At Regis nimia diligentia & amor ad praecipitandum aegrum nimius fuit: omnes enim id vnum studebant, vt Regi placerent, vt aliquid agere & dicere viderentur; sic salus aegri negligebatur, & si quid aliàs malè gestum fuit, hinc malè gestum est. Itaque Regis spes fallitur, aegri salus deseritur, foro & scaenae seruitur, avaritiae locus quæritur, mons parturit, nascitur ridiculus mus, & his artibus in opprobrium & artis Medicæ & Chirurgiæ omnia conuertuntur: minùs enim benè tractatur quàm aliquis de plebe homuncio, aut scrutorum venditor. Porro supprimitur sanies in thorace multa, febris perseuerat, alui profluuium, macies, tandem de repente difficultas spirandi, πύκνως, & inde mors, hæc contigit circà 33. diem à vulnere. Apertum cadauer, 3. aut 4. libræ sanguinis saniosi in capacitate thoracis inuentæ sunt, corpus ipsius pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagionem erat velut tabo infectum, & membrana succingens erat syderata. Mirum quòd toto morbi tempore nulla pene tussis fuit. Si tantula pars humoris pleuritim facientis tussiculas adfert, cur non tanta saniei pars in thorace & circum mediastinum suppressa? nullus dolor lateris, nullum sputum cruentum.

Nobilis vir in bello ciuili per fuga multa tulit incommoda; in tot tantisque discriminibus cœpit laborare destillatione à capite postico, præsertim in humeros & cervicem, hinc colli ac cervicis contorsio quædam. Et cum tempore occursum non fuisset remediis ad id institutis, ita malum increuit, vt facies in posteriora detorqueretur, & non nisi magno conatu in anteriora reflecteretur.

At siue bibere, siue edere, siue loqui vellet, funiculo in eam rem comparato retrahebatur caput aliorsum inclinans. Nunquam Luterianis Medicis quidquam tale videre contigerat. At laborandum fuit in specie morbi inquirenda, & remediis accommodatis. Videbatur nonnullis vnus partis esse resolutio, quæ alteri conuulsionem attulisset, quod non erat credibile, nam in eodem statu pars perpetuo permanisset. At reducta facies in suum locum nisi magno conatu & magno cum dolore sisteretur, conuulsio quodam modo statim reuellebatur in postica, magnâ omnium qui aderant admiratione. Conuulsio erat reuera, & omnes muscoli erant affecti & viscoso frigidoque humore imbuti, qui discussus vsu rerum calidarum affectum sustulit.

3. Mirum & inauditum quod contigit D. Colino Scabino Calen-
tensi Synocho febre putrida laboranti. illi multoties educitur sanguis, febrilis incendij restinguendi gratia, vnâ horâ, aut alterâ post celebratam phlebotomiam, sanguis vasculis exceptus vermiculis plenus conspicitur, vt in putri & verminoso casco obseruari solet. Nihilominus conualuit. Causam tantæ putredinis referebant Medici ad grauem malignamque exhalationem in aëra sublatam ex vacuata cloaca ciuitatis inquinamenta, & purgamenta excipiente, quæ ambientem permixtione labefactauerat, & exitiali labe conspurcauerat.

4. Cuidam mulieri quinquagenariæ obortus in ventre tumor, hydropis opinionem faciebat. Ante morbo graui afflicta fuerat, victa ars malo graue symptoma non arcuit. Has tumentis aqualiculi molestias menses aliquot tulit, donec in hydropem cõfirmentur. Fœditas coloris, carnis ac molis collapsus, marcor & eminens abdominis tumor asciten significabant. Afflicta annos aliquot morbo ac symptomate victa excessit. Apertum cadauera, qua intercus copiosè erupit, lien ac iecur vitium fecerat. Intestina velut tabo infecta conspiciuntur. Nec alia occultior diuturnæ calamitatis & mortis occasio quæsita est, donec in latrocinantis & penitus scrutantis Chirurgi conspectum se mesenterium dedit. Occurrit aliquid insolens cuius nouitas non tam admirationem peperit, quàm admiratio expectationem superauit, omnibus stupor fuit; inuentum est mesenterium ab intestinis separatum & absolutum. Pondere, qualitate, abscessuum insolentium, tanquam latentium scaturiginum vbertate, suprâ quam credi potest fuit prodigiosum. Dena pondo pependit, densum, corpulentum, succulentum

plus iusto. Longius, latius & altius quam natura ferret. Sed abscessuum perennitas maiori admirationi fuit. Nam & melicerides, & steatomata pullularant. Tumores ex iis quidam adeo increuerant & satiati fuerant, vt exigua punctione ingens humoris mellei copia æstu quodam exundaret. Multiplices tumores & lacunas humoris varietate, aut prudens, aut inconsulta natura quasi cellulis distinxerat. Aliàs coacta ac conglobata materies atheroma potiùs exprimebat, aliàs ob solutum, sed aliquantulum viscosum quem continebat humorem in meliceridon familiam tumor erat potiùs natus cooptari. Choerades non apparebāt, sed hic humor in naturam strumofam fortè degeneraturus erat. Sic omnia monstrosa. Digladiabantur etiam anatomes gnari & ancipites erant, an esset mesenterium id quod apparebat, an quid aliud. Stupore quodam, nutu, renutu, hæsitazione potiùs rem definiebant ac diiudicabant (aut se fingeant diiudicare) quam graui aliqua ratione. Ex mutuo ore alij mutuo pudibundi ac dubitabundi pendebant. Ita herclè hæc pars tanquam deformata & in aliam naturam μετα-
 λαβῆσα naturam propriam ac formam exuerat.

Nobilis phreniticus per nouem dies decubuerat. Nulla arte conciliatur somnus, circa nonam noctem omnia exacerbata. Exiliebat, & medico assidenti manum afferre volebat. A ministris in lectum coniectus est, fingit se dormire. Inopinatò è lecto surgit, & è sublimi fenestra, in medicum qui in area stabat incidit præceps. Miraculo sanitati restituitur. Putant casu discussam materiam, copiosæ vrinæ fluxerunt, simile quid apud Hipp. lib. 5. epidemiorum. Cuidam crurum rigor erat, & diurnus: fortè in lapidem cecidit. læsum caput est, vertigo oborta est. desit malum vetus.

Mulier paupercula se vtero gestare opinabatur, venter intumuerat valdè. Exacti sunt perfecti foetus menses, nil producitur, tumor perseverat. Alij eam hydropicam existimant, alij molam gestare autumant. Posteriorum opinionem euentus meliorem detexit. Nam cum annos sedecim has tumoris molestias tulisset, emaciata interiit. Aperto cadauere apparuit vterus, vndiquaque distentus. Magnam cucurbitam & profunditate densitatēque, & amplitudinem referebat. Adeo induruerat vt apprimi digiti non possent. Crassities digitorum quinque penè erat, pendebat pondere libras nouem cum dimidio. In capacitate interna, massa quædam carneâ concreuerat, quæ pertinaciter interno corpori vterorum adhæserat, immo in eius naturam penè coaluerat. Molam

esse putabant, quæ flexu temporis diuturnioris ita vteris ipsis magno adhæsu & pertinaci coniuncta, in similem naturam vna sui parte coiuerat. In colo vteri abscessus erat steatomatis naturam referens, cornua manifestò apparebant, testiculus tantum vnus erat. Miraculo multis dissecta hæc pars exhibita est ad spectandum.

7.

Ioannes Hualdus annos natus viginti & duo, de dolore capitis queritur, humiditate cerebri effusa in opticos nervos occæcatur, Aduersus id omni præsidiorum genere oppugnatur, nil proficitur, immo & empiricorum præsidia aduocantur. Audio tãdem visum aliquatenus recuperasse, dolores perseverant capitis intolerabiles, omnium remediorum vim malum superauit. Præ mali diuturnitate & vehementia interiit. Aperto cadauere abscessus reperti sunt in processibus (quibus vires & munia certa à natura tribuuntur) mammillaribus. Illos abscessus melicerides vocare possis, quamquam ad scirrhum proximè accedant. Os frontis erosum erat & perforatum vi humoris acrimoniaque; foramen erat instar quadrantis qui tres denarios pendet. Circum foramen obsita erat caries multa quæ tempore exedisset. Ossa autem ethmoidea parte interna magis cariem contraxerant, & paulò antequam interiisset nec videbat, nec odorabatur. Conuulsus interiit. Vno antequam interiisset anno pedes incuruos retractosque habebat, adhibitis particularibus frictionibus ex hydrargyro, ista contractio sublata est. Sed antequam fatis concedit, præ conuulsione & manus & pedes incuruantur, & sic miserrimè suum diem obit. Putabant venefico poculo imbutum, sed male. Sed tanta fundi calamitas non aliunde orta erat peritorum consilio & opinione, quàm à latente luis venereæ veneno. Arque reuera signa aliquot paruerant: sed in primariis istis liberis, si quid peccatum sit, omnia solent leuiora æstimari. Contendebant quidam eum ad luis venereæ curationem adigi debere, vndelibet hoc malum natum foret: sed metu pecuniæ amittendæ ex venditione magistratus in quo erat constitutus, aut ne ea de re eliminaret quiddam, curatione superfluum est. Nec dubium est quin spes aliqua curationis superesset, si plus valuisset virorum bonorum sinistrum aduersumque rerum exitum metuentium autoritas certa ratione roborata, quàm aut amittendæ pecuniæ metus, aut fucata nonnullorum opinio malo ad blandiri solitorum.

Claudius Prior cum sumptuum metu medicos consulere ne-

*Tamen ex
abscessu illi
ex ossium ca-
ries potest ab
alia causa
quam à ve-
nere aut vene-
no oriri vide
quod scripsit
Hipp. lib. 2. de
morbis cap.
de carie ossis
capitis.*

PARADIGMATVM.

301

glexisset intolerabili siti cruciabatur. Hinc mero soluere nitebatur. Adaugebat magis. Viscera habebat calidissima, intemperantissimè vixerat, & malè affectos pulmones malèque affectum iecur elephantica facies demonstrabat. Malo vires quarente raptis sursum humoribus & aluo astricta penè suffocatur. Stertit, lingua densatur, apoplecticus quodammodo fit. In ore densitas ista linguae remanet, circum venas ranales batrachion nascitur, in gargarone quoddam *ἑπιφλόγισμα*, ac si angina esset *ἐρυσίπτελα πύδης*, loquendi magna difficultas, omnia ex arte fiunt: tamen cum non febriret multum, inopinatò septimo die natura irritata moliri vult aliquid. Nescio quæ materies in pulmone conclusa mouetur, ac si abscessus aliquis esset. Lactatur, resurgit sæpè, stertor, mors. illa sitis ingens à pulmone calfacto ob pituitam putrem nata erat. Erat vel erysipelas in pulmone improprie dictum ab Hipp. denique hoc fuit pleripneumonicon. Simile passus est piæ memoriæ Doctor Thersophus Galterus: cum enim inextinguibilem vnus mensis sitim sustinuisset, oborto leni dolore lateris, intra quatrimum interiit.

2. de morbis.

Mirum quod obseruatum in aperto cadauere cuiusdam virginis: ea cum per menses aliquot laborauisset, & iam de hydropemetus esset, vi morbi interiit. Internum corpus obsitum erat exiguis admodum abscessibus, quorum infinitus erat numerus. Sebium contentum in iis videbatur: speciem internarum chæradon putabant.

9.

Nobilis mulier frequenter animo deficiebatur, omnibus remediis magnam & malignam vim morbi oppugnantibus consulebatur. Aperto cadauere in sinistro cordis ventriculo repertus est exiguus quidam grumus sanguinis qui ibi concreuerat, hinc repentinæ mortis occasio.

10.

In obsidione Rupellæ cuidam nobili globulo sclopetario transfoditur pectus à costis mammæ sinistrae subiectis ad infimas nothas costas lateris dextri; præsertim quæ parte sita est cartilago xiphoides: hoc tamen vulnus curabile fuit. At anno post obortus dolor est intolerabilis colico simillimus qui nulli cessit remedio. Eo extincto apertum cadauer. Inuentum est diaphragma parte sua carnosa perforatum superiore ictu. Atque foramen illud aliqua ex parte obductum erat caruncula quæ circum accreuerat: Tamen per reliquam rimulam colon intestinum sensim subiue-

11.

P p iij.

sui parte ingressum fuit: idemque contigit quod tenui vulpeculæ apud Horatium, cum enim intumuit egredi non potuit. Denique ut fit enterocoele in scroto, ita enterocoele facta est in pulmonis capacitate.

12. Alteri à simili ferè in diaphragmate vulnere, ventriculus subiit pulmonis capacitatem sensim, & intra breue tempus interiit.

13. Mercatori dolor summus ad spinam dorfi, annum integrum laborabat. Quod aliquando lue venerea infectus esset, id attribuebant veteri morbo. Ter aut quater litus est. Nihil malum quieuit. Tandem sursum deorsum ingens sanguinis copia excreta est. Aperto cadauere Aneurisma compertum est in diuisione magnæ arteriæ ad ilia, quâ parte spinæ incumberet.

14. Ioanni Formaget dolores ad vtrumque hypochondrium ac præsertim ad sinistrum. Solo manus apulsu dolebat, manifestus erat pulsus in liene. Nos aneurisma esse suspicabamur. Eodem die quo secta vena exolutus est diffuso affatim sanguine. Putruerat lien, & grumosi sanguinis sinistro in hypochondrio magna copia reperta est.

15. Cuidam omnes arteriæ micabant manifesto. Mirum id fuit. Instituta diæta curatus est.

16. Mulier præpinguis macrescere volebat. Creta & aceto sæpè muliercularum & empiricorum consilio vsa est. Hinc pylori constrictio infecta est tanta, ut inde morse euenerit.

17. Cuidam lien sua mole iecur superabat. Crediderunt medici illud iecur à tanto liene in coctionis munere perficiendo adiuvati.
Fernel. c. 7. l. 1. physio.

18. Cuidam vnus tantum ren erat, sed mira magnitudinis mole alterius defectum compensabat.
ibid.

19. Cuidam dolor capitis implacabilis circum futuram coronariam. Irrita medicamenta. Qua parte dolor designabatur, eadem facta scalpello sectio. Non profuit. Aperto capite repertus est vermis inter caluariam & piam matrem situs. Si terebrata caluaria fuisset, spes vitæ aliqua fuisset.

20. Filius familiæ cladem gallicam patiebatur. Dum id clam esse vult, imperito barbitonfori rem credit. Hic rem paruifaciens nil interesse putat quo modo morbus curetur. Nam æger toto die ad prima munia redibat, deinde sero benè cœnatus duabus horis post illinebatur hydrargyro: nox ita transigebatur. Mane circiter deci-

mam patris mensæ accumbebat. Et ita morbo defuncturum se putabat. Sed de repente centum penè locis tubercula apparuerunt atheromatis simillima, & paruarum lupiarum instar. Elephantiasis metuebatur. Remedia ad elephantiasin vsurpantur: media curationis via obiit.

Inueni cuidam magna in ventriculo cruditas erat, febris quotidiana successit. initio paroxysmorum syncope: deinde epilepticæ conuulsiones. Quid hoc rei?

21.

*Hieronymus
Sabucinus.*

Magdalenæ ad ædes diui Marci habitanti pes palpitare vehementer ex pollice dextro cœpit. Hæc palpitatio hinc rectà ascendebat per crus, femur & lumbos, donec ad caput perueniret, quo contacto desipiebat, postea statim conuellebatur spuma ad os facta.

22.

idem.

Mulier quædam strangulæ matricis erat obnoxia. Sæpè in comitiales conuulsiones incidebat ac syncopas. Hoc malum cum sæpiùs tulisset, nec vllò remedio liberaretur, excreto tandem è vulua nigro quodam humore & crasso, miraculo euasit.

23.

idem.

Philosophus quidam intolerabili capitis dolore tenebatur, pars dolens in syncipite magnitudine digitorum non superabat. Aperto capite crassior membrana ea parte in qua dolor excitabatur caluaria adhærebat pauculo humore putri interiecto. Annorauit quodque autor idem quosdam comitiales factos fuisse quod pars vnguenti ex hydrargyro in aurem incidisset. An hoc verisimile est.

24.

idem.

Cuidam familiaris erat prolapsio intestini in inguen, fortè illi bubo venereus oboritur, suppuratur. Aperitur scalpello pars. Ita dum cicatrix obducitur, ita firma fit pars vt via præclusa sit descensuro intestino.

25.

Coquus quidam difficultate meiendi tenebatur, aliquando suppressio erat vrinæ. Calculum in vesica, aut aliquid simile suspicabantur. Per quædam interualla malum repetebat. De repente interiit, subitæ cladis causa reperta est aneurysma ruptum, valde enim erat dilatata arteria quæ vasis vrinariis subiacebat. Ac credibile dilatationem istam arteriæ difficilis mictionis causam fuisse.

26.

Grauidæ mulieri octauo mense abscessus ex aure erupit, filius eius hoc partu editus perpetuò purulentas aures habuit.

27.

*Fer. c. 11. l. 1.
de morb. caus.
Hip. 5. epid.*

Quidam opimo corporis habitu, bibax, diebus octo ex ingenti corporis mole in magnam gracilitatem, citra vim morbi collapsus

28.

idem de vrinis c. 11.

est. Et magnam vrinæ copiam profuderat, repentini collapsus & extenuationis causam.

29.

Idem c. 10. de febr. forte idem D. Sangermano contigit cui erat familiaris vomitus.

Quidam ætate florente epulans liberaliter, quotidie bilem vomebat. Hæc cessat vomitio; hinc ventriculi dolor immanis cum nausea & tussi inani. Viciis die rigebat citra febrem. Exactis diebus xv. tertiana corripitur; hæc soluta resoluuntur omnes partes quæ sub capite sunt. Aperto corpore bilis prassina sincera reperitur in cauo iecoris pondo libræ membranæ coercita, & huius portio in nervos spinæ iam irrepserat.

30.

Quidam in cymeterio sancti Ioannis à lithotomis sectus, detracti quinque lapides. Mirum quod illi per totam penè vitam contigerat. Alius nil penè reddebat nisi liquidum, aut sollicitata pharmacis. Nesciebatur quò id esset referendum. Aperto cadauere repertum est in medio vnius crassi intestini annulus crassus & durus qui mediam penè intestini partem occupabat. Sic crassiora excrementa non poterant transmitti.

31.

c. 9. pathol.

D. du Peron per 15. menses alius liquidiuscula deiciebat. Tandem excretus ingens lapis qui continebatur in intestinis. Fernelius multos recenset quibus ab intestinis lapides deturbati sunt etiam sine dolore.

32.

Rassius obseruauit detracto pilo vno eorum qui in cauitate nasi nascuntur, cancrum teterrimum contigisse. Quod notandum, nè quid hæc temerè fiat.

33.

Filia Bartholomæi Roland ventris tormina quæstæ est, vomitiones assiduæ. Dolor nulli cessit remedio, dolore victa mortua est. Stylo abdomini immisso exiguo admodum foramine flatus erupit, & totum abdomen resedit. An non viuenti metu repentinæ mortis ista punctio fieri & potuit, & debuit. Audendum hercle desperatis maximè rebus.

34.

Dolebat sartor quidam, & suppressionem quandam vrinæ patiebatur. Erat autem pituita obstruens vrethram quæ id faciebat. Ille dum niteretur, acu pituitam aut inducere, aut educere, ea fortè impacta isti pituitæ introducta est; tribus post annis educus est ex lithotomo lapis. Hic ita acu erat transfossus. Nunquid id miraculi instar est?

35.

Puero cuidam in pupillam oculi stilus acutus adigitur: aqueo autem humore effuso quæ ictus fuerat oculus, minor aliquantò reddita pupilla est, corneæque in rugas contracta est. Sed qui effusus humor erat, collectus est, & in locum suum refusus, vlcere ad cicatricem

PARADIGMATVM.

305

cicatricem perducto sanitati æger restituitur. Rara hæc sunt: nam cum vlcus pupillam attingit & aqueus humor funditur cæcitatiscertissima metus est; id tamen Galenus obseruauit cap. 2. lib. 1. de sympto. causis.

Cuidam Chirurgo cum per dies aliquot cum summa cutis siccitate & squalore febris assidua, periculum mortis crearet, ac iam de funere ageretur: audacioris medici consilio propinata aqua quantum ebibere posset: deinde vestimentis circumtectum corpus: sudores manauerunt: alius liberior fuit, conualuit. Ab eo tempore familiaris fuit ob refrigeratas impendio partes alui fluorex interuallis repetens. Iam annos 24. perseuerauit. Mirum cur maior offensio non contigerit. In methodi medendi lib. 9. vetat Galenus ne siccis calidisque corporibus aqua exhibeatur, quod partes solidas lædat, verba Galeni hæc ferè sunt: Intempesti uè aqua præscripta imbecillas corporis partes concutit, vnde nonnullis ilico spirandi difficultatem, conuulsionem ac tremorem conciliat. Minus iis tuta qui paucum sanguinis habent. Nam celeriter ad partes solidas venit. Tamen alio in loco in febribus hecticis in quibus carniū est consumptio aquam mirificentiſſimè laudat. Aquæ potus, vt ita duo illi loci concilientur, initio hecticarum & intemperiei calidæ siccæ confert, & dum vires vigent. Sed si contrà eueniat, quia nil in corpore est quod vim occurrentis aquæ debilitet & frangat, damnis augetur ægrum corpus.

36.

Aristo. Mitilniensis corpore erat gracili, macro, & superius os ventriculi vt potè frigidius aquæ frigidæ assuescere nō posse sæpè animaduenerat. Morbo præhensus est, cui profligando aquæ potum ex usu esse medici colligebant. Ille verò contrà insistebat ne frigida propinaretur, alioqui, aut grauis singultus, aut conuulsionis metum adesse. Medici opinionis suæ defensores pertinaces frigidæ poculum propinant. Contigit vt æger prædixerat. Nam conuulsus inde interiit. Quod diligenter notandum est vt aliquid consuetudini tribuatur.

37.

Gal. c. 1. l. de consuetudine.

Inexhaustâ siti cruciatos & ab ea nonnullos intereuntes vidit Galenus. Primum eum qui viperam (dipsadem esse suspicatur) comederat: item qui vinum in quod forè, inciderat hoc animal, tum qui vetus vinum ad ebrietatem hauserat. Nec non qui in nauis siti diuexati temperare sibi non potuere quin marinam aquam biberent, ij celerius interierunt, quam qui ab ea tempe-

39.

Gal. c. 7. l. 1. de caus. sympto.

39. Vomitus cruenti & munctionis cruentæ ac hæmorrhagiæ causa esse potest hirudo, aut bibita, aut inter natandum naribus ducta. Et Galenus ita de homine integrè sano sensit qui cruentum euomeret. Nam fortè ille in fonte paruam hirudinem hauserat quæ tempore increuerat: alius cruentum eodem in nare adducto animali emunxit.

*Gal. 6. 5. l. 4.
de loc. affectu*

40. Fernelio occurrerunt qui cum nonnulla respirandi difficultate laborarent, ab exercitatione incalcentes lapillos tussiendo è pulmonibus extunderent. Alij pilulas erui, aut pisi magnitudine. Ac idem obseruasse se fatetur Galenus in libris *Ἐπὶ τοῦ πῶς περὶ τῶν νόσων.*

*Fern. 6. 10. l. 5.
patho.*

*Gal. 6. ult. l. 4.
de locis affect.*

41. Antipatri medici notanda historia, & cuius morbus non nihil dedit negotij Galeno, & sex mensum tempus exigeretur antequam noticiam causæ pulsus inæqualitatis haberet. Antipater omnem in multis pulsibus, immo & in vna pulsatione inæqualitatem querebatur. Causam ad vitium pulmonum, nempe ad obstructionem Gal. referebat: obstructio autem & angustia, aut cum febre est, aut necessario cum orthopnoea, neutrum aderat, quod mirum. Causam autem cur orthopnoea non esset Galenus sensit quod humor viscosus nō asperas sed leues arterias tantum occuparet. Inde notandum non omnem arteriarum pulmonis obstructionem difficilem anhelitum afferre, sed quæ in asperis non autem læuioribus est arteriis. Sed quæ in læuibus est, tandem malo incremente repentinum affert interitum, vt Antipatro quoque contigit.

*Cap. ult. l. 4.
de locis affect.*

42.

Septennis puella diarrhoea correpta plures dies grauidam olimque materiam aluo reddit. Consilium cum mulieribus ceptū est, in eam rem largè cytoniatum exhibetur. Aluus inde omnino restitit. Eā suppressā sæua tormina excitantur, adeoque intumescit venter vt repentinè hydropica facta videretur. Inualescunt dolores, stercus per os reiecitur. Aperto cadauere cæcum intestinum adeo cytoniato obturatum depræhenditur, vt illac nil pertransire posset. Immo accidere potest vt illa putris acrisque materia pereso perforatoque intestino aliam sibi viam quærat. Hinc patet nocere plurimum si aluus fluens repentinè supprimatur.

*Fern. 6. 9. l. 6.
Patholog.*

43.

*Fern. 6. 1. l. 6.
Patholog.*

Senator sanus ex coniuge sana liberos omnes surdos suscepit, & multos; huius rei causam cæcam putant. Conformationis vitio tribuunt, sed vnde.

44.

Alius cum Lutetix degebat sanos omnes liberos suscepit: &

Burdigala, omnes mutos & surdos. Item alia mulier sana coniugi sano iuncta, surdos habebat. Recens natis Fernelius, oleum amygdalinum amararum in aures instillabat. Auditum recuperabant.

Adolescens à vehemeti exercitatione cum molesta tussi torqueretur, vomica integram oui columbini magnitudine ex-
dit, in qua pus erat laudabile. Secuta hinc cruenta excretio. Con-
ualuit. 45.
Ferm. c. 10. l. 6.
Patholog.

Parrhisii duo medici repente interierunt rupta vomica in pulmonibus, cum nec febris, nec inappetentia, nec aliud simile præcessisset. 46.
Quæstio. Quæ fiat ut ita lateat vomica nec sui signum edat: cur non ab ea effertur vapor in partem vicinam qui leipothymiam afferat: hoc explicauit Hippocrates, Quibus suppuratio in corpore later, ea vel præ puris crassitie, vel loci non apparet. Sic circum voluentis materiam membranæ crassities impedit quominus à parte quicquam mali exhalet.

Quidam in vico templi fluxu alui laborauit. Sexto post anno interiit. Multis vomicis obsessum erat hepar & pars mesenterij syderata erat. 47.
Holler c. de
alui fluxionibus.

Monachus pici simillima excreuit. Extima algebant, de funere agebatur. Conualuit. Ne credas omnem qui per inferiora excernitur nigrum sanguinem malum esse & atrabilarium. Nam Hippocrates ait 4. aphorismorum per comparisonem per inferiora melius esse nigrum deiici. Galenus vult illum nigrorem tarditate egressus acquiri. 48.
Holler. c. de
dysenteria.

Adolescens annos 12. natus bilioso fluore vnà cum febre correptus deiiciebat dysentericis similia, nigrum sanguinem. Sitis, extima algent, vigilia. Obiit 9. die. secatur cadauer. Oesophagus ad ventriculi os superius & medium thoracem syderatur, item & epiploon. pulmones vlcerati, & intestina. Sæpè in dysenterijs malum longius serpit. Relictis intestinis appetit malum aluum ipsam, præsertim cum corpus biliosum, partesque sunt imbecillæ. Quæ ratione dysenteria vis ad aluum vsque pertineat videre est in aphorismo illo. Diuturnæ dysenteria si nausea & cibi fastidium superueniat, malum. 49.
ibidem.

Alteri febris, vomitio, ventris dolor, deiectiones pici & nigro sanguini similes: 20. die mors. Inuentum est vlcus vstulatum in ambitu excis omnibus tunicis ventriculi qua parte in pyloron decliuus est. Toto morbi tempore aluus procidebat. 50.
Holler.

Et nos in fabro lignatio obseruauimus rem commemoratione 51.

Qq ij

dignam. A male curatis hæmorrhoidibus, & vi sedi illatâ, rectum intestinum imbecillum redditur. Cuidam rheumaticæ dispositioni obnoxius est, id est, ex quibusdam interuallis sanies olida & putris illâc manabat. Galæ & abdomini seruebat. Genetofioris vini amantissimus, habitu erat macer, squalidus. Cœpit non ita fluere ista proluxies: hinc dolores ad imum ventrem: iactationes, carentia somni, inappetentia: tum fastidia ciborum, & vomitiones perpetuæ: tamen à medicamentis lenius habebat: & naturam potius ferebat medicamenti, quàm alimentorum gratiam. Cum quid biberat ederat ve ponderis sensionem habebat in ventriculo, & veluti de obice obiecto querebatur. Nulla arte vomitiones cessauerunt, febris lenta. Tandem consumptio corporis, imus venter collapsus, partium extrimarum perfrigeratio: Mors. Aperto cadauere gibbus liuebat, fundus ventriculi & pyloron syderarum: totus ventriculus putris & laceratus est, minimo ferè digitorum conatu.

Dysenteria quidam detinebatur, repente suppressa est, & paulo post infans redditus est. Et Galenus suppressione hæmorrhoidû, & dysenteria, nephriticum atrabilarios morbos consequi auctor est. Nobilis pictor in fecem stabiem suppressâ dysenteria incidit. Et Hippocrates particul. 80. lib. 4. de diarræa acutorum, dysenteria quæ cessauit, aut abscessum, aut tuberculum efficiet, nisi vel in febres, vel in sudores desierit: & in Coacis scribit, Dysenteria in tempestiue suppressa abscessum in costis, aut visceribus, aut articulis facit. Causa cur suppressa semel dysenteria aluus ita restringatur, est quia siccatur intestinum humore furibundo suppressio: & tum pus in intestinis manet quod tandem interficit. Quod in plerisque obseruatum.

Domino de Mancy calculosi renes suppurarunt & collique facti sunt, adeo vt pellicula externa remaneret. In aliis idem obseruatum.

Cuidam subito resoluitur vesica cum repente dolor incidisset in os sacrum & coccygis, vrina supprimitur. Tamen rursus, aut manum pectini ad mouens reddebat. Rectum intestinum arxiduro redditur, clysmata non sentit. Ad motis contra paralyfin remediis conualuit.

Primarius Collegij diuæ Barbaræ longa vrina suppressione diuexatur. Vi remediorum aliquando meiebat, solus ren dexter calculo erat occupatus. Cur non sinister officium suum fecit?

52.
Holler. c. de
dysenteria.
Gal. l. 6. de
diffinitione ad
uersus Eras-
stræum.
Hipp.

53.
Hipp. in Coac-
is.

Holler. c. de
dysente.

54.
Holler. c. de
stranguria.

55.
ibidem.

PARADIGMATVM.

309

Nobilis quidam in pueritia seclus fuit. Grandiori dolores ad vesicam, calculi signa aderant. Ca herere tamen deprehendi non potuit. A malè curata cicatrice abscessus & gangrena venit, interiit. *Holl. c. de strangu.*

56.

Mercatori omnia calculi signa, Catheter probare non potuit. Mortuo duo magni calculi reperi sunt, singuli sua membrana inclusi. Membrana illa iudicium catheteris eludebat. *Holl. c. de lapide vesicæ.*

57.

Vidi puerum annos duodecim natum qui calculum in vesica haberet, intolerabili dolore cruciatur. Interiit vno ante obitum anno, adeo putrem olidamque materiam meiebat cum dolore strangurioso (vt sic dicam:) vt qua parte vrina vestimento hærebat in ea vermes nascerentur. Notandum hanc humorem pituitosum, putrem, & purulentum humorem (sine vlcere tamen) eadem symptomata inuehere posse quæ & calculus ipse.

58.

Aduocatus meiebat vermes à pituita in vesica succrescente. Alius intolerabili conciatu pituitæ quæ in crystallum concreuerat, partes aliquot excernebat. Quidam annos 20. vrinam cum capillitio vrinam excernebat. Præses pituitam lentam, corruptam magna quantitate meiebat. Notat quoque Hollerius à renibus pus excerni: nec necesse esse vt sanguis vnà excernatur. Item in pulmonibus & capite inuenti lapides. Et ab abscessu renum tabes contingit, hinc mors.

59.

Holl. de calculo vesicæ.

Mulier cum cruciatibus purulenta, vrina profluebat. Quarto post mense interiit. Duo calculi in corde cum multis abscessibus reperi. Renes erant integri & via vrinariæ. Mirum quæ tantus dolor cruciarer.

60.

Holl. c. de lapide vesicæ.

Mercatori dysuriam patienti signa omnia calculi. Sexto non reperitur lapis. Ad collum vesicæ caro concreuerat. Idoneis consumpta remediis, conualuit. Observatione dignum est quod mictus cruenti in plerisque perspicuntur. Non tamen magno terrori esse debent. Nam annotat Celsus lib. 4. post vehemens exercitium sanguinis mictum contingere, quod lassitudinem à labore contractam leuat. Hoc autem præsertim iis contingit quibus solemnis euacuatio aliqua suppressa est.

61.

Aduocatus Perrot minimas carunculas sæpè meiando excernebat. An non id a renibus?

62.

Holl. c. de mictu cruento.

Moniali cuidam mictus cruentus: at & ob exercitationem potest contingere, & ob suppressos menses, (vt huic contigit) & *κρίτικος.*

63.

Qq. iij

64. Aduocatus Archambault sæpè per os sanguinem excernebat, per aluum & vnà cum vrina.
65. *Holl.c. de vermibus.* Puella album vermem latum, palmo maiorem satis crassum reiecit per nares, nulla tussi, nullo vomitu antecedente. Præcesserat acerbissimus capitis dolor per duos dies. obseruauit Valescus de Taranta dolores capitis à vermibus esse.
66. *ibid.* In quodam cum præcessisset lumborum & regionis renum dolor, è renibus ipsis cum vrina vermes reiecti sunt.
67. Puer natus annos 12. ex interuallis longos vermes, albos è ventriculo reieciatbat. Erat commotio, morsus, sitiebat, angebatur.
68. *ibid.* Excretum vermem, Tineam vocatum, nouem pedes longum obseruauit Valeriola. notat quoque Sanaronola vermem pedes 15. longum excretum fuisse, lib. de vermibus cap. 1.
69. Senex cum ea symptomata quæ & pueri conflictati vermibus, passus fuisset, quingentos excreuit vermes propinato medicamento è scordio & corallina.
70. *Holler.* Mulier rustica palpitatione cordis & inflatione ventris, ac si vtero gereret, laborabat. Vermes prodière quam plurimi, conuuluit. Sæpè insolentia symptomata vermes afferunt.
71. *Holl.c. de hæmorrhoid.* Nobili cuidam, cum in grauissimo renum dolore pus, sanguinem & crassam pituitam meieret, quia tumebar hæmorrhoids, & dolor non cedebat remediis, apertione hæmorrhoidon, incredibili celeritate dolor conquieuit.
72. *Cap. de exitu ani.* Mulier nil excludebat stercoris, dolor in ano ingens, implacabilis. Speculo immisso nil apparuit. Tandem summa vi & eo conatu & dolore qui in difficili partu est, rotundum globulum è cæco intestino deiecit. Is globulus tunica erat inuolutus suberis substantia, herniâ laborabat.
73. Dominus de Vau-iour annos natus viginti cum palpitatione annos aliquot laborasset, assumpto cassiæ bolo eodem die interiit. Quod iis contingit qui ea palpitatione molestantur. Omnes arteriæ euidenter in singulis ferè partibus palpitare videbantur. Aperto cadauere adeo omnes cordis valuulæ & magna arteria distenta visa est, vt cor triplo, aut saltem duplo amplius videretur.
74. Nicolaus Magnus & nomine, & re, præ ingenij excellentia magnus à decimo nono ætatis anno palpitatione laborauit. Narrat se tum palpitationem incipientem sensisse cum annos vnde viginti natus contentius in vmbatili philosophorum xylo disputaret.

PARADIGMATVM.

311

Nam cum aliis aliud contingere soleat, non mirum si in ea contentione quidam in epilepsiam incidunt, in palpitationem alij. Atque ab eo tempore ex intervallis ea palpitatio repetere solet, eamque ex stomachi cruditate originem habere credit. Nam flatibus erumpentibus leuatur plurimum: & cum accessio adest necessario illi decumbendum abstinendumque à cibo & potu. Exactis horis aliquot sudor manat toto corpore, alleuatur, cibum capit.

Puella tremor in sinistra parte in facie & thorace, non autem in partibus inferioribus si in sinistrum incumberet, mouebatur. Quiescebat autem in dextrum deuoluta. Mane & vesperi mouebatur, caloris & frigoris erat vicissitudo, suppressi menses annis ferè tribus. Facies saturato colore. Tenasmus, dolor stomachi, lien inflatus, huic vincula vteri erant resoluta.

75.
*Holl. c. de exi-
tu matricis.*

Dominæ de Rochepot cum varicosa esset hysterica affectione præhendebatur cum delirio, risu, lacrymis, oculorū contractione.

76.
*Holl. c. de hyst.
affect.*

Filiabus Præsidis Rothomagensis in motu vteri sursum quo ex intervallis agitantur, risus, præsertim dum paroxysmus instaret. Risum nec monitu, nec minis compescebant. Respondebant se non posse illum continere.

77.
ibid.

Mulier cum 9. menses videretur vterum gestare, cum omnia paruissent quæ in legitimo partu accidere contingunt, nil aliud præter quædam animalcula ranis similia excreuit, cum multis purgamentis cruentis.

78.
Holl. c. de mor.

Alia cum perfecto foetu molam excreuit ac si aliqua esset superfoetatio.

79.

Cuidam cultello aperta, hernia aquosa fuit. Hinc in gangranam, dolorem intolerabilem & delirium incidit, mors expectabatur. Excluditur multa aqua per viretram, concisa magna pars gangranæ conualuit.

80.
Holl. c. de ent.

Quidam diu pila palmaria luserat, lassus somnum iniit in peristerotrophæio. Repente elephanticus euasit.

81.
*Sylu. com in
l. Gal. de febr.*

In colicis doloribus cauendum ne decipiamur. Nam sæpè in fine febrium, contingit à centro materiam regeri in abdomen, ibique dolores excitari colicis similes cum in intestinis nulli, aut exigui flatu contineantur. Sæpè humor biliosus ferit & distendit, doloremque excitat qui colicum mentiatur, interdum continentur abscessus à quibus dolores colicis non absimiles excitantur. Quod obseruauit Fernelius & nos post illum.

82.

Aduocatus Gilot dolore colico cruciari putabatur, sed frustra.

83.

Holl. c. de colico dolore.

Variis praefidiis tentata res est. Nil profectum. Post longa & multorum annorum tormina, quibus non decumbebat, sexto quo decubuit die, interiit. Huic colon qua parte vicinum reni sinistro collecta veluti cartilagine dura in scirrhum obduruerat interiore cavitae eo tumore intercepta. Atque ita nil transcurrerat. Parte dextra colon ad instar magnae vesicae dilatatum medicamentis erat. Superiecti vicinique musculi abdominis & peritonaeon erant saniosa.

84.

Hieronymus Germanus colicum dolorem pati putabatur. Quarto die interiit extimis ante frigentibus, languente pulsu, sanguineis spectris ob oculos obuersantibus. Huic interna in visceribus & intestinis inflammatio & putrilago erat.

85.

Sacerdoti colici dolores acerbissimi. Secuta deinde est paralytis quae sedatis doloribus remansit. Nam & vi doloris, & per modum abscessus irritata materia *ὀξύλυσιν*, potest afferre. Id frequenter contingere asseuerant Pictauiensibus.

86.

Mulierem sexagenariam vidimus quae fluore tetro muliebri constabat, diu perseuerauerat. Nescio quo remedio repressus est, hinc natus diabetes fauissimus quo emaciata tabefactaque interiit. Narrauit nobis se in renum regione sensum ingentis frigoris saepe praecessisse.

In tumore abdominis & hydropis specie multa saepe obseruantur memoratu digna. Nam & pars detumet & euanescit sine manifesta excretionem.

87.

Hollar.

Negotiatori Parisiensi in Angliam profecto cum is intumeret valde, tumor miraculo quodam subsedit, euauit morbus, nec rediit. An quod tumor partim vi caloris naturalis cum viscerum robore coniuncti discussus fuerit, an quod adiutus fuerit ab aere marino cui se commiserat in negotiatione?

88.

Cuidam hydropico sudores toto corpore manarunt, & aqua totum corpus diffusum erat, hinc curatio.

89.

Hipp. in coacis.

Piscator 12. menses quartana laborarat: huic male curatae & ob improbam victus rationem hydrops successit. Deinde sursum translata materia conuulsiones epilepticae & terrificae, tumor faciei admirabilis: delata deorsum tumorem pedum & scroti attulit. Hydrocele, testiculorum phlogosis & merus gangraenae: sectus est. Conualuit, tametsi pronuntiari Hippocrates epilepsiam hydropi superuenientem desperatam esse, in Coacis.

90.

Cuidam ad viuum secti sunt vngues: abdomen intumuerat; exercuit

exercuit corpus: per extremas partes aqua defluxit, conualuit.

Alteri abdomen tumidum habenti alui fluor: detumuit aqualiculus, repetiit paulò post, mors. Et nos sæpe hydropicos alui fluore interiisse comperimus: quanquam Hipp. scribit, Si hydropico aqua in ventrem confluat, bonum.

91.

Holler.

Singultiendi non faciebat finem quidam, & non nisi vsu vini Hippocratici alleuatus. Credibile est huic ventriculi os superius præfrigidum habuisse.

92.

Puella perpetuò singultiebat, nil deglutiebat, dolor in œsophago erat. Antè pulmonibus bubulis largiter vsa fuerat, hinc grauitas in stomacho, nausea, vomitus, frustulum pulmonis quem ederat, in œsophago restiterat. Cucurbitulis reiectum est frustulum & aliis adhibitis remediis: conualuit.

93.

Archidiaconi à syncope & palpitatione è viuis sublato corpore dissecto abscessus in substantia cordis inuentus est: in alterius pericardio aqua inuenta est, quæ id symptoma inferret. In Britone inflammatio cordis, in alio abscessus in vena arteriosa.

94.

Holl. c. de pal-
pitatione.
Gal. c. 2. l. 5. de
loc. aff.

Ioan. Minard Supplicum libellorum in Regia Magister interiit à magno abscessu: in pericardio tunica contenta erat materia purulenta, & hoc medicis admirationi fuit. Vnde dum viueret & bellè munia sua obiret; ex interuallis leipothymia præhendebatur: Aphonos per 12. horas, aut eò plus manebat. Huius rei causa analiò referenda: legendus locus Galeni de Simia in libris de locis affectis huc maximè pertinens.

95.

Cap. 2. l. 5. loc.
aff.

Palpitatio plerisque incidit. Pericardium flatu multo distentum deprehensum est. Et is flatus in aquam aliquando con-
crescit.

96.

Præses Rothomagensis ab ineunte ætate ad annum 55. quo obiit palpitatione cordis tenebatur, ac præsertim à somno meridiano & ubi arctius tibias decussatim complicaret. Sensus erat quidam tremulus ad carotidas. Pulsus paruus vel nullus. Soluebatur paroxysmus edito crepitu, ructu clystere; dolore in mediis clauiculis excitato, deinde in fronte, vel rufsi satis violenta sponte nata, idem mulieri contigit. Repererunt medici in vtroque cor esse calidius, frigidiorum ventriculum. Sic vapor excitabatur, quem calor discutere non poterat.

97.

Holl. c. de Pal-
pitatione.

Mulier ex balneo, aut vitiosis lignis succensis animo deficiebat. Quidam si per horam lauaretur idem patiebatur. hinc conuenit

98.

Gal. in apbo.

R r

Hipp. Aph. Qui frequenter & absque causa manifesta exoluuntur, de repente intereunt.

99. Monachus asthmate breui interiit. Dissecto repertus abscessus in vena arteriosa integris pulmonibus.

100. Quidam angina correptus cum suffocaretur, iussit sibi amputari gurgulionem, seruatus est.

101. Mihi narratum est à fide dignis puerum annos decem natum cum in regalibus egregie Hippocraticum vinum hausisset, de nocte ab angina suffocatum. Pressus dolore sibi foris intro adegit gladiolum: effluente multo sanguine sanatus, & vixit.

102. Melancholiâ morbo detentus se mortuum putabat. Medicos precabatur ne animæ quominus euolaret impedimento forent. Moncbat vt omnes viderent expirantem. Hæmorrhoidon fluxu liberatur.

103. Alius se mortuum ratus omnia esculenta auersabatur, quod nefas crederet mortuum edere. Optimo consilio effectum cadauer mensæ accumbens, cuius exemplo cibum sumpsit.

104. Sacerdos concidebat epilepticus, solum caput mouebatur, nulla alia aliarum partium incitatio. rarissimum hoc.

105. Scoto è sura dextra vapor excitabatur, hinc totius corporis concussio. Soluebatur vomitionibus biliosis.

106. Nicolaus de Marillac & Catharina olim illustri Domini Mei Supplicum libellorum magistri eodē penè morbo interiēre. Ille cum de dolore aurium intima occupante quereretur, nec non de capitis parte altera remediis aliquot aliquantulum dolor cessit: recruduit statim, non ita tamen quin munia publica obiret: ἀνέπερος ferè erat. Exactis aliquot diebus recrudescit dolor, accessio febrilis cum periodico frigore eum præhendit: attonitus statim recumbit: incipit conuelli: conuulsus cum horrendis symptomatis & ἀφρονος interiit. Serua autem tres tantum dies laborauit. Sine febre: defectiones animi præ dolore: iactationes, insomnia. Remediis non cessit dolor. Rigor seu tetanus præhendit. ἀφρονος. mors. in vtroque credibile est quoddam apostema in cerebro conceptum esse. Si euasissent, ὁ δὲ λυσιν, aut ἡμπαλῆσαν vitare non potuissent.

107. Quidam laborabat morbo medicis incognito. Suspicio nonnulla fuit poculi venefici. Argumenta aderant. Præscripto iudicis res ad medicos relata. Aperto cadauere exanthematis oblitus ventriculus reperitur. Iudicarunt toxicum præbitum, sed malè.

quidem. Chirurgus oculatus quæsiuit num antequam è viuis excessisset aliquid in cute apparuisset. Cognito quod aliquid tale contigisset sententiam retractant: ac iudicarunt à morbillis occul-
tis, vi naturæ non erumpentibus id tale euenisse. Hinc corpus in-
ternum contaminatum. Notandum hoc vt falsa de potione vene-
fica suspicio potius blanda & placida ratione in simili exemplo
fundata eleuetur, quam acerba apud iudices contentione franga-
tur ac oppugnetur.

Cuidam cum aphthosum os & gurgulio fuisset cum anhelitus
insuauitate excretio puris contigit. Aperto corpore totus inter-
nus thorax syderatus apparuit. Et nos in vico de la Bretonnerie
vidimus dominam cui saniosum os est, & veluti purulentum, fœ-
rens. Dubitant medici an à pulmonibus, an à cerebro.

Observatum est palpitationem cordis mulieri melancholia
hypochondriaca laboranti post molestias multas contigisse. Mors.
In sinistro cordis sinu pars humoris melancholici reperta est ibi
veluti concreta ac fermentata. Atque ita spiritus oppressi, congela-
tique sunt, eorumque inciratio & motus repressus.

Eques Torquatus imbecillitatem stomachi & oculorum te-
nebricosum quid obiecit homini occupato publicis muniis; con-
suluerunt vt quotidie pilulam ex aloë antepastum deglutiret. A
dolore stomachi interiit. Ferunt repertam in aluo integram mas-
sam pilularum. Nam & frequentiam medicamenti natura elusit:
& fortè cum pilulam caperet genio indulgit. Vt medicamentu-
lum impotens fuerit.

Duo excernebant sanguinem, vnus per nares, alter per os.
Cum remediis non cederet malum, quæsitum num hirudinem
hausissent. Cum huius rei opinionem fecisset quod in fonte bibis-
sent, tandem veritas apparuit. Videndum ne decipiamur in hæ-
morrhagiis, & à vitio corporis res reperatur.

Mulier hydrope vteri corripitur appetentibus menstruis aqua-
rum illuuijs per vteri ceruicem profunditur. Pelues sex imple-
bantur aquâ citrinâ. Mox stara periodo menses reduces. Rursum
par colluuijs colligebatur, & profluebat.

Senex in iram mirè propensus post obitum sine felle depre-
hensus est. In eius loco lapis concreuerat: iis aliquando in cysti cal-
culus concreuit quos grauis ac diuturnus icterus exercuit. Idem
se obseruauisse annotauit Langius & nos lapillos octo in cysti vi-
dimus in Domina de Chaulmont.

114. Neoburgu, virgo vestalis, continuis sub dextro hypochondrio torminibus vexabatur. Mors. Omnia illaesa intestina, ab hepate pendeat folliculus fellis ob pondus inclusi lapidis in substratum intestinum procumbens. Ac illud intestinum inoffenso fellis folliculo lapis ille attriuerat. Hinc dolores, tormina.

115. Trallianus narrat se vidisse quendam qui cum tussi summa ad tabem usque maciaretur, oborta grauiore tussi lapidem durum excreat, qui pavimento illisus resiliebat. Paulus quoque in pulmonibus saepe concreescere annotauit.

116. Canonicus continuo tussiebat, tonsillarum abscessu laborarat. Materiam dum discutere medici conarentur, siccitate tandem obduru in lapidem. Cum medici tussim inde ortam mitigare conarentur usu suppurantium lapis est excretus. Nam raro vicinia lapidem continens remollita est.

117. Barrachion moribus mediastinam mulierem cum suffocationis periculo tenebat, vix loqui poterat. Tandem concreuit materia in verum lapidem.

118. Cuidam tenasmus permolestus. Tandem depræhensum illius causam esse lapidem in intestino retentum.

119. Cuidam stomachi dolor acerbissimus. Excretus est vomitu lapis. Cessauerunt symptomata.

120. Barnaba Panthou confarcinatori annos 69. nato ictus & confusio ad nothas costas hepatis propinquas. Restitit semper dolor & tussiendo percipiebatur. Exacti menses sex aut octo. Tandem dolores ad aluum, insomnia, inappetentia: de nocte syncope, vomitus sanguinis. Sudores frigidi, pulsus languidus, sanguis niger, grumolus. Syncopæ repetunt. Putatur animam agere. Purgatus deinde est. Conualuit, ita tamen ut pars ea dolore non careret. Quæstio. Vnde sanguis? cur non interiit secundum dictum Hippo.

121. Vermes aliquando pruritu quodam emergunt, præsertim ascarides, hinc in fœmora natesque quoquoersum irruunt.

122. Quidam annos 20. natus epilepticus erat, nil tale passus erat antequam natus esset annos decem. At nono ætatis anno incidit in cranium quâ decurrit corona ὀβελῶν, effractum est cranium. Effectum ut quod intro pulsum erat releuaretur. Os illud quod effractum erat vitium attigerat, ideo incremento & nutritione prohibebatur. Sic reliquum cranium crescebat, & qua parte læsum fuerat non nutriebatur. Secundum illam partem tamen

cerebrum crescebat. Sic per oppressiōem cerebri quo præsertim tempore turgebat, vertigines & epilepsia.

Legatus quodam torquebatur, nec non tumore à dextro hypochondrio per ima ventriculi in sinistrum exporrecto. Sexennio toto studetur tanquam remolliendo scirrhus. Tandem iniecto acriore enemate durum quippiam ac medio ductu pertusum pedis longitudine detractum est. Portio intestini credebatur, sed falso.

123.

*Fer. c. de intesti-
ni morbis.*

Alteri grauior affectus aluum cohibuit, ventre supra modum intumescēte discessit è viuis. Inuentum est colon intestinum adeo infarctum pituita concreta, vt solidum planè putaretur. Et ideo nil facis in aluum prolabebatur.

124.

Multos cum iter facerent epilepsia præhendit, violento aëre ducto, aut per nares, aut aures. Si earum partium interitus obstruerentur, talis mali occasio præcipiebatur.

125.

Rond. c. de epilepsia.

Ingeniosi & quibus ingenij acuties est ob cerebri substantiam subtilem ac delicatam in epilepsiam propendent. Vnde Carolus V. Imperat. Mahometius & Cæsar iis affectibus obnoxij fuerunt. Et quibus ingenij vis acutior delicatiorque ij si quid contentius agant præsertim in coitione hominū, & frequētia, vt si quid edisserere velint paroxysmo epileptico capiuntur, vnde quidam putarunt non eò epilepsiam comitiam morbum dici, non quòd dimitterentur comitia si quis in iis epilepsia præhenderetur: sed cum aliàs tum maxime paroxysmum epilepticum hominem adoriri cum in hominū corona cum contentione aliqua animi agere instituunt. Vnde & aliis memoriā quoque excidit id quod à longo tempore ei erat demandatum.

126.

Nobilis quidam quartanā laborabat, Eum tadebat remedium solennium. Vulgarium opem poposcit. Præstigiis ac amulettis febris visa est quiescere. Suppressa est materia, ab ea successit crudelis dysenteria; interiit. Hinc nosci oportet fatius esse cum causa ægrotare, quàm sine causa alleuari.

127.

Virgo rigente hyeme niueis globulis cum æqualibus suis ludebat. Secuta partium extrimarum refrigeratio, febris acuta. Summus in intimis æstus, interiit. Inuentus penè recoctus uterus, & hepar vermiculatum, hæc cum macilenta esset non dubium si in tam grauem affectum hyeme ita sauiēte inciderit.

128.

Nobilis solebat epilepsia præhendi. Remediis nil profectum est: furiosus factus est, desit postea esse epilepticus. Ergo verum

129.

R r iij.

quod in aphorismis scripsit Hipp. A furore ἐκστασις superueniens bonum. huius bonæ solutionis maximè meminit Hipp. lib. 2. epid. sect. 5.

130. Cuidam tam vehemens cordis palpitatio contigit, vt vicinas costas fregerit: & eas quæ supra sinistram mammam sunt de sede propria depulerit, sæpe arteriam dilatauerit. Item in aneurisma pugni magnitudine dilatatur arteria, & visu & tactu percipitur pulsatio D. Magnus ait se cum Fernelio obseruasse effractas, vi palpitationis, costas, sed ait illas costas longè antè abscessu tentatas fuisse. Alioqui incredibilis esset historia. Alteri tanta palpitatio contigit vt vehementer defiliret manus pectori applicita.

131. Quidam cum in comitatu Præfulis caligas non exuisset, tandem cum exuere voluit partium pilos euellit citra præeuntem morbum ullum. Quod eò accessisse credibile est, quoniam diuturnitate suppressionis fuliginosi excrementi putredo concepta fuerit, hinc pilorum defluuium.

Rondeletius.

132. Mulier quartanâ laborabat, immunis ab ea fuit quindecim dies, aut plus eò. Consilio medicorum ius folliculorum senæ sumpsit. Statim repetit febris, deinde cessat. Iteratò sumpsit medicamentum, rursus febris. Hoc arguit febre cum quartana mitiùs agendum.

Dicam quod nos obseruasse contigit anno Domini 1582. Magna fuit febrium quartanarum seges & verarum, quod per se & primò contingerent. Omnibus initio adhibita remedia. Non tamen quiescunt. Hoc affirmo verum, quibuscumque sæpius exhibita sunt medicamenta & pugnatum remediis valentibus, iis omnibus producta fuit febris. Qui verò præsidia neglexerunt principio exacto, ij intra breue tempus incolumes extiterunt. Quod ab omnibus diligenter obseruandum est, & hoc primus Galenus cum aliquot veteribus annotauit. Vt malè de agris quartana laborantibus mereantur qui id student, vt medicamentorum frequenti vsu humorem adeo contumacem oppugnent & expellant.

133. Comitissæ de Mauleurier vxor cum vterum gereret casu est lapsa ad regionem lumborum, ferunt non attigisse partus tempus legitimum. Peperit. Omnia satis ex voto. Pleuritis. Secatur vena sæpius, lochia supprimuntur. Ἀπὸ πλῆκτος. Mors. Aperto cadauere ligamenta vteri rupta reperiuntur. Mirum hoc. Et forte ruptura hæc purgationis non legitimè factæ causa fuit. An non oborta

PARADIGMATVM.

379

pleuritide in muliere nuper enixa audacius mittendus sanguis? Vxor Domini Bonian mercatoris, non alia ratione interiisse videtur, quàm quia sæpius sanguis missus fluentibus lochiis. Hæc enim statim suppressa sunt.

Mulierem vidi quæ liberos habuerit & nata annos 30. semel, aut bis tantum menstrua passa fuerat. An menstrualem esse necesse est mulierem vt concipiat vtero?

134.

Mirum quod obseruatum in sene iracundo, in cysti fel non inuentum sed in eius loco lapis. Quod & Langius accidere iis ait, qui diuturno ictero laborarunt. Dominus Magnus ait, in vulgari quartanarum febrium foetura obseruasse se plerosque toto autumno & hyeme quartanarios decubuisse, ac tandem interiisse: in quorum mortuorum cysti lapis loco fellis concreuerat. His quartanis iecur autor fuit.

135.

Nobilis Domina du Bez, cum quartana laboraret modo duplice, modo simplice, modo typum tertianæ retinente, cum item & vinum biberet, & ingens intus incendium perciperet, tamen perpetuò illi aquæ vrinæ fluxerunt. Quod mirum. Siue antè accessionem, tempore accessionis, & post accessionem. Et exiguum fuit admodum caloris argumentum in vrinis.

136.

Virgo fædos colores patiebatur. Diu id mali perseuerabat. Nullis cessit remediis, iuncta viro ægrescit, fortè curru citato vehementerque succutiente deuehebatur, dolores cordis, nausæ, agitationes, morituram credebant. Omnis generis humores abundè euomuntur: aluus humescit. Momento penè primum faciei nitorem recuperauit.

137.

Nobili cuidam vrinæ diu suppressuntur. Comatosus fit, conuellitur. Vsu variorum remediorum vrina fluit. Moritur tamen. Quia suppressio excrementorum resolutionem cerebri affert: & qualitatem partibus imprimit explicatione vix perceptibilem.

138.

Ioannes le Fuzelier in Senatu Procuratorium munus exercens, tabida matre natus, eo modo, eoque morbo, & tempore eodem interit quo eius mater. In pulmonibus nil commemorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod antè mortem ei contigit, decem ante quam è viuis excederet diebus tumidum corpus fuit. Tumor fugax erat, repetebat ex interuallis. Vnde hoc? leucæ videbantur esse. Tale quid in morbis funestis contingere solere agnouit Hippocrates, Leucæ autem oboriuntur (supple in morituris) in morbis funestissimis, cuiusmodi est phthisis.

139.

Hipp. 2. prorr.

66.

140.

Mulier nunquam articulare morbum passa, fanis parentibus orta, sub dio in multam noctem sermonem producit. Ab influxu lunæ crudore quodam cerebrum percellitur. Dolores capitis ingentes, hinc omnis generis arthritidis eam adoritur.

141.

Puellæ febris continua. Elatum abdomen in tumorem. Mirum quomodo tam subito hic tumor natus. Præ dolore interiit. Ac abdomen mortuæ apertum. Magno edito sono venter totus subsedit.

142.

Mulier macilenta erat & melancholiâ hypochondriacâ laborare videbatur. Cum aqua potui dabatur, nullum dolorem sentiebat. Cum vinum aqua dilutum hauriebat, dolore vehementi eoque ad sinistrum hypochondrium tenebatur. Quid hoc rei? An quod vinum subibat lienem & subigebat succum melancholicum in eo contentum, ut & acetum facit Hippocratis sententia?

Hipp. 3. aucto.

143.

Mulieri acerbissimi dolores capitis & aurium. Sine intermissione admittebat fumum cephalicorum per infundibulum. Allevabatur, deteriores fiunt dolores. Mors. Aperto capite aquæ copia magna reperitur. Causam medici retulerunt ad vapores ita frequenter susceptos. Nec abs re. Cautos esse oportet in excitandis in aurem vaporibus.

144.

Polemarchus à medico suo venefico poculo inficitur. Inexpugnabilis erat dormiendi appetitus. Sexto post die mors, de ventriculo querebatur. In eo quibusdam maculis ventriculus erat aspersus. Medici quibus aperiundi cadaueris cura erat, satis hoc argumenti afferre putabant. Oculatio alius iussit ventriculum ab aliis partibus defecari. Præterdit apertum omnium oculis: perforatus minimis foraminibus miraculo quodam apparuit. Et hæc pertusio mortis causa fuerat.

145.

Vidi aurigam ad ripam Sequanæ pulmonicum, qui adeo viuens spiransque de se halitum emitteret, ut rotum ferè coenaculum inficeretur, & vix quisquam erat ferendo.

146.

Fer. c. 16. l. 6. patho.

Mulieri nunquam menses fluxerunt: vixit tamen incolumis. Vidi natam annos 30. quæ semel tantum menstruum passa sit, nec tamen fœcunda esse desierit, & Hip. l. 5. epid. notat de quadam cui cum annos 4. suppressi menses essent, concepit & peperit Vitalē.

Gal. c. 1. l. 1. de loc. affectis

In Perinæo quidam percutitur. Urina supprimitur oborram inflammatione, vesicam tamen plenam esse circumscriptio designabat. Affunditur aqua tepens. Tensio remittitur. Urinam facit.

Quidam

PARADIGMATVM.

327

Quidam colico dolore diuexatus ab omnibus calidis & acribus offende-
batur, item & caloricis irritabatur. Alimentis benignis iuuabatur, dolorem acrem percipere se æger narrabat. Dato medicamento ex aloe conualuit. Sic decipi non oportet in colicis doloribus.

147.
Gal. c. 4. l. 1. de
loc. affect.

Alius cum dolorem excitari putaret ab acribus humoribus sumpsit medicamentum acre. Ab hoc medicamento læsum intestinum. Quous etiam benigno cibo offende-
batur. Coniecit Gal. intestinum venisse ad διάτῶν περιτονίων, & ideo facile iecoris recrementa recipere, & corrumpere. Astringentibus cibis alleuatus.

148.
ibid.

Quidam in collo læsus hyeme. Recurrentes nervos læsio non attigerat. Tamen dum curatur perfrigerantur illi nerui. Vox perit. Vsu calidorum recuperatur.

149.
Cap. 6. l. 1. de
loc. affect.

Chirurgus strumas puero curaturus dum vas secat membranam digito euellens, imprudens neruum recurrentem distrahit. Curat choradas: mutum puerum reddit.

150.
ibid.

Homo macilentus lapidem in rene querebatur. Oxyporis calidisque medicamentis lapidi deturbando medici studebant. Aliquo post tempore digitos manus vt cauum sonantes, nil penè sentire & vix moueri posse ægrè ferebat. Paralyfin esse medici putabant. Sed à sola siccitate ob diaram exactam nata id mali contigerat. Macilentos lapidosos curare cum consilium est, cautionem adhibere oportet.

151.
Cap. 1. l. 6. de
sanitate tuenda

Dolorem capitis intulit scorpius in cerebro natus post basilicæ herbæ frequentem odoratum. Item & à vermibus in cerebro natis idem contingere posse asserit ex Indorum medicorum sententia Auicennas.

152.
Holl. l. 1. de
dolore cap.

Cuidam trium digitorum sensus ademptus fuerat. Integer autem motus erat. Medici frustra manui remedia applicabant, cum in ea parte nec perfrigeratio fuisset, nec inflammatio, nec ictus. Fortè cum veheretur curru, in spinam incidit qua parte decurrit nervus sensum digitis impertiens. Iraque sæpè læsionis argumentum in ea parte paret quæ læsa non est.

153.
Gal. c. 6. l. 1. de
loc. affect.

In eodem capite multæ extant historię eorum quibus huius, aut illius digiti, aut manus sensus ademptus erat illæso motu.

Puero cum in fluuio pisces venaretur præ aquæ frigore inuita fæcum contigit excretio resoluta musculo ani. Aliis inuita, aut yrinæ aut fæcum similiter affuit excretio, aut suppressio propter ictum, aut læsionem neruorum dorsi lumborumque. Gal. eò loci,

154.
ibid.

SS

ictum & refrigerationem rerum earum causas statuit. At in hoc distinguuntur, quod ictus maxima ex parte ad plures vno musculos attinet: sed frigus vnum ferè musculum attingit.

155.
*Holt. lib. de
materia Chir.*

Quidam maligna vi luis veneræ confictatus cum remedia deessent fimo stabulario vrinis iumentorum & equorum commixto putrique corpus recondidit. Tota materia venenata exhalauit. Curatus est.

156.
*Cap. 5. l. 2. de
loc. affect.*

Galeno ipsi obortus est tantus dolor vt sibi perforari partem terebra putaret: ac præsertim qua parte vretres a renibus ad vesicam protenduntur. In calculi opinionem eo loco fixi ventum est. At excretio declarauit vitream pituitam hoc doloris tardium attulisse, quæ omnium frigidissima est.

Idem illustri viro Domino de Fon-le-bon contigisse nouimus, frustra que ei tanquam calculoso manum auxiliarem adhibebamus. Nam post infinita propè remedia per penem frigidissima pituita dolorem inferente excretâ conualuit. Quanquam & fortè colica nephriticaque simul aderat.

157.

Nuper misella mulier nescio quæ absurda ob annonæ caritatem sumere coacta, cõqueritur de grauissimo stomachi dolore, ac si colicam stomachicam dixisses. De fouenda parte ita distenta cogitabamus. Tandem Rheo exhibitio reuomuit pituitosa multa cum tribus lumbricis semipedem longis ac viuus.

158.
*Sanaron. l. de
vermib. c. 4.
idem Mesu.
c. 2. de cura
agritud. int.*

Obseruauit Fernelius vermes ita sensim cuniculosegisse, vt viam sibi in crura fecerint. In inedia qui vermibus confictari soliti erant, iis vermes ventrem & vmbilicum perforarunt, vt notat Auicennas, & post eum Sanaronola lib. de vermibus, atque idem se obseruasse Ioannes Mesuæus asseuerat.

159.
*Fer. de sympt.
uteri.*

Non tantum ætate prouectiores fluor muliebris diuexat, sed & iuniores & septennes puellas. Eas præsertim quas fœdus color deturpat. Quod in puella annorum octo accidisse narrat Fernelius. Et nos multo minorem fœdo fluore diuexatam vidimus. Mater id eò accidisse suspicabatur quòd puellula ista seruæ πορνῆ patienti concubisset, & probabile istud.

160.

Narrat Fernelius fluorem muliebrem à gonorrhœa virulenta distingui, quod hæc fluat mensibus etiamnum erumpentibus: fluor autem muliebris cesset fluentibus mensibus. Nos contra in misella muliere vtrumque simul fluere obseruauimus. Et saniosa excretio per fluorem muliebrem adeo fœda erat, vt nullus esset ferendo.

Mirum quod contigit Polemarcho Polono. Illi annos multos aures erant purulentæ, & magno profectu exernebatur nonnihil saniosum. Accepto grâdi in fronte vlunere, raptò veluti alio cursu in anteriora, è naribus stillat purulentum ac foetens. Hinc narium foetor. Quod mirum magis & medicis inauditum incognitumque fuit, vmbilicus ei intumuit, & stillabat sanies ferè assimilis ei quæ per nares exernebatur. Quæsitum qua id via & ratione fieret, cum vasa vmbilici in vinculum coaluerint.

161.

Nouimus mulieres, aut hemicrania, aut capitis dolore affligi grauitè solitas dum, aut lactant, aut peperere. Cum primùm autè conceperunt vtero aliæ nil tale sentiunt: aliæ post duos menses tantùm laborare desinunt. Quid hoc rei? Hipp. primus hoc à se obseruatum literis mandauit. Mulieri, ait, in Phæris caput circumdolebat. Remediis non iuuabatur, ne dum caput quidem purgaretur. Cum concepisset dolores capitis relinquebant.

162.

Annosa mulier menstrua alba patiebatur, malum diu perseuerauerat. Cum tam diuturni mali eam tæderet, consulto medico nescio quid sumpsit quod fluxum sisteret. Nec hoc impunè tulit. Nam non ita post diabetes sæuissimus eam oppressit, à quo duobus mensibus post emaciata tabefactaque interiit. Mirum quò abierit olida putrisque materia quæ fluorem committebat. Nam ea per diabetelem non fluebat. Erat enim aqua limpida.

163.

Militi ab osse ethmoide solebat purulenta materia effluere, non secus ac è naribus fluere solet. Illa fœda eluuiès suppressa est facile quòd resimis esset naribus. Duo inde vermes villosi instar digiti geniti sunt qui illum in furorem adegere: ac febre non multùm manifesta die vigesimo de medio sustulere.

164.

Fer. 6. 7. l. 5.

Quidam biliosus & macilentus, deposito scœnore contendit se intra breue tempus præfinitum sexdecim placentulas corniculatas (Galli vocant *des eschaudés*) comesturum. Effectum est uti voluit. Venter inde intumuit, doluit plurimum. Miraculo quodam post tumorem istum ventris, maculis, aut exanthematis corpus exaratur qualia in fœda scabie apparent. Grauiissimè aggrauit, ferè inde contabuit.

165.

Quidam in diuturno comitatu cum multis diebus caligas non exuisset, tandem cum eas deposuit, cum illis illarum partium pilos auulsit: ita fuliginosæ materiæ retentio diuturna radices illorum exederat.

166.

Rondeletius.
in ca. de notis
Alopecie à
mo. bo. Gallie.

Quendam equus in præcordiorum regione calcitrauerat: in

167.

Sf ij

LIBER

324

septo transuerso semper mansit imbecillitas. Dum respirationem inchoabat omnes thoracis musculos mouere cogeatur etiam sanus effectus. Et athleta, Secundus, nomine, cum in septo transuerso imbecillitatem nonnullam perciperet, omnes vna respiratione thoracis musculos mouebat, his locis patet sæpè occultam difficultatis spirandi causam, ex aliqua etiam abdita diaphragmatis imbecillitate nasci. Præsertim vitium æstimare oportet dum quietem agimus: nam tum sola diaphragmatis motio respirationi sufficit, quod si tunc omnes thoracis partes mouentur, aliquid contra naturam subesse suspicandum est.

Gal. c. 4. l. 4.
de loco. aff.

168.

ibid.

Cuidam in nate oborto suppurato iuxta cruris initium, nervi illius cruris per chirurgiam nudati sunt: parte tamen sanata, toti membro difficultas motus contigit. Coniecit Gal. à priore inflammatione aliquid scirrhosum in parte relictum esse. Huic rei prouidit. Conualuit.

169.

ibid.

Piscator cum solo frigido diu piscans defedisset, in inuoluntariam sæcum & vrinæ excretionem incidit, fomentum calidorum vfu sanatus est.

170.

ibid.

Quidam sub multa fecit iter pluuiæ ac validis ventis, pallium madefactum ceruici imposuerat. Pars pericranij sensu carebat. Medici capiti remedia assidue applicabant. Nil proficiebatur. Ceruici consultum est. Sanatur. Nam ex primis spinæ spondylis nervi paria duo ascendunt ad caput, à quibus pellis caput ambiens sensum mutuatur: sic necessario ceruici neruorum origini prospiciendum erat.

Quibus ex locis patet consultos nos esse oportet in remediis usurpandis, ne parti temerè illa adhibeantur, cum tantum compatiendi lege laborat.

171.

Gal. c. 2. l. 5. de
loc. aff.

Galenus obseruauit tantam sæpè humoris copiam in ambiente cor tunica, vt ipsum cor non moueatur, quod & in hominibus & in simia à se dissecta vidit, cum illa in dies emaciaretur. In Gallo gallinaceo scirrhosum obseruauit, ac si multiplex membranarum implicatio esset.

172.

ibid.

Gladiatores inflammato manifestè corde vidit pereuntes, non aliter quam si syncope cardiaca præhenderentur.

173.

ibid.

Quidam cum palpitatione præhenderetur præsertim verno tempore, solennem phlebotomiam celebrabat: & multis in simili affectu profuit sectio venæ, ait Gal. Et ille & hi ferè omnes morte ante senectutem præueniuntur, & cum syncope omnes ferè pe-

PARADIGMATVM.

325

reunt. Tamen sine syncope vnum, aut alterum periisse, ait Gal. sed alia mortis specie: id est, apoplectico quodam modo, vt ait Paulus Æginera.

Faber lignarius à vomitione molesta liberari non potuit. 174.
Aperto cadauere semilacer erat ventriculus & putredine corruptus. Idem ferè in Domino de Hodeuille est inuentum. Nam languit ferè per 45. dies, nec manifestus erat morbus. Animo sæpè deficiebat, vt facultatis vitalis virtus videretur exingui, alimentis resurgebat. Mors. Aperto cadauere totum hepar penè putre: Pulmones corrupti. Quibus in ægris eadem symptomata conspiciuntur, cautè medicamenta exhibere oportet. Nam sæpè calamitosè statim à sumpto medicamento intereunt. At præmatura morte corripuntur.

Puer annos natus duodecim sine nephritico dolore, cum difficultate tamen vrinæ per penem excernit lapillos pici & aloæ simillimos. Mirum fuit multis. Numquam cruentū excreuit. Quæritur cuius naturæ ea sit concretio. A sanguine esse aiunt. Ergo credibile foret aliquando mistum cruentum fuisse. Tamen cum Gal. explicat quæ sint illæ carunculæ quæ in vrinis apparent, ait veram carnem non excerni, sed sanguinem in hepate, aut in renibus exustum. Qui locus pro eo de quo nunc dicimus, audiendus videtur.

Com. in Aphs.
76. l. 4.

Qui tam annos 30. natus nephriticos dolores passus erat sæpè: 176.
Purulentum minxerat. Cætera alacris interiit. Repertus lapis in ore vasorum vrinariorum. Quod mirum, vterque ren tabuerat: nil erat succi, nil carnis: sed in molem maximam creuerat, ac si inflatam vesicam dixisses: & tota cavitates renum ita extensorum inanis erat. Sed quod mirum magis & nusquam visum, carunculæ longæ repertæ sunt tum in arteria venosa, tum in vena arteriosa, nec non caua vena dextrum cordis ventriculum attingente. Et tamen nunquam vlla difficultate spirandi laborarat.

Idem narras
Fer. c. 12. l. 6.
patholog.

Heros quidam Lutetiæ à febre acutissima decumbit. Deliria perpetua. Moriturum delirium prædicebant medici. Ecce nil tale medicis agitantibus strophium deuorat. Hinc grauissimæ & frequentissimæ conuulsiones. Medici tale quid morbo tribuebant, sed mole. Fortè illud per os magno cum conatu expulit: cessant conuulsiones. Audio conualere. In historiis præcedentibus huius libri obseruatum quomodo hydrops modò per insensilem transpiratum miraculo eua nuerit: modò per sudores. Nos autem

177.

St. iij

178. vidimus mulierem quæ menses aliquot hydropē detenta fuit. Abdomen elatum erat plurimum. Protuberavit umbilicus: ruptus tandem est vi aquæ conclusæ. Excreta magna aquæ pars. Item circum lumbos per dies aliquot alia pars aquæ per modum copiosi sudoris excreta est. Euasit tandem ab illo morbo. Immo narrat se plurimum adiutam in tumore aquoso tibiæ poculo ex cancris fluuialibus contusis in vino albo, in quo prius infusi sunt. Tumor ille pedum miraculo discessit.

179. Paulo antè annotatum quendam puerum excreuisse è vesica, aut è renibus lapillos pici aloæque simillimos. Est & mirandum quod nuper obseruatum, ex interuallis grumus sanguinis è nare durissimus, friabilis tamen magno cum conatu exibat. Qua parte decurrebat latebatque vena nigrities summa apparebat. Quærebatur quid rei esset. Tandem dictum malum hoc veluti nasi hæmorrhoidem nuncupari posse, quæ fæculento sanguine cerebrum repurgaretur. Nec malum hoc suppressendum censebant, quod furoris, aut symptomatis deterioris metus esset quidam.

180. Cuidam militi nares simas habenti ex eluuiæ quadam suppressa fluere solita, vermes duo villosi instar digiti illi geniti inuerti- que sunt: atque hi tandem illum in furorem adegerunt, & sine manifesta multum febre de medio sustulerunt.

*For. c. 9. l. 5.
de morbis.*

181. In oppidulo diui Gratiani quidam colico cruciatu tentari solitus post intempestiuos labores consueta symptomata experitur. Rustici neglecta alui subductione ad calefactoria confugiunt. Impensè calfaciunt. Aluus planè resistit. Medicamenta assumpta etiam horas nouem in præcordiis morata, reiciebantur sine villo profectu. Clysteres irriti. Balnea usurpantur. Nihil profunt. Quarto post die tympanitis speciem refert abdomen. Mors. Iliacum hoc.

182. Galenus notat quibusdam ex diuturno lactis usu, lapides in renibus concreuisse: aliis dentes eodem usu excidisse. Quidam agricola centum annos vixerat in usu frequenti lac habens, aliàs solum, aliàs cum cacuminibus thymi. Alius spe longioris vitæ idem facitare voluit. Incredibile quot symptomata inde contigerint. Hinc patet vnum & idem non easdem habere in multis vires.

*Cap. 7. l. 1. de
sant. tuenda.*

183. Cuidam totum brachium à metastasi humoris in eam partem nigricabat. Malum disperebat. Tunc insaniebat. Rursus redibat. Consultum tandem est vt denigrato brachio scarificatio profun-

PARADIGMATVM.

da adhiberetur. Conualuit, liberque fuit & ab ista nigritie, & ab infania.

Multis qui infaniuerant post melancholicas affectiones caput apertum fuit. Venæ capitis inuentę sunt turgentes, dilatatae, ac varicosę factę. Idem capiti contigerat quod venis varicosis. Immo affectus erat, quę Hipp. vocat *ὑπερμετρον*, venarum: super-vomitionem & eructationem voco.

Mulier ægerrimē prae dolore varices ferebat. Dilatatio summa erat. Audacter ē varicibus ipsis detractus est sanguinis largacopia. Audacia ista rationem superauit. Optimē habuit.

Mulier nouem menses gestare vterum putabatur. Nonnulla ex iis aderant quę imprægnatis mulieribus, adesse solent. Instante partus tempore prae dolore ob abdominis tumorem fatis concedit. Veriti parentes ne vnâ extingueretur fœtus, vt adempta matresupereffet, recens emortuæ cadauer penē spirans secatur. Totum corpus internum, epiploum, mesaræum, hepar, lien, pulmones, cor quoque ipsam & peritonæum erant obsita vesiculis aqua purissima plenis & limpidissima, nihilque graueolens habebat, & quod magis mirandum, vnicuique vesiculæ triplex erat tunica, & incolumis, integraque à corpore siue esset superficies, siue interior substantia decidi detrahi que poterat. Hipp. hydatidas obseruauit in corpore ipsius hepatis, sed nunquam quid tale in toto corpore deprehensum est.

Nobilis vir febre tertiana correptus fuit, quartus paroxysmus adeo vehemens fuit, vt translato sursum humore vnus oculi, & exitus foras contigerit. Et hic oculus deperditus tabuit.

Filiæ D. Desbrosses obortus tumor sub lingua, batrachion vulgo dictus, hinc nonnulla deglutiendi & loquendi difficultas, oui Columbini magnitudinem adæquabat. Et venulis conspersus erat nigricantibus. metuebant chirurgi ne ad carcinomatis naturam accederet. Sectionem tentare recusant, audacior vnus adacto scalpello pituitæ albuginæ vncias duas vel tres educit. Breui conualuit.

Dominus du Plessis cum molestiam aliquot accessionum febris tertianæ satis vehementis pertulisset, nouum & insolens remedium experiri voluit, cum enim ex aquatione & fluuio equi reuertissent, iussit eos aqua puteali perfundi, cum hoc spectaret, istaque affusio aquæ perplaceret, idem voluit sibi fieri, & vt id

serui facerent coegit. Educunt frigidam ē puteo, nudo corpori, medio paroxysmo aqua affunditur. Nec id diu impune tulit. Nam paulo post ἀφ' αὐτοῦ fit, cōuulsiones eum adoriūtur. Spuma in os cucurrit. Epilepticē cōuellitur. Mors. Minū fuit vnde tam repentinæ mortis occasio. Licet enim diffari prohibeatur materia tertianam committens, non ita tamen sæua edit symptomata. Credibile est istud serum, eumque febilem habitum qui ē materia putrente effertur (licet febris ipsa, sit ἐνθὺς) malignum quid habere. Declarant dolores vehementes capitis, aut totius corporis &c. symptomata quæ tam cito assidere solent febribus etiam mansuetis, vt mirum non sit, si insolentem experientiam & imprudentem tam fatalis casus exceperit.

190. Alter febre tertiana laborabat. Medicus qui illi medebatur vt erat αἰμὸς φοβός, detractionem sanguinis neglexit. Quarto paroxysmo ruptis velut venis, & sanguinis repagulis, & facto impetu quodam in partibus internis, tanta foras sanguinis eruptio est consecuta, vt eo ipso die illi obeundum fuerit.

191. Vxor D. Bondenier varices magnos habebat in cruribus & tibiis. Temperamento est melancholico, adhibito super ea consilio aperta sunt venæ, detracta est sanguinis copia insignis. Ab eo tempore nullum commemorabile secutum est incommodum.

192. Virgo quædam dum humi cecidisset, & verita esset ne naturalia detexisset, præ pudore desiit esse menstrua. Patiebatur autem tunc menstrua. Verebatur vero ne quid istius impuræ excretionis apparuisset. An tam facilis suppressionis mensium causa, reuocato spiritu aliò, qui sanguinem ad partes conducebat.

193. Filius Clarissimi illius Budæi qui sui sæculi lumen exitit, horrendum symptoma passus est: eo sudante lintea cruentis maculis perspersa inuenta fuerunt. Et eo morbo interiit. Notat Arist. quosdam sudore cruento exudauisse. Et Theophr. ex Monade medico. citat sudorem aliquando emanare cui similitudo insitum sanguine.

194. Filio D. du Bois post eruptionem variolarum oborti dolores atrocissimi in brachiis & tibiis qui nullis cesserunt remediis: adhibito consilio super ea re emplastrum de ranis applicatur partibus dolentibus, breui conualuit. Id quod negligi non debet, ne tam facilis & ad manum parati remedij contemptus calamitatem ægris adferre videatur. Nam si dum urgent dolores isti, si dum pars tumet ad suppurantia festines, corruptionis metus maior

cap. 19. l. 3. de
bist. an.

maior erit. Si in solis anodynis consistas, opera fortassis lude-
tur. Et in tempestate quadam pustularum & eruptionum fe-
rinarum ferace oborti sunt tumores & dolores in variolis &
morbillis qui pueros miserè necabant. Itaque cæteris nil pro-
ficientibus, in hanc itum sententiam, vt Emplast. de Vigo cum
hydrargyro applicaretur, aut litus lenis alis fieret ex Mercu-
rio. Mirum in modum id remediij genus profecit.

In domo D. de Pacy cum hortus esset in quo genista luxu-
riaret, & parietes ferè floribus ornarentur ac vestirentur, cœ-
pit quosdam desiderium floribus vtendi & esitandi, colligunt
& sartagine frigunt. Esitant iucundissimè. Tribus post esum
horis, tumultus in ventriculo contigit, dolor capitis cum ver-
tigine fugaci, nausea, vomitus, & alui laxatio; ac si quoddam
cholera morbi rudimentum foret. Stupor, metus, admiratio.
Quæ grauida erat verebatur de abortu. Paulò pòst pacata om-
nia. Vocatus, mirabar quid esset cur flores isti, qui in vsu aceto
conditi hyeme asseruari solent, tantam perturbationem at-
tulissent. De his sic Dioscorides. Purgant per superiora vehe-
menter Ellebori vice citra periculum flores genistæ & semi-
na. Quod observatione dignum est ne aut ciborum ignoran-
tia, aut voluptate ducti in commoda valetudinis peccemus.

Quidam in sura vulnus accepit, fluxit sanguis multus, non
tamen immodicè, vt ne ad fluxum sanguinis referas. Id quod
contigit. Ab eo tempore congregi non potuit, nec semen emi-
sit, saltem non arrexerit sufficienter. Id mirum fuit etiam peritis
rei anatomicae. Non videtur enim ratio cur vulnus eâ parte in-
flictum eam impotentiam adferat. An id Hip. fortè adum-
brauit, dum scripsit sectionem in malleolo infœcundos red-
dere? Sic aliquis partium consensus est, sed is fortassis non in-
tellectus.

Socrus D. Passart frequenter colico dolore tenebatur eoque
valde crudeli. Ad hepar illud referebant. Ea videbatur mœsta
perpetuo. Tandem incidit in febrem continuam. Dolor to-
tam partem dextram penè occupabat. Ab iecore omnino id ef-
se autumabant. Nulla re iuuari potuit. Nono iæterus *κατακορίης*.
Mors: aperto cadauere cystis fellis lapillis plena reperta est.
Hepar albicans.

Sectio inter annularem & minimum digitum ab antiquis
credita est febrem quartanam soluere. Quædam 7. iam men-

T c

195.

196.

197.

198.

ses quartanaria fuerat: Masilij Medici consilio secta est vena, detractusque copiosè sanguis. Febris iugulata est, sed annum ferè vnum manus tota veluti liuefacta mansit. Alter febre quartana diu laborabat. In tibiis vlcera maligna & telephia oboriuntur. Febris perseverat. Arte remedijque communibus non curantur. Suspicio luis venereæ est, quòd medicabilia non redderentur. Tamen rebus diligenter expensis, & rogatis, nil venereum inuentum est. Non desierunt tamen Medici suadere vsum hydrargyri. Plantis pedum & femoribus applicantur ceronea de hydrargyro, & consimilibus. Prouocatur *πυαλίσκος*. Curantur vlcera, curatur & febris. An idem in contumacia febris quartanæ agere licet? Tamen narrat Fernelius obseruasse se quendam continenter afflictum, & lue venerea cum sordidis vlceribus, necnon quartana vera. Adhibiti litus & diæta solennis ad luem veneream, lue venerea est liberatus. quartana perseverauit.

*Lib. de Abdi-
tis rerū cau-
sis.*

199.

Mercator quidam ferina destillatione in pulmones à capite iam vetere infirmitate prædito laborabat; nec solum caput ac-
cusabamus, sed & partium inferiorum intemperiem quandam, cui pariter consulendum putabamus. Postquam primarios Medicos consuluit, ijs visum est ex vsu esse lenientia, mitigantia, catarrhum compescientia, tandem nostro consilio incrassantiũ syruporum vsus visus est necessarius. Lutetiam venit tussiculus, curis implicitus, debebat enim sistere se coram Senatu examinis ergo. Et cum hinc illinc animus curis ageretur bene coenatus, meminit istius superioris consilij. E pharmacopolio syrupum de papauere quærit. Eo copioso vsus est, tum ad catarrhi leuationem, tum ad somni conciliationem. Sed suæ imprudentiæ poenas non longè post pependit. Obmutuit enim & *ἄφωνος* mansit per duas horas integras. Etiam valde agitatus vocem non recuperauit. Hinc apparuit febris ingens (nec enim antè *ἀπυρετός* erat. Sequentibus diebus veluti balbutiens & parum attonitus redditus est. Multorum obliuiscēbatur, *κατὰ φρονός* interiit. An vsus istius syrupi tantopere obfuit. An materia suppressa fuit quæ *κατὰ φρονός* inuexit? An bonum in catarrhis venenatis & subtilioribus dare narcotica? Annon dum symptomati occurrimus, causam, morbi fomitem adaugemus? Etenim in talibus fluxionibus fit quædā *νάχσις*, & retinens de natura syntectica, & talis humoris suppressio

cum aliquid venenati habeat, pernicioſa eſt. Commodè per halitum & ſudorem exhalaret & digereretur, ſed ſi idroticis vtimur, metus eſt ne corpus caleſcat, & humores commoueantur.

Nobilis mulier cum conceptum fallere vellet & foetum e-
 lidere, το φθέρου ſumpſit ad provocandum ſanguinem; & ſui
 temerarii conſilij poenas pependit. Fluxus enim ſanguinis eſt
 conſequutus, eroſis potius quàm apertis venis. Multo ſanguine
 per ſinum pudoris profuſo, adeo refrixit omne genus neruo-
 ſum, vt in ſummam imbecillitatem adductum ſit. Hinc crucia-
 tus articulares, immanes, modo quodam admirabili atque di-
 uina vindicta orti. Membrorum contractio, ſqualor, macies,
 mors. Quæ immodica hæmorrhagia conuulſionem ab inani-
 tione adfert, eadem articulares dolores excitare poteſt.

220.

F I N I S.

T t ij

INDEX ALPHABETICVS RERV M OMNIV M
*insigniorum quæ continentur in hoc tertio Tomo Consultationum
 Medicinalium Dom. Gulielmi Ballonij, Doctoris Medici
 Parisiensis.*

- A** Admiratio medicorum artem obscurat. 294
 Aduftioni virus quoddam semper est adjunctum. 106
 Aduftio bilis flauæ vim nescio quam imprimit humoribus. 107
 Alius fluens non est repente supprimenda. 306
 Angli vt plurimum ruffi. 9. fluxionib calidis & biliosis sunt obnoxij. *ibid.* quare. *ibid.* sunt superbi & elati animo. *ibid.* quare & quomodo sunt ruffi. *ibid.*
 Animal vt subsistat tria sunt necessaria, vita, nutritio & respiratio. 4
 Animalia venenata quare nec fame nec siti pereunt. 80. triplex eius causa assignatur. 125
 Animi pathemata morbos faciunt grauissimos. 72. 74
 Animi pathematû vis maxima in morbis faciendis. 119. 221
 Animi pathemata alterant vocem & in viribus & in qualitate: omnes naturæ actiones peruertunt. *ibid.*
 Animus vbi mœrore percellitur, corpus sustinere nequit, vnde sequitur quasi membrorum omnium ruina. 222
 Animi ægrotantis Medicus est sermo, ægritudo autem non solum est miseria, sed etiam carnificina. 223
 Apoplexia quomodo fiat. 49
 Apoplexia rudimenta quomodo abigenda. 285
 Aquæ potus quibusnam noxijs. 305
 Aquæ potus lethalis. *ibid.*
 Arthriticorum misera conditio: si comedendum, manus, si ambulandum, pedes non habet, si dolendum, pedes & manus habent. 141
 Arthritides biliosæ vnâ cum senecta releuantur. 185
 Arthritidem cessare malum est. *ibid.*
 Arthritis vbi cessat, in quos affectus transmutetur. *ibid.*
 Arthritis quare dicatur opprobriû Medicorum. 217
 Arthritis est diathesis partibus impressa. 272
 Aurium morbi periculosi. 92
 Aurium tinnitus penè incurabilis. 117
 Aurium obstructio duplex. 194
 Aurium morbi summa cura sunt prænoscenti. 195. quomodo differant ab oculorum morbis. *ibid.*
 Autumnus morborum ferax multis de causis. 56
 Autumnus serum multum generatur. 252
 Autumnus pestifer & funebris dictus. 282

INDEX.

- B** Alnei ex aqua dulci dotes & commoda. 20. quibulnam idoneum. *ibid.*
- Biliofi sunt ad phthifim propenfi. 130.
- Bilis benigna & manfucta inedia beneficio efferata & immitis redditur. 137
- Bilis efferuefcit per inedia in biliofis corporibus, & æruginis naturam induit. 212
- Bilioforum duo funt genera, alii tales funt à natura, alii ex euentu. 84.
- Bilis accenfa fuo ardore moleftias multas infert corpori. 47
- Bilis aduritur quatuor modis. 56. fola naturalis bilis facit ad fapien- tiam. 56
- C** Achexia quomodo differat ab euexia. 228
- Cachexia duplex. 229
- Cachexia vniuerfalis triplex eft, pituitofa, melancholica & aquea. *ibid.*
- Cachexia quâ differt ab atrophia. *ibid.*
- Cachecticae funt penè omnes vir- gines, quarum pallet & eft fœdata facies. 230
- Cæfar magis metuebat à Dola- bella & Antonio, vtroque elegante, succulento & florido, quàm à Caf- fio & Bruto, macilentis, & subtri- ftibus. 172
- in Calculo renum quæ agenda. 278.
- Calculi duo magni qui à cathete- re non potuerunt probari. 309
- Cancrofo tumori an debeatur py- roticum, an fupra an infra partem admouendum. 105
- Cancris funt alendi, non curandi, nec irritandi. 106
- Cancris funt soboles humoris me- lancholici. *ibid.*
- in Canis rabidi morfu quænam a- genda. 169
- Capitis vulnus etiam leue nullum eft negligendum, ex Hippocrate. 3
- Capitis acriter dolentis tres cau- fae. 6
- in Capitis dolore quâ conferat balneum. 8
- Caffia non colata magis lenis, tẽ- perat, humectat bilem, & pituitam ducit. 276
- Caffia fola, fine vlllo alio medica- mento affumpta, nocet calculofis, duplici de caufa. 149
- Caffia calefacit propter quandam quam habet in fe caliditatem, ex Rondeletio. 176
- Caufarum externarum obferua- tio non negligenda in medicina fa- cienda. 71
- Cavfi fignum an fit fitis. 63
- in Cavfo partes extremae cur al- gent. 67. 70
- Cavfi caufa potest effe frigidiffi- ma. 70
- in Cavfo quomodo confert venæ feftio. *ibid.*
- Cavfus quomodo fiat, ex Hipp. 72
- Cavfi fummū remedium aquæ po- tus. 73
- Cerebrum ne vis febrilis occupet in omni febre, eft prouidendum. 10
- Cerebri morbi de apicibus artis funt. 118. & 136
- Cerebrum metropolis frigidi & glutinofi. *ibid.* qui funt Cerebro fic- co & defæcatiore, prudentiores funt, fed id boni faua mercede cõ- pensatur. *ibid.*
- Cerebri glandula eft fluxibus opportuna. 119
- lymptomatum quæ Cerebrū exer-

INDEX.

cent diuifio elegans & fcientifica. 187.

Cerebri morbi funt curatu difficil-
les, vt & cognitu difficillimi. *ibid.*

Cerebri phlogofis eft morbus in-
curabilis & venenatus. *ibid.*

Cerebri morbi trib. de caufis cu-
ratu difficiles. 225

Cerebrum colliquationem facile
patitur à calido. 254

Cerui febre carent, & febres vi-
tant qui ceruina carne vtuntur. 137
quare *ibid.*

Cholera morbus duplex, humida
& ficca. 174

Cogitatio affidua occæcat, abdu-
cto intus vifu. 11

Colica Pictauienfis dicta, etiam
Parifis frequens. 312

Colicus dolor Melodunenfibus &
Pictauienfibus familiaris affectus.
184.

Colicus dolor facile tranfit in pa-
ralyfm. 209

Colorum faciei mutationes funt
à corde. 12

Color pallidus hepar affectum de-
nuntiat. 140

Color multum pallidus ex candi-
cante, ab hepate eft. 228

Contraria contrariorum funt re-
media. 202

Corpora quædam fimul iuncta
habent quandam antipathiam. 110

Corpora pinguia minus fœcunda
funf, & fenefcunt celerius. 111

D.

Defipientiæ obfcuræ, blandæ
& contrectabiles, peffimæ.
186. & 188.

Destillationib. & tabi funt obno-
xii qui funt calidior et temperamen-
to. 16

Destillatio in corpore tenui & lon-
go, tabem minatur. 92

Difficultatis fpirandi caufa mul-
tiplex. 232

Diuites ed infelices quo minus
benetractatur quàm aliquis de ple-
be homuncio, aut ferutorum ven-
ditor. 297

Diuortium primum romæ pro-
pter infœcunditatem. 111

Dentium dolor nulli parcit atati
aut fexui. 247. tormentis annu-
meratur. *ibid.*

Diuretica nocent pulmonibus,
quia fanguinem liquant, & impe-
diunt expectorationem. 233

Dolores cur noctu magis augean-
tur. 35

Duo funt in natura quæ admira-
tionem pariunt Fallopio, nimirum
magnes & hydrargyrus. 144

Dysentericæ diuturnæ mortis fu-
turæ figna. 309

Dysenteria fuppreffa in infaniam
verfa eft. 308

Dysenteria intempeftiuè fuppreffa
abfcelfum facit in coltis, in vifceri-
bus, aut in articulis. 308

E.

Elephantiafi an competat potus
è zytho, pomaceo vel pyraceo.
264.

Elephanticus de repente quomo-
do quidam euafert. 311

Elephantiafi Arabum quinâ funt
obnoxij. 83

Elephas ad alios deuoluitur, &
quafi per traducem hereditatis iure
propagatur. 122

Ellebori duo genera apud anti-
quos. 147

Ellebori magnus olim fuit vfus
ad leuanda mentis & capitis vitia.
ibid.

Ellebori vtriusque periculofus v-
fus. *ibid.*

Elleboro fuperiora corporis fibi

INDEX

- repugavit Carneades Academicus, scripturus aduersus Zenonem Stoicum. *ibid.*
- Ex Elleboro purgatio difficilis & plena terroris. *ibid.* non adhibenda sine necessitate. *ibid.*
- Elleborus multis magnis confert affectibus. *ibid.*
- Elleborismo vires eximias tribuit Plinius aduersus epilepsiam. 153
- Empyici cur noctu magis febricitant. 27
- Enterocoele facta in thoracis capacitate. 302
- Epilepsia curatio dependet ex dignotione loci mittentis ad cerebrum. 137.
- Epilepsia hydropi superueniens desperata, ex Hipp. 312
- Epileptici facti sunt multi ingeniosi. 317
- Epilepsia quare morbus comitialis dicitur. *ibid.*
- Epilepsia in furorem versa. *ibid.*
- Epilepsia origo & causa variis a partibus repetenda. 282
- Errhinorum in vsu magna cautio- ne vtendum est. 164
- Eunuchi vnde dicti. 158
- Euphrasia in oculorum morbis ce- co errore vsurpatur. 88
- F**ebres quare noctu augeatur he- tica febre laborantibus. 26
- Febres diurne & nocturne, qua- nam periculosiores. 27
- Febris continua existit duplici de causa. 68
- Febres ex hypochondriorum do- loribus maligne. *ibid.*
- Febrium acutarum focus quis. 69
- Febres quae quo quomodo inter- mittunt, periculo vacant. 244
- Fluor aluius omnis aut est dy- sentericus, aut diarrhoicus, aut me- sentericus, aut hepaticus. 192
- Fluor albus mulierum quomodo distinguendus a purulenta excretio- ne. 241
- Fluxiones acrium humorum quo- modo contingant. 50
- Fædi virginum colores quomodo sunt curandi. 78 79
- G**enerales in Iure definitiones & in Medicina propositiones periculosa. 58
- Glandulae sunt partes depositariae & emunctoriae cerebri, aut male af- fecti, aut prauo succo onusti. 161. 164.
- Gonorrhæa venerea scortatorum flagellum. 158
- H**emoptoicos pinguefacit Hip- pocrates, ne tabeant, & ino- pia cibi sanguis efferetur. 246
- Hæmorrhagiae familiares iis quib. viscera sunt imbecilla. 252
- Hæmorrhoidalis dolor penè tor- mentis annumerandus. 248
- habet purgationem, non morbum. 249.
- Hæmorrhoidum fluxus menstrua- tis mulieribus morbus est, viris non morbus, sed sanitatis tutela. 250
- Hæmorrhoidibus mulieres obno- xia ferè sunt valetudinariae. 251
- Hæmorrhoides fluere desinunt cor- pore legitime vacuato. 252
- Hæmorrhoides in muliere morbus, in viro sanitas, ex Aristotele & Cel- so. 159. 227 234.
- in Hepatis fermentatione conue- nit liberalis venae sectio. 193
- Hollerius Medicus Parisiensis ce- leberrimus laudatur. 209
- Homini soli contingit inter cæ- tera animantia, vt vulneratus non reddat sanguinem. 120. ei soli con-

INDEX.

tingit profluvium sanguinis è naribus, aliàs terrificum. 127. 252

Homines urbani & literarum cupidi, ventriculi imbecillitate laborant. 136

Homo totus à natiuitate morbus est. 248

Humori cuique suum est serum naturale & præternaturale. 252

Hydrargyri vires eximiae & mirandae. 121. quomodo parari debeat in lue venerea. 122

Hydrargyrosis ferè semper pulmonibus labem inurit mali moris & penè indelebilem. 138. & 142

Hydrargyri vires planè mirabiles. 144.

Hydrargyrus aduersatur chalcantho, indeque aquæ medicata nocent iis qui passi sunt hydrargyrosim, præsertim si vitriolo sint imbuta. 219

Hydrargyrus est luis venereæ alexiterium. 270. inter Hydrargyrū & semē corruptum antipathia quedam. 281

Hydrargyrus est velut semē quoddam omnium metallorum. 281

Hypochondriacæ melancholiæ signa. 196

in Hypochondriacis calor est vter plurimum acer & mordax. 197

Hypochondriaci non sunt validè purgandi. 199. videntur carere febre, & tamen febriunt. 200

Hypochondriacorum febris est sui generis, & tumori cancroso non dissimilis. 205

Icterus à calculo in cysti fellis concreto. 315

Imbecillitas partium duplici modo assumpta à Galeno. 185

Imbecillam aliquam partem raro quis non habet, ex Celso. 185

Imbecillitas partium an ad înterperiem, an ad morbos materiae reuocanda. 185

an ista Imbecillitas habeat aliquid æpphron. 185

Imbecillum omne est querulum, idq. duplex, 196. ex Aristotele. 224 queruli sunt senes, ægri, & conualescentes. 224

Insulsus dicitur qui caret sale. 76

Insulsus homo & fatuus. quomodo differunt. 168

Intemperiei inæqualis magna vis est ad morbos generandos & curandos. 11. quid sit illa? 281

Lac virginalis quomodo parari soleat. 87

Lactis asinini vsus facit aduersus arthritidem. 98

Lactis vires in magnis doloribus. 219.

Lac refranat & contemperat cacothiam & prauitatem humorum in humano corpore turgentium. 281

Lac asinae prodesse non potest in tumore, obstructione aut duritie hypochondrii. 281

Lactis asinini vsus ad faciei nitorem. 262

Lac sumidum est, & caput opplet. 255.

Lactis asinini vsus præsertim per æstatem vlceribus accommodatus est, quod vehementer detergeat. 287.

Lana tinctæ colorem non depouunt, sic cerebrum in desipientia phrenitica, neque enim elui potest hac affectio. 188

Lapides ex intestinis decedentes. 304.

Lapis per tussim excretus. 316

Lapis in cysti fellea repertus ex ictero

INDEX.

ictero diurno. 319

Laurentius Medicus regius laudatur. 127

Legati olim vxores secum non ducebant. 251

Lethargus fit ex pulmone cum afficitur cerebrum tetro vapore, vnde marcor cerebri. 187

Lethargus & phrenitis quâ differunt. *ibid.*

Lienosi quare sunt voraces. 201

Lien iusto minor non bene defæcat sanguinem. 202

Lien quibus efflorescit, ijs corpus extenuatur. 218. 233

in Luem veneream non datur præscriptio, latent reliquæ, domatur venenum, non vincitur. 113

Lues venerea nunquam emoritur, nec eius fibræ omnes eliduntur. 115. morbus est totius substantiæ. *ibid.*

Luis venereæ alexiterium est hydrargyrus. 270

Luis venereæ latentis miranda symptomata. 300

Luis venereæ feliciter depulsæ exemplum. 322

M.

Macri magis formidandi quâ floridi & succulenti. 172

Matrimoniorum perturbatrix est infœcunditas, soboles verò vinculum, fidum pignus, & amicitia cõciliatrix. 108

in Matrimonio proles est beatum amoris pignus. 113

Medici multi plus valent & vident quàm vnus. 102

Medicorum indulgentia iuuat in morbo diurno. 106

Medicorum decreta tanquam Senatus consulta esse debent, quorum ratio non quouis tẽpore reddi debet. 171.

Medicus artem & artis euentum

nec debet nec potest semper præstare. 206

Medicus vtilior est amicus quàm extraneus, licet par sit scientia. 251 in Medico non solum scientia, sed & fidelitas & beneuolentia requiritur. *ibid.*

Mercurium Fallopius diuinum mixtum appellat. 144

Mercurius & magnes, duo sunt in rerum natura quæ admirationem pariunt etiam doctissimis. *ibid.*

ex Mercurio potest ostendi resurrectio per cineres. *ibid.* vires eius mirabiles. *ibid.*

Mercurius dulcificatus mira præstat in lue venerea & scrophulis. 121

Mercurius aurum solum ad se rapit. 122

Melancholicorum duæ species, alij à limo, alij ab affatione sanguinis. 136

Melancholici affectus quinam absolute dicti. 37. & 58

Melancholici quare dicuntur balbi blasique. 38

Melancholicis affectibus an venæ sectio conueniat. 39

Melancholici perpetuò medicinam appetunt, eisque corpus perpetuò dolet. 52

Melancholici apud Aristotelem dicuntur qui atrabile laborant. *ibid.*

Melancholicorum varij motus & impetus vnde repetendi. 53. cur dolendi finem non faciunt. *ibid.*

Melancholica sunt symptomata timor & mæstitia absque causa. 55

Melancholici per naturam sunt ingenio singulari. *ibid.*

Melancholicorum sanguis quare non ita facile corrumpitur. 56

Melancholicis quibus nominibus conueniat sanguinis missio. 57

Melancholici ex sanguine misse

V u

INDEX.

pinguescunt. *ibid.*

Melancholici dolendi & conquerendi finem non faciunt. *ibid.*

Melancholicus humor non tam est irritandus quàm fouendus, alendus & mansuefaciendus. 59

in Melancholicorum morborum curatione promouenda monentur Medici de officio. 60

Melancholici nec sano sunt corpore nec animo, licet magnorū sint facinorum auctores. 61

in Melancholicis fuliginosum excrementum multorum malorū causa est. 62

Melancholicorum maxima pars fit ab adusto humore. 62

Melancholici habent quædam interualla. 75

Melancholici vnde sunt voraces. 106.

Melancholicorum morborum irritatio, doloris est prouocatio, & denique mors ipsa. 107

Melancholicis lac, balnea & omnia temperata profunt. *ibid.*

Melancholici humoris vis & energia magna. 119

Melancholici toti iacent in fermento. 121

Melancholici leui de causa sanguinem excernunt. 126

Melancholici affectus elleborismū requirunt. 146

Melancholici morbo & agrotō animo medentur blanda colloquia. 146.

Melancholici perpetuò medicinā appetunt. 159. 172. 196

Melancholici ab adustione non sunt vehementer purgandi. *ibid.*

in Melancholicis ab adustione est adiunctum virus quoddam. 173

Melancholici hypochondriacæ symptomata multa enumerantur. 191.

Melancholici ab humore acri valde queruli. 196

in Melancholicis deiecta est appetentia ab intemperie & affectione praua, quam Galenus vocat *κακότης τῆς σωματικῆς*. *ibid.*

Melancholici cur flatuosi, macri, & pilosi. 197

Melancholicorum corpora perpetuò punguntur. 199

Melancholia hypochondriaca est gradus ad elephantem. 199. 200

Melancholici omnia tuta timent. 200.

Melancholia hypochondriaca multa includit & opinione maiora. *ibid.*

non tam est in humoribus quàm in partibus solidis. *ibid.* ei quandoque remedium est senectus, quæ & ipsa morbus est. *ibid.* ordo agendorum ad eius curationem. *ibid.*

Melancholici affectus sunt tormenta medicorum. 201

Melancholici flatu abundant: in iis excretiones sanguinis non omnino sunt mala. 235

Melancholicus humor adustus grauiorum capitis dolorū causa sæpius esse solet. 249

Mesenterium prodigiosum, ab intestinis separatum, abscessuum insolentium vbertate plenum. 298

Menstrua an requirantur ad conceptionem. 319

Morborum vno quasi ictu plus facit quàm humores, qui longas febres procreant. 224

Morbi neruosi generis ex parte humoris & subiecti curatu difficiles. 216.

Morbi aut sunt longi, aut precipites. 223

in morbis à partium corruptione non potest certo prædicti exitus, vt in humoralibus morbis. 244

INDEX.

Morbos congenitos in senecta desituros credidit Hippocrates. 1

Morborum diurnitas à tribus causis repetenda. 3

in morbo mente constare bonum, quomodo accipiendum. 5.

Morbos attollere non debent medici pluribus de causis. 13

Morbi à stirpe in posteros deriuntur & hereditarii fiunt. 16

Morborum congenitorum vis & potentia. 21. vix vnquam curantur. *ibid.*

Morbi vernaes an mane irriterentur? 28

Morbi vt plurimum omnes circa diluculum mitescunt, etiam pestilentes. 29

Morbi pene omnes sub tempus noctis ingrauescunt. 32

Morbus crudus quomodo intelligendus, ex Galeno. 43. 61

Morbus malignus dicitur qui communem aliorum morborum sortem superat, & aegrè curationem admittit. 67

Morbus lethalis dicitur duabus de causis. *ibid.*

Morbum quid faciat non est videndum, sed quid tollat. 71

Morbi longi trifariam dicuntur. 74.

Morbi tranquillitas eiusdem diurnitatem & longitudinem significat. 128

Morbi cerebri medicorum operam saepe eludunt & elidunt. 136

Morbi congeniti seu connutriti, à Plinio parentales dicuntur. 176. sūt æternæ possessionis, & in eos non est longioris temporis exceptio. *ibid.*

Morborum plurima genera primo coitu & prima mensium eruptione soluantur; quod si non soluantur, vix ac ne vix curationem admittunt. 190

Morbi multi negliguntur quia sine febre & vulgo homines affligunt, quales sunt dolores denticum, podagra, verminationes, tusses, tormina ventris. 203

Morborum quorundam cruciatus saepe sunt grauiore carnificum tormentis. *ibid.*

Morbo urgente videntur remedia cum quadam temeritate rapienda. 207.

Mucosum quid, tenax & glutinosum apparet in vrinis quorundam, & adhærescens pertinaciter in fundo matulæ, vndenam oriatur. 180

Mucosi excrementi in paralyti natura excutitur. 212

Mucus quid est, quanam substantia. 215

Mucosus humor proprius membranarum & neruosi generis, ex Hippocrate. *ibid.*

Mucosa vrina talis est, vel ob pituitam purulentam, vel ob pus pituitosum. 218

Mucosa vrina vnum ex tribus significat. *ibid.*

Mucus & salia sunt repletionis indices. 165

Muliebris fluor tribus de causis curatu difficilis. 122. est multorum maiorum ferax aegris & medicis, quibus est crux & tormentum. 122

ex eo magna sequuntur incommoda, siue persequeret, siue supprimitur. 123

ab eius suppressione gangrena fit in vtero. *ibid.*

Muliebris fluor in colliquatium terminatur. *ibid.* ad eius curationem quanam victus ratio requiratur. 123.

quanam remedia interna & externa. 124. 125

V u ij

INDEX.

in muliebris morbis non semper accusandus uterus. 159
muliebres morbi ferè incogniti, ex Hippocrate. 204
muliebrum omnium morborum causam retulit Hippocrates ad uterum. *ibid.*
muliebris fluor moderatam victus legem requirit. 260. in eo casu abstinendum est ab agarico. *ibid.*
mulieres hypochondriacæ & melancholicæ deterioris sunt conditionis quàm viri. 131
præter mulierem nulla animalia grauida coitum norunt. 156
mulieres calidiore temperamento sunt afflictæ valetudinis. 159
mulieres quare sunt naturâ frigidiore. 205
mulieres melancholicæ non fiunt sæpe menstruales. 206
mulieribus animi essentia faciliè dissoluitur, cum sit in illis vitale robur infirmum, & valida animi pathemata. 224
mulieres infirmum gerunt animû. *ibid.* & 226.
mulierum morbi grauissimi duplici de causa. 240
mulieres hæmorrhoidibus obnoxie ferè sunt valetudinariæ. 251
mulieres à cæteris morbis sanguineis per menstrua vindicantur. 253
mulieri quæ facile concipiebat, si concipere desinat, illi est mittendus frequenter sanguis. 257
mulierum cacochymarum proprium est, vt earum menses statam periodum non seruent, natiuôque careant colore. 284
mulieres quædam vix menstruales, concipiunt tamen, & vitales pariunt fœtus. 320
mulierum morbi sunt curatu difficiliore propter pudorem, si quid

præsertim circa naturalia oriatur. 103.

mulieres hypochondriacæ difficilius curantur quàm viri. 106

musicæ occultæ nullus respectus, ex Nerone. 19

musicam adamabat Aeneas Silius, qui postea Papa fuit. *ibid.*

musici dicuntur esse soli Galli. 20.
quare non Hispani & Germani. *ibid.*

N.

Natura humana aternitatis auida est. 155

Natura nostri amantissima sic cuncta disposuit, vt dolorem aut breuem fecerit, aut tolerabilem. 204

Natura quædoque est homini bruta & nouerca. 296

O.

Obstetrix apud Comicum, Medicorum auctoritatem imitatur. 173

Oculorum morbi difficillimæ curationis, & quare. 87

Oculorum morbus *ἱππος* dictus, quis. 236

Oculus mobilis in morbis, aut delirium, aut tremorem musculorû oculi declarat. 237

Offensis obnoxia est infirmitas. 168. 185.

Optima tria, bene valere, formosum esse, & habere diuitias nulla fraude quæsitæ, ex Platone. 176

P.

Paralysis quæ sub finem morbi contingit, an fiat à siccitate. 209.

Paralyseos causæ varix recensentur. 210

Paralysis quædam post colicum dolorem Pictauiensibus est familiaris. 211

in Paralyfi vinum est vitandum

INDEX

- optimis de causis. 214
- Paraphimoseos causa varia recensentur. 98. eiusdem remedia multa. 99. unde dicta. *ibid.*
- Partem aliquam corporis imbecillam nemo non habet. 251
- Pedes in hydropo cur tumeant. 45
- Perfrigerationis partium extimarum causa, dum omnia intus ardent. 68
- Peripneumonia non habet coniunctum lateris dolorem, quamvis lateris doloris quem balneum discutit, super ea meminerit Hippocrates. 277
- Phreniticorum desipientia pessima, ex Hippocrate. 188
- Phreniticus quasi miraculo sanitati restituitur. 299
- Pituita alba quid sit explicatur. 45.
- Pituita atra bili mixta parit Epilepsiam. 46
- Pituita falsa & acida fons multorum morborum. *ibid.*
- Pituita acida & falsa, ex Platone, fons est affectionum rheumaticarum. 216
- Pituita vitrea dolorem parit acutissimum. 322
- Plantae viuaciores sunt quae plus lenti & glutinosi habent humoris. 109.
- Podagra non est morbus incurabilis, ex Plinio. 98
- Podagram tria accersunt, desidia, crapula & vini usus. 208
- Πολυπράγμονες homines aut non sunt prolifici, aut prolem valetudinariam producant. 109
- Practici veteres non tam erant verborum quam rerum aucupes. 191. veteres Medici intelliguntur.
- Præceptum therapeuticum optimum: quæ per inferiorem ventrem sunt euacuationes, in partes vicinas fluxiones ferè commouent. 217.
- Pulmones tetram & malignam labem ut plurimum retinēt ex hydragrosi. 138. 142
- Pulmones aliquid mali ferè semper præfagiunt, post luem veneream. 142.
- Pulmonum vitia facit exsereabilia pulegium. 168
- Pulmones qui habent calidiores, quædam tabes est familiaris, nomine tabis largiùs sumpto. 181
- in Pulmone calidiore an balneum competat. 182
- in tabescentibus à Pulmone consumpta valent, quia suppleant vicē testudinum nemoralium. 183
- in iisdem somniferorum usus minus tutus. *ibid.*
- Pulmonum morbis obnoxij viuunt qui calido temperamento præditi sunt. 16
- Pulmonum in affectibus an balneum conferat. 18
- Pulmonum malè affectorum signa. 25
- Pulsus inæqualis cum omnimoda inæqualitate exemplum. 306
- Pus in thorace contentum quare non excernitur, tres causæ recensentur ex Galeno. 23
- Puris & pituitæ putris idem effectus. 24
- Pus habet maximè suos paroxysmos nocturnos. 26. 32
- Pus & purulentum quomodo inter se differant. 29
- Pus què differat à sanie & sanguine. 30
- Pus dum fit, febris augetur & dolor. 32
- Pus an aliquis possit excernere nulla febre præcedente. 34

INDEX.

Pus dicitur omnis humor aut fucus corpori onerosus. 35. 179

Q.
in Quartana febre mitius agendum quam in alijs febribus. 318
de Quartanæ febris curatione præceptum insigne. 318
Quartanam febrem iecur aliquando facit. 319
cum Quartanarijs benignè agendum est in negotio curationis. 106

R.
Amicosis non valde conueniunt remedia per os assumpta, quidquid obganniant impostores. 107

Rariorum rerum obseruatio ferit sensus eruditorum. 294

Ratiocinari in quouis morbo bonum est. 10

Raucedinis causæ recensentur. 13.
quando formidabilis. 14. quando signum bonum, & masculæ virilitatis argumentum. 15

Raucedinosi purgatio inimica. 20.

Rheumatismus quomodo fiat. 177. fuit optimè cognitus Galeno. *ibid.*

Rigor omnis aut est ab vlcere, aut à valis. 63

Rosa priuilegio quodam vim habet sistendi catarrhi. 246

Rosarum tinctura quomodo paranda, & quibus conueniat. 131

S.

Sacro morbo sunt obnoxij homines acerrimi ingenij. 118

Salis vsus erat sacerdotibus prohibitus, vt essent castiores, & eo abstinetur in sacrificijs. 97

Saluia herba sacra, ex Agrippa. 116. vires eius miræ ad iuuandam conceptionem si succus eius bibatur. *ibid.*

Sanguis humidior multorum morborum parens. 249

inter verum Sanguinem & pus, ichor est quodammodo medius. 250.

Sanguis per putredinem amissis suis fibris in putre quoddam serum resoluitur. *ibid.*

in Sanguine considerata multa veniunt. 252

Sanguinis consistentiâ vitiatâ fit serum. *ibid.*

Sanguis vel est sanus, vel morbosus. *ibid.*

Sanguinis ichores amari autumno generantur. *ibid.*

Sanguis est humidior vel natura, vel morbo. 254

Sanguis fit serosus multis de causis. 256

Sanguis Galeni temporibus fere expers erat feri. *ibid.*

Sanguis temporarium sumit incrementum. 257

Sanguis vermiculis plenus. 298

Sanguis niger qui per inferiora excernitur non est semper malus, etiam si atrabiliaris sit. 307

Sanguinis excretio per os & nares ab hirudine in corpore latente. 315.

Sanguinem frænum bilis esse putauit Auicenna, sed falsò. 7

in Sanguine magna pars vitalitatis residet. 39

Sanguis an faciat ad prudentiam. 40. 41. 43.

Sanguis corrumpitur per alienæ rei admistionem. 48

Sanguis tripliciter afficitur à bile sanguinem subeunte. *ibid.*

Sanguinis frequens detractio quare vulgo credatur pinguefacere. 59

Sanguis aquâ multâ dilutus an probandus? 61

INDEX.

- Sanguinei & ἰξίθυροι fiunt melan-
cholici. *ibid.*
- Sanguinis vitium elisis fibris est
λύσις, & corruptâ substantiâ est
φθόρα. 123
- Sanguinis excretio per os secura
est in atrabilariis. 127
- Sanguis adurituri seri defectu, &
liquatur dum serum educitur per
medicamenta calidiora. 202
- Sanitas summum est bonum, diui-
tiarum, aut bonorû corporis nulla
est utilitas citra sanitatem, ex Hipp.
175.
- Scelotyrbe quid, eius symptoma-
ta & remedia. 82
- Scientiâ futurâ præfagium in Zo-
roaste. 102
- Scorbutum descripsit Hippocra-
tes nomine stomacaces. 143. eius si-
gna recensentur. *ibid.*
- Scorbutus idem est cum scelotyr-
be. 144
- Scrophulæ morbus sunt ludens o-
peram Medicorum. 120
- an iis cõueniat herba scrophularia
dicta. 121
- Scrophularum affines sunt lues ve-
nerea & elephantiasis. *ibid.*
- Scrophulas & affectus congeneres
sanat hydrargyrosis. *ibid.*
- Scrophulæ in caneros sæpe tran-
seunt. 160
- Scrophularum & cãcrorum est se-
minarium in iis quibus in facie gut-
ta est rosacea. *ibid.*
- Scrophularia ipso nomine & frõte
multa pollicetur ad curationē stru-
marum, sed in exoluendo promisso
languet. 161
- Semen ex omnibus partibus deci-
duum, tradux est ad æternam pro-
pagationem. 155
- Senes difficiles sunt & queruli, vt
& conualescentes ac ægri. 126
- Seri putris perennis generatio
multorum malorum & symptoma-
tum causa. 249
- Sitim pariunt & accendunt mul-
tæ partes corporis, situ, actione &
vfu differentes. 64
- Sitis an sit causi signum patho-
gnomonicum. 64
- Sitire perpetuò & æstquare est ar-
denti febris peculiare. 65
- Sitis intolerabilis est comes ar-
denti febris. 65
- Sitis quare non adest vbi adesse
debet. 66
- Sitis cur maior aut minor sit quâ
febris in causo. *ibid.*
- Sitis absentia & vacuitas non est
semper signum facultatis naturalis
emorientis. 67
- Sitis inexplibilis in muliebri fluo-
re est signum pessimum. 123
- Sitis à pulmone exemplum. 301
- Sitis inexhaustæ causæ aliquot
recensentur. 305
- Sputum ex Hippocrate, effemi-
natur, ob nimium iusculorum & re-
rum liquidarum vsum. 246
- Sputum cruentum tabis prodro-
mus. 247. terrificus est affectus,
quia minatur tabem. *ibid.*
- Sputo cruento obnoxius erat Sa-
turninus, apud Plinium, & tamé
nonagesimum ætatis annum attigit.
ibid.
- Sputum sanguinis est de apicibus
artis. 92
- Sterilitas Medicos tenet anxios
& ambiguos, è qua parte pro-
cedat, an viri, an mulieris. 113
- Sterilitatis causa est intemperies
vteri. *ibid.*
- Strumæ vt plurimùm sunt à pi-
tuita salsa per putredinem acida.
238.
- Studioforum & vrbanoꝝ pluri-

INDEX.

mi sunt infirmo ventriculo, propter
inquietas cogitationes & assiduas
vigilias. 6
Sudoris sanguinei exempla. 328

T.

TEmpestiva si tempestive non
fiunt, morbi sunt inconstantes
& difficilis iudicij. 224

Terebinthinæ vires eximie ad-
uersus sterilitatem. 115

Tormentis annumerantur multi
morbi qui vulgo tamen negliguntur.
203.

Tussis causæ multæ recensentur.
244.

Tussim quandam à splene fieri
obseruarunt antiqui. *ibid.*

Tussis quò magis est vulgaris, eò
ferè negligitur. 247

Tussis mala vt signum & causa.
ibid. caput replet & pulmonem ca-
lescit. *ibid.* eius causæ variæ re-
censentur. *ibid.*

Tutius est cū causa ægrotare quàm
sine causa alleuari. 317

V.

Voletudinarii viuunt qui in-
quieti viuunt. 101

Varices in venis capitis. 327

Variolæ & morbilli valde frequen-
tes anno 1586. 249

Veneris immoderatæ noxæ multæ,
& magna incommoda. 8

ad Venerem impotentia recensentur
causæ multæ. 76

ad Venerem excitandam impensè
calida nocent. 77

de Venerem sopientibus aut exci-
tantibus medicamentis. 95

Veneris raritas vtilissima. 97

Venerem damnauit Democritus.
ibid.

Venerem stimulat cicero vñs.
ibid.

Veneri officiunt & nocent fluo-

res albi.

109

Veneri totum incumbit vulgus.
115. 156.

Veneris vñm immeritò damnauit
Democritus. 156

Veneria olim cur dicebantur
à cñtra. 158

Ventriculo sunt imbecillo vrbani
homines & studiosi. 100. 156. 185

Ventris segnitie omnium confu-
sio. 84

Ventris tumores quinam pericu-
losi. 83

Vermes in furorem adigunt mili-
tem. 326

Vermibus enecandis competit ar-
gentum viuum. 272. quamuis non
sine periculo exhibeatur. *ibid.*

Vermis implacabilem dolorè ciens
in capite. 302

à Vermibus capitis dolores. 310

Vermes insolentia symptomata
saepè afferunt. *ibid.*

Vertiginosi homines vñde fiunt.
10. & 12.

Vertigo est affectus senibus fami-
liaris. 99

Vertiginosi qua diætā indigeant.
101.

Vertiginosi vñdenam fiunt qui v-
tuntur trochiscis de vipera. 137

Vertiginis tenebrosæ origo. 168

Vertigo epilepsiæ paranympus.
282.

in Vertigine an balneum compe-
tat. 1283

Veternosi pro hydropicis sumun-
tur apud Terentium. 265

Veternosus dicitur vetere morbo
detentus, & affectus, cuius generis
est vetus hydrops. 265

Vigilia pertinax cibos crudos &
incoctos facit. 225

Vinum ieiuno non bibendum.
12.

Vinum

INDEX.

- V**inum multa adfert ad vitam incommoda. 207
Vinum ieiuno ventriculo assumptum multum nocet. 208
Vinum nervosis affectibus an conveniat. *ibid.*
Vinum facile nervos replet ob calidam temperiem. *ibid.*
Ab usu Vini fluxionum prouentus ingens. 209
Vinum magis fundit & liquat quam possit digerere. *ibid.*
Vinum quomodo conferat in dolore capitis. 214
Vinum album rubro salubrius est. 256.
Vires cur ad summum veniunt imbecillitatis nulla prægressa evacuatione.
Virginis fædi colores per vomitum curati. 319
Visus hebetudo venæ sectionem quomodo requirat. 23
Viuaciores sunt plantæ quibus succus lentior est. 183
Vlcera oris quorum origo est à liene valde terrifica esse scripsit Hippocrates. 143
Vocem vitari in morbis magni est momenti. 13
Vocis differentiarum multarum. 19
Vocem vitiosam habent Elephantici. 19
Volusino præfecto per os fluxit sanguis singulis annis, & attingit annum 90. 127
Vrinæ suppressio in febribus ardentibus sæpe est *αἵμα ἰμπεριον*. 112
Vrina tortuosa fluens calculum in vesica indicat. 148
Vrina ipsa in sectis à calculo, detergendi vim habet. 149
Vrinæ suppressio cerebrum inficit, & labem affert indelebilem. 319
Vterus est plenus attractæ humiditatis. 126. est muliebrium morborum causa, ex Hipp. 159
Vteri cultus in recens nuptis medetur symptomatis hystericis & hypochondriacis. *ibid.*
Vterus grauium morborum in mulieribus author & fundus. 282
Vteri magna est habenda ratio in omnibus morbis mulierum. 284
Vulgus est proletarium, totum incumbit, Veneri, apud ignobiles vulgaris reperitur generatio, ex Plinio. 115
In Vulneribus thoracis omnia tutæ sunt timenda. 296
Z.
Zythi potus an competat in elephantiasi. 264
Zythum damnant Dioscorides & Galenus & Eobanus Hællus. 265

Extrait du Priuilege du Roy.

PAR grace & priuilege du Roy, il est permis à M. IACQUES THEVART, Docteur Regent en la faculté de Medecine en l'Vniuersité de Paris, & Medecin de la Royne Mere du Roy, de faire imprimer les Oeuvres de Medecine de M. GUYLLAUME DE BAILLOV, iadis tres-celebre Docteur, Regent, Doyen, & ancien maistre de ladite Faculté de Medecine son oncle, par luy examinez, corrigez, & augmentez, & mis en bon ordre, avec defences à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre ny debiter lesdits Oeuvres dudit sieur DE BAILLOV, ensemblement ou separément, sans le congé & permission dudit sieur THEVART, durant le temps & espace de dix ans, à compter du iour que lesdites Oeuvres seront acheuées d'imprimer; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, & de mille liures d'amende, despens, dommages & intersts enuers luy; nonobstant oppositions ou appellations quelconques, Chartre Normande, clameur de Haro. ou autre chose à ce contraire, ainsi qu'il est plus au long contenu en l'original. Donnée à Paris le 18. Septembre mil six cens trente-quatre. Signé, par le Roy en son Conseil. RENOUARD, Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Ledit sieur THEVART consent & accorde que IACQUES QUESNEL, marchand Libraire à Paris, iouisse du contenu au present Priuilege.

Ce 3. & dernier volume de Conseils est acheué d'imprimer pour la premiere fois le 15. Novembre 1648.

Errata sic corriges.

PAge 3 lin. 16. suadeat, pag. 8 lin. 19. lixiuium. Ead. pag. 16 lin. 34. imponantur, pag. 10 lin. 23. prehenderint, lin. vlt. ægri, pag. 16 lin. 8. Ergo pag. 21 lin. 28. fuliginosi, pag. 23 lin. 13. hinc lachrymæ, pag. 25 lin. 30. in facie, pag. 14 lin. 14. multum, & lin. 28. feri tenuis, & vlt. lin. langius, pag. 35 lin. 17. transeundus, pag. 37 lin. 26. mixtum aliquid, pag. 40 lin. 16. poeta, pag. 41 lin. 6. serosum, & lin. 15. *αἰματώδες*, pag. 41 lin. 24. *καθ' ἑαυτὸν*, & lin. 36. *ἐδίσταρα*, pag. 43 lin. 30. *ἀπορρέουσα*, pag. 47 lin. vlt. fibras, pag. 49 lin. 26. pro bonorum lege humorum pag. 51 lin. 12. Platoni, pag. 9 lin. 9. borborysmi, pag. 60 lin. 19. alioquin, pag. 61 lin. 12. cras-
sefactionem, lin. 33. sed. pag. 65 lin. 22. in ventrem, pag. 75 lin. 8. larissæa, pag. 77. l. 15. forum, pag. 80. lin. 10. & alibi sæpius pro scynæ lege Chinæ vel potius ad congruè loquendum leg. rad. sinarum, pag. 85 lin. 2. Pugeses & borboniæ, pag. 90 lin. 14. scrotum, pag. 95 lin. 5. Hypocratico, pag. 98. lin. 4. populeoue, pag. 100 lin. 23. defæcatus, pag. 101 lin. vlt. decerni, pag. 102. lin. 3. rad. dictamni, pag. 104 lin. 112. halicacabi, pag. 109 lin. 13. irriguus, pag. 114 lin. 30. citrini, pag. 123. lin. 29. fluorem, pag. 124 lin. 10. iua, pag. 128. lin. 14. Peruuiano, pag. 135. lin. 15. hydragogum, pag. 141. lin. 12. Ischium Pag. 144. lin. 5. vsus pag. 179. lin. 3. stranguriam, pag. 182. lin. antep. conferuæ, pag. 192. lin. 18. laborauit. Et in marg. omnis, pag. 202. lin. 7. hydrargyri, pag. 208. in marg. vinum substantia neruosis partibus noxium, qualitate ami- cum, pag. 212. in marg. apparet cum, pag. 239 lin. 4. fugitiuo, & lin. 2. & 5. Gonorrhœæ Go- norrhœam, pag. 243. varices de genere eorum quæ, pag. 246. lin. 28. berberorum. pag. 247. lin. 4. tenui, & subfinem lin. testatur, pag. 250. lin. 6. dele integram, p. 255. lin. 15. auriginosorum, p. 271. lin. antep. rebellante, pag. 272. lin. 6. contactuque, & lin. 8. spica & pag. 286. lin. 4. pede, pag. 317. lin. 14. meatus.

Cætera emendabit candidus Lector.

